


YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL
LIBRARY

THE GIFT OF
Mrs. J. G. Dusser de Barenne



Dr. J. G. Dusser de Barenne

Dr. J. G. DUSSER DE BARENNE
UTRECHT.

[Handwritten signature]

Dr. J. G. DUSSER DE BARENH
UTRECHT.

Die

Vasomotorisch-trophischen Neurosen.

Eine Monographie

von

Dr. R. CASSIRER

Privatdozent an der Universität Berlin.

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 24 Abbildungen im Text und 24 Tafeln.



BERLIN 1912
VERLAG VON S. KARGER
KARLSTRASSE 15.

Alle Rechte vorbehalten.

RC 343

912 D

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn Professor Dr. H. Oppenheim

in Dankbarkeit gewidmet

vom Verfasser.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Die zweite Auflage der vasomotorisch-trophischen Neurosen, die ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe, nachdem die erste seit mehreren Jahren vergriffen war, erscheint in wesentlich veränderter Gestalt. Die Zunahme der Literatur über den Gegenstand wie die wachsende eigene Erfahrung haben zu einer erheblichen Vermehrung des Umfanges des Buches geführt. Außerdem habe ich mich entschlossen, eine Reihe von Abbildungen und Tafeln einzufügen, die hoffentlich ihren Zweck erfüllen, die Darstellung der geschilderten Krankheitsbilder eindringlicher zu gestalten. Durch das Entgegenkommen meines Verlegers, der auf alle meine Wünsche mit größter Bereitwilligkeit eingegangen ist, brauchte ich mir in dieser Beziehung keinerlei Beschränkung aufzuerlegen. Ich möchte nicht unterlassen, Herrn Verlagsbuchhändler Karger auch an dieser Stelle meinen besten Dank abzustatten. Mein Dank gebührt ferner Herrn Kunstmaler Max Landsberg, der die schwierigen farbigen Abbildungen hergestellt hat.

Das Gebiet, das ich behandelt habe, ist auch heute noch eins der schwierigsten und dunkelsten der ganzen Physiologie und Pathologie. Aber ein wenig mehr Licht haben die Forschungen des vergangenen Dezenniums doch hineingetragen. Die Lehre vom Aufbau und den Funktionen des vegetativen Systems beginnt ein festeres Fundament zu bekommen; ich gebe mich der Hoffnung hin, daß diese Zunahme unserer Kenntnisse und unseres Wissens auch meiner Darstellung zugute gekommen ist: stellen doch meiner Auffassung nach die vasomotorisch-trophischen Neurosen einen wichtigen Teil der gesamten Pathologie des Sympathicus dar. Vielleicht ist die Zeit auch nicht mehr fern, in der dieses Verhältnis in der Nomenklatur zum Ausdruck gebracht werden kann und es möglich ist, an die Stelle der jetzigen Bezeichnungen eine sachgemäßere Terminologie zu setzen.

Es liegt ein wenig im Zuge der Zeit, der ätiologischen Forschungsrichtung vor der symptomatologischen allzusehr den Vorzug zu geben. Auch auf unserem Gebiete macht sich diese Tendenz geltend. Die Zunahme unserer Kenntnisse von dem Wesen und der Geltung der inneren Sekretion ist unverkennbar, und bei den engen Beziehungen, die überall zwischen innerer Sekretion und vegetativem Nervensystem herrschen, ist das Bestreben leicht verständlich, das pathologische Geschehen im Reiche des Sympathicus in Abhängigkeit von Störungen der inneren Sekretion zu bringen. Bei diesem Vorwärtsdrängen werden allzuleicht die entgegenstehenden Schwierigkeiten ungenügend ein-

geschätzt: die Mangelhaftigkeit, Unvollständigkeit und Vieldeutigkeit des tatsächlichen Materials wird übersehen. Was als Lösung der schwebenden Fragen imponiert, bedeutet häufig genug nur eine Verschiebung des bisherigen Standpunktes der Wissenschaft.

Die Fortschritte unserer ätiologischen Erfahrungen dürfen keinen Verzicht auf Erweiterung und Vertiefung unserer symptomatologischen Erkenntnisse bedingen. Ich habe mich in dem vorliegenden Buche überall bemüht, der intimeren Erforschung der Krankheitszeichen den ihr zukommenden Rang zu wahren.

Berlin, im Juni 1912.

R. Cassirer.

Vorwort zur ersten Auflage.

Die vorliegende Arbeit verdankt ihre Entstehung den klinischen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren in der Poliklinik des Herrn Professor Oppenheim zu sammeln Gelegenheit hatte. Es begegneten mir da wiederholt Krankheitsbilder, deren Klassifizierung ungewöhnliche Schwierigkeiten machte, weil sie keiner der bisher bekannten und umgrenzten Krankheiten völlig entsprachen. Die Symptome dieser Kranken bezogen sich meist auf Störungen der Sensibilität, der Vasomotilität und der Trophik der gipfelnden Teile des Körpers. Man hat bisher ähnliche Krankheitsbilder und Symptomengruppen unter dem Titel „Vasomotorisch-trophische Neurosen“ zusammengefaßt. Man rechnete zu ihnen die Akroparästhesie, die vasomotorische Neurose Nothnagels, die Erythromelalgie, die Raynaudsche Krankheit und das umschriebene flüchtige Ödem. Ich habe außer den eben genannten Affektionen noch einige weitere, ihnen klinisch nahe stehende, unter denen ich besonders die Sklerodermie erwähne, in den Kreis meiner Besprechungen gezogen, und habe als Titel meiner Arbeit die altgewohnte Bezeichnung „Vasomotorisch-trophische Neurosen“ gewählt. Ich weiß aber sehr wohl, und möchte dies gleich am Anfang betonen, daß dieser Titel in verschiedener Beziehung zu beanstanden ist. Nicht in allen der genannten Krankheitsbilder finden wir vasomotorische und trophische Symptome vereint, und fast in ihnen allen sind außer diesen Krankheitszeichen noch andere, namentlich solche sensibler Natur, vertreten. Ja, die letzteren stehen z. B. in den Akroparaesthesien durchaus im Vordergrund. Auch die Bezeichnung aller dieser Krankheitsbilder als Neurosen gibt zu Bedenken Anlaß. Aber ich habe mich vergebens bemüht, einen besseren Titel ausfindig zu machen. Man könnte versucht sein, die besondere Lokalisation der Symptome an den Akra im Titel zum

Ausdruck zu bringen, aber die Bezeichnung „Akropathien“ ist eine zu weite und umfassende; hierzu würde unbedingt unter anderem die Akromegalie und die Marfanische Krankheit zu rechnen sein; diese gehören in vieler Beziehung nicht in unseren Kreis hinein, und ich habe sie deshalb nicht besprochen. Bedenken aller Art erheben sich auch gegen die Bezeichnung „die Akro-neurosen“, und so habe ich einen alten, schlechten Titel gewählt, um nicht einen neuen, nicht viel besseren anwenden zu müssen. Die Krankheitsbilder, die in mir die Idee zu meiner monographischen Darstellung dieses Gebietes erweckten, hatten, wie erwähnt, die Besonderheit, daß sie keiner der bisher streng gesonderten Erkrankungen dieser Gruppe sich anstandslos einfügen ließen, während sie der Gruppe der vasomotorisch-trophischen Neurosen unverkennbar angehörten. Sie trugen bald von diesem, bald von jenem Typus ein oder mehrere Kennzeichen an sich, und so mußte ich zu der Überzeugung kommen, daß im einzelnen die Grenzen der genannten Affektionen nicht so scharf sein können, wie dies nach den meisten bisherigen Darstellungen zu vermuten war. Freilich haben neuere Beobachter auch sonst schon der Ansicht Ausdruck gegeben, daß die Trennung der einzelnen Formen nicht immer streng durchführbar ist (Oppenheim, Kulenburg). Insbesondere hat Oppenheim in seinem Lehrbuch ausdrücklich hervorgehoben, daß „auf keinem anderen Gebiete die Klassifikation solche Schwierigkeiten bereite wie auf dem der vasomotorischen und Trophaneurosen, da hier die mannigfachen Übergangs- und Mischformen vorkommen.“

Ich habe dem klinischen Teile eine längere anatomisch-physiologische Einleitung über die vasomotorischen und sekretorischen Centren und Bahnen und über die Abhängigkeit der Ernährung der Gewebe von Alterationen des Nervensystems vorausgeschickt. Eine solche schien mir bei den hier herrschenden verwickelten und vielfach noch so unklaren Verhältnissen erwünscht und für die klinische Betrachtung fruchtbringend zu sein. Die Mangelhaftigkeit und Unfertigkeit unserer Kenntnisse in diesen Abschnitten der Anatomie und Physiologie spiegelt sich natürlich in unserer Auffassung der pathologischen Erscheinungsformen dieses Gebiets nur zu gut wieder, und gar zu vieles trägt daher auch in meiner Darstellung einen provisorischen und hypothetischen Charakter.

Herr Prof. Oppenheim hat mir das reichhaltige Material seiner Poliklinik vollkommen zur Verfügung gestellt. Dafür und für die fördernde Unterstützung und das anregende Interesse, das er meiner Arbeit dauernd entgegengebracht hat, sage ich ihm auch an dieser Stelle meinen ergebensten Dank.

Berlin, im September 1900.

R. Cassirer.

Inhaltsverzeichnis.

| Verzei. | Seite | |
|---|--------------|--|
| Erstes Kapitel. Anatomisch-physiologische Einteilung | 1—145 | |
| 1. Anatomie und Physiologie der vasomotorischen Bahnen und Centren | 1—39 | |
| Die vasomotorischen Centren in der Medulla oblongata beim Tier | | |
| 1. Bahnen von da zu den spinalen Centren 2. Der spinale Vervorg des Sympathicum 3. Der Aufbau des vegetativen Systems 4. Die physikalischen Eigenschaften des vegetativen Systems 11. Die vasomotorischen Intervallen der Extremitäten 12. der Gehirngefäße 13. Physiologie der Vasomotorenzentren 14. der Vasokonstriktoren 16. der Vasodilatatoren 21. Corticale und subcorticale Vasomotorenzentren 23. Das Oblongata-Centrum beim Menschen 25. Spinale vasomotorische Bahnen und Centren beim Menschen 26. Corticale und subcorticale Centren beim Menschen 25. Zusammenfassung 27. | | |
| 2. Anatomie und Physiologie der sekretorischen Bahnen und Centren | 39—52 | |
| Abhängigkeit der Drüsentätigkeit vom Nervensystem 39. Bahnen und Centren der schweißsekretorischen Nerven 42. Einfluß des ausgehenden Temperatur von Giften usw. auf die Schweißsekretion 49. | | |
| 3. Die trophischen Funktionen des Nervensystems | 52—145 | |
| Die vasomotorischen Theorien: die Theorie von Schiff 53. sympathische Hyperämie, von Brown-Séquard 54. sympathische Anämie 56. Die Theorie der trophischen Nerven (Sauerbruch) 58. Die trophischen Störungen als Folge einer Reizung der Nerven im allgemeinen 59. als Folge einer Abschwächung des nervösen Einflusses 69. Der Einfluß reflektorischer Reize 70. Keine dieser Theorien allgemeingültig 71. | | |
| Die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Teile des Nervensystems voneinander. 106. Neurontheorie 11. Wallerische Degeneration 73. Retrograde Degeneration 75. Sekundäre Atrophie zweiter Ordnung 84. Reflektorische Bedingtheit der trophischen Funktionen des Nervensystems 87. Die Abhängigkeit einzelner Funktionen und Aufbau der Zelle 91. Abhängigkeit der Ernährung der Muskulatur vom Nervensystem 92. des Knochengewebes 101. der Gefäße 110. | | |

der Gefäße 113, der Haut und ihrer Anhangsgebilde 129. Zusammenfassung 139.

Zweites Kapitel. Die Akroparästhesien und verwandte Zustände 144—181

Geschichtliches 144. Ätiologie 147. Symptomatologie 151. Die Parästhesien und die übrigen sensiblen Symptome 151. Die vasomotorischen Symptome 155. Verlauf 157. Pathologie 165. Zwei Gruppen: Reine Akroparästhesien (Typus Schallite) und Akroparästhesien mit vasomotorischen Symptomen (Typus Kothlitz) 159. Rare Kaskis Fälle 160. Heberden'sche Knötchen 161. Vasomotorische Ataxie 163. Selbstmordtendenz des Symptomenkomplexes aber häufig auf dem Boden neuropathischer Dürkose 164. Wesen der Krankheit 167. Diagnose 172. Abgrenzung von Neuritis, Neuralgien, Beriberi, Beriberi 172, von Hysterie und Neurose 174, von Tetanie 175, von Akroalgie 176, von den organischen Krankheiten des Nervensystems 176. Von Intoxikationen 178. Prognose 179. Therapie 180.

Drittes Kapitel. Die Erythromelalgie 182—274

Geschichtliches 182. Ätiologie 183. Alter, Geschlecht 183. Beruf, Lebensstellung 184. Theoretische Schädliehkeiten 184. Rheumatische 185. Vergiftungen 185. Symptomatologie 186. Schmerz, Hitze, Schwellung 186. Sitz dieser Erscheinungen 191. Sekretorische Störungen 195. Trophische Störungen 196. Sensible Störungen 202. Motorische Störungen lokaler Art 204. Atypische vasomotorische Störungen (Übergang zur Raynaud'schen Krankheit) 205. Allgemeinzustand 208. Unkomplizierte Fälle 209. Erythromelalgie und funktionelle Erkrankungen des Nervensystems 211 und organische Erkrankungen des Nervensystems 215 und Zeichen von peripheren Nervenkrankheiten 215. „Periphere“ Erythromelalgie 215. Erythromelalgie und Erkrankungen des Herzens und der Gefäße 221. Pathologische Anatomie, Pathologie 228. Anatomisch anatomische Fälle 228. Zusammenfassung 233. Frühere Ansichten über die Pathogenese 233. Die Erythromelalgie erhebt sich zusammen aus vasomotorischen, trophischen, sensiblen und sekretorischen Störungen 242. Sitz der Krankheit 245. Art der krankhaften Reize 258. Zusammenfassung 259. Diagnose 260. Abgrenzung von und Übergänge zu anderen vasomotorisch-trophischen Neurosen 260. Abgrenzung von Akroalgie 265, von Neuritis und Neuralgie 264, von Akrosynke 265, von Erythema 265, von Erythromelie 266, von Polydynamie 267, von Erkrankungen des Gefäßapparates 268. Verlauf, Prognose 271. Therapie 272.

Viertes Kapitel. Die Raynaud'sche Krankheit 275—305

Erfassung. Allgemeines über Gangrän 275. Die neuropathische Gangrän 276. Die Raynaud'sche Gangrän. Historisches über die Raynaud'sche Krankheit 277. Ätiologie 282. Geschlecht, Alter 282. Vorformen 285. Stand, Natursaktheit 286. Heredität 287. Anämie, Überanstrengung, Trauma 288. Kälte, Nies 290. Symptomatologie 290. Ein typischer Fall 293. Vasomotorische Symptome 294. Syncope locale 294. Angiurie locale 298. Gangrän 299. Lokalisation 310. Andere trophische Störungen 313. Ergebnisse der Einwirkung von Röntgenstrahlen 317. Sensible Symptome 322. Sekretorische Symptome 323. Motorische Störungen 324. Uge-

skulische Symptome 334. Kontraktionen größerer Arterien 337. Plethysmographische Untersuchungen 342. Allgemeinsymptome 352. Verlauf 354. In Anfällen 354. Dauer der Anfälle 355. Fehlen von Anfällen 356. Fehlen einzelner klassischer Symptome 360. Komplikationen 361. Raynoldsche Krankheit nach akuten Infektionskrankheiten 362, nach Malaria 363, im Verlauf chronischer Infektionskrankheiten 368. Raynoldsche Krankheit und Nierenaffektion 369, und Hämoglobinurie 369, und Albuminurie 374, und Mellurie 377, nach Gift, Alkoholfismus usw. 378, und organische Erkrankungen des Gefäßsystems und des Herzens 381, und Lues 384, und organische Erkrankungen des Zentralnervensystems 388, und organische Erkrankungen des peripheren Nervensystems 390, und funktionelle Erkrankungen des Nervensystems 396. Raynoldsche Krankheit und allgemeine Störungen vegetativer Innervation 400, und bläuliche Ödeme 404, und Chorea, Epilepsie, psychische Störungen 407, und Dystrophia musculorum progressiva 408. Pathologische Anatomie 411. Veränderungen des Nervensystems 412, des Gefäßsystems 416, der peripheren Gefäße und Nerven 422. Negative Befunde 423. Pathologie 425. Genese der vasomotorischen Symptome 426. Genese der trophischen Störungen insbesondere der Gangrän 432. Genese der sensiblen Symptome 435. Die Pathogenese der motorischen Symptome 445. Das Wesen der Krankheit 446. Eine centrale vasomotorische Neurose 447. Die vasculäre Theorie 451. Die vasculäre Theorie 452. Eigene Ansicht: die Raynoldsche Krankheit ist eine vasomotorisch-trophische Neurose 457. Sitz der Krankheit 458. Krankheitsursache 459. Zusammenfassung 461. Diagnose 469. Unterscheidung von den verwandten Neurosen 467, insbesondere von Erythralgie 469, von Ödemen 474, von anderen organischen centralen Nervenerkrankungen 476, von peripheren Neuritiden 478, von der Neurose 479, von Herz- und Gefäßkrankheiten 480, von der Endometritis 483, von interstitiellen Hämien 489, von Ergasimus 490, von Frostbeulen 496. Prognose 498. Therapie 499.

Anhang. Die *Acrasphylia chronica*. 508—525

Acrasphylia chronica anaesthetica 508. *Acrasphylia chronica hypertrophica* 516. Unterscheidung von der Akroegalie 519. Pathogenese dieser Formen 527. Differentialdiagnose 527. *Acrasphylia chronica* und bläuliche Hautatrophie 530, chronische *Acrasphylia* bei organischen centralen Nervenerkrankungen 532.

Fünftes Kapitel. Die *Sclerodermie*. 536—700

Einführung 536. Ätiologie 537. Alter, Geschlecht 537. Heredität 539. Vorangegangene Infektionskrankheiten 540. Rheumatische Schädelaffektionen 541. Trauma 542. Allgemeine Neurosen 543. Organische Nervenerkrankungen 544. Symptomatologie. Die sklerodermischen Veränderungen 546. Stadium oedematosum 547. Stadium indurativum 548. Stadium atrophicum 549. Sekretorische Symptome 552. Vasomotorische Störungen 553. Pigmentanomalien 556. Parasthesien 558. Ernährungsstörungen der Abhangsgeleße der Haut 561. Sensibilitätsstörungen 562. Myofibrillstörungen, Myosklerosen 566. Veränderungen der Knochen und Gelenke 571. Veränderungen der Schleimhaut 579. Veränderungen der inneren Organe

581. Allgemeinsymptome 582. Einteilung in verschiedene Unterformen 584. Das bandartige Sklerodermis 588. Die Sklerodermakrylie 593. Ihre Beziehungen zur Raynaud'schen Krankheit 597, zur Erythrodalgie 608. Verlauf 609. Prognose 612. Pathologische Anatomie 614. Die Veränderungen der Haut 614, der großen Gefäße 620, der Muskeln 621, der Knochen 622, der inneren Organe 622, des Nervensystems 624. Pathogenese 625. Die Schilddrüsen-theorie 627. Der Zusammenhang mit anderen Drüsen mit innerer Sekretion 632. Die Gefäßtheorie 638. Die nervöse Theorie 640. Die Säure-ferment- als Angiotropheneurose 641. Als Sympathikus-erkrankung 643. Entscheidung zugunsten der nervösen Theorie 644. Sitz der Krankheitsursache 653. Art der Krankheitsursache 655. Diagnose 657. Die Abgrenzung gegenüber den verwandten Neurosen 657. Die Hemiatrophia faciei progressiva 658. Vorkommen, Analogie 660. Ausdehnung des Leidens 661. Sympathikus-symptome 663. Anatomische Untersuchungen 664. Pathogenese 666. Hemiatrophia totalis 671. Hemiatrophia operaria 674. Hemihypertrophia faciei und totalis 677. Unterscheidung von Sklerodermis und trophischen Symptomen bei Glikos 682, bei peripheren Nervenverletzungen 684. Unterscheidung vom Morbus Addisonii 684, von der idiopathischen Hemiatrophie 688, vom Sklerema neonatorum 690, vom Geheulhermatismus 695, von der Polymyositis 695. Therapie 697.

Sechstes Kapitel. Das akute unvollstehende Ödem.

331—332

Einteilung 331. Ätiologie 335. Alter 333. Heredität 334. Rheumatische Affektionen 337. Intoxikationen 337. Nervenleiden 339. Psychische und physische Traumen 344. Thermische Schädlichkeiten 345. Menstruation und ähnliches 346. Symptomatologie 348. Die Hautschwellungen 349. Schwellen, trophische, akutenartige Symptome 354. Lokalisation 358. Schwellungen der Schleimhäute der oberen Luftwege 359, der Conjunctiva und der Nasenschleimhaut 360, der tieferen Luftwege 361. Die Magen- und Darm-schwellungen 369. Anschwellung der Sehnenstrahlen 343, der Muskeln 344, der Gelenke 345. Neuritis optica 346. Andere ungewöhnliche Lokalisationen 347. Anamnesen der Hämorrhagie 349. Cerebrale Symptome 354. Allgemeinsymptome 355. Verlauf 353. Prognose 356. Beziehungen zu anderen näher verwandten Affektionen 360. Zur Urticaria 360. Zu den vasomotorisch-trophischen Neurosen 362. Übergangsstadien zur Barnard'schen Krankheit 368. Epidermolysis bullata und ihre Beziehungen zum bürstigen Ödem 371. Purgare und bürstiges Ödem 378. Pathogenese 380. Einteilung des Ödems 381. Die Frage der Lymphbildung 382. Die Serumbilckheit 387. Die Dermographie 392. Das akute unvollstehende Ödem beruht auf einer Affektion des Nervensystems 393. Es ist keine einfache Angioneurose 395. Sitz der Erkrankung 399. Pathogenese der einzelnen Symptome 401. Zusammenfassung 405. Diagnose 405. Symptomatische bürstige Ödeme 406. Chronische vasomotorische Ödeme 409. Unterscheidung vom hysterischen Ödem 410. Das Trophicoedem 416. Konstat. des Trophicoedems 417. Analogie 418. Art des Ödems 419. Lokalisation 420. Verlauf 422. Pathogenese 425. Abgrenzung des bürstigen Ödems vom starren Ödem 426, vom Erythema 429. Therapie 429.

| | Seite |
|--|----------------|
| Siebentes Kapitel. Die multiple neurotische Hautgangrän | 833—885 |
| Einführung 833. Ätiologie 837. Trauma 833. Neuropathische Belastung 839. Symptomatologie 841. Vorausgehende sensible und vasomotorische Symptome 843. Entstehung der Nekrosen ohne Bläschenbildung 842, mit Bläschenbildung 844. Untersuchungen von Kreibich 847. Versuchsang, Geschwulstbildung 849. Vererbung 850. Gesamtverlauf 852. Allgemeine nervöse Symptome 850. Prognose 861. Pathogenese 858. Beziehungen zur hysterischen Gangrän 854. Neurotische Ursache der Gangrän 863. Experimentelle Untersuchungen von Kreibich 863, von Bettmann 865, von Zoller 866. Beziehungen zur Raynandschen Gangrän 867. Vorkommen von multipler neurotischer Gangrän bei organischen Nervenerkrankheiten 871. Bei peripheren Nervenerkrankheiten 872. Zusammenfassung 874. Diagnose 876. Unterscheidung vom Arterioskleros 876. Von anderen Fällen multipler Gangrän 884. Therapie 885. | |
| Schluss | 886—890 |
| Literaturverzeichnis zu Kapitel I: | |
| 1. Die vasomotorischen Bahnen und Centren | 897—902 |
| 2. Die sekretorischen Bahnen und Centren. | 902—903 |
| 3. Die trophische Funktion des Nervensystems | 904—914 |
| Literaturverzeichnis zu Kapitel II: Die Akroparästhesien | 914—916 |
| Literaturverzeichnis zu Kapitel III: Die Erythromelalgie | 917—922 |
| Literaturverzeichnis zu Kapitel IV: Die Raynandsche Krankheit 922—949 | 922—949 |
| Literaturverzeichnis zu Kapitel V: Die Sklerodermie | 948—965 |
| Literaturverzeichnis zu Kapitel VI: Das akute unbeschriebene Ödem 965—982 | 965—982 |
| Literaturverzeichnis zu Kapitel VII: Die multiple neurotische Hautgangrän | 982—996 |

Verzeichnis und Erklärung der Tafeln.

| | nr. Seite |
|--|------------|
| Tafel I. Schema des Aufbaus des vegetativen Systems | 10 |
| Tafel II. Röntgenbild des gesunden rechten Fußes in einem Falle von reflektorischer Atrophie des Beins nach Trauma | 67 |
| Tafel III. Röntgenbild des kranken linken Fußes desselben Falles | 67 |
| Tafel IV. Röntgenbild des kranken rechten Fußes in einem zweiten Fall von reflektorischer Atrophie des Beins nach Trauma (siehe auch Figur 1 auf S. 102) | 108 |
| Tafel V. a) Ankylose und Synchysis beider bei Raynaud'scher Krankheit und Sklerodactylie. Dorsum manus | 297 u. 301 |
| b) Ankylose und Synchysis beider bei Raynaud'scher Krankheit und Sklerodactylie. Vola manus. (Die Krankengeschichte des Falles findet sich auf S. 300.) | 297 u. 301 |
| Tafel VI. a) Ankylose, Synchysis und Hypernämie beider bei Raynaud'scher Krankheit. | 300 |
| b) Kleines gangränöses Geschwür an der Palpa der Finger bei Raynaud'scher Krankheit | 304 |
| Tafel VII. Lokale Hyperämie (Rubor) der Finger bei Raynaud'scher Krankheit. Am Handrücken lokale Cyanose | 300 |
| Tafel VIII. Schwere Gangrän der Finger bei Raynaud'scher Krankheit mit Sklerodactylie | 305 |
| Tafel IX. Röntgenbild eines atypischen Falles von Raynaud'scher Krankheit. Atrophische Veränderungen in den Diaphysenphalangen | 310 |
| Tafel X u. XI. Schwere atrophisch-destruktive Veränderungen an den Knochen der Hand in einem Fall von Raynaud'scher Krankheit | 318 |
| Tafel XII. Atrophische und zum Teil auch proliferierende Prozesse an den Knochen der Hand in einem Fall von Raynaud'scher Krankheit; kleine milchtrichterförmige Auflagerungen an der Spitze der Endphalanx des dritten Fingers | 320 |
| Tafel XIII. Atrophische Veränderungen der Knochen bei Raynaud'scher Krankheit. Verschmälerung der Corticalis, Erweiterung der Spongiosamassen an den Phalangen (wie auch auf Tafel X—XII). Chronisch-atrophische Veränderungen, zum Teil auch noch in den Mittelhand- und Handwurstknochen. Am V. Finger maulwurfsförmige atrophische Fleck (gichtische Knochenkrankung) | 326 |
| Tafel XIV. Atrophische Veränderungen bei Raynaud'scher Krankheit. An der Endphalanx des zweiten Fingers. Ablagerung von knöchernem Detritus (Gichtverfärbung). Siehe auch Figur 3 auf S. 321 | 329 |
| Tafel XV. Atrophische Veränderungen der Knochen, Verschwinden der Gelenkspalten bei Raynaud'scher Krankheit plus symmetrischer Speicheldrüsenanschwellung (Mikulicz'sche Krankheit) | 404 |
| Tafel XVI. Fall von Akroasphyria interna hypertrophica | 517 |
| Tafel XVII. Atrophie der ganzen linken Schulter in einem Fall von Sklerodermie ex plagues (siehe auch Figur 12 auf S. 523). Bei S. Scapula | 572 |
| Tafel XVIII—XIX. Derselbe Fall. Osteopetrotische Prozesse an den Füßen, Versteifung des Fußskeletts (siehe auch Figur 15 auf S. 574) | 573 |

- Tafel XX–XXII. Schwere destruktiv-atrophische Veränderungen des Knochengewebes der Hand in einem Fall von Sclerodaktylie. Rarefaktion der Spongiosa, totale Zerstörung von Knochenteilen, Verschwinden ganzer Phalangen, Beteiligung des Gelenkapparates an den destruktiven Prozessen (siehe auch Figur II auf S. 586) . . . 575
- Tafel XXIII. Verschmälerung und Verdünnung der Knochen, besonders der Endphalangen in einem Fall von Sclerodaktylie. Deformation vom Gelenkenden bis in das Handgelenk . . . 572 u. 599
- Tafel XXIV. Fall von chronischem neurotischen (dem mit vasomotorischen Erregungen: Trophiden) . . . 621

Erstes Kapitel.

1. Anatomie und Physiologie der vasomotorischen Bahnen und Centren.

Gewisse Zeit, bevor die Erfahrungen der menschlichen Pathologie uns genauere Kenntnisse über vasomotorische Centren verschafft hatten, war von seiten der Physiologen der Versuch gemacht worden, das Vorhandensein und die Lage solcher Centren beim Tiere zu demonstrieren. Cl. Bernard wies in seinen berühmten Versuchen nach, daß, wenn er durch den sogenannten Zuckerstich, die Piquüre, den Boden des vierten Ventrikels verletzte, nach einigen Stunden Zuckerausscheidung durch den Harn erfolgte. Es glaubte, daß diese Mellurie durch eine Hyperämie der Leber bedingt sei, als deren Ursache eine Verletzung des Centrums der Lebervasomotoren anzunehmen ist. War auf diese Weise wenigstens ein Teil des Vasomotorencentrums nachgewiesen, ohne daß übrigens etwa eine ganz bestimmte, eng umgrenzte Stelle des Ventrikelbodens als Ort des Centrums angegeben worden wäre, so versuchten Ludwig und seine Schüler Thiry, Owyjanskow und Dittmar eine genauere Feststellung des ganzen Centrums beim Kanichen. Es unfällt nach ihnen eine an multipolären Ganglienzellen reiche Stelle, deren untere Grenze etwa 3 mm über der Spitze des Calamus scriptorius gelegen ist, während die obere etwa dem oberen Rand des Corpus trapezoides und dem Facialisursprung entspricht. Das ganze Centrum hat demgemäß ungefähr eine Länge von 4 mm; jede Körperhälfte hat ihr Centrum, das in einer Entfernung von $2\frac{1}{2}$ mm von der Mittellinie gelegen ist, beide Centren sind durch Commissuren miteinander verbunden. Eine Reizung dieses Gebietes hat Verengung aller Arterien des Körpers zur Folge und als Konsequenz davon Steigerung des arteriellen Blutdrucks. Eine Lähmung des Gesamtcentrums läßt die Gefäßwände erschlaffen und erweitert alle Arterien unter enormer Abnahme des Blutdrucks. Es ist anzunehmen, daß dieses für alle Gefäße gemeinsame Centrum in eine Anzahl dicht zusammenliegender Einzelcentra zerfällt, die für sich bestimmte Gefäßprovinzen beherrschen; experimentell näher festgestellt wurden von diesen Centren durch Cl. Bernuards schon erwähnte Versuche die für die Leber- und Nierenvasomotoren.

Physiologische Untersuchungen ergaben über den weiteren Verlauf der von diesem Centrum ausgehenden Vasomotoren folgendes: Dittmar stellte fest, daß er die Vorderstränge und ebenso die Hinterstränge und den hinteren Teil der Seitenstränge wegzunehmen konnte, ohne die vasomotorischen Reflexe zu stören. Es bliebe also dann beider-

seits nur ein kleiner prismatischer Raum innerhalb des Seitenstrangs übrig, dessen Verletzung jene Reflexe stört oder aufhebt, er bildet den vorderen Teil des Seitenstranges. Langley zeigte, daß nach Durchschneidung des Halsmarks eine elektrische Reizung der Seitenstränge an der unteren Schnittfläche eine allgemeine Aufrichtung der Haare des Rumpfes erzeugte, was für uns insofern von Interesse ist, weil die *Arrectores pilorum* jedenfalls von sympathischen Fasern versorgt werden. Kölliker (Handb. d. Gewebelehre II. S. 125) gibt wenigstens die Möglichkeit solcher Bahnen an und glaubt, daß sie in den Vorder- oder Vorderseitensträngen liegen könnten.

Diese Bahnen endigen in den verschiedenen Höhen des Rückenmarks und dessen grauer Substanz, indem sie sich um die Zellen aufspalten, die hier in der Mittellinie der grauen Substanz zwischen Vorder- und Hinterhorn liegen. Anatomische Untersuchungen der neueren Zeit haben uns folgendes über die genauere Lage dieser Zellen gelehrt: Die Ganglienzellen liegen in der medialen, dorsalen Zone der Vorderhörner und in der Grenzgegend gegen das hintere Horn, sie sind im ganzen ziemlich klein und senden dünne Nervenfortsätze aus, die in die vorderen Wurzeln übergehen und deren feine, markhaltige Elemente darstellen; diese man gehen durch die *Rami communicantes* ab in den Grenzstrang des Sympathicus über. Gaskell nimmt an, daß auch aus Zellen der Hinterhörner und vor allem auch aus Zellen der Clarke'schen Säule diese feinen Wurzelfasern entspringen, doch ist nach Kölliker (l. c.) dieser Nachweis noch nicht geliefert. In den genannten Zellen wäre der spinale Ursprung des Sympathicus zu suchen. Es leuchtet ein, daß auf rein anatomischem Wege dieser Ursprung sehr schwer festzustellen ist; daher sind denn auch zahlreiche experimentelle Untersuchungen über diesen Punkt angestellt worden. (Biedl, Hoehen, Onuf and Collins, Huot, Troughkofsky, Nottelmann, Lapinsky und Cassirer.) Sie alle basieren auf der Tatsache, daß sich in der Ursprungszelle nach Durchschneidung ihres peripheren Nervenfortsatzes gewisse Veränderungen erkennen lassen. Durchschneidet man also einen sympathischen Nerven, wie z. B. einen *Ramus communicans albus* oder den *Nervus splanchnicus*, so konnte man erwarten, in den Ursprungszellen des Nerven, die man in den mehrfach genannten Zellen des Rückenmarks vermutete, Veränderungen zu finden. Auch die Tatsachen der retrograden Degeneration versuchte man zu diesem Zweck zu verwerten, indem man sich der Marchi-methode bediente. Die Erfolge der Experimente schienen den gehegten Erwartungen zu entsprechen. Biedl fand nach Durchschneidung des Splanchnicus Zellveränderungen in den Seitenhörnern des untersten Halsmarks, von sechsten ventralen Nerven ab, und in den Vorderhörnern des oberen Brustmarks bis zum fünften Dorsalnerven, außerdem enthielten die vorderen Wurzeln in ihrem lateralen Teil

eine ansehnliche Zahl von degenerierten Fasern; solche waren auch noch in den Rami communicantes und selbst im Grenzstrang des Sympathicus vorhanden. Hoeben und Huot, der dessen Untersuchungen fortsetzte, fanden nach Exstirpation des obersten Halsganglions des Sympathicus Veränderungen in der centralen Gruppe der Nervenzellen, besonders betroffen waren die dort liegenden kleineren Zellen, die Veränderungen erstreckten sich vom fünften bis zum achten Halssegment. Sie waren auch auf der der Operation entgegengesetzten Seite nachweisbar, wenn auch in geringerer Stärke. Huot fand weiter sogar Veränderungen in den Zellen des Vaguskerne, in den Zellen um den Aqueductus Sylvii und am Boden des dritten Ventrikels, schließlich auch am Ganglion habenulae. Er glaubte ferner in der Medulla spinalis an der operierten Seite einen Ausfall derjenigen Fasern, die aus dem Seitenstrang in die graue Substanz hineinziehen, zu sehen. Die Marchimethode ergab ihm negative Resultate. Auf Trouchkotskys Untersuchungen, die zu ähnlichen Resultaten führten, gehe ich nicht ein. Laugel-Lavastine hatte Hunden den Grenzstrang des Sympathicus im Abdomen zerstört, er fand im Rückenmark Läsionen besonders an der Basis der Vorderhörner und in den Seitenhörnern. Die Arbeiten von Onuf und Collins müssen wir sorgfältig berücksichtigen. Die Untersuchungen dieser Autoren, die in einer umfangreichen im Jahre 1901 veröffentlichten Arbeit niedergelegt sind, haben überall große Beachtung gefunden; sie sind vielfach so gedeutet worden, als ob durch sie die in Rede stehende Frage definitiv gelöst wäre. Ein genaueres Studium der Arbeit läßt aber erkennen, daß das tatsächliche durch Experimente herbeigeschaffte Material, auf dem die Schlüsse der Verfasser aufgebaut sind, recht wenig umfangreich ist, und daß es mannigfachen Bedenken Anlaß gegeben ist.

Im ganzen haben die Autoren an acht Tieren experimentiert; über fünf dieser Experimente und Untersuchungen wird ausführlich berichtet. Bei einer Katze im Alter von 3½ Wochen wurde das dritte bis fünfte Halsganglion des linken Sympathicus herausgenommen; das Tier wurde zwei Wochen nach der Operation getötet. Bei der Sektion zeigte sich, daß die rechte Seite des Sympathicus anscheinend durch entzündliche Veränderungen, die sich an die Operation angeschlossen hatten, gelitten hatte. Bei der Herausnahme wurde das Rückenmark bis zum vierten Halssegment beschädigt und für die Untersuchung unbrauchbar, von da aus nach oben war es gut erhalten. Untersucht wurde nach Nissl, Marchi und mit Karminfärbung. Die Präparate, die nach Marchi gefärbt sind, beweisen nach Ansicht der Autoren, daß die meisten der aus dem lumbalen Sympathicus stammenden sensiblen Fasern zu den Zellen der Clarksehen Säulen ziehen, die Nisslpräparate, die eine Degeneration der Zellen der Clarksehen Säulen erkennen ließen, zeigen andererseits, daß diese Fasern um die Dendriten dieser

Zellen herum aufliegen. Die Veränderungen wurden doppelseitig gefunden, was von den Autoren zum Teil auf die entzündlichen Veränderungen des rechten Sympathicus bezogen wurde. Da die Veränderungen in den Zellen weiter proximalwärts hinaufreichen, als die in den Fasern, muß für diese ein steigender Verlauf angenommen werden. So weitgehende Schlüsse werden aus einem einzigen Experiment gezogen. Schlüsse, die ganz offenkundig allen möglichen Einwänden Raum geben. Bei einem zweiten Tier wurden das 6.—9. Ganglion thoracicum des Sympathicus herausgenommen (sechs Wochen alte Katze), das Tier wurde nach vier Wochen getötet. Veränderungen nach Marchi fanden sich nicht, auch Nissl zeigen in allen Segmenten die Clarkeschen Zellen Veränderungen und zwar beiderseits, auf der operierten Seite etwas mehr; die Ursache für die Bilateralität der Veränderungen wird in einer Kreuzung der Fasern in der hinteren Commissur, oder auch in einer Kreuzung direkt von einer Clarkeschen Säule zur anderen gesehen.

Auch hier fließt die Doppelseitigkeit der Veränderungen die größten Bedenken ein, wenn man erwägt, wie schwierig die Beurteilung derartiger Zellveränderungen ist, die ja hier wie im ersten Falle nicht etwa einfache sagen, retrograde Veränderungen im selben Neuron, sondern Veränderungen im zweiten nur funktionell zusammengehörigen Neuron darstellen, denn die Zellen der Clarkeschen Säule senden ihre Fasern, wie bekannt und wie auch Onuf und Collins annehmen, in die Kleinhirnsseitenstrangbahn, es kann sich hier also nur um afferente, zu den Zellen der Clarkeschen Säulen ziehende Fasern handeln. Dasselbe Bedenken gelten gegen die Untersuchungsergebnisse eines dritten Falles, Exstirpation des 8.—9. Ganglion thoracicum des rechten Sympathicus mit den Verbindungsästen und einem Teil des Splanchnicus bei einer Katze von 5—6 Wochen. Das Tier wurde nach 6 Monaten getötet. Das 10. und 13. Dorsalsegment wurde auf Quer-, das 11. und 12. auf Längsschnitten untersucht. Wieder wurden Alterationen der Clarkeschen Säulen und zwar atrophisch-regressiven Charakters doppelseitig ohne sicheren Unterschied zwischen links und rechts nachgewiesen. Ferner fanden sich Veränderungen in den Zellen des Seitenhorns, die namentlich auf der operierten Seite geschrumpft und kleiner erschienen und Läsionen in einer Gruppe, die die Autoren als paracentrale bezeichnen; die Zellen liegen ventral von denen der Clarkeschen Säule um den Centralkanal herum. Sie sind beim operierten Tier kleiner als in der Norm, zum Teil in ihrem Nisslkörperaufbau geschädigt. Es besteht keine ausgesprochene Differenz zwischen beiden Seiten. Schließlich sprechen die Autoren auch noch von einer intermediären Zone, zwischen Seitenhorn, Basis des Vorder- und Hinterhorns und paracentraler Gruppe. Es finden sich hier normalerweise kleine und wenig zahlreiche große Zellen — auch hier wurde bilateral eine Schrumpfung der Zellen nachgewiesen.

Bei einem vierten und fünften Tiere wurde das Ganglion stellatum einmal links, einmal rechts herausgenommen; die Tiere wurden drei bis fünf Monate später getötet. Wieder fanden sich weitverbreitete Alterationen der Zellen und zwar in den Zellen beider Seitenhörner, beider paracentraler Gruppen und beider Clarkescher Säulen. Die Veränderungen reichten nach unten mindestens bis zum 9. Dorsalsegment, was auf einen absteigenden Verlauf des betreffenden Fasern im Rückenmark resp. im Grenzstrang hinweist. Mit der Färbemethode waren Fasendegenerationen nicht nachweisbar, was auf die Doppelseitigkeit der Veränderungen zurückgeführt wird.

Die Erklärung der Zellläsionen in der paracentralen Gruppe macht den Autoren selbst große Schwierigkeiten, da sie bei Anwendung der Marchimethode keine Degenerationen in den vorderen Wurzeln fanden und auch sonst Fasern, die von dort aus in die vorderen Wurzeln ziehen, nicht nachzuweisen imstande waren. Sie vermuten trotzdem, daß es sich um einen Kern handelt mit „efferenter Funktion“. Dieser Anschauung fehlt aber jede stützende anatomische Sicherheit. Für die Zellen des Lateralhorns nehmen sie dieselbe Funktion an, weil sie ganz denselben Bau haben wie die der paracentralen Gruppe. Auch diese Anschauung ist somit durchaus hypothetisch; die Zellen der intermediären Zone haben teils den Charakter der eben genannten teils den der Zellen der Clarkeschen Säule. Die Bestimmung ihrer Funktion erfolgt nach diesen Gesichtspunkten.

Bei den beiden Tieren, denen das Ganglion stellatum exstirpiert wurde, wurde auch die Medulla oblongata untersucht. Oatuf und Collins fanden Veränderungen an zwei Stellen; die eine entspricht dem sogenannten dorsalen Vago-Glossopharyngeuskern. Sie nehmen an, daß dessen Zellen Fortsätze aussenden, die als viscerale efferente Fasern zu den Eingeweiden gehen (enteromotorische Fasern). Die andere Stelle liegt ventral und lateral von der spinalen Glossopharyngeuswurzel, stellt ein Homologon der Clarkeschen Zellen dar und hat dieselben Funktionen. In dieser Beziehung bestätigen die Autoren also Huets Untersuchungen; ebenso stimmen die späteren von Kobustam und Wolffstein mit ihnen überein.

Auch die vorstehend ausführlich berichteten Experimente haben meines Erachtens die Frage der spinalen Lokalisation des Sympathicus nicht definitiv gelöst. Überall treffen wir in den Darlegungen der Autoren auf Vermutungen, Hypothesen, Annahmen. Die anatomischen Befunde sind vielfach in ihrer Deutung unsicher. Dazu kommt, daß die sichere Beurteilung der histologischen Bilder sehr große Schwierigkeiten macht, wie jeder sofort sieht, der eigene experimentelle Untersuchungen angestellt hat. Zum Teil daraus wird zu erklären sein, daß die Nachforschungen, die ich selbst mit Lapinsky gemeinsam angestellt habe und die in Exstirpation des Ganglion celli supremum und des Ganglion stellatum

bestanden, uns keine positiven Resultate ergeben haben. Wir fanden weder bei Untersuchungen nach Nissl, noch nach Marchi Veränderungen. Über die weiteren Gründe dieser Differenz muß ich hier hinweggehen, und ich verweise bezüglich aller Einzelheiten auf unsere zitierte Arbeit. Ich möchte zusammenfassend also bemerken, daß mit der Ursprung des Sympathicus aus bestimmten Zellen des Rückenmarks durch die experimentellen Untersuchungen noch nicht sicher demonstriert erscheint. Recht ausführliche Angaben über die sympathischen Kerne im Rückenmark finden wir bei Jacobsohn. Er unterscheidet Nucleus sympathicus lateralis superior u. thoracalis, Nucleus sympathicus lateralis infer. u. sacralis u. Nuel. sympath. medialis inferior u. lumbosacralis. Die obere laterale Kernsäule erstreckt sich von C VIII bis zum oberen Abschnitt von L III, die untere laterale Kernsäule von S II bis in das Coccygealmark und die untere mediale Kernsäule von L II bis gleichfalls in das Coccygealmark; im untersten Rückenmarksaabschnitt verschmelzen die beiden letztgenannten Kerne. Diese Schilderung Jacobsohns gründet sich aber nicht auf eigene neue experimentelle Forschungen — von einigen pathologischen Befunden Jacobsohns soll später die Rede sein — sondern nur auf eine sehr genaue topographische Untersuchung eines Rückenmarks mittels der Nissle'schen Methode. Eine sehr genaue Schilderung der Zellen im Tractus intermediolateralis entwirft auch Bruce.

Doch wenn hier auch noch nicht alles sicher ist, jedenfalls müssen wir ein Ursprungscentrum der feinen sympathischen, den vorderen Wurzeln sich beimengenden Fasern in den Seitenteilen der grauen Substanz des Rückenmarks anponieren. Von dort aus ziehen diese Fasern dann weiter durch den Ramus communicans albus zu den sympathischen Ganglien und beteiligen sich somit am Aufbau des Sympathicus. Über diesen lehrt Kölliker (Loc. cit. S. 850) folgendes: Die cerebrospinalen motorischen in den Sympathicus eintretenden Fasern enden alle mit Endverzweigungen um die sympathischen Zellen herum, sie enden niemals direkt im Darm, an den Gefäßen usw. Hierbei ist ihr Verlauf ein längerer oder kürzerer, die einen enden an den nächstgelegenen Ganglienzellen, d. h. in den entsprechenden Ganglien des Grenzstranges, andere durchlaufen mehrere Ganglien, bis sie zu ihren Endigungen gelangen, noch andere endlich finden erst an den am meisten peripherisch gelegenen Ganglien ihr Ende. Es ist höchst wahrscheinlich, daß alle sympathischen Zellen von den motorischen Fasern erster Ordnung, d. h. von den aus dem Rückenmark stammenden motorischen Fasern beeinflusst werden, während auf der anderen Seite die motorischen Ganglienzellen des Sympathicus oder, wie man sie auch nennen könnte, die motorischen Fasern zweiter Ordnung sie auf andere Zellen einwirken. Auch diese letzteren Fasern haben einen verschieden langen Verlauf und enden bald nahe, bald sehr entfernt von ihrem Ursprun-

mit freien Endigungen. Commissurenfasern kommen nach Langley in den Ganglien des sympathischen Systems nicht vor; jedenfalls haben seine Versuche die Abwesenheit solcher funktionellen Verbindungen beim Erwachsenen erwiesen. Die sensiblen Fasern des Sympathicus stammen alle von cerebrospinalen Fasern und enden in den peripherischen Teilen. Ähnliche Anschauungen vertritt auch Morat auf Grund zahlreicher experimenteller Untersuchungen.

Die Lehre vom Aufbau des sympathischen Systems, wie sie Kölliker zum Teil schon auf den Forschungen von Langley fußend, hier gibt, ist im Laufe der nächsten Jahre besonders durch die unermüdlige Tätigkeit dieses Autors und seiner Schule erheblich gefördert worden. Langley konnte nachweisen, daß wir im Nicotin eine Substanz besitzen, die im ganzen vegetativen Nervensystem auf jene Ganglienzellen, in welchen eine anatomische Unterbrechung des Neurons und eine funktionelle Umschaltung der Nervenregung stattfindet, eine elektive Wirkung ausübt. Bei intravenöser Injektion von Nicotin und auch nach lokaler Applikation einer verdünnten Lösung auf einen Ganglienknoten tritt eine vorübergehende Erregung und nachfolgende Lähmung in den Ganglienzellen ein, welche Umschaltstationen sind. Während vor der Nicotinswirkung die elektrische Reizung einer dem vegetativen Nervensystem angehörigen Nervenfasern einen gewissen Reizeffekt gibt, gleichgültig, ob die Faser vor ihrem Eintritt in das Ganglion oder nach ihrem Austritt gereizt wurde, lähmt das Nikotin die unterbrechende Ganglienzelle und nur diese allein, und hat zur Folge, daß die Reizung der präganglionären Fasern nunmehr wirkungslos ist, durch Reizung der postganglionären Fasern jedoch auch weiterhin der gewünschte Effekt erzielt wird. Diese Wirkung des Nicotins erstreckt sich nur auf das vegetative System; im cerebrospinalen efferenten Nervensystem gibt es nirgends eine Unterbrechung durch ganglionäre Zwischenstationen. Auf diese Weise dient diese Methode einerseits zur Feststellung der Zugehörigkeit eines Reizerfolges zur Funktion des animalen vegetativen Nervensystems und andererseits zur Entscheidung der Frage, ob ein bestimmter Ganglienknoten eine physiologische Unterbrechungsstation für eine bestimmte Nervenfasern bildet oder nicht. Die Nikotinemethode ist bei verschiedenen Tierklassen von sehr ungleicher Zuverlässigkeit. Am sichersten ist die lähmende Wirkung bei dem Kaninchen und bei der Katze. Beim Hunde gelingt es selbst den stärksten Dosen in der Regel nicht, die Rückenmarksnerven in den Ganglien vollständig zu lähmen. Innerhalb derselben Tierklasse können sich geringe individuelle Verschiedenheiten zeigen und bei demselben Tier werden die Ganglien ferner in verschiedenem Grade angegriffen, so wird das oberste Halsganglion leichter bzw. schneller gelähmt als die Ganglien des Solarplexus. Schließlich wird innerhalb desselben Ganglion nicht jede Nervenendigung gleichzeitig betroffen.

Der Wert der Nicotinmethode wurde befestigt durch die von Langendorff am Ganglion cervicale superius gemachte und bald darauf von ihm auf das Ganglion ciliare ausgedehnte Entdeckung, daß beim Absterben des Tieres die Reizeffekte viel früher versagen bei Reizung der zu den sympathischen Ganglien hinziehenden Fasern, der cerebrospinalen Nerven, als bei Reizung der vom Ganglion fortziehenden Fasern, der sympathischen autonomen Nerven.

Die Resultate dieser Forschungen führen zu folgendem Schema des Aufbaus des vegetativen Systems. Die aus dem Centralnervensystem stammende, meist schmale markhaltige Faser, die ihre Zelle in der grauen Substanz desselben hat, zieht in einem Hirn- oder Rückenmarksnerven oder mit mehreren zu einem selbständigen Stamm vereinigt zu einem sympathischen Ganglion. In dem Ganglion endigt diese cerebrospinale Faser (präganglionäre Faser Langley's) und tritt mit dem eigentlichen sympathischen Nervenzuschnitt in Kontakt, indem ihre Endhäutchen die sympathische Zelle entweder in spärlichen Ästchen umgeben oder mit einem unentwirrbaren Faserwerk ausspannen. Von der sympathischen Zelle geht ein in sehr vielen Fällen markloser Achsencylinder zu dem peripheren Gewebe (postganglionäre Faser Langley's) und endigt dort ohne nochmalige Zellunterbrechung. Niemals also treten die centralen präcellulären Fasern direkt in Kontakt mit dem peripherischen Gewebe, sondern sie wirken nur auf die Zelle des sympathischen Systems, wie schon Kölliker behrte. Niemals ferner tritt ein sympathischer Nerv, eine postcelluläre Faser mit einer Ganglienzelle in Kontakt, sondern sie geht immer direkt zu den peripheren Geweben, zu den Muskeln oder Drüsen oder zum Darm. Daß eine präcelluläre Faser auch mehrere Ganglien durchlaufen kann, ehe sie in einem endigt, ist schon oben auseinandergesetzt worden.

Das gesamte sympathische System, das also diejenigen Nervencentren und Nervenbahnen umfaßt, welche die glatten Muskeln, die Drüsen und das Herz innervieren, zerfällt in eine Reihe von Unterabteilungen, deren Ursprünge in verschiedenen Abschnitten der cerebrospinalen Achse gelegen sind. Man unterscheidet vier voneinander getrennte Ursprungsterritorien: erstens das im Mittelhirn, zweitens das im verlängerten Mark gelegene, drittens das im Dorsalmark bis zum zweiten und dritten Lumbalsegment gelegene, endlich viertens das im Sacralmark vom 2.—4. Sacralsegment gelegene Territorium. Wir beschäftigen uns zunächst mit dem an dritter Stelle genannten Abschnitt, den wir als das sympathische System im engeren Sinne bezeichnen. Dieser Abschnitt besteht also aus den in den Seitenhörnern des Rückenmarks gelegenen spinalen Centren des Sympathicus, den aus diesen hervorgehenden vorderen Wurzeln, die zum Grenzstrang des Sympathicus ziehen (als *Rami communicantes albi*) und

sich dort um Ganglien, die zur Seite der Wirbelsäule liegen, aufsplittern. Diese Ganglien und ihre Verbindungen bilden den Grenzstrang des Sympathicus. Aus ihnen gehen die *Rami communicantes* grösst hervor, die entweder zu den spinalen Nerven ziehen und mit ihnen weiter verlaufen oder selbständig weiter verlaufen (N. splanchnicus usw.), um auf verschiedenen Wegen die Peripherie zu erreichen. Das sympathische System im engeren Sinne besteht also aus den spinalen Centren, den *Rami communicantes*, den vertebralen Ganglien, dem Grenzstrang des Sympathicus und den peripheren sympathischen Nerven. Die oberste spinale Grenze dieses Systems reicht bis zum 1. Brustnerven. Das scheint für alle Tierklassen identisch zu sein, während die untere Grenze bei den verschiedenen Klassen einigen Variationen unterworfen ist; beim Menschen reicht sie bis zum zweiten oder dritten Lumbalsegment, und es ist besonders die Tatsache zu betonen, daß aus dem ganzen Cervicalmark sympathische Fasern nicht entspringen. Nur manchmal soll die achte Cervicalwurzel an der Bildung des Sympathicus beteiligt sein. Der Grenzstrang des Sympathicus wird nur aus dem dorsolumbalen Ursprungsgebiet gebildet. Er erstreckt sich topographisch von der Schädelbasis neben der Wirbelsäule hin bis zum Steißbein. Der Verlauf der Fasern ist in ihm sehr mannigfaltig. Im Halsympathicus gibt es nur aufsteigende Fasern, im Brust- und Beckenteil sendet aber der 7.—10. Ramus albus die Fasern nach oben und unten, während die ersten 6 Rami nur nach oben, die letzten 7 nur nach unten Fortsetzungen schicken, so daß also der Brust- und Beckenteil des Grenzstrangs ein Geflecht zum Teil aufwärts zum Teil abwärts verlaufender Fasern darstellt. Am Hals teil zählt man drei Ganglien, am Brustteil 11—12, am Lendenteil 4—5 und am Beckenteil 4—5 sacrale und ein coezygeales Ganglion. Die zuführenden Fasern zu einem Ganglion kommen durch die *Rami albi* zum Grenzstrang zum Teil von entfernten Rückenmarkssegmenten. So bezieht das Ganglion supremum ja seine präcellulären Fasern aus den oberen Dorsalsegmenten, auch die anderen Ganglien enthalten zum Teil Zuzug aus 5—6 Segmenten. Dagegen schließen sich die aus den sympathischen Ganglien entspringenden postcellulären Fasern lokal eng an den oder an die nächstliegenden spinalen Nerven an, indem sie ihre Fasern ihnen durch die *Rami grisei* zuführen. Die Gebiete der Einflüsse der sympathischen Ganglien greifen am Rumpf sehr wenig, an den Extremitäten mehr ineinander über. Das Ganglion cervicale supremum versorgt die Gefäße, zum Teil die Drüsen des Kopfes, auch zum Teil die Gefäße des Gehirns, ferner den Dilator iridis und den Müllerschen Muskel der Orbita, das Ganglion stellatum schickt Zweige zu den Brusteingeweiden, besonders die accelerierenden Fasern zum Herzen. Im übrigen versorgt der Grenzstrang die Muskeln der Gefäße an den Extremitäten und am

Rumpf, die Muskeln und Drüsen der Haut und die Blutgefäßmuskeln des Darmapparates zwischen Mund und Rectum, der Lungen, der Baucheingeweide, die Muskeln der Milz, des Ureters und der inneren Geschlechtsorgane. Auf die Unterscheidung von vertebralen und prävertebralen Ganglien gehe ich nicht ein.

Zu diesem sympathischen System im engeren Sinne kommen nun noch drei weitere Systeme, die man als Mittelhirnanteil, als bulbären Anteil und als sacralen Anteil des sympathischen oder vegetativen Systems bezeichnet hat. Sie stehen offenbar in einem gewissen, namentlich pharmacodynamischen Gegensatz zu dem sympathischen System im engeren Sinne und wurden früher als autonome, neuerdings von Langley mit einer zweckmäßig erscheinenden Nomenklatur als parasympathische Systeme bezeichnet. Der Mittelhirnanteil schließt sich dem Oculomotorius an. Sein Ursprung wird von den meisten in die kleinzelligen Medianzellen des Oculomotorius verlegt. In den Verlauf der sympathischen Oculomotoriusfasern ist das Ganglion ciliare eingeschaltet, dessen Radix brevis die Fasern aus dem Oculomotorius führt. Von da aus gehen die Fasern zum Sphincter iridis und zum Ciliarmuskel. Aus dem bulbären Anteil des Sympathicus entspringen Fasern für die Blutgefäße der Sehnhäute des Kopfes, für die glatten Muskeln, für die Drüsen des Eingeweidekanals vom Mund bis zum Colon descendens sowie für die glatten Muskeln und Drüsen der Luftröhre und der Bronchien und endlich für das Herz. Die Hauptmasse dieser Fasern verläuft im Vagus und zwar entspringt sie im wesentlichen jedenfalls aus dem Nucleus dorsalis vagi wie Osuf und Collins, Kohnstamm und Wolfstein und andere festgestellt haben. Auf dem Wege des Vagus begeben sich dann diese Fasern zum Herzen, zur Trachea, zu den Bronchien und zu den Organen der Bauchhöhle. Die zweite Gruppe der Fasern des bulbären Teils tritt in Beziehung zu den Drüsen des Kopfes. Er stammt nach Kohnstamm aus Zellen der *Formatio reticularis*, die er als Nucleus salivatorius zusammenfaßt. Die Fasern verlassen die Medulla oblongata auf dem Wege des Facialis bzw. des Nervus intermedius Wrisbergii, um sich später den Nervenästen des Trigeminus anzuschließen. Die Einzelheiten dieser Verbindungen kommen für uns nicht in Betracht. Vom Sacralteil des sympathischen Systems im weiteren Sinne werden innerviert die Wände des Colon descendens bis zum Anus, die Blase und Urethra, die Muskeln der äußeren Geschlechtsorgane sowie die Blutgefäße dieser Bezirke. Auch hier interessieren uns Einzelheiten nicht. Den drei genannten parasympathischen Systemen stellt Langley nun neuerdings ein weiteres System koordiniert zur Seite, das ist das enteric system, das aus dem Meißner-Auerbachschen Plexus besteht. (Vgl. dazu das Schema des vegetativen Systems auf Tafel 1.)

Wie aus der oben gegebenen Schilderung hervorgeht, erhalten die meisten Organe eine doppelte autonome Innervation, nämlich einerseits von dem sympathischen System im engeren Sinne, andererseits von dem craniobulbären und sacralen System, dem parasympathischen System. Während nun alle vegetativen Nerven wie schon erwähnt, eine gemeinsame pharmakologische Reaktion aufweisen, nämlich die Nicotinreaktion, gibt es eine Gruppe von Giften, die nur auf die sympathischen und eine solche, die nur auf die parasympathischen Nervenendigungen wirken. Das Adrenalin wirkt auf die Organe immer entsprechend einer Reizung der zugehörigen sympathischen Fasern. Es ruft dementsprechend an den sympathischen Fasern in allen Gefäßgebieten Vasokonstriktion hervor, es ruft Verstärkung und Beschleunigung des Herzschlages, wie die Reizung des Accelerans hervor, es bewirkt Pupillenerweiterung wie die Reizung des Halsympathicus und bewirkt Sekretion der Speicheldrüsen, soweit dieselben durch sympathische Nerven in Aktion versetzt werden. Dort aber, wo die sympathischen Fasern hemmende Wirkung entfalten, zum Beispiel am Magen und Darm oder an der Blase ruft auch Adrenalin nicht Erregung, sondern Hemmung hervor. Man kann also sagen, daß die erregende Wirkung des Adrenalins aus den Gesamtenigungen des vegetativen Systems nur diejenigen herausgreift, welche dem sympathischen System im engeren Sinne angehören. Aber diese Regel hat eine einzige, freilich doch sehr wichtige Ausnahme, die Schweißdrüsen reagieren nicht auf das Adrenalin mit einer Erregung. Auf die Endigungen der parasympathischen Systeme wirkt Adrenalin dagegen nicht. Hingegen gibt es eine andere Gruppe von Giften, welche ihren Angriffspunkt gerade an den Endapparaten dieses Systems findet und das sympathische Nervensystem mit einer Ausnahme, nämlich der der Schweißdrüsen unbeeinflusst läßt. Als Hauptrepräsentant dieser Gruppe ist das Atropin einerseits, das Muscarin, Pilocarpin, Cholin andererseits zu nennen. Das Atropin lähmt die entsprechenden Endigungen, das Muscarin und seine Analoga reizen die entsprechenden Endigungen. Im speziellen sind die Angriffspunkte der einzelnen hier besprochenen Gifte noch nicht völlig bekannt. Soviel ist aber festgestellt, daß sie alle an Endapparaten der parasympathischen Systeme angreifen und die verschiedenen Endapparate dieser Systeme durch das gemeinsame pharmakologische Verhalten als zusammengehörig gekennzeichnet sind. Nach Gottlieb und Meyer, denen wir in der Darstellung der pharmakologischen Wirkungen und Eigentümlichkeiten dieser Systeme gefolgt sind, scheinen sich aber auch die im Centralnervensystem gelegenen Ausgangspunkte der beiden großen Gruppen des vegetativen Systems pharmakologisch voneinander zu unterscheiden und durch ihnen eigentümliche chemische Reaktionen zu charakterisieren.

Nach dem Gesagten sind jedenfalls ungemein zahlreiche und komplizierte Giftwirkungen am vegetativen Nervensystem möglich.

Ich habe mit diesen Feststellungen auf das Gebiet der physiologischen Forschung übergegriffen. Da aber diese physiologischen Experimente für die Erkennung der anatomischen Zusammenhänge von grundlegender Bedeutung gewesen sind, glaubte ich sie in diesem Zusammenhang anführen zu sollen. Für unsere Zwecke interessiert uns am meisten das sympathische System im engeren Sinne, auf dessen Innervationsverhältnisse wir noch für einen Augenblick etwas näher eingehen müssen. Der größte Teil der Gefäße des Kopfes wird sicher durch den Halsteil des Sympathicus versorgt. Doch scheinen Ausnahmen vorzukommen. Fletcher bestätigte z. B. die Tatsache, die schon Schiff vor langer Zeit festgestellt hatte, daß Reizung des Nervus auricularis magnus beim Kaninchen eine Verengung der Ohrgefäße hervorruft, und daß diese Fasern nicht aus dem Halsteile des Sympathicus stammen, da die Kontraktion noch nach Herausnahme des obersten Ganglions bestehen bleibt. Die Fasern kommen vielmehr aus dem Ganglion stellatum des Sympathicus und treten durch dessen vertebrealen Zweig zum dritten cervicalen Nerven und von hier aus zum Auricularis magnus, wie Reizversuche lehrten.

Die oberen Extremitäten erhalten ihre vasomotorischen Nerven durch die vorderen Wurzeln des 4.—10. Dorsalnerven. Nach Bayliss verlassen die vasoconstrictorischen Nerven der vorderen Glieder das Rückenmark in den vorderen Wurzeln des 3.—11. Thoracalnerven, aber der 3., 4., 10. und 11. enthalten verhältnismäßig wenig Fasern. Diejenigen der hinteren Glieder werden im 11., 12., 13. Thoracal- und in den 1., 2. und 3. Lumbalnervenzurzeln gefunden. Die meisten sind in den 12. und 13. thoracalen und 1. und 2. lumbalen Wurzeln vorhanden. Für den Menschen hat Strömberg durch Beobachtung der Gefäßreflexe bei Querschnittserkrankung des Rückenmarks feststellen zu können geglaubt, daß die gefäßverengenden Nerven für die oberen Gliedmaßen oberhalb des 7. und 8. dorsalen Segmentes aus dem Rückenmark austreten. Simons hat durch plethysmographische Untersuchungen der Gefäßreflexe nach Verletzungen der Arme nerven feststellen können, daß der Radialis keine vasomotorischen Fasern führt. Die Haut des Rumpfes bezieht ihre Vasomotoren aus den vorderen Wurzeln der Dorsal- und Lumbalnerven. Der hintere Abschnitt des Rumpfes wird aus dorsalen spinalen Nerven mit Vasomotoren versorgt. Die unteren Extremitäten werden von den vorderen Wurzeln der drei letzten Brust- und der drei obersten Lumbalnerven versorgt. Sie gehen zunächst zum 6. und 7. Lumbal- und 1. und 2. Sacralganglion und zwar meist direkt an das entsprechende Ganglion heran, können auch bis zum nächst Folgenden. Das Gebiet der Unterleibsgefäße versorgt der Nervus splanchnicus, der sich aus Fasern

vom 5. Dorsalnerven abwärts konstituiert (Hallion et Frank). Auf die genaue Verteilung seiner Verzweigungen einzugehen erübrigt sich für uns.

Eine ganze Literatur existiert über die Frage der Innervation der Hirngefäße. Eine gute historische Darstellung der Frage findet sich in der Dissertation von Awerbach aus dem Jahre 1905 und bei Weber. Der exakte anatomische Nachweis, daß wenigstens die Gefäße der Pia mater ihre eigenen Nerven besitzen, wurde an einem Goldchloridpräparat zuerst von Obersteiner erbracht. Nachdem frühere Untersucher teils für (Francis Franck, Huber) teils gegen (Gulland, Rohuste(n)) deren Vorhandensein auf Grund anatomischer Untersuchungen sich ausgesprochen hatten. Ebensovienig Einigkeit herrschte bei den Physiologen. Um nur die neueren zu nennen, so führten die Untersuchungen von Knoll, Gärtner und Wagner, Roy and Sherrington, Hill, Hill and Macleod, Müller und Siebeck, Hürthle, Cavazzini-Wieczowski, Jensen zu durchaus widersprechenden Resultaten. In einer umfangreichen, auf sehr zahlreiche Experimente gestützten Arbeit tritt neuerdings Weber mit aller Entschiedenheit für das Vorhandensein einer vasomotorischen Innervation der Hirngefäße ein. Er stellt in seinen Ergebnissen einige Besonderheiten und Abweichungen von den allgemein vasomotorischen Innervationsverhältnissen fest. Er scheint zunächst zu der Annahme geneigt, daß nicht das allgemeine Vasomotorenzentrum sondern ein davon kinnwärts an bisher unbekannter Stelle liegendes Gebiet als vasomotorisches Centrum für die Hirngefäße in Frage kommt. Sicher gilt das für die dilatatorischen Nerven. Die Hirngefäße erweitern sich nicht, wie alle anderen Gefäßgebiete mit Ausnahme der vielleicht nervenlosen Lungengefäße bei Reizung des Depressor, sind also in dieser Beziehung sicher unabhängig vom Vasomotorenzentrum der Medulla oblongata. Im Hals-sympathicus und im Vagus verlaufen die vasomotorischen Fasern für die Hirngefäße; diese Fasern besitzen keinen Tonus und unterscheiden sich also darin von allen anderen Gefäßnerven. Eine weitere sehr bemerkenswerte Tatsache ist die, daß durch Reizung eines Sympathicus die Gefäße beider Hirnhemisphären beeinflußt werden; ebenso steht es mit der Wirkung der einseitigen peripheren sensiblen Reizung. Weber nimmt als Ursache dafür eine Kommunikation der Gefäßnerven an den großen Gefäßen der Hirnbasis an. Die Bedeutung dieser Einrichtung liegt auf der Hand. Die reflektorische Wirkung kann durch Erregung irgendeines sensiblen Nerven herbeigeführt werden; fast stets tritt unmittelbar nach dem Reiz eine aktive Gefäßerweiterung im Gehirn ein, die meist kurz darauf von einer länger dauernden Verengerung abgelöst wird. Einige Versuchsergebnisse sprechen dafür, daß der Weg für die Beeinflussung der Hirngefäße nicht allein durch die Vago-sympathici geht.

Nach den Ergebnissen dieser Weberschen Versuche weicht die vasomotorische Innervation der Gehirngefäße also in manchen Punkten von dem allgemein gültigen Schema ab.

Sehr merkwürdig ist die weiter von Weber erhobene Tatsache, daß nach Zerstörung der Medulla oblongata Reizung eines beliebigen Punktes der Hirnrinde eine auf beiden Seiten gleichmäßig starke aktive Erweiterung der Hirngefäße beider Hemisphären bewirkt. Er bezieht das auf die Erregung des hypothetischen speziellen Vasomotoren- bzw. Vasodilatatorencentrums für das Gehirn.

Früher hatte man stets angenommen, daß vasomotorische Fasern nur zu den Arterien gehen. Vor längerer Zeit wurde darauf hingewiesen, daß auch die Venen verengende Fasern erhalten (Goltz, Ranvier, Vulpian). So sollen die Kaninchen-Ohrvenen vom Hals-sympathicus aus versorgt werden, die Hinterbeinvenen vom Ischia-dicus. Bei Monro (Raynauds Disease, S. 7) finde ich die Angabe, die dem Lehrbuch Howells entnommen ist, daß eine experimentelle Verengung des Venenlumens durch Reizung der Nervi sciaditici bei unterbundener Arteria cranialis bis zum Verschwinden des Lumens eintritt. Bancroft hat die Ursprünge der Vasomotoren aus dem Rückenmark bei Katzen zu ermitteln gesucht und fand solche in den Wurzeln des ersten bis vierten Lumbalnerven. Am Sympathicus war die höchste Stelle, die auf Reizung noch Venenkontraktionen lieferte, das dritte Lumbalganglion. Sie verlaufen von da aus weiter in den Rami communicantes zum sechsten und siebenten Lumbalnerven und zum ersten und zweiten Sacralnerven. Im großen und ganzen soll ihr Verlauf dem der Arterienmotoren entsprechen, nur daß ihre Ursprung aus dem Rückenmark ein beschränkterer ist. Nach Lewandowsky haben Steinach und Kahn dargetan, was schon Stilling vermutete, daß auch die Kapillaren kontraktionsfähig sind und von Nerven versorgt sind.

Was die physiologischen Verhältnisse des großen Vasomotorencentrums angeht, so gehen die Meinungen der Physiologen übereinstimmend dahin, daß das Centrum unter normalen Verhältnissen sich im Zustand einer mittleren tonischen Erregung befindet: „Es gehen von demselben ununterbrochen Impulse aus, die eine mittelstarke Kontraktion der glatten Gefäßmuskulatur anregen, wodurch der normale Gefäßtonus bedingt wird.“ (Landois.) Hierbei bestehen parallel mit den Atmungsbewegungen eintreffende Erregungsschwankungen des vasomotorischen Centrum, auf denen zum Teil die respiratorischen Blutdruckschwankungen beruhen (Traube-Heringische Druckschwankungen). Nach Ström ist es eine der Aufgaben der inneren Sekretion, auf die vasomotorischen Centren durch Hypertension und Hypotension zu wirken. Unter physiologischen Bedingungen halten diese Wirkungen sich das Gleichgewicht; deren

Ausdruck sollen die Traube-Hering'schen Schwingungen sein, die aber von anderen wieder anders erklärt werden. Bechterew glaubt, daß sie eine recht komplizierte Entstehungsweise haben.

Das Centrum kann direkt und reflektorisch erregt werden.

Eine direkte Erregung erfolgt durch den Gasegehalt des in der Medulla oblongata kreisenden Blutes. Eine stark venöse Blutmischung erregt das Centrum stark, so daß die Arterien sich unter Blutdrucksteigerung kontrahieren; auch plötzliche Anämie der Oblongata durch Unterbindung der zuführenden Gefäße bedingt solche Reizung; denselben Einfluß können Gifte haben wie Strychnin und Nicotin. Bei Tieren gelingt auch die direkte elektrische Reizung des Centrums, und Deganello fand, daß auch warmes Wasser einen direkten Reiz auszuüben vermag.

Das Centrum kann ferner reflektorisch erregt werden. Innerhalb der centripetalen Nerven gibt es Fasern, deren Reizung das Vasomotorententrum beeinflußt, und zwar solche, deren Reizung das Centrum erregt, und andere, deren Reizung die Erregbarkeit des Centrums herabsetzt. (Pressorische und depressorische Nervenfasern.) Nach Latschenberger und de Ahna liegen in allen sensiblen Nerven neben pressorischen auch depressorische Fasern. Lovén fand, daß bei Reizung eines jeden sensiblen Nerven zuerst pressorische Wirkung zu beobachten ist, und daß, wenn diese Reizung intensiver und anhaltender wird, eine depressorische Wirkung in Form einer Gefäßverengung sich kundgibt. Die näheren Bedingungen dieser reflektorischen Reizungen sind für uns von großem Interesse. Pressorische Wirkungen werden z. B. durch Berührungen der Haut hervorgerufen oder durch schwache elektrische Reizungen, auch durch die äußerliche Anwendung von Wärme und Kälte. „Beim Menschen verursachen überhaupt die meisten Erregungen der Empfindungsnerven: schwache Hautreize, Kitzel (auch unangenehme Gerüche, bittere oder saure Geschmacks, optische oder akustische Reize) zu der applizierten Stelle Sinken der Hauttemperatur und Abnahme des Volumens der betreffenden Extremität. Die entgegengesetzten Erfolge hatten schmerzhaftige Erregungen, ebenso Einwirkungen der Wärme, auch Applikationen angenehmer Gerüche und süßer Geschmacks.“ (Landois.) Hallion et Comte konnten mit Hilfe eines neuen Apparates feststellen, daß sensible Reize irgendwelcher Art, und wo sie auch einwirken mochten, sich durch gefäßverengernde Wirkung kundtun, wenn das betreffende Gefäßgebiet nicht schon vorher im Zustande der Verengung war. Sie studierten besonders die brusken Reize. Die reflektorische Gefäßzusammenziehung trat stets an allen Extremitäten zu gleicher Zeit auf, ihr relativer Wert hängt in keiner Weise von dem Reizort ab. Auch gewisse Reize der Schleimhäute bringen ähnliches hervor, z. B. kaltes Wasser, kalte Luft, ebenso Geräusche,

Licht usw., abgesehen von jedem psychischen Effekt. Gefäßverengung trat nur selten nach Gefäßverengung ein. Hallion et Comte, die diese Reflexe als reflexes vaso-moteurs bulbomédullaires im Gegensatz zu den lokalen Reflexen (s. u.) bezeichnen, haben sie auch in Fällen pathologischer Veränderung (Hysterie usw.) studiert. Ähnliche Resultate entnehmen wir einer Arbeit Patrizzis. Er versuchte elektrische, thermische, akustische und optische Reize, ebenso wie Geschmack- und Geruchstoffe. Die hauptsächlichsten Gefäßreflexe bestanden auch bei ihm in Gefäßkontraktionen, indem von 425 Beobachtungen im wachen Zustande der Versuchsperson 361 in Zusammenziehung und nur 64 = 15% in Erweiterung sich kundgaben. Während des Schlafes wurde unter 116 mal nur sechsmal Gefäßverengung beobachtet. Die dilatatorische Reaktion zeigt häufig den Zustand der Ermüdung an. Sie hat nichts mit den begleitenden Gefühlen von Lust und Unlust zu tun. Die Gefäßreflexe folgen beim Menschen den Grundgesetzen der Lokalisation und Irradiation. Der lokalisierte Gefäßreflex geht in kürzerer Zeit vor sich als der irradierte; wichtig ist, daß das Gehirn einen deutlichen Einfluß auf die Reflextätigkeit ausübt. Delezenne hat den Nachweis führen zu können geglaubt, daß es in den Gefäßen selbst sensible den Blutdruck regulierende Fasern gibt. Eddinger glaubt, daß sensible Eindrücke von der Gefäßwand her durch Füllang und Spannung u. a. m. direkt auf die in dieser liegenden sympathischen Zellen einen Einfluß ausüben können, und daß von diesen Zellen aus durch reichlich nachgewiesene andere Fasern reflektorische Muskelkontraktionen in der Arterienwand erzeugt werden. Einen besonderen Nerven mit depressorischer Wirkung entdeckten bekanntlich Ludwig und Cyon in einem Aste des Vagus (Nervus depressor). Seine Reizung bedingt, im wesentlichen durch Erweiterung der vom Splanchnicus innervierten Bauchhöhlengefäße, ein hochgradiges Sinken des Blutdrucks. Er entspringt nach Köster aus dem Ganglion jugulare. Bei übermäßig hohem Blutdruck werden die Endigungen dieses Nerven in der Aorta erregt, und auf diese Weise die Tätigkeit des Gefäßcentrums in der Medulla oblongata herabgesetzt (Tschermack und Köster).

Über die Folgen der Durchschneidung eines vasomotorischen Nerven geben uns die klassischen Versuche Cl. Bernards Aufschluß. Nach Durchschneidung des sympathischen Halsgrenzstranges sehen wir das Ohr der operierten Seite sich lebhaft erwärmen und röten. Die Gefäße erweitern sich, der Blutstrom ist in dem affizierten Gebiete verlangsamt, die Transsudation ist vermehrt, der Blutdruck erhöht, die Arterien pulsieren lebhafter als sonst, der Pulsschlag kann sich bis in die Venen bemerkbar machen. Jede Reizung eines peripheren vasomotorischen Nerven berührt das Entgegen-

gesetzte, Erblassen der betreffenden Teile, Abkühlung, Verengung der Gefäße, Verminderung der Transsudation. Die Verengung kann bei kleineren Arterien bis zum völligen Verschwinden ihres Lumens gehen. Anhaltende Reizung ruft schließlich Erschöpfung der Nerven und damit die Erscheinungen der Lähmung hervor, was für pathologische Verhältnisse von Bedeutung ist. Die Cl. Bernard'schen Untersuchungen sind von den verschiedensten Forschern nach allen Seiten hin nachgeprüft und erweitert worden. Wir gehen darauf nicht weiter ein. Nur die jüngsten dieser Versuche sollen hier noch Erwähnung finden.

Lapinsky hat sehr genaue und vor allem auch über lange Zeit ausgedehnte Untersuchungen über die lokale Blutcirculation im Bereiche gelähmter Nerven veröffentlicht. Bei ihm finden sich auch alle hierher gehörigen Literaturangaben. Er hat am Frosch experimentiert und fand folgendes: Die Durchschneidung des Stammes des Nervus ischiadicus, seine Umschnürung mit einer Ligatur, oder die Durchschneidung seiner vorderen Wurzeln, hat eine kurz dauernde Verengung der Gefäße der gelähmten Extremität im Gefolge, die er anderen Autoren folgend, durch eine Reizung der isolierten Vasomotorien erklärt. Sie geht bald, im Laufe von ungefähr 24–60 Stunden in eine Erweiterung derselben Gefäße über, der sich im Laufe einiger Tage eine Schlingelung und Ausbuchtung der Gefäßwänden anschließt. Schließlich kommt es aber wieder zu einer geringfügigen Verengung, doch so, daß die Gefäße immer noch weiter als normal sind. Die Strömungsgeschwindigkeit sinkt anfangs etwas, nimmt jedoch nach einigen Stunden zu, um dann aber allmählich immer langsamer zu werden. Der lokale Blutdruck erweist sich, unter geringen Schwankungen als höher als normal. Wichtig ist, daß auch in der „normalen“ Extremität die Blutcirculation nicht ganz normal ist; während einer kurzen Periode nach der Operation sind ihre Gefäße erweitert, dann verengen sie sich schnell, um sich bald wieder zu erweitern. Die Hauptsache ist also nach diesen Versuchen eine lang dauernde Gefäßerweiterung. Immerhin bleiben die erwähnten Erscheinungen nach Lähmung der Vasomotoren nicht dauernd bestehen. Schiff hat gezeigt, daß regelmäßig bei Kaninchen, denen einige Wochen früher der Halssympathicus extirpiert war, das Ohr der operierten Seite kälter war, als das der intakten. Landois hat diese Untersuchungen bestätigen können. Weir-Mitchell hat genaue Untersuchungen über den Effekt einer Verwundung des Nerven auf die Temperaturverhältnisse seines Innervationsgebietes beim Menschen angestellt. Es gibt nach ihm (*Des Lésions des Nerfs, traduit par Dastre* pag. 186) keine einzige klinische Beobachtung, die eine primäre Temperaturerhöhung nach totaler Zerschneidung eines Nervenstammes beweise. Übrigens betont auch Salvioli, daß er bei zahlreichen Durchschnit-

dungen des Ichiadicus trotz genauer Temperaturmessung die Erhöhung nicht so bedeutend fand, wie gewöhnlich angenommen wird; sie kann ferner recht vorübergehend sein und auch ganz fehlen. Dagegen hat Waller festgestellt, daß, wenn man den Nervus ulnaris am Ellenbogen einer Kältemischung aussetzt, zuerst die Temperatur etwas absinkt, um dann über die Norm zu steigen. Das ist so zu erklären, daß die Kälte zunächst reizend, und dann lähmend auf den Nerven einwirkt. Weir-Mitchell hat diese Experimente wiederholt und bestätigt. In Übereinstimmung mit den Tierexperimenten hat man auch beim Menschen nach Durchtrennung der Nerven in der späteren Zeit deutliche Temperaturherabsetzungen gesehen, die einmal auf der durch Erweiterung der Gefäße bedingten Wärmeabgabe, dann aber auch noch auf der Störung der willkürlichen Muskelstätigkeit und der dadurch hervorgerufenen Störung der peripheren Bluthewegung beruhen und auch wohl noch andere Ursachen haben, wie die Atrophie der Gefäße resp. ihrer Muskeln usw.

Werden sehr große Gebiete der äußeren Decke in den Zustand der Vasomotorenlähmung versetzt, wie z. B. durch hohe Rückenmarksdurchschneidung, so wird von den erweiterten Gefäßen so viel Wärme abgegeben, daß eine Erwärmung in den betreffenden Gebieten nur sehr kurze Zeit und in geringem Maße bemerkbar wird, oder auch gar nicht eintritt, vielmehr von vornherein durch eine Abkühlung ersetzt wird, dabei sinkt auch die Temperatur des gesamten Körpers, aber nicht allein durch vermehrte Wärmeabgabe, sondern auch infolge herabgesetzter Wärmeproduktion (Tangl.)

Auch auf die Herztätigkeit wirkt die Reizung oder Lähmung großer Vasomotorengebiete, indem im ersten Falle das Herz ausgiebiger arbeitet, die Kontraktionen an Zahl und Stärke zunehmen, während im zweiten Fall das Entgegengesetzte statthält. Von großer Wichtigkeit für pathologische Verhältnisse ist die Tatsache, daß die Wirkung der Reizung oder Lähmung der Vasomotoren eine für die verschiedenen Gefäßprovinzen ihrer Intensität nach verschiedene ist. Es werden nämlich, worauf unter anderem Lewaschew hingewiesen hat, die Gefäße der peripheren Körperteile, z. B. der Ohren, der Nase, der Finger und Zehen, am intensivsten beeinflußt, während andere Gebiete viel weniger der Einwirkung der vasomotorischen Nerven unterstehen. Es hängt das jedenfalls zum großen Teil von dem Bau der Arterien ab; wie bekannt ist die mittlere Gefäßhaut, die Muscularis, an den verschiedenen Gefäßen sehr verschieden stark entwickelt, am stärksten an zahlreichen kleinen Arterien, während sie an den großen fast ganz fehlt, vor allen Dingen an der Aorta und Pulmonalis, ferner auch an den Knochenarterien. Bei allen diesen wird naturgemäß die Einwirkung der Vasomotoren nur eine geringfügige sein können.

Wir sehen in unserer anatomischen Schilderung, daß die Fasern, die von dem Vasomotorcentrum in der Olongata ausgehen, in ihrem weiteren Verlauf durch Ganglienzellengruppen unterbrochen werden, die im Grau des Rückenmarks liegen. Diese Ganglienzellengruppen stellen nun ihrerseits neue, dem Hauptvasomotorcentrum subordinierte Centren dar, wie die folgenden physiologischen Experimente lehren. Durchschneidet man einem Tier das Rückenmark, so erweitern sich zunächst infolge der Trennung der Vasomotoren von dem Olongatazentrum alle die Gefäße, die von unterhalb der Trennungstelle entspringenden Nerven innerviert werden. Nach einigen Tagen jedoch kontrahieren sich die Gefäße wieder, ein Beweis, daß die im Rückenmark gelegenen Centren zunehmend nach Ausschaltung ihres übergeordneten Centrums dessen Funktion übernehmen haben. Entsprechende Versuche haben ergeben, daß auch diese Centren reflektorischer Erregung fähig sind. Doch auch eine weitere Zerstörung der betreffenden nervösen Teile im Rückenmark führt noch nicht zu einem völligen Versagen jeder vasomotorischen Innervation. Zunächst zwar kommt es nun wieder zu einer Gefäßdehnung, aber nach einiger Zeit sehen wir auch jetzt noch eine normale Verengung eintreten. So haben Gergens und Weber nachgewiesen, daß ein Tonus der Gefäße bei Tieren vorhanden war, denen das gesamte Centralnervensystem genommen war, und die demgemäß jedes von dort kommenden, den Tonus regulierenden Einflusses entbehren mußten. Als diesen beherrschend kann nur eine in den peripheren Gefäßen vorhandene Ursache angenommen werden, und wenn man einen nervösen Einfluß in Betracht ziehen will, muß man auf die Existenz peripherer nervöser Apparate, auf lokale Gefäßcentren schließen. Magnus konnte nach Durchschneidung des Splanchnicus bei Katzen eine völlige Wiederherstellung des Blutdrucks nachweisen, was er ebenfalls auf die Wirkung peripherer Apparate bezieht. Diese haben wir in den Ganglienknoten zu suchen, die in den peripheren, die Gefäße umspinnenden Nervenplexus liegen. Beim Frosch hat Jegorow den anatomischen Nachweis von in der Wand der Arterien liegenden Nervengeflechten erbracht. Er fand zwei Geflechte, ein oberflächliches in der tiefen Schicht der Adventitia und ein tiefes, teils auf, teils zwischen den Elementen der Muscularis. Auch Nervenzellen finden sich auf und zwischen der Muscularis. Masson hat zuerst (nach Velch) die Wirkung der peripheren Gefäßcentren gezeigt, indem er Hunden, deren Gehirn und Rückenmark weggenommen war, Nebennierenextrakt einspritzte und dadurch eine Kontraktion der Gefäße bewirkte. Velch hatte ähnliche Resultate bei Anwendung von Piperidin, wenn er nach Abtragung von Gehirn und Rückenmark durch Injektion von 20 cem physiologischer Kochsalzlösung entgegen dem Blutstrom den Blutdruck auf der Höhe erhielt. Ähnlich wirkten Coniin und Nicotin. Freilich scheinen, wie

Landois in Übereinstimmung mit Gergens und Weber bemerkt, die Gefäßwände nach dieser Reihe von Eingriffen nicht mehr die vollendete Beweglichkeit wiederzuerlangen, die sie unter normalen Verhältnissen besaßen. Lewaschew fand aber immerhin, daß an Gefäßen, deren Vasomotoren gelähmt waren, durch Temperaturwechsel sich die bekannten Erscheinungen von Kontraktion und Dilatation produzieren ließen, wie an normal innervierten Teilen. Diese von Landois als periodisch-regulatorische Gefäßbewegungen gekennzeichnete Erscheinung besteht in langsamen, abwechselnden Verengungen und Erweiterungen des Gefäßlumens, die in gleichmäßigem Rhythmus erfolgen. Durch Vermittlung der peripheren Gefäßganglien sollen nach Landois die Gefäßbewegungen zustande kommen, die bei Anwendung direkter mechanischer, thermischer, chemischer und elektrischer Reize sich zeigen. Nach der von Langley eingeführten Terminologie darf man diese Erscheinungen als Axonreflexe, d. h. innerhalb eines sympathischen Neurons ablaufende Vorgänge bezeichnen, während ihnen nicht die Bedeutung wirklicher Reflexe zukommt. Echte Reflexe werden innerhalb des sympathischen Systems nicht beobachtet, sondern nur Reflexe vom cerebrospinalen auf das sympathische System. Daran hält Langley unbedingt fest. Auf die durch mechanische Reize entstehenden mannigfachen Erscheinungen (Dermatographie und Ähnliches) ist in aller Ausführlichkeit Vulpian¹⁾ eingegangen. Daß auch die Venen durch direkte mechanische Reizung sich kontrahieren, lehrt ein Versuch von Gubler (Vulpian am angegebenen Orte, S. 70). Wenn man eine der dorsalen Venen der Hand kräftig beklopft, so sieht man eine deutliche Verminderung des Volumens, die bis zu völligem Verschwinden der Vene, wenigstens bei reizbaren Individuen, gehen kann. Der betreffende empfindet dabei ein deutliches zusammenschnürendes Gefühl. Einige Sekunden später folgt der Verengung eine Erweiterung, die allmählich zunimmt, so daß nach einer halben bis einer Minute die normalen Verhältnisse hergestellt sind. Der Auffassung, daß die oben beschriebenen Erscheinungen mit Sicherheit auf das Vorhandensein peripherer Gefäßzentren hinweisen, tritt Lewandowsky entgegen, indem er die Möglichkeit einer muskulären Automatie betont und an einen peripheren muskulären Tonus denkt, den er auch an anderen Orten (M. dilatator pupillae, Blasenmuskeln) vermutet. Asher neigt in seiner kritischen Besprechung der Annahme zu, daß doch besondere, nicht rein muskuläre, sondern nervöse Endrichtungen in den Gefäßwänden vorhanden sind. Jedenfalls ist ohne weiteres klar, daß in einer Selbständigkeit der Peripherie eine wesentliche Eigentümlichkeit der Organe des sympathischen Systems zu sehen ist. Einen anatomischen Ausdruck findet diese Selbständigkeit

¹⁾ Leçons sur les Vasomotors, I, p. 40.

in dem Fehlen der Degeneration des glatten Muskels nach Durchschneidung seines Nerven; sie sind hier höchstens angelehnt (Lewandowsky).

In unseren bisherigen Erörterungen haben wir nur von einer Art vasomotorischer Nervenfasern gesprochen, von den bei Reizung die Gefäße verengernden oder vasoconstrictorischen Fasern. Diesen steht ein zweites System gegenüber, das als das der gefäßerweiternden Nerven oder der Vasodilatoren beschrieben ist. Die Wirkung der Vasodilatoren wird dadurch gekennzeichnet, daß, wenn man einen dieser Nerven durchtrennt und das periphere Ende reizt, das innervierte Gefäß sich erweitert, während andererseits die bloße Durchschneidung des betreffenden Nerven keine Verengung des Gefäßlumens herbeiführt. Die Vasodilatoren scheinen jedoch ohne Einfluß auf den normalen Tonus zu sein.

Ein Centrum für die Vasodilatoren ist bisher nicht gefunden, doch wird die Existenz eines solchen in der Medulla oblongata als wahrscheinlich angesehen. Nach Untersuchungen von Brustein im Bechterewschen Laboratorium findet es sich unmittelbar über der Gegend des vasoconstrictorischen Centrums. Der Verlauf der gefäßerweiternden Nerven ist noch in vielen Teilen unsicher. In einzelnen Organen verlaufen sie als besondere Nerven, an anderen Abschnitten des Körpers treten sie gemischt mit Vasoconstrictoren und anderen Nerven auf.

Cl. Bernard hatte vasodilatatorische Fasern in der Chorda tympani, die zur Glandula submaxillaris gingen, nachgewiesen. Lépine fand sie im Hypoglossus und Glossopharyngus der Zunge des Frosches, Vulpian im Lingualis, wobei er nachwies, daß sie dorthin aus der Chorda tympani gelangt waren (Vulpian, l. c. I. S. 154). Ebenso wie die Chorda tympani bestehen auch die Nervi erigentes vorwiegend aus vasodilatatorischen Fasern.

Trzaska-Chrzczejewsky wies später nach, daß in der Froschzunge die vasoconstrictorischen Fasern im Hypoglossus, die vasodilatatorischen im Glossopharyngus verlaufen. Dastre und Morat fanden Vasodilatoren in den vorderen Wurzeln des zweiten bis fünften Dorsalnerven, die von da durch die Rami communicantes auf dem Wege des Sympathicus zur Regio buccofacialis gehen, die betreffenden hinteren Wurzeln enthalten keine solchen Nerven. Die gefäßerweiternden Nervi erigentes stammen aus den vorderen Wurzeln des ersten bis dritten Sacralnerven. Halliom et Frank fanden im Splanchnicus vermischte gefäßerweiternde und -verengernde Fasern, die ersteren stammen nach ihren Untersuchungen aus dem 11., 12. und 13. Ramus dorsalis und dem 1. und 2. Ramus lumbalis. Auch in den großen peripheren Nervenstämmen verlaufen vielfach neben vasoconstrictorischen vasodilatatorische Fasern.

Stricker und nach ihm Gärtner machten zuerst die Angabe, daß in den hinteren Wurzeln des Plexus sacralis Vasodilatoren für die unteren Extremitäten verlaufen. Dies wurde zunächst bestritten, dann aber von Bornerzi, Morat, Morat et Bonue im wesentlichen bestätigt, während Steinaeh für den Frosch den Nachweis zu erbringen suchte, daß gewisse hintere Wurzeln motorische Fasern für die Darmmuskulatur und die Harnblase enthielten. Morat gab später an, daß das trophische Centrum dieser Fasern wahrscheinlich im Mark liege, auch Hasterlick und Biedl haben diese Angaben von dem Vorkommen gefäßerweiternder, centrifugal verlaufender Fasern in den hinteren Wurzeln bestätigt und sie glauben, nachgewiesen zu haben, daß in den hinteren Wurzeln des Nervus ischiadicus nur gefäßerweiternde Nerven verlaufen, während in einem vom Bauchstrang des Sympathicus zum Ischiadicus verlaufenden Ast sich nur Vasoconstrictoren finden: im Stamme des Nerven sind beide Arten der Gefäßnerven schließlich vermengt. Auch Wersilow fand derartige Fasern in den hinteren Wurzeln, die zu den Hinterplatten des Hundes gehen, in geringer Anzahl auch in den Nerven des Armplexus, die erstere in der vierten Lenden- bis ersten Sacralwurzel, die letzteren in der fünften Cervical- bis ersten Brustwurzel.

Diesen physiologischen Feststellungen gegenüber behauptete Kölliker freilich auch dann noch (l. c. S. 125), daß keine, unwillkürliche Bewegungen vermittelnde Fasern durch die dorsalen Wurzeln aus dem Rückenmark austreten, denn die unmittelbare Beobachtung lehre, daß beim Menschen und bei den Säugern die hinteren Wurzeln keine Elemente enthalten, die im Marke entspringen. An anderer Stelle seines Werkes freilich (S. 79 und S. 864) scheint er dieser Annahme doch geneigter. Von Bedeutung ist in dieser Frage ein Versuch von Bayliss. Dieser unternahm es, nachzuweisen, daß die Gefäßerweiterung centrifugal durch dieselben Fasern geleitet wird, die zentrifugal die Empfindung leiten; er fand nach Durchschneidung der sechsten und siebenten Lumbalwurzel und der ersten Sacralwurzel Erweiterung der Gefäße der Haut und des Muskels. Da er den gleichen Effekt noch 10 Tage nach der Durchschneidung der betreffenden hinteren Wurzel bekam, schloß er, daß die Gefäßerweiterung bedingt sei durch die centrifugale Erregung sensitiver Fasern, die im Ganglion spinale ihr trophisches Centrum haben. Kohnstamm hat diesen Gedanken aufgegriffen und ihn in der Pathologie gewisser Erkrankungen zu verwerten versucht, worauf wir später zu sprechen kommen. Die Frage des Ursprungs dieser Fasern ist wohl auch jetzt noch nicht sicher erledigt, Scalfidi, Dale, Frerier haben dazu neuerdings Beiträge geliefert, ohne eine definitive Entscheidung zu bringen, obwohl Bechterew (l. c. S. 325) behauptet, daß nach Hinterwurzelabschneidung, auch bei höheren Tieren, so beim Hunde, centrifugale Degeneration einiger Fasern unschwer zu bemerken ist.

Analog den Verhältnissen bei den Vasoconstrictoren werden auch bei den Vasodilatoren subordinierte Centren im Rückenmark angenommen.

„In den Nerven liegen, wie Goltz zeigte, nebeneinander Vasoconstrictoren und Vasodilatoren. Wird z. B. der Sciadicus sofort nach der Durchschneidung am peripheren Ende gereizt, so überwiegt die Wirkung der Vasoconstrictoren, reizt man aber den peripheren Stumpf nach 4–5 Tagen, innerhalb derer die Vasoconstrictoren ihre Erregbarkeit verloren haben, so erweitern sich die Gefäße durch die nennenswerte alleinige Wirkung der Gefäßerweiterer. Reize, welche in längeren Zwischenräumen den Nerven treffen, reizen vornehmlich die Gefäßerweiterer, tetanisierende Reize jedoch erregen die Vasoconstrictoren. Die Vasodilatoren sind leichter erschöpfbar als die Constrictoren“ (Landois). Die Art der Wirkung der Vasodilatoren ist in ihren Einzelheiten noch nicht festgestellt, es ist von manchen Seiten angenommen worden, daß sie direkt auf gewisse Längsmuskelfasern in den Gefäßen wirken und dadurch deren Erweiterung bedingen, verbreiteter und wohl auch wahrscheinlicher ist die Annahme, daß sie auf die peripheren Ganglien hemmend einwirken und so zur Gefäßerweiterung führen. Lewandowsky hält es für wahrscheinlich, daß direkt ohne Dazwischentreten peripherer Ganglien durch die Wirkung der vasodilatorischen Fasern ein in der Ringmuskulatur der Gefäße bestehender Tonus aufgehoben wird.

Daß übrigens in den funktionell verschiedenen Fasern des sympathischen Systems anscheinend ein gleichartiger Prozeß fortgeleitet wird, lehren die von Langley an verschiedenen Stellen ausgeführten Experimente über Verheilung und Leitungsfähigkeit vorher funktionell verschiedener Fasern. So ergab die Reizung des Halsesymphathicus nach Vereinigung von Fasern desselben mit Fasern der Chorda eine Erweiterung der Gefäße mit reichlicher Sekretion aus der Glandula submaxillaris, die Reizung des fünften Cervicalnerven nach Vereinigung mit dem obersten cervicalen Ganglion Pupillenerweiterung. Die Wirkung hängt also ganz von dem Erfolgsorgan ab.

Die Erregung der Gefäßerweiterungscentren wird wie bei den entsprechenden Constrictoren teils direkt bedingt, z. B. auch durch venöses Blut, oder durch Gifte wie Chloralhydrat in kleinen Dosen, oder sie wird reflektorisch erreicht wie z. B. beim Zustandekommen der Erektion durch sensible Reize. Die Körpertemperatur wird durch Reizung dieser Centren ebenfalls beeinflußt und zwar in einer dem früher Gesagten entsprechenden Weise.

Mit den bisher genannten und in ihrer Lage und Wirksamkeit näher geschilderten vasomotorischen Centren ist aber die Zahl der bekannten vasomotorischen Centren noch nicht erschöpft. Lépine und dann genauer Eulenburg und Landois stellten fest, daß Zerstörung gewissen Abschnitte der Rindenoberfläche des Gehirns

durch Glühlichter beim Hunde sofort eine beträchtliche Steigerung der Temperatur in den Gefäßen der entgegengesetzten Körperseite und Gefäßerweiterung bedingt. Die Temperaturzunahme tritt unmittelbar nach gelungener Operation ein, sie ist von verschiedener Intensität und schwankt in Grenzen von 1–13°. Die wirksamen Bezirke umfassen beim Hunde die auch als motorische Centra für Vorder- und Hinterextremitäten festgestellten Teile, fallen aber wohl nicht völlig mit ihnen zusammen. Die thermischen Centres für Vorder- und Hinterextremitäten sind getrennt. Die Temperaturzunahme ist in fast allen Fällen nach längere Zeit nachweisbar, wenn auch mit erheblichen graduellen Schwankungen, bisweilen findet schon nach wenigen Tagen ein Ausgleich statt. Lokalisierte elektrische Reize bewirken, wenn schwache Ströme angewendet werden, eine geringe und vorübergehende Abkühlung der anderen Seite. Ein thermisches Centrum für den Kopf konnten die Experimentatoren nicht abgrenzen. Diese Angaben sind auch bei der Nachprüfung von anderen Autoren bestätigt, von anderer Seite aber doch wieder bestritten worden, so daß die Frage nach der Existenz und mehr noch nach der Lokalisation dieser Centren noch nicht völlig gelöst ist, wie auch Lewandowsky betont. Dagegen haben Lewandowsky und Weber im Striatum der Katze eine Stelle gefunden, von der aus eine Erregung des Splanchnicusgebietes mit allen Folgen einer solchen (Blutdrucksteigerung) hervorgerufen werden kann. Sehr ausführlich diskutiert Bechterew die Frage der corticalen vasomotorischen Centren. Er ist zu entschieden positiven Resultaten gekommen und hat durch Rindenreizung sowohl pressorische wie depressorische Wirkungen erzielt. „Im allgemeinen nimmt der vasomotorisch aktive Teil der Gehirnrinde ein äußerst umfangreiches Areal ein. Er umfaßt nämlich außer dem am meisten erregbaren Gyrus sigmoides die Scheitellappen und einen Teil der Schläfenlappen.“ Bechterew nimmt an, daß in den vasomotorischen Centren der Hirnrinde vasoconstrictorische und vasodilatatorische Fasern nicht ganz gleichmäßig vertreten sind. Je nach dem Überwiegen einer dieser beiden Faserarten oder je nach der größeren oder geringeren Ermüdbarkeit kommt es bald zu einem Sinken, bald zu einem Ansteigen des Blutdrucks. Möglicherweise ist auch die Qualität des Reizes für den Erfolg nicht irrelevant.

Es ist auch nach Zerstörung anderer, subcorticaler Teile dasselbe oder ähnliches erreicht worden wie bei Reizung corticaler Centren, namentlich ist das Corpus striatum in dieser Beziehung in Anspruch genommen worden. Ito hat die ganze Frage des „Wärmestichs“ ausführlich erörtert und glaubte als Resultat seiner sorgfältigen Experimente feststellen zu können, daß eine bestimmte Stelle am freien Rand des Nucleus caudatus als Centrum für die Wärmebildung anzusehen ist, und zwar derart, daß die Reizung nervöser Elemente Wärme-

vermehrung durch Steigerung der Tätigkeit gewisser Drüsen insbesondere des Pankreas bedingt. In einer eben erschienenen Arbeit bestreitet aber Ernest Sachs, daß der Thalamus opticus, Nucleus caudatus und Nucleus lenticularis Centren für die Regulierung der Temperatur enthalten. Dagegen fanden Karplus und Kreidl bei der Katze durch Reizung der interpedunculären Substanz eine Wirkung auf den Hals-sympathicus; die Reizstelle liegt im vorderen und mittleren Teil des Corpus subthalamicum in der Nähe der Linsenkernechlinge.



In unserer bisherigen Darstellung haben wir uns wesentlich auf die Verhältnisse beim Tier bezogen. Es ist aus verschiedenen Gründen nicht angängig, diese Ergebnisse direkt in ihren Einzelheiten auf den Menschen zu übertragen. Es ergeben sich schon für die einzelnen Tiere nicht unerhebliche Verschiedenheiten, und Abweichungen für den Menschen sind um so eher zu erwarten, als gerade die gegenseitige Abhängigkeit höherer und niederer nervöser Centren beim Menschen und beim Tier große Differenzen aufweist.

Wir erwähnten schon früher, daß die experimentellen Untersuchungen uns keine sicheren Anhaltspunkte über die genauere Lage des großen Vasomotorencentrums in der Medulla oblongata geliefert haben. Die Arbeiten Owajannikows und Dittmars verlegen das vasomotorische Centrum in ein Gebiet, das im wesentlichen der oberen Olive entspricht. Eine Übertragung dieser Angaben auf den Menschen ist schon deswegen unstatthaft, weil die obere Olive beim Menschen unverhältnismäßig viel weniger bedeutend ist, als beim Tier (Hund, Katze z. B.). Zudem ist ihre Zugehörigkeit zum Höelleitungsapparat sicher. Bechterew äußerte in seinen Leitungsbahnen früher die Ansicht, daß der untere Centralkern das Centrum darstelle. Neuerdings hat Brustein in Bechterews Laboratorium Untersuchungen angestellt. Den stärksten Effekt lieferten beim Hunde elektrische Reizung der Seitenteile des verlängerten Markes, entsprechend der Grenze des mittleren und unteren Drittels der Rautengrube. Bechterew nimmt daher an, daß das Hauptcentrum der Vasomotoren in der *Formatio reticularis grisea* des seitlichen Abschnitts des verlängerten Markes dicht oberhalb des *Calamus scriptarius* seine Lage hat. Das ist noch immer eine sehr unsichere Bestimmung und Bechterew betont selbst, daß die Frage der Lokalisation des Centrums noch nicht abgeschlossen ist.

Was lehren nun klinische und anatomisch-pathologische Untersuchungen über die Lage des Centrums? Zunächst müssen hier die Fälle von Diabetes mellitus in Betracht gezogen werden, bei denen Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Glykosurie centraler Natur war. Ererichs hat diese Fälle in seiner Monographie über den Diabetes

(Berlin 1884, zitiert nach Reinhold) zusammengestellt. Als wichtigste und konstanteste Veränderung fand er eine starke Erweiterung der kleinen Gefäße, häufig begleitet von teils älteren, teils frischeren Blutungen, daneben Verdickung des Ependyms und Erweiterung der perivascularären Räume am Boden des vierten Ventrikels, in einem Fall dann noch kleinste myelotische Herde, in einem anderen eine größere Anzahl punktförmiger Blutungen, namentlich im linken Bindearm. Die Veränderungen scheinen jedoch sehr mannigfach lokalisiert gewesen zu sein; Reinhold meint allerdings, daß meist gerade die Wand und die oberflächlichen Schichten des Gewebes am vierten Ventrikel betroffen waren. In einer geringeren Anzahl von Fällen fand Frerichs Neubildungen, unter denen Reinhold besonders eine hervorhebt. Der Tumor ging vom Nervus vagus dexter aus und hob den Boden des vierten Ventrikels empor. Er erwies sich als ein Fibromyom, die Achsenzylinder des Nervus vagus waren intakt. Größere Herderkrankungen in der Medulla wurden nicht gefunden, das einzig auffallende war eine gleichmäßig und symmetrisch durch die Medulla verbreitete Dilatation der kleinen Venen und Capillaren; die Ganglienzellen der unteren Oliven waren deutlich verkleinert. Es ist von verschiedenen Autoren noch eine ganze Reihe von Fällen beschrieben worden, in denen die Melliturie als Symptom von Neubildungen in der Medulla oblongata oder im vierten Ventrikel angegeben wurde, sie finden sich bei Reinhold¹⁾ und Oppenheim²⁾ zitiert. Durch diese Neubildungen waren die verschiedenartigsten Läsionen der in Frage kommenden Gegenden bedingt worden. Stieda³⁾ führt demgegenüber z. B. einen Fall an, wo trotz hochgradiger Veränderungen am Ventrikelboden keine Melliturie nachzuweisen war. Dieser Autor weist auch auf die Schwierigkeiten hin, die es mache, eine Übereinstimmung zwischen den experimentellen Tatsachen der Physiologie und den Befunden der pathologischen Anatomie beim „Gehirndiabetes“ herzustellen. Für die Verschiedenheit der einzelnen pathologischen Fälle macht er die raschere oder langsamere Entwicklung und die verschiedene Ausdehnung der Neubildungen verantwortlich.

Ausgedehnte und mühevollc Untersuchungen über die Lage des Centrums in der Medulla oblongata des Menschen hat Hellweg unter Benützung des Okkultationsmaterials von 47 Personen, die an verschiedenen Psychosen gelitten hatten, angestellt. Er kommt zu dem Resultat, daß das vasomotorische Centrum beim Menschen ungefähr die Lage einnimmt, die Owsjannikow und Dittmar dafür beim Kaninchen ermittelt haben. Er verlegt es demnach in die Seitenteile der Hirnke und in die obere Olive. Wie Reinhold mit Recht hervor-

¹⁾ Am angegebenen Orte, S. 72 und 122.

²⁾ Oppenheim, Geschichte des Oskirus, 21. Aufl. S. 122.

³⁾ Stieda, Festschrift für Prof. Theodor Bar, 1889, Leipzig.

hebt, sind die Heltwegschen Resultate höchst anfechtbar, er hat als klinischen Ausdruck der Störung des Vasomotoriensystems einfach die Geisteskrankheit an und für sich angenommen. Die wenigen Fälle, die er aus der Literatur als Bestätigung für seine Annahme anführt (Fälle von P. Meyer und Browne), sind ebenfalls ohne Beweiskraft.

Wir müssen nunmehr näher auf die von Reinhold erhobenen Befunde eingehen. Reinhold hat drei Kranke untersucht, von denen zwei *intra vitam* an einer einfachen Seelenstörung, der dritte an progressiver Paralyse gelitten hatten. Bei allen dreien war die unmittelbare Todesursache in einer Pneumonie gefunden worden, alle drei hatten während des Lebens vasomotorische Symptome dargeboten. Der erste zeigte etwa eine Woche vor dem Tode plötzlich starkes Ödem der Füße und ödematöse Schwellung der rechten Augengegend, fünf Tage vor dem Tode (in der Zusammenfassung gibt der Verfasser 10 Tage an) erscheint in dem bisher zuckerfreien Urin plötzlich Zucker. Am nächsten Tage neue Ödeme, Sugillationen und Ecchymosen an den Extremitäten, der Tod erfolgte unter leichter Temperatursteigerung. Der zweite Fall weist eine fünf Wochen anhaltende und sechs Wochen vor dem Tode wieder verschwindende Glykosurie auf, sieben Wochen vor dem Tode Ödeme, vier Wochen später eine Blutung unter die Haut, Ödeme und Blutung werden bei dem Fehlen jeder anderen Ätiologie als ventrale vasomotorische Störungen aufgefaßt. In den letzten fünf Tagen des Lebens konstant, vorher vereinzelt subnormale Temperatur bis 32,8°. Der dritte Fall endlich betrifft eine ziemlich rasch verlaufende progressive Paralyse. Die ersten vasomotorischen Störungen treten zwölf Tage vor dem Tode als gangränartige Veränderungen an den peripheren Teilen der Extremitäten und als Decubitus ventus auf. Zwei Tage vor dem Tode rapid fortschreitende Pilegmone, trotzdem niedrige Temperaturen, Hämatom an der Ferse bei Anschluß traumatischer Schädlichkeiten, am letzten Tage Temperatur bis 32,1°.

Die beschriebenen vasomotorischen Störungen werden als central bedingte aufgefaßt, weil weder der klinische noch der pathologisch-anatomische Befund eine andere Ätiologie möglich erscheinen lassen. Was nun die Art der in der Medulla oblongata vorgefundenen Veränderungen, die für das Entstehen der vasomotorischen Störungen verantwortlich gemacht werden, angeht, so handelt es sich in allen drei Fällen im wesentlichen um Blutungen, die im Fall 1 und 3 frisch, im Fall 2 etwas älter waren, sie besonders aus der an einigen Stellen schon weit vorgeschrittenen Bindegewebsneubildung zu schließen war. Die Blutungen hatten zu einer Zerstörung des von ihnen unmittelbar getroffenen Gewebes geführt. Sie liegen alle subependymal in dem sogenannten Ventrükelgrau. Dieses Ventrükelgrau ist nach Reinholds Annahme den Nervenkernen durchaus analog gebaut, indem es eine reichlichere Anzahl von Ganglienzellen enthält, die teils zerstreut liegen

teils zu größeren oder kleineren Gruppen vereinigt sind. Reinhold schildert sie des genaueren wie folgt:

Schon in Höhen, in denen der Centralkanal gerade anfängt, sich zum Ventrikel zu erweitern, liegen medial vom Hypoglossuskern zwei kleine Kernhäufchen. An ähnlich gelegenen Stellen tritt etwas mehr proximal der Nucleus funiculi teretis auf, der sich bis in die cerebrale Hälfte der Rautengrube verfolgen läßt. Er verschwindet etwa gleichzeitig mit dem Facialis aus dem Gesichtsfeld, nun treten andere Gruppen von Ganglienzellen auf, die mehr zeitlich gelagert sind, später kommen auch wieder Nervenzellen neben der Mittellinie zum Vorschein. In auffallender Weise zeigen diese Zellen alle eine große Ähnlichkeit in Größe und Aussehen, in der überwiegenden Mehrzahl sind sie nur von mittlerer Größe und von länglichen, spindelförmigem Bau. Außer den Ganglienzellen finden sich in diesem Gebiete auch Nervenfaseru, und zwar kommen hauptsächlich die von Schütz als dorsales Längsbündel bezeichneten Fasernzüge in Betracht, die Reinhold aber lieber „Schütz'sche Fasern“ nennt, weil er ihnen keinen longitudinalen Verlauf zubilligen kann. Diese Fasern betrachtet Reinhold als konstituierende Elemente des vasomotorischen Centrum. Schließlich hat er auch Nervenfaseru aus der *Formatio reticularis radiär* in das Ventrikelgrau hinausstrahlen sehen, und er hält sie für geeignet, die physiologisch und klinisch geforderte vasomotorische Obbangstarrückenmarkbahn darzustellen.

In dieses Ventrikelgrau verlegt nun Reinhold das vasomotorische Centrum und umgrenzt es in der Weise, daß er die Grenzen der in seinen Fällen gefundenen Blutungen auch als die Grenzen des Centrums annimmt, doch so, daß er auf Grund gewisser Erwägungen das Gebiet des Nocl. funicul. teretis dem vasomotorischen Centrum noch zurechnet. Es besteht danach das Centrum aus einem größeren proximalen und zwei kleineren caudalen Centren, der Nocl. funicul. teretis stellt die Verbindung zwischen distalen und proximalen Abschnitten her.

Zwischen den beiderseitigen vasomotorischen Centren besteht keine direkte Verbindung, wohl aber reichen die nervösen Elemente beiderseits sehr nahe an die Mittellinie heran. Was die periphere Abgrenzung angeht, so will Reinhold diese durchaus nicht als geometrisch scharfe Linie aufgefaßt wissen. Viel wahrscheinlicher ist ihm ein allmählicher Übergang. Die proximale Grenze des Centrums erscheint Reinhold auch noch dadurch sichergestellt, daß in den Fällen von Polioencephalitis sup. acuta des Wernickeschen Typus die Blutungen gewöhnlich ihren Hauptsitz weiter proximal am Boden des Aquaeductus Sylvii und des dritten Ventrikels haben und distalwärts allmählich abnehmend bis in die Gegend der Striae acusticae reichen, und daß dementsprechend in diesen Fällen vasomotorische Erscheinungen zu finden pflegen. Die distale Abgrenzung des Centrums scheint ihm durch

eine Beobachtung von Lemeke gegeben zu sein. Dieser fand in einem Falle von frischer Blutung in den Ventrikellboden, die von der Mitte der unteren Olive bis zur Spitze der Ala cinerea reichte, neben Anarthrie, Dysphagie, Respirationstörungen, eine Erniedrigung der Körpertemperatur auf 23°. Reinhold meint, aus diesem Fall und seinen Fällen 2 und 3, die ebenfalls Temperaturniedrigung zeigten, schließen zu dürfen, daß im kaudalen Abschnitt des Bodens des vierten Ventrikels die Bezirke des vasomotorischen Centrums liegen, die speziell der Wärmeregulierung vorstehen.

Ein Vergleich der so bestimmten Lage des Centrums beim Menschen und der beim Tier experimentell festgestellten läßt uns erkennen, daß insoweit eine erhebliche Verschiedenheit besteht, als das menschliche Centrum viel näher dem Ventrikellboden liegt, als das beim Kanarienvogel gefundene. Es ist von den Experimentatoren ausdrücklich hervorgehoben worden, daß die tieferen Schichten der Medulla durch den Stich getroffen sein müssen, wenn Glykämie erfolgen soll. Es ist ganz unbekannt, welches die speziellen dafür verantwortlich zu machenden Gebilde der Oblongata sind, und es muß Reinhold unbedingt zugegeben werden, daß in Rücksicht auf die verwickelte Struktur dieser nervösen Teile die Experimente Cl. Bernards sowohl wie Dittmars und Owsjannikow's verhältnismäßig grob sind.

Wie steht es nun aber mit der Begeisterung der Reinhold'schen Ausführungen? Uns scheint durch sie die Frage nach der Lokalisation des vasomotorischen Centrums beim Menschen noch keineswegs zum Abschluß gebracht zu sein.

Anatomisch kann von einer irgendwie sicheren Abgrenzung des von Reinhold bezeichneten Teils des Ventrikellbodens von dessen übrigen Teilen nicht die Rede sein. Überall im centralen Hohlraum speziell des vierten Ventrikels, des Aqueductus Sylvii und des dritten Ventrikels ergeben sich ähnliche Verhältnisse¹⁾. Zahlreiche mittelgroße spindelförmige Ganglienzellen und ein ziemlich dichtes Gewirr von stärkeren und feineren Nervenfasern bilden überall die wesentlichen Bestandteile dieser Formation, über deren funktionelle Bestimmung bisher nichts Sicheres bekannt ist. Schütz, der zuerst das dortgelegene Fasernetz beschrieben hat, faßt es als ein System von Assoziationsfasern zwischen den einzelnen Hirnnervenkernen auf. Nach Kolliker²⁾ ist die Schütz'sche Schilderung keine ganz genaue, er hält die zahlreichen Fasern des centralen Hohlraums für kurze Bahnen von Assoziationsystemen, doch sei Sicheres nicht bekannt. Reinhold glaubt, daß die Schütz'schen Angaben von der Häufigkeit des Schwundes dieser Fasern bei Paralytikern mit seiner eigenen Annahme ihrer

¹⁾ Siehe Cassirer-Schiff, Arbeiten aus dem Institut Obersteiger, II, IV, 8, 110.

²⁾ Handbuch der Gewebelehre, II, 8, 338.

Zugehörigkeit zu den vasomotorischen Bahnen bei der Häufigkeit von vasomotorisch-trophischen Störungen bei der Paralyse nicht in Widerspruch stehen; doch liegt unseres Erachtens irgendein Beweis dafür nicht vor, daß wirklich diese in der Tat bei Paralytikern sehr häufig angetroffenen Störungen stets oder auch nur mit einer gewissen Regelmäßigkeit ihr anatomisches Korrelat in der Degeneration der Schütz-schen Fasern haben.

Daß ferner die in Reinholds drei Fällen beobachteten klinischen Erscheinungen, die er als central vasomotorisch bedingte kennzeichnet, sicher derartige gewesen sind, ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben. So heißt es in der Krankengeschichte von Fall 3 (progressive Paralyse): „Unter andauernder mäßiger Unruhe, schlechter, zumeistlich unregelmäßiger Nahrungsaufnahme und größter Unreinlichkeit schreitet der somatische und psychische Verfall des Patienten rasch vorwärts.“ Wenn sich bei einem solchen Kranken in den letzten 14 Tagen vor dem Tode gangränöse Stellen, Decubitus, Abszesse, ein Hämatom der Ferse und subnormale Temperaturen entwickeln, so dürfte der Beweis, daß es sich hier um central bedingte, vasomotorische Störungen handelt, wohl nicht zu erbringen sein. Nicht viel besser steht es bei den anderen Fällen mit diesem Nachweis und auch die zweimal beobachtete Glykocurie ist in ihrer Genese nicht genügend sicher zu erklären.

Auch die Art der post mortem gefundenen Veränderungen gibt zu Bedenken Anlaß. Es handelt sich in zwei Fällen um frische, in einem Fall um etwas ältere Blutungen, die Gefäße sind dilatiert und das umgebende Gewebe ist verändert. Es findet sich Degeneration der markhaltigen Nervenfasern, schwere Färbbarkeit des Gewebes und vereinzelte Körnchenzellen. Dabei ist zu erwägen, daß alle drei Kranken an Pneumonie zugrunde gegangen sind, daß frische Blutungen geringerer Ausdehnung namentlich in diesem Teil des Hohlengraus, wo auch normalerweise einige oft recht weite Gefäße liegen, bei an Infektionskrankheiten und unter asphyktischen Erscheinungen gestorbenen Individuen nicht gerade selten gefunden werden, und daß hier durch den Marasmus und die große motorische Unruhe das Zustandekommen solcher Blutungen erleichtert wurde.

Der Versuch, durch Heranziehung der Poliomyelitis sup. acuta eine proximale Abgrenzung des vasomotorischen Centrums zu gewinnen, erscheint ebenfalls nicht berechtigt, wenn man sich erinnert, daß Fälle von ganz gleichem anatomischen Charakter, wie die des Wernickeschen Typus, auch in distaleren Höhen der Medulla oblongata um die Kerne des 7., 9. und 12. Nerven herum als Poliomyelitis inf. acuta often beschrieben wurden, ebenfalls ohne vasomotorische Störungen aufzuweisen. Wenn ferner einzelne der von Reinhold aufgeführten Fälle von Neubildungen in der Oblongata resp. im vierten Ventrikel für seine Annahme zu sprechen scheinen, so fehlt es anderer-

seits nicht an widersprechenden Beobachtungen, und weiterhin mangelt es bei diesen Fällen auch noch völlig an einer auf bestimmte Gebiete beschränkten Lokalisation der Zerstörung. Die Bedenken, die sich gegen die von Reinhold angenommene genaue Lokalisation des vasomotorischen Centrums ergeben, sind damit im wesentlichen auseinander-gesetzt. Es möge uns aber gestattet sein, unsere Ausführungen über die Lage des Centrums in der *Medulla oblongata* nochmals dahin zusammenzufassen:

Tierversuche haben ergeben, daß das vasomotorische Centrum in der *Medulla oblongata* entsprechend einem großen Teile des vierten Ventrikels liegt, pathologische Erfahrungen beim Menschen machen eine ähnliche Lage auch für diesen wahrscheinlich, doch ist eine genaue Lokalisation zur Zeit noch unmöglich, im besonderen ist die Annahme von Reinhold, daß es im Höhlengrau des vierten Ventrikels liegt, durchaus unbewiesen.

Der weitere Verlauf der vasomotorischen Bahnen vom *Oblongata-centrum* bis in das Rückenmark ist ebenfalls Gegenstand pathologisch-anatomischer Untersuchung gewesen. Zuletzt hat Reinhold in seiner Arbeit versucht, diese Bahnen genauer zu bestimmen. Er fand in seinem ersten und dritten Falle im Bereich der vorderen gemischten Seitenstrangbahn Degeneration der markhaltigen Nervenfasern. Es handelte sich nicht um eine totale Strangdegeneration, sondern um eine die einzelnen Höhenabschnitte in *circumscripter* Weise betreffende Lichtung der Markscheiden mit konsekutiver stärkerer Entwicklung des Stützgewebes. Am bedeutendsten waren die Veränderungen im oberen Halsmark, und zwar nahmen sie dort ein kleines umschriebenes dreieckiges Gebiet ein, das sich im Fall 3 proximal bis zur Schließenskreuzung verfolgen ließ. Distal nahm die Degeneration rasch an Intensität ab und schon im obersten Brustmark war sie nicht mehr nachweisbar.

Über ähnliche Faserzüge berichtet auch Hellweg auf Grund seiner Untersuchungen. Er teilt die im Rückenmark vorhandenen vasomotorischen Bahnen in zwei Gruppen, die beide bei seinen von Gesteirkranken stammenden Material durch besonders dünne und feine Fasern ausgezeichnet waren. Sie treten durch die ganze Höhe des Rückenmarks aus dem Vorderhorn in die Seitenstränge, wo ihre Hauptmasse die Bahn bildet, die Hellweg als *diffuse Formation* bezeichnet. Sie liegt in den Seitenstrangresten und dem zunächst anliegenden Teil der Vorderstränge, im unteren Dorsalmark ist sie nicht gut abgrenzbar, von der Mitte des Dorsals bis an beginnt sie sich zu sammeln, wird aber erst im oberen Cervicalteil mit aller Bestimmtheit abgrenzbar. Ungefähr vom vierten Cervicalnerven an wird eine neue schärfer umschriebene *Formation* erkennbar, ein dichtes Bündel feiner Nervenfasern, wahrscheinlich auch dem Vorderhorn entspringend, legt sich längs der

Peripherie an, es ist von dreieckiger Form mit der Basis nach außen und der Spitze nach innen, nach vorn wird es von den vorderen Wurzeln begrenzt. Deutlich als solche zu verfolgen ist diese Dreikantenbahn Hellwegs bis zur unteren Olive, hier biegt sie plötzlich aus der Längsrichtung in eine schräge um und umgibt schalenförmig die Olive. Auch die diffuse Formation des Seitenstranges nimmt nach diesem Autor einen ähnlichen Verlauf und tritt in nahe Beziehungen zur unteren Olive.

Der Dreikantenbahn ist erst später in der Literatur genügende Aufmerksamkeit geschenkt worden. Hellweg glaubt, daß Westphal sie in zwei Fällen gesehen hat, in denen es sich um akute aufsteigende Spinalparalyse handelte. Westphal glaubte sich nicht berechtigt, diesen Befunde einer Anzahl besonders feiner, in einem dreieckigen Felde vereinigter Fasern eine pathologische Bedeutung beimesen zu sollen. Des weiteren hat Bechterew unter dem Namen „Oliventrang“ diese Bahn beschrieben, und sehr ausführlich ist Pick, der sie in drei Fällen sah, auf diese Faserzüge eingegangen. Pick spricht sich über Ursprung, Endigung und Bedeutung dieser Bahn sehr vorsichtig aus, er ist jedenfalls nicht imstande, die Befunde Hellwegs in bezug auf ihre Funktion zu bestätigen. Ich selbst habe die Bahn viermal beobachten können, zweimal handelte es sich um eine diffuse Atrophie des Kleinhirns, einmal um einen Fall von reflektorischer Papillenstarre, wo neben der Degeneration der Dreikantenbahn eine ganz beginnende tabische Hinterstrangsveränderung im unteren Dorsalmark vorlag, endlich sah ich sie einmal als zufälligen Nebenfund in einem Falle, der im Laboratorium von Prof. Oppenheim zu Übungszwecken von anderer Seite geschnitten wurde. In keinem der Fälle hatten, soweit bekannt, *intra vitam* vasomotorische Erscheinungen bestanden, so daß auch ich mit der Annahme Hellwegs und Reinholds, daß es sich um eine vasomotorische Leitungsbahn handle, nicht einverstanden sein kann. Auch die späteren Forschungen haben das Dunkel, das über Ursprung, Endigung und Funktion dieser Bahn liegt, höher nicht aufzuhellen vermocht. Am ausführlichsten hat sich Obersteiner mit der Topographie des Faserzuges beschäftigt, weitere Beiträge lieferten Mingazzini und Peruzzi, Spiller und besonders Gianelli, der in seinem Fall wenigstens die Beziehungen zu dem anterior und mittleren Teil der Olive auf Grund einer Degeneration des Bündels sicher stellen zu können glaubte. Obersteiner¹⁾ betrachtet es jetzt als eine durch die Olive unterbrochene spinalwärts ziehende Fortsetzung der ventralen Hasenbahn. Von den Hellwegischen Anschauungen ausgehend hat Thalbitzer Untersuchungen über die Funktion dieser Bahn bei Psychosezen aufgenommen, ohne jedes positive Ergebnis, wie vorauszusetzen war,

¹⁾ Obersteiner, *Anleitung beim Studium des Baues der nervösen Centralorgane*. V. Aufl. Wien 1912. S. 421.

Daß aber trotzdem die vasomotorischen Leitungsbahnen vom Oblongatacentrum aus in den Seitensträngen resp. den Vorderseitensträngen verlaufen, erscheint sehr wahrscheinlich. Kölliker¹⁾ gibt die Möglichkeit solcher Bahnen zu, „sie könnten als bis jetzt noch unbekannte, centrifugal wirkende Bahnen in den ventralen oder ventrolateralen Strängen liegen“. Kocher hat an einem großen Material von Rückenmarkverletzungen, die durch Wirbelbänderverletzungen bedingt waren, die Erscheinungen der Vasomotorenlähmung studiert. Er fand als solche Gefäßausdehnungen und erhöhte Temperatur der motorisch gelähmten Glieder. Die Lähmung restituerte sich stets rüßig. Kocher läßt es dahingestellt, ob durch Vermittlung von Fasern der anderen Seite (bei Halbsseitenläsion des Rückenmarks) oder durch Eintreten peripherer Ganglien. Bei manchen Patienten schien unvollkommene Lähmung der Vasomotoren mit Reizerscheinungen von ihrer Seite einherzugehen, d. h. mit Blässe und Verminderung der Temperatur; es besteht nach diesem Autor auch die Möglichkeit, daß diese Symptome nicht durch Reizung der Vasoconstrictoren, sondern durch Lähmung der Vasodilatoren bedingt seien, was aber mit sonstigen physiologischen Erfahrungen über die Vasodilatoren im Widerspruch steht. Er nimmt an, daß die Vasomotoren zugleich mit den Pyramidenfasern verlaufen, aber doch nicht von ihnen repräsentiert werden. Auch Schlesinger hat auf die durch Compression des Rückenmarks durch Tumoren bedingten vasomotorischen Symptome aufmerksam gemacht, die übrigens auch schon von anderer Seite bei Querschnittserkrankungen des Rückenmarks beobachtet worden waren, ohne daß für die genauere Lokalisation der betreffenden Bahnen dabei viel herausgekommen wäre. Die Annahme, daß sie in den Seitensträngen verlaufen, stimmt ja auch mit den von Dittmar und Langley experimentell beim Tier gewonnenen und oben angegebenen Resultaten überein.

Nicht besser sind wir über die spinalen vasomotorischen Centren orientiert. Es ist von klinischer Seite der Versuch gemacht worden, wenigstens einen Teil von ihnen näher zu lokalisieren, und zwar geschah dies von seiten Pierrets. Dieser analysierte die bei der Tabes dorsalis beobachteten Störungen vasomotorischer Art näher und kam zu dem Schluß, daß diese Störungen von Veränderungen bedingt werden, die die Zellgruppen betreffen, die im Seitenhorn, resp. an der Stelle der Vereinigung des Vorder- und Hinterhorns im Tractus intermediolateralis liegen. Hierhin verlegen auch Grassé et Ranzier die spinalen vasomotorischen und Schweißcentren auf Grund einer klinischen Analyse ihres „Syndrome bulbo-médullaire, constitué par la thermesthésie, l'analgésie et les troubles endoraux ou vasomoteurs“. Ihnen folgt eben

¹⁾ Am angegebenen Ort. S. 155.

talls auf Grund klinischer Daten Eulenburg. Einen pathologisch-anatomischen Befund über das Centrum bringt Jacobssohn, insofern wenigstens, als er in einem Falle das Centrum oculospinale gefunden zu haben glaubt, und man wohl mit Recht annehmen darf, daß diesem analog auch die übrigen Ursprungscentren des Sympathicus liegen. Er beobachtete folgenden Fall: Eine in der linken Schläfeneingrube lagernde Krebsgeschwulst hatte den ganzen gleichseitigen Plexus brachialis mit ergriffen und fast dessen sämtliche Nervenfasern zur Degeneration gebracht. Es bestanden die entsprechenden klinischen Symptome und ocalopupillären Erscheinungen, nämlich Verengerung der linken Pupille, Verkleinerung der linken Lidspalte mit Zurücksinken des linken Bulbus. Die anatomische Untersuchung ergab im Rückenmark mit der Nisslmethode eine Degeneration der großen Vorderhornzellen und was uns besonders angeht, es waren mittelgroße Zellen einer charakteristischen Zellgruppe, welche die Spitze des Seitenhorns an der Grenze zwischen Hals- und Brustmark einnimmt, verändert. Diese Zellen sind normalerweise zum größten Teil nicht polygonal, sondern mehr schmal und länglich ausgezogen, sie liegen niemals ganz zerstreut, sondern bilden stets einen kleinen, sich deutlich heraushebenden Zellhaufen. In Jacobssohns Fall waren diese Zellen außerordentlich dunkel gefärbt, sie hatten ein etwas gequollenes Aussehen und die schematische Substanz hatte sich mehrfach mitgefärbt. Der ganze Zelleib sah wie mit feinen Sandkörnchen gefüllt aus und war verwaschen. In dieser Weise waren die meisten Zellen an vielen Präparaten verändert, und zwar links viel stärker als rechts, aber im ganzen waren die Veränderungen in dieser Zellgruppe viel geringer als in den großen Vorderhornzellen. Trotzdem hält Jacobssohn die pathologische Bedeutung der Zellveränderungen im Seitenhorn für erwiesen und verlegt in diese Zellgruppe das Centrum oculospinale Budges. Nach meiner Ansicht bedarf auch diese Annahme noch sehr der Bestätigung, da die Zellen dieser Gruppe, wie ja auch Jacobssohn erwähnt, auch normalerweise einen abweichenden Bau haben und speziell oft sehr dunkel gefärbt sind. Ich möchte erwähnen, daß auch beim Kaninchen eine ähnliche Gruppe besteht, und daß wir auch in dieser bei unseren oben erwähnten Versuchen nach Exstirpation der Ganglien des Hals-sympathicus keine Veränderungen gefunden haben.

Auch dieser Teil der vasomotorischen Bahnen scheint mir demnach in seinen Einzelheiten noch nicht fixiert. Wladjtschko berichtet von einem Fall, wo zu Lebzeiten des Pat. neben Erscheinungen von Bulbäraparalyse Raynandsche Symptome bestanden, und von einem zweiten von Sklerodermie; bei anatomischer Untersuchung fand er Anhaltspunkte dafür, daß die Zellen des Seitenhorns in enger Beziehung zu den Vasomotoren stehen; ebenso einige Zellen der Basis des Hinterhorns und der paracentralen Gruppe. Eine solche vereinzelt positive

Angabe besagt gegenüber den zahlreichen negativen Befunden, die wir später kennen lernen werden, nichts.

Beim Menschen weist eine Anzahl von wohlbekannten physiologischen Beobachtungen darauf hin, daß das Großhirn von Einfluß auf die Gefäßweite ist. Vorstellungen und Affekte bewirken offensichtliche Veränderungen der Gefäßweite, Erblässen und Erröten usw. Das braucht nicht weiter mit Beispielen belegt zu werden. Die Abhängigkeit der sekretorischen Funktionen von der Psyche wird in den Pawlow'schen Versuchen, deren Gültigkeit auch für den Menschen sichergestellt ist, aufs deutlichste gezeigt. Auch pathologische Erfahrungen bestätigen diesen Einfluß. Bechterew und Schüller erwähnen, daß Verletzungen und Entartungen in den Centralwindungen Ungleichheit der Temperatur beider Seiten nach sich gezogen hätten. Einen wertvollen Beitrag zu dieser Frage hat Rossolimo geliefert. Bei einem 38-jährigen Mann fanden sich Erscheinungen, die auf eine Neubildung in der rechten motorischen Zone deuteten: Parese mit Zuckungen der linken Körperseite, daneben Kopfschmerz, ferner folgende vasomotorische Störungen: die linke Hand war stets cyanotisch, ödematös, ihre Temperatur im Vergleich zur rechten um 0,2 bis 0,3° herabgesetzt, der Unterschied war ein dauernder. Die Operation, bei der sich eine Cyste fand, machte die vasomotorischen Erscheinungen verschwinden. Rossolimo schließt daraus, daß das corticale vasomotorische Centrum den motorischen Centren nahe liegt. Auch Friedländer und Schlesinger haben einen ähnlichen Fall beobachtet. Mager beobachtete in zwei Fällen von Tumor der Centralwindungen vasomotorische Symptome, in dem einen gesellten sich zu den sensiblen und motorischen Erscheinungen Jacksonscher Epilepsie Temperaturherabsetzung auf der befallenen Seite, in einem zweiten bestand eine ausgesprochene Cyanose in dem paretischen Bein. Im ganzen sind derartige Symptome, wie Oppenheim (Die Geschwülste des Gehirns II. Aufl. S. 95) hervorhebt, selten beobachtet worden. An anderer Stelle erwähnt er (Lehrb. V. Aufl. S. 811), daß er eine vasomotorische Form der Jacksonschen Epilepsie und eine vasomotorische Monoplegie beobachtet habe: anfallsweise auftretende vasomotorische Störungen im Arm und Gesicht einer Seite mit oder ohne Bewußtseinsverlust und persistente vasomotorische Störungen in denselben Gebieten, dabei nur geringe Parese und Atrophie. Auch die vasomotorischen Symptome der Epilepsie sind hier zu erwähnen.

Auch über die Bahnen, die von dem supponierten corticalen Centrum zu den tieferen Hirnteilen führen, ist einiges bekannt geworden. Bemerkenswert ist besonders die Tatsache, daß bei den gewöhnlichen Hemiplegien oft vasomotorische Störungen wie Cyanose und Ödem der gelähmten Seite vorhanden sind, die sich aus der Untätigkeit allein nicht immer genügend erklären lassen (Oppenheim u. a.).

Vor einiger Zeit haben Parhon und Goldstein genauere Untersuchungen über diesen Punkt veröffentlicht. Sie fanden, daß unter 18 Fällen von Hemiplegie 13 mal die gelähmte Seite kälter war, 4 mal war kein Unterschied, 1 mal war die Temperatur auf der gelähmten Seite höher. Auch die Pulshöhe zeigte Differenzen, meist fand sich eine einfache Verminderung auf der gelähmten Seite, einige Male sogar bestand nur mehr ein oscillatorisches Zittern an Stelle der Puls-welle. In zwei Fällen war ein Ödem der ganzen gelähmten Seite zu notieren, es traten hier ferner Blasen an den Händen auf, die bald platzen; ein einfaches Ödem der Hand fand sich 8 mal unter 86 Fällen. Die Dermatographie ergab 2 mal keinen Unterschied, 3 mal war ein deutlicher Unterschied zugunsten der gelähmten Seiten, 9 mal ein geringer Unterschied im selben Verhältnis und 1 mal ein Unterschied zugunsten der gesunden Seite vorhanden. Alles in allem sprechen sich Parhon und Goldstein für die Annahme corticaler vasomotorischer Centren und davon ausgehender Bahnen aus. Wo sie verlaufen, vermögen sie nicht zu bestimmen, jedenfalls war in den heißen Fällen von hochgradigem Ödem der hintere Teil der inneren Kapsel intakt, was gegen die Annahme spricht, daß die vasomotorischen Bahnen nahe den sensiblen verlaufen.

Subcorticale vasomotorische Centren wurden zunächst im Sehhügel angenommen, indem man sich auf solche Fälle stützte, wo Affektionen dieser Gegend Temperaturerhöhung und wohl auch Ödem der entgegengesetzten Seite bedingt hatten (Ott u. a.). Monakow¹⁾ glaubt es nicht von der Hand weisen zu sollen, daß sekretorische, vasomotorische und andere mit dem sympathischen Nervensystem in Verbindung stehende Fasermassen im Sehhügel eine reiche Vertretung haben. Ähnliches wurde vom Nucleus caudatus behauptet (Kaiser, Minor, Thöls usw.) und auch in den Vierhügeln, den Pedunculi und dem Pons wurden Centren für diese vasomotorischen Bahnen oder wenigstens Durchgangspunkte derselben angenommen (Ott, Hellweg), doch fehlt für alle diese Stellen sowohl ein irgendwie sicherer experimenteller als auch ein klinischer oder gar pathologisch-anatomischer Nachweis, so daß wir auf die verschiedenen Ansichten der Autoren über diese Frage wohl nicht näher einzugehen brauchen.

Was die Verhältnisse der vasodilatatorischen Centren und Bahnen beim Menschen angeht, so ist darüber nichts Näheres bekannt, und wir müssen uns ganz an das halten, was der Tierversuch uns lehrt. Daß auch das Großhirn beim Menschen erregend auf die Dilatoren einwirken kann, hat man u. a. daraus geschlossen, daß Erektionen durch Vorstellungen zustande kommen; ebenso soll die Schamröte eine Wirkung der Großhirnrinde auf die Vasodilatoren sein.

¹⁾ *Gehirnpathologie*, II. Aufl., S. 364.

Überschauen wir noch einmal das ganze Vasomotorensystem, so sehen wir aus den vorstehenden Zeden, daß es aus zahlreichen übereinander gelagerten Abschnitten zusammengesetzt ist, die voneinander abhängig sind. Wenn wir im System der die willkürlichen Muskeln innervierenden Nerven mit zwei Abteilungen zu rechnen haben, so steigt diese Zahl bei dem Vasomotorensystem auf vier und kann möglicherweise darüber noch hinausgehen.

Es ist angenommen, und darf wohl auch als bewiesen gelten, daß in der Großhirnrinde ein Vasomotorencentrum liegt. Von hier aus gehen die Vasomotorenbahnen wahrscheinlich zusammen mit den motorischen und sensiblen langen Leitungsbahnen durch die innere Kapsel zu den subcorticalen großen Ganglien. Schon hier im Thalamus opticus oder im Nucleus caudatus werden sie vielleicht durch neue Zellgruppen in ihrer Kontinuität unterbrochen. Dann verfolgen sie ihren Weg weiter durch den Pons zu dem großen Vasomotorencentrum der Medulla oblongata. Von diesem Centrum ziehen Fasern durch die Seitenteile der Medulla spinalis zu bestimmten Höhen des Rückenmarkes, um sich dort wahrscheinlich in der mittleren grauen Substanz um Zellgruppen herum aufzusplitteln, die als die spinalen vasomotorischen Centren anzusehen sind. Diesen Zellgruppen entspringen wiederum Fasern, die durch die Rami communicantes zum Sympathicus und von dort weiter zur Peripherie gehen. Auch in diesen Teil der Vasomotorenbahn sind noch einmal Ganglienzellen eingeschaltet. Sie liegen an verschiedenen Stellen der Bahn, teils in den Ganglien des Grenzstranges, teils mehr peripher, vielleicht zum Teil direkt in den Gefäßwänden. Diese Zellen sind als die periphersten vasomotorischen Centren anzusehen. Von einzelnen Forschern wird sogar die Möglichkeit einer autonomen Tätigkeit der glatten insbesondere auch der Gefäßmuskulatur ins Auge gefaßt.

Physiologisch haben wir zwei Arten von Centren und Bahnen zu unterscheiden, die der Vasoconstrictoren und der Vasodilatatoren.

Die klinische Bedeutung dieser Tatsachen liegt auf der Hand. Es ist durch diese Vielheit offenbar für einen rascheren Ausgleich vasomotorischer Störungen gesorgt, der noch dadurch begünstigt wird, daß hier die untergeordneten Centren gegenüber den höheren eine relativ größere Selbständigkeit zu haben scheinen. Auf der anderen Seite erschwert diese Vielheit auch außerordentlich die lokalisatorische

Diagnose vasomotorischer Störungen, namentlich wir kein Mittel haben, aus der Art der Störungen auf deren Sitz zu schließen, während doch z. B. im motorischen System die Art der Parese uns in der Mehrzahl der Fälle über den Sitz der Läsion Aufschluß gibt. Dazu kommt dann noch, daß wir es ja mit zwei Systemen zu tun haben, einem gefäßverengernden und einem gefäßweiternden, und daß ferner von allen möglichen Teilen des Körpers her sehr leicht die mannigfachsten, oben näher geschilderten reflektorischen Wirkungen auf das Vasomotorensystem ausgeübt werden können. So erklärt sich eine Tatsache leicht, die wir im speziellen Teil unserer Ausführungen noch oft recht schwer empfinden werden, daß nämlich weder Art noch Ausbreitung der vasomotorischen Störungen uns einigermaßen sichere Anhaltspunkte über deren Pathogenese ergeben. Nur das eine darf man erwarten, daß dort, wo sich die vasomotorischen Störungen streng an den Verlauf eines peripheren Nerven knüpfen, die krankmachende Ursache ebenfalls in diesem Nerven sitzt und dessen vasomotorische Fasern schädigt.

Von allgemeiner Gültigkeit und großer Wichtigkeit für die Klinik der vasomotorischen Erscheinungen scheint mir schließlich noch ein Punkt zu sein. Wir sahen schon, daß die Ausfallserscheinungen von seiten des Vasomotorensystems eine große Tendenz zur Rückbildung haben, und wir gehen nicht fehl, wenn wir diese Tatsache darauf zurückführen, daß zahlreiche übereinander geordnete Centren für die Vasomotoren zur Verfügung stehen, von denen bei Ausfall des übergeordneten offenbar ohne erhebliche Störung das untergeordnete eintritt. Ganz anders entwickeln sich die Dinge, wenn wir eine Reizung eines Centrums oder einer Bahn vor uns haben. Da ist ein vikariierendes Eintreten tieferer Bahnen und Centren natürlich unmöglich, der Reizzustand pflanzt sich durch die ganze Kette der nervösen Systeme fort und wird nicht kompensiert. Bei fortwährendem Reiz kann der Nachlaß der klinischen Erscheinungen nur dadurch bedingt werden, daß die Erregbarkeit des betreffenden Nervenabschnittes aufhört und damit auch hier an Stelle des Reizes die Lähmung tritt. Daß aber wenigstens auf reflektorischem Wege lange Zeit eine Vasomotorenreizung unterhalten werden kann, haben wir oben betont, wie es auch von Samuel mehrfach hervorgehoben und auch experimentell festgestellt wurde. Wir werden in den geschilderten Verhältnissen, wie ich denke, eine genügende Erklärung dafür finden, daß Reize innerhalb des Vasomotorensystems viel mächtiger wirken als Lähmungen, und werden umgekehrt auch bei langdauernden vasomotorischen Erscheinungen eher an (reflektorische) Reiz- denn an Lähmungszustände zu denken haben.

Von größter Bedeutung sind ferner die oben erwähnten pharmakologischen Eigenschaften des vegetativen Systems im weiteren Sinne und die sich für die einzelnen Abschnitte des Systems (sympathi-

ches System im engeren Sinne, parasympathische Systeme) ergebenden Differenzen; die allgemeine Wirkung des Nicotins, das allüberall im vegetativen System die Wirkung der postganglionären Fasern aufhebt, die für uns daneben ganz besonders in Betracht kommende Wirkung des Adrenalin, das im engeren sympathischen System überall Reizeffekte auslöst, der Antagonismus der zwischen der Wirkung dieser Substanz und denen anderer Substanzen besteht, die der Atropin-Gruppe auf der einen Seite, der Muscarin-Gruppe auf der anderen Seite angehören, die nicht auf das sympathische System im engeren Sinne, sondern auf das craniospinal und zentrale parasympathische System (autonome Systeme) lähmend oder hemmend wirken: alle diese sich uns jetzt allmählich erschließenden Tatsachen sind gewiß von größter Bedeutung; aber ihr augenblicklicher Wert für eine genauere Erkenntnis pathologischer Geschehens auf unserem Gebiete ist noch recht gering, da es vorläufig an sicheren Unterlagen fehlt, die physiologisch-experimentellen Erkenntnisse auf die Pathologie zu übertragen. Ein von Heß und Eppinger gemachter Versuch ein Krankheitsbild der Vagotonie aufzustellen, mußte deswegen scheitern. Wir sehen in diesen Erkenntnissen Wegweiser für zukünftige Forschungen; sie eröffnen hoffnungsreiche Ansichten, über den jetzigen sehr unbefriedigenden Stand unserer Kenntnisse fortzukommen, aber ihre harte Anwendung auf die Krankheitslehre, und die insbesondere in Frage kommende Pathologie des vegetativen Systems ohne ausreichende Begründung kann nur Schaden stiften, ebenso wie die damit in gewissem Zusammenhang stehende vorläufige Übertragung der für einzelne Krankheiten sicher gestellten Erfahrungen über Störungen der inneren Sekretion auf weite unerforschte Gebiete nicht methodisches Arbeiten, sondern ein Operieren mit Schlagworten darstellt, das unfruchtbar ist, weil es verdunkelt, statt zu erhellen, weil es die Forschung hemmt statt sie zu fördern.

2. Anatomie und Physiologie der sekretorischen Centren und Bahnen.

Die Absonderung des Drüsensekretes ist nicht als eine einfache Folge der veränderten Gefäßfülle anzusehen, sondern sie ist eine selbständige Leistung, die unter dem Einfluß bestimmter Nerven — sekretorischer Nerven — steht. Diese fundamentale Tatsache, die wir unseren Erörterungen vorausschicken, ist von Ludwig bewiesen worden. Ludwig fand zuerst an der Glandula submaxillaris des Hundes, daß eine Reizung der Chorda tympani die reichliche Absonderung eines an festen Bestandteilen verhältnismäßig armen Speichels bewirkt. Gleichzeitig damit bewirkt die Reizung der Chorda eine Erweiterung der Gefäße der Drüsen, eine Blutdrucksteigerung und einen vermehrten Durchlauf des Blutes; es

kennt zum Pulsieren der Venen, deren Blut viel heller rot erscheint als in der Norm. Daß aber diese Sekretion nicht einfach eine Folge des erhöhten Blutdrucks sei, bewies Ludwig schlagend damit, daß in dem Ausführungsgang der Speicheldrüsen ein Druck herrscht, der beinahe das Doppelte des Blutdrucks betragen kann. Noch andere Momente sind hier zu nennen: die Fortdauer der Sekretion nach Unterbindung aller an der Drüse führenden Gefäße u. a. m.; für uns besteht keine Notwendigkeit, die Beweise für den allgemein anerkannten Satz zu häufen.

Die Anregung zur Sekretion kann aber zur Glandula submaxillaris noch auf einem anderen Wege gelangen, auf dem des Sympathicus. Die Reizung dieses Nerven läßt aber ein von dem durch Reizung der Chorda tympani erzielten verschiedenes Sekret zutage treten; der dann von der Drüse gelieferte Speichel ist dickflüssig, zäh, reich an Schleim und den sonstigen spezifischen Bestandteilen; bei Sympathicusreizung verengen sich außerdem unter Abnahme des Blutdrucks die Gefäße, das in die Venen einströmende Blut ist tief dunkelrot.

Besondere Modifikationen der Reizungsintensität lassen erkennen, daß Chorda- und Sympathicuspeichel nicht spezifisch, sondern nur graduell voneinander verschieden sind, wie das Heidenhain gelehrt hat.

Heidenhain nimmt zur Erklärung dieser Verhältnisse folgendes an: er unterscheidet in der Chorda und im Sympathicus zwei Arten von Nervenfasern, die einen, welche der Absonderung des Wassers (und der Salze), die anderen, welche der Absonderung der organischen Bestandteile des Sekretes vorstehen, und er benennt diese als sekretorische und trophische Nervenfasern. Die Einwirkungen der letzteren äußert sich nach ihm darin, daß unter ihrem Einfluß in den Drüsenzellen köstliche organische Substanzen entstehen, die in das durch die sekretorischen Fasern gebildete Sekret übergehen; die Drüsen erleiden dabei die auch direkt eintretenden Veränderungen ihrer Struktur, indem an die Stelle der während der Ruhe der Zelle aufgestapelten hellen Zellkomplexe während der Reizung immer mehr dunkle, protoplasmatische Zellgruppen treten. Die Einwirkung der sekretorischen Fasern veranlaßt die Absonderung des Wassers und der Salze; und zwar nach dem Gesetze, daß mit steigender Stärke der Reizung sowohl der Wassergehalt als der Salzgehalt bis zu einem gewissen Maximum anwächst, aber der letztere schneller als der erstere, so daß der Gehalt des Sekretes an Salzen mit zunehmender Reizung steigt. „Welche Art von Triebkräften die sekretorischen Fasern auslösen, um so erhebliche Wassermassen in Bewegung zu setzen, darüber fehlt jede begründete Vermutung, wie vielmehr über die Gründe, weshalb das schneller abgesonderte Wasser mehr Salze in Lösung hält, als das langsamer sezernierte“ (Heidenhain). Wir dürfen uns auf weiter hierher gehörige Fragen,

da sie nicht direkt unser Thema berühren, nicht weiter einlassen. Eine Bemerkung wollen wir nur noch anfügen. Die Ausdrücke „sekretorische“ und „trophische“ Fasern könnten leicht der Annahme Raum verschaffen, als hätten wir es hier mit zwei differenten Nervenkatégorien zu tun, und als wäre insbesondere für die Frage der trophischen Nerven, die uns sehr bald lebhaft interessieren wird, damit etwas entschieden. Dieser Anschauung muß widersprochen werden. Die beiden Nervenarten sind nicht prinzipiell verschieden, die „trophische“ Tätigkeit der einen weicht von der „sekretorischen“ der anderen nicht grundsätzlich ab, beide müssen, das lehren schon die wenigen oben angegebenen Daten, chemische Umsetzungen in der Drüse bewirken (Kopp).

Wir wenden uns, nachdem wir in dem vorhergehenden Abschnitt zunächst einmal uns der Tatsache erinnert haben, daß die Drüsentätigkeit überhaupt dem direkten Einfluß des Nervensystems untersteht, der Gruppe von Drüsen zu, die allein uns für unseren speziellen Zweck interessiert, den in der Haut gelegenen Schweiß- und Talgdrüsen, und untersuchen für diese Gruppe genauer, was über die Anatomie und Physiologie der sie innervierenden Bahnen und Centren bekannt ist.

Daß durch Reizung der Nerven Schweißsekretion eintritt, fiel zuerst Goltz bei Versuchen, die aus anderen Ursachen am Ischiadicus von Katzen angestellt wurden, auf. Da neben der Schweißsekretion starke Hyperämie auftrat, lag immer noch die Möglichkeit vor, daß es sich einfach um eine gesteigerte Transsudation aus dem Blut handle. Ostrowski hat zuerst die Unabhängigkeit der Schweißsekretion vom Blutkreislauf dadurch nachgewiesen, daß er nach Unterbindung der Aorta durch Reizung des Ischiadicus Schweißsekretion aus den unbehaarten Platen der Katze erhielt. Wenig später und unabhängig von ihm hat Luchsinger begonnen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, und ist später in wiederholten Publikationen auf sie zurückgekommen. Zunächst stellte er in Gemeinschaft mit Kendall fest, daß Reizung des Nervus ischiadicus oder der Nerven des Plex. brachial. bei Hunden und Katzen bisweilen Schweißsekretion bedinge, diese erschien schon, wenn die Temperatur der Platen noch im Sinken war. Damit war wiederum bewiesen, daß die Schweißsekretion nicht die Folge der Hyperämie sein kann. Die Verfasser stellten weiterhin fest, daß der Versuch auch nach Unterbindung der Art. cranialis resp. der Aorta gelingt und ferner noch während einer Viertelstunde nach Amputation des Beines. Auch die klinische Beobachtung lehrte die Unabhängigkeit des Schwitzens von der Hyperämie: „kalter Schweiß“ bei Blasen der Haut als Angstschweiß, Todeschweiß. Adamkiewicz (zitiert nach seinem Artikel „Schweiß“ in Eulenburgs Realencykl. XVIII S. 115) konnte sogar noch 45 Minuten nach dem Tode Schweißsekretion erhalten. Damit war der endgültige Beweis von der Unab-

hängigkeit der Schweißsekretion von Circulationsverhältnissen gebracht und ihre direkte Beziehung zu nervösen Vorgängen dargetan. Lushington hat dann weiter gezeigt, daß auch Durchschneidung des Ischiadicus die betreffende Hinterextremität des Tieres, auch wenn dasselbe in für das Schwitzen günstige Bedingungen gebracht wird, im Gegensatz zu der gesunden Pfote nicht schwitzt. Atropininjektion löst das Schwitzen bei Ischiadicusreiz ganz auf, ohne die dabei produzierten vasomotorischen Phänomene zu beeinflussen. Adamkiewicz glaubte gezeigt zu haben, daß die Reizung peripherischer motorischer Nervenstämmen der Extremitäten beim Menschen die Schweißdrüsen in gleicher Weise bei intaktem, wie bei unterbrochenem Blutkreislauf erregt. War damit das Bestehen wahrer Schweißnerven für die Tiere sowohl als für den Menschen entschieden, so trat nun die Frage nach dem Verlauf dieser Nerven in den Vordergrund. Adamkiewicz stellte dafür folgendes „Schema“ auf: „Der Nervenapparat der Schweißdrüsensekretion nimmt wahrscheinlich von der Oberfläche des Gehirns seinen Anfang. Die Nerven steigen durch die Medulla oblongata in das Rückenmark herab, hier treten sie mit Sekretionscentren in Verbindung, die durch das ganze Rückenmark zerstreut sind. Diese liegen in den Vorderhörnern der grauen Substanz an denselben Stellen wie die motorischen Ganglienzellen. Die Sekretionsfasern verlaufen durch die motorischen Nerven zu denselben Gebieten wie diese. Außer durch cerebrospinale Nerven werden die Schweißdrüsen durch sympathische Fasern versorgt.“

Dieses Schema bedarf an vielen Stellen noch sehr der Bestätigung. Gehen wir auf die einzelnen Punkte ein, unter Berücksichtigung experimenteller und pathologischer Erfahrungen:

Die Reizung der Großhirnrinde beim Tier ergab negative Resultate (Adamkiewicz und Vulpian). Adamkiewicz meint jedoch trotzdem der Großhirnrinde des Menschen und zwar ihren motorischen Teilen einen Einfluß auf die Absonderung des Schweißes zuschreiben zu sollen, indem er sich dabei auf folgende Beobachtungen stützt. Senator fand in einem Fall, in dem nach Apoplexie eine Bindeataxie und zeitweilige Krämpfe im linken Arm auftraten, eine auffällig starke, auf diesen Arm beschränkte Schweißsekretion. Die Sektion ergab einen Absceß an der entsprechenden Stelle der Hirnrinde. Adamkiewicz konnte einen ähnlichen Fall, der nicht zur Sektion kam, selbst beobachten. Weiter in diesem Sinne zu verwendende Beobachtungen sind die von Mickle, der halbseitiges Schwitzen des Gesichts bei progressiver Paralyse sah und ferner bei einem seiner Kranken linksseitige Krämpfe, Wärmesteigerung, Verengerung der linken Pupille und halbseitiges Gesichtsschwitzen beobachtete. Morselli fand Hyperhidrosis unilateralis dextra facialis in einem Fall von Gliom im vorderen Teil der linken Hemisphäre, außerdem bestanden Läsionen im Halsteil

des Sympathicus. Meschede beobachtete halbseitiges Schwitzen besonders des Gesichtes in einem Fall, wo die Sektion eine konzentrische Hyperostose des Schädeldachs und eine Atrophie eines Teiles der Centralwindungen ergab. Pandi beobachtete folgenden Fall: Bei einem 35jährigen Mann entstehen im Anschluß an ein Trauma Zuckungen im linken Arm und eine Facialislähmung, die zwar auch den oberen Facialis mitbetrifft, aber keinerlei elektrische Erregbarkeitsveränderungen aufweist; linke Papille etwas weiter als rechte, Reaktion normal, beiderseits Fußclonus und Steigerung der Patellarreflexe. Zeitweise Temperaturerhöhung bis auf 38,5. Seit drei Jahren besteht starkes Schwitzen der linken Gesichtshälfte, das immer mehr zunimmt, sonst keine vasomotorischen Störungen. Pandi nimmt als Ursache eine chronische Veränderung im motorischen Teil der rechten Hemisphäre an, die zugleich das Centrum des linken Arms und des ganzen linken Facialis betrifft, also ziemlich ausgedehnt ist. Die Affektion rührt von dem Trauma her.

Pandi macht darauf aufmerksam, daß das von Emminghaus beschriebene epileptische Gesichtsschwitzen ebenfalls einen corticalen Ursprung vermuten läßt. Nach ihm lokalisiert Koranyi auf Grund einer eigentümlichen Art von epileptischen Anfällen mit Schweiß- und Speichelsekretion das corticale Centrum der Schweißsekretion in die Nähe des Sprachencentrums. Auch Tauscher hat einen Fall von epileptischem Schwitzen erwähnt. Friedländer und Tauscher haben ferner eine Anzahl von Fällen beschrieben, in denen das halbseitige Schwitzen teils bei einer Anzahl von funktionellen Neurosen wie bei der Migräne, der Hysterie, dem Morbus Basedowii usw. eintritt, teils auch idiopathisch, als einziges wesentliches Krankheits-symptom zur Beobachtung kommt. In den letzteren Fällen wurde von ihnen und auch von anderen, wie besonders von Olivier bisweilen ein hereditäres Vorkommen des Symptoms gefunden, das in diesen und ähnlichen Fällen als ein Zeichen der Degeneration des betreffenden Individuums aufgefaßt wurde.

Auch bei Psychosen wurde das Halbschwitzen beobachtet. Der Einfluß der Suggestion auf das Schwitzen wurde von Pandi bei einer Hysterica, vorher schon von Adamkiewicz festgestellt. Daß gewisse Vorstellungen, besonders wenn sie von angestrebtem Affekt begleitet sind, zu Schweißausbrüchen führen, kann als eine Erfahrung des täglichen Lebens keinem Zweifel unterliegen.

Die im vorgehenden aufgeführten Erfahrungen lassen es als sicher gestellt erscheinen, daß das Großhirn einen Einfluß auf die Schweißsekretion haben kann. Damit ist freilich, ebenso wie bei den gleichen Verhältnissen des vasomotorischen Systems, noch nicht mit Sicherheit festgestellt, daß dieser Einfluß auch von einem bestimmten Centrum des Großhirns ausgeht. Dieser Punkt bedarf noch der Aufklärung.

Bezüglich des weiteren Verlaufs der Bahnen für die Schweißnerven weisen einige pathologische Erfahrungen darauf hin, daß diese sich an den Weg der motorischen Fasern halten. Wenigstens wurde in einer Anzahl von Hemiplegien übermäßiges Schwitzen auf der gelähmten Seite beobachtet. (Binger and Burg, Messadaglia e Lombroso, Chevalier, der sogar von *Hémiplégies sudorales* spricht, Richat, Raymond.) Einen neuen derartigen Fall hat S. G. A. Seeligmüller beschrieben. Hier bestand neben bleibender rechtsseitiger motorischer Lähmung bleibende Hypästhesie und überwiegende Schweißsekretion auf der gelähmten Seite. Seeligmüller nimmt eine große Blutung an, die ihren Sitz in der Nähe der großen Centralganglien der linken Hemisphäre und in dem hinteren Teil der inneren Kapsel hat, die bei den zum Teil bleibenden Störungen seitens der Motilität und Sensibilität wohl selbst in erheblicherem Grade lädiert ist. Auch Strümpell und Gowers fanden an der hemiplegischen Seite gelegentlich stärkeres Schwitzen. Parhon et Goldstein sahen bei Pilocarpininjektion stärkeres Schwitzen auf der hemiplegischen Seite.

Ob diese Bahn durch subcorticale Centren unterbrochen wird, ist sehr zweifelhaft. Nach Pandis Ansicht ist dies der Fall; er zitiert zu ihrer Stütze einen Fall von Kaposi, der bei einer Kranken gekreuztes halbseitiges Schwitzen beobachtete, indem die linke Gesichtshälfte und die rechte Körperhälfte schwitzten. Nach Pandis Ansicht lassen auch analoge Erfahrungen bezüglich des Vasomotorensystems erwarten, daß für die Schweißsekretion subcorticale Centren vorhanden sind.

Auf Grund experimenteller Untersuchungen glauben Nawrocki und Adamkiewicz ein gemeinsames Centrum für sämtliche Schweißnerven in der Medulla oblongata annehmen zu sollen. Adamkiewicz verfügt auch über eine Erfahrung am Menschen, die für das Vorhandensein eines solchen gemeinsamen Centrums spricht. In einem Falle, in dem allmählich unter Doppeltsehen sich Augenmuskellähmungen entwickelten, bestand auffallend profuses Schwitzen. Die Sektion bestätigte die *intra vitam* gestellte Diagnose einer Neubildung der Medulla oblongata. Es fand sich ein bohnengroßes Gliom am Boden des vierten Ventrikels in dessen mittlerem Teil.

Auch im Rückenmark scheinen Centren für die Schweißsekretion zu liegen. Nach Luchsinger befindet sich das Schweißcentrum für die Hinterextremitäten der Katze im unteren Teil des Dorsal- und im oberen Teil des Lendenmarks. Adamkiewicz kam auf Grund seiner Versuche zu ähnlichen Resultaten. Ein Centrum für die Schweißnerven der oberen Extremitäten wird im unteren Teil des Halsmarks angegeben.

An welcher Stelle des Querschnitts wie diese Centren zu suchen haben, ist ungewiß. Einige Erfahrungen am Menschen, u. a. das Vorkommen von Anhidrosis bei spinaler Kinderlähmung (Erb, Adamkiewicz, v. Leyden-Goldscheider) machen es einigermaßen

wahrscheinlich, daß wir die betreffenden Centren in der Nähe der motorischen Vorderhorncentren erwarten dürfen. Bloch nahm an, daß alle chronischen Rückenmarkskrankheiten, welche in das Gebiet der motorischen Funktion eingreifen, und zwar so, daß sie zu einer degenerativ-atrophischen Lähmung der Muskeln führen, gelegentlich auch Anomalien von seiten des Schweißdrüsenapparates aufweisen. In dieser Allgemeinheit ist die Blochsche Ansicht nicht aufrecht zu halten. Es gibt Rückenmarkskrankheiten, die nicht die graue Substanz betreffen und doch mit Störungen der Schweißsekretion einhergehen; so finden wir solche gelegentlich bei der Tabes. Man könnte hier wohl daran denken, daß in diesen Fällen degenerative Prozesse in den peripheren Nerven die Ursache der Schweißanomalien sind (Teuscher), doch ist das für die Fälle schwer annehmbar, wo es sich um halbseitiges Schwitzen handelt, wie es Gowers erwähnt. Oppenheim läßt es dahingestellt, wie weit solche Schweißle von einer begleitenden allgemeinen Nervosität bedingt sind.

Auch bei der multiplen Sklerose ist Hyperhidrosis einer Gesichtshälfte beobachtet worden, und Oppenheim hat bei dieser Krankheit abnorme Schweißsekretion der Extremität einer Seite verbunden mit einer Herabsetzung der Temperatur derselben gesehen.

Schließlich sei noch erwähnt, daß bei den Erkrankungen des Rückenmarks halbseitiges Schwitzen im Gesicht mit und ohne andere Störungen des Sympathicus nicht selten beobachtet wurde, sofern die Erkrankungen das Halsmark oder die beiden oberen Segmente des Brustmarks betrafen und auf der einen oder anderen Seite stärker überwogen. Es handelt sich bei diesen Fällen immer um Affektion der Sympathicusursprünge im Rückenmark, und die Frage der genaueren Lokalisation der betreffenden Centren und Bahnen deckt sich mit der von uns schon erörterten des spinalen Sympathicusursprungs. Hier sei nur so viel erwähnt, daß Kocher auf Grund seiner reichen Erfahrungen über die Verletzungen des Halsmarks zu der Anschauung gekommen ist, daß die oculo-pupillären Fasern des Halsympathicus das Halsmark in seiner ganzen Länge von oben nach unten durchsetzen und es mit der ersten Dorsalwurzel verlassen; analoges wird für die sekretorischen Fasern des Nerven anzunehmen sein. Schlesinger fand in einem Fall von centralem Tuberkel im ersten bis vierten Dorsalsegment, wo Hyperhidrosis der rechten Gesichtshälfte bestanden hatte, bei der Sektion im unteren Halsmark eine deutliche Degeneration in der seitlichen Grenzschicht im stumpfen Winkel zwischen Vorder- und Hinterhorn. Man könnte wohl auch diese Beobachtung zur Bestimmung des Verlaufs der sekretorischen Fasern des Sympathicus verwerten.

In einer späteren Arbeit hat Schlesinger die pathologischen Erfahrungen über die spinalen Schweißbahnen und Centren zusammengestellt und daraus eine Anzahl von Schläüssen gezogen. Danach ver-

bringen die spinalen Ästeile der Schweißnerven die Schweißdrüsen bestimmter Hautterritorien anscheinend in gesetzmäßiger Weise. Diese Versorgungsgebiete umfassen umfangreiche Abschnitte der Hautoberfläche, die sich mehrfach ähnlich aber weniger scharf begrenzen, wie die segmentalen Sensibilitätsgebiete der Haut. Als „spinale Schweißterritorien erster Ordnung“ sind zu betrachten je eine Gesichtshälfte, je eine obere und untere Extremität, und je eine obere Rumpfhälfte, Hals-, Nacken-, Kopfhälfte. Die spinale Anordnung der Schweißnerven läßt sehr nahe Beziehungen zur spinalen Anordnung der sensiblen Nerven erkennen. Oft schwirrt nicht das ganze Schweißterritorium zu gleicher Zeit, sondern die Exsudation betrifft zunächst wenigstens nur einen Abschnitt des Territoriums. Es scheint, als ob die Nerven für die Gebiete des Gesichts, des Kopfes, Halses, Nackens, der oberen Rumpfhälfte und der oberen Extremitäten nahe beieinander im Rückenmark liegen. Die Fasern für die Gesichtshaut scheinen durch den Ramus communicans des zweiten, vielleicht auch des dritten Dorsals in den Grenzstrang des Sympathicus einzutreten, die anderen beiden Centren liegen wahrscheinlich in der Nähe des Gesichtscentrums im oberen Dorsalmark. Über den Verlauf und die Lage der Schweißfasern im Rückenmark ist nichts Sicheres bekannt; die für das Gesicht ziehen in der Nähe der vasomotorischen Leitungsbahn, aber fallen nicht ganz in ihr Gebiet. Schlesinger betont selbst die Unsicherheit seiner Schlüsse, die sich aus der geringen Zahl exakt beobachteter Fälle herleitet. Besonders zweifelhaft erscheinen mir die engen Beziehungen in der Anordnung der sudoralen und sensiblen Ausbreitungsgebiete, die Schlesinger annimmt.

Wie die Schweißnerven von den Centralorganen aus weiter nach der Peripherie verlaufen, darüber bestanden zunächst zwei Anschauungen unter den Physiologen. Die einen (Lachinger, Nawrocki) waren auf Grund ihrer Experimente zu der Ansicht gekommen, daß die Schweißnerven sämtlich durch die Rami communicantes in die Bahn des Sympathicus übergeführt würden, während andere (Vulpian, Adamkiewicz) sich dahin aussprachen, daß ein mehr oder minder großer Teil der Fasern direkt vom Rückenmark in die cerebrospinalen Nerven eingeht. Die neuesten und umfassendsten Untersuchungen in dieser Frage stammen von Langley. Er verneint für seine Untersuchungen entschieden die Annahme, daß es Schweißnerven gibt, die direkt, ohne den Sympathicus zu berühren, zu cerebrospinalen Nerven ziehen. Langley stellte weiter fest, daß die Schweißnerven für die Hinterfüße der Katze zum größten Teil aus dem ersten und zweiten Lendenerven, zum geringeren Teil aus dem dritten Lendenerven und dem zwölften Dorsalnerven stammen. Für die Vorderfüße fand er, daß die Schweißnerven im vierten bis neunten Dorsalnerven das Rückenmark verlassen, von dort aus ziehen sie alle, wie schon Nawrocki zeigte,

zum Ganglion stellatum. Auch hier fand Langley keine direkten spinalen Schweißfasern. Im weiteren Verlauf liegen sie bei der Katze im Nervus ischiadicus resp. im Nervus ulnaris und medianus. Am Kopf scheinen sie sich wenigstens bei manchen Tieren im wesentlichen dem Trigeminas anzuschließen. Interessant ist die von Levy-Dorn gefundene Tatsache, daß schließlich die Schweißnervenzusammenhänge von den motorischen Fasern sich zum größten Teil trennen, so daß er im Nervus plantaris internus der Katze einen fast reinen, von motorischen Fasern freien Schweißnerven fand.

Beim Menschen hat Adankiewicz, wie schon erwähnt, durch elektrische Reizung des Hüftnerven bei gleichzeitiger Kompression der Arteria cruralis Schweißsekretion hervorrufen können. Doch haben weitere Erfahrungen gezeigt, daß die Verhältnisse beim Menschen keineswegs ganz einfach liegen. Besonders studiert sind die Bedingungen der Schweißsekretion im Gesicht, die man als Ausfluß dreier verschiedener Gruppen peripherer Nervenerkrankung hat auftreten sehen: erstens bei Erkrankungen des peripheren Facialis, zweitens bei solchen des Trigemini und drittens bei solchen des Halsteils des Sympathicus.

Nawrocki behauptete zuerst, daß die Gesichtshaut bei Facialislähmungen ein pergamentartiges, trockenes Aussehen habe, und Strauß und Bloch fanden, daß mit dem Eintritt von Atrophie im Facialisgebiet auch das Schwitzvermögen des Gesichts verloren gehe. „Il existe une parallèle frappante entre la réaction électrique et la réaction sudorale du nerf facial“. Spätere Beobachtungen erwiesen, daß die Sache doch nicht so klar liegt. Windscheid fand in einem Fall von frischer Gesichtslähmung und Entartungsreaktion eine Hyperhidrosis in der gelähmten Gesichtshälfte; unter elektrischer Behandlung verschwand mit der Gesichtslähmung die Hyperhidrosis. Ähnlich war es in einem zweiten Fall, während in einem dritten, wo sich nur noch gewisse Reizzustände im Facialisgebiet als Residuen einer früheren Lähmung fanden, ebenfalls Hyperhidrosis bestand. Windscheid zitiert zwei ähnliche Fälle von Nitzelschandel und Schulz. Bernhardt hat dieser Frage seine Aufmerksamkeit zugewendet, er machte bei Personen, die an einseitiger rheumatischer Gesichtslähmung litten, Pilocarpininjektionen, kam aber nicht zu unzweideutigen Resultaten. Eine Erklärung der bestehenden Verschiedenheiten erscheint zurzeit noch nicht möglich, was auch Remaks Ansicht ist. Köster hat dann an einem großen Material erneut Untersuchungen angestellt. Bei 38 untersuchten Kranken fand er 23 mal eine starke Herabsetzung des Schweißes auf der gelähmten Gesichtshälfte, 6 mal eine starke Steigerung der Schweißsekretion. Die Schweißfasern gesellen sich zum Facialis schon an der Basis und begleiten ihn dann in seinem ganzen Verlauf. Schweißstörung und Störung der elektrischen Erregbarkeit

sind unabhängig voneinander. Die Schweißsekretion bildet sich oft rasch zurück, was Köster auf das vikariierende Eintreten der im Trigemini verlaufenden Schweißfasern bezieht, werauf auch die seltenen Fälle von Facialislähmung ohne Störung der Schweißsekretion zu beziehen sind. Es mag in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden, daß noch eine zweite Störung sekretorischer Tätigkeit bei Facialislähmung beobachtet wurde, nämlich die Sistierung der Tränensekretion auf der gelähmten Seite und zwar dann, wenn der Krankheitsprozeß in der Nähe des Ganglion geniculatum sitzt (Goldzieher, Jendrassik, Köster). Köster hat auch eine in einer Anzahl von Fällen eintretende Störung der Sekretion der Mundspeicheldrüsen beschrieben.

Daß der Trigemini auf die Schweißsekretion beim Menschen einen Einfluß hat, dafür liegen nur spärliche Erfahrungen vor. Im Gegensatz zu dem häufigen Vorkommen von stärkerer Speichel- und Tränensekretion wird über Hyperhidrosis bei Trigemini neuralgie nur selten berichtet (Dehrmann und Latour nach Raymond). Ollivier beobachtete eine auf den Oberkieferast des Quintus beschränkte Neuralgie mit gleichzeitiger Hyperhidrosis unilabialis faciei, die in der betreffenden Familie erblich war.

Schon Romberg hatte übrigens bemerkt, daß eine aus der Stirnhaut neugebildete Nase nicht eher schwitzte, als bis ihre sensible Innervation hergestellt war. Windscheid zitiert einen Fall von Schuh, der gesehen hat, daß nach Resektion des Nervus frontalis der betreffende Gesichtsteil fortwährend schwitzte. Diese Erfahrungen sprechen also zugunsten der Annahme, daß der Trigemini auf die Schweißsekretion des Gesichtes von Einfluß ist (vielleicht aber nur durch reflektorische Einwirkung).

Endlich werden häufige Störungen der Schweißsekretion im Gesicht nach Affektion des Hals sympathicus beobachtet. Doch auch hier sind die Verhältnisse kompliziert, insofern, als einmal die Anhidrosis, die auf eine Lähmung des Hals sympathicus zu beziehen ist, in der Tat mit anderen Lähmungssymptomen des Nerven, also Pupillen- und Lidspaltenverengung und Gefäßerweiterung vereint gefunden wurde, während ein andermal neben der Anhidrosis Refluxsymptome von seiten des Nerven vorlagen. Und ganz analog findet sich dann auch Hyperhidrosis einmal mit Reiz-, das andere Mal mit Lähmungserscheinungen vergesellschaftet. Wir gehen auf die Einzelfälle hier nicht ein, verweisen vielmehr in dieser Beziehung auf die neueren bisher gehörigen Arbeiten (Möbins, Friedländer, Raymond, Pandi, Jacobsohn, Seeligmüller). Auch bei gewissen Tieren (Pferd, Esel) hat, wie der alte Dupuyrouche Versuch lehrt, die Durchschneidung des Hals sympathicus neben der Hyperämie stets Schwillenausbruch zur Folge. Wir sind bisher nicht in der Lage, zu einer eindeutigen Auffassung der anscheinend

oft widersprechenden Verhältnisse zu gelangen, es sind mannigfache Erklärungsversuche unternommen worden, man hat das Bestehen schweißhemmender Fasern annehmen zu sollen geglaubt, man hat eine gleichzeitig bestehende Lähmung der einen und Reizung der anderen Fasern supponiert. Nixati hat versucht, die Verschiedenheiten in den einzelnen Fällen als verschiedene Stadien eines Prozesses aufzufassen, doch ist eine Einigung bisher nicht zustande gekommen, das wahrscheinlichste ist wohl, anzunehmen, daß ein Teil der Fasern gereizt, ein anderer gelähmt ist.

Über den sonstigen peripheren Verlauf der Schweißbahnen beim Menschen wissen wir nicht viel. Weir-Mitchell¹⁾ fand als Regel, daß bei völliger Durchschneidung des Nerven die Schweiß- und Talgsekretion im Innervationsgebiet aufhört, wahrscheinlich auf Grund der Atrophie der betreffenden Drüsen. Im Gegensatz dazu fand er in vielen Fällen von partieller Nervendurchtrennung eine übermäßig starke Schweißabsonderung, oft zusammen mit den Erscheinungen der glossy skin. Häufig war dann der Schweiß auch von besonders saurem, unangenehmem Geruch. Für Mitchell's Ansicht spricht, wie Remak hervorhebt, ein Fall von Dehis, der nach Resektion des Nerv. ulnaris in dessen Bezirk die Schweißsekretion aufhören sah, während Kölliker behauptet, daß, nachdem zu Anfang nach einer Nervendurchschneidung vermehrte Schweißsekretion bestanden hat, später diese sistiert. Jedenfalls wird Hyperhidrosis als Reizerscheinung bei traumatischer Nervendegeneration sicher beobachtet (Remak). Bei aus anderer Ursache bedingter Neuritis ist sie nicht gerade häufig, wie derselbe Autor bemerkt. Ich habe, wie viele andere, sie wiederholt bei Fällen traumatischer Neuritis beobachtet können und ganz im Einklang mit Weir-Mitchell's Beobachtungen am ehesten dort, wo auch glossy skin stark ausgesprochen war, während motorische und sensible Ausfallserscheinungen zurücktraten. Nach alledem wird man annehmen müssen, daß in zahlreichen peripheren Nerven Fasern verlaufen, die Schweißsekretion bedingen. Adamkiewicz stellt die Vermutung auf, daß sie meist mit den motorischen Nerven zur Peripherie gehen. Genaueres über ihren Verlauf ist aber noch nicht bekannt.

Damit dürfte das, was wir über die Anatomie der Centren und der Bahnen der Schweißnerven mitzuteilen haben, abgeschlossen sein.

Werden wir nun noch einen Blick auf die Bedingungen, unter denen die Nerven die Schweißsekretion anregen. Nach Landois wirken folgende Umstände für eine Zunahme des Schwitzens:

Erhöhte Temperatur der Umgebung; dagegen haben Kälte und Wärme der Haut über 60° die Schweißsekretion auf; die für das

¹⁾ A. a. O. S. 192.

Schwitzen günstigste Temperatur liegt zwischen 15° und 30°; zweitens wirkt günstig starker Wassergehalt des Blutes, besonders Aufnahme warmen Getränkes; drittens lebhafte Tätigkeit des Herzens und der Gefäße, durch die der Blutdruck in den Capillaren der Haut erhöht wird; hierher gehört auch die vermehrte Schweißbildung infolge erhöhter Muskeltätigkeit; viertens gewisse Gifte, insbesondere das Pilocarpin, Muscarin, Physostigmin, während andere, wie das Atropin, die Schweißsekretion beschränken. Es wurde schon darauf aufmerksam gemacht, daß das sonst im Gebiet des sympathischen Systems im engeren Sinne so wirksame Adrenalin ohne Effekt auf die Schweißdrüsen bleibt. Zu Schweißausbruch führt ferner erhöhte Blutvenosität.

Es handelt sich nun um die Beantwortung der Frage, werauf der Einfluß der genannten Momente beruht, ob sie auf die Centren direkt wirken und weiterhin eventuell auf welche unter ihnen, oder ob sie die peripheren Nerven beeinflussen, oder die Drüsenzsubstanz selbst.

Sicher wirkt ein großer Teil der genannten Ursachen direkt auf die Centren, so die Dyspnoe, die Landois zur Erklärung des Todeschweißes heranzieht und die Angst, die auch bei Tieren, namentlich bei Katzen, sehr leicht zu Schweißausbruch führt. Aber es ist nachgewiesen worden, daß auch die Wärme und selbst die Wasserinfusionen in die Vena jugularis direkt auf die nervösen Schweißcentren wirken; auch Gifte können das Centrum selbst erregen, wie das Eicrctoxin und das Ammonium acet. Ein anderer Teil der Gifte allerdings, wie besonders das Pilocarpin, Muscarin, Physostigmin wirken sicher zum größten Teil peripher. Das Pilocarpin wirkt auch noch nach Durchschneidung des Gehirnstamms an der Katzenpleks kräftig schweißtreibend. Es entspricht der peripheren Angriffsweise dieser Gifte, daß nach subcutaner Injektion eine lokale Schweißbildung dem allgemeinen Schweißausbruch vorangeht und nach kleinen Mengen auf die Umgebung der Injektionsstelle beschränkt bleiben kann (Strauß), und daß andererseits subcutane Injektion geringer Atropindosen das Schwitzvermögen nur lokal aufhebt.

Außer durch direkte Reize kann das Schweißcentrum auch reflektorisch erregt werden. Eine solche Erregung und zwar mittels elektrischen Stromes kann experimentell demonstriert werden (Luchsinger, Adamkiewicz); auch die Wärme kann von den sensiblen Nervenendigungen aus reflektorisch das Centrum erregen. Eine große Anzahl pathologischer Erfahrungen beim Menschen beweist ebenfalls die reflektorische Entstehung des Schwitzens. Cl. Bernard machte an sich selbst die Beobachtung, daß wenn er Schokolade auf seine Zunge brachte, sofort Schwitzen des Gesichtes eintrat. Landois teilt ebenfalls von sich selbst mit, daß kalter Schweiß auf seiner Stirn hervortritt, sobald er mit scharfem Eisig die Mundschleimhaut reizt.

In einem Fall von Raymond begann der Kranke auf der rechten Gesichtseite zu schwitzen, sobald er anfang zu kauen, gleiches berichtet Fuchs. Bei Parotitiden hat man häufig Schwitzen beobachtet, das jedenfalls oft auch einen reflektorischen Ursprung hat. Schuster stellte vor kurzem einen derartigen Fall vor, bei dem auch lange vorangegangener Parotitis sobald Patient zu essen beginnt ein vom Ohr zum Mund sich erstreckender 3 cm breiter scharf abgegrenzter Streifen äußerst ergiebig zu schwitzen beginnt, besonders lebhaft beim Essen saurer Dinge.

Rechtere w nimmt an, daß auch das Schwitzen bei Muskelarbeit zum Teil reflektorisch bedingt ist.

Die Schweißsekretion tritt nach Adamkiewicz stets sowohl im Gebiet des gereizten Nerven als auch im entsprechenden Gebiet der anderen Seite ein. Er hat die Schweißsekretion deshalb als „bilateral-symmetrische Funktion“ bezeichnet.

Über den näheren Modus, wie die Nerven auf die Sekretion des Schweißes durch die Schweißdrüsen wirken, ist nichts bekannt. Es ist wahrscheinlich, daß die glatten Muskelfasern, die wir in den größeren Schweißdrüsen finden und zu denen Nervenfasern gehen, für die Entleerung des Sekrets von Wichtigkeit sind. Daß dieser Modus jedoch nicht überall eingehalten wird, geht nach Levy-Dorn daraus hervor, daß durch Parästhesien der Nerven reichliches Schwitzen lange Zeit hintereinander hervorgerufen werden kann, während durch Einwirkung der glatten Muskelfasern nur eine stoßweise Entleerung erfolgen könnte.

Wir sahen zu Anfang unserer Betrachtungen, daß das Schwitzen unabhängig von der Blutcirculation ist. Über dieser Tatsache dürfen wir jedoch eine weitere nicht vergessen, daß die Schweißsekretion doch meist in Begleitung vasomotorischer Erscheinungen verläuft. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich dabei um eine Gefäßerweiterung, also um Reizung vasodilatatorischer oder Lähmung vasoconstrictorischer Fasern, das erstere ist wohl wahrscheinlicher. Seltener findet sich eine Gefäßverengung, wie bei dem kalten Schweiß, der die Angst begleiten kann. Es treten also neben den Sekretionsnerven meist auch Gefäßnerven in Tätigkeit.

Übrigens gilt die Tatsache des gleichzeitigen Vorhandenseins einer Hyperämie auch für andere Sekretionsorgänge, ebenso wie auch für noch weitere Funktionen im tierischen Körper, z. B. die Muskel-tätigkeit. Jedenfalls wird es gut sein, sich diese Koinzidenz der Erscheinungen für die Betrachtung und Erklärung klinischer Tatsachen zu merken und sich gleichzeitig zu erinnern, daß ihrer Lage nach vasomotorische und schweißsekretorische Centren und Bahnen sehr ähnliche Verhältnisse darbieten.

Über eine zweite Art von Drüsen, die sich in der Haut finden,

die Haarbalg- und Talgdrüsen, die den Hauttalg sezernieren, braucht hier nichts weiteres gesagt zu werden. Eine Abhängigkeit dieser Sekretion von nervösen Einflüssen ist höchst wahrscheinlich, und es fand sich auch, daß sie bisweilen nach Lähmung peripherer Nerven zessierte. Ochanoviz bemerkte, daß nach Durchschneidung des Halsympathicus das Fell an der Ohrmuschel schon nach einigen Tagen einen auffallenden Glanz hat und die Haut fettig erscheint; es handelt sich offenbar um gesteigerte Talgdrüsenabsonderung als Folge der Sympathicusdurchschneidung. Weitere Erfahrungen liegen nicht vor, und die ganze Frage ist auch von untergeordneter Wichtigkeit.

Wenn wir bei den Erörterungen über die anatomischen und physiologischen Verhältnisse der vasomotorischen Centren und Bahnen schon auf eine große Zahl noch unsicherer und nicht genügend klar gestellter Verhältnisse gestoßen sind, so werden die Schwierigkeiten noch um vieles erheblicher, wenn wir versuchen, uns über die Rolle zu unterrichten, die das Nervensystem bei der Ernährung der Gewebe zu spielen berufen ist.

3. Die trophischen Funktionen des Nervensystems.

Wir haben zunächst die Frage zu beantworten, ob überhaupt ein solcher Einfluß des Nervensystems nachweisbar ist, oder, wenn wir die Fragestellung präziser gestalten wollen, wir haben uns zu fragen, kommen in irgendeinem Gewebe des menschlichen Körpers nutritive Störungen vor, die wir als in direkter Abhängigkeit von bestimmten Störungen irgendeines Teiles des peripherischen oder centralen Nervensystems stehend anzusehen haben? Es gibt ja zweifellos, das leuchtet ohne weiteres ein, eine große Anzahl nutritiver oder „trophischer“ Störungen, die sich in völliger Unabhängigkeit vom Nervensystem entwickeln. Hierher rechnet die ganze große Gruppe der unmittelbar durch Vermittlung des Gefäßapparats bedingten Veränderungen. Wenn die Art. femoralis z. B. vollständig durch ein Gummiseil verschlossen ist, und somit dem Bein kein Nährmaterial zugeführt werden kann, so muß dieses natürlich zugrunde gehen. Hierher rechnen die Gewebsveränderungen durch lokale äußere Einwirkungen, die Zermalmung des Gewebes durch ein äußeres Trauma, seine Zerstörung durch Verbrennen oder Erfrieren. Hierher gehören ferner auch die Schädigungen, die die Bakterien auf die Ernährung der Gewebe direkt oder durch Produktion von Giften auszuüben vermögen.

Es hat nun namentlich in früherer Zeit nicht an solchen Stimmen gefehlt, die jede Ernährungsstörung auf die eine oder die andere der genannten Bedingungen zurückführen wollten, und einen direkten Einfluß

des Nervensystems auf die Ernährung der Gewebe überhaupt leugneten. Die klinisch und experimentell festgestellten trophischen Veränderungen, die sich bei Erkrankung des Nervensystems vorfinden, suchten diese Forscher in mannigfacher Weise zu erklären. So nahmen ein, weder an, daß es sich um eine Entzündung der Gewebe handle, die entlang dem Nerven fortkriechend, schließlich auch das Organ ergreift, in dem der Nerv endigt. Eine zweite Theorie wollte die bei Nervenkrankheiten beobachteten Schädigungen als durch die Inaktivität bedingt auffassen, die ihrerseits eine Folge der Nervenkrankheit sei, und eine dritte Theorie endlich zog zur Erklärung die Tatsache herbei, daß durch das Nervenleiden eine Anästhesie der betreffenden Teile und dadurch wieder ein ungenügender Schutz derselben gegen äußere Schädlichkeiten herbeigeführt sei.

Dagegenüber waren es besonders die Erfahrungen, die man bei der Erkrankung der peripheren motorischen Nerven machte, die am eine direkte Abhängigkeit der Ernährung gewisser Gewebe vom Nervensystem denken ließen. Die frappante Tatsache, daß nach Durchschneidung eines motorischen Nerven der von ihm innervierte Muskel sehr rasch einer schweren, irreparablen und sich durch ganz besondere Kriterien auszeichnenden Atrophie anheimfiel, war von jeher die Hauptstütze dieser Ansicht, und ist es auch heute noch. In diesem Falle konnte nicht die Rede davon sein, daß die Inaktivität die Atrophie verschuldet hätte, denn dazu trat sie viel zu rasch ein und war von wirklichen Inaktivitätsatrophien durch mannigfache Besonderheiten leicht unterscheidbar. Daß es sich nicht um eine Fortsetzung der Erkrankung des Nerven auf das Muskelgewebe handeln konnte, war schon auf Grund der einfachen anatomischen Untersuchung festzustellen. Von einer Einwirkung besonderer äußerer Schädlichkeiten konnte nicht die Rede sein. So schien die Annahme eines direkten trophischen Einflusses des Nervensystems auf die Muskulatur gesichert.

Auch für andere Gewebe des Körpers schienen mannigfache Erfahrungen einen solchen Einfluß plausibel zu machen.

Nun kam die Frage an die Reihe, auf welche Weise dieser trophische Einfluß ausgeübt wird, welche Wege und Bahnen ihm offen stehen. Darüber sind eine Anzahl Theorien veröffentlicht worden, die wir im folgenden kurz Revue passieren lassen wollen.

Wir wenden uns da zunächst den vasomotorischen Theorien zu, d. h. denjenigen, die versuchen, die Gewebeveränderungen, die in Abhängigkeit von Störungen des Nervensystems stehen, durch vasomotorische Einflüsse zu erklären.

Es ist eine Theorie der neuroparalytischen Hyperämie und eine der neuroirritatorischen Anämie als einer Ursache der trophischen Störungen aufgestellt worden. Die erstere rührt von

Schiff, die zweite von Brown-Séquard her. Schiff schildert uns den Vorgang folgendermaßen: Die *Hyperémie névro-paralytique*, die durch Durchschneidung der Vasomotoren bedingt wird und von der aktiven Gefäßdilatation durch Vasodilatatorexzitation scharf zu unterscheiden ist, verursacht konstant Temperaturerhöhung, die sich durch die größere Menge des in den Geweben kreisenden Blutes erklärt. Sehr häufig kommen dazu Ernährungsstörungen, die Schiff zwar nicht in allen Geweben, aber doch in sehr vielen, in den Lungen, den Knochen, dem Bindegewebe, der Cornea, dem Penis und vor allem in der Magenschleimhaut nachweisen konnte. Nie aber entstehen diese nutritiven Störungen völlig spontan, sondern es bedarf zu ihrem Zustandekommen immer eines mechanischen, lokalen Reizes, der allerdings relativ sehr gering zu sein braucht, viel geringer als in Organen, in denen keine neuroparalytische Hyperämie besteht. Die resultierende Entzündung, durch die die nutritiven Veränderungen repräsentiert sind, ist ihrem Wesen nach nicht von anderen Entzündungen unterschieden, nur die Leichtigkeit ihrer Entstehung macht ihr Charakteristischem aus.

Die Frage, wie die neuroparalytische Hyperämie auf die Ernährung der Gewebe wirkt, ist vielfach diskutiert worden. Zur Herstellung der Hyperämie hat man sich meist der Durchschneidung des Hals-sympathicus bedient, man hat die Beobachtungen teils an der Hornhaut und teils am Ohr des Kaninchens vorgenommen. Man hat nun in diesen Teilen durch irgendwelche Mittel eine Entzündung produziert und hat untersucht, ob sie anders verläuft, als unter normalen Bedingungen. Die Resultate waren nicht übereinstimmend. Virchow fand nach Läsion der Hornhäute mit glühenden Nadeln keine bedeutenden Unterschiede. Snellen (nach Samuel) fand eine schnellere Vernetzung auf der Seite der Sympathicusdurchschneidung, dabei ergab sich ihm aber doch im ganzen, daß die Durchschneidung der Vasomotoren den Entzündungsprozeß einigermaßen befördert. Weitere Beiträge zu dieser Frage sind von Sinitzin, Seuffleben, Eckard, Danilewski geliefert worden; auch der letztere fand, ebenso wie auch Sinitzin, einen wohlthätigen Einfluß des erhöhten Blutzufusses im Sinne einer rascheren Heilung, aber die hyperämischen Gewebe sind weit weniger instand, äußeren Reizen Widerstand zu leisten. In späterer Zeit sind dann hiesher gehörige Versuche von Samuel und Künzel angestellt worden. Samuel macht gegen die früheren Untersucher den Einwand, daß sie immer zum Vergleich sich der angeblich intakten anderen Seite desselben Tieres bedient hätten. Diese sei aber gar nicht intakt, sondern zeige einen gewissen Grad von Anämie, der durch die Hyperämie der operierten Seite notwendig bedingt sei. Die Anämie sei nachweisbar durch den meßbaren Temperaturabfall der nicht operierten Seite. Um brauchbare Vergleichsresultate zu

erhalten, müsse man daher gesunde Tiere nehmen, die genau die gleiche Konstitution wie die operierten Tiere haben und unter ganz gleichen Bedingungen gehalten werden. Samuel produzierte eine Entzündung, indem er das Ohr des Kaninchens auf drei Minuten mit Wasser von 54°C verbrühte. Er fand, daß bei der genau gleichen Entzündungsursache durch die Lähmung des Sympathicus die kongestiven und exsudativen Entzündungserscheinungen vermehrt und verstärkt werden. Die Fälle verlaufen günstig, aber nicht etwa günstiger wie die gewöhnlichen Entzündungsfälle ohne Sympathicuslähmung. Im Gegenteil verlaufen die letzteren rascher und milder heftig. Ausdrücklich muß aber hervorgehoben werden, und das ist augenblicklich für uns das wichtigste, daß die Neigung zur Entzündung durch die Lähmung des Sympathicus nicht erhöht wird. Geringere Temperaturgrade, die eine Entzündung bei gesunden Tieren noch nicht zu erzeugen vermögen, rufen eine solche auch bei operierten Tieren nicht hervor. Ebenso wenig vermag andererseits der erhöhte Blutfluß es zu verhindern, daß bei nur um wenige Grade stärkerer Verbrühung ein Ausgang in Gangrän eintritt. Daß auch eine monatelang andauernde Hyperämie ohne Einfluß auf die Ernährung der Gewebe ist, haben Versuche von Ollier und Cl. Bernard gezeigt. Die Versuche von Samuel sind weiter von Bunzel wiederholt worden und haben diesem ähnliche Resultate ergeben. Er hat sie insofern noch modifiziert, als er die Verbrühung in einigen Fällen erst 10–14 Tage nach der Sympathicusdurchschneidung vornahm. Er fand, daß dann die Erscheinungen viel schwerer verliefen, und führt das darauf zurück, daß durch die Sympathicusdurchschneidung dauernde Veränderungen der Ernährung der Gewebe einschließlich der Gefäßwände hervorgebracht würden. Wir haben auf diesen Punkt später noch einzugehen.

Auch von klinischer Seite ist gegen die in Rede stehende Theorie viel eingewendet worden und mit Recht. Nach Charcots¹⁾ Angaben hat Perroud eine Anzahl von Fällen neuroparalytischer Hyperämie beim Menschen gesammelt, wo trotz langen Bestandes der Hyperämie niemals trophische Störungen eintraten. Charcot hat ferner darauf aufmerksam gemacht, daß dort z. B., wo sich trophische Störungen an die Reizung peripherer Nerven anschließen, es sich regelmäßig nicht um eine Hyperämie, sondern bisweilen eher um das Gegenteil gehandelt habe, um eine Anämie und eine diese begleitende Temperaturherabsetzung; in noch zahlreicheren Fällen fehlte überhaupt jede Änderung des Blutgehaltes in dem von trophischen Störungen betroffenen Teil. Wenn somit die neuroparalytische Hyperämie durchaus nicht als notwendige oder überwiegend häufige Grundlage trophischer Störungen angesehen werden darf, so ist damit natürlich noch nicht

¹⁾ *Léçons sur les maladies du système nerveux. Oeuvres complètes* I p. 157.

gesagt, daß ihr auch jeder solche Störungen begünstigende Einfluß fehlt. Das lehren auch Samuels zitierte Experimente. Charrat hat dieses Moment sehr wohl berücksichtigt; er weist, indem er sich auf Versuche Cl. Bernards stützt, darauf hin, daß, während beim gesunden Tier durch Sympathicusdurchschneidung eben keine trophischen Veränderungen eintreten, sie beim kranken oder hungernden Tier sehr leicht erscheinen, und daß auch beim Menschen gelegentlich wohl ähnliche Bedingungen trophische Störungen veranlassen könnten, wie z. B. manche Fälle von Decubitus acutus auf diese Weise erklärt werden müßten. Auch Leloir räumt der Gefäßlähmung für manche Fälle eine prädisponierende Rolle ein. Es wird im Laufe der Besprechung der speziellen klinischen Krankheitsbilder diesem Verhältnis Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen.

Eine zweite von Brown-Séquard aufgestellte Theorie sucht auf entgegengesetztem Wege das Problem zu lösen. Leloir hat ihr demgemäß den Namen „Théorie de l'ischémie neuroirritative“ gegeben, doch hat Brown-Séquard, wie ich aus der Lektüre seines Werkes ersehe, keineswegs alle oder selbst auch nur einen überwiegenden Teil der trophischen Störungen auf diesem Wege zu erklären versucht, indem er scharf zwischen den Wirkungen unterscheidet, die durch die Erregung des nervösen trophischen Einflusses und diejenigen, die durch das Fehlen dieses Faktors entstehen, und indem er ferner diese verschiedenen Modalitäten auf direktem oder reflektorischem Wege einwirken läßt, kommt er dazu, den trophischen Störungen, die unter dem Einfluß des Nervensystems stehen, eine mannigfach verschiedene Genese zuzuschreiben. Nur eine der verschiedenen Möglichkeiten ist die, mit der wir es im Augenblick zu tun haben. Er führt nämlich die rasche Decubitusbildung, die man nach Frakturen oder Luxationen der Wirbelsäule zu beobachten Gelegenheit hat, darauf hauptsächlich zurück, daß eine dauernde Konstriktion der Blutgefäße eintritt. Dieser Auffassung ist nun freilich mit Recht entgegengehalten worden, daß sie mit klinischen und experimentellen Ergebnissen im Widerspruch steht. Die experimentell durch Reizung des Sympathicus produzierte Ischämie ist niemals imstande, Gangrän zu erzeugen, und wenn man hier den Einwurf machen kann, daß diese Ischämie stets eine kurz dauernde ist, so verliert dieser Einwurf einem Experimente O. Webers gegenüber seine Beweiskraft. Diesem gelang es nämlich, durch eine in kurzen Pausen sich wiederholende Reizung des Sympathicus, den Nerven für einige Zeit (mehr als 8 Tage lang) im Reizzustande zu erhalten und sogar eine Temperaturniedrigung von über 2° zu erzielen, ohne daß es zu einer Gangrän gekommen wäre. Es scheint demnach experimentell überhaupt nicht möglich zu sein, durch Reizung der Vasomotoren Anämien hervorzubringen, die eine Schädigung der Gewebernahrung bedingen, und es liegt dies offenbar an der von

uns schon erwähnten leichten Erschöpfbarkeit der Vasomotoren. Ob durch Reiz auf sensible Nerven reflektorisch eine solche Anämie erzeugt werden kann, ist auch sehr zweifelhaft, da auch dann der Anämie rasch eine Hyperämie zu folgen pflegt. Charcot fügt den erwähnten auf Experimente sich stützenden Gründen gegen die Ischämie neuro-irritative klinische hinzu, indem er darauf hinweist, daß z. B. bei gewissen hysterischen Affektionen langdauernde Ischämien ohne trophische Störung beobachtet werden. Die Fälle von Spontanangrän nach Anämie wollte er, in früherer Zeit wenigstens, nicht anerkennen und führte sie alle — sicher mit Unrecht — auf Veränderungen der Gefäßwände zurück.

Daß Vasodilatatorenlähmung eine Anämie nicht hervorbringen kann, haben wir bereits im vorigen Abschnitt gesehen.

Es ist überhaupt nicht schwer, jegliche vasomotorische Theorie, welcher Art sie auch immer sei, als ausschließlichen oder hauptsächlichen Erklärungsmodus der trophischen Störungen zurückzuweisen, denn wir haben, wenigstens bei sehr vielen und darunter den wichtigsten trophischen Störungen klinisch keine Anhaltspunkte dafür, daß dem Eintreten der trophischen Störungen eine Veränderung des Blutgehaltes der betreffenden Teile vorausgegangen sei. Das gilt zunächst für das ganze Gebiet der muskulären „neurotischen“ Atrophien, ebenso wie für die pathogenetisch gleichstehenden neurotischen Drüsenatrophien. Das gilt aber dann auch weiter für andere trophische Störungen, wie z. B. die tabischen Arthropathien und ähnliches mehr.

Demgegenüber bedarf es andererseits kaum noch des ausdrücklichen Hinweises, daß circulatorische Störungen irgendwelcher Art oft begünstigend auf das Eintreten und Fortschreiten nervös-trophischer Störungen wirken müssen. Denn daß jedes lebende Gewebe, wenn es nur einmal einer mangelhaften trophischen Innervation unterliegt, doppelt schwer geschädigt werden muß, wenn es dann auch noch seine nutritiven Stoffe einem schlecht gemischten oder in zu geringer Menge vorhandenen Nahrungsmittel entnehmen muß, liegt klar auf der Hand.

Der Gruppe der Theorien, die trophische Störungen auf vasomotorischem Wege erklären wollen, setzen wir die gegenüber, die sich eigener trophischer Nerven zu diesem Zweck bedient. Ihr Begründer und eifrigster Verfechter ist Samuel. Er hat sie in zahlreichen Publikationen zu allgemeiner Anerkennung zu bringen gesucht, doch hat er trotz aller Bemühungen ihr niemals allgemeine Geltung zu schaffen vermocht.

Ehe wir auf die von dem Autor zur Begründung seiner Theorie angeführten Tatsachen eingehen, die er in immer wieder aufs neue modifizierten experimentellen Versuchen und in fortwährender Sammlung klinischer Beobachtungen zusammenzubringen versuchte, sei

es gestattet, die Grundzüge seiner Theorie darzulegen, wie wir sie am Ende seines Buches „Die trophischen Nerven“, S. 349, finden:

Jedes Gewebe resp. jede Zelle ernährt sich durch Anziehung derjenigen Stoffe aus der Ernährungsflüssigkeit, die nach der Gesamtheit aller Verhältnisse ihr adäquat sind. Die Zelle wächst, erlangt ihre Reife und geht unter, nach Gesetzen, die in ihr selbst liegen. Ernährung, Wachstum und Neubildung, also die Erhaltung, Vergrößerung und Vermehrung der Zellen, die wesentlich nach diesen Gesetzen in der gesamten organischen Natur vor sich gehen, erfahren in der höher organisierten Tierwelt einen besonderen Antrieb zur Lebhaftigkeit durch den unermüdlichen Einfluß trophischer Nerven. Die Nichtexistenz trophischer Nerven im Pflanzenreich kann gegen ihre Existenz in der höheren Tierwelt natürlich gar nichts beweisen. Die Selbsternährungsfähigkeit ist auch den Tierzellen eigen, aber sie ist für sich nicht ausreichend, um den Nutritionsprozeß auf der Höhe zu erhalten, auf der er zur Durchführung der Aufgaben der Tierwelt stehen muß. Das Aufhören dieses trophischen Nerveninflusses bringt daher nicht die Ernährung und die auf sie begründeten Vorgänge des Wachstums und der Neubildung zum Stillstand, sondern setzt sie nur auf einen geringen Grad herab. Das Hauptresultat seiner Erwägungen faßt Samuel in den kurzen Satz zusammen: „Der Grund der Ernährung liegt in den Zellen, das Maß der Ernährung in den trophischen Nerven.“

Die Unterscheidung von anderen nervösen Einflüssen liegt hier, wie überall, nur in der Differenz der Angriffspunkte, die bei den trophischen Nerven die trophischen Centren der Zellen sind. Samuel kennt centrifugale trophische Nerven, aber außerdem auch noch centripetale trophische, Reflex vermittelnde Fasern. Die Reflexverhältnisse zu den übrigen Nerven, namentlich zu den vasomotorischen, sind noch unklar.

Bezüglich der Bahnen der trophischen Nerven läßt sich nur soviel angeben, daß in den peripheren Körperteilen diese Nerven meist mit den sensiblen zusammen vorkommen, aber ohne daß in allen sensiblen Nerven auch trophische Zweige vorhanden sein müßten. Als Ursprungsstätte der trophischen Nerven sind vor allem die Spinalganglien anzusehen; später hat Samuel diese Anschauung speziell in bezug auf die trophischen Centren der Muskeln in Übereinstimmung mit den allgemeinen Erfahrungen modifiziert.

Die trophischen Nerven sind seiner Ansicht nach sehr schwer reizbar. Es gehören starke und langdauernde Reize dazu, um irgendwie sichtbare Resultate zu erlangen. Dieser Eigentümlichkeit schiebt Samuel die Schuld dafür zu, daß dem experimentellen Nachweis ihrer Wirksamkeit so große Schwierigkeiten erwachsen, und daß andererseits klinisch einer sehr großen Anzahl von Nervenverletzungen

gegenüber nur selten trophische Störungen eintreten. Im allgemeinen aber hat, das hebt Samuel immer wieder hervor, die Lehre von den trophischen Nerven ihre Sicherstellung mehr durch die Beobachtung am Krankenbett als durch experimentelle Untersuchungen gefunden. Zu den dafür schon angegebenen Gründen kommt noch der hinzu, daß es experimentell kaum je gelingt, eine völlige Eravation der Teile herbeizuführen, vielmehr immer nur eine Innervationsstörung resultiert.

Was nun die verschiedenen Formen der durch Läsion der trophischen Nerven erzeugten Störungen anbetrifft, so hat Samuel die experimentell und klinisch bekannt gewordenen Tatsachen unter drei Gruppen untergebracht. Er unterscheidet: Neurotische Agnesien und Atrophien, neurotische Hypertrophien und neurotische Dystrophien. Bei jeder dieser drei Kategorien verurtheilt er aufs neue nachdrücklich, daß im Einzelfalle einerseits irgendeine andere Möglichkeit der Ernährungsstörung auszuschließen und andererseits die Existenz eines direkten und auf gesonderten Bahnen verlaufenden trophischen Einflusses unmittelbar zu erweisen ist.

Im folgenden wollen wir auf die Einzelheiten, die Samuel zur Begründung seiner Theorie zusammengetragen hat, näher eingehen. Wir beginnen mit seinen experimentellen Untersuchungen.

Seine ersten Versuche bezogen sich auf die Produktion von Entzündungen durch Nervenreize, und zwar begann er mit Experimenten an der Schwimmhaut des Frosches, ging dann aber bald zu Versuchen an Warmblütern über, da er die Berechtigung des Einwandes anerkannte, man könne von den Verhältnissen bei Kaltblütern nicht auf die von Warmblütern schließen. Er brachte durch eine elektrische Reizung des Ganglion Gasseri bei Karminthen, bei nicht nur erhaltenen, sondern gesteigerter Sensibilität einen Entzündungsprozeß in der Conjunctiva und Cornea des Auges hervor, der mehrere Tage anhält, um dann von selbst wieder zu verschwinden. Aber hier liegt offenbar die Annahme sehr nahe, daß diese Entzündung traumatisch entstanden sei, da das Tier sicher lebhafteste Abwehrversuche gemacht hat. Noch viel weniger beweisend sind Samuels Reizversuche am Nervus auriculo-temporalis und am Ichniadicus deren Folge jedesmal eine akute phlegmonöse Entzündung war, die wir nach unseren heutigen Kenntnissen auf Rechnung einer Infektion setzen müssen. Auch Reizung des Nerv. laryng. inf. brachte eine akute Entzündung hervor, ihre trophische Natur ist aber keineswegs auch nur wahrscheinlich. Das Rückenmark wurde in Breite eines Wirbels bloßgelegt und in die Wunde eine mit Crotonöl bestrichene Borste eingeführt; wenn diese auf die hinteren Wurzeln und die Spinalganglien zu liegen kam, so trat eine bedeutende Schwellung des Ober- und Unterschenkels mit starker Temperaturerhöhung ein. Es ist schwer begreiflich, warum Samuel diese Störungen als trophische und nicht als vasomotorische auffaßt.

Der Nachweis einer experimentellen neuroparalytischen Entzündung erscheint also noch nicht geliefert, und Samuel selbst hat sich in einer seiner späteren Publikationen über diesen Punkt auch sehr skeptisch ausgesprochen.

Ebenso wenig scheint das der Fall zu sein mit dem Nachweis der Abhängigkeit der Hauternährung von trophischen Nerven. Auch hierfür hat Samuel versucht, einen Beweis zu liefern, nachdem vorher schon Joseph durch seine bekannten Versuche (Durchschneidung der zweiten Cervicalwurzel mit angeblich nachfolgendem Haarausfall in bestimmten Distrikten des Hinterkopfes) einen strikten Beweis für dieses Abhängigkeitsverhältnis gegeben zu haben glaubte. Doch sind die von Joseph erhaltenen Störungen nicht konstant und stimmen auch miteinander nicht völlig überein, zudem konnte Behrend Josephs Angaben nicht bestätigen. Auch Samuel negiert die Beweiskraft der Josephschen Versuche, stützt sich dagegen auf eigene, wie er meint, völlig einwandfreie Versuchsergebnisse.

Er durchschneidet nämlich bei Tauben den Plexus axillaris und beobachtet den Einfluß dieser Operation auf das Wachstum der großen Flügel Federn, die sich physiologisch in bestimmten Zeiträumen regenerieren. Das Resultat war, daß die erste Federregeneration nur um wenig schwächer ausfiel als unter normalen Bedingungen, bei jeder späteren aber wurde, je länger desto mehr, das Wachstum unregelmäßig, im Hervorwachsen sowohl wie im Weiterwachsen und in der definitiven Ausbildung. Zu einer vollen Federlosigkeit aber kommt es nicht, und ein spontaner Federanfall findet nicht statt, „der bleibende Innervationsdefekt bringt einen progressiven Wachstumsdefekt zustande, es tritt eine allmähliche Verminderung der histogenetischen Energie ein, während ein gänzliches Erlöschen des Wachstums nicht beobachtet wird.“ Samuel hat in seinen Versuchsbedingungen sich bemüht, jede Möglichkeit einer Entstehung der Wachstumsstörung durch Anästhesie oder Nichtgebrauch auszuschließen, und er glaubt, daß ernsthaft nur die Frage zu erörtern sei, ob es sich nicht doch um eine vasomotorische Anämie mit progressiver Ernährungsstörung handle. Auch diese Annahme meint er zurückweisen zu müssen, einmal, weil sich keine Zeichen von Anämie in dem betreffenden Gehirn finden, im ersten Stadium sogar direkt eine Hyperämie in den Bildungsstätten der Federn vorhanden ist, ferner, weil er durch Gefäßunterbindung eine Störung des Federwachstums erhielt, die andere Züge aufwies, als die nach Nervendurchschneidung. Die immerhin bestehende Ähnlichkeit beider Prozesse beruhe darauf, daß Gefäßunterbindung sekundär auch die Nervenaktion heben müsse.

Doch auch dieser Versuch läßt der Kritik manchen Angriffspunkt, ja der Nachweis isolierter trophischer Fasern scheint überhaupt nicht versucht. Aber auch der Nachweis eines direkten Einflusses des Nerven-

systems auf die Ernährung der Haut und ihrer Anhänge ist durch ihn nicht über allen Zweifel erhaben klar gestellt. Es sind eine Anzahl komplexer Faktoren vorhanden, sensible, motorische und vasomotorische Funktionsstörungen, die in ihrem unübersichtbaren Zusammenwirken sehr wohl die durchaus nicht sehr sinfälligen Wachstumsveränderungen ergeben haben könnten — vorausgesetzt, daß Nachprüfungen überhaupt stets das hier geschilderte Ergebnis haben würden. Trendelenburg hat neuerdings ein ähnliches Experiment angestellt. Nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln des Flügels der Taube tritt auf der Seite der Durchschneidung folgende Erscheinung ein. Zur Zeit der Mauserung, die bei Tauben einmal im Jahre erfolgt, war zu bemerken, daß die Federn dort beträchtlich langsamer wuchsen als auf der gesunden Seite und zwar geschah dies keineswegs an besonders exponierten Stellen; nur bei einem älteren Tier war diese Differenz nicht zu bemerken. Der Autor denkt aber zum Unterschied von Samuel selbst nicht an die Existenz trophischer Nerven, sondern vermutet, daß auch bei den Tauben wie bei Säugern Vasodilatoren durch die hinteren Wurzeln verlaufen und deren Alteration die Störung des Wachstums erklärt.

In bezug auf den trophischen Einfluß der Nerven auf die Drüsen ist Samuel zu folgenden Schlüssen gekommen. Es gibt eine neurotische Drüsenatrophie, die besonders an der Submaxillardrüse und den Hoden studiert wurde. Neurotische Hodenatrophie hat Obolensky experimentell durch Durchschneidung des Nerv. spermatic. extern. bei Kaninchen und Hunden erzeugt. Die Verhältnisse an der Glandula submaxillaris beweisen nach Samuel, daß der trophische Einfluß auf gesonderten Bahnen verläuft. Es ist ja bekannt und von uns auch schon erwähnt, daß der durch Reizung der Chorda tympani erhaltene Speichel dünnflüssig ist und in großer Menge abgesondert wird, während die Reizung des Sympathicus nur spärliche Absonderung eines sehr dickflüssigen Speichels ergibt, der reich an spezifischen Bestandteilen ist. Nun soll ferner die Atrophie der Submaxillaris nach Sympathicusdurchschneidung erheblicher sein, als die nach Durchschneidung der Chorda tympani. Daraus glaubt Samuel schließen zu dürfen, daß der Sympathicus der trophische Nerv der Glandula submaxillaris ist.

Er beruft sich dabei auf Heidenhains Ansicht. Demgegenüber bemerkt Kopp mit Recht, daß die trophische Funktion von der Sekretionstätigkeit nicht zu trennen ist, und daß kein Grund besteht, die Nervenwirkungen des Sympathicus und der Chorda ihrer Art nach zu unterscheiden. Ebenso beweisen andere Experimente (Légnon: Exstirpation des obersten Halsganglions bei ganz jungen Hähnen mit konsekutiver Kammatrophie, Schiff: Durchschneidung des für die

Fleischklappen der Kehle bestimmten Nerven mit späterer Atrophie derselben) für die Existenz besonderer trophischer Nerven nicht.

Die Erfahrungen am Krankenbett haben es uns zur Gewißheit gemacht, daß bestimmte Teile des Nervensystems auf die Ernährung der Muskulatur von maßgebendem Einfluß sind. In diesem Punkte wird Samuel's Lehre heute keinem Widerspruch begegnet, daß nämlich weder Anämie noch direkte Fortleitung entzündlicher Prozesse vom Nerven auf den Muskel noch einfache Inaktivität die Atrophie der Muskulatur bei Erkrankungen des peripheren motorischen Abschnittes erklären. Desto mehr wird bestritten, was Samuel weiter behauptet, daß dieser trophische Einfluß auf besonderen Bahnen geleitet wird. Samuel stützt diese Behauptung zunächst dadurch zu stützen, daß er Fälle zitiert, wo bei Agensie des Rückenmarkes zugleich eine Agensie der Muskulatur im Bereich der fehlenden Rückenmarkssubstanz vorhanden war (E. H. Weber, Alessandrini, Barkow). Aber neuere Forschungen haben uns mit Tatsachen bekannt gemacht, die diesen Aufstellungen widersprechen, und lehren uns, daß im embryonalen Leben die Bildung der Muskulatur unabhängig von der des Rückenmarkes erfolgt. Es stimmt damit auch ganz gut überein, daß in den Fällen von Anelie (Fehlen der Gliedmaßen) erhebliche Veränderungen im Rückenmark fehlen (Meunier). Goldstein hat die vorliegenden experimentellen und pathologischen Tatsachen kritisch zusammengestellt und ist dabei zu folgendem Resultat gekommen. Die erste Entwicklung der Muskulatur geht ohne nervösen Einfluß nach dem Prinzip der Selbstdifferenzierung (Roux) vor sich. Auch Nussbaum hält es in seiner zusammenfassenden Darstellung der Beziehungen zwischen Nerv und Muskel für festgestellt, daß das Wachstum embryonaler Muskeln bis zu einem gewissen Grade unabhängig vom Nervensystem erfolgt. Später von einem noch nicht näher zu bestimmenden Zeitpunkt inmitten der embryonalen Periode ab entwickelt sich der Einfluß des Zentralnervensystems auf das Wachstum, die Erhaltung und die normale Funktion der Muskulatur in stetig zunehmendem Maße. Besonderen Wert aber legt Samuel auf die Tatsache, daß es, wenn auch selten, Fälle von Atrophie ohne Lähmung gibt und daß ferner z. B. bei der progressiven Bulbärparalyse die Muskelatrophie nicht immer gleichen Schritt mit der Lähmung hält. Man darf die Tatsache nicht bestreiten, wie das Kopp getan hat, aber trotzdem ist mit ihr nicht das zu beweisen, was Samuel mit ihr beweisen will, nämlich die Existenz gesonderter trophischer Nerven, sondern wie können, Goldscheiders Beispiel folgend, die Erklärung für sie auch auf anderem Wege finden. Dieser Autor nimmt für solche Fälle an, daß durch das Leitungshindernis nur so weit eine Abschwächung der nervösen Impulse herbeigeführt wird, daß die schwächeren, kontinuierlich unter der Schwelle des Bewußtseins ablaufenden Inner-

ventionsströme in erheblicher Weise beeinträchtigt sind, während bewußt aktive Impulse noch hindurchgehen. Daher das Mißverhältnis zwischen Lähmung und Atrophie.

Es würde zu weit führen, wenn wir auch auf das übrige klinische Material, das Samuel zur Stütze seiner Hypothese von den trophischen Nerven angehäuft hat, in allen Einzelheiten eingehen wollten. Nur einzelnes Wichtige wollen wir noch besprechen, insbesondere die Tatsachen, die von Samuel als vor allem beweisend für die Sonderexistenz der trophischen Nerven angesehen wurden. Zu den neurotischen Atrophien werden von ihm außer den schon genannten Muskel- und Drüsenatrophien noch die neurotischen Knochenatrophien gerechnet. Das wichtigste Beispiel dafür ist das Zurückbleiben des Knochenwachstums bei der spinalen Kinderlähmung. Auch das entgegengesetzte Verhalten, verstärktes Längenwachstum des Knochens bei spinaler Kinderlähmung, wurde von Seeligmüller beobachtet. Nach Samuel beweist die Tatsache, daß die Schwere der Muskelatrophie der der Knochenatrophie nicht immer parallel geht, eine getrennte Lage der Centren für die Ernährung der Knochen und der Muskeln und damit eine Sonderexistenz bestimmter trophischer Centren. Die ganze Frage der Abhängigkeit des Knochenwachstums von nervösen Einflüssen, die noch keineswegs geklärt ist, soll erst später ausführlicher behandelt werden. Selbst aber bei Annahme eines solchen Einflusses gelten bezüglich der Sonderexistenz bestimmter trophischer Centren die eben bei den Muskelatrophien geäußerten Bedenken in verstärktem Maße und werden noch durch die Erfahrungen bei der Poliomyelitis nicht beseitigt.

Die Ernährungsstörungen der Haut, die Samuel zur Stütze seiner Theorie angeführt hat, sind im allgemeinen in ihrer Deutung noch viel unsicherer, als die bisher erörterten. Mit besonderer Ausführlichkeit hat Samuel den Herpes zoster behandelt. Er behauptet, daß der Zoster und die Neuralgie durchaus nicht zwei verschiedene Phänomene eines identischen Leidens einer und derselben Nervenprimärfaser sein können; wäre das der Fall, so müßten sie in der Zeit ihres Auftretens, in der Intensität der Erscheinungen, in Fortdauer und Verschwinden einander decken, was nicht geschieht. Da nun aber Zoster und Neuralgie doch überaus häufig dieselben Nervengebiete befallen, muß man annehmen, daß sie die nebeneinander verlaufenden Erscheinungen der Affektion eines Nervenbündels sind, das sensible und trophische Nerven in sich birgt. Auch hier wieder liegt die Schwäche der Beweisführung Samuels auf der Hand. Er setzt voraus, daß Erkrankung einer Nervenfasern immer von denselben Erscheinungen gefolgt sein muß, und daß es nicht möglich ist, daß je nach Art des krankmachenden Reizes das eine Mal nur sensible, das andere Mal daneben auch trophische Störungen und schließlich ein drittes Mal gar die letzteren allein zur

Beobachtung kommen. Schließlich ist noch zu berücksichtigen, daß ein Teil der Symptome auf Störungen vasomotorischer Fasern beruhen kann.

Von allen Affektionen, die Samuel verwerdet hat, spricht keine so zugunsten seiner Ansicht von der Sonderexistenz trophischer Nerven, wie die *Hemiatrophia facialis progressiva*. Es ist das bekanntlich eine Krankheit, bei der sowohl die Haut nebst ihren Anhängen, wie die Knochen einer Seite des Gesichtes allmählich atrophieren. Diese Hemiatrophie beruht nach Samuel auf isolierter Lähmung trophischer Nervenfasern; hier sei die Aufgabe gelöst, die dem Experiment nicht gelungen ist, eine vollkommen reine Trophoneurose zu schaffen. Schon Romberg, von dem überhaupt der Ausdruck „Trophoneurose“ stammt, hat in der Hemiatrophie ein Beispiel dieser Klasse von Krankheiten zu erkennen geglaubt, in denen durch aufgehobenen Nerveneinfluß mangelhafte Ernährung bedingt wird. Samuel weist die Theorien zurück, die diese Affektion anders erklären wollen, zunächst einmal die von Lande, der erklärte, er glaube nicht an die trophischen Nerven, es handle sich bei der Affektion vielmehr um „une affection spéciale autopathique et protopathique de l'élément laminaire“; daher nennt er sie „Aplasia lamineuse“. Das Bindegewebe schwinde bis auf die elastischen Fasern, diese üben einen Zug auf die tiefer liegenden Gewebe aus, durch die diese und zunächst einmal die sie versorgenden Arterien komprimiert werden. Demgegenüber betont Samuel mit vollem Recht, daß die für gewöhnlich so deutlich ausgesprochene scharfe Begrenzung auf eine Gesichtshälfte in keiner Weise so ihre Erklärung finde. Auch irgendwelche Circulationsverhältnisse können nach seiner Meinung, der ich mich anschließe, die Affektion nicht erklären, denn abgesehen von den Bedenken, die theoretisch der Annahme eines dauernden arteriellen Spasmus entgegenstehen, während eine Lähmung der Gefäßerweiterer überhaupt keine Anämie erzeugt, abgesehen also von diesen Schwierigkeiten würde in jedem Fall doch immer ein Collateralkreislauf entstehen können und zum mindesten ein scharfes Abschneiden der Atrophie in der Mittellinie undenkbar sein. Auch Virchow betont in einem solchen Fall, daß irgendwelche Gefäßerkrankung nicht die Ursache sein könne. Die Gefäße seien anatomisch am wenigsten beteiligt, auch klinisch ist eine Gefäßbeteiligung nicht wahrnehmbar, die hautreizenden Reize wirken in normaler Weise, die auf die vasomotorischen Nerven wirkenden Reize wirken schneller und intensiver als sonst. Es besteht also sicher kein Vasomotorenkrampf. Die Halbseitigkeit der Affektion widerspricht auch durchaus der von Möbius angenommenen Hypothese, daß der unsehrtriebene Gesichtsschwund die Wirkung einer örtlichen Schädlichkeit sei, d. h. daß durch die Schleimhaut oder die Haut ein Gift eindringe und darin langsam sich verbreite, das die Gewebe zum Schwunde bringt, soweit es sie erreicht. Möbius

gießt die ganze Schale seines Spottes über die aus, die die trophoneurotische Natur der Hemiatrophie annehmen, aber ich glaube aus den erwähnten Gründen nicht, daß irgendeine andere Pathogenese denkbar ist.

Wie steht es nun aber mit der Angabe, daß die Hemiatrophie eine Erkrankung besonderer trophischer Nerven ist? Diese Behauptung scheint mir nicht vollkommen berechtigt zu sein. Man findet nämlich in fast allen Fällen von Hemiatrophie auch andere nervöse Störungen, namentlich sensible und sekretorische. Auch sie weisen darauf hin, daß pathogenetisch das Nervensystem in Frage kommt, aber gerade diese stete Mitbeteiligung anderer Nerven, meist des Trigemini, in einigen Fällen auch des Sympathicus, läßt auch hier wieder, wie bei allen übrigen Affektionen, die wir bisher betrachteten, eine Modifizierung der Samuelschen Ansichten in dem Sinne zu, daß der krankhafte Reiz seinen Weg nicht auf besonderen trophischen Bahnen zu nehmen braucht. Ein von Mendel referierter Fall weist auf das Trigeminalggebiet hin, es fand sich eine Neuritis interstitialis proliferans und eine sekundäre Atrophie der cerebralen Quintuswurzel. Der letzteren besonders legte Mendel Bedeutung bei. Ich glaube nicht, daß mit diesem Befunde ein sicherer Anhaltspunkt für die pathologische Anatomie der Hemiatrophie gegeben ist, zumal in anderen Fällen völliger Zerstörung des Quintus eine Hemiatrophie vermißt wurde (Hugelstamm); andererseits stellten Loebl und Wiesel in einem anderen Fall wieder eine Neuritis der peripheren sensiblen (und motorischen) Äste des Quintus fest, bis zum Ganglion Gasserii, während alle centralen Teile des Trigemini völlig normal befunden wurden. Doch kann auf die ganze Frage hier nicht weiter eingegangen werden, und ich verweise in dieser Beziehung auf das spätere Kapitel der Sklerodermie, in dem sie noch einmal ausführlich behandelt wird.

Fassen wir das Resultat dessen, was wir den kritischen Erörterungen der Samuelschen Arbeiten und Ansichten entnehmen, in folgendem zusammen, so müssen wir sagen: das Bestehen isolierter trophischer Nerven und Centren ist klinisch und experimentell nicht bewiesen. Daß das Nervensystem einen Einfluß auf die Ernährung der Gewebe hat, ist wenigstens für einzelne Arten der Gewebe wahrscheinlich gemacht.

Samuel behauptet nun, daß, wer den trophischen Einfluß des Nervensystems auf die Muskeln und Drüsen zugibt, daß der ihn prinzipiell damit auch für die übrigen Körpergewebe zugesteht, und daß ferner, wenn ein solcher Einfluß zugegeben wird, er auch auf besonderen Bahnen geleitet werden muß, da man den Nerven nicht zweierlei verschiedene Funktionen zutrauen dürfe und namentlich nicht den sonst centripetal leitenden Nerven eine Funktion, die eine centrifugale Leitung erfordere. Wir haben die letzte Behauptung bereits mehrfach als nicht

zutreffend gekennzeichnet. Daß mannigfache klinische Erfahrungen eine doppelseitige Leitung wahrscheinlich machen, ist allgemein anerkannt, besonders energisch ist in letzter Zeit Kohnstamm für diese Annahme eingetreten.

Als einer der sichersten Beweise für das doppelseitige Leitungsvermögen wird der sogenannte Zweizipfelversuch von Kühne angeführt. Das untere Ende des *Musculus sartorius* des Frosches läßt sich durch einen sagittalen Schnitt so teilen, daß jeder Zipfel von getrennten Nervenästen versorgt wird, die aber ihrerseits zu einer Teilungsstelle im Nerven hinführen, respektive von einer Teilungsstelle ausgehen. Reizt man jetzt den einen Zipfel, so zuckt auch der andere. Nach Kühne ist die Erklärung des Versuches nur so möglich, daß die Erregung von dem gereizten Zipfel bis zur Teilungsstelle und von da in den anderen Zweig des Achseneylinders hinergeht. Ähnliche Versuche hat er auch am *Musculus gracilis* angestellt. Weiter sind hier anzuführen die Untersuchungen von Babuchin am elektrischen Organ des Zitterweises. Dieses Organ wird von einem einzigen großen Achseneylinder versorgt, der sich vielfach zerteilt. Hier genügt die Reizung eines einzelnen Astes, um das ganze Organ zu entladen. Bidder stellte folgendes Experiment an. Er verbotte den durchschnittenen Hypoglossus mit dem centralen Ende des Lingualisstammes. Eine Reizung dieses Stammes ergab dann Zuckungen in der Zungenmuskulatur, doch gilt dieser Versuch nicht mehr als beweiskräftig aus hier nicht zu erörternden Gründen. Heute ist man darüber einig, daß eine Vereinigung centrifugaler und centripetaler Fasern nicht möglich oder wenigstens bisher nicht sicher erzielt worden ist. (Siehe Handbuch der Physiologie von Nagel Bd. IV, S. 801.) Den Versuchen von Kühne und Babuchin sind dann noch die von Langley anzureihen, die den Autor zur Aufstellung der sogenannten Axonreflexe führten. Langley und Anderson bestätigten eine Beobachtung von Sokownin, daß bei Reizung des centralen Endes eines durchschnittenen Hypogastricus Kontraktion der Blase der entgegengesetzten Seite auch dann zu erhalten ist, wenn alle Verbindungen des Ganglion mesentericum inferius mit dem Rückenmark zerstört sind. Langley zeigte, daß afferente Fasern, die einen wahren Reflex vermitteln können, hier nicht existieren, wie überhaupt im vegetativen System echte Reflexe nicht vorkommen, und daß Degenerationen der präganglionären Sympathicusfasern sowie Nicotianvergiftung diesen Pseudoreflex aufheben. Nach seiner Meinung, die von den Physiologen allgemein akzeptiert wird, verläuft hier die Erregung antidrom in efferenten präganglionären Fasern, um mittels Collateralen auf periphere Ganglien in diesem Fall der anderen Seite und endlich auf postganglionäre Fasern überzugehen, die direkt zu der Muskulatur der Blase verlaufen. In diesen Fällen also wie auch bei den Versuchen

von Babuckin und Kühne würde die motorische Erregung antidrom verlaufen und dann erst auf das Erfolgsorgan übergehen.

Diesen Versuchen an motorischen Nerven stehen nun analoge an sensiblen zur Seite. Sherrington reizte bei durchschnittenem *Rallus medullae oblong.* den auf 3 cm isolierten *Funiculus gracilis* mit schwachen Induktionsströmen oder mechanisch und erhielt sodann Bewegung der Hinterextremitäten und des Perineum. Spezielle Durchschneidungsversuche zeigten, daß die Erregung durch die hinteren Stränge geleitet wird. Sherrington nimmt an, daß hier sonst an afferenten zum Gehirn leitenden Bahnen eine antidrome Leitung nach unten erfolgt und auf irgendeine Weise motorische Effekte erzielt werden. Bayliss konnte, wie schon erwähnt, die Beobachtung Strickers bestätigen, wonach gewisse gefäßerweiternde Fasern durch die hinteren Wurzeln das Rückenmark verlassen. Er nimmt an, daß es für gewöhnlich afferente Fasern sein sollen, die hier für die antidrome Leitung nach der Peripherie zu in Betracht kommen. Er fand nämlich, daß nach Zerstörung des Spinalganglions die Gefäßerweiterung nicht mehr eintritt, während sie bei Durchschneidung der hinteren Wurzeln und Reizung des peripheren Stumpfes allein bestehen bleibt. Die Tatsache, daß der periphere sensible Nerv peripherwärts degeneriert und centralwärts zum Ganglion spinale hinleitet, stellt das sicherste Beispiel einer Doppelnichtigkeit der Leitung dar und wird auch von Lewandowsky, der dieser Hypothese sonst sehr skeptisch gegenübersteht, anerkannt.

Aber auch die erste Behauptung Samuels ist nicht erwiesen, im Gegenteil, die klinische Erfahrung, wie die Experimente sprechen durchaus dafür, daß eine wesentliche Differenz in den Ernährungsbedingungen der verschiedenen Gewebe im Verhältnis zum Nervensystem besteht. Man hat in diesem Zusammenhang auch von aktiven und passiven Geweben gesprochen, und auf die eine Seite die Muskeln und Drüsen, auf die andere die Knochen und das Bindegewebe gestellt, und mit Recht darauf aufmerksam gemacht, unter wie verschiedenen Bedingungen diese Gewebe „leben“. Es mag bei dieser Gelegenheit gleich auch noch ein zweiter Analogieschluß auf diesem Gebiete zurückgewiesen werden; wir sind nicht berechtigt, aus dem embryologischen auf das spätere Verhalten der Gewebe in dieser Hinsicht zu schließen, d. h. wir dürfen nicht, wenn wir finden, daß gewisse Gewebe sich unabhängig vom Nervensystem entwickeln, daraus schließen, daß diese Unabhängigkeit im postembryonalen Leben gesichert ist, wie das schon einmal betont wurde.

Die Zurückweisung der Samuelischen Lehre darf uns natürlich nicht hindern, anzuerkennen, eine wie wertvolle Bereicherung Physiologie und Pathologie dieses Gebietes durch Samuels ausgedehnte, mühevollen und unermüdete Forschungen erfahren haben.

Wenn uns nun wieder in der Störung des Blutzuflusses zu den Geweben, soweit er neurotisch bedingt ist, auch in eigenen trophischen Nerven der Weg erkennbar wird, auf dem der angenommene trophische Einfluß des Nervensystems vor sich geht, so bleibt nichts anderes übrig, als in den uns auch sonst schon bekannten Nerven diesen Weg zu suchen. Wir haben uns also im Folgenden mit denjenigen Theorien zu beschäftigen, die annehmen, daß der trophische Einfluß des Nervensystems an alle Nervenbahnen und Nervencentren, die daneben ihrer speziellen Funktion dienen, gebunden ist. Die Mehrzahl der Forscher, die das in Rede stehende Problem behandelt haben, neigt sich jetzt dieser Auffassung zu, aber über den Modus dieser Einwirkung gehen auch heute noch die Ansichten weit auseinander. Eins hat sich, je länger desto mehr, herausgestellt, was wir eben schon betont haben: es ist nicht möglich, alle Erscheinungen gestörter Ernährung prinzipiell auf dieselbe Weise zu erklären, nichts ist gefährlicher, wie der Schluß von einem Gewebe auf das andere. Es bleibt uns heute nichts anderes übrig, als für jede Gewebsart einzeln die Tatsachen zu sammeln und zu erörtern.

Diese allgemeinen und in neuerer Zeit auch überall anerkannten Gesichtspunkte wurden früher nicht genügend beachtet, und daher kommt es, daß von den weiteren noch zu besprechenden Theorien die eine und die andere zwar in einzelnen Punkten akzeptabel erscheint, aber jedesmal versagt, wenn man sie in der Ausdehnung anwendet, die ihr ursprünglich zugedacht war.

Die eine dieser Theorien führt die trophischen Störungen auf eine Verminderung des nervösen Einflusses zurück (Vulpian, Leloir u. a.), während eine zweite sie auf Reizzustände in den betreffenden Nerven bezieht. Der Hauptvertreter dieser letzteren Annahme ist Charcot. Auf die experimentellen Erfahrungen gestützt, die ihm zu ergeben scheinen, daß nicht die völlige Durchschneidung eines Nerven eine Ernährungsstörung ergibt, sondern nur die unvollkommene, und in Rücksicht auf die klinischen Tatsachen, daß trophische Störungen am ehesten dann auftreten, wenn die Leitungsbahn der betreffenden Nerven nicht völlig zerstört, sondern nur irgendwie geschädigt ist, erklärt er: „Le défaut d'action du système nerveux n'a pas d'influence directe immédiate sur la nutrition des parties périphériques . . . au contraire, l'excitation morbide, l'irritation des nerfs ou des centres nerveux sont de nature sous de certaines conditions à provoquer à distance les troubles trophiques les plus variés“¹⁾. Die nach Aufhebung des nervösen Einflusses entstehenden trophischen Störungen sind nach dieser Theorie entweder als Inaktivitätstrophien aufzufassen, oder sie beruhen, namentlich wenn sie experimentell

¹⁾ Charcot, *Oeuvres complètes*. I. p. 21.

erzeugt sind, auf durch die Anästhesie begünstigten Traumata. Einer ähnlichen Entstehung tropischer Störungen redet auch Weir-Mitchell das Wort, indem er wenigstens für diejenigen Störungen, die sich an der Haut und deren Adnexen finden, annimmt, daß sie durch einen Reizzustand in den peripheren Nerven bedingt und unterhalten werden. Er stützt sich dabei auf die zahlreichen Erfahrungen, die er an einem großen klinischen Materiale machen konnte, und die er ausführlich in seinem Buche mitteilt. Für das beschränkte Gebiet, für das Weir-Mitchell seine Theorie aufstellt, scheint sie auch zu Recht zu bestehen, insbesondere werden in der Tat diejenigen Störungen, die von ihm und vorher schon von Paget als *glassy-skin* beschrieben wurden, auf diese Art zu erklären zu sein. Anders steht es, wenn wir mit Charcot der Theorie allgemeine Geltung zubilligen sollen. Charcot hat wohl gesehen, daß es erhebliche Schwierigkeiten macht, die Erfahrungen bei der Muskelatrophie mit seiner Theorie in Einklang zu bringen, er hat sich bei seinen Erklärungsversuchen auf angebliche klinische und experimentelle Tatsachen gestützt, die sich als unrichtig erwiesen haben, und die er selbst später anders aufgefaßt zu haben scheint. So sagt er¹⁾: „Sensé l'irritation des nerfs serait capable d'occasionner l'atrophie rapide et latente des muscles, précédée elle-même de la diminution ou de la disparition de la contractilité faradique. La division complète des nerfs a entraîné l'atrophie et la perte des réactions électriques qu'on n'ait d'un temps incomparablement beaucoup plus long, à l'instar du repos prolongé.“

Daß das im letzten Satz Behauptete nicht richtig ist, ist sicher. Auch ist es nicht angangig, in dem Reiz, den der zerfallende Nerv ausübt, das irritative Moment zu sehen, das die Atrophie bedingt, da diese Atrophie fortdauert, wenn längst vom Nerven jede Spur geschwunden ist, wie Vulpian schon mit Recht hervorhebt. Ähnliches gilt auch für die neurotische Drüsenatrophie; und für eine Reihe weiterer Affektionen, die man als neurotische Atrophien zu betrachten gewohnt war, ist die Richtigkeit der Charcot'schen Auffassung wenigstens in keiner Weise wahrscheinlich gemacht.

Demgegenüber versucht Vulpian, die Abschwächung des nervösen Einflusses als das die tropischen Störungen bedingende Moment hinzustellen. Er sagt in seinen Vorlesungen II, S. 424: „L'affaiblissement de l'influence trophique des centres nerveux me paraît favoriser le développement des diverses affections rutées que l'on observe chez les sujets qui sont atteints d'une lésion de ces centres ou des nerfs soit sensitifs soit mixtes.“ Er ist der Ansicht, daß die Übertragung dieses Einflusses teils durch Fasern des Sympathicus, teils durch sensible Nerven erfolgt, während der tropische Einfluß der Centren auf

1) Charcot, a. a. O. I, p. 40.

die Muskeln durch die motorischen Nerven bedingt wird. Vulpian hat aber später selbst eingesehen, daß seine Theorie nicht instande ist, alle Erscheinungen zu erklären, und er hat sie deshalb erweitert resp. modifiziert. Er berichtet darüber in der Vorrede zu Weir-Mitchells oben zitiertem Buche. Er hält an der eben gegebenen Erklärung für eine Reihe von Ernährungsanomalien in der Haut ebenso wie für die Atrophie der Muskeln fest; dagegen sucht er für eine Reihe von Zuständen, zu denen er die herpetiformen, die blasen- und bläschenförmigen Ausschläge, geschwürige Prozesse an der Haut, Panaritien und glossy skin rechnet, und bei denen, wie er zugeben muß, eine vollständige Leitungsunterbrechung nicht besteht, folgenden Entstehungsmodus plausibel zu machen: Krankhafte Reizungen, die durch einen Entzündungszustand in dem betreffenden Nervengebiet bedingt sind, wirken auf das trophische Centrum der affizierten sensiblen Fasern, d. h. also die Spinalganglien, reizend ein und bedingen dort eine Abschwächung der trophischen Tätigkeit, die ihrerseits wieder durch dieselben sensiblen Fasern centrifugal zur Peripherie geleitet wird. Vulpian will nicht absolut ausschließen, daß im Sinne Weir-Mitchells die Reizung peripherer sensibler Fasern gelegentlich direkt centrifugal fortgeleitet wird und die Ernährung der Haut und anderer Gewebe beeinträchtigt, aber er hält doch den letztgenannten Weg für wahrscheinlicher, offenbar weil er so für alle Ernährungsstörungen einen gemeinsamen Erklärungsmodus findet. Er gibt seiner Theorie demgemäß folgende Formel: *Ces altérations sont des résultats de troubles de la nutrition dus à l'abolition ou à la diminution de l'action trophique des centres nerveux sur les différents tissus*¹⁾. Einen Anhänger hat die Vulpian'sche Theorie in Leloir gefunden.

Es ist von großem Interesse, daß bei dieser Theorie ein neues Moment eingeführt wird, die Entstehung trophischer Störungen durch reflektorische Reize. Freilich ist Vulpian nicht der erste, der in diesem Sinne sich ausdrückt, da auch Weir-Mitchell schon einer ähnlichen Auffassung Raum gibt. Später haben Hayem und Hallopeau et Neumann sich für diese Auffassung ausgesprochen. Vulpian's Theorie in ihrer letzterwähnten Gestalt ist in vieler Beziehung die annehmbarste von allen bisher erwähnten, aber Bedenken bleiben auch hier nicht aus. Es ist in einer großen Zahl von Fällen nicht einzusehen, wozu wir des komplizierten Reflexapparates bedürfen, wo wir mit der Annahme eines direkten Reizes entweder oder einer direkten Abnahme der Funktionen auskommen. Ferner ist es auch zweifelhaft, ob man annehmen darf, daß eine einfache Aufhebung des Nerveninflusses so mannigfache und oft das Kennzeichen einer Irritation an

¹⁾ Vulpian, *Préface* zu Weir-Mitchell's Buch: *Des lésions des nerfs traitées par Dastre*, p. 41.

sich sowohl wie an den Begleitsymptomen deutlich aufweisende Störungen hervorbringen kann.

Die Bedenken, die wir gegen jede einzelne der erwähnten Theorien haben mußten, wenn wir sie als allgemeingültig betrachteten, weisen uns darauf hin, daß es vorzuziehen ist, von einer solchen allgemeingültigen Theorie abzusehen. Es scheint uns vielmehr angebracht, unsere weiteren Erörterungen in der Richtung zu führen, wie weit und in welcher Form die einzelnen Gewebe dem trophischen Einfluß des Nervensystems unterliegen.

Wir beginnen mit der Diskussion der Abhängigkeit der einzelnen Teile des Nervensystems voneinander.

Die Schwierigkeiten, die sich einer solchen Darstellung entgegenstellen, sind besonders groß, weil unsere Auffassung über den Aufbau dieses Systems zurzeit noch immer nicht als einseitig und klar bezeichnet werden kann. Die Neurontheorie, die, wenn auch nicht lange Zeit, fast allgemein angenommen war, ist bekanntlich in den letzten Jahren stark angegriffen worden. Diese Hypothese besagte, daß das Nervensystem aus unzähligen Nerveneinheiten bestünde, aus anatomisch sowohl wie physiologisch bestimmten und wohl charakterisierten Zellindividuen. Die wesentlichen Bestandteile eines jeden solchen Zellindividuums sind der Zellkörper mit seinen Ausläufern, den Protoplasmafortsätzen, der Kern mit dem Kernkörperchen und der Achsenzylinderfortsatz, der im weiteren Verlauf häufig zur markhaltigen oder marklosen Nervenfasern wird. Neue Färbungsmethoden, die eine distinkte Färbung der im Achsenzylinder verlaufenden Fibrillen, die sich bis dahin einer sicheren Darstellung entzogen hatten, ermöglichten, haben zunächst einmal die Annahme der histologischen Einheit der Nervenzelle und ihrer Fortsätze stark erschüttert. Sie zeigen uns diese Fibrillen — bei den Wirbeltieren — in den Achsenzylinderfortsätzen in langen, einander parallel laufenden Zügen, während sie in den Ganglienzellen in der mannigfachsten Weise sich aufsplittern, einander überragen und sich verflechten. Wir erkennen hier auch deutlich Neurofibrillen, die von einem Dendriten im Bogen in den nächst benachbarten hineinziehen usw. Inwieweit echte intracelluläre Netze gebildet werden, ist noch zweifelhaft, sie kommen wohl sicher vor, doch wird ihre Häufigkeit von verschiedenen Forschern ganz verschieden angegeben. Die von Golgi zuerst beschriebenen an der Oberfläche der Zellen lagernden Netze (sogenannte Golginetze) werden jetzt fast allgemein als nicht nervöse Bildungen angesehen. Ganz im ungewissen sind wir noch über die Art und Weise, wie eine Verbindung zwischen den intracellulären Neurofibrillen und den von außen an die Zelle in mannigfachsten Formen (Körben, Bechern, Hosen) herantretenden Nervenfaserendigungen stattfindet. Ebenso wenig sind unsere Kenntnisse über die periphere Endigung der Neurofibrillen genügend sicher

fundiert. Jedenfalls herrscht im ganzen im Gegensatz zu den Anschauungen im letzten Dezennium des vergangenen Jahrhunderts die Meinung vor, daß die Hypothese des Aufbaus des Centralnervensystems aus lauter anatomisch selbständigen Nerveinheiten in der bisherigen Form nicht aufrecht erhalten werden kann.

Die Frage aber, ob das Kontiguitäts- oder Kontinuitätsprinzip den Aufbau des Nervensystems beherrscht, ist unseres Erachtens in ihrer Wichtigkeit viel zu hoch eingeschätzt worden. Das hat schon Weigert mit aller wünschenswerten Deutlichkeit hervorgehoben, wenn er sagte: für die physiologisch so wichtige Frage nach der Übertragung der nervösen Erregungen von dem Gebiet der einen Zelle auf das einer anderen, ist es zunächst ganz gleichgültig, ob bei diesen Übertragungen der Nervenstrom direkt von einem Achsenzylinderbüschel auf die Verästelungen der Protoplasmafortsätze übergeht, oder ob er dabei einen kleinen Zwischenraum zu überspringen hat. Auch die so interessante Lehre von der (physiologischen) Selbständigkeit der Neurone hat mit der Frage der freien Endigungen gar nichts zu tun.

Viel wichtiger als die Entscheidung dieser im wesentlichen anatomischen Frage wäre es, wenn wirklich die Ansichten, die Bethe über die Rolle der Ganglienzellen für die nervöse Funktion auf Grund von Experimenten sich gebildet hat, zu allgemeiner Annahme gelangen sollten. Er nimmt an, daß die in den Anhäufungen der fibrillären Substanz gelegenen Ganglienzellen mit der eigentlichen, spezifischen, nervösen Funktion gar nichts zu tun haben. Er weist den Ganglienzellen vielmehr gewissermaßen nur die Rolle eines Ernährungsreservoirs zu, aus dem die Fibrillen bei ihrer spezifisch nervösen Tätigkeit eine bestimmte für diese nötige Menge von Stoffen entnehmen. Nach dieser Auffassung würden die Ganglienzellen also immer noch trophische Centren darstellen, aber doch in wesentlich anderem Sinne als früher. Der Begriff des Centrums würde dahin modifiziert sein, daß in der betreffenden Zelle nichts weiter als eine größere Ansammlung von Fibrillen statthätte, die dort ihr Nährmaterial entnehmen.

Ich glaube, daß trotz des stützenden Experimentes die Auffassung Bethes von der Rolle der Ganglienzellen sehr unwahrscheinlich ist. Sie hat sich bisher auch nur spärliche Anhänger zu erwerben vermocht.

Bei dieser Unsicherheit über die allgemeinen Prinzipien der Struktur des Nervensystems werden wir gut tun, uns abseits von jeder Theorie die vorhandenen Tatsachen im einzelnen darzustellen und ihre Erklärung zu versuchen. An der physiologischen Zusammenhänge gewisser Bestandteile des Nervensystems festzuhalten, nötigen uns Erfahrungen, die längst vor dem Auftauchen der Neurontheorie allgemein anerkannt waren, wie auch eine gegenseitige Abhängigkeit dieser physiologischen Einheiten zum gesicherten Besitz unserer Wissenschaft gehört.

Es ist seit langem bekannt, daß die Zelle auf den Nervenfortsatz einen trophischen Einfluß ausübt. Die ersten hierher gehörigen Beobachtungen verdanken wir Nasse, feste Gestalt bekam diese Lehre durch die Experimente von Waller. Wird irgendwo eine Nervenfasern in ihrer Kontinuität dauernd unterbrochen und von ihrer Zelle losgelöst, so degeneriert der periphere Stumpf (Wallerische Degeneration oder besser nach Lohmann *cellifugale Degeneration*). Die Pathologie hat in der Lehre von der sekundären (Türkschen) Degeneration diese Erfahrungen vollinhaltlich bestätigt. Durchschneidung einer motorischen Nerven bewirkt dessen Degeneration peripher von der Durchschneidungsstelle bis zu seiner Endigung am Muskel, Durchschneidung des sensiblen Nerven eine solche bis zu seiner Endigung in der Peripherie; nach Durchschneidung einer hinteren Wurzel degeneriert deren intramedulläre Fortsetzung. Gleichgültig also, ob die gewöhnliche physiologische Leitung in *cellifugaler* oder *cellipetaler* Richtung stattfindet, die Degeneration erfolgt stets *cellifugal*. Über die genaueren Modalitäten dieser Degeneration bestehen noch mannigfache Meinungsverschiedenheiten: es ist nicht sicher ausgemacht, ob sie in allen Punkten des peripheren Nervenstumpfes gleichzeitig einsetzt, oder ob sie von der Durchschneidungsstelle aus sich weiter fortplant, wie das z. B. neuerdings Modena behauptet. Es ist ebensowenig sicher, an welchen Teil der Nervenzelle dieser trophische Einfluß anknüpft, wenn auch die meisten Erfahrungen auf den Kern hinzuweisen scheinen.

Genaue hat das Versagen auseinanderzusetzen. Nach diesem Autor ist es zweifellos, daß der Kern dem „Biogen“ des Protoplasmas gewisse „Kernstoffe“ liefert, die zur Unterhaltung des Stoffwechsels der Biogene unbedingt erforderlich sind. Während der Kern wahrscheinlich Biogenstoff nicht enthält, enthält er doch ein Depot von Ersatzstoffen für gewisse zur Erhaltung des Stoffwechsels der Biogenmoleküle notwendige Stoffe. Allerdings gehen auch isolierte Zellkerne zugrunde.

Die Erklärung für das Zugrundegehen des Achsencylinders nach der Abtrennung von der Zelle schien, wenigstens wenn man sich auf den Boden der Neurontheorie stellte, ohne weiteres gegeben zu sein.

Man nahm an, daß es sich um nichts anderes handle, als um den Untergang eines losgelösten Teils einer Zelle. „Die normale Erhaltung der Konstitution ist eben nur für die mit dem Zellkörper in kontinuierlicher Verbindung stehenden Teile möglich.“ (Goldscheider.) Und auch neuerdings erklärt Goldscheider, daß er bis auf weiteres daran festhalte, daß das Neuron eine nutritive Einheit sei. Dabei ist aber doch eins zu bedenken: der Achsencylinder wird nicht etwa in der Weise von seiner Ursprungszelle ernährt, daß er von ihr direkt sein Nährmaterial bezieht; bei der enormen Ausdehnung mancher Achsencylinder wäre das von vornherein höchst unwahrscheinlich, und es spricht dagegen auch, wie Lohmann mit Recht bemerkt, die starke Versorgung

der Nervenfasern mit eigenen Blutgefäßen. Es werden wohl mit gutem Grunde, die Ranviersehen Einschnürungen als die Stellen betrachtet, an denen die Ernährungsflüssigkeiten an den Achsenzylinder herantreten. Die trophische Funktion der Nervenzelle muß also eine andere sein, sie muß durch ihren Einfluß den Achsenzylinder befähigen, das sich ihm in seiner Umgebung darbietende Nährmaterial an sich zu ziehen und in zweckentsprechender Weise zu verwerten. Mit dieser Anschauungsweise bleiben wir ganz auf dem Boden der Vorstellungen, die uns die Virchow'sche Auffassung von dem Vorgange der Ernährung der Zelle kennen gelehrt hat. Goldscheider hat die Ansicht ausgesprochen, daß ein wirklicher Transport eines Stoffes, vielleicht einer fermentartigen Substanz, von der Zelle aus zu den Enden des Achsenzylinders hin stattfindet, diese setze ihn vielleicht in den Stand, das gebotene Nährmaterial zu assimilieren. Ich möchte Lenhossek beistimmen, daß wir durch eine solche Formulierung des Vorgangs nicht weiter kommen, als wenn wir eine von der Zelle cellifugal strömende Erregung annehmen, die dem Achsenzylinder seine Assimilationskraft sichert. Was das für eine Erregung ist, wissen wir nicht, aber es geht uns damit nicht besser und nicht schlechter, als mit jeder anderen Art nervöser Erregung.

Nicht wesentlich anders sind die Vorstellungen, die wir dann akzeptieren müssen, wenn wir von einer anatomischen Einheitlichkeit der einzelnen Zelle absehen. Wir müssen dann annehmen, daß der trophische Geltungsbezirk einer Nervenzelle sich auf die Nervenfasrillen erstreckt, die sie durchziehen, resp. die in ihr ein Nervenfasernetz gebildet haben, und wir müssen weiter supponieren, daß dieser Einfluß sich bis zu einem bestimmten Punkte in der Peripherie erstreckt, der wahrscheinlich durch den gleich weit geltenden spezifisch funktionellen Einfluß der Zelle bedingt wird. Wenn diese Grenze alles willkürlich gewählt erscheint, der sollte folgendes bedenken: es ist bisher nur theoretisch angenommen, nicht etwa sicher bewiesen, daß der Einfluß einer einzigen Zelle sich gerade auf ein ganz bestimmtes Gebiet, d. h. den von ihr ausgehenden Nervenfortsatz mit seinen Endverzweigungen erstreckt. Tatsächlich haben wir es in unseren Beobachtungen stets mit einer mehr oder minder großen Vielheit von Zellen zu tun, mit Zellgruppen, und wir wissen nur, daß bestimmte Zellgruppen einen trophischen Einfluß auf bestimmte Fasergruppen und Ausbreitungsgebiete der Nervenfortsätze ausüben. Nicht die einzelne Spinalganglienzelle mit ihrem Achsenzylinderfortsatz verfahren wir bei der aufsteigenden Degeneration, sondern ein ganzes Spinalganglion mit seinen zahlreichen Zellen und Nervenfortsätzen, und selbst bei der Degeneration nur einer hinteren Wurzel haben wir eine Vielheit von Achsenzylindern vor uns. Allzu schwierig erklärbar erscheint mir auch bei Annahme eines kontinuierlichen Nervennetzes

ein solcher Einfluß der Zellen auf einen bestimmten und mit ihnen jedenfalls in enger räumlicher Beziehung befindlichen Nervenfaserkomplex nicht zu sein.

Goldscheider betont mit Recht, daß die trophische Erregung nicht ohne weiteres der übrigen Funktion der Zelle gleich zu setzen ist, schon aus dem Grunde nicht, weil sie immer collifugal verlaufen muß, während die spezifisch funktionelle Erregung im peripheren sensiblen Nerven z. B. sich collipetal fortpflanzt. Eine Schwierigkeit ergibt sich, wie wir schon oben sahen, aus der Annahme dieser doppelten Fortpflanzungsrichtung nicht, da die Möglichkeit einer doppelbinnigen Nervenleitung als bewiesen zu gelten hat.

Neben den Vorgängen der Degeneration machen sich zunächst bei einfacher Zerschneidung des Nerven im peripheren abgetrennten Stück abhald regenerative Vorgänge bemerkbar, auf deren histologische Einzelheiten wir auch wiederum nicht einzugehen brauchen. Über die Bedingungen dieser Regenerationen haben sich Meinungsverschiedenheiten ergeben, die in der Frage gipfeln, ob es eine autogene, d. h. ohne Einfluß der Ganglienzelle eintretende Regeneration im peripheren Neuron gibt. In erster Linie ist Bothe auf Grund zahlreicher Experimente für diese autogene Regeneration eingetreten, ihm sind ganz oder bedingungsweise einige wenige Forscher (Raimann, Zander, Durante, Badfurth Kennedy, Fleming) gefolgt; das zur Regeneration erforderliche Material wird nach dieser Auffassung von den Zellen der Schwannschen Scheide geliefert, deren Produkte sich zu Neurofibrillen differenzieren. Von denselben Autoren wird auch angenommen, daß die peripheren Nervenfasern eine pluricelluläre Entstehung haben, und nicht, wie His das zuerst lehrte, durch Auswachsen von Achsenzylinderfortsätzen entstehen. Demgegenüber behaupten die „Monogenisten“, in erster Linie Ramon y Cajal, dann Perroncito, Munzer, Marinesco, Lugaro, Schiefferdecker, Modena den maßgebenden Einfluß der Nervenzellen auf die Regeneration, die nach dieser Auffassung nur durch Auswachsen der Neurofibrillen vom proximalen Stumpf ausgeht, und bei der die Zellen der Schwannschen Scheide nur eine sekundäre Rolle spielen. Ob das wirklich für alle Fälle auch für ganz junge Tiere zutrifft, erscheint mir zweifelhaft, über jeden Zweifel erhaben dagegen die Tatsache, daß der Einfluß der Ursprungszelle auf die Regeneration ein ganz außerordentlich bedeutsamer ist.

Spätere Erfahrungen haben uns noch etwas Weiteres gelehrt. Nicht allein im peripheren Stumpf treten nach Durchschneidung des Achsenzylinders Degenerationen auf, sondern auch in der zugehörigen Zelle und im zentralen Stumpf. Freilich sind die Bedingungen und Einzelheiten dieser Degeneration längst nicht so gut bekannt, wie die der Wallerschen Degeneration.

Schon seit langem hatte man beobachtet, daß nach Absetzung ganzer Gliedmaßen in den zugehörigen Teilen des Rückenmarks gewisse Veränderungen auftraten; die ersten hierher gehörigen Beobachtungen stammen von Vulpian und Dickinson. Genaue Untersuchungen hat zuerst Leyden¹⁾ veröffentlicht. Er fand, daß nach Amputationen auch am erwachsenen Menschen noch eine nachweisbare Veränderung des Rückenmarks eintrat, die nicht allein die weiße Markmasse betrifft, sondern auch zu einer entschiedenen Veränderung der Ganglienzellen mit Verkleinerung des grauen Vorderhorns führt. Die weiteren Untersuchungen haben diese Angaben meist bestätigt, jedoch differieren sie bezüglich der Lokalisation der Veränderungen wie des Charakters der Degeneration. Bald werden allein die Hinterstränge, bald allein die Vorderstränge, bald nur die weiße, bald nur die graue Substanz verändert gefunden, und bald wird nur das Vorder- oder Hinterhorn, bald beide zusammen als affiziert erklärt. Leyden-Goldscheider²⁾ nehmen an, daß die Differenz der Angaben größtenteils von der verschiedenen Intensität der Degeneration abhängig ist, die ihrerseits bezüglich ihrer Intensität und Ausbreitung von verschiedenen Bedingungen, wie dem Alter des Individuums zur Zeit der Amputation, von der nach der Operation bis zum Tode verflissenen Zeitdauer usw. beeinflußt wird. Orzechowski hat die Frage zum Teil auch auf Grund eigener Untersuchungen nochmals ausführlich behandelt. Es kommen offenbar Differenzen, die unserem Verständnis bisher nicht zugänglich sind, vor. Alter des Individuums sowohl wie die seit der Operation verflissene Zeit sind nicht immer maßgebend. Zabriskie fand bei einem 12-jährigen Mädchen, bei dem 2 Jahre vorher die Amputation vorgenommen worden war, keinerlei Zellveränderungen; auch in einem eigenen Fall erhielt Orzechowski zum Teil negative Resultate, indem wenigstens gewisse Zellgruppen vollkommen normal blieben, während andere allerdings degenerierten. Auch Dejerine macht auf die große Unsicherheit und Variabilität der hier vorliegenden Verhältnisse neuerdings aufmerksam; er fand in einem 44 Jahre nach der Amputation des einen Armes zur Sektion gekommenen Rückenmark keine deutlichen Vorderhornveränderungen.

Von anderer Seite her wurde das Problem behandelt, indem man das Experiment zu Hilfe nahm und nach Durchschneidung peripherer motorischer Nerven deren Ursprungsgebiet im Rückenmark untersuchte. Die ersten Experimente rühren von Vejas, einem Schüler v. Gudden und von v. Gudden selbst her. Am erfolgreichsten hat dann Forel die Frage erörtert, und einen mächtigen Anstoß hat der Eifer der Unter-

¹⁾ Leyden, *Klinik des Rückenmarkserkrankten*, 1875, II, S. 315.

²⁾ V. Leyden-Goldscheider, *Die Erkrankungen des Rückenmarks*, Wien 1887, S. 50.

sacher dieses Gebietes bekommen, als die neue Nissl'sche Untersuchungsmethode reiche Aussicht zu ergeben versprach. Forel hat an zwei Meeresschnecken operiert; er schnitt dem einen den Nerv. facialis nahe dem Foramen stylo-mastoideum ab und fand nach 262 Tagen einen wenn auch nur partielle, so doch bedeutende degenerative Atrophie des Nerven und seiner Zellen. Bei einem zweiten Tier zog er den Nerven aus dem Canalis Fallopius heraus, so daß er an der Hirnbasis abriß, und tötete das Tier nach 141 Tagen. Hier fand er trotz der fast halb so kurzen Zeit einen fast totalen Zerfall der Fasern und Zellen. Es waren nur noch einige wenige Ganglienzellen vorhanden, deren Zugehörigkeit zum Facialis ihm zweifelhaft erschien, während die überwiegende Mehrzahl der Zellen klein, geschrumpft und den Gliazellen ähnlich aussah. Auch die Facialisfasern waren fast völlig verschwunden. Die späteren Untersucher, die mit der Nissl'schen Methode arbeiteten, vor allem Nissl selbst, dann Platan, Marinesco, van Gehuchten, Sträubler, Anderson und sehr viele andere haben die histologischen Einzelheiten der Zellveränderungen genau studiert. Schon einige Tage nach der Durchschneidung des Nervus facialis sah Nissl dessen Ursprungszellen krankhafte Umwandlungen erfahren, die teils in einer Auflösung der chromatophilen Körperchen, teils in einer Verlagerung und Gestaltveränderung des Kerns und in einer Schwellung und Vergrößerung des Zellkörpers bestanden, wobei die Zelle auch ihren polygonalen Bau verliert. Es scheint nach andere Formen histologischer Strukturänderungen außer der Chromatolyse zu geben. Marinesco hat eine Art fadenförmiger Umwandlung der Nisslkörper beschrieben. Derselbe Autor hat auch die in den Fibrillen der Ganglienzellen sich abspielenden Veränderungen nach Durchschneidung und Zerteilung des Nerven (am Hypoglossus, Vagus, Facialis des Kaninchens) und ebenso die nach Durchschneidung eintretenden reparativen Vorgänge studiert und ausführlich dargestellt. Die Veränderungen (Destruction und Schwund der Neurofibrillen) beginnen in der perinucleären Region, und gehen am spätesten auf die Fibrillen der protoplasmatischen Fortsätze über. Sie bestehen zunächst darin, daß die Färbung der Fibrillen (Marinesco bediente sich der Cajal'schen Methode) weniger distinct wird, daß diese ein körniges Aussehen bekommen, schließlich sich ganz auflösen, nur noch in Bruchstücken vorhanden sind und selbst aus dem Zellbild völlig verschwinden. Die Einzelheiten dieser Forschungen interessieren uns jedoch hier nicht, dagegen müssen wir hervorheben, daß auch heute noch keineswegs in jedem Punkte Klarheit herrscht. Während z. B. meist eine einfache Durchschneidung des zugehörigen Nerven in den Ursprungszellen wenigstens den leichtesten Grad der Veränderungen, die Chromatolyse ergibt, vermüßte van Gehuchten sie wiederholt bei der Durchschneidung spinaler Nerven. Die Schwierigkeiten der Deutung der Befunde

bestehen aber besonders darin, daß wir nicht in der Lage sind, anzugeben, welche Bedeutung in physiologischer Beziehung den verschiedenen histologischen Prozessen zukommt. Monakow¹⁾ wirft die Frage auf, ob die Ganglienzelle unter allen Umständen verkümmern muß, wenn ihr Nervenfortsatz abgetrennt wird. Es scheint das nicht der Fall zu sein, und jedenfalls ergeben sich in bezug auf die Schnelligkeit und Intensität dieser Zelldegenerationen sehr große Verschiedenheiten, über deren Bedingungen wir noch nicht genügend orientiert sind. Monakow meint, daß viel darauf ankommt, ob die Ganglienzelle im Besitz reicher Collateralen ist oder nicht; er schreibt ferner der Lage der Durchtrennungsstelle selbst eine gewisse Rolle zu. Wird der Achsenzylinder in großer Entfernung von seiner Zelle abgetrennt, so beeinflußt dies ihre Fortexistenz weniger als wenn die Unterbrechungsstelle in nächster Nähe der Zelle liegt. Ferner betont er, daß nach seiner Ansicht die sekundären Veränderungen in den Ganglienzellen eines Kerns nicht einfach direkt proportional der Zahl der zerstörten Fasern sind, sondern daß die Intensität und der Umfang ihrer Degeneration in einem ganz anderen, weit größeren Verhältnis wächst, da im Falle einer Zerstörung aller aus diesem Kern hervorgehenden Fasern überhaupt keinerlei Tätigkeit mehr in dem Kern möglich ist. Dieser Punkt scheint auch mir von ausschlaggebender Bedeutung zu sein; ich bin immer der Ansicht gewesen, daß darauf zu wenig Rücksicht genommen wurde, wie groß relativ die Zahl der durchtrennten Fasern ist. „Man darf wohl annehmen, daß bei der funktionellen Betätigung eines motorischen Nervenkerns die einzelnen Nervenzellen sich gegenseitig unterstützen“ (Monakow). Doch sind diese Ansichten Monakows, die auch Forel im wesentlichen teilt, früher von anderen (Lenhossek, Nissl) bestritten worden. Von Einfluß auf die Entwicklung der Degeneration und besonders auf das spätere Schicksal der Zellen ist ferner die Art der Kontinuitätstrennung im zugehörigen Nerven. Am wenigsten eingreifend scheint die einfache Zerschneidung zu sein, ja Gehuchten hat, wie schon erwähnt, nach Durchschneidung spinaler Nerven jede Veränderung der Zellen, selbst deren geringsten Grad, die Chromatolyse, vermißt; stärker wird die Degeneration, wenn es sich um Resektion eines größeren Nervenstückes oder um Herausziehung des Nerven handelt. (Siehe die oben zitierten Versuche Forels.) Man ist meist geneigt, diese Unterschiede damit zu erklären, daß in dem ersteren Falle eine Wiedervereinigung der Nervenfasern möglich ist, während im zweiten Fall Regenerationsvorgänge sich zwar wohl anbahnen, aber nicht zum Ziele führen können. Immerhin ist es doch sehr bemerkenswert, daß überhaupt diese Regenerationsvorgänge sich eintreten, und wir werden, wie Lenhossek betont, dadurch unabwieslich

¹⁾ Monakow a. a. O. S. 234.

zu der Annahme geführt, daß jene ersten Zellveränderungen, mögen sie anatomisch noch so deutlich ausgeprägt sein, in funktioneller Hinsicht doch nicht eingreifend genug sind, um die trophische Aktion der Zelle zu beeinträchtigen. Ob die Intensität der primären Veränderungen allein von der Möglichkeit der Wiedervereinigung der Nervenfasern abhängt, ist aber zweifelhaft; von Gehuchten leugnet sogar überhaupt den Einfluß dieses Momentes, während Marinesco ihn durchaus an erste Stelle schiebt. Die Möglichkeit, daß noch andere Dinge von Einfluß sind, scheint mir vorzuliegen, insbesondere ist das Alter zu berücksichtigen, ferner auch der Allgemeinzustand und die speziellen Ernährungsverhältnisse des Gebietes.

Von vielen Seiten ist dem öfter geäußerten Heranziehen oder -reißen der Nerven eine besonders schädigende Wirkung zugeschrieben worden; Raimann hat wieder diesen Punkt zur Erklärung vieler Differenzen verwertet, während schon vor langem Forel eine derartige Vorstellung für ganz töricht und undiskutabel erklärt hat. Sträußler hat durch vergleichende Untersuchungen den Streit zu entscheiden versucht. Nach Resektion fand er am 5. Tage Alterationen in den Vorderhornzellen, die 30 Tage lang fortschritten, es kam zu einer Schwellung, zur Chromatolyse, aber der Kern war wenig alteriert. Nach Ausheilung waren schon nach 24 Stunden Veränderungen nachweisbar, die nach 5 Tagen auch auf den Zellkern übergriffen, und nach 10 Tagen zu vielfachem Zelluntergang geführt hatten. Nach 30 Tagen war der Prozeß beendet, mehr als die Hälfte aller Zellen waren untergegangen, und es fanden sich Zeichen einer deutlichen Entzündung in den Vordersträngen und deren Umgebung. Diese letztere Tatsache weist aber wiederum darauf hin, daß wir es bei diesen Versuchen dann doch schon wieder mit recht komplizierten Verhältnissen zu tun haben, mit sekundären Erscheinungen, wie sie Orzechewski auch in einem seiner Amputationsfälle vor sich zu haben glaubte und zur Erklärung besonders hochgradiger Veränderungen, die er in einem seiner Amputationsrückennarbe beobachtete, heranzog.

Was uns am meisten interessieren muß, sind aber nicht die ersten Veränderungen der Zellen, sondern deren späteres Schicksal. Ganz gewiß treten jedesmal wie in den Nervenfasern so auch in den Zellen Reparationsvorgänge auf; das endgültige Schicksal der Zellen aber scheint in der Tat am meisten davon abzuhängen, ob in der Peripherie eine Wiedervereinigung der durchtrennten Fasern stattfindet, d. h. physiologisch gesprochen, ob die Zelle ihre Tätigkeit wieder aufnehmen kann. Ist das nicht der Fall, so scheint nach vergiftlichen Regenerationsversuchen ein ganz allmähliches Kleinerwerden und Verschrumpfen der Zellen einzutreten.

Auch da hat man experimentelle Studien gemacht. v. Gehuchten et Biervilliet entfernten drei Kaninchen den Bulbus und ließen sie je

16, 19 und 21 Monate am Leben; bei zwei von ihnen war der Oculomotorius bei der anatomischen Untersuchung ganz normal, bei dem dritten nach 16 Monaten getöteten fehlte er völlig. Die Differenz blieb ungeklärt. Wir dürfen wohl, die bisherigen pathologischen und experimentellen Erfahrungen zusammenfassend, sagen: Die Durchtrennung des Achsencylinders bewirkt eine rasch eintretende Veränderung in dem Aufbau der „zugehörigen“ Vorderhorn-Ganglienzelle, vielleicht nicht ausnahmslos, aber in der großen Mehrzahl der Fälle. Die Intensität dieser Veränderungen wechselt; wir sind nur zum Teil imstande, dafür zureichende Gründe anzuführen. Diese Veränderungen sind ihrem Wesen nach reparabler Natur. Es tritt jedenfalls in weitem Umfange eine Rückkehr zur Norm ein. Aber über das weitere Schicksal der Zellen ist damit nichts entschieden. Dieses scheint der Hauptsache nach davon abzuhängen, ob eine Wiedervereinigung der getrennten Nerven möglich ist und sich tatsächlich vollzieht. Wo dies der Fall ist, bleiben die Zellen erhalten, wo nicht, verfallen sie einer offenbar sehr langsam fortschreitenden Reduktion aller ihrer Einzelbestandteile (einfache Atrophie). Doch scheint diese unter nicht näher bekannten Bedingungen auch ausbleiben zu können.

Später sind diese Untersuchungen auch auf die Spinalganglienzellen und ihr Verhalten nach Durchschneidung ihrer ventralen und peripheren Fortsätze ausgedehnt worden. Man hat in den Spinalganglienzellen nach Durchschneidung der peripheren sensiblen Nerven Veränderungen nachgewiesen ähnlich den in den motorischen Zellen geschilderten (Darkschewitsch, Flemming, Lagaro, van Gehuchten, Rossin, ich, Kleist, Bumm, Köster). Das sind sehr flagrante Erscheinungen. Schwierigkeiten ergeben sich erst, wenn man das Schicksal dieser veränderten Zellen weiter verfolgen wollte. Die ausgedehnten und auf lange Zeiträume sich erstreckenden Untersuchungen Kösters haben aber auch in dieser Beziehung einige Sicherheit gebracht. In Übereinstimmung mit meinen und Marinescos Feststellungen fand er, daß ein großer Teil der anfänglich veränderten Zellen zunächst wieder zur Norm zurückkehrte. Während ein kleiner Teil in späterer Zeit nach drei Monaten und länger allmählich atrophiert und schließlich ganz zugrunde geht, läßt sich bei der übergroßen Mehrzahl der Zellen nur eine Abnahme ihres Volumens konstatieren, so daß das ganze Spinalganglion erheblich kleiner ist als ein normales (Befund nach 188 Tagen).

In Amputationsläsen wurden die Spinalganglienzellen bisher nur ganz vereinzelt untersucht (Homén, Sano). Definitive Resultate haben diese Untersuchungen bisher nicht ergeben.

Sehr bemerkenswert ist, daß die Durchschneidungen des centralen Fortsatzes zu einem ganz anderen Resultat führen. Lugaro durchschneidet die hinteren Wurzeln, er fand keine Veränderungen in den Spinalganglienzellen nach diesem Eingriff, nachdem schon vorher Bidder, Vejas, Joseph, Singer und Münzer zu ähnlichen negativen Resultaten gekommen waren. Positive Befunde wurden dann aber von Bumm, Kleist und besonders von Köster erhoben. Bis etwa zum 80. Tage sind nach Köster die Spinalganglienzellen der operierten ohne Abweichung von denen der gesunden Seite. Dann aber beginnt eine Atrophie einer zunächst noch geringen Zahl von Zellen, die Zellen werden in allen Teilen kleiner, die Atrophie nimmt etwa bis zum 200. Tage zu, so daß schließlich nur sehr wenige Zellen normale Größenverhältnisse aufweisen; die Zellen sind auch abnorm stark pigmentiert. Zur Atrophie gesellt sich auch eine Degeneration der Zellen und es kommt schließlich zu einer mehr oder weniger ausgedehnten Verödung des Nervenknötens. Das äußere Bild der strukturellen Zellaänderungen ist also nach Durchschneidung der peripheren Nerven und der Hinterwurzeln das gleiche, der Unterschied liegt in dem verschiedenen Eintritt der Degenerationen und in dem Umstand, daß nach Durchtrennung des peripheren Nerven die meisten Zellen sich von ihrer Störung wieder erholen, während nach Durchschneidung der hinteren Wurzel irgendwelche Regenerationserscheinungen nicht stattfinden. Köster schließt daraus auf eine verschiedene biologische Wertigkeit der Hinterwurzel und des peripheren sensiblen Nerven, ein Schluß, der ihm allerdings von anderer Seite bestritten wurde. (Bikelex.)

Die Pathologie schafft in den tabischen Hinterstrangsveränderungen einen Zustand, der sich mit den Durchschneidungen der hinteren Wurzeln einigermaßen in Parallele setzen läßt. Die Frage des Verhaltens der Spinalganglienzellen bei der Tabes ist immer noch nicht entschieden. Die einen fanden in den Zellen auch bei vorgeschrittener Tabes nur relativ geringfügige und irrelevante Alterationen (Schaffer, Juliusburger und Meyer, Maragliano), während Oppenheim und Siemerling, wenigstens in einzelnen Fällen, ebenso Redlich, Thomas und Hauser, Wallenberg, Ströbe und in letzter Zeit besonders auch Bielschowsky mit seiner Fibrillenmethode und Nagette, mehr oder weniger erhebliche Alterationen feststellen konnten, ebenso wie Schaffer, auf dessen Darstellung wir hinweisen. Doch gestatten selbst die positiven Befunde bei der Kompliziertheit der gegebenen Bedingungen keinen sicheren Schluß, erlauben insbesondere keine Entscheidung der Frage, inwieweit sie als sekundäre, durch die Veränderungen der hinteren Wurzeln bedingte aufzufassen sind. Im ganzen scheint mir auch nach den neueren Feststellungen das Mißverhältnis zwischen Hinterwurzel- und Spinalganglienerkrankung noch

immerhin ein sehr großes zu sein und auf eine relative Selbständigkeit dieser beiden nervösen Abschnitte hinzuweisen. Die Differenz gegenüber den experimentellen Befunden könnte auch hier wieder sehr wohl auf die differente Art der experimentellen und pathologischen Schädigung zurückgeführt werden.

Fälle, in denen durch eine Querschnittserkrankung eine aufsteigende Degeneration der Hinterstränge bedingt wurde, sind anscheinend bisher auf das Verhalten der Spinalganglien hin nicht genügend untersucht worden. Derartige Untersuchungen wären sehr wünschenswert. In den unterhalb der Läsionsstelle gelegenen Teilen der Hinterstränge scheinen erhebliche Alterationen nicht beobachtet zu sein.

Damit sind wir dann bereits auf die Frage gekommen, inwieweit die Fasern von der retrograden Degeneration betroffen werden. Bregman hat zuerst Veränderungen in den centralen Nervenstämmen, d. h. also in den mit der Zelle noch in Zusammenhang befindlichen Nervenfasern nachgewiesen, und zwar sowohl an motorischen wie an sensiblen Nerven. Ausgedehntere Untersuchungen dieser Art sind von Pilez, Elsholz, Raimann und besonders auch von van Gehuchten unternommen worden. van Gehuchten fand an den centralen motorischen Nervenstämmen ganz regelmäßig Veränderungen, die er mit der Marchimethode nachwies. Sie folgen der Wallerschen Degeneration im peripheren Stumpf in erheblichem zeitlichem Abstand und sind erst nach 40–50 Tagen deutlich; sie treten also auch erheblich später als die Veränderungen in den Zellen auf. Damit wird die zuerst von Bregman geäußerte Ansicht, daß diese mit Marchi nachweisbare Degeneration ein Folgezustand der collulären Alterationen sei, wahrscheinlich gemacht.

Dafür spricht auch die von mir bei meinen Durchschneidungsversuchen beobachtete Tatsache, daß, während die Zellveränderungen schon am fünften Tage an den Spinalganglien zu konstatieren sind, sichere Veränderungen der hinteren Wurzels und deren intramedullärer Fortsetzungen nicht vor dem 20. Tage deutlich werden. Die Untersuchungen von Redlich wie auch die ausgedehnten Experimente Kösters haben zum selben Ergebnis geführt. Redlich fand Veränderungen in den Hinterwurzeln nach Durchschneidung des peripheren Nerven erst vom 20. Tage an. Köster meist noch erheblich später, nach 60 Tagen in Form von Markscheidenzerfall und Untergang der Nervenfasern. Die individuellen Differenzen waren dabei in einer größeren Untersuchungsreihe sehr erhebliche. Immer ist, auch in meinen und Redlichs Fällen nur ein kleiner Teil der Fasern betroffen.

Köster hat ferner dem Verhalten des peripheren Nerven nach Hinterwurzel durchschneidungen Aufmerksamkeit geschenkt. Auch hier fand er Veränderungen, die noch später sich ausbilden; sie folgen auch hier den Degenerationen der Zellen, meist erst vom dritten bis vierten

Monat nach der Durchschneidung in größerem Umfange sichtbar werdend. Sie beginnen in den sensiblen Nervenendigungen und machen meist schon an den größeren Nervenstämmen halt. Der ganglionäre Anteil der Hinterwurzel degeneriert nach einigen Monaten bis weit in das Ganglion hinein und zwar kommt es hier zum völligen Untergang der Nervenfasern; auch der centrale Stumpf des peripheren Nerven zeigt nach Durchschneidung des letzteren Atrophie der Fasern und einen ziemlich ausgeprägten Markscheidenzerfall; hier kommt es aber nicht zu einem Untergang der Nervenfasern. Die Differenz bemerkt Köster darauf, daß im peripheren Nerven eine Wiedervereinigung der durchtrennten Fasern statthat, in der Hinterwurzel nicht. Er spricht von einer verschiedenen biologischen Wertigkeit der beiden Fortsätze der Spinalganglienzelle; doch sind seine Ansichten nicht ohne Widerspruch geblieben.

Auch Roux und Heitz fanden nach Durchschneidung hinterer Wurzeln Degeneration in den peripheren Verzweigungen nach 240 Tagen, während nach 338 und 382 Tagen nur noch zahlreiche leere Nervenschäiden nachweisbar waren.

Auch pathologische Erfahrungen beweisen, daß Veränderungen im peripheren Nerven in dessen centralen Abschnitten gewisse Alterationen hervorrufen. In einem Falle von traumatischer Abrisung mehrerer Wurzeln des Plexus brachialis konnte Monakow hochgradige Degenerationen in der entsprechenden Rückenmarkshälfte (Vorderhorn, Hinterhorn, vordere und hintere Wurzeln, Randzone der Vorderstränge) beobachten.

Dafür sprechen weiter auch die schon erwähnten Erfahrungen an den Amputation Rückenmarken, die eine Verschmälerung der betreffenden Vorderwurzelfasern erkennen lassen. Auch die hierbei nachweisbare Verschmälerung der in den Hinterstrang eintretenden Wurzelfasern gehört hierher. Neuere Erfahrungen haben dann wiederholt gezeigt, daß bei Erkrankung peripherer Nerven, sei es auf dem Boden der peripheren Neuritis, sei es bei ihrer Zerstörung durch komprimierende Geschwülste, in den zugehörigen hinteren Wurzeln und den aus diesen aufgebauten Hintersträngen eine Degeneration eintreten kann. Freilich sind wir noch weit entfernt alle Bedingungen dieser Degenerationen zu kennen, oft genug wird es sich um nichts anderes gehandelt haben als um eine Ausdehnung der Giftwirkung auf die centralen Teile des sensiblen Nervens wie etwa bei den Rückenmarksbefunden bei der Polyneuritis, in anderen Fällen schien aber in der That eine reaktive durch die Schädigung der peripheren Abschnitte bedingte Läsion der centralen Partien vorzuliegen. Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß diese sogenannten retrograden Degenerationen, denen dieser Name allerdings kaum mit Recht zukommt, da auch sie anscheinend centrifugal sind, keineswegs auf das Gebiet der motorischen

und sensiblen Nervenabschnitte beschränkt sind. Monakow weist darauf hin, daß ausgesprochene derartige Veränderungen nachweisbar sind an den Sehhügeln von höheren Säugern, denen umfangreiche Cortexabschnitte abgetragen wurden; nach Rückenmarksdurchschneidung fand er Veränderungen in den Zellen des Nucleus Deiters. Kohnstamm hat sich in zahlreichen Arbeiten diese Reaktion zur Feststellung des Verlaufes der sensiblen Bahnen zweiter Ordnung und anderer Bahnen bedient. Monakow berichtet über weitere mannigfache Erfahrungen aus allen möglichen Zell- und Fasersystemen; es wäre aber gewiß voreilig, zu sagen, daß eine solche Degeneration immer eintreten muß.

Es gibt dann noch eine weitere Art von Atrophie außer der Wallerschen und der retrograden Degeneration, die man als sekundäre Atrophie zweiter Ordnung oder als indirekte Degeneration bezeichnet. Unter diesem Namen versteht man nach Monakow¹⁾ sekundäre Veränderungen in Fasermassen und auch in Ganglienzellgruppen, die einen eigentlichen größeren Zerfall der nervösen Elemente vermischen lassen, bei denen weder Markschollen noch Körnchenzellen auftreten, die vielmehr dadurch charakterisiert sind, daß die histologischen Elemente qualitativ ihre Form behalten, dagegen in allen ihren Teilen eine deutliche Volumensverminderung verraten. Die Markscheide wird auffallend schmal, der Kern chromatinärmer, das Protoplasma läßt die Mischkörperchen nur undeutlich zum Vorschein kommen. Es handelt sich da um Veränderungen in Fasersystemen oder Fasersträngen, die zwar selbst nicht in ihrer Kontinuität unterbrochen werden, aber im engsten Zusammenhang mit anderen geschädigten Partien stehen. Hierher gehört z. B. die Atrophie der Schleife resp. der Hinterstrangkerns nach ausgedehnten und früh erworbenen Defekten im Scheitellappen des Großhirns, oder die Atrophie der Ganglienzellen im äußeren Kniehöcker nach Enucleation des Auges.

Schaffer hat ganz auf dem Boden der Neurontheorie stehend, diese Degeneration darauf zurückgeführt, daß durch den Ausfall des einen Neurons Veränderungen in dem zweiten funktionell mit ihm in Beziehung stehenden bedingt werden. Er hat diese Dinge insbesondere an zwei Erkrankungsgruppen demonstrieren zu können geglaubt, an der cerebralen Muskelatrophie und an den tabischen Anystrophien. Die Frage der ersteren ist bekanntlich eine viel erörterte und streitige. Sie wurde zuerst genauer von Charcot und seinen Schülern Brissaud und Pitres studiert; später wurden weitere Fälle veröffentlicht von Senator, Quincke, Joffroy et Achard, Eiswiler, Bargherini, Steiner, Darkschewitsch, Kramer, Stricker, Schaffer, Kirchhoff, Petrina, Parhon et

¹⁾ Monakow, *J. u. O.* 8, 46.

Goldstein, Marinesco, Bechterew, Fuchs, Scheidt, F. H. Lewy. In diesen Fällen fand sich im Gegensatz zu dem sonst beobachteten Verhalten eine erhebliche Atrophie in der Muskulatur der gelähmten Körperseite, die nur ganz ausnahmsweise einen degenerativen Charakter hatte (Eisenlohr), in keinem Verhältnis zur Größe der Motilitätsstörung stand und häufig ohne Kontraktur der betroffenen Muskulatur einberging: 8–10 Wochen nach Einsetzen der Lähmung hatte die Atrophie ihren Höhepunkt erreicht, dann blieb sie stationär oder verlor sich in einzelnen Fällen schließlich auch wieder. Dieser frühzeitigen Atrophie stellte man bisher eine Spätatrophie entgegen, die sich erst allmählich entwickelt und nur mäßige Grade erreicht. Über die Pathogenese der Frühatrophy gingen die Meinungen weit auseinander; die einen wiesen ihr einen spinalen Ursprung zu (Charcot, Joffroy et Achard), Schaffer insbesondere glaubte auf Grund genauer mikroskopischer Untersuchungen dreier Fälle, in denen er neben Pyramiden-Seitenstrangdegenerationen zweimal Verkleinerung und Atrophie des Vorderhorns und Abnahme der Zahl seiner Nervenzellen, einmal eine deutliche, nur mit Nadel nachweisbare Erkrankung der Vorderhornzellen fand, behaupten zu können, daß die cerebrale Muskelatrophie stets spinalen Ursprungs und abhängig von einer Vorderhornzellenerkrankung ist. Andere, wie Eisenlohr, Kirchhoff, Quincke, Bergherini vertraten die Ansicht, daß sie von der Läsion gewisser cerebraler Centren abhängig sei. Kirchhoff nimmt sogar bestimmte isolierte trophische Bahnen und Centren an und sucht sie im Nucleus caudatus, im Putamen und in den Teilen der Hirnrinde, die den motorischen Centren nahe liegen. Monakow¹⁾ macht auf die Häufigkeit begleitender sensibler Störungen aufmerksam und betont ferner, daß der Herd in diesen Fällen stets ein sehr großer war, er glaubt eine Erklärung der Erscheinungen in dem gleichzeitigen Ausfall einer großen Anzahl von sensiblen Funktionen einerseits, motorischen und vasomotorischen Funktionen andererseits gefunden zu haben. In den Fällen, in denen nur eine stärkere Atrophie in den Muskeln der hemiplegischen Seite begegnet ist, lagen jedenfalls nach die von Monakow benannten komplizierten Verhältnisse vor.

Ich glaube nicht, daß eine Verallgemeinerung der Schafferschen Befunde zulässig ist. Hier interessiert uns jedoch hauptsächlich der von Schaffer vorgeschlagene Erklärungsversuch, daß die Erkrankung des ersten motorischen Neurons die des zweiten Neurons nach sich zieht. Weitere Beispiele dieser Systemtrophik findet er, wie erwähnt, in der tabischen Amyotrophie, die er als Folge der Erkrankung des sensiblen Protoneurons sich ausbilden läßt. In ähnlicher Weise führt er die Verankerungen in den Vorderhornzellen Ampuligter auf die

¹⁾ Monakow a. a. O. S. 62.

Erkrankung des sensiblen Neurons zurück, so daß sich nach dieser Auffassung die Systemtrophik nicht nur auf homologe (motorisch-motorisch), sondern auch auf heterologe Neurone (motorisch-sensibel) ausdehnt. Weitere Beispiele dieser gegenseitigen Beeinflussung der Neurone findet er in der Degeneration der Pyramidenbahnen bei spinaler Amyotrophie, in welchem Falle die Erkrankung des motorischen Teloneurons eine solche des motorischen Archineurons nach sich zieht, ferner in der Erkrankung der Kleinhirnsseitenstrangbahn und deren Ursprungszellen in den Clarkeschen Säulen, die in seltenen Fällen bei der Tabes auftritt (Oppenheim). Hier bedingt die Erkrankung des sensiblen Protonurons die eines Teils des sensiblen Deuteronurons. Ähnliche Anschauungen hat auch Klippel in einem Aufsatz, der diese Dinge behandelt, kundgegeben.

Es liegen auch einige experimentelle Untersuchungen vor, die eine Klärstellung der hier sich ergebenden Probleme anstreben.

Warrington und Bräuning fanden nach Durchschneidung hinterer Rückenmarkswurzeln erheblichere Veränderungen in den vorderen Wurzeln und ihren Ursprungszellen. Parkon et Goldstein führten an mehreren Versuchstieren gleichzeitig die Durchschneidung des Ischiadicus in der Kniekehle und des Rückenmarks in der oberen Lumbalregion aus; es fanden sich in den motorischen Vorderhornzellen viel schwerere Veränderungen als bei einfacher Durchschneidung des Ischiadicus; es blieben auch die Reparationserscheinungen aus, die nach der einfachen Nervensektion sich regelmäßig einstellen.

Man darf nach allem nicht daran zweifeln, daß der Zustand gewisser nervöser Fasersysteme von Einfluß auf die Trophik von solchen Systemen ist, die mit den erst genannten in engem funktionell-anatomischen Connex stehen. Über die Ausdehnung dieser Beeinflussung ist bisher ein abschließendes Urteil nicht möglich, die Beurteilung muß eine sehr vorsichtige sein. Es ist z. B. durchaus nicht wahrscheinlich, daß in allen von Schaffer angezogenen Fällen wirklich das Verhältnis von Ursache und Wirkung in der Erkrankung der beiden Faser- und Zellgruppen besteht. Es ist vielmehr wohl denkbar, daß in manchen seiner Beobachtungen die beiden Erkrankungsreihen auf einer Ursache beruhen.

Becht einfach ist die Erklärung, die Monakow (a. a. O.) über das Zustandekommen derartiger sekundärer Atrophien zweiter Ordnung gibt. Er sucht die Ursache der Veränderungen in einer stark verminderten Tätigkeit der betreffenden Nerventeile, betrachtet sie daher im wesentlichen als Inaktivitätsatrophien. Daß ihr anatomisches Bild im allgemeinen von dem bei den sekundären Degenerationen beobachteten abweicht, wurde bereits erwähnt. Nach jahrelanger Dauer solcher Atrophien können indessen, wie Henschen gezeigt hat, auch die höchsten Grade der regressiven Metamorphose erreicht werden, und es

kann nach sehr langer Zeit ein völliger Untergang der Elemente eintreten. Im Endresultat braucht also zwischen sekundärer Atrophie erster und zweiter Ordnung ein Unterschied nicht vorhanden zu sein, indem bei beiden schließlich die nervösen Teile untergehen.

Die von Monakow gegebene Erklärung hat natürlich noch Gültigkeit, wenn wir uns nicht auf den Boden der Neurotheorie stellen, sondern nur den allgemeinen Grundsatz im Auge behalten, daß für die ungestörte Ernährung der Gewebeleile deren Funktionieren eine Voraussetzung ist.

Gehen wir nun auf die Erklärung der sogenannten retrograden Degeneration ein, die uns zu wichtigen Problemen über die Trophik des Nervensystems überhaupt leiten wird.

Eine zurzeit weit verbreitete Anschauung geht von der Ansicht aus, daß die trophische Funktion des Nervensystems keine automatische, sondern wie alle übrigen nervösen Funktionen eine reflektorische sei. Im allgemeinen schreibt man Marin^{es}co die Autorschaft für diese Auffassung zu. Er hat in der Tat gelegentlich einer Arbeit über Veränderungen der Nerven und des Rückenmarks nach Amputationen sich in diesem Sinne geäußert: „Der Grund der Entartung (in der Zelle und im zentralen Stumpf) ist offenbar in dem unterbrochenen Zusammenhang zwischen Peripherie und Centrum zu suchen. Man kann sich vorstellen, daß auf Reize in den sensiblen Nervenenden hin in den Spinalganglien biologische Änderungen, wahrscheinlich chemischer Natur, erzeugt werden, die auf die von Ganglienzellen ausgehenden Fasern einen trophischen Einfluß ausüben. Durchschneidet man nun ein Glied oder einen Nerven allein, so treten an die Stelle der normalen Reize von den Nervenendigungen her in Quantität und Qualität davon verschiedene Reize auf, die nicht mehr imstande sind, die Ganglien zu genügender trophischer Tätigkeit anzuregen, daher entsteht die langsame beständig fortschreitende Entartung der abgehenden Nervenfasern. . . . Aus demselben Grunde, aus welchem die centralen Nervenzellstümpfe degenerieren, werden auch die Fasern, welche die Spinalganglienzellen nach dem Rückenmark senden, verändert werden; so erklärt sich die Atrophie in der sensiblen Sphäre dasselbst.“ Marin^{es}co stützt sich dabei noch besonders auf Versuche von Joseph und Gad. Diese Autoren reizten den Nervus vagus des Kaninchens und riefen dadurch reflektorische Atembewegungen hervor, um zu sehen, ob bei dem Durchgang der Erregung durch das dem Spinalganglion entsprechende Ganglion jugulare eine Verzögerung der Reizwirkung eintrete. Dem war in der Tat so, es trat eine Verzögerung ein, die keine andere Bedeutung haben konnte, als daß der Reiz eine gewisse Veränderung des Zustandes der Zelle bei seinem Durchgang durch sie bedingte. Diese könne sich nur auf die trophische Tätigkeit der Zelle erstrecken, da eine andere Funktion dafür nicht denkbar sei. Es sei deshalb wahrscheinlich, daß die Er-

regungen, welche der Zelle zuströmen, zugleich dazu dienen, ihre trophischen Funktionen zu erhalten.

Marinesco ist aber nicht der erste, der die trophische Tätigkeit des Nervensystems als eine reflektorisch bedingte auffaßt. Abgesehen von den oben erörterten Theorien Vulpian's und Weir-Mitchell's — Hemmung resp. Erregung der trophischen Centren durch von der Peripherie kommende Reize — hat Kopp in seinem schon zitierten Werke bereits mehrere Jahre vor Marinesco die trophische Tätigkeit des Nervensystems als eine stets reflektorisch bedingte aufgefaßt, und dieser Auffassung im folgenden eine ganz scharfe Prägung gegeben: „Eine wahre Automatie nervöser Centren ist bis heute nicht erwiesen; so können wir denn vielleicht als letzte Ursache der trophischen wie jeder anderen Funktion des Nervensystems die durch äußere Momente bedingte kontinuierlich wirkende Erregung der peripheren und centralen Endapparate betrachten.“ Und „ich meine, daß die trophischen Funktionen des Nervensystems als gewissermaßen reflektorische Vorgänge aufzufassen sind, und sehe ich in den kontinuierlich von der Peripherie zum Centrum geleiteten Erregungen den letzten Grund der normalen nervo-trophischen Tätigkeit“ (a. a. O. p. 67).

In der Folgezeit ist dann besonders Goldscheider auf diesen Gedanken zurückgekommen und hat ihn zugleich erweitert, indem er betonte, daß die Erregung, die die trophische Tätigkeit der Nervenzellen bedingt, nicht notwendig von der Peripherie herzukommen braucht, sondern ebenso gut vom Centrum stammen kann; es ist auch, wie er weiter bemerkt, nicht notwendig, daß die reflektorische Erregung durch zum Bewußtsein gelangende Reize stattfindet, vielmehr sind auch unter der Schwelle des Bewußtseins verlaufende Reize wirksam, und gerade diese stellen ja die Hauptmasse der Erregungen überhaupt dar. Schon die Pulsweite, die Stoffwechselvorgänge machen leichte Reizungen, ebenso kommen kontinuierlich vom Centrum her solche, und zwar nicht nur bei Ausführung einer aktiven Bewegung, sondern fortwährend, denn fortwährende Innervationsimpulse sind zur Aufrechterhaltung irgendeiner auch der nachlässigsten Haltung des Körpers nötig. Dazu kommen Erregungen, die durch fortwährende Bewegungsvorstellungen ausgelöst werden; kurz und gut ein dauernder, ewig wechselnder Erregungsstrom durchfließt alle Bahnen, sensible und motorische. Alle diese unzähligen Erregungen dienen nun dazu, die trophische Tätigkeit der Zellen anzuregen, ihr Ausfall bewirkt nach dieser Anschauung die geschilderten Veränderungen in der Architektur der Ganglienzellen selbst und der von ihnen ausgehenden Nervenfortsätze.

Lechussek¹⁾ bekämpft diese Anschauung Marinescos und Goldscheiders deswegen, weil deren Ansichten zwar für den speziellen

¹⁾ Lechussek, Der innere Bau des Nervensystems. 1885, S. 122.

Fall der Degeneration nach Amputationen pälten, aber nicht für eine Reihe weiterer Erscheinungen. Nach jahrelangem Bestehen cerebraler Erkrankungen, die eine Lähmung bedingen, sei sie nun organischer oder funktioneller Natur, sind die Vorderhornzellen bekanntlich noch immer in völlig gutem Zustande, obwohl die Aufnahme von Reizen, die ihre Funktion anregen, aufgehört hat. Es wird also nicht jede Beeinträchtigung der nervösen Tätigkeit der Zelle von deletärem Einfluß auf sie sein, sondern gerade nur die Störungen, die durch eine totale funktionelle Kontinuitätsunterbrechung des Fortsatzes hervorgerufen werden. Die Tatsache der Funktionsaufhebung an sich erklärt das Einsetzen von Zellveränderungen nicht. Für die motorischen Zellen erblickt Lenhossek das erhaltende Moment also nicht in dem reflektirischen Einwirken peripherischer oder centraler Reize, sondern im Gegenteil, er glaubt, daß gerade dadurch der Untergang der Ursprungszelle nach Durchschneidung ihres Fortsatzes beschleunigt wird, daß Reflexcollateralen, Pyramidenfasern und andere Fibrillen nach wie vor mit ihren Erregungen diese Zellen bestimmen, daß letztere aber die = empfangenen Impulse nicht abzugeben imstande sind. In der Unmöglichkeit der Reizabgabe liege also das wesentlichste Moment. Im allgemeinen ist für eine jede Zelle die normale Verbindung mit dem Endorgan irgendwelcher Art durch Vermittlung des Nervenfortsatzes Existenzbedingung; funktioniert die Zelle wegen der Abtrennung des Fortsatzes nicht mehr, so leidet auch ihre Fähigkeit, Nahrungsstoffe in sich aufzunehmen, und damit ihre tropische Funktion.

Aber auch gegen Lenhosseks Auffassung sprechen eine Anzahl von Erwägungen. Zunächst liegen die Dinge bei den durch cerebrale Affektion bedingten Hemiplegien doch so, daß hier den Vorderhornzellen auch nach Unterbrechung der Pyramidenbahn noch eine ganze Reihe von Reizen zufließen, teils peripherer, teils centraler Natur, die es erklärlich erscheinen lassen, daß unter Annahme der Goldscheider'schen Hypothese bei cerebralen Lähmungen keine hochgradigen Veränderungen gefunden werden; daß solche leichter Art vorkommen können, zeigen u. a. Schaffers erwähnte Untersuchungen. Daß bei sehr lang dauernden hysterischen Lähmungen Veränderungen in den Vorderhornzellen wohl stets fehlen, halte auch ich für wahrscheinlich, aber hier findet noch mehr als bei den cerebralen organischen Lähmungen eine fortwährende Reizwirkung auf die Vorderhornzellen statt.

Andererseits erklärt, wie Lenhossek behauptet, die Marinesco-Goldscheider'sche Hypothese nicht die retrograde Degeneration im motorischen Nervenabschnitt; denn hier sei zweifellos die Einwirkung peripherer und centraler Reize auf die Zelle dieselbe wie früher. Für diesen speziellen Fall könnten wir also von der Lenhossekschen Hypothese Gebrauch machen, daß eine geregelte und ungestörte Abgabe der empfangenen Reize eine *conditio sine qua non* zur Erhaltung und

Struktur der Zelle bildet. Goldscheider ist in einer späteren wichtigen Arbeit diesem Bedenken, die auch ich (in der I. Auflage dieses Buches) ferner Beifügung geäußert haben, entgegen. Er sagt, ist der motorische Nerv durchgeschnitten, so wird dies zur Folge haben, daß die funktionellen Erregungen der zugehörigen motorischen Nervenzellen sehr bedeutend vermindert werden; da der Erfolg der Reizung fehlt, da das Erfolgsorgan gelähmt ist, eine Bewegung in dem betreffenden Teil nicht möglich ist, so wird auch keine Veranlassung zu Bewegungsimpulsen des betreffenden Körperteiles bestehen. Hierzu kommt, daß die mit der aktiven Bewegung sonst verknüpften centralen Eindrücke der Bewegungsempfindung und der mannigfachen Hautempfindungen, die auf die motorischen Zellen zurückzuwirken pflegen, und die, indem sie über den Verlauf der Bewegung an die psychomotorischen Centren Nachrichten gelangen lassen, zugleich bewegungsregend wirken, gleichfalls fehlen. Auf diese Verminderung der physiologischen Reize schiebt Goldscheider die trophischen Veränderungen der motorischen Nervenzellen; nebenbei betont er noch, daß die Durchschneidung der motorischen Nerven eine Verletzung des Nerven darstellt und daß die Veränderung in der Nervenzelle, die nach der Durchschneidung abfällt eintritt, die Reaktion auf den traumatischen Reiz sein mag.

Aber warum gehen, die Richtigkeit dieser Erwägungen zunächst einmal zugegeben, nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln die Spinalganglienzellen zugrunde, wie Köster's Untersuchungen im Gegensatz zu früheren Anschauungen gelehrt haben. Die Reizaufnahme erscheint in diesen Fällen doch in jeder wichtigen Beziehung ungestört, und doch treten, wenn auch in ganz anderer Form und in relativ sehr langsamem Ablauf, schwere Störungen in dem Erhaltungszustand eines Teiles der Spinalganglienzellen auf.

Es scheint demnach doch der ungestörte Ablauf der Reizabgabe von wesentlicher Bedeutung für die Erhaltung des nutritiven Gleichgewichts der Zelle zu sein. Wir werden demgemäß zu der Anschauung gedrängt, daß jede Störung der Funktion überhaupt, mag sie nun auf der Behinderung der Reizaufnahme oder der Alteration der Reizabgabe beruhen, zu einer Veränderung im anatomischen Aufbau der Nervenzelle führt. Im allgemeinen scheint dabei das spätere und definitive Schicksal der Zelle davon abhängen, ob es sich um eine irreparable oder um eine passagere Störung der Funktion handelt. Es wäre interessant zu untersuchen, ob durch eine Kombination der schädigenden Faktoren (Verhinderung der Reizaufnahme und Abgabe) die deletäre Wirkung für die Trophik der Zelle gesteigert wird, oder vielmehr eine Verzögerung erfährt. Solche Untersuchungen sind an der Spinalganglienzelle unschwer durchzuführen, meines Wissens aber noch nicht ausgeführt worden. Daß Störung der Reizaufnahme und der Reizabgabe in verschiedener Weise einwirkt, lehrt ja das

Beispiel der verschiedenartigen Einwirkung der Durchschneidung der peripheren Fortsätze und der hinteren Wurzeln auf die Spinalganglionzelle. Diese Differenz hängt zunächst sicher nicht von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Reparatur der Fortsätze ab, da ja, man kann beinahe sagen vom ersten Moment des Experimentes an die Differenz in dem Verhalten der Zellen deutlich wird. Das spätere Schicksal der Zellen mag im Sinne von Rikles nicht ganz unbeeinflusst davon bleiben, daß die Bedingungen für die Wiedervereinigung der getrennten Bestandteile beim peripheren Nerven günstiger sind, als bei der hinteren Wurzel. Lugaro hat vor längerer Zeit versucht, die ungleiche Wirkung, die die Behinderung der Reizaufnahme und Reizabgabe auf das trophische Verhalten der zugehörigen Zellen hat, plausibel zu machen, indem er auf die verschiedene physiologische Dignität der beiden Tätigkeiten für die verschiedenen Zellarten hinwies. Das sensible Nervensystem sei mehr auf die Aufnahme der Reize angewiesen, das motorische mehr auf die Abgabe. Die Störung des überwiegenden Anteils der Funktion würde nach Lugaros Ansicht die stärksten Veränderungen der Zellen setzen, während bei Störungen des anderen Teils der Funktion vielleicht nur langsame Alterationen und weniger hochgradige sich einstellen. Diese Theorie ist aber kaum mehr als eine Umschreibung der Tatsachen, und im Hinblick auf ganz spezielle Fälle aufgestellt. Sie bedarf schon jetzt, nachdem wir das Verhalten der Spinalganglion nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln kennen gelernt haben, gewisser Modifikationen.

Aus allen bisher angeführten Tatsachen können wir nur ein Prinzip herausheben, das für uns in dieser ganzen Frage das leitende sein und bleiben muß: die enge Abhängigkeit, die zwischen Funktion und Aufbau der Zelle herrscht. Die Funktion besteht in Reizaufnahme, Verarbeitung und Umsetzung des Reizes und Reizabgabe. Es ist sehr wohl möglich, daß die Störung jeder dieser drei Funktionsabschnitte zu verschiedenen, wohl auch verschieden lokalisierten trophischen Störungen führt. Wir haben eben die Tatsachen, die für diese Annahme sprechen, angeführt. Unsere Kenntnisse sind in dieser Beziehung noch äußerst lückenhaft. Aber das Prinzip im allgemeinen steht fest. Ob wir daneben noch mit der Annahme rechnen müssen, daß die einzelnen Teile einer funktionellen Nerveneinheit, eines Neurons in so innigem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen, daß die Integrität jedes einzelnen Abschnittes für die Aufrechterhaltung des Ernährungszustandes des ganzen von grundlegender Bedeutung ist, erscheint mir recht zweifelhaft. Weder für die Erklärung der Tatsachen, die die sogenannte retrograde Degeneration, noch für die, welche die sekundäre Atrophie betreffen, scheint mir die strikte Aufrechterhaltung des Neuronbegriffes von Bedeutung. Wir müssen, den Tatsachen folgend, auch wenn wir das Neuron als Einheit annehmen, seine verschiedenen Teile

ganz verschieden bewerten, wir kommen nicht mit der Ausnahme aus, daß es für die Integrität des Neurons in jedem Falle notwendig sei, daß auch alle seine Teile vollkommen intakt sind; wir dürfen vermuten, daß die Schädigung morphologisch anscheinend identischer Abschnitte je nach der physiologischen Dignität verschieden wirkt. Diese Tatsachen und, wie ich schon in der ersten Auflage des Buches betonte, Grund genug, uns nicht allzusehr für das Bestehen der Neurontheorie zu engagieren.

Wenn wir in den Ganglienzellen nur dasjenige Centrum sehen, dem eine gewisse Anzahl mit ihm in naher räumlicher und funktioneller Beziehung stehender Fibrillen untergeordnet ist, so werden wir auf Grund dieser Auffassung die uns bekannten Tatsachen bezüglich der Trophik des Nervensystems ebenso gut verstehen lernen, wie auf Grund der Theorie, die die Ganglienzellen mit ihren Fortsätzen als eine abgeschlossene Einheit auffaßt. Wir werden hier wie dort nicht weiter kommen, als daß wir für die einzelnen, physiologisch differenten Teile des Systems die gegenseitigen Erhaltungsbedingungen auf Grund experimenteller Untersuchungen und klinisch-anatomischer Beobachtungen feststellen. Dabei möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen, der bisweilen nicht scharf genug beachtet wird, daß nämlich unter pathologischen Verhältnissen sehr oft insofern wesentlich andere Bedingungen als beim Experiment vorliegen, als hier allmählich ein Nervenelement nach dem anderen zugrunde geht, während bei experimenteller Durchtrennung eine große Anzahl von Nervenelementen plötzlich und zu gleicher Zeit dasselbe Schicksal trifft. Wir sind nicht berechtigt, diesen Differenzen vom vornherein nur den Wert eines Gradunterschiedes zuschilligen, sondern müssen annehmen, daß in ihnen ein wesentlicher Unterschied in bezug auf die Beeinflussung des gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnisses der Teile begründet sein kann, zumal wenn wir noch bedenken, eine wie große Resistenz und Anpassungsfähigkeit gerade das Nervensystem langsam wirkenden Reizen gegenüber zu entfalten imstande ist.

Wir wenden uns nunmehr der Frage zu, in welchem Abhängigkeitsverhältnis die Ernährung der Muskulatur vom Nervensystem steht. Wir können die folgenden Formen der Muskelatrophie unterscheiden: Muskelatrophien bei Läsion der spinalperipheren motorischen Bahn, cerebrale Muskelatrophien, sogenannte arthritische Muskelatrophien, die wohl nur den Einzelfall einer umfassenden Gruppe, der reflektorisch entstehenden Muskelatrophien darstellen, schließlich Inaktivitätsatrophien. Nach der Auffassung mancher Forscher wären dann aber auch noch die primären Myopathien, soweit sie der Erkschen

Dystrophia musculorum progressiva zugehören, hier anzuführen. Auf den ersten Blick scheint gerade auf dem Gebiete der Ernährung des Muskels der trophische Einfluß des Nervensystems ganz klar zu sein. Wenn wir die große Differenz ins Auge fassen, die zwischen dem Ernährungszustande des Muskels besteht, je nachdem ein cerebraler oder ein spinalperipherer Prozeß die motorische Leitungsbahn unterbrochen und das Versagen der Funktion einer bestimmten Muskelgruppe hervorgerufen hat, so werden wir ohne weiteres zugestehen müssen, daß trotzdem die Inaktivität in beiden Fällen anscheinend die gleiche ist, der Ernährungszustand der Muskeln ein durchaus verschiedener bleibt: auf der einen Seite eine rasch eintretende hochgradige, auf der anderen eine nur langsam sich entwickelnde und einen sehr mäßigen Grad erreichende Atrophie. Da, wie schon erwähnt, die Atrophie im ersten Falle nicht durch die Fortsetzung eines krankhaften Prozesses vom nervösen Apparat her auf den Muskel bedingt sein kann, da sie ferner, wie oben gezeigt, auch nicht aus der Untätigkeit des Muskels allein resultiert, so war man stets geneigt, sie darauf zurückzuführen, daß dieser Abschnitt des Nervensystems und insbesondere die motorischen Vorderhornzellen eine trophische Wirkung auf die Muskeln ausüben, und man hat gerade dieses Verhältnis oft als den typischen Ausdruck der trophischen Funktionen des Nervensystems angenommen. Daß aber auch hier komplizierte und schwer entscheidbare Fragen vorliegen, werden wir gleich sehen.

Experimentell sind Studien über die Veränderungen der Muskulatur nach Durchschneidung der peripheren Nerven schon vor langer Zeit vorgenommen worden. Die ersten Arbeiten stammen von Mantegazza, Erb, Vulpian. Später hat Stier nochmals zahlreiche Untersuchungen über diesen Punkt veröffentlicht. Sie fand, daß sehr bald nach Durchschneidung des Nerven, schon nach 1–2 Wochen, eine deutliche Herabminderung des Faserdurchmessers sich einstellt. Es schien, daß bei jungen Tieren dies eher eintrat, als bei älteren, die Abnahme dauerte etwa die ersten fünf Wochen an und wurde dann schwächer. Auffällig und ganz konstant war, daß die Querstreifung sich ungemein lange erhielt, meist bis zum Ende des Versuches, also sechs Wochen bis zwei Monate lang, in späteren Studien fand sich außerdem Vermehrung des Bindegewebes und in manchen Fällen auch Kernvermehrung; degenerative Veränderungen dagegen waren nicht zu konstatieren, doch sagt Stier selbst, daß zur Feststellung eines solchen Befundes die Beobachtungen von zu kurzer Dauer waren, da fettige Degeneration meist erst nach Verlauf mehrerer Monate eintreten pflegt. Stier hat weiter auch das Verhalten der Muskeln nach Exstirpation der Hirnrinde studiert, hier boten sich stets nur sehr langsam fortschreitende, im ganzen sehr geringgradige Veränderungen dar, im wesentlichen nur eine geringe Abnahme des Faserdurchmessers. Sehr bemerkens-

werte Ergebnisse hat Jamin bei seinen experimentellen Untersuchungen erzielt. Er durchschneidet bei Hunden auf der einen Seite den Ischiadicus, auf der anderen Seite die Pyramidenbahnen unterhalb der Cervicalanschwellung. Das am meisten in die Augen springende Resultat ist die Tatsache, daß zwischen den beiden Formen der entstehenden Muskelatrophien keine qualitativen Differenzen nachweisbar waren! er fand auch nach Durchschneidung des Nerven keine degenerative Muskelatrophie im anatomischen Sinne, sondern nur Abnahme des Faser-Volumens, Kernwucherung und Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes resp. Fettgewebes. Die degenerative Form der Muskelatrophie (körnige Degeneration, Fettinfiltration, wachstartige Degeneration) kommt seines Erachtens nur zustande, wenn zu der Untätigkeit oder verminderten Funktion der Muskeln noch eine lokale traumatische oder toxische Schädigung des Muskelparenchyms sich hinzugesellt. Dabei war ein Teil der Versuchstiere Jamins viele Monate am Leben erhalten worden. Schon vor Jamin hatte Levaditi experimentell die Frage nach dem Einfluß der Pyramidenbahnen auf die Ernährung der funktionell zugehörigen Muskeln studiert. Er war zu ganz identischen Resultaten gekommen, indem er hier eine sichere Muskelatrophie fand, die ihrem Wesen nach mit der bei Durchschneidung peripherer Nerven erzielten übereinstimmte, nur quantitativ geringer war.

In den aus der menschlichen Pathologie stammenden Befunden sind die Differenzen zwischen den bei Affektion des spinalperipheren Neurons und bei anderen Affektionen beobachteten Muskelatrophien anscheinend meist viel erheblicher, insofern als bei der erstgenannten Gruppe die degenerativen Veränderungen der Muskulatur viel stärker in den Vordergrund treten. Ob dies in der Tat nur, wie man aus Jamin's Anschauungen schließen sollte, auf akzidentellen Umständen beruht, bedarf wohl noch weiterer Untersuchungen. Immerhin ist man aber auch beim Menschen zu dem Schluß gekommen, daß für die genetisch verschiedenen Formen der Muskelatrophie absolute Unterschiede nicht nachweisbar sind. Auch Lewy ist neuerdings zu demselben Resultat gelangt. In jedem Falle geht es nicht an, aus dem funktionell verschiedenen Verhalten der Muskeln, insbesondere aus dem Fehlen oder Vorhandensein der elektrischen Entartungsreaktion auf anatomische Differenzen zu schließen, wie das Bechterew (l. c. S. 524) auch jetzt noch tut.

Klinisch hat man dann noch eine weitere Form der Muskelatrophie beobachtet, die Inaktivitätsatrophie, die z. B. dann eintritt, wenn durch einen fixierenden Verband eine Extremität ruhig gestellt wird, oder wenn durch irgendwelche Vorstellungen bei hypochondrischen Kranken z. B. ein Glied lange nicht bewegt wird, oder wenn bei den hysterischen Paralyen die Innervationskraft der den Bewegungsvorstellungen entsprechenden Reize nicht intensiv genug ist, um eine

Bewegung auszulösen. Das Vorkommen dieser Atrophie ist freilich bestritten worden. Goldscheider äußert sich zu dieser Frage in folgendem: „Unter den für die Trophik in Betracht kommenden Erregungen spielen die ausgesprochenen aktiven Impulse jedenfalls die geringste Rolle, die kontinuierlichen unter der Schwelle des Bewußtseins verlaufenden sind viel wichtiger, immerhin wird ein dauernder Ausfall der bewußt-aktiven Innervationen doch etwas ausmachen, auch werden bei vielen Fällen dieser Art die unbewußten kontinuierlichen Erregungen infolge passiver absoluter Ruhestellung des Gliedes abgeschwächt werden, so daß ein Übergang zur cerebralen Muskelatrophie gegeben ist. Je nachdem diese Bedingungen mehr oder weniger ausgesprochen sind, wird das, was man schlechthin Inaktivitätsatrophie nennt, mehr oder weniger deutlich hervortreten, daher die Verschiedenheit der Urteile.“

Mit diesen Ausführungen Goldscheiders sind wir bereits in die Diskussion der Frage eingetreten, wie wir uns den Einfluß des Nervensystems auf die Ernährung der Muskulatur zustande kommen denken. Es gehen von der Nervenzelle aus dauernd Erregungsströme auf die Muskelfasern über, die diese befähigen, aus dem umgebenden Nährmaterial das aufzunehmen, was ihrer Erhaltung dient. Die Schwierigkeiten beginnen dann, wenn wir zu entscheiden haben, ob dieser Erregungsstrom identisch mit dem motorischen Innervationsstrom ist oder nicht. Die Frage wird meist in letzterem Sinne beantwortet; indem man nämlich auch hier wieder den Unterschied zwischen cerebraler und spinalperipherer Muskelatrophie heranzieht, schließt man, daß da bei beiden Arten der Atrophie der motorische Innervationsstrom fehlt, und trotzdem das Resultat so verschieden ist, die Ganglienzelle des Rückenmarks neben ihrer motorischen noch eine besondere trophische Funktion ausübt. Andere haben das bestritten. So sagt Ferri: „Die totale Muskelatrophie oder besser der Muskeltod nach Zerstörung der motorischen Nerven oder ihrer sogenannten Kerne scheint mir bloß zu beweisen, daß der Muskel ohne tonische Erregung, also völlig untätig, nicht bestehen kann. Besonders trophische Eigenschaften der motorischen Nervenzelle anzunehmen, scheint mir zur Erklärung dieser Tatsache ebenso überflüssig, als zur Erklärung der Tatsache, daß eine gewisse Temperatur für diese oder jene Tierart letal ist.“ In der Tat besteht ja auch zwischen dem Muskel, der nicht willkürlich bewegt werden kann, weil die Leitung vom Gehirn her unterbrochen ist, und dem, der nicht funktioniert, weil sein peripherer Nerv durchgeschnitten ist, ein sehr großer Unterschied in bezug auf den Innervationsausfall.

Im ersten Fall wirken keine Willkürreize mehr auf den Muskel ein, während zahlreiche andere Reizwirkungen noch vorhanden sind; so wirken in voller Stärke die reflektorischen Reize von den sensiblen Bahnen her, und es üben, wenigstens für lange Zeit, die degenerierenden

Pyramidenbahnen Innervationen, wenn auch pathologischer Art, aus. Demgegenüber ist der Muskel bei peripherer Lähmung vollkommen ernerviert, und seine völlige Inaktivität macht sich funktionell durch eine schlaffe Lähmung gegenüber der spastischen im ersten Fall bemerkbar. Es fehlen ihm nicht nur die Willkürreize, sondern auch die unbewußten reflektorischen Reize, und ferner ist wenigstens in der Regel die Ernährung dadurch geschädigt, daß mit der Unterbrechung der peripheren Bahn auch die Vasomotoren in Mitleidenschaft gezogen sind. Inwieweit der letztgenannte Umstand für die Muskelatrophie verantwortlich zu machen ist, ist zurzeit noch nicht sicher zu entscheiden. Ganz ohne Einfluß werden Störungen des Blutzuflusses nicht sein. Es scheint sogar, als ob geringfügige einfache Muskelatrophien allein durch vasomotorische Störungen hervorgerufen werden könnten. Beispiele dafür finden sich weiter unten im Kapitel Raynaudsche Krankheit. Luzzato hat in einer eigenen Arbeit über vasomotorische Muskelatrophie diese und ähnliche Beobachtungen zusammengestellt. Ich erwähne ferner an die sogenannten ischämischen Muskellähmungen, bei deren Entstehung allerdings Nervenschädigung auch oft eine Rolle zu spielen scheint (Lapinsky), und an die Tatsache, daß wo im Anschluß an ererbte Herde frühzeitige Muskelatrophien auftreten, die vasomotorischen Bahnen, wie aus den klinischen Begleiterscheinungen hervorgeht, meist mitbetroffen zu sein scheinen. Die Vasomotorenlähmung mag daher bei den spinalperipherischen Muskellähmungen auch mit in Rechnung gezogen werden.

Leyden-Goldscheider¹⁾ machen darauf aufmerksam, daß in diesem Zusammenhang auch die Angabe Cl. Bernards von Wichtigkeit ist, daß nach Durchschneidung des motorischen Nerven das Blut fast mit demselben Sauerstoff- und Kohlensäuregehalt aus der Muskulatur abfließt, wie es arteriell zuströmt, während sonst auch ohne Kontraktion der Muskeln ein Sauerstoffverbrauch stattfindet.

Daneben wäre die Annahme wohl berechtigt, daß die Verschiedenheiten der Muskelatrophie bei Inaktivität, bei cerebraler und bei peripherer Lähmung nicht auf einer besonderen trophischen Funktion des Nervensystems beruhe, sondern nur auf den quantitativen Unterschieden des Innervationsdefektes, der sich notwendig bei den verschiedenen Formen der Atrophie ergibt.

Nun gibt es noch eine weitere Art von Muskelatrophien, aus deren Pathogenese wir vielleicht einiges Material zur Entscheidung der uns beschäftigenden Frage entnehmen können, ich meine die arthritischen Muskelatrophien. Ihre klinische Erscheinungsweise ist bekannt: bei Gelenkleiden finden wir sehr häufig eine Atrophie derjenigen Muskeln, die in der Nähe des erkrankten Gelenkes liegen. Es sind fast ausnahmslos

1) Leyden-Goldscheider, a. a. O. S. 94.

die Streckmuskeln der Gelenke, die der Atrophie verfallen, nur selten und weniger hochgradig werden zuweilen auch die Biegemuskeln ergriffen. Die Atrophie tritt sehr rasch ein, schon nach 1–2 Tagen kann sie sich andeuten und nach 8–10 Tagen und selbst auch schon weit früher schon soweit entwickelt sein, daß das Zentimetermaß einen deutlichen Unterschied gibt.

Am stärksten tritt die Atrophie bei Affektionen des Kniegelenkes im Quadriceps auf; ähnlich sehen wir bei Schultergelenkerkrankung den Deltoides, den Supraspinatus, den Infraspinatus befallen werden. Die elektrische Erregbarkeit ist herabgesetzt, aber ohne qualitative Änderungen, die Reflexerregbarkeit kann erhöht sein. Die anatomische Untersuchung ergibt nur eine einfache Muskelatrophie, eine Verschmälerung der Fasern, aber keine Kernvermehrung und keine Verfettung. Die Untersuchung des centralen Nervensystems lieferte beim Menschen stets negative Resultate und bei Experimenten, die von Duplay et Cazia angestellt wurden, erhielt man das gleiche Resultat auch beim Tier, nur die artikulären Nervenendigungen des Cruralis waren degeneriert.

Die Pathogenese dieser Atrophien ist Gegenstand vielfacher Diskussionen gewesen. Man erklärte sie zunächst für einfache Inaktivitätsatrophien. Die Kranken vermeiden jede Bewegung, die Folge ist ein Nichtgebrauch des Gliedes und die Atrophie. Diese Annahme kann nicht richtig sein, obwohl sie noch vor nicht langer Zeit von Sulzer verteidigt worden ist und auch jetzt wohl noch Anhänger hat. Er fand, daß bei Ankylosen für die Atrophie der Muskeln nur das Maß ihrer Inaktivität in Betracht kommt; die durch das Gelenkleiden ganz inaktivierten sind demgemäß am stärksten atrophisch. Aber die Atrophie tritt für eine Inaktivitätsatrophie viel zu rasch auf, und sie erreicht viel zu hohe Grade, als daß wir sie auf einfachen Nichtgebrauch zurückführen können. Saben wir doch eben, daß das Vorkommen einer solchen Atrophie sogar direkt bestritten wird, und daß bei cerebralen Atrophien die Abnahme des Muskelvolumens meist nur unbedeutend ist. Andere Erklärungsversuche sind nicht weniger unhaltbar, so die mechanische Theorie Roux, die die Atrophie auf den Druck des Gelenkergusses auf die Muskeln zurückführt, oder die Brown-Séquards, der, seiner Allgemeintheorie folgend, auch hier Vasomotorenreizung annimmt. Man hat weiter an eine Myositis gedacht, die vom Gelenk auf die Muskeln sich ausgebreitet hätte. Hoffa hat anfangs gemeint, es könnte sich um eine direkte, durch Resorption des pathologischen Gelenkinhaltes entstehende Vergiftung des Muskels handeln, doch hat er später diese Annahme zurückgezogen. Auch eine ascendierende Neuritis ist supponiert worden, doch fehlt die anatomische Begründung, und Duplay et Cazia fanden bei ihren direkt darauf gerichteten Untersuchungen keine Veränderungen der peripheren Nerven. Die einzige Theorie, die

sich eine allgemeine, wenn auch nicht unbestrittene Geltung zu verschaffen gewußt hat, ist die Reflextheorie. Ihr Schöpfer ist Vulpian; Charcot und die meisten Franzosen haben sie lebhaft unterstützt. Vulpian nimmt an, daß durch die Gelenkaffektion die artikulären Nervenendigungen gereizt werden, daß dieser Reiz sich spinalwärts fortpflanzt und auf die Gangbrenzellen der Vorderhörner einwirkt, wo er eine dynamische Veränderung erzeugt, deren Resultat dann die Muskelatrophie ist. Raymond hat versucht, dieser Theorie eine experimentelle Stütze zu geben. Er durchschnitt bei Hunden auf einer Seite die hinteren Rückenmarkswurzeln der drei letzten Äste des Plexus lumbalis, erzeugte dann eine Entzündung des Kniegelenkes auf dieser Seite und fand, daß sich keine Muskelatrophie entwickelte, wie er annahm, weil der Reflexbogen, auf dem der sie sonst auslösende Reiz sich fortpflanzen mußte, durchgeschnitten war. Hoffa hat diese Experimente wiederholt und kam zu demselben Resultat, er hat sogar den Versuch so modifiziert, daß er an beiden Kniegelenken eine Entzündung erzeugte und nur an einem die hinteren Wurzeln durchschnitt. An diesem Bein fehlte die Atrophie des Quadriceps, am anderen war sie vorhanden. Auch bei Annahme dieser Theorie macht die Frage Schwierigkeiten, warum gerade die Extensoren befallen werden, immerhin scheint die Reflexhypothese mir die einzig beachtliche zu sein, und wir würden bei ihrer Annahme in der Tat zu der Voraussetzung gezwungen sein, daß die Vorderhornzellen neben ihrer sonstigen Funktion noch die einer trophischen Erregung der Muskelsubstanz haben. Für unseren speziellen Fall wäre die Annahme zu machen, daß die Abschwächung der nutritiven Funktion nur auf einer dynamischen, nicht auf einer anatomisch nachweisbaren Störung der Vorderhornzellen beruhe. Wir würden dann ein ganz ähnliches Verhalten anzunehmen haben, wie das ist, welches Erb in den Vorderhornzellen bei der Dystrophia muscul. progressiva supponiert.

Eine neuerdings mitgeteilte sehr interessante Beobachtung Schlesingers ist ebenfalls kaum anders als durch die Annahme einer reflektorisch bedingten Störung der nutritiven Funktionen der motorischen Vorderhornzellen zu deuten. Bei einem an Hydrops articularum intermittens leidenden Mann trat unmittelbar nach einem das Kniegelenk betreffenden Anfall eine Abmagerung der Oberschenkelmuskulatur ein, von der Schlesinger sich durch Messung überzeugen konnte. Der Kranke galt an, daß eine gleiche Atrophie aus gleichem Anlaß schon mehrfach sich ausgebildet hatte. Im Gelenk lag ein entzündlicher Prozeß nicht vor; eine Inaktivitätsatrophie konnte nicht angenommen werden, da der Kranke das Bein zuweilen bewegte; zudem dauerte der Gelenkerguß nur wenige Tage, dann konnte das Bein sogar völlig normal gebraucht werden. Die Atrophie dagegen, die weder von funk-

tionellen noch elektrischen Veränderungen begleitet war, schwand erst nach Monaten. Kolbe hat einen ähnlichen Fall berichtet.

Von großer Wichtigkeit für die Entscheidung dieser Fragen scheinen mir Fälle zu sein, in denen nach einem eine Extremität treffenden Trauma, das nicht zu schwereren Gelenkveränderungen, auch nicht zu längerer Inaktivität führt, wohl aber heftige sensible Reizerscheinungen und meist auch vasomotorische Störungen hervorruft, eine allmählich fortschreitende Atrophie der betroffenen Extremität sich anbildet; diese erstreckt sich aber nicht allein auf die Muskeln, sondern auch auf das Fett- und Bindegewebe und geht mit radioskopisch nachweisbaren Knochenveränderungen einher. Ich werde später ausführlicher auf diese Fälle eingehen, die mir von großer allgemein-pathologischer Bedeutung zu sein scheinen, weil bei ihnen die trophischen Störungen ganz in den Vordergrund treten, alle anderen funktionellen Alterationen demgegenüber wenig ausgeprägt sind, und weil sie auf diese Weise die Unabhängigkeit trophischer von funktionellen Veränderungen im engeren Sinne darzustellen recht geeignet sind. Auch bei ihnen muß wie bei den arthritischen Muskelatrophien gemäß ihrer Entstehung mit einer reflektarisch bedingten Genese gerechnet werden.

Das auf den vorhergehenden Seiten zusammengestellte Material soll uns zur Beantwortung der Frage dienen, ob die Ernährung des Muskelgewebes in direkter, enger Abhängigkeit von gewissen Strukturen des Nervensystems steht, — dafür kommen nach allem nur die Vorderhornanglienzellen in Betracht —, oder ob die beobachteten Muskelatrophien nur dem Maße der Abnahme der Funktion resp. der auf das Muskelgewebe einwirkenden Reize entsprechen.

Die Mehrzahl der Forscher steht jetzt wohl auf dem Standpunkt, daß allein die Störung des funktionellen Zusammenhanges in seinen verschiedenen Abstufungen für die muskelatrophischen Störungen in Frage kommt. Funktions- und nutritive Impulse sind nach dieser Auffassung identisch (Bechterew, Levaditi usw.).

Leyden-Goldschneider nehmen eine Trennung der nutritiven Fähigkeit und der funktionellen Erregung an, stützen sich dabei aber auf die an einem anderen Gewebe gemachten Erfahrungen. Entscheidend ist für sie das Verhältnis bei den sensiblen Nerven, bei welchem die Richtung der funktionellen Erregungsleitung derjenigen Richtung entgegengesetzt ist, in welcher sich der trophische Einfluß des Spinalganglions geltend macht, wie wir oben schon erwähnt haben. Diese Tatsache ist naturgemäß bemerkenswert, weil in ihr das Prinzip der getrennten Leitung funktioneller und nutritiver Impulse enthalten ist; doch ist ein bindender Rückschluß auf das Verhältnis des Nervensystems zur Ernährung des Muskels daraus kaum abzuleiten. Sehen wir uns nach anderen Beweisen für die Trennung der beiden Tätigkeiten um, so dürfen wir trotz der zunächst so stark in den Vordergrund tretenden

Differenzen in der Art der Atrophie aus diesen Unterschieden kaum weitgehende Schlüsse ziehen; denn wie aus den Experimenten hervorgeht, scheint im prinzipiellen Charakter der Atrophie anatomisch kein Unterschied zu bestehen. Und die Differenzen des Verhaltens in bezug auf die elektrische Erregbarkeit dürfen um so weniger als Beweismittel herangezogen werden, als wir über ihre Genese nur wenig sicheres wissen.

Erklärt nun aber die rein quantitative Differenz der auf den Muskel bei den verschiedenen Lähmungen (cerebrale, peripherospinale, arthritische resp. reflektorische und psychogene) einwirkenden Reize die Differenzen der Atrophie? Das wird vielfach behauptet, aber doch ohne zureichende Begründung. Zum mindesten — und das müssen auch die Anhänger dieser Theorie zugeben — muß dann den verschiedenen Reizen eine sehr verschiedene Wichtigkeit für die Aufrechterhaltung der Trophik zugesprochen werden. Das Fehlen von Willkürreizen bei unbegrenzt langdauernden cerebralen Lähmungen kann so gut wie vollkommen einflußlos bleiben. Die Atrophien bei alten Hemiplegien, wo von einem, wenn auch pathologischen Reiz der Pyramidenbahn kaum noch die Rede sein kann, halten sich in sehr bescheidenen Grenzen; und dabei ist noch immer auf die häufig diese Lähmungen begleitenden Gelenkveränderungen und die in ihrem Geleite auftretenden Atrophien Rücksicht zu nehmen. Bei einem Fall von seit 25 Jahren andauernder absoluter psychogener Lähmung beider Beine sah ich anderswärts keine Spur von Atrophie der Muskeln. Das deckt sich mit den oben angeführten Goldscheiderschen Ausführungen über die verschiedene Wichtigkeit der einzelnen Reizarten für die Trophik. Durch Einführung dieses Momentes ist die Frage aber bereits erheblich kompliziert.

Es gibt nun aber Krankheiten, in denen gerade bei intakter Willkürbahn diese übrigen Reizarten sehr stark vermindert, zum Teil aufgehoben sind, das sind die mit Erkrankung der hinteren Wurzeln einhergehenden Affektionen, insbesondere die *Tubes*. Sollte man nicht erwarten, daß es nun hier, wo häufig alle reflektorischen Reize, mögen sie vom Muskel, vom Gelenk, von der Haut ausgehen, fehlen, schwere Muskelatrophien eintreten. Nun ist es ja wohl richtig, daß bei der vorgeschrittenen *Tube* die Ernährung der Muskeln Schaden leidet, aber doch meist nur in beschränktem Umfang, wie aus dem Erhaltenbleiben der groben motorischen Kraft hervorgeht. Wo nicht komplizierte Verhältnisse vorliegen (Vorderhornkrankung, periphere Neuritiden) kommt es nicht zur Lähmung, auch nicht zu vorgeschrittener Atrophie, sondern nur zu Zuständen extremer Hypotonie und Schwellheit, die eine Atrophie wohl vortäuschen können.

Trotzdem dem Muskel hier also die Mehrzahl aller anderen Reize außer dem Willkürreizen entzogen ist, bleibt sein trophischer Zustand

ein leidlich guter. Vorausgesetzt nur, daß die von der Vorderhornzelle ausgehenden Innervationsströme nicht aufhören. Das gibt doch immerhin zu Bedenken Anlaß, wenn ich auch nicht verkennen will, daß auch in diesem Punkt eine Vermehrung und Konsolidierung unserer Kenntnisse von großer Wichtigkeit wäre. Schließlich erwähne ich nochmals das Verhalten bei der atrophischen und den übrigen Formen von reflektorischer Muskelatrophie und die dafür oben gegebene Erklärung.

Diese Erwägungen bestimmen mich dazu, als sehr wahrscheinlich anzunehmen, daß die Vorderhornzellen auf die Muskulatur die sie motorisch innervieren, auch noch eine nutritive, von dem übrigen funktionellen Einfluß getrennte Wirkung ausüben.

Der Vollständigkeit halber wollen wir noch erwähnen, daß Gaule in seinen Versuchen über die trophischen Centren der Muskulatur zu vollkommen abweichenden Resultaten gekommen ist. Er fand solche Centren nämlich in bestimmten Ganglien des Sympathicus, und er glaubte feststellen zu können, daß der Reiz, der die betreffenden Zellgruppen des Sympathicus traf, von dort durch die Rami communicantes und durch die Spinalganglien zum Rückenmark geleitet wird. Über die weitere Leitung konnte nichts Sicheres ermittelt werden. Es zeigte sich nur eine direkte trophische Abhängigkeit der Muskeln derart, daß, wenn Gaule z. B. eine bestimmte Ganglienzellgruppe im Ganglion cervicale inferius reizte, er in den beiden *Musculi psoas* und *iliopsoas* sofort einen Gewebeerfolg erhielt. Wir brauchen auf diese sonderbaren Resultate nicht weiter einzugehen; von physiologischer Seite (Hering) ist Gaule entgegengehalten worden, daß seine Muskelveränderungen mechanisch durch die Befestigung des Tieres bei der Operation entstanden; außerdem widersprechen seine Resultate so sehr allen unseren klinischen Erfahrungen, daß wir von ihrer Verwertung absehen müssen.

Über den Einfluß des Nervensystems auf die Ernährung des Knorpelgewebes sind experimentelle Untersuchungen schon mannigfaltig angestellt worden; die Resultate gehen weit auseinander. Schiff fand drei bis sechs Monate nach Durchschneidung der Nerven an der hinteren Extremität ein geringeres Volumen der Knochen, eine weitere Markhöhle und eine Verdickung der Knochenhaut. Nach 1—1½ Jahren fand er dagegen an gewissen Stellen Knochenverdickungen; die späteren Beobachter (Nasse, Kassowitz, Mantegazza u. a.) erhielten widersprechende Resultate. Nasse und Kassowitz sahen Verlängerung und dabei zum Teil Abnahme der anorganischen Bestandteile. Mantegazza und Nasse fanden wie Schiff Verdickung der Knochen. Wilno Edwards sah nach Durchschneidung des einen Nervus maxillaris inferior eine Hypertrophie der betreffenden Kieferhälfte. Neuere Unter-

zunahmen stammen von Kapsammert; dieser konnte eine Verlängerung der Knochen an der operierten Seite nicht finden, berric. er fand unter 12 Fällen nur einmal eine solche von 1,5 mm am 7. Tage nach der Operation; er glaubt, daß diese Differenz noch in die Breite der physiologischen Abweichungen falle. Das gleiche nimmt er für die vier Fälle seiner Versuche an, wo eine größere Dicke einer Diaphysenwand zu finden war, denn er fand sie schon fünf Tage nach der Durchschneidung, sie war ganz gleichmäßig und es fehlte schließlich jede Veränderung des Periostes und des Markgewebes. Weiter fand er dreimal periostale Auflagerungen; er erklärt diese so, daß durch Traumen eine Entzündung der Knochenhaut hervorgerufen wird, die ihrerseits die periostalen Knochenneubildungen bewirkt. In einem seiner Fälle zeigte die Sektion in der Tat auch eine blutige Durchtränkung der Knochenhaut. Schließlich fand er zweimal nach Durchschneidung der Nerven eine Volumensabnahme in den Diaphysenwänden, von der er nicht sicher angehen kann, werauf sie zurückzuführen ist. Auch Ghillini fand in seinen Versuchen keine Verlängerung des Knochens nach Durchschneidung des Nervus ischiadicus, wenigstens wenn er die Tiere frei herumlaufen ließ, eher konnte er einige Male eine Verkürzung des Beines konstatieren. Magni sah nach Durchschneidung des Ischiadicus beim Kaninchen Bruchigkeit und Zurückbleiben des Wachstums der Knochen des betreffenden Gliedes. Abraham hat ähnlich wie Edwards eine Durchschneidung des Nervus mandibularis vorgenommen und zwar bei Kaninchen im Alter von 8–10 Tagen und im Alter von 3 Monaten. Er hat im ganzen 40 Tiere operiert und sie nach 1, 2 und 3 Monaten getötet. Er untersuchte den Einfluß dieser Operation auf das Wachstum und die Ernährung der unteren Schneidezähne und berücksichtigte die histologischen und chemischen Verhältnisse. Es war keine irgendwie geartete Einwirkung festzustellen.

Veruthe bei Katzen zeigten Stood, daß auch auf das Wachstum nur zagelegter Zähne ein Einfluß durch diese Durchschneidung nicht ausgeübt wird, dagegen fand dieser Autor, wie nebenbei bemerkt sein mag, danach Geschwürsbildung an der Unterlippe; Abraham konnte solche Operationen nur bei älteren Tieren nachweisen, wo sie dem zweiten Schneidezahn gegenüber lagen, und sie traten auch bei älteren nicht auf, sobald er den zweiten Schneidezahn entfernt hatte. Diese Geschwüre haben demnach wahrscheinlich eine mechanische Entstehungsursache. Breubacher glaubte beim Hund nach Excision des N. mandibularis einfache Atrophie der Zahnpulpa nachweisen zu können; es war keinerlei Entzündung vorhanden; so daß der Autor einen direkten trophischen Einfluß annimmt. Langelaan fand nach Durchschneidung des N. alveolaris mikroskopische Veränderungen, die er als chronische Asphyxie des Pulpagewebes zusammenfaßt. Er hat dann auch die Entstehung von Ulcera neuroparalytica

nach Nervendurchschneidung in diesem Gebiet studiert; die bei Durchschneidung des Infraorbitalis auftretenden Geschwüre sind auch nach seinen Anschauungen nicht als rein trophische aufzufassen, auch dort nicht, wo es experimentell gelang an Stelle der Nervendurchschneidung mehr die Bedingungen einer Nervenreizung (Neuritis) zu realisieren. Girard glaubt nachgewiesen zu haben, daß nach Durchschneidung der sensiblen Quintuswurzel Atrophie der Gesichtsknochen auf der betreffenden Seite entsteht, und führt sie auf die Ausschaltung hypothetischer trophischer Fasern des Quintus zurück. Ähnliche Resultate erhielt Schiff. Auf andere Weise hat Curcio das Problem zu lösen gesucht; er brachte bei Kaninchen den Femur oder den Humerus durch Abschälen des Periostes zur Nekrose und fand 3 Wochen später bei der Untersuchung des Rückenmarks mit Nissl's Methode Chromatolyse der Zellen in der betreffenden Anschwellung, selten kombiniert mit Verlagerung des Kernes. Betroffen war immer nur eine Zellgruppe in der Nachbarschaft des Centralkanals, in der Nähe des Tractus intermediolateralis, alle übrigen Zellen waren stets frei; in den erwähnten Zellen suchte Curcio das Centrum für das Knochenwachstum. Daß aber gerade die Beurteilung dieser Zellen besondere Vorsicht erfordert, wurde bereits einmal erwähnt.

Die Ausbeute, die uns diese experimentellen Erfahrungen ergeben, ist sehr gering, wir werden auf sie die Annahme der Abhängigkeit des Knochenwachstums vom Nervensystem nicht gründen können.

Ergiebiger sind die pathologischen Erfahrungen. Das bekannteste Beispiel ist das Zurückbleiben des Knochenwachstums bei der spinalen Kinderlähmung. Bei dieser Krankheit hat man in seltenen Fällen sogar auch das Gegenteil, ein verstärktes Längenwachstum gefunden (Seeligmüller). Es gibt auch einige Erfahrungen über Störungen des Knochenwachstums nach Läsionen peripherer Nerven. Arnoux erwähnt eine Arbeit von Avezou (*Confusion des troncs nerveux du bras*, 1879, Thèse), der mehrere derartige Fälle gesammelt hat, Lobstein, Ogle, Bauchut haben ebenfalls Ähnliches beschrieben. Remak¹⁾ bemerkt, daß nach schweren, ungeheilten Nervenverletzungen im frühen Kindesalter bei fortdauernder Lähmung eines Gliedes auch dessen Knochenwachstum zurückbleiben könne, das kann z. B. nach schwerer Entbündungslähmung eintreten. Daß beim Erwachsenen lediglich von einer peripherischen Neuritis abhängig eine Knochenveränderung sich ausbilden kann, wie sie die rarefizierende Osteitis darstellt, davon ist Remak nichts bekannt; nur ganz vereinzelt soll durch Neuritis eine partielle Hypertrophie der Epiphysen hervorgerufen worden sein. Doch erwähnen schon Gayet et Bonnet einen Fall von

¹⁾ Remak, Neuritis und Polyneuritis. Nethangels spezielle Pathol. und Therapie, XI, 3, S. 116.

Blum: bei der Autopsie eines Mannes, der 7 Jahre vorher eine Kontinuitätstrennung des N. medianus erlitten hatte, fand sich ein Neurom des zentralen Endes des N. medianus; die Knochen waren verkleinert rarefiziert und mit rotem Mark gefüllt. Es hatte hier die Reizung des zentralen Endes des Nerven die tropische Störung hervorgerufen.

Einige wenige neuere Erfahrungen zeigen sehr deutlich, daß gelegentlich nach traumatischen Läsionen peripherer Nerven schwere Knochenveränderungen auftreten können. Einen Fall hat Hirsck mitgeteilt. Nach einer Glasscherbenverletzung des rechten N. medianus über dem Handgelenk bildete sich neben den entsprechenden motorischen und sensiblen Störungen ein auf Druck sehr schmerzhaftes Neurom an der Verletzungsstelle. Die Endglieder des Zeige- und Mittelfingers waren verkürzt, die Nägel beider Finger zu Rudimenten entartet. Eine weitere wichtige Beobachtung verdanken wir Goldscheider. Sein Patient hatte 16 Jahre zuvor eine Anschießung des linken Oberarmes erlitten, allmählich hatten sich die jetzt bestehenden Ernährungsstörungen eingestellt. Die Hand steht in Krallenstellung, die Haut ist glatt, glänzend, kühl, bläulich. Die Endglieder der Finger sind zugespitzt, die Nägel fehlen mit Ausnahme des Daumennagels. Die Untersuchung mittels Röntgenstrahlen ergibt sehr bedeutende Schrumpfung der Nagelphalangen, geringere Verkürzung und Verschmälerung der mittleren Phalangen, die Größenverhältnisse der Grundphalangen sind nicht verändert, doch ist ihre Struktur alteriert. Es besteht eine atrophisch-degenerative Parese im Ulnaris- und Medianusgebiet der Hand, außerdem sensible Störungen in ersterem. Die linke A. brachialis ist kleiner, der Radialpuls links kaum fühlbar. Ich habe einen ähnlichen Fall in meiner Neuritis und Polyneuritis in der „Deutschen Klinik“ kurz erwähnt. In allen diesen Fällen bestand, wie man sieht, die Verletzung des Nerven nicht in völliger Durchtrennung. Gleiche pathogenetische Bedingungen liegen für die bei Lepa beobachteten Knochenveränderungen vor, oder wenigstens für einen Teil derselben. Deycke-Pascha (zit. nach Goldscheider) fand bei Untersuchung mit Röntgenstrahlen ganz ähnliche Veränderungen wie Goldscheider in seinem Fall.

Viel häufiger sind Knochenkrankungen bei zentralen Nervenkrankungen. Samuel hat zunächst die abnorme Knochenbeteiligung bei Paralytikern und anderen Geisteskranken als neurotisch bedingt hinstellen versucht. Ueber den letzten Punkt hat Meyer vor nicht langer Zeit eine Untersuchung angestellt. Er wies diese Fragilitas ossium histologisch als durch einfache Atrophie hervorgerufen nach und spricht sich über ihren angeblich tropischen Charakter sehr zurückhaltend aus, er ist vielmehr geneigt, das Hauptmoment, wenn nicht sogar das ausschließliche, in dem hochgradigen Marasmus zu finden, den solche Kranken darbieten. Zu erwähnen sind hier ferner die spontanen Frakturen bei der Tabes, die auf eine rarefizierende Osteitis zurück-

gefährdet werden. Bei der Tabes kommt ferner ein schmerzloses Ausfallen der Zähne vor; es ist versucht worden, eine Degeneration der spinalen Trigeminuswurzel dafür verantwortlich zu machen, doch ist diese Annahme nicht aufrecht zu erhalten, da bei totaler beiderseitiger Degeneration der Wurzel Zahn- und Kieferveränderungen fehlen können. Ziemlich häufig kommen im Verlaufe der Syringomyelie Knochenveränderungen vor. Es kommt da zur Nekrose von Knochen, besonders an den Fingerphalangen, seltener scheint ein einfaches Kleinerwerden resp. ein Verschwinden von kleinen Knochen zu sein, ohne daß eitrige Prozesse, nekrotische Knochenkrankung usw. vorausgegangen wären. Am häufigsten findet sich das noch bei dem Morvansthen Typus. Todesco hat ausführliche Untersuchungen in elf Fällen angestellt; er betont das Zusammenkommen mit angioneurotischen Symptomen. Die Röntgenuntersuchung ergibt das Bild der chronischen Knochenatrophie, gleichmäßige Aufhellung des Knochenstoffs an der Diaphyse und den Epiphysen. Daß Ähnliches bei der Sklerodermie eintreten kann, werden wir später feststellen können. Auch Vergrößerungen gewisser Knochen, besonders auch wieder an der Hand, sind beobachtet worden. Bieweil ist die Vergrößerung so erheblich, daß nicht sicher zu entscheiden ist, ob nicht eine Kombination mit Akromegalie vorliegt (Fall von Holtschewnikoff). Schon Charcot hat einen Fall von Ghods mit Chiro-megalie beschrieben. Ähnliche Fälle berichten Marie, Schlesinger, Chantemoss, Peterson, Bier, Lunz u. a. Sahrazès hat zuerst durch die Röntgenuntersuchung nachweisen können, daß auch das Knochenmark tatsächlich an der Volumenzunahme der Hand teilgenommen hat. Es mag in diesem Zusammenhang erwähnt werden, daß Bonnet nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln des Lendenmarks neben Ulcerationen der Platten eine akromegalische Größenzunahme derselben bemerkte. Dauernde vasomotorische Störungen sollen nicht bestanden haben; und äußere Verletzungen, als Ursache der gefundenen trophischen Veränderungen schließt er aus. Er nimmt an, daß in den Centrifugalfasern der hinteren Wurzeln die Impulse verlaufen, die zur Ernährung der Haut und der übrigen Gewebe notwendig sind.

Schließlich möchte ich noch die bekannte Tetrache erwähnen, daß die Kyphoskoliose ein häufiges Symptom der Syringomyelie ist. Auch sie wurde übrigens in letzter Zeit mehrfach bei der Sklerodermie beobachtet. Die Pathogenese dieser Knochenkrankungen ist unklar, Leyden-Goldscheider sind geneigt, die der Akromegalie ähnlichen Veränderungen nur als Ausdruck jener perversen Anlage, die man bei der Syringomyelie in einer Anzahl von Fällen findet, anzusehen. Die Beziehungen der Kyphoskoliose zu den Erkrankungen des Nervensystems sind von Oppenheim zum Gegenstand einer Besprechung gemacht worden, auch diese Frage ist nicht entschieden, es werden

bald trophische Störungen am Knochen- und Gelenkapparat der Wirbelsäule beschädigt, bald Lähmung und Atrophie der Rückenmuskeln. Daß auch die Skoliose ein Stigma der neuropathischen Anlage sein kann, betont Oppenheim ausdrücklich, und er glaubt, daß diese Auffassung auch für eine Anzahl von Fällen von Kyphoskoliosen bei Gliosis Berechtigung hat. Sehr selten scheinen Knochenveränderungen bei der Hemiplegie der Erwachsenen zu sein. Dejerine hat einen solchen Fall beschrieben, in dem seit drei Jahren eine starke Atrophie der Muskeln sowohl wie der Knochen bestand. Das Röntgenbild ergab eine auffällige Porosität der Knochen. Es ist bekannt, daß dagegen bei den cerebralen Kinderlähmungen das Zurückbleiben des Knochenwachstums eine ganz gewöhnliche Erscheinung ist.

Als ein ganz ausnahmsweise seltenes Symptom finden wir Knochenveränderungen in Form der Osteophytenbildung in einer Beschreibung von Pratois et Etienne bei einem Manne, der an einer spinalen Muskelatrophie litt.

Konsequent fortgesetzte radioskopische Untersuchungen, die von Sudeck inauguriert wurden, haben unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet erheblich erweitert. Schon früher hatte Wolff gefunden, daß bei Erkrankung eines Gelenkes auch entfernt gelegene Knochen sich verkleinern können, er nahm an, daß das primäre Gelenkleiden eine sekundäre Nervenaffektion an der betreffenden Extremität veranlaßt und daß diese Nervenaffektion ihrerseits das Knorpelgewebe sowohl bei jugendlichen als bei erwachsenen Individuen in der Quer- und Längsrichtung zum Wachstumsstillstand oder zur Schrumpfung bringt. Sudeck stellte dann fest, daß nach Entzündungen größerer Gelenke oder nach Traumen im Verlauf weniger Wochen radiographisch nachweisbare Knochenatrophien nicht nur in direkt beteiligten, sondern auch in benachbarten Knochen auftreten. Sudeck wie Kienbock, der Ähnliches beobachtete, häufig in Gemeinschaft mit anderweitigen vasomotorisch-trophischen Störungen wie Cyanose, Kälte, Ödem, Hypertrichosis, Nagelveränderungen, kamen zu der Auffassung, daß es sich bei diesen Knochenveränderungen um neurotische, auf Reizzuständen im Nervensystem beruhende Störungen handle, nicht um fortgesetzte Entzündungen oder Inaktivitätsatrophien. Dieser Auffassung hat sich auch Goldscheider angeschlossen: die Schnelligkeit der Entwicklung, das Zusammenvorkommen mit Muskelatrophien und trophischen Störungen der Haut, die Glückartigkeit der Bedingungen bei der Knochen- und der arthritischen Muskelatrophie spricht in hohem Grad für ihren neurotischen Charakter. Sie stellen offenbar die Anfangstadien der von Wolff beobachteten Atrophien dar. In einem von Leguen, Claude et Villaret beschriebenen Fall handelt es sich anscheinend auch um diese Form der Knochenatrophie, da für die von den Autoren an-

genannte Neuritis traumatica keine genügend sicheren Anhaltspunkte vorliegen.

Aus alledem geht hervor, daß geringfügige trophoneurotische Knochenveränderungen viel häufiger vorkommen, als wir das bisher annahmen. Jedenfalls scheint auch hier der Reizprozeß im Nervensystem das maßgebende pathogenetische Moment abzugeben.

Ich selbst habe in den letzten Jahren einige Fälle dieser Art beobachtet. Wegen der großen prinzipiellen Wichtigkeit, die sie mir zu haben scheinen, will ich sie hier ein wenig ausführlicher mitteilen.

Bei dem einen handelt es sich um einen 35-jährigen Mann, der am 5. November 1898 einen Unfall hatte. Er stolperte beim Hinabsteigen von der Treppe ins Dunkeln so, daß er mit vollem Körpergewicht auf den eingeklinkten linken Fuß zu liegen kam. Es trat keine Fraktur, keine Lähmung, keine Gefühlsstörung und keine Schwellung an dem Fuß ein, aber von vornherein waren Schmerzen vorhanden, die nur beim Versuch des Aufstehens sich einstellen und so stark waren, daß absolet kein Berühren des Fußes mit der Hand möglich war. Die Schmerzen wechselten ihren Sitz und tauchten bald im Hals, bald im Spinn. Der Pat. konnte noch ein halbes Jahr in sitzender Stellung arbeiten. Im Mai 1899 legte er sich wegen der fortwährenden Schmerzen auf acht Wochen in Bett und wollte dann die chirurgische Klinik auf, wo absolet eine erhebliche Atrophie des linken Beins und namentlich auch die später an beschreibenden Veränderungen am Knochenapparat durch die Röntgenuntersuchung festgestellt wurden. Massage, Gymnastik, Gehversuche unter einem entlastenden Verband brachten eine langsame Besserung, so daß er allmählich, wenn auch nur kurze Zeit, ohne Stock gehen konnte. Nach einer etwas stärkeren Anstrengung im Februar 1910 trat erneut eine Verschlechterung ein, so daß Patient wieder vollkommen das Gehen aufgeben mußte und die Klinik wieder aufsuchte. Der Zustand war nun der folgende: Es bestand eine sehr erhebliche Atrophie des ganzen linken Beins, der größte Wadenumfang war rechts 36, links 26 cm, die Umfang der Oberschenkel, 12 cm oberhalb der Patella rechts 49, links 40 cm. Knie- und Achillessehnenphänomene waren beiderseits gleich. Die Haut des linken Unterschenkels war etwas kühler als die des rechten. Laßt Pat. das Bein herabhängen, so tritt lebhaftes Rötung und heftige Schmerzen auf. Die mit dem linken Bein geleistete Kraft ist in allen Muskelgruppen geringer als die mit dem rechten Bein geleistete. Die Haut selbst erscheint in ihrem Aufbau nicht verändert. Dagegen ist das Unterhautfettgewebe zweifelslos reduziert. Die Sensibilität ist vollkommen intakt, die Arterien pulsieren in normaler Weise. Die Röntgenbilder ergeben jetzt, wie auch schon ein Jahr vorher, die charakteristische fleckige Aufhellung, respektive Verdunklung des Knochens des Unterschenkels und des Fußes (Tafel II gesunder rechter, Tafel III kranker linker Fuß). Irgendwelche Störungen der elektrischen Erregbarkeit bestehen nicht, auch keine quantitative Veränderung, wie ein genauer Vergleich ergibt. Die Behauptung ist am linken Bein schwächer als am rechten. Die Schmerzen, die in der Endlage nicht erheblich sind, sind beim Versuch zu stehen und zu gehen absolet so stark, daß der Pat. den Versuch aufgeben muß. Die obige Untersuchung des Pat. hatte ein negatives Resultat. Ich habe ihn dann weiter beobachten können. Er wurde mit Massage, Elektrizität und Heißluftbehandlung, vorsichtigen Gehübungen und Gymnastik monatelang behandelt, der Erfolg war vorübergehend ein guter, aber ein definitiver Erfolg ist nicht erzielt worden. Das Gehen war dauernd durch die Schmerzen sehr erheblich behindert. Die vasomotorischen Störungen, bestehend in einer Cyanose des Fußes und des Unterschenkels, traten immer wieder auf. Besonders deutlich war die Differenz in der Färbung der Fußsohlen, die auf der linken Seite teils blau, teils rot

evanescent, teilweisem erloschen. Die Pulsation in den Gefäßen des Fuße war stets gleich. Der Wadenumfang betrug am 27. Dezember 1935 links 34, rechts 38 cm. Der Pat. hatte im ganzen aber erheblich an Gewicht zugenommen, aber die Differenz war die gleiche geblieben. Auch im Mai 1936 hat sich der Zustand nicht wesentlich geändert. Pat. ist darauf angewiesen in horizontaler Stellung etwas zu arbeiten, während ihm jede Tätigkeit, die Gehen und Stehen erfordert, durch einen Schvärze auf hauptsächlich die selbst auftretenden Schmerzen unmöglich gemacht wird.

Hier waren also nach einem Unfall, der zu einer Zerrung gewisser Teile des linken Beines geführt haben mußte, von vornherein heftige Schmerzen ausgelöst worden, ohne daß irgendwelche palpablen Veränderungen im Gelenk, am Knochenapparat, an den Muskeln oder an den Nerven nachweisbar waren. Im Anschluß an die Schmerzen stellten sich vasomotorische Störungen, die im allgemeinen in den Hintergrund traten, ein. Unter Fortdauer der von der Haltung des Gliedes abhängigen sehr intensiven Schmerzen bildeten sich allmählich trophische Störungen aus. Die letzteren betrafen in erster Linie den Knochenapparat, fernerhin die Muskulatur und ganz besonders das Unterhautbindegewebe und vielleicht auch das zwischen den Muskeln liegende Binde- und Fettgewebe, während die Haut selbst nicht wesentlich in ihrem Aufbau gestört war; nur geringe Veränderungen des Haarwachstums waren noch zu konstatieren.

Ganz ähnlich liegt ein zweiter Fall.

Ein 23-jähriger Mann, den ich am 2. September 1935 zuerst gesehen habe, erlitt vor zwei Jahren in der Gegend des rechten Fußgelenkes eine Verletzung. Er knickte bei der Tätigkeit um und hatte gleich Schmerzen in der Gegend des inneren Knöchels. Er suchte nach einigen Tagen den Arzt auf, der irgendeine exzessive Verletzung nicht gefunden haben kann, ohne er machte ihm keinen Verband. Die Schmerzen bestanden in der nächsten Zeit in intensiver Weise in der Gegend des Fußgelenks an, und es stellte sich allmählich eine Abmagerung ein, die nach den Angaben des Pat. auch auf den Unter- und Oberschenkel übergieng. Er verspürte ferner immer noch etwas Hitze in der Gegend des Fußgelenks. Im Mai 1936 wurde ihm ein Gipsverband angelegt, nachdem wurde die Atrophie stärker. Bei der Untersuchung fand sich: der ganze rechte Unterschenkel ist erheblich dünner als der linke. Auch der rechte Oberschenkel ist dünner als der linke und diese Teile bilden sich erheblich kälter an. Der größte Wadenumfang beträgt rechts 29 cm, links 34 cm. Der Umfang des Oberschenkels, 12 cm über der Patella links 43½ cm, rechts 39½ cm. Das Kniegelenk ist beiderseits stark, links gleich rechts. Das Achillesphänomen ist beiderseits gleich. Die Gegend des rechten Fußgelenks ist etwas etwas aufgetrieben. Die Bewegungsfähigkeit des Gelenkes ist aktiv und passiv nur sehr wenig beschränkt. Der Druck auf die Gelenkergend ist überall etwas schmerzhaft, aber nicht erheblich. Die Kraft der einzelnen Muskeln ist rechts gegenüber links nur wenig herabgesetzt. Die elektrische Erregbarkeit ergibt ein vollkommen normales Verhalten auch in qualitativer Beziehung. Es besteht eine starke Erschlaffung des rechten Kniegelenks, ein ausgesprochenes Genu recurvatum, wie auch die Abbildung (Fig. 1) erkennen läßt. Die Haut zeigt in ihrem Aufbau keine wesentlichen Störungen. Sehr ausgeprägte Veränderungen dagegen ergab wieder die Röntgenuntersuchung an den Knochen, namentlich an den Knochen des Fußgelenks, die eine charakteristische Verkrümmung erkennen lassen (Tafel IV), während die Knochen des Unter- und auch des Oberschenkels eine allgemeine

Atrophie aufweisen. Die weitere Beobachtung, die sich über einige Monate erstreckte, ergab keine Abminderung gegenüber dem erst erwähnten Stadium. Die Umfangsdifferenzen zwischen der erkrankten Seite betrugen noch wie vor 5 cm. Die weitere Untersuchung des Pat. ergab als einzige Anomalie ein Fehlen des *M.culus depressus zygali* uln, die bei dem Pat. familiär sein soll.



Fig. 1.

Heftigste Atrophie des rechten Beins nach Trauma.

Auch hier bestanden also im Anschluß an einen Unfall neben ganz leichten arthritischen Veränderungen des Fußgelenks sehr erhebliche nutritive Störungen, die das Unterhautfettgewebe, die Muskulatur, resp. das Zwischengewebe der Muskeln und in erster Linie die Knochen betroffen haben, während die Haut in ihrem Aufbau nicht wesentlich verändert war. Auch die Muskeln selbst dürften nicht sehr schwer geschädigt gewesen sein, wenigstens was ihre Funktion betrifft. Es

bestand zwar eine mäßige, aber keineswegs eine erhebliche Schwäche, und die Atrophie ist sicher zum großen Teil nicht auf eine Atrophie der Muskeln, sondern auf eine Atrophie des Zwischengewebes zu beziehen, wie auch in dem ersten Falle. Beachtenswert sind in beiden Fällen die absolut normalen Verhältnisse der elektrischen Erregbarkeit.

Diese Fälle, die, wie erwähnt, zuerst von Sudeck und Kienbock studiert worden sind, die wohl Charcot auch schon beobachtet hat und bei denen er von einer Atrophia abarticularis gesprochen hat, zeigen im wesentlichen also Störungen nur auf dem Gebiete der Trophik, daneben leichte vasomotorische Symptome und ausgesprochene sensible Reizsymptome, während alle sensiblen Ausfallsymptome fehlen. Es kann nach allem kaum einem Zweifel unterliegen, daß die trophischen Störungen hier reflektorisch entstanden zu denken sind, durch Reizprozesse in sensiblen Apparaten. Dafür spricht auch folgender von Sudeck beobachteter Fall: Nach einer Verletzung der Hand infolge einer Quetschung trat Schwellung, Rötung, lebhaftes Schmerzen und eine Bewegungsbehinderung in der Hand ein und das Röntgenbild zeigte die charakteristischen Symptome einer akuten Knochenatrophie: eine diffuse Aufhellung der Knochensubstanz mit erhaltener Struktur und charakteristischer Umränderung der einzelnen Handrückenknochen. Diese Umränderung ist auch bei den Fällen, die ich beobachtet habe und von denen ich oben zwei prägnante mitgeteilt habe, regelmäßig zu sehen gewesen. Auf der Dorsalseite des Os hamatum fand sich in dem Sudeckschen Falle eine kleine nierenförmige Knochenauflagerung. Von dieser nahm Sudeck an, daß sie einen fortwährenden Reiz auf die betreffenden sensiblen Nervenäste ausübte. Er entfernte diese kleine Knochenauflagerung und es kam dann alsbald zur Heilung der bei dem Patienten nachweisbaren Veränderungen. Nach diesen Erfahrungen kann über die reflektorische Genese der hier vorliegenden trophischen Störung wohl kaum ein Zweifel obwalten. Die Analogien zwischen der arthritischen Muskelatrophie und dieser Knochenatrophie sind demgemäß sehr weitgehende, und die Erfahrung bei der einen und bei der anderen Reihe der Erscheinungen sind geeignet, einander gegenseitig Unterstützung zu leisten und die reflektorische Genese sowohl der arthritischen Muskelatrophien wie der traumatischen Knochenatrophien sicher zu stellen.

Nicht geringeres Interesse als die Veränderungen der Knochen haben die der Gelenke, soweit sie im Verlaufe von centralen Nervenkrankungen auftreten, gefunden. Auch sie kommen am häufigsten bei der Tabes und der Gliosis vor. Sie sind zuerst von Charcot beschrieben worden; Charcot¹⁴⁾ glaubte ihre Ursache auch anatomisch nachgewiesen zu haben, indem er in zwei Fällen von Tabes mit Arthro-

¹⁴⁾ Charcot, a. a. O., 1, S. 121.

pathie in der äußeren Gruppe der Vorderhornzellen eine ausgesprochene Degeneration fand, doch hat er später in einem anderen Falle diese Degeneration nicht nachweisen können, und Michel stellte 23 Fälle zusammen, in denen allen sich der von Charcot erhobene Befund nicht wiederfand. Noch neuerdings haben aber Etienne et Champy doch wieder Veränderungen der Vorderhornzellen, besonders der dorsolateralen Gruppe bei Arthropathien nachweisen zu können geglaubt, wobei sie allerdings von der Ansicht auszugehen scheinen, daß die Vorderhornläsion ihrerseits auf eine Störung ihres Stoffwechsels zu beziehen ist, die durch das Fehlen der von den Reflexcollateralen auf die Zellen wirkenden Impulse hervorgerufen ist. Pitres et Vaillard beachten die tabische Arthropathie ebenso wie die Spontanfrakturen auf Grund der Untersuchung von vier Fällen mit peripherer Nervendegeneration in Verbindung. Ähnliche Befunde wurden von Siemerling und Oppenheim, von Marinesco und von Münzer (nach Leyden-Goldscheider) gemacht. Auch Joffroy hat dasselbe gefunden. Auf anderem Wege suchte Buzzard Aufschluß zu bekommen, indem er die häufige Koimodenz zwischen Gelenk- und Knochenleiden einerseits und gastrischen Krisen andererseits feststellte. Er äußerte die Ansicht, daß beide Störungen durch ähnliche anatomische Bedingungen herbeigeführt würden, und zwar seien dies Veränderungen im Bulbus medullaris oblongatus in der Nähe des Vaguskernes. Seine Beschreibung ist als höchst mangelhaft und in vielen Punkten angreifbar abzulehnen.

Londe ist neuerdings auf die verschiedenen Formen der Arthropathien eingegangen und hat die echten, nervösen Arthropathien von der Gruppe der Arthropathien unterschieden, die sich bei anderen spinalen Leiden und ferner auch bei cerebralen und neuritischen Affektionen finden. Für die ersteren nimmt er eine rein nervöse Genese an, während bei den letzteren die Erkrankung des Nervensystems wohl eine Rolle spiele und unter anderen die Lokalisation bestimme, doch komme dazu meist noch ein anderer ätiologischer Faktor, wie eine Infektion, eine Autointoxikation, ein Trauma. Die Nervenerkrankung schaffe hier in dem affizierten Gelenk nur den *Loos minoris resistentiae*. Demgegenüber sei die nervöse Erkrankung die alleinige Ursache der echten Arthropathie bei der Tabes und Glosie. Entgegen diesen Ansichten stehen solche, die von einem ursächlichen Zusammenhang zwischen der Arthropathie und dem Nervenleiden überhaupt nichts wissen wollen, und die Arthropathie als Arthritis deformans oder als syphilitisches Gelenkleiden auffassen wollen. Andere meinen (Virehow, v. Volkmann), daß die Arthropathie durch ein Trauma veranlaßt sei, wozu bei der Anästhesie und Ataxie der Tabiker reichlich genug Gelegenheit sei. Es scheint mir, daß diejenigen die die direkte Abhängigkeit des Gelenkleidens von dem Nervenleiden leugnen, den klinischen

Beobachtungen nicht genügend gerecht werden. Es ist richtig, daß die Anästhesie die Kranken ihr schon affiziertes Gelenk nicht ausreichend schonen läßt, und daß die Ataxie sie zu brusken und immer aufs neue das Gelenk schädigenden Bewegungen verführt. Aber einmal kommt die Ataxie bei der Glosia gar nicht in Betracht, ebensowenig wie übrigens ein syphilitisches Gelenkleiden, und auch bei der Tabes kann sie dann nicht wirksam sein, wenn, wie oft, die Arthropathie im ersten Stadium der Krankheit auftritt, wohl gar ihr erstes Symptom ist. Störungen der Sensibilität pflegen allerdings fast immer vorhanden zu sein, und eins der hauptsächlichsten klinischen Kennzeichen der Arthropathie ist ja ihre Schmerzlosigkeit. Doch ist auch diese Regel nicht ohne Ausnahme. Dann aber ist es in jedem Falle schwer verständlich, wie das Erlöschensein der Schmerzempfindung die Gelenkaffektion bedingen soll. Nach Leyden-Goldscheider¹⁾ ist es nicht unwahrscheinlich, daß für die Ernährung der Gewebe überhaupt die centripetalen Nerven in Betracht kommen, indem sie reflektorisch die Gefäßweite regulieren, eine Wirkung, die vor allem in Frage kommen soll, wenn besondere Anforderungen an die Widerstandskraft der Gewebe gestellt werden; übrigens käme es nicht lediglich auf die Schmerzempfindlichkeit an, sondern auf die centripetale Leitung überhaupt, auf das Ausbleiben der kontinuierlich wirksamen, leichtesten, zum Teil untermerkbaren Reizanstöße. „Hiernach kann auch nicht ein besonderer Teil der centripetalen Leitung angeschuldigt werden, periphere Läsionen ebenso wie centrale können die Störung der Nutritionsanpassung bedingen.“

Ich verweise auf meinen oben beschriebenen Fall von traumatisch-reflektorischer Knochen- und Muskelatrophie, bei dem auch eine Gelenkaffektion vorhanden war, die durchaus die äußere Form des tabischen Genu recurvatum darbot, und wo die Gelenkerschlaffung nur auf reflektorischem Wege entstanden sein konnte.

Um die experimentelle Hervorbringung von Arthropathien hat sich Vulpian bemüht. Er suchte solche an Meerschweinchen und Hunden mittels Verletzungen der hinteren Rückenmarkshälfte zu erzeugen. Das gelang nicht. Er durchschnitt dann bei einem Hunde die beiden letzten thorakalen und die oberste lumbale rechte hintere Wurzel. Nach einem Monat bildete sich eine Störung des linken Ellbogengelenkes mit den Zeichen der Arthropathie. Bei der Sektion fanden sich neben anderen Veränderungen welche im linken Hinterhorn des Halsmarks. Irgendeine Beweiskraft ist diesem Experiment meines Erachtens nicht beizumessen entgegen der Anschauung Bechterew's, dem ich diese Angaben entnehme.

Wie der nähere Mechanismus der Genese der Knochen- und Gelenkaffektionen bei Nervenleiden ist, darüber können wir sichere Angaben

¹⁾ Leyden-Goldscheider, a. a. O., S. 161.

noch nicht machen; wir können nur konstatieren, daß die Arthropathien — ebenso wie die Knochenerkrankungen — bei der Tabes und Gileosis meist, wenn nicht immer, zugleich mit Störungen der sensiblen Bahn einhergehen, und daß wir daher wohl in diese Nervenabschnitte die Einflüsse zu verlegen haben, die von Seiten des Nervensystems regulierend auf die Knochen- und Gelenkernährung wirken. Damit haben wir naturgemäß nur eine Vermutung über den centripetalen Teil des in Frage kommenden Reflexbogens ausgesagt; ob der centrifugale Teil in denselben Gebilden centrifugalwärts verläuft, ob er anderweitige Bahnen benutzt, bedarf weiterer Überlegungen. Bechterew nimmt alle Gebiete und Ganglien des Rückenmarks, die als vasomotorische Bahnen und Centren fungieren, als solche in Anspruch, die für die Knochenernährung in Frage kommen (hintere Wurzeln mit ihren vasodilatatorischen Fasern, die Zellgruppen in der Nähe des Tractus intermediolateralis als Ursprungscentren des Sympathicus (s. o.), vordere Wurzeln).

Auch an den Sehnen sind trophische Störungen nach nervösen Affektionen beschrieben worden. So fand Gubler eine Schwellung der Strecksehnen an den Mittelhandknochen bei Radialis-Blähmung, die er als direkte nutritive Störung infolge der schon einige Zeit bestehenden Blähmung charakterisierte. Ähnliches fand er auch einmal bei cerebraler Hemiplegie; seine Beobachtungen sind später von B. Remak, von Erb und E. Remak¹⁾ bestätigt worden. Eulenburg hat angenommen, daß die Dupuytren'sche Fasziolen-Kontraktur eine Folge der Neuritis ulnaris sein kann, doch ist diese Hypothese im allgemeinen nicht bestätigt worden (Remak).

Wir kommen jetzt zur Besprechung des Einflusses der Nerven auf die Ernährung der Gefäße. Es leuchtet ein, daß wir hiermit an ein Gewebe gelangen, dessen neurotrophische Abhängigkeitsverhältnisse um deswillen besonders wichtig sind, weil von ihnen ja wiederum die Ernährung der übrigen Gewebsteile des Organismus direkt abhängig ist und demgemäß trophische Veränderungen der Gefäße ihrerseits wieder zu sehr erheblichen trophischen Störungen in allen übrigen Teilen des Körpers führen können. Wir werden auf einzelne Punkte der hier angeregten Frage noch später ausführlicher zurückkommen müssen, und wir wollen an dieser Stelle daher nur einige wenige der wichtigsten Tatsachen anführen.

Die Anschauung, daß Veränderungen in der Struktur der Gefäßwandungen Folgen nervöser Störungen sein können, ist schon eine recht alte. Noch Haeftenegg hat Quesnay zuerst im Jahre 1749 gangränöse Prozesse, die auf Gefäßverstopfung beruhten, mit nervösen Stö-

¹⁾ Remak, a. a. O., S. 170.

rungen in Zusammenhang gebracht. Aber erst die neuere Zeit hat für diesen später mehrfach wieder betonten Zusammenhang Beweise zu bringen versucht. Wir haben hier besonders der sehr sorgfältig ausgeführten Untersuchungen Lewaschew's zu gedenken, wenn auch ähnliche Untersuchungen anderer Autoren zeitlich vorausgingen (Giovanni, Eichhorst, Vulpian, Nothnagel). Lewaschew reizte an Hunden den Ischiadikus der einen Seite vermittels in Schwefelsäure usw. getränkter Fäden und setzte diese Reizungen bis zu 1½ Jahren fort, wenn auch in intermittierender Form. Es trat Gefäßerweiterung und Temperatursteigerung ein, die der Autor auf eine Reizung der Vasodilatoren bezog. Nach drei bis fünf Monaten machte sich dann eine Tendenz zur Gefäßverengung geltend, die jedoch durch Einziehen eines neuen Fadens oder durch Anziehen des alten hintangehalten wurde. Die anatomische Untersuchung der Arterien der kranken Seite ergab zuerst nach sechs- bis achtmonatlicher Reizung Veränderungen, die im allgemeinen in den kleineren Arterien intensiver waren, als in den großen Stämmen. In den letzteren fanden sich Veränderungen nur bei den Tieren, bei denen die Reizung sehr lange fortgesetzt wurde. Zuerst tritt in der Adventitia und von da aus in die Muscularis sich forterstreckend eine Gefäßneubildung auf; im weiteren Verlauf findet um diese neugebildeten Gefäße herum eine Bindegewebsneubildung statt, die Muskelzellen erscheinen getrübt, verkleinert, mit undeutlichen Kernen besetzt, und so wird allmählich ein Teil der Media durch Bindegewebe ersetzt. In späteren Stadien erleidet auch die Intima Veränderungen und verliert ihre charakteristische Faltelung. Die neugebildeten Vasa vasorum entarten ebenfalls bindegewebig, und als Endprodukt stellt sich eine Sklerose heraus, die stets eine nur fleckweise ist, indem normale Stellen sich zwischen die erkrankten einschoben. Von dem Prozeß wurden auch die Venen betroffen; in der Haut traten entzündliche oder gangränöse Prozesse nicht auf.

Die Versuche von Lewaschew sind mehrfach nachgemacht worden, so von Martin, Grey et Mathieu und Schnell. Diese Autoren erhielten im allgemeinen keine Bestätigung der Versuchsergebnisse von Lewaschew, aber sie folgten auch nicht genau den Vorschriften dieses Autors, indem sie an die Stelle der Reizung des Nerven die einfache Durchschneidung treten ließen und vor allem zu wenig Zeit zwischen ihren Experimenten und den anatomischen Untersuchungen vergehen ließen. Positive Resultate erzielten dagegen wieder Bervœt und Fränkel. Auch Bervœt experimentierte vermittels Durchschneidung des Nervi ischiadici. Fränkel, der Bervœt's Versuche wiederholte, fand ganz dieselben Ergebnisse, so daß ich mich, da mir das Original der Bervœt'schen Arbeit nicht zur Verfügung steht, auf die Wiedergabe der Fränkel'schen Untersuchungen beschränke. Fränkel durchschnitt bei 12 Tieren den Ischiadikus; er fand danach nach drei bis vier

Wochen die ersten trophischen Störungen: Abmagerung, Haarausfall, Wundwerden des Rückens, der Pfote usw. Er ließ die Tiere meist drei bis vier Monate am Leben, fand jedoch auch bereits, wenn er nach ein bis zwei Monaten untersuchte, Veränderungen der Gefäße. Diese wiesen schon makroskopisch Differenzen gegen die der gesunden Seite auf, da sie stärker mit Blut gefüllt waren. Die mikroskopische Untersuchung zeigte auf der entnervten Seite eine große Dickenzunahme aller drei Wände, verschieden in der Intensität, je nach der seit der Durchschneidung vergangenen Zeit. Das Lumen ist relativ weit, weiter als das der entsprechenden normalen Arterien, aber im Verhältnis zu dem bis auf das Fünffache verdickten Wandungen erscheint es doch eng. Die Venen sind noch stärker betroffen, als die Arterien, so daß sie schließlich von den Arterien schwer zu unterscheiden sind. Fränkel glaubt diese Veränderungen auf folgende Weise deuten zu können. Die unmittelbare Wirkung der Nervenläsion ist ein chronischer Reizzustand, der einen Arterienkrampf und eine hypertrophische Verdickung der Gefäßwandungen bedingt. Nach zwei bis drei Monaten tritt eine passive Dilatation ein durch Überschreitung der Leistungsfähigkeit der Muskulatur, und damit löst sich eine regressive Metamorphose der Gefäßwand heraus. Gegen diese Untersuchungen erheben Czylkharz und Helbing schwerwiegende Einwände. Sie operierten an Kaninchen in derselben Weise, wie Fränkel; wum sie dann das Tier vor äußeren Schädlichkeiten und damit vor dem Auftreten von Geschwüren usw. schützten, fanden sie keine Strukturveränderungen an den Gefäßen, während auch sie die von Bervet und Fränkel beschriebenen Veränderungen dann nachweisen konnten, wenn es zur Geschwürsbildung gekommen war. Durch diese seien sekundär die Gefäßveränderungen bedingt. Fränkel hat in einem zweiten Aufsatz seine ursprünglichen Angaben aufrecht erhalten, doch blieb die Streitfrage unentschieden, bis dann Lapinsky den endgültigen Beweis zu erbringen schien, daß Durchschneidung vasomotorischer Nerven Alterationen der Gefäßwandungen herbeiführe. Auch Kapsammer hat, wie er nebenbei gelegentlich seiner das Knochenwachstum betreffenden oben erwähnten Experimente bemerkt, nach Ischiadicusdurchschneidung bisweilen eine Verdickung der Gefäßwandungen gefunden. Angelucci operierte am Halsympathicus und fand nach Herausnahme des Ganglion cervicale supremum bei Tieren, die er bis zu einem Jahr am Leben ließ, neben anderen trophischen Störungen am Gesicht und Schädel an Stelle der anfänglichen Gefäßerweiterung eine deutliche Gefäßverengung unter Verdickung der Wandungen. Auch Lapinsky hat am Halsympathicus operiert und fand Ähnliches, wie Angelucci, dessen Untersuchungen er übrigens nicht zu kennen scheint, jedoch sind Lapinskys Untersuchungen viel ausgedehnter und exakter. Er operierte 14 Kaninchen, von denen ich selbst einen Teil mitbeobachtete

konnte, da wir gemeinsam an ihnen, wie schon erwähnt, die Lokalisation des Nervus sympathicus im Rückenmark zu bestimmen versuchten. Er nahm einmal das Ganglion cervicale inferius heraus, siebenmal das superius, dreimal wurde der Halsympathicus reseziert, dreimal mit einer Ligatur umschnürt. Die klinischen Erscheinungen waren die bekannten, die Gefäße erweiterten sich stark, nahmen einen gewundenen Verlauf an, pulsierten viel intensiver als auf der gesunden Seite und zeigten erhöhten Blutdruck, stellenweise traten am Ohr punktförmige Blutungen auf, bei Einschnitten blutete die operierte Seite stärker. Die Veränderungen blieben dauernd bis zum Tode der Tiere bestehen, der 10, 12, 22, 26, 30, 36, 46, 60, 76 und 90 Tage post operationem durch Chloroformnarkose herbeigeführt wurde. Schon makroskopisch erwiesen sich die Gefäße als verändert, sie waren sehr dick, erweitert, stark mit Blut gefüllt, geschlängelt. Mikroskopisch fanden sich in 7 von 14 Fällen deutliche Veränderungen in den größeren Gefäßen, eine Verdickung der Muscularis und der Elastica. Viel stärker war die Alteration der kleinen Gefäße und Capillaren, ein Teil hatte seine Muscularis eingebüßt, die Muskelfasern waren entweder vollkommen geschwunden oder stark atrophisch. Die Intima war verdickt und gewuchert, ihr Lumen z. T. durch Zellwucherung verschlossen. An anderen Gefäßen war auch die Media stark verdickt und einzelne Muskelfasern hypertrophisch. Die geschilderten Veränderungen der Gefäße betrafen die Tiere, die mindestens sechs Wochen nach der Operation getötet wurden. Erfolgte die Tötung vor der sechsten Woche, so war eine Gefäßdegeneration nicht absolut sicher nachweisbar, es fand sich dann nur eine sehr zweifelhafte Verdickung der Intimakörner kleinerer Gefäßchen. Die Art der Läsion des Nervus sympathicus schien ohne Bedeutung zu sein, insbesondere war es nicht von Wichtigkeit, ob die Ganglien des Sympathicus mit herausgenommen wurden oder nicht. Bemerkenswert ist, daß die Vasa vasorum nur ausnahmsweise erheblichere Störungen zeigten. Schließlich ist hervorzuheben, daß das die Gefäße umgebende Gewebe keine Zeichen von Entzündung oder Eiterung aufwies.

Aber auch Lapinskys Untersuchungen und Feststellungen sind nicht ohne Widerspruch geblieben. Jores hat an acht Kaninchen eine Durchschneidung des Halsympathicus vorgenommen. Er fand in den von ihm untersuchten Gefäßen der Intima (Ohrgefäße und der Carotis) nach 2–9 Monaten keinerlei Veränderungen. Er führte die von Lapinsky beobachteten Endarteriitiden auf Verletzungen und Unterbindungen gelegentlich der vorgenommenen Operationen zurück. Lapinsky ist dieser Auffassung seiner Befunde später mit aller Energie entgegengetreten. Die negativen Resultate von Jores erklärte er damit, daß dieser nur die Ohrgefäße untersuchte, die nach Lapinskys späteren Feststellungen nicht nur vom Halsympathicus aus inner-

viert werden, und daß er nur Durchschneidungen des Sympathicus, nicht auch Exstirpationen des obersten Halsganglions vorgenommen hat. Ubrigens fand auch Jores eine Verdickung der Muscularis. Lapinsky hat später an einem umfangreichen Material seine experimentellen Forschungen fortgesetzt und sie durch das Studium der sich in den peripheren Vasomotoren abspielenden Veränderungen ergänzt. Er durchschneidet resp. reseziert an 36 Hunden den N. ischiadicus gleich nach seinem Hervortreten aus dem Foramen ishiad. maj. und untersucht dann nach acht Tagen bis elf Monaten teils die in der Begleitung der Gefäße ziehenden vasomotorischen Nerven, teils und zwar nur an Tieren, die keine Ulcerationen dargeboten hatten, die Gefäße selbst. An den letzteren fand er starke Erweiterung der Vasa vasorum und vielleicht auch Hyperplasie derselben, eine gewisse Infiltration und Verdickung der Adventitia, Aufquellen einzelner Muskelfasern und Kerne und Wucherung der Endothelzellen in Form einzelner Züge und Kämme. Was die Degenerationen der Nervenfasern betrifft — die Untersuchungen wurden nach der Methode von Ehrlich ausgeführt — so leiden zuerst die myelinhaltigen Vasomotoren und ihre Veränderungen treten schon am Ende der ersten Woche nach der Operation zutage. An den marklosen Fasern treten die ersten Degenerationssymptome erst am Ende der zweiten Woche auf. Die Fasern gehen schließlich ganz zugrunde. Eine Regeneration tritt nur sehr langsam ein. Lapinsky nimmt an, daß die Degeneration der Vasomotoren die Ursache der histologischen Veränderungen der Gefäßwände darstellt. Die mit der größten Sorgfalt ausgeführten Untersuchungen Lapinsky's scheinen mir für irgendwelche Einwendungen keinen Raum zu lassen. Die Abhängigkeit des Aufbaus der Gefäßwände von dem sie motorisch beherrschenden Nerven scheint mir danach außer allem Zweifel zu sein. Wir werden abhald sehen, daß die näheren Modalitäten dieser Abhängigkeit noch einer genaueren Erörterung bedürfen.

Lapinsky hat sich auch darum verdient gemacht, die Abhängigkeit bestimmter Gefäßerkrankungen von der Neuritis zu zeigen. Auch darin hatte er Vorgänger: Giovanni scheint zu den ersten zu gehören, die auf diesen ätiologischen Zusammenhang hingewiesen haben, ihm folgten andere, unter denen ich Potain, Bervox, Fränkel, Thoma, Moltchanoff nenne. Genauerer darüber finden wir bei Lapinsky in seinen beiden das Thoma betreffenden Abhandlungen. Er selbst hat vier Fälle veröffentlicht. Die Beteiligung der Blutgefäße zeigte sich im Krankheitsbilde in Erweiterung der Arterien und Venen, in ihrer Schlingelung, in der Veränderung der Farbe der distalen Teile der betroffenen Extremität, in einer gewissen Volumensvergrößerung und in einer anfänglichen Temperaturzunahme, die später bald einer Temperaturabnahme Platz machte. Schließlich traten Blatungen auf, die Wandungen der Arterien wurden härter, der Puls veränderte

sich und Lapinsky konnte nach den anatomischen Beweis der Gefäßwandveränderung erbringen. Es fand sich eine Wucherung der Intima, Verlegung des Lumens und eine Blutung im umliegenden Gewebe.

Es ist natürlich, daß in allen derartigen Fällen sehr sorgfältig errogen werden muß, in welchem Verhältnis die Erscheinungen des Nerven- und Gefäßsystems zueinander stehen. Die Gefäßerkrankung kann vor der Nervenkrankung vorhanden gewesen sein und diese sogar veranlaßt haben; es sind ja bekanntlich Neuritiden arteriellen Ursprungs beschrieben worden (Oppenheim, Dutil-Lamy, Joffroy et Anhard, Schlesinger usw.). Auch im Gebiet der Venenerkrankung sind sie beobachtet worden (Quena). Okada hat experimentelle Untersuchungen über diesen Gegenstand angestellt. Wenn er die *A. gluteae inf.* oberhalb der Abgangsstelle der *Arteria ramitans nervi ischiadici* unterband und dadurch den N. ischiadic. seiner wichtigsten vasculären Ernährungsquelle beraubte, so entstand bald eine totale, bald eine partielle, hauptsächlich fleckweise Degeneration in der Art der Wallerschen Degeneration. Ebensogut können ferner die Neuritis und die Gefäßerkrankung koordiniert und durch dieselben Ursachen hervorgerufen sein. Die chronischen Intoxikationen des Alkohols, des Bleis, des syphilitischen Giftes, all das kann Nerven und Gefäße zu gleicher Zeit treffen. Schließlich können auch lokale Ursachen, wie Einwirkung hoher oder niedriger Temperaturen, ferner die Nachbarschaft irgendwelcher reizender Prozesse von Wichtigkeit für die Gefäßerkrankung sein. Lapinsky hat sehr sorgfältig auf alle diese Momente geachtet und sie auszuschließen versucht.

Wie ist die Abhängigkeit der Gefäßveränderungen von denen der vasomotorischen Nerven zu erklären? Daß für die Lapinsky'schen Versuche die Erklärung nicht anwendbar ist, die Ozyklharz und Helbing, wie oben erwähnt, für die Fränkel'schen Befunde gegeben haben, leuchtet ohne weiteres ein. Aber wenn wir auch von derartigen Erklärungsversuchen absehen, so ergibt sich doch, daß wir uns an dieser Stelle sehr komplizierten Bedingungen gegenüber befinden, so daß wir bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse zu keiner bestimmten Entscheidung gelangen.

Wenn wir hören, daß die Muskulatur der Gefäße nach Durchschneidung der im Nerven verlaufenden vasomotorischen Fasern erkrankt und weiter auch feststellen können, daß die Vasomotorien zweig selbst in der Peripherie affiziert sind, so sind wir zunächst geneigt, an ein direktes trophisches Abhängigkeitsverhältnis von vasomotorischer Innervation und Bau der Muskelhaut zu denken und ein ähnliches Verhältnis zu supponieren, wie es zwischen den motorischen Nerven und der quer gestreiften Muskulatur besteht. Ich erinnere aber zunächst daran, daß wir, wie oben auseinandergesetzt wurde, auch in dieser Beziehung zu keinem ganz sicheren Resultat kamen, da wir nicht be-

stimmt zu sagen vermochten, ob die Störungen in der Muskeltröphik außer durch den Ausfall der funktionellen Impulse noch durch einen solchen der nutritiven veranlaßt war, wenn uns das auch sehr wahrscheinlich erschien. An der Gefäßmuskulatur liegen die Verhältnisse deswegen noch komplizierter, da durch den Ausfall der vasomotorischen Innervation eine Erweiterung des Gefäßrohrs bedingt ist und damit gewisse mechanische Veränderungen, denen man einen großen Einfluß auf die Struktur der Gefäßwände zugeschrieben hat, hervorgerufen werden.

Auf diesen Punkt hatte Thoma und seine Schule ihre Aufmerksamkeit gerichtet, und sie hatten nach sehr umfangreichen und genauen Untersuchungen den Satz aufgestellt, daß die Degeneration der Gefäße durch die primäre Ausdehnung ihrer Tunica muscularis bedingt sei. Es würden die in der Gefäßwand liegenden Pacinischen Körperchen gereizt, dadurch entstehe reflektorisch Erweiterung, Vermehrung und Hyperämie der Vasa nutritia und die Gefäßwandveränderung. Auch die Verlangsamung der Blutgeschwindigkeit und die Schwankungen des intravasculären Druckes sind von Thoma und anderen zur Erklärung der Gefäßwandveränderungen herangezogen worden. Auch Lapinsky ist geneigt, den genannten mechanischen Momenten einen gewissen Einfluß zuzuschreiben, dafür sprechen ihm besonders die Beobachtungen von Gley-Mathieu, in denen sich Gefäßveränderungen auch auf der gesunden Seite gezeigt hatten. Er nimmt an, daß auch in den Gefäßen der Kontroll Extremität Erweiterung des Lumens, erhöhter Blutdruck und Verlangsamung der Strömungsgeschwindigkeit eintritt, wie das experimentell verschiedentlich festgestellt sei; auch hier wären die mechanischen Momente wirksam. Doch wäre auch für diese Veränderungen noch eine reflektorische, direkt neurotische Entstehung denkbar. Gegen die Annahmen Thomas ist auch Widerspruch erhoben worden, so z. B. von Jores, der in seinen Versuchen zwar eine Erweiterung der Gefäße nach Durchschneidung des Halsympathicus fand, aber doch keine Bindegewebswucherung in der Intima. Aber auch wenn man annimmt, daß die Erweiterung der Gefäße für die Struktur ihrer Wände nicht gleichgültig ist, so sind damit gewiß nicht alle Bedingungen der Gefäßwandveränderung erschöpft. Man hat von der Erweiterung und eventuellen Neubildung der Vasa vasorum gesprochen, ohne daß bisher eine genügend sichere anatomische Grundlage für diese Annahme geschaffen worden wäre.

Für uns ist aber das oben berührte Problem das wichtigste, inwieweit den vasomotorischen Nerven ein direkter trophischer Einfluß auf die Gefäßwand zukommt. Naturgemäß werden wir unter den verschiedenen Bestandteilen der Gefäßwand am ehesten an die Muscularis zu denken haben. Das Problem erweitert sich zu der Frage, inwieweit überhaupt die glatte Muskulatur in nutritiver Abhängig-

keit von dem Nervensystem steht. Darüber liegen nun genauere Untersuchungen kaum vor, soweit nicht die Gefäße in Frage kommen. Die Physiologen gehen wohl meist von der Anschauung aus, daß die glatte Muskulatur nutritiv viel unabhängiger ist, als die quergestreifte; aber es ist recht zweifelhaft, ob diese Auffassung genügend sicher fundiert ist. Zur Entscheidung scheinen mir freilich andere Gewebe geeigneter zu sein, als gerade die Gefäßmuskeln; wir würden vielleicht einen gewissen Anhalt gewinnen können aus Versuchen, die sich mit dem Verhalten der glatten Muskulatur des Darms nach Läsionen der efferomotorischen Nerven beschäftigen, wobei freilich immer mit der Automatie der betreffenden Teile sehr zu rechnen sein wird. Was die Alterationen der übrigen Gefäßwände angeht (Intima, Adventitia), so ist eine Entscheidung über deren Genese noch viel schwieriger und unsicherer als für die Muscularis; es ist jedenfalls nicht daran zu zweifeln, daß Veränderungen einer Gefäßwand auf die Struktur der anderen von Einfluß sind.

Wir stehen hier, wie wir sehen, vor durchaus noch ungelösten Fragen.

Eines aber müssen wir den mitgeteilten Tatsachen immerhin doch entnehmen, daß wir nämlich allen Grund haben, in Fällen von Erkrankung der Gefäße und namentlich der kleineren unter ihnen, den Zustand des vasomotorischen Nervensystems in Betracht zu ziehen.

Als letztes Gewebe kommt für uns die Haut und ihre Anhänge in Betracht. Wir haben bereits, als wir die Theorie Samuels besprachen, darauf hinweisen müssen, daß der experimentelle Nachweis der Abhängigkeit der Hauternährung von Reizung oder Durchschneidung peripherer Nerven bisher nicht erbracht worden ist, trotzdem zahlreiche Versuche in dieser Beziehung unternommen worden sind. Auch die neuesten Experimente dieser Art haben fast durchgängig zu negativen Resultaten geführt. So regiert Salvioni auf Grund zahlreicher Experimente, bei denen er eine Durchschneidung des Nervus ischiadicus und Cruralis an Hunden, Kaninchen, Tauben, Hühnern und Fröschen vorgenommen hatte, die Existenz trophischer Nerven. Entzündliche und ulcerative Läsionen der Haut traten nicht auf, wenn die Tiere vor solchen Schädlichkeiten bewahrt wurden, denen sie infolge der Sensibilitätsstörung ausgesetzt waren. Jaquet brachte eine Neuritis an beiden Nervi ischiadici durch Injektion von Crotonöl hervor und bedeckte ein Glied mit Watte, das andere nicht. Nur auf dem unbedeckten Glied waren schwerere Veränderungen der Haut vorhanden. Bikels und Jasinski operierten an neun Katzen, bei denen jeder die drei bis fünf Ganglia interspinalia herausnahm. Die Katzen lebten bis zu acht Monaten am Leben, niemals fand sich irgendeine trophische Störung, nur bei einer Katze, bei der

vier Monate nach der Operation eine zufällig entstandene Hautabschürfung bemerkt wurde, kam es auf der Seite der Operation zu einer ausgedehnten Hautentzündung mit Haarausfall; unter Schutzverband trat eine Heilung ein, die allerdings sehr langsam fortschritt. Die letzt-erwähnte Tatsache verdient Beachtung, sie ist allgemein anerkannt, insofern, als allgemein zugegeben wird, daß geringfügige äußere Schädigungen zu abnorm schweren Veränderungen an den mangelhaft innervierten Gliedern führen können.

Unter den hierher gehörigen Fragen ist wohl keine in so ausgedehnter Weise behandelt worden, wie die von dem Einfluß des Nervus trigeminus auf die Hornhaut. Eine unendlich große Zahl von Experimenten ist angestellt worden, ohne daß man bisher zu einer Sicherheit gekommen ist. Noch die jüngsten Untersuchungen haben zu entgegengesetzten Resultaten geführt, insofern, als Gaulle zu der Ansicht kam, daß das Zellenleben und der Stoffwechsel der Hornhaut vom Trigeminus resp. dem Ganglion Gasser beherrscht wird, da er nach Durchschneidung dieses Ganglion und des zwischen Ganglion und Gehirn liegenden Trigeminasabschnittes an scharf umschriebenen Stellen Nekrosen, an anderen vermehrte Neubildung von Zellen fand. Demgegenüber erklärten Eckhard und später Hanau, daß alle Veränderungen der Hornhaut nach Quintuslähmung zur Folge äußerer Einwirkung auf das infolge seiner Unempfindlichkeit ungeschützte Auge sind. Das gelte sowohl von den geringen initialen Läsionen, den Grübchen und den nur mikroskopisch nachweisbaren Nekrosen, die speziell die Folge von Vertrocknung sind, wie von der sogenannten Keratitis neuroparalytica. Es hat bei dieser ungeklärten Sachlage für uns keinen Zweck, auf die Einzelheiten der experimentellen Untersuchungen weiter einzugehen; in der Arbeit von Hanau, in dem Buche von Krause und an vielen anderen Stellen finden sich zahlreiche Angaben über die betreffenden experimentellen Untersuchungen. Nicht viel besser steht es mit den pathologischen Erfahrungen von der Abhängigkeit der Hornhauterkrankung von Trigeminasaffektionen. Auch hier sind alle möglichen Ansichten vertreten worden; man hat die Austrocknung des Auges, seine Unempfindlichkeit und die dadurch bedingte leichtere Verletzbarkeit auch beim Menschen zur Erklärung herangezogen, doch kommt man damit hier ganz gewiß nicht aus, da oft genug bei vollkommen erhaltenem Lidoclage und nicht veränderter Tränensekretion diese Momente nicht in Frage kommen können. (Siehe z. B. den Fall von Sachs'alber). Ein andermal schätzte eine bestehende Ptosis das Auge, und trotzdem kam es zur Entwicklung der Hornhautentzündung (Luksch, Fedoroff), während bei entgegengesetztem Verhalten, d. h. bei völliger Anästhesie und Lagophthalmus eine solche Entzündung ausbleiben konnte. Auch ein von Seydel gemachter Versuch, diese Differenzen aufzuklären, dürfte kaum auf

allgemeine Anerkennung rechnen; Seydel fand in drei Fällen von Hornhautanästhesie keine Zeichen von Keratitis neuroparalytica, während er sie in drei anderen Fällen von Quintuslähmung konstatieren konnte. In den letzten drei Fällen fanden sich Sympathicus-symptome, nämlich Retraktion des Bulbus, Verkleinerung der Lidspalten, Miosis. Er glaubt diese Sympathicus-symptome auch in den Fällen der Literatur, in denen sich die Hornhautaffektion fand, nachweisen zu können. Einer ähnlichen Auffassung geben Berger et Loewy Ausdruck, wenn sie annehmen, daß die trophischen Nerven für die Hornhaut für gewöhnlich nur zu einem kleineren Teil durch das Ganglion Gasseri laufen, während der größere Teil im sympathischen Plexus cavernosus seinen Weg nimmt. Seydel schließt: die Keratitis neuroparalytica ist eine Nekrose als Ausdruck einer durch vasomotorische Störung hervorgerufenen Ernährungsstörung, die erst bei Aufhebung der normalen Hornhautempfindlichkeit zustande kommt. Damit lebt die alte Theorie von Schiff wieder auf, nur daß Seydel nicht eine neuroparalytische Entzündung, wie Schiff will, sondern eine neuroparalytische Nekrose annimmt. Abgesehen davon, daß die Theorie klinisch keineswegs sicher gestützt ist, operiert sie mit der theoretisch höchst aufsehtbaren Annahme, daß eine Hyperämie an und für sich eine Ernährungsstörung zur Folge haben könnte. Soll diese Annahme vermieden werden, so bedarf es dann doch eben wieder der äußeren Schädlichkeit, die auf dem vasomotorisch und sensibel gelähmten Gebiete ihre Wirksamkeit freilich viel schneller und intensiver ausübt, als auf normalen.

Die ganze Frage der Keratitis neuroparalytica ist in neuerer Zeit in der ausführlichsten Weise von Wilbrand und Säger in ihrer Neurologie des Auges (II. Bd. S. 201—281) unter sorgfältiger Berücksichtigung der gesamten Literatur und mannigfacher eigener Erfahrungen behandelt worden. Sie führen sie auf Reizumstände im Trigeminalgeliet, die an irgendeiner Stelle des Verlaufes dieses Nervenabschnittes liegen können, zurück. Was sie auf der einen Seite die Annahme bestimmter trophischer Nerven zurückweisen, so vermögen sie sich doch der Einsicht nicht zu verschließen, daß die krankhafte Irritation von Nervenfasern im Trigeminalgeliet für die Entstehung der Affektion von grundlegender Bedeutung ist; sie weisen also die rein traumatische oder mykotische oder zerolische Theorie zurück.

Unter den „trophoneurotischen“ Hautaffektionen wollen wir im folgenden nur den *Dacryotus acutus*, das *Malum perforans pedis*, die Hautveränderungen nach peripheren Nervenkrankungen und schließlich die bei der Syringomyelie auftretenden berücksichtigen. Wir erinnern uns, daß wir über eine sehr wichtige hierbei zitierte Affektion bereits an früherer Stelle einige Worte gesagt haben, über die *Hemiatrophia facialis*. Im speziellen Teile werden

wir noch eine ganze Reihe anderer derartiger Hautveränderungen näher behandeln.

Der Decubitus acutus (rechare à développement rapide nach Charcot) entwickelt sich wenige Tage, ja in einigen Fällen wenige Stunden nach Eintritt einer centralen Nervenerkrankung; auf eine solche wurde er in manchen Fällen wenigstens von Samuel¹⁾ zurückgeführt. Die Nervenerkrankung kann eine cerebrale sein, insbesondere eine Blutung oder Erweichung, oder eine spinale, eine Myelitis oder eine Verletzung des Rückenmarks. Auch eine periphere Nervenerkrankung soll ihn verursachen können. Samuel führt einen Fall von R. Remak an, wo er angeblich durch Druck auf die Cauda equina entstand; auch Charcot²⁾ erwähnt einen Fall von Decubitus acutus, in dem die Ursprünge des Nervus ischiadicus und cruralis durch eine Beckengeschwulst komprimiert waren. Dieser Decubitus sitzt am Kreuzbein, an den Trochanteren, an den Fersen, zuweilen an den Knien, wenn diese aneinanderliegen, ausnahmsweise wohl auch einmal an den Bauchdecken. In den Fällen des Brown-Séquardschen Symptomenkomplexes, in denen es zum Decubitus kommt, sitzt er auf der Seite der Anästhesie und nicht der Lähmung, was Samuel zu der Folgerung veranlaßte, daß die trophischen Fasern, deren Läsion ihn verursacht, nicht mit den vasomotorischen zugleich verlaufen. Nach Samuels Ansicht kann dieser Decubitus nicht allein durch Druck entstehen, da er bei anderen Affektionen, die ein ebenso langes Krankenlager bedingen, wie z. B. bei Oberschenkelfrakturen, nicht vorkommt und außerdem sein Eintritt oft äußerst rasch erfolgt. Ebenso wenig kann Verunstetigung beschuldigt werden; denn er tritt an Stellen auf, die einer solchen gar nicht besonders ausgesetzt sind, wie z. B. an den Fersen. Auch eine Sensibilitätsstörung kann ihn nicht verursachen, denn sie ist hier keineswegs gar nicht vorhanden, in anderen Fällen schon wieder geschwunden.

Diese Ansicht von der trophoneurotischen Natur des Decubitus acutus ist nicht ohne Widerspruch geblieben, obwohl sie in Charcot einen gewichtigen Fürsprecher erhielt, der seinem Auftreten, wie bekannt, eine besondere prognostische Bedeutung beimaß, indem er ihn als ein höchst ungünstiges Zeichen auffaßte (Decubitus ominosus). Es haben aber später viele Erfahrungen bewiesen, daß durch peinliche Sauberkeit und Schutz vor Druck das Entstehen des Decubitus meist zu vermeiden ist, und daß er auch heilen kann, ohne daß die ihn verursachende centrale Nervenerkrankung heilt. Fast alle neueren Beobachter sprechen sich gegen die trophoneurotische Genese des Decubitus aus, ich nenne Kocher, Leyden-Goldscheider, Monakow, Oppenheim, Hanau. Monakow³⁾ bespricht speziell den Decubitus acutus

¹⁾ Samuel, Die trophischen Nerven, S. 232.

²⁾ Charcot, a. a. O., S. 62.

³⁾ Monakow, a. a. O., S. 198.

bei der Hirnblutung; nach seiner Ansicht handelt es sich teils um rein mechanische Wirkungen, teils um Reize infektiöser Natur; infolge von vasomotorischen Störungen, lokaler Cirkulationsabsperrung usw. kommt es leichter als sonst zur Aufnahme von Infektionskeimen durch die Haut und zur Hautnekrose. Daß nur die gelähmte Seite von solchen Störungen ergriffen wird, erklärt sich daraus, daß hier infolge der Lähmung auch jene kleinen reflektorischen Bewegungen, die mit gesunden Gliedern bei einwirkenden Reizen ausgeführt werden, unterbleiben. Unter anderen Verhältnissen fehlt zwar die motorische Lähmung, aber es tritt dann an ihre Stelle die Anästhesie, wie bei der Halbseitenlähmung. Jedenfalls haben wir es jedesmal, wenn wir einen Decubitus beobachteten, mit einem Komplex von verschiedenen Erscheinungen zu tun, deren Wirksamkeit im einzelnen sehr schwer abzuschätzen ist, und ich glaube nicht, daß die Möglichkeit bestritten werden kann, daß der akute Decubitus stets als Effekt dieser verschiedenen Störungen entsteht. Der strikte Beweis, daß der Decubitus eine direkte Folge einer nervösen Läsion ist, wurde bisher jedenfalls nicht geliefert. Dejerine und Lelsir glaubten zwar, eine periphere Ursache des Decubitus in der von ihnen aufgefundenen Neuritis parenchymatosa in der Umgebung mancher Hautnekrosen nachgewiesen zu haben, doch haben auch ihre Untersuchungen keine zwingende Beweiskraft, da von ihnen nicht nachgewiesen wurde, daß nicht auch dort, wo kein Decubitus bestand, degenerative Veränderungen in den peripheren Nerven vorlagen; eine solche Annahme ist bei der schweren Kachexie der betreffenden Kranken nicht gerade unwahrscheinlich; ferner ist nicht erwiesen, daß die nervösen Veränderungen der Entwicklung des Decubitus vorausgingen. Gewissen klinischen Erfahrungen gegenüber ist es freilich manchmal recht schwierig, die trophoneurotische Natur von Hautnekrosen, die sich an der gelähmten Seite abspielen, in Abrede zu stellen. So beobachtete ich vor kurzem einen Fall, bei dem eine unvollkommene Hemiplegie und Hemianästhesie eintrat, und bei dem nach wenigen Stunden direkt unter meinen Augen eine ausgedehnte, zur Nekrose führende, mit sehr heftigen Schmerzen einhergehende Blasenbildung am parietischen Oberschenkel eintrat, auf dem der Patient allerdings einige Stunden gelegen hatte. Ich sah einen zweiten Fall von Hemihyposästhesia vertebralis, bei dem sich kleine, schlecht heilende Bläschen auf der Rückseite der Finger immer wieder bildeten. In der Literatur finden wir auch derartige Erfahrungen niedergelegt; so berichtet Ingeltrans von pemphigusähnlichen Eruptionen auf der gelähmten Seite, ebenso Schlesinger, der im unmittelbaren Anschluß an eine linksseitige Lähmung mit schweren Sensibilitäts- und vasomotorischen Störungen einen mächtigen Blasenausschlag auftreten sah, der die gesunde Seite fast völlig verschonte, auch einige Wochen immer rezidierte und schließlich

unter Hinterlassung umfangreicher Pigmentierungen abheilte. Chvostek sah Ähnliches, Chatin hat schon vor längerer Zeit die hierhergehörigen Erfahrungen früherer Zeit zusammengestellt. Daß diese Störungen bei äußerst sorgfältiger Pflege vermeidbar sind, beweist nicht unmittelbar ihre sekundäre Natur. Jedenfalls scheinen mir die Verhältnisse noch dringend weiterer Aufklärung bedürftig.

Auch über die Genese des *Malum perforans pedis* ist ein völlig sicheres Urteil zurzeit nicht abzugeben, wenn auch hier wieder ein Zusammenhang zwischen Haut- und Nervenkrankung wahrscheinlich ist. Die ersten, die die Anschauung ausgesprochen haben, daß das *Mal perforans* auf neurotischer Grundlage entsteht, waren Duplay et Morat; ihre Angaben sind später oft genug bestätigt worden. Man findet das *Mal perforans* bekanntlich besonders bei Tabes, dann auch bei anderen spinalen (Syringomyelie und Spina bifida, Tumor des Rückenmarks) und neuritischen Erkrankungen (Lepra, Erkrankung peripherer Nerven), schließlich auch bei Diabetes und Alkoholismus. Ein sehr typisches Beispiel eines *Mal perforans* sah ich jüngst in einem Fall von Kompression der Cauda equina durch Tuberkulose des Kreuzbeines. Das Geschwür saß im Gebiete der Anästhesie. Die Anästhesie allein kann das Geschwür nicht hervorrufen, man trifft es z. B. bei der Tabes, ohne daß die Anästhesie in seiner Umgebung irgendwie das sonst bei dieser Affektion gewöhnliche Maß überschreitet. Als zweites Moment hat man den Druck hinzugenommen, der z. B. durch die Stiefel ausgeübt wird, und hat auf Grundlage dieser beiden Momente und einer bisweilen nachweisbaren Degeneration der Gefäßwände, insbesondere einer Sklerosierung der Gefäße das Uleus entstehen lassen. Auch eine gelegentliche Infektion hat man zu Hilfe genommen; aber auch heute noch ist es nicht sicher, ob wirklich das Zusammenwirken dieser Umstände zur Hervorbringung des *Mal perforans* genügt. Romak z. B. drückt sich über diesen Punkt sehr vorsichtig aus¹⁾: „Ob es notwendig ist, in solchen Fällen noch einen Anfall oder eine Erkrankung besonderer tropischer Nerven und eine erst dadurch bewirkte verminderte Widerstandsfähigkeit der Gewebe anzunehmen, muß dahingestellt bleiben.“ Leyden-Goldscheider sagen²⁾: „Möglicherweise existiert eine besondere Ursache des *Mal perforans*, welche aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen, zu welchen namentlich Nervendegeneration und die dadurch gesetzte verminderte Gefäßreaktion, sowie die Erkrankung der Gefäßwände selbst gehört, wirksam werden kann.“ In einer ganz ausführlichen Studie vom Jahre 1904 hat Adrian alle bis dahin bekannt gewordenen Tatsachen und Ansichten über das *Malum perforans*, seine Geschichte, pathologische Anatomie und Ätiologie

¹⁾ Romak, a. a. O., S. 149.

²⁾ Leyden-Goldscheider, a. a. O., S. 182.

zusammengestellt, die mechanische, vasculäre, nervöse und gemischte Theorie besprochen. Er kommt aber auch nicht zu einer ganz bestimmten Auffassung. Das ganz ausgesprochene Überwiegen der „nervösen“ Ätiologie geht zur Evidenz auch aus seiner Zusammenstellung hervor. Doch ist es sicher, daß das Ulcus nicht durch die Nervendegeneration eindeutig bestimmt ist, denn diese läuft keineswegs parallel der Hautaffektion, sie findet sich nicht nur an den Hautästen, sondern auch an den tieferen, und die Hautaffektion fehlt oft dort, wo eine entsprechende Nervendegeneration da ist. Auch pflegen bisweilen trotz selbstverständlich fortbestehender Nervendegeneration die gelegentlich eines operativen Eingriffs zur Entfernung des Geschwürs gesetzten Wunden gut zu heilen. Alles in allem, die Natur dieser Affektion ist nicht klar, die direkte Abhängigkeit von nervösen Störungen ist nicht erwiesen, es ist auch noch nicht sichergestellt, daß und wie das Geschwür durch Zusammenwirken anderer Umstände zustande kommt. Doch darf man wohl hier gerade mit einem großen Maß von Wahrscheinlichkeit an die Kombination von nervösen sensiblen Störungen mit solchen der Gefäßreflexe denken, zumal vasculäre Läsionen vielfach gefunden wurden. Der Annahme isolierter trophischer Nerven bedürfen wir auch hier gewiß nicht; andererseits werden wir dem Vorkommen des *Malum perforans* ohne Beihilfe neurotischer Störungen skeptisch gegenüberstehen dürfen. Neue Untersuchungen von Levy besagen, daß neben dem *Malum perforans* stets Knochenveränderungen vorhanden sind, bzw. Affektionen der benachbarten Gelenke. Wenn das auch für alle Fälle zutreffen sollte, was wohl noch zu erweisen ist, so wird damit in der prinzipiellen Auffassung dieser Affektion nichts geändert.

Wir wenden uns jetzt den Störungen der Haut zu, die nach Erkrankung peripherer Nerven in ihr auftreten, und besprechen besonders deren häufigste Form, die sogenannte *Glossy skin*. Nach Weir-Mitchell hat Denmark zuerst diese Störungen beschrieben, ihm ist ein halbes Jahrhundert später, 1864, Pagei gefolgt, dann haben Weir-Mitchell und seine Mitarbeiter besonders auf diesen Zustand aufmerksam gemacht. Wir finden in diesen Fällen bekanntlich die Haut stark rot gefärbt, verdünnt, glänzend, gespannt; der Kranke empfindet dabei oft ein lebhaft brennendes Gefühl und neuralgiforme Schmerzen. Die Falten der Haut und ihre Haare fehlen oft, die Haut ist empfindlich gegen alle äußeren Reize. Dieser Zustand der Haut ist von späteren Beobachtern oft wiedergefunden worden. Wichtig ist, daß für viele Fälle die Angabe Weir-Mitchells richtig ist, daß diese Hautveränderung sich oft einstellt, wenn es sich nicht um eine völlige Durchtrennung des Nerven, sondern um eine partielle Läsion und einen in ihm fortdauernden Reizzustand handelt. Remak freilich betont, daß die Weir-Mitchellsche Lehre dringend der Revision bedarf; es kommen nämlich ganz ähnliche Veränderungen auch nach ausgedehnten

Phlegmonen an Hand und Arm vor ohne erkennbare Beteiligung der Nervenstämmе. Auch wir haben mehrmals Gelegenheit gehabt, dies zu beobachten. Dabei muß man aber immer noch berücksichtigen, daß periphere Nervenverzweigungen insbesondere auch vasomotorische Ästchen sehr wohl erkrankt sein können. Ferner kann nach Remak diese Hautveränderung auch nach scheinend völliger Durchtrennung eines Nerven eintreten. Schließlich macht er darauf aufmerksam, daß verschiedenes dafür spricht, daß in zahlreichen Fällen Weir-Mitchells durch Infektion neben der Perineuritis auch anderweitige Entzündungsprozesse in der Haut vorgekommen sein mögen. Immerhin leugnet er keineswegs für alle Fälle die neurogene Natur dieser Erkrankungen. Ich glaube, daß es hierfür einen besonders bestimmenden Grund gibt, der in der Lokalisation dieser Hautveränderungen in einem bestimmten Nervengebiet gegeben ist. Finden wir diese, so dürfen wir mit Sicherheit annehmen, daß die Ernährungsstörung neurogener Natur ist; freilich ist damit wieder auch nicht entschieden, wie sie im speziellen Zustande kommt. In einem sehr charakteristischen Fall dieser Art, den ich vor einiger Zeit sah, ließ sich feststellen, daß bei der Kranken, die Glossy skin im Bereich des erkrankten Nervus ulnaris und medianus einer Seite aufwies (Glasplitterverletzung) die Zeichen allgemeiner Vasolabilität, Neigung zur Asphyxie der Finger usw. schon vorher in ausgesprochenem Maße vorhanden gewesen waren. Auch bei der Glossy skin könnte man wieder mannigfache Faktoren beschuldigen, bisweilen bestehen sicher vasomotorische und sekretorische Störungen, auf die wir im vorigen Kapitel bereits eingegangen sind. Rechterew betont besonders die Atrophie der Hautdrüsen, die die auffallende Glätte und Trockenheit — oft ist übrigens eher das Gegenteil der Fall — erklären soll. Aber es scheint nicht, als ob sich die eigentümliche Atrophie der Haut auf diese Weise erklären ließe.

Es sind noch andere Veränderungen der Haut nach Neuritis beschrieben worden. Sehr oft, das sei noch erwähnt, finden sich im Gebiete der Glossy skin allерhand Ausschläge namentlich bläschenförmiger Natur. Daß solche Eruptionen auch ohne Glossy skin vorkommen, lehrt u. a. ein von Strauß aus Oppenheims Poliklinik beschriebener Fall. Einige Male ist ichtthyotische Hautveränderung nach Neuritis beschrieben worden. Wir wollen auf die weiteren Einzelheiten nicht eingehen, da sie nicht von prinzipieller Wichtigkeit sind. Man hat Veränderungen der Nägel gefunden, ohne daß aber trotz speziell darauf gerichteter Aufmerksamkeit verschiedener Forscher sich Sicheres über ihre Entstehung ergeben hat. Bernhardt hebt als bemerkenswert hervor, daß das Nagelwachstum von dem Einfluß der die Finger und das Gewebe der Nagelbetten innervierenden Nervenäste relativ unabhängig ist. Bisweilen sind Pigmentanomalien beobachtet worden, oder Veränderungen des Haarwachstums, so z. B.

Ausfall und strichweises Grauwerden der Haare; letzteres besonders häufig bei den Neuralgien.

Ein sehr großes Kontingent neurotrophischer Hautveränderungen stellen schließlich die bei der Syringomyelie beobachteten Veränderungen dar. Es würde uns viel zu weit führen, wenn wir hier auf Einzelheiten eingehen wollten, auch hier finden wir die trophischen Veränderungen meist nicht isoliert, sondern mit allen möglichen motorischen, vasomotorischen und sensiblen Reiz- und Ausfallerscheinungen kombiniert. Es ist aber bis jetzt doch keineswegs gelungen, die hierbei beobachteten trophischen Störungen immer als sekundär bedingte nachzuweisen, vielmehr scheint mir die einfache klinische Beobachtung gerade hier oft genug gegen eine solche Ableitung zu sprechen. Wir sehen diese Störungen gelegentlich auftreten, auch ohne daß erhebliche andere Erscheinungen vorausgegangen wären, und auch, wo diese vorhanden sind, vermögen wir nicht festzustellen, daß zwischen ihnen und den trophischen Störungen ein bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis obwaltet. Jarsich hat in einem Fall von Herpes iris in der grauen Aehse des Rückenmarks Veränderungen gefunden, die er mit der Hautaffektion in Verbindung bringt, doch ist die Beobachtung zumal bei ihrer Singularität keineswegs einwandfrei.

Trophische Störungen der Haut, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine direkte Beeinflussung des Nervensystems zurückzuführen sind, haben wir bereits früher noch bei der Hemiatrophia facialis kennen gelernt; auf die bei den vasomotorisch-trophischen Neurosen vorkommenden mannigfachen Störungen dieser Art gehen wir im speziellen Teile ein.

Wenn wir nun die Wege, auf denen der trophische Einfluß für die Gewebe der Haut fortgeleitet werden kann, näher ins Auge fassen, so werden wir zuerst an die sensible Leitungsbahn denken. In die Ursprungszellen dieser Leitungsbahn, die Spinalganglienzellen, hat man schon vor langen die trophischen Centren für die Haut verlegt. Einige experimentelle Versuche schienen dafür zu sprechen; so hat Axmann sich schon im Jahre 1847 für diese Funktion der Spinalganglien ausgesprochen und beinahe 50 Jahre später dieselben Anschauungen in einer neuen Arbeit aufrecht erhalten. Er hat dabei das Vorkommen eigener trophischer Nerven gelangweilt und hat die Tätigkeit der Spinalganglien so formuliert, daß sie spezifisch trophische Arbeit leistende Organe zur Tätigkeit anreizen. Gaulle hat beim Frosch unmittelbar nach Verletzung des zweiten Spinalganglions lokale (Ausblößen und Auftreten von Warzen oder Vertiefungen in der Haut der Dorsalseite, quaddelige Quellung der Beugeseite) wie allgemeine Veränderungen der Haut eintreten sehen (Pigmentverlagerung nach der Bauchseite, Auftreten von Flecken, Warzen, Defekten in der Haut). Bei Kaninchen soll Läsion eines oder mehrerer cervicalen Spinalganglien

speziell Stichverletzung ohne Eröffnung des Duralacks, solange die Hinterwurzeln erhalten sind, in etwa der Hälfte der Fälle ganz akute Blutungen in der Stammuskulatur bewirken, in welchen schon innerhalb 48 Stunden Narbenbildung einsetzt, ferner in einzelnen Fällen Blutungen und narbige Veränderungen in der Haut. Doch auch diese Versuche Gaules sind ebenso wie seine anderen oben erwähnten als nicht beweiskräftig erwiesen worden. Daß in einer großen Anzahl von Fällen nach Exstirpation der Spinalganglien keine trophischen Störungen gefunden wurden, ist bekannt und von uns erwähnt. Auch Joseph spricht sich gegen die Anschauung Axmanns aus, daß in den Spinalganglien Ernährungszentren für die peripheren Gebilde vorhanden sind. Unter den pathologischen Tatsachen schien für eine trophische Rolle der Spinalganglien der Befund zu sprechen, daß man bei Herpes zoster in ihnen Veränderungen fand (Bärensprung).

Der Herpes zoster gehört seit langem zu den Hautaffektionen, bei denen eine direkte neuropathische Grundlage angenommen wurde. Der Entdeckung Bärensprungs gegenüber wurde mehrfach festgestellt (Curschmann, Eisenlohr), daß auch neuritische Veränderungen Herpes hervorzurufen imstande sind. Dabier wollte in einigen Fällen neben neuritischen Veränderungen auch die Integrität der Spinalganglien nachgewiesen haben. An einem außerordentlich großen Beobachtungsmaterial haben aber Head and Campbell mit völliger Sicherheit festgestellt, daß dem primären spontanen Herpes eine akute, oft hämorrhagische Entzündung der Spinalganglien zugrunde liegt (Poliomyelitis posterior acuta). Howard, Hedinger, Dejerine-Thomas haben diese Befunde bestätigen können. Head gibt aber die Möglichkeit zu, daß der Prozeß seinen Ausgang von jeder anderen Stelle der viscerosympathiko-spino-radikulären Bahn nehmen könne. In der Tat ist er auch einige Male bei Erkrankungen der centralen grauen Substanz gefunden worden. Thomas-Laminière wiesen hämorrhagische Herde in der grauen Substanz des entsprechenden Seitenhorns nach, außerdem, was vielleicht von großer Wichtigkeit ist, Degenerationen der Rami communicantes des Sympathicus. Diese Befunde bestätigen die Ansicht Kaposi's, der erklärte, daß überall Zoster entstehen kann; bei peripheren Leiden, bei Erkrankungen der Spinalganglien und ihrer centralen Fortsätze im Rückenmark, vielleicht sogar bei gewissen Gehirnerkrankheiten.

Was die näheren Bedingungen der Entstehung der trophischen Veränderungen der Haut beim Herpes zoster angeht, so sprechen sich Head and Campbell trotz ihrer so ausgedehnten persönlichen Erfahrungen sehr vorsichtig aus, indem sie sagen: We do not imagine

*) Kaposi, Lehrbuch der Hautkrankheiten 1899, S. 322.

that the eruption of herpes zoster is produced by disturbance of special trophic nerves, but by intense irritation of cells in the ganglion, which normally subserve the function of pain. Daß die Erfahrungen beim Herpes zoster von Samuel fälschlich als Beweis für die Annahme isolierter trophischer Nerven angesehen wurden, haben wir bereits oben erwähnt. Kohnstamm nimmt an, daß eine eigenartige Reizung des sensiblen Endneurons eine krankhafte Veränderung auf der Haut hervorzubringen vermag und er glaubt, daß diese Erregung nicht auf dem gewöhnlichen Wege über das Rückenmark und den Sympathicus geleitet wird, sondern direkt in den peripherischen Fortsatz der Spinalganglienzelle, der gewöhnlichen Leitungsrichtung entgegengesetzt absteigt. Demgegenüber denkt Lewandowsky (l. c. S. 110) an die Fortleitung irgendeines toxischen Stoffes von den Spinalganglienzellen durch die Nervenfasern zur Peripherie. Diese Annahme scheint mir, besonders in Rücksicht auf die strenge Beschränkung der trophischen Störungen auf bestimmte Nervengebiete recht unwahrscheinlich. Alles deutet vielmehr darauf hin, daß Reizprozesse, die sich an irgend-einem Abschnitt des sensiblen Endneurons (peripherer Nerv, Spinalganglion, extra- und intramedulläre hintere Wurzel) abspielen, und die offenbar eine gewisse uns nicht näher bekannte Qualität haben müssen, zu trophischen Störungen in der Haut vom Charakter des Herpes Veranlassung geben. In Anlehnung an Kohnstamm muß man mit der Möglichkeit der Fortleitung des Reizes in antidromer Richtung rechnen. Vielleicht kommt aber doch häufiger oder gar ausschließlich der andere noch mögliche Weg in Frage, der über die sensible zur vasomotorischen Bahn führt und durch reflektorische Erregung der letzteren die trophischen Störungen schafft, die mit den vasomotorischen für gewöhnlich eng zusammenhängen. Die Entscheidung erscheint für die Zukunft nicht unmöglich. Der Nachweis trophischer Störungen in gefäßlosen Gebieten (Hornhaut) spräche zugunsten einer direkten Reizung der sensiblen Fasern mit antidromer Verlaufsrichtung. Da wo sensible Innervation und vasomotorische Innervation der Haut nicht zusammenfallen, wäre durch exakte Analyse möglicherweise zu erkunden, ob die trophischen Störungen sich an das sensible oder das vasomotorische Interventionsgebiet halten. Der Nachweis der Mitaffektion sympathischer Fasern bei der Zoster-Erkrankung ist oben bereits erwähnt und als bedeutsam gekennzeichnet worden. Doch ist nicht zu erwarten, daß es sich da um eine konstante Erscheinung handelt, da Herpes zoster auch im Bereich von Spinalganglien vorkommt, die keine Beziehungen zum Sympathicus haben (cervicale Ganglien).

Die multiple neurötische Hautangrän, auf die wir im speziellen Teil näher eingehen werden, steht dem Herpes zoster nahe, beschränkt sich aber freilich nicht auf bestimmte Nervengebiete.

Sie ist besonders ausführlich von Kreibich in ihrer Pathogenese studiert worden. Die in Frage kommenden Möglichkeiten sind dieselben wie beim Herpes zoster. Kreibich nimmt als Ursache eine Reizung der Vasodilatatorbahn an, die reflektorisch durch Reizung sensibler Nerven bedingt ist. Die hier wirksamen Reize können toxische, elektrische, psychische sein. Daß Kreibich die Gangrän rein als Folge vasomotorischer Phänomene auffaßt, gibt mir zu lebhaften Bedenken Anlaß, die später begründet werden sollen. Daß auch die Affektion ganz peripherer Abschnitte des sensiblen Leitungsapparates zu trophischen Störungen Veranlassung geben kann, haben wir oben gelegentlich der Besprechung der bei peripheren Neuritiden eintretenden trophischen Störungen bereits zu konstatieren Gelegenheit gehabt.

Einen außerordentlich wichtigen Beitrag zu dieser Frage verdanken wir Rievers und Head. Head ließ sich zum Zwecke genauer Sensibilitätsuntersuchungen an sich selbst den *Ramus superficialis nervi radialis* durchschneiden. Ein kleines Stück wurde exstirpiert, die Enden wurden mit zwei Sidenstühten wieder zusammengenäht. In derselben Weise wurde der *Nervus cutaneus antibrachii lateralis* verschnitten und zusammengenäht. Die Autoren machen selbst darauf aufmerksam, daß sonst dort, wo nutritive Störungen bei peripheren Neuritiden eintreten, motorische und sensible Fasern gemeinsam zerstört zu sein pflegen und die eintretende Lähmung das Bild zu stören geeignet ist, und daß in diesem experimentellen Falle alle Fehlerquellen eliminiert waren. Es waren nur afferente Nerven zerschnitten und die Bewegungsfähigkeit blieb völlig frei. Während der Operation hatte man Bedacht darauf genommen, den Handrücken vor jeder mechanischen Läsion und vor jeder Reizung durch Antisepsie zu schützen. Trotzdem trat vier Tage nach der Operation in der analgetischen Partie eine Schwellung auf. Die Oberfläche war rau und die Haut erschien mit epithelialen Schuppen bedeckt. Eine Woche später wurde die Haut hier unelastisch und schrumpelig wie bei einem alten Manne. Dieser Mangel an Elastizität rief eine Empfindung hervor, als ob die betreffenden Teile mit Collodium bedeckt wären. Außerdem bildeten die obersten epithelialen Schichten kleine klesenartige Schüppchen, die Haut war in überem Gelüste trocken und stärker gerötet, die Haare waren auffällig unregelmäßig angeordnet, es bestand auch Anhidrosis. Das ganze Gebiet war ein wenig tiefer rot gefärbt als der Rest der Haut der Hand. Die Ausdehnung dieser Veränderungen deckte sich absolut mit der Aufhebung der Schmerzempfindlichkeit. Wenn man mit der Nadel einen Strich über den Handrücken zog, so verschwand die weiße, durch das Kratzen hervorgerufene Linie auf der normalen Haut in kürzester Zeit, auf der erkrankten blieb sie bisweilen für einige Tage deutlich sichtbar. Mückenstiche, welche fünf Tage später auf der erkrankten Partie noch sichtbar waren, waren auf den gesunden Teilen nicht mehr zu er-

kennt. Die Trockenheit und Anhidrosis begannen im proximalen Abschnitt nach 112 Tagen allmählich zu schwinden, aber die Haut der Hand blieb noch bis 189 Tage nach der Operation von abnormer Beschaffenheit. Mit der Rückkehr des Schwitzens verlor die Hand die eigentümlich blaue Farbe, welche sie während der ersten fünf Monate nach der Operation charakterisiert hatte. Das Nagelwachstum blieb unbeeinflusst. Neben diesen vasomotorisch-sekretorischen Störungen bildeten sich zwei bis drei Monate nach der Operation auch trophische Störungen aus. Offenbar nach einer Äthylchlorid-Spray entstand im Centrum der affizierten Partie ein Geschwür. Das erste, was sichtbar wurde, war ein kleines Bläschen, das eine ganz geringe Flüssigkeitsmenge enthielt. Die Decke des Bläschens wurde beim Waschen entfernt und es blieb eine raue Oberfläche. Wenn man diese Stelle bedeckte, schien eine Heilung einzutreten, aber die kleinsten Reize des gewöhnlichen Lebens ließen die Ulceration wieder auftreten. Vom 162. Tage an wurde das Geschwür trocken, von der Peripherie her erschien ein Epithelbelag. Zeitlich fiel damit die Wiederkehr der Schmerzempfindung zusammen. Eine kleine Stelle blieb aber noch bis zum 185. Tage analgetisch und genau solange blieb das Geschwür an dieser Stelle noch bestehen. Die Autoren heben ausdrücklich den strengen Parallelismus zwischen Heilung des Geschwürs und Rückkehr der Schmerzempfindung hervor.

Die ganze Beobachtung ist in ihrer Exaktheit für uns von außerordentlicher Wichtigkeit. Ein kleiner Reiz, wie er von der gesunden Haut standstillig ertragen wird, hatte hier ausgereicht, um langdauernde trophische Störungen hervorzubringen in einem Falle, wo man ganz gewiß sein konnte, daß nur rein periphere sensible Nerven beschädigt waren. Auf der anderen Seite lehren die bei Rückenmarkskrankheiten beobachteten trophischen Störungen, von denen wir oben gesprochen haben, daß offenbar auch die Affektion der centralen intramedullären Fortsätze der Spinalganglien zu trophischen Störungen führen können. Sie scheinen mir im wesentlichen dann einzutreten, wenn die Hinterhörner oder die hintere weiße Substanz erkranken. Isolierte Veränderungen dieser Art, d. h. auf der einen Seite reine trophische Störungen, auf der anderen umschriebene Veränderungen der hinteren grauen Substanz wurden freilich bisher noch nicht beobachtet. Die früher mitgeteilten Erfahrungen über Auftreten von trophischen Störungen bei der cerebralen Hemiplegie und Hemianästhesie sprechen dafür, daß auch Affektionen der centralen Teile der sensiblen Bahn zu trophischen Störungen führen können. Von Wichtigkeit ist ein weiterer Punkt, auf den schon wiederholt hingewiesen ist, daß es nämlich vorzüglich nicht die totalen Durchtrennungen sind, die trophische Störungen hervorrufen, sondern bei weitem mehr die partiellen Läsionen, die einen Reizzustand im Nerven

setzen. Das hat, wie wir schon gesehen haben, zu Erklärungsversuchen geführt, denen wir bei Charcot, Weir-Mitchell, Vulpian begegnet sind. Auch Oppenheim¹⁾ erkennt diese Tatsache an und formuliert seine Ansicht in folgender Weise. Er nimmt an, daß der Reizzustand im peripheren Nerven sich auf das trophische Centrum fortpflanzt; hier stimmt er dessen Funktionen dahin an, daß es zu Ernährungsstörungen in den entsprechenden Nervengebieten kommt. Bezüglich der bei Rückenmarkserkrankungen beobachteten trophischen Störungen nimmt Oppenheim an, daß die Spinalganglien nur dann ihre trophischen Funktionen in normaler Weise ausfüllen können, wenn sie die Reize, die ihnen überliefert werden, im Rückenmark durch ihren centralen Fortsatz fortleiten können, daß dagegen durch Verhinderung dieser Fortleitung und Anhäufung der Reize im Spinalganglion in diesem eine Umstimmung erfolgt, wodurch die nutritiven Vorgänge in der Peripherie in abnormer, pathologischer Weise verlaufen. Wir begegnen bei dieser Erklärung einem Prinzip wieder, das in etwas anderem Zusammenhang auch von Lenhossek und Lugaro, wir schon erwähnt, benutzt wurde. Nicht alle vorliegenden Erfahrungen stimmen aber zu dieser Anschauung; auch darüber haben wir uns schon ausgesprochen. Hier sei nur noch erwähnt, daß im allgemeinen bei einfacher Zerstörung der centraleren Teile der sensiblen Leitungsbahn trophische Veränderungen in der Haut nicht gerade häufig sind, wie wir sie denn z. B. bei den Affektionen des Rückenmarks durch Trauma, durch Geschwülste, ferner auch bei den meisten Querschnittserkrankungen zu vermissen pflegen. Es verdient vielleicht auch hier die Tatsache Berücksichtigung, daß es gerade oft mit Reizescheinungen einhergehende Krankheiten sind, die zu trophischen Störungen führen; für die Gliosis wenigstens scheint nach dem, was wir über ihre pathologische Anatomie wissen, diese Auffassung nicht unberechtigt. Wieso es kommt, daß eine Reizung die supponierte trophische Funktion schwerer schädigt als die völlige Aufhebung der Leitung, darüber wollen wir später noch einiges sagen.

Wenn wir den Weg sensible-vasomotorische Leitungsbahn für Entstehung von Hautveränderungen nach den genannten Erfahrungen in Anspruch zu nehmen geneigt sind, so müssen wir naturgemäß auch zu ergründen versuchen, ob Alterationen des vasomotorischen Systems direkt und an und für sich imstande sind, einen Einfluß auf die Ernährung der Haut auszuüben. Man hat sich da zunächst an den Hals-sympathicus gehalten und hat ihm auf Grund experimenteller wie pathologischer Tatsachen eine Bedeutung für die Ernährung der Haut zugesprochen. Von den ersteren erwähne ich die Versuche von Arlwing. Durchschneidung des Vagasympathicus beim Rinde bewirkte

¹⁾ Oppenheim, *Lehrb. der Nervenkrankheiten*. N. Aufl. S. 77.

Aufhören der Drüsensekretion an der entsprechenden Seite der Schnauze, die allerdings nach 48 Stunden schon wieder beginnt; Reizung des peripheren Stumpfes ruft sehr starke Sekretion hervor; außerdem aber tritt an den betreffenden Stellen nach der Durchschneidung allmählich eine Trockenheit und Verdickung der Epidermis ein. Beim Hunde lehnen bei ähnlicher Operation die anfänglichen sekretorischen Anomalien ganz, und die allmählich eintretende Verdickung findet sich hier doch auch. Arlving schließt aus seinen Versuchen: der Halsstrang des Sympathicus führt beim Hunde und Rinde neben Gefäß- und Sekretionsnerven trophische Nerven; die letzteren haben Einfluß auf das Epithel der äußeren Decke und der Drüsen, ihre Wirksamkeit ist unabhängig von Gefäß- und Drüsenerven. Jedoch kugnet Grützner die Beweiskraft der Arlving'schen Versuche, weil nicht mit Sicherheit nachgewiesen wurde, daß die Epithelveränderung nicht eine Folge der Sekretionsanomalien sei. Angelucci sah bei Katzen, denen er das oberste sympathische Ganglion abtrug, mangelhafte Entwicklung der Schädelknochen, unregelmäßige Bildung und Ausfallen der Zähne und Haare auf der operierten Seite, ferner trophische Störungen der Haut. Morat et Dayen fanden bei zwei Hunden trophische Veränderungen der Gesichtshaut und der Mundschleimhaut nach Durchschneidung des Halsympathicus. Cohanovici (zit. nach Bechterew, l. c. S. 535) fand nach Durchschneidung des Sympathicus beim Hund und Kaninchen Verschmächtigung und Schichtenverminderung des Stratum Malpighii, Volumabnahme, Abflachung und stärkere Pigmentierung der Zellen der untersten Schicht und Veränderungen an den Haaren.

Diese Experimente sind insgesamt wenig beweiskräftig, zumal Hertel die Angaben Angelucci's durchaus nicht bestätigen konnte. Auch die Pathologie liefert kein Material, um die Frage zu entscheiden. Es ist bekannt, daß der Sympathicus zu einer sehr großen Reihe von Erkrankungen in Beziehung gebracht wurde (siehe die Übersicht bei Onuf und Collins und das Referat von Ziehen). Für sehr viele Fälle hat sich diese Annahme als völlig falsch herausgestellt, für andere bleibt die Möglichkeit oder vielmehr Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs doch bestehen. Dahin gehören vor allem gewisse trophische Erkrankungen, die mit Veränderungen der Haut, des Unterhautgewebes und der Knochen einhergehen und die das Gebiet der vasomotorisch-trophischen Neurosen umfassen. Schwimmer hat zuerst dem Sympathicus eine Rolle in der Genese verschiedener Hautaffektionen zugeschrieben. Er nahm an, daß von ihm besondere trophische Nerven ausgehen, doch finden sich in seinen Ausführungen keine Beweise für eine derartige Auffassung. Unter den hierher gehörigen Affektionen ist es vor allem die *Hemiatrophia facialis progressiva* gewesen, die man auf eine Affektion des Sympathicus zurückzuführen geneigt war. Doch hat diese Ansicht auch frühzeitig schon, besonders von

seits Möbius' heftigen Widerspruch erfahren. Wir werden auf die Pathogenese dieser wichtigen und interessanten Krankheit in einem späteren Kapitel noch ausführlich eingehen haben. Aber jedenfalls darf auch hier schon gesagt werden, daß die Sympathicustheorie der Hemiatrophia facialis progressiva auch in neuerer Zeit vielen Anklang findet. So tritt auch neuerdings noch Oppenheim (Lehrbuch 5. Auflage S. 1548) für sie ein. Die für diese Auffassung sprechenden Gründe scheinen auch mir außerordentlich beachtenswert zu sein. In diesem Zusammenhang erwähne ich nur, daß man gelegentlich, wenn auch nicht gerade häufig, zusammen mit der Hemiatrophie oculopapilläre Symptome vorfindet, wie das auch in einem von Schönfeld mir mitgeteilten und photographisch belegten Fall sehr deutlich ist (siehe beistehende Abbildung Fig. 2, die wenigstens die Lidspaltdifferenz und den Exophthalmus, leider nicht die Pupillendifferenz erkennen läßt). Auch einzelne Erfahrungen von dem Vorkommen von Reizprozessen in der Nähe des Hals sympathicus (Oppenheim, Minwi, Bourcyeux, Barret und andere) sprechen in diesem Sinne. Die Sympathiektomie wurde zwar erfolglos angewendet (Chipault), doch ist das ganz gewiß kein gegen die Theorie entscheidendes Moment.



Fig. 2

Hemiatrophia facialis progressiva dextra.
Oculopapilläre Symptome.

Die mit der Hemiatrophie nahe verwandte und mit ihr pathogenetisch wohl identische Sklerodermie ist von Brissaud mit großer Energie als eine Affektion sympathischen Ursprungs erklärt worden. Die ganze Frage von der Rolle, die der Sympathicus bei der Ernährung der Haut und anderer Teile des Körpers spielt, ist in ein neues Stadium getreten, seitdem durch die schon erwähnten Versuche von Lapinski und seinen Vorgängern die Veränderung der Gefäßwand nach Sympathicusdurchschneidung festgestellt wurde. Daß auf diesem Wege Hautveränderungen entstehen können, ist sicher anzunehmen. Außerdem ist denkbar, daß durch Durchschneidung des Sympathicus oder Läsionen desselben auch Ver-

änderungen in anderen Teilen der Haut, die er funktionell beherrscht, eintreten können, wie in der glatten Muskulatur der Haut und in ihren Drüsen. Für andere Teile der Haut scheint mir dagegen eine direkte Abhängigkeit vom Sympathicus unwahrscheinlich zu sein, und wenn man Störungen ihrer Trophik sekundär auf diesen Nerven zurückführen will, etwa durch die Vermittlung von Gefäßveränderungen, so wird man vorher den Beweis solcher Veränderungen zu erbringen haben, der bei den trophischen Störungen der Haut keineswegs immer zu führen ist. Es ist also nicht anzunehmen, daß für alle Fälle Sympathicus-Läsionen direkt als Ursache der trophischen Hautaffektionen angesehen sind. Vielmehr geht aus unseren früheren Erörterungen schon hervor, daß auch die sensible Leitungsbahn für die Entstehung derartiger Störungen sehr in Betracht kommt. Wie im einzelnen diese Vorgänge sich abspielen, darauf werden wir im speziellen Teil noch an vielen Stellen zurückzukommen haben. Es liegt ja eine Reihe von Möglichkeiten vor; es ist denkbar, daß der Reiz direkt auf der vasomotorischen Leitungsbahn centrifugal sich fortsetzend zu trophischen Veränderungen Anlaß gibt. Es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß, wie das schon erörtert wurde, der Reiz auf der sensiblen Leitungsbahn in centrifugaler Richtung verlaufend direkt nutritive Schädigungen hervorzubringen imstande ist. Das wahrscheinlichste aber scheint mir, daß am häufigsten diese Störungen auf reflektorischem Wege in dem Sinne entstehen, daß an der sensiblen Leitungsbahn ein Reiz angreift, der in ihr centripetalwärts verlaufend auf das sympathische System übertragen wird und in diesem centrifugalwärts zur Peripherie fortgeleitet wird.

Der Begriff des sympathischen Systems ist in dieser Beziehung oft zu eng aufgefaßt worden, indem man dabei wesentlich nur an den Grenzstrang des Sympathicus gedacht hat unter Vernachlässigung derjenigen Teile des Systems, die in den centralen Partien des cerebrospinalen Nervensystems gelegen sind. Die neueren Auffassungen über den Aufbau des vegetativen Systems im ganzen stellen uns vor die Frage, ob wir imstande sind, für die hier supponierte trophische Funktion irgend ein bestimmtes der oben näher unterschiedenen vegetativen Systeme in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, daß diese Frage zurzeit völlig unentschieden bleiben muß. In erster Linie wird man natürlich an das sympathische System im engeren Sinne zu denken haben, wegen der intimen Beziehung zwischen diesem und der Gefäßinnervation. Bindende Beweise können, soweit unsere bisherigen Kenntnisse reichen, hier nur durch den Nachweis der oben angegebenen pharmakologisch-toxischen Reaktionen geliefert werden. Selbst der Versuch hierzu ist bisher noch in keinem der in Frage stehenden Krankheitsbildern in systematischer Weise gemacht worden. Daß in manchen von ihnen sympathikotonische Symptome klinisch deutlich in die Erscheinung

treten, darf allerdings ohne weiteres zugegeben werden. Einen gewissen Anhaltspunkt für die Lokalisation mancher trophischen Störungen ergeben in anderer Hinsicht die Erfahrungen auf dem Gebiete der Syringomyelie, derjenigen organischen Erkrankung, die zu den mannigfaltigsten trophischen Störungen der Haut, der Gelenke sowie der Knochen führt. Hier ist es nach allen Erfahrungen die Affektion der seitlichen und mittleren, zum Teil vielleicht auch der hinteren grauen Substanz, die für die Entstehung der trophischen Störungen in Frage kommt. Das sind Stellen, an denen auch räumlich vasomotorische und sensible Gebiete nahe zusammenliegen. Im Gebiet der vasomotorisch-trophischen Neurosen selbst fehlen, wie wir später sehen werden, alle beweiskräftigen anatomischen Befunde. Aber manches spricht auch hier dafür, daß der *Locus morbi* gelegentlich hier an dieser Stelle zu suchen ist.

Wenn wir mit großer Wahrscheinlichkeit in der Störung des Reflexmechanismus zwischen sensiblen und vasomotorischem System für einen großen Teil der Fälle der vasomotorisch-trophischen Neurosen und damit der trophischen Störungen der Haut überhaupt die pathologische Grundlage zu suchen bestrebt sind, so ergibt sich aus dieser Auffassung, daß wir bei dem Umlauf dieses Reflexbogens auf eine bestimmte Lokalisation verzichten und damit nur den Versuch einer Systematisierung machen. Jeder Lokalisationsversuch muß vorläufig daran scheitern, daß unsere Kenntnisse über die Funktion der einzelnen Abschnitte der vasomotorischen Bahn bzw. des sympathischen Systems im engeren Sinne noch vollkommen unzureichende sind, daß wir nicht wissen, ob die Art und die Verteilung der vasomotorischen Störung eine *differentie* ist, je nachdem Centren oder Bahnen und je nachdem corticale oder subcorticale, medulläre, spinale und sympathische periphere Teile der Bahn affiziert sind, ganz im Gegensatz zu den Kenntnissen, die wir in dieser Beziehung auf dem Gebiete der Motilität und auch auf dem der Sensibilität für derartige Bestimmungen besitzen. Hier ist also das Meiste noch zu tun. Unsere Erfahrungen und Überlegungen führen uns nicht viel weiter als bis zu dem Punkt, zu dem Nothnagel schon vor langer Zeit gekommen ist.

Nothnagel hatte die Hypothese aufgestellt, daß die Regelung der Ernährung durch die Gefäßnerven erfolge, die reflektorisch von den die Sensibilität leitenden Nerven beeinflusst werden. Marinesco und Sériex, ferner auch Leyden-Goldscheider sind geneigt, diese Hypothese zu unterstützen. Leyden-Goldscheider bemerken, daß dieser Reflexmechanismus vielleicht erst dann sich in merklicher Weise geltend macht, wenn besondere Anforderungen an die Widerstandskraft der Gewebe gestellt werden. Für den centripetalen Abschnitt des Reflexbogens kommen hier vielleicht besonders vasosensible Fasern in Betracht. Das Vorhandensein derartiger Fasern

ist sehr wahrscheinlich, sie stellen vielleicht einen Teil der im Sympathicus verlaufenden afferenten Fasern dar; ihre Reizung gibt Anlaß zu den heftigen und in bezug auf Ausdehnung und Qualität eigentümlich gearteten Schmerzen, die wir bei den vasomotorisch trophischen Neurosen finden. Noch ganz kürzlich hat Neumann einen Beweis für die Sensibilität der inneren Organe erbringen zu können geglaubt, indem er (beim Frosch) durch Reizung von Darmteilen, die vom Mesenterium enthüllt waren, Erregungen im Rückenmark auslöste; eine Lücke in der Bewußtführung für das Vorhandensein sympathikosensibler Fasern wurde so ausgefüllt; was hier von enterosensiblen Fasern gezeigt wird, kann auf vasosensible unbedenklich übertragen werden.

Wir haben bereits erwähnt, daß in der Tat Reizung der sensiblen Nerven von außerordentlich großem Einfluß auf den Zustand der Gefäße ist, und daß man z. B. eine viel stärkere Hyperämie erreichen kann, wenn man gewisse sensible Nerven reizt, als wenn man selbst den Sympathicus durchschneidet. Wir werden daher wohl Grund haben, auch diesem Reflexmechanismus eine erhebliche Rolle in der Ernährung der Gewebe zuzuschreiben. Auf der anderen Seite müssen wir uns vergegenwärtigen, daß es Reflexe innerhalb des sympathischen Nervensystems nicht zu geben scheint. Überall da also, wo wir Grund zu der Annahme haben, daß eine reflektorisch entstandene Störung vorliegt, werden wir deren Ursachen nicht allein in den Sympathicus verlegen dürfen.

Wir können zusammenfassend also sagen, daß für den nervösen Einfluß auf die Ernährung der Haut und der unter ähnlichen Bedingungen befindlichen Gewebe, wie der Knochen und Gelenke, die sensible und die vasomotorische Leitungsbahn zu Verfügung zu stehen scheinen.

Wenn wir nun von einer Ernährungsstörung der Haut sagen wollen, ob sie neurotrophisch bedingt ist oder nicht, so werden wir in der Klinik nur nach dem einen Gesichtspunkte verfahren können, daß wir nämlich zunächst untersuchen, ob diese nutritive Störung durch irgendein anderes Symptom erklärt wird. Es wird in diesen Fällen aber nicht genügen, festgestellt zu haben, daß überhaupt noch eine andere Störung vorliegt, insbesondere eine Anästhesie oder eine Änderung in der Füllung der Gefäße. Wir werden vielmehr verlangen müssen, daß ein bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis zwischen diesen Symptomen und den nutritiven Störungen erkennbar wird; mir wenigstens erscheint es richtiger, in Fällen, wo eine solche Abhängigkeit sich nicht klar ergibt, es bei der einfachen deskriptiven Auffassung ruhig sein zu lassen und schaff zwischen den einzelnen Störungen, seien sie nun sensible, vasomotorischer oder trophischer Natur, zu unterscheiden. So nur wird es möglich sein, schließlich dennoch, wenn

wirklich ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den einzelnen Faktoren besteht, dessen Gesetzmäßigkeiten aufzufinden, d. h. zu erfahren, welcher Art die grundlegenden vasomotorischen und sensiblen Symptome sein müssen, in welcher Art sie sich eventuell kombinieren müssen, um zu trophischen Störungen zu führen. Unberechtigt dagegen erscheint es mir, solange theoretisch nicht nachgewiesen ist, daß solche Störungen stets sekundär sein müssen und nicht ausgemacht ist, wie sie bedingt sind, sie von vornherein immer, sobald sie nicht ganz isoliert auftreten, als sekundäre anzufassen. Ich werde also auch in der Folgezeit im speziellen Teil von dieser Auffassung Gebrauch machen und werde diejenigen Störungen der Ernährung als tropho-neurotische resp. im engeren Sinn trophische bezeichnen, die wenn auch im Zusammenhang mit anderen nervösen Symptomen, doch ohne sichere oder wenigstens wahrscheinliche gesetzmäßige Abhängigkeit von ihnen der klinischen Beobachtung sich darbieten.

Diese Stellungnahme ist natürlich nur eine provisorische, aber sie scheint mir für die klinische Betrachtungsweise die einzig richtige zu sein. Um so mehr, als sowohl die schon mitgeteilten klinischen Erfahrungen, als besonders auch die, die aus unsere Betrachtungen im speziellen Teil noch liefern sollen, es mir nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich erscheinen lassen, daß für die Ernährung der Haut, der Knochen und der Gelenke eine nervöse Beeinflussung vorhanden ist und auf den vorher geschilderten Wegen verläuft. Über die trophische Innervation innerer Organe ist nur wenig zu sagen. Die nach doppelseitiger Vagotomie auftretende Längentrübung hat nach allgemeiner Übereinstimmung eine andere Erklärung gefunden. Interessant sind Nékam's Versuche die zeigen, daß die entnervte Niere nach intravenöser Streptokokkeninfektion stets in viel schwererer Weise erkrankt als die andere.

Unsere Betrachtungen haben uns demnach zu der für den ersten Augenblick überraschend erscheinenden Auffassung geführt, daß nicht nur für die „aktiven“ Gewebe (Muskeln, Drüsen) sondern auch ganz besonders für die „passiven“ (Haut, Knochen, Gelenke) eine Abhängigkeit von trophisch-nervösen Einflüssen wahrscheinlich erscheint, daß aber für die letztgenannten Gewebe diese Abhängigkeit enger zu sein scheint, als für die erstgenannten. Bei genauerer Überlegung erscheint diese Differenz insofern aber recht plausibel, als bei den aktiven Geweben die Aufrechterhaltung der Trophik durch die Funktion viel einfacher und sicherer gewährleistet ist, als bei den passiven; hier besteht zwischen Funktion und Ernährung wohl auch ein enger Zusammenhang, aber es bedarf hier doch eines besonders fein abgestuften Reflexmechanismus, um die

spezifische Funktion und die Ernährung der Gewebe stets in vollkommenem Einklang zu halten.

Ein Punkt wäre noch zu besprechen, das ist die uns ebenfalls von der Klinik nahegelegte Erfahrung, daß im allgemeinen mehr die pathologische Veränderung der Innervation als ihre völlige Aufhebung zur Schädigung der Ernährung der Gewebe führt, wobei aber ebenfalls wieder nur die nicht motorisch (oder sekretorisch) innervierten Gewebe in Betracht kommen. Wir haben gesehen, daß dafür bereits verschiedene Erklärungen gegeben wurden; mir scheint folgendes der Berücksichtigung wert. Erstens sei nochmals daran erinnert, daß gerade Reizungen der sensiblen Nerven einen sehr großen Einfluß auf die Gefäßinnervation haben. Etwas anderes ist vielleicht noch wichtiger. Wir können uns vorstellen, daß im allgemeinen die Gewebe zwar trophisch innerviert werden, daß aber bei Wegfall dieser Innervation auch ohne neurotrophischen Einfluß die Zelle bei gewöhnlichen Anforderungen ihre nutritive Tätigkeit spontan ausübt. Danach wäre ein Ausfall der trophischen Innervationen nur dann von Bedeutung, wenn an die Ernährung der Gewebe durch irgendwelche andere Ursachen erheblichere Anforderungen gestellt werden. Sie würde z. B. nicht mehr ausreichen, wenn ungünstige Einflüsse einwirken wie lang anhaltender Druck oder Austrocknung und Ähnliches mehr. Ganz anders gestaltet sich die Sache, wenn an irgendeiner Stelle die Innervation durch einen Reiz in pathologischer Weise modifiziert wird. Solange dieser Reiz andauert, wird notwendigerweise, ganz abgesehen von äußeren Bedingungen, auch die Ernährung der diesem Reiz unterworfenen Gewebe pathologisch verändert werden. Wir sind oben bereits bei der vasomotorischen Innervation ähnlichen Bedingungen begegnet, und wir werden auch weiterhin bei der klinischen Analyse derjenigen Krankheitsbilder, in denen vasomotorische und trophische Symptome eine große Rolle spielen, oft genug wieder konstatieren müssen, daß eher eine pathologisch gestörte, denn eine aufgehobene Innervation in Frage kommt. Daß wir übrigens auch auf dem Gebiete der Sensibilität den Reizsympptomen eher begegnen, als den Ausfallsymptomen, lehnen vielfache Erfahrungen. So kann eine häutere Wurzel durch eine Neubildung völlig zerstört sein, ohne daß ein Sensibilitätsdefekt zum Vorschein kommt, während die Reizung auch nur weniger Fasern einer solchen Wurzel zu dauernden und alarmierenden Symptomen führt.

Bezüglich des Unterschiedes von aufgehobener und pathologisch veränderter trophischer Innervation ist aber doch noch folgendes zu erwägen. Schon Samuel hat mit allem Nachdruck darauf auf-

merksam gemacht — siehe darüber auch die Ausführungen an früherer Stelle — daß das Aufhören des trophischen Nerveneinflusses die Ernährung und die auf sie begründeten Vorgänge des Wachstums und der Neubildung nicht zum Stillstand bringt, sondern sie nur herabsetzt. „Ohne diesen Nerveneinfluß geht der Ernährungsprozeß nur in dem Grade der Lebhaftigkeit vor sich, dessen die Gewebe aus alleinigem eigenem Antriebe bei mangelnder Erregung fähig sind.“ Ohne diesen Nerveneinfluß besteht also, wie man sich wohl ausdrücken könnte, eine *Vita minor* oder *Vita minima* in den ernervierten Geweben; unter günstigen äußeren Bedingungen, wenn keine besonderen Ansprüche an die Leistungsfähigkeit des Gewebes herantreten, kann es in seiner Ernährung ungeschädigt bleiben; aber jede stärkere Inanspruchnahme genügt, um seine Trophik zu schädigen — oder wie man zu sagen pflegt, das Gewebe ist empfindlicher geworden: so mag ein leiser Druck genügen, die Haut des Myelitisranken zur Nekrose zu bringen, ein Druck, der sonst von der gesunden Haut anstandslos ertragen wird; so verursacht die kleinste äußere Schädlichkeit an der entnervten Cornea einen Substanzverlust. Man ist oft geneigt gewesen, zu glauben, daß mit dem Nachweis einer solchen äußeren Schädlichkeit als unmittelbarer Bedingung einer Ernährungsstörung der Beweis geliefert ist, daß es sich nicht um eine trophoneurotische Störung handelt. Diese Auffassung scheint mir aber nicht richtig zu sein. Die normal ernährten Gewebe des Körpers sind eben vermöge ihres ganzen Aufbaus und ihrer Aufgaben nicht für einen idealen Ruhezustand bestimmt, sondern sie sollen gewissen äußeren oder auch inneren Schädlichkeiten, soweit sie über eine bestimmte Grenze nicht hinausgehen, Widerstand entgegensetzen und ihre trophische Integrität wahren. Bringt sie der leichteste Reiz schon zum Zerfall, so ist ihre Trophik gestört, und in den Fällen, die wir im Augenblick im Auge haben, ist die Exservation die Ursache dieser Störung. Wir sind ja vollkommen berechtigt und auch gewohnt, bei anderen Geweben einen Funktionsausfall bereits dann anzunehmen, wenn sie irgendwie erhöhte Leistungen nicht mehr aufzubringen vermögen; so sprechen wir z. B., wenn wir beim Muskel einen Funktionsdefekt erst bei stärkerer Inanspruchnahme erkennen können, doch von einer Parese des Muskels; ja wir kennen hier sogar ein Krankheitsbild, dessen Hauptzug die pathologische Ermüdbarkeit des Muskels ist. Nicht minder werden wir, um es nochmals zu wiederholen, einen Defekt der Ernährung der Haut annehmen dürfen, wenn diese bei den gewöhnlichen Anforderungen, die die gesunde Haut intakt lassen, bereits mit einer Schädigung ihres Aufbaus reagiert. So kann, wie mir scheint, eine trophoneurotische Ernährungsstörung sich nicht gar selten hinter anderen Bedingungen verstecken, und erst eine sorgfältige Analyse der Einzelheiten des Vorganges kann zu einer richtigen Auffassung führen. Daß oft aber der Vorgang der Ernäh-

rungsstörung ein so komplizierter ist, daß alle Genauigkeit der Beobachtung nicht zu sicherer Erkenntnis führt, haben wir schon oft genug betont. Die vorstehenden Zeilen sollten nur zeigen, daß zurzeit allzu sehr das Bestreben vorherrscht, die eine Seite der Erscheinungen hinter der andern zurücktreten zu lassen.

Wir sind bisher auf die Art der trophischen Störungen der Haut und ähnlicher Gewebe nicht weiter eingegangen und haben im speziellen nicht weiter danach gefragt, ob wir es mit Erscheinungen der Atrophie, der Dystrophie oder der Hypertrophie zu tun haben. Im allgemeinen wird man sagen müssen, daß durchaus die dystrophischen Prozesse im Vordergrund stehen. Eine einfache Atrophie in dem Sinne, daß jedes der Elemente, aus denen das Gewebe sich zusammensetzt, in gleichem Verhältnis zu den anderen atrophiert, so daß das gegenseitige Verhältnis der Elemente unbeeinflusst bleibt, wird kaum beobachtet, ebensowenig ein rein hyperplastischer Vorgang. Auch das entspricht der Tatsache, daß pathologische Abänderung der Innervation hier die Hauptrolle spielt.

Es ist schon vielfach betont und von uns auch erwähnt worden, daß die trophische Funktion des Nervensystems keine automatische ist, so wenig wie irgendeine andere nervöse Funktion. (Weir-Mitchell, Vulpian, Kopp, Marinesco, Goldschneider.) Die notwendige reflektorische Anregung haben die genannten Autoren in den zahlreichen, sei es von der Peripherie, sei es von den Centralorganen zu den betreffenden nervösen Centren verlaufenden Reizen gefunden. Einer ganz besonderen Auffassung der Frage, welche Reize dieser Anregung der trophischen Centren dienen, begegnen wir bei Grale. Er geht von der Erwägung aus, daß die Erhaltung eines Organismus wesentlich darauf beruht, daß die von ihm und in ihm entwickelten Kräfte den äußeren Kräften, mit denen seine Umgebung auf ihn einwirkt, das Gleichgewicht halten. Die Aufgabe des Nervensystems ist es im allgemeinen, diese Entwicklung gerade auf den Punkt einzustellen, in dem dies Gleichgewicht hergestellt ist. Die äußeren Kräfte zerfallen in zwei Klassen: erstens die in ihrer Wirkung rasch schwankenden Kräfte, denen auch wir mit rascher Entwicklung entgegenstrebender Kräfte begegnen; hierher gehören z. B. die Abwehrbewegungen; zweitens die Kräfte, unter deren Einfluß wir nicht minder stehen, die aber wegen ihrer stetigen Wirksamkeit für uns nicht sinnfällig sind, also die Schwerkraft, der Luftdruck, die Temperatur, die Wasserdampf- und Oberflächenspannung und gewisse elektrische Spannungen der Atmosphäre. Die Einstellung der Kräfte des Organismus gegen diese Kräfte muß ebenso kontinuierlich und kann ebenso unbewußt vor sich gehen wie die Wirkung der entsprechenden äußeren Kräfte, und sie muß unter dem Einfluß des Nervensystems stehen, wenn sie für den Organismus

mit einer gleichmäßigen Ökonomie erfolgen soll. Die Beweise, die Gaule für diese Anschauung in seinen schon von uns zitierten Experimenten gibt, sind, wie ich bereits erwähnt habe, keineswegs anerkannt worden. Wir dürfen wohl sagen, daß die von Gaule besonders hervor-gehobenen Einflüsse nicht ohne Bedeutung sind, aber wir haben gar kein Recht, in ihnen die einzigen Momente zu sehen, durch die die trophischen Funktionen des Nervensystems angeregt werden. Indem wir vielmehr an der Hypothese festhalten, daß die trophischen Funktionen des Nervensystems reflektorisch bedingt sind, wenden wir den Kreis der wirksamen Erregungen viel weiter fassen müssen und für alle centripetalen Reize die Möglichkeit offen lassen, daß sie zu solcher Erregung beitragen.

Zusammenfassend möchte ich über die physiologische Bedeutung der pathologischen Erfahrungen sagen: Es liegen keine Erfahrungen vor, die uns nötigen, isolierte trophische Nerven anzunehmen. Dagegen weisen zahlreiche klinische Beobachtungen darauf hin, daß das Nervensystem eine trophische Funktion ausübt. Diese ist nicht für alle Gewebearten gleich geartet. Sie steht im engen Zusammenhang mit der besonderen Funktion der betreffenden Gewebe. Der trophische Einfluß wird auf den für diese Funktion zur Verfügung stehenden Bahnen geleitet. Die Haut erhält ihre trophischen Impulse auf dem Wege der sensiblen und vasomotorischen Leitungsbahn. Sie verlaufen hier zum Teil in einer der sonstigen Funktionen entgegengesetzten Leitungsrichtung. Der Reflexmechanismus, der den Weg von der sensiblen zur vasomotorischen Leitungsbahn benützt, ist für die Ernährung der Haut von größter Bedeutung. Ähnlich liegen die Verhältnisse für die Knochen und Gelenke, während für die Muskeln und Drüsen der Zusammenhang mit der Funktion ein ganz anderer ist, und der trophische Einfluß, wenn auch unter reflektorischer Erregung, ohne weiteres auf den für die spezielle Funktion zur Verfügung stehenden Bahnen ablaufen kann. Selbst hier stehen aber auch vasomotorische Bahnen zur Verfügung.

Zweites Kapitel.

Die Akroparästhesien und verwandte Zustände.

Der Name Akroparästhesien stammt von Schultze; er hat ihn zuerst in einer Dissertation von Mohr aus dem Jahre 1880 für die hier in Frage stehenden Zustände vorgeschlagen und ist einige Jahre später in einer eigenen Publikation nochmals ausführlich auf den Gegenstand zurückgekommen. Schultze ist aber nicht der erste, der sich mit diesen Affektionen beschäftigt hat, doch war bis zu seinen Arbeiten deren Kenntnis trotz einer Anzahl von Einzelpublikationen noch wenig verbreitet. Schultze hat mit dem kurz und passend gewählten Namen erst so recht eigentlich das Bürgerrecht für sie erworben.

Die erste ausführliche Beschreibung rührt wohl von Nothnagel her. Vor Nothnagel hat den Angaben Bernhards zufolge Martin in einer nur nicht zugänglichen Schrift verwandte Dinge beschrieben.

Nothnagel entwirft folgendes Bild von der Krankheit: Alle seine Kranken waren weiblich, zwei von 14 waren Wäscherinnen. Die Entstehung der Affektion wurde meist auf Kälteeinwirkung zurückgeführt. Die Symptome stellten sich oft allmählich, selten plötzlich ein; es waren vor allem Parästhesien: das Gefühl der Verraubung und Vertäubung, als ob die Finger fehlten, außerdem wieder das Gefühl von Eingeschlafensein, von Kriebeln, dazu kommen häufig ziehende, reißende Schmerzen. Niemals fehlte ein Gefühl von Kälte. Die Störungen befallen die Finger, Hände und Vorderarme, die Handteller waren meist weniger betroffen. Es bestehen ferner subjektive Störungen des Tastsinnes. Die Patienten können nicht erkennen, ob eine Oberfläche rauh oder glatt ist. Objektiv besteht eine Abnahme der Empfindungsschärfe für Nadelstiche, für Tastempfindungen, für Temperatur- und elektrische Reize. Die Störungen erstrecken sich nicht auf bestimmte Nervengebiete und sind meist doppelseitig. Die Motilität ist im wesentlichen frei; nur wird oft geklagt, daß feinere Arbeiten wegen der Steifigkeit der Finger schwer vorstatten gehen.

Meist sind die Finger blaß, ganz weiß, kreideweiß, und Nothnagel hat sich von dieser Tatsache wiederholentlich selbst überzeugen können. Die Hände fühlen sich auch kälter an als normal. Dagegen fand sich bei ungleicher Verteilung der Farbenveränderung auf die beiden Hände niemals ein Unterschied im Radialspuls oder bei derselben Radialis ein solcher im- und außerhalb des Auffalls.

Die Beschwerden sind des Morgens und in der Kälte schlimmer. Klopfen, Binsten, warmes Wasser bringen Erleichterung. Die Krankheit

hat meist einen remittierenden Verlauf. Die Blässe der Teile und die Abnahme der Temperatur lassen sich nach Nethnagel nur durch einen verringerten Blutzufluß erklären. Für diesen ist die Ursache in einem arteriellen Krampf zu suchen, und Mittel, die einen solchen produzieren, steigern daher auch die Erscheinungen, solche, die die Arterien erweitern, bringen sie zum Schwinden. Beachte man in einem Falle, in dem die linke Hand stärker betroffen war und schlechter fühlte als die rechte, die linke Hand in Wasser von 37°, so war bezüglich der Sensibilität zwischen beiden Händen kein Unterschied mehr vorhanden.

Alles das beweist dem Autor, daß auch die Anästhesie durch den Gefäßkrampf, der nur die Hautarterien betrifft, bedingt ist.

Die nächsten Jahre brachten keine weiteren Publikationen über das Thema; nur soll nach einer Angabe Saundbys Jones hierhergehörige Fälle beobachtet und beschrieben haben; doch ohne genauer zwischen Taubheit und Schmerzen zu unterscheiden (Jones, *Studies on functional nervous disorders* 1870 p. 550). Erst im Jahre 1880 hat Putnam ohne Kenntnis der Nethnagelschen Arbeiten über hierhergehörige Fälle berichtet.

Auch er fand sie fast nur bei Frauen, die im Alter zwischen 20 und 50 Jahren und darüber standen. Häufig bestand allgemeine Schwäche oder Anämie. Die Parästhesien waren nachts und morgens am stärksten, oft kamen Schmerzen hinzu. Eine Farbveränderung der Haut der Finger war manchmal zu konstatieren (stärkere Blässe oder Röte). Eine Hand war meist stärker befallen als die andere; der Verlauf war ein recht chronischer.

Ähnliche Zustände haben Ormerod und Sinkler beschrieben. Sinkler ist später noch einmal auf das Thema zurückgekommen.

Eine sehr anschauliche und vollständige Schilderung des Krankheitsbildes verdanken wir Saundby. Es handelt sich nach ihm um ein Taubheitsgefühl und ein Kriechen wie bei Druck auf einen Nervenstamm, bald in einer, bald in beiden Händen, bisweilen auch in den Füßen. Die Parästhesien sind mehr oder weniger schmerzhaft, begleitet von vorübergehender Schwäche, kommen deutlich anfallsweise, meist des Nachts oder beim Erwachen; zuweilen sollen sie von Cyanose oder von Kältegefühl oder von Verengung der Radialis begleitet sein. Die leichteren Zustände dieser Art finden sich meist bei Frauen, gerade die schwereren aber bei Männern. Sie kommen ungefähr gleich oft in je einer der Hände, seltener in beiden Händen oder beiden Füßen (paraplegische Form), am seltensten in den gleichseitigen Extremitäten, Hand und Fuß (hemiplegische Form) vor. Sehr häufig sollen Störungen der Magenfunktionen das Leiden begleiten.

Ähnliche Fälle hat auch Moir beobachtet.

In Deutschland lenkte zuerst Bernhardt die Aufmerksamkeit wieder auf das Leiden. Nach ihm handelt es sich um dauernd vorhandene

und anfallsweise stärker auftretende, vorwiegend subjektive Sensibilitätsstörungen in den Händen und Fingern, um das Gefühl von Absterben, Vertoten, Taubwerden, Fedrigsein, Kriebeln meist der Finger. Doch können sich die Störungen bis auf die Oberarme ausdehnen und direkt schmerzhaft werden. Es werden beide Hände befallen, oder nur eine, zuweilen nur einzelne Finger, jedoch wird kein Nervengebiet bevorzugt, und es finden sich nie Druckschmerzpunkte. Die objektive Sensibilitätsstörung ist meist gering. Keine Lähmung, keine Atrophie, kein Weißwerden der Finger. Nach dem Schlafen sind die Beschwerden intensiver. Betroffen sind meist Frauen zwischen 40 und 60 Jahren, ätiologisch kommen Klimakterium, Gravidität, Puerperium, ferner Anämie und andere Dyskrasien in Betracht, schließlich die Beschäftigung mit kaltem Wasser.

Nunmehr erst folgen der chronologischen Folge nach die Arbeiten von Schultze.

Das gut abgrenzbare Krankheitsbild weist nach ihm die folgenden Züge auf:

Meist bei Frauen, aber auch bei Männern stellen sich, gewöhnlich allmählich, Parästhesien in den Händen und Fingern, seltener auch in den Füßen ein; meist in Form von Formikationen, nicht selten aber kommt es zu erheblichen Schmerzen und zu einem Gefühl von Steifigkeit; feinere Bewegungen können verlangsamt und selbst gehemmt werden. Die Parästhesien sind sehr häufig des Nachts und am Morgen am stärksten und lassen im Laufe des Tages nach, oft sind sie im Winter heftiger als im Sommer. Sie sind sehr hartnäckig und können Jahre dauern, ohne daß sich weitere Komplikationen einstellen. Die Hautfarbe der Hände ist meist nicht verändert, insofern wurde auch auffallendes Weißwerden zusammen mit größerer Kälte während der Anfälle beobachtet. Nie stärkere Röt. Keine Abnormität an Arterien und Venen. Sensibilität meist normal, doch kommen Hyperästhesie und Hyperalgesie vor, besonders während der Anfälle aber auch Hypalgesie. Keine Druckempfindlichkeit der Nervenstämmen. Keine Atrophien. Hier und da wird über Schwäche der Glieder geklagt.

Schultze behandelt in seinen Publikationen des weiteren ausführlich die Abgrenzung und die Pathogenese des Krankheitsbildes; wir werden Gelegenheit haben, auf diese Punkte im Verlauf unserer Darstellung zurückzukommen.

Die Autoren, die in der Folge über dies Krankheitsbild geschrieben haben, haben seine Symptomatologie nicht mehr mit wesentlichen Zügen bereichern können. In Unkenntnis der Schultzeschen Arbeit hat wenig später Laquer über derartige Krankheitsbilder berichtet, des weiteren ausführlich Friedmann, und in einer zusammenfassenden Darstellung v. Frankl-Hochwart und ich (1. Auflage dieser Monographie). Kunstliche Beiträge wurden ferner von Collins, Ballet,

Hackroße, Schmidt, Egger, Dejerine, Pick u. a. beigebracht; außerdem finden sich Darstellungen des Krankheitsbildes in den Lehrbüchern von Eichhorst, Oppenheim, Strümpell, Curschmann.

Der im folgenden gegebenen Darstellung liegen außer den aus der Literatur geschöpften Erfahrungen solche über etwa 200 Fälle eigener Beobachtung zugrunde.

Ätiologie.

Geschlecht, Alter. In überwiegendem Maße sind Frauen betroffen. Frankl-Hochwart fand unter 223 Kranken (davon 56 eigener Beobachtung) nur 19 Männer. Savill berechnet den Anteil der Frauen auf 82,8%, Collins dagegen nur auf 69% (bei einer Gesamtzahl von 100 eigenen Beobachtungen). Ich fand unter meinen 40 ersten Fällen nur 3 Männer (I. Aufl.), unter den 150 letzten aber doch 24 Männer und komme damit auf ungefähr dieselbe Verhältniszahl wie Savill. Auch jetzt noch finde ich allerdings die atypischen Fälle bei den Männern relativ häufig.

Was das Alter betrifft, so waren unter 372 Fällen (94 der Statistik von Frankl-Hochwart, 184 eigene Beobachtungen, 94 Fällen von Collins)

| | |
|-----------------------|-----|
| unter 20 Jahren | 1 |
| zwischen 21—30 Jahren | 59 |
| „ 31—40 „ | 102 |
| „ 41—50 „ | 114 |
| „ 51—60 „ | 81 |
| „ 61—70 „ | 39 |
| „ 71—80 „ | 1 |

Zwischen 30—60 Jahren standen unter diesen 372 Fällen also nicht weniger als 297. Das Durchschnittsalter betrug in meinen Fällen bei Männern 45,5, bei Frauen 41,5 Jahre.

Die jüngste Patientin, die ich beobachtete, war ein 7jähriges Mädchen, das über ein Gefühl von Kriebeln und Trockenheit in den Fingern klagte. Es war ein nervöses Kind, das ein Jahr zuvor Keuchhusten gehabt hatte. Nachts sollen die Hände steif sein, nach dem Wachen soll das Gefühl am stärksten sein; eine Veränderung der Farbe war nicht bemerkt worden. Objektiv fand sich nichts. Savill sah die Symptome zweimal bei Kindern. Frankl-Hochwart sah das Krankheitsbild bei einem 12jährigen Mädchen; ich selbst beobachtete ferner noch ein 16jähriges Mädchen; doch handelte es sich in diesem Falle um die Nethnagelsche Varietät der Krankheitsform, d. h. um ausgesprochene Blässe der Finger neben den Akroparästhesen. Die älteste Patientin, die Curschmann sah, war 73 Jahre.

Beruf. Die arbeitenden Klassen stellen das Hauptkontingent dieser Kranken, und zwar sind es namentlich die Frauen, die viel waschen, viel Handarbeit machen usw. Doch ist dieser Faktor nicht ausschlaggebend, gelegentlich befallt die Affektion auch Personen, die manuell nicht tätig sind. Am meisten von Einfluß scheint die Beschäftigung mit Wasser zu sein. Etwa 40 von meinen Fällen hatten sich vermöge ihres Berufes öfter solchen Schädlichkeiten aussetzen, darunter befanden sich eine auffällig große Anzahl von Kutscherfrauen, die bei ihrer Beschäftigung des Wagenwaschens sowohl der Nässe als auch der Kälte preisgegeben waren. Freilich litt keiner der betreffenden Eheherrn an demselben Ubel. Thermische Schädlichkeiten sind auch sonst noch öfter als ursächlich wirksam angegeben worden; Oppenheim sah einmal die Krankheit plötzlich entstehen, als ein Kranker im Sommer die schwitzenden Hände mit Eis in Berührung brachte, einer meiner Patienten hatte mit Eis zu tun, ein anderer war Heizer. Überanstrengung der Hände wurde von einer Anzahl meiner Kranken beschuldigt, so angestrengtes Nähen, Plätten, Melken. Wiederholt traten die ersten Störungen nach angestrengtem Waschen auf. Ätiologisch kommen bei den Frauen weiterhin noch gewisse Zustände des Sexuallebens in Betracht. So ist von mehreren Beobachtern hervorgehoben worden, daß besonders häufig Frauen im Klimakterium befallen wurden (Schultze, Friedmann, Jaquer, Bernhardt). Von anderer Seite wieder (Saundby) wird demgegenüber der Einfluß des Klimakteriums abgelehnt unter Hinweis auf die Fälle, bei denen sich die Parästhesien erst weit jenseits des Klimakteriums einstellten, so einmal erst 15 Jahr nach Beginn desselben. Auch in einer Anzahl unserer Fälle traten die Störungen erst jenseits des Klimakteriums auf, während sie aber doch viel häufiger gerade in die Zeit des Klimakteriums fielen. Mehrfach entwickelten sie sich im Puerperium, oder nach einem Abort, nicht selten, mindestens in zehn Fällen meiner eigenen Beobachtung während der Gravidität und es kam auch vor, daß sie bei späteren Schwangerschaften rezidierten. Von besonderem Interesse sind die Fälle, in denen die Akroparästhesien unmittelbar nach Extirpation des Uterus und der Ovarien auftraten, also dort wo eine *Climax praecox* geschaffen wurde. Ich habe das in sechs Fällen beobachtet, so daß an dem ursächlichen Zusammenhang wohl nicht gezweifelt werden kann. Ich teile etwas ausführlicher den folgenden Fall mit, bei dem, was sonst wegfiel, noch ein weiteres ätiologisches Moment in angestrengtem Plätten zu suchen war.

Es handelt sich um eine 40-jährige Frau. Am 14. Oktober 1895 Totalexstirpation des Uterus wegen Myoma uteri. Am 14. Dezember strengt sie sich mit Plätten an, am anderen Morgen erwacht sie mit Steifigkeit in der rechten Hand, dann kommt weiches Kriebeln, erst rechts, dann links und zu den Fäßen. Das Kriebeln, griechische, warme Gefühl blieb aber links immer schwächer als rechts. Dann traten

gleichzeitig liegende Hitze, Schweiß, Blutmischung zum Kopf auf. Die Parästhesien waren des Morgens am stärksten, die Pat. hatte auch das Gefühl, als ob ihre Hand gestrandet sei. Die objektive Untersuchung ergab völlig normale Verhältnisse. Die Beschwerden waren lange Zeit sehr erheblichen. Eine antirheumatische Behandlung mit dem jodischen Handbad brachte Besserung.

Einen Fall mit ähnlicher Ätiologie beschreibt Sinkler.

Bei einer 41-jährigen Frau wurden beide Ovarien entfernt. Sie bekam Taubheitsgefühl, Prickeln, Schmerzen in der rechten Hand im Thoraxgebiet. Nach einigen Tagen war auch die linke Hand ergriffen. Der objektive Befund war negativ. Hier brachte Jodtinktur Heilung.

In beiden Fällen finden sich neben den Parästhesien noch sonstige Beschwerden, die in Zusammenhang mit der vorzeitigen Climax zu bringen sind.

Ein Zweifel darüber, daß ein gewisser Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Parästhesien und den Störungen der sexuellen Funktionen bzw. gewissen normalen Vorgängen des weiblichen Geschlechtslebens besteht, kann demgemäß kaum aufrecht erhalten werden. Immerhin darf nicht vergessen werden, daß in einer großen Reihe von Fällen keinerlei derartige Beziehungen vorlagen.

Den eben erörterten ätiologischen Momenten dürfte sich am ungezwungensten eines anschließen, das uns in einem unserer Fälle entgegentrat, eine Neigung zu Blutungen, ein gewisser Grad von Hämophilie, der in dem betreffenden Fall darin sich kund gab, daß u. a. gelegentlich einer einfachen Zahnextraktion die Blutstillung nur sehr mühsam gelang.

Friedmann glaubte feststellen zu können, daß allgemeine Anämie, ferner schlechte Herzaktion, Arteriosklerose das Entstehen der Parästhesien begünstigt. Auch Laquer fand häufig Anämie und Herzschwäche, nie dagegen größere Kreislaufstörungen. Ein entscheidender Einfluß wird diesen Momenten nach meinen Erfahrungen nicht beizulegen sein. Immerhin möchte ich doch erwähnen, daß unter meinen männlichen Kranken drei mit ausgesprochener Arteriosklerose waren. Es handelte sich in diesen Fällen in der Tat um das echte Bild der Akroparästhesien, nicht etwa um Vorläufererscheinungen irgendwelcher organischer Erkrankungen. Unter unseren Patientinnen waren sonst dagegen eine ganze Reihe mit vollkommen normalem Ernährungszustand, ebenso fehlten Störungen von seiten des Herzens, sowohl objektiver, wie subjektiver Art in fast allen Fällen. Doch begünstigen immerhin alle allgemein schwächenden Krankheiten das Erscheinen der Akroparästhesien. Von vorausgegangenen Krankheiten ist sonst nicht viel zu berichten. Am häufigsten ist in der Anamnese noch von rheumatischen Beschwerden die Rede, arthritische Veränderungen habe ich wiederholt zu beobachten Gelegenheit gehabt, doch muß darauf

hingewiesen werden, daß beide Symptomenkomplexe sehr wohl auch durch dieselben ätiologischen Schädlichkeiten, unabhängig voneinander bedingt sein können. Saundby fand, daß sehr häufig Störungen der Magenfunktionen dieses Leiden begleiten und auch veranlassen, und daß die Störungen nach der Beseitigung der Magenbeschwerden verschwinden. Von den späteren Autoren hat keiner außer Möbius und Collins, der unter 100 Fällen 32 mal Obstipation und 25 mal Magenstörungen fand, dies Verhältnis bestätigen können; wir haben nichts derartiges beobachtet, jedenfalls von einem ätiologischen Zusammenhang uns nicht überzeugen können. In einem Fall, den Shaw berichtet, traten Akroparästhesien als Ausdruck einer Fischvergiftung auf und verschwanden alsbald wieder nach deren Beseitigung.

Gelegentlich war in Fällen unserer Beobachtung Influenza vorausgegangen, ebenso in einem Falle Schmidts. Laes war nur selten nachweisbar, so daß an irgendeinen Zusammenhang nicht zu denken ist.

Schmidt hat eine ganze Reihe von Beobachtungen veröffentlicht, in denen die Lungentuberkulose ätiologisch von Wichtigkeit war, doch schied er selbst seine Fälle von der mehr selbständigen Form der Akroparästhesien. Wir kommen auf Schmidts Arbeit noch zurück.

Sechsmal war in unseren Fällen Alkoholismus nachweisbar, davon dreimal in sehr ausgesprochenem Maße bei männlichen Patienten. Es wäre verlockend, wenigstens bei diesen den Alkoholismus verantwortlich zu machen, zumal der einzige männliche Patient Frankl-Hochwarts Wirt war — allerdings wollte er nicht viel trinken — doch stehen einer Verwertung des Alkoholismus die Angaben Schaltzes entgegen, der unter seinen sechs männlichen Patienten keinen Alkoholisten fand. Fry beobachtete einen Fall mit uratischer Diathese, auch ich habe einmal dasselbe gesehen.

Von weiteren Intoxikationen sei noch eine Angabe Schaltzes erwähnt. Hier glaubte der Kranke, sein Leiden auf Arbeiten im Wasser und Salmiak (zu Putzwecken) zurückführen zu sollen, er hatte alle 8–14 Tage hindurch 2½ Tage in dieser Weise zu hantieren. Einer meiner Patienten hatte Seife zu kochen, ein anderer setzte sich dadurch einer herabfälligen Intoxikation aus, daß er als Arbeiter in Gasterarten viel ungereinigte Gase einatmen mußte.

In bezug auf die Ätiologie erwähnenswert sind schließlich noch einige unserer Fälle, in denen ein Trauma eine Rolle gespielt haben soll. Einmal handelte es sich um eine 44-jährige Frau. Vor fünf Jahren geriet sie mit den Fingern der linken Hand in eine Maschine, die Endphalangen der Finger wurden damals erheblich gequetscht. Seit dieser Zeit bestehen unangenehme Empfindungen in dieser Hand, Schmerzhaftigkeit der Kuppen der zweiten bis vierten Fingers, des Morgens und in der Nacht stellt sich das Gefühl der Vertaubung am stärksten ein, es kommt dann

auch zu Bewegungsbehinderung, die Patientin kann keine Nadel einfädeln, sich nicht anziehen. Die Finger sollen zu solchen Zeiten auch blaß werden. Eine genaue Untersuchung ergibt keinerlei objektive Erscheinungen, speziell keinerlei neuritische Symptome. Bei einem Schlächter traten die Akroparästhesien nach einem Fall auf den rechten Ellbogen auf, sie blieben dauernd auf die rechte Hand beschränkt. In einem Fall, den Sommer mitteilt, war es ähnlich; die Verletzung bestand hier in einer Quetschung des ersten bis vierten Fingers der linken Hand. Die Parästhesien traten in typischer Weise im wesentlichen nachts und morgens auf. Bei dem Patienten Wilda stellten sich nach einem Stoß gegen den linken Ellbogen zeitweilig auch links die abnormen Empfindungen ein, auch Mondio berichtet von traumatischer Genese.

In einem weiteren Fall eigener Beobachtung war im Alter von 25 Jahren eine Fraktur des linken Unterarmes erfolgt, und es sollen schon seitdem zeitweise Kälteempfindungen in der linken Hand vorhanden gewesen sein. Die eigentlichen Akroparästhesien traten erst viel später im Anschluß an Überanstrengung beim Waschen auf. Schließlich sei in diesem Zusammenhang noch erwähnt, daß in einem meiner Fälle eine beiderseitige Halsrippe nachweisbar war.

Symptomatologie.

Im Vordergrund des Krankheitsbildes stehen die Klagen der Patientinnen über unangenehme Empfindungen in den Händen, seltener in den Füßen. Es sind meist Sensationen von Kriebeln, Jucken, Ameisenlaufen, Eingeschlafensein, ein Gefühl, als ob die Finger oder die ganze Hand geschwollen sei, als ob die Finger vertracket wären, oder platzen oder pulsierten, oder ein Gefühl von Taubheit, als ob noch eine Haut über den erkrankten Teilen liege. Von diesen nur unangenehmen, nicht direkt schmerzhaften Empfindungen aus finden sich ganz allmähliche Übergänge zu einer ausgesprochenen Schmerzhaftigkeit, die so erheblich sein kann, daß durch sie die Kranken aus dem Schlaf geweckt werden, daß sie vor Schmerzen laut schreien, ja daß sie zum Gebrauch von Morphinum gedrängt werden.

Diese Empfindungen sind meist nicht kontinuierlich, sondern treten anfallsweise auf; am stärksten pflegen sie des Nachts und Morgens beim Erwachen zu sein. Dann pflegt auch die Motilität, die sonst völlig frei bleibt, insofern beteiligt zu sein, als sich in den betreffenden Teilen eine gewisse Klammigkeit geltend macht, die die Hände zu feineren Arbeiten, selbst auch zum Zuknöpfen, zum Binden einer Schleife usw. unfähig macht. Einer meiner Kranken mußte die Arbeit morgens 1—2 Stunden aussetzen; ein anderer wurde dadurch behindert, daß er einen dünnen Hammerstiel nicht fest umfassen konnte. Durch

Reiben, Drücken, Schlagen usw. werden die unangenehmen Empfindungen gelindert. Oft sind die Parästhesien zu Anfang überhaupt nur des Morgens da und kommen erst nach kürzerer oder längerer Zeit auch tagüber zur Beobachtung.

Auch die Außentemperatur soll von Einfluß sein, insofern, als niedrige Temperaturen ungünstig wirken; doch habe ich diese Angabe bei unseren Kranken nicht häufig verifizieren können. Auch Frankl-Hochwart betont, daß Temperaturenwirkungen ganz ohne Einfluß bleiben können. Oft wird darüber geklagt, daß die Schmerzen beim Einperhalten des Armes stärker werden, bzw. dabei erst auftreten. Eine meiner Kranken hatte sich die Hände im Schlafe festgebunden, damit sie sich nicht immer in die Höhe gingen.

Was die Verbreitung der Parästhesien angeht, so sind in den meisten Fällen beide Hände betroffen, eine gewöhnlich mehr als die andere. Bisweilen beschränken sich die Parästhesien auch auf eine Hand, selten nur auf einzelne Finger. In vierzehn Fällen Frankl-Hochwarts war nur eine Hand betroffen, davon neunmal die rechte. In einzelnen Fällen sind auch die Füße mitbetroffen. Collins gibt folgende Zahlen: in 52% sind nur die Hände befallen, in 30% Hände und Füße, in 10% nur die Füße. Ballet macht auf eine Beteiligung der Zungenspitze und der Lippen aufmerksam, die auch wir einmal ebenso wie Collins konstatieren konnten.

Eine scharfe Beschränkung der Parästhesien auf das Gebiet eines peripheren Nerven wird nicht beobachtet. Friedmann behauptet zwar das Gegenteil, indem er sagt, es käme recht oft vor, daß die Sensationen sich nur über das Gebiet eines bestimmten Nerven erstrecken, und daß mit einer besonders auffallenden Geflossenheit das Ulnarisgebiet befallen wird, je nach individueller Ausbreitung dieses Nerven entweder der fünfte und der ganze vierte Finger, oder aber mit sehr typischer Begrenzung nur die Ulnarisseite des letzteren. Wenn auch zugegeben werden mag, daß im allgemeinen die Ulnarseite der Hand und die nach dieser hin gelegenen Finger öfter betroffen werden, so konnte ich doch eine deutliche Begrenzung auf ein Nervengebiet trotz gerade auf diesen Punkt gerichteter Aufmerksamkeit nicht finden. Ich komme darauf noch zurück.

Saundby spricht von einer paralogischen und einer hemiplegischen Form der Parästhesien. Die letztere ist jedenfalls die bei weitem seltenere; Frankl-Hochwart konnte sie einmal beobachten. Unter unseren Fällen war der hemiplegische Typus nur zweimal vertreten.

Der objektive Befund ist meistens ein sehr dürftiger.

Das Gefühl in den von den Parästhesien betroffenen Teilen ist in der Mehrzahl der Fälle für die objektive Untersuchung völlig intakt. Ich fand unter 36 Fällen 22 mal keinerlei nachweisbare Störungen, für die späteren Fälle vermag ich keine Zahlen anzugeben, aber es

unterliegt durchaus keinem Zweifel, daß die ohne objektiven Befund in der Mehrzahl sind. Auch die anderen Autoren geben keine Zahlen, doch finden wir bei allen die Angabe, daß die Sensibilität gewöhnlich normal sei, daß aber gelegentlich Hyperästhesie und Hyperalgesie und im Gegensatz dazu auch Hypalgesie vorkomme. (Schulitze.) Nach meinen Erfahrungen und denen anderer (Frankl-Hochwart) sind jedoch Hyperästhesie und Hyperalgesie durchaus ungewöhnlich; Frankl-Hochwart konnte nur einmal Hyperalgesie finden; ich fand sie niemals, dagegen vielfach Hypästhesien, die auch außerhalb der Anfälle fortbestanden.

Der folgende Fall stellt einen solchen dar, in dem diese Sensibilitätsstörung einen etwas erheblicheren Grad erreichte und genau abgrenzbar war.

54-jährige Frau, Wäscherin.

Wächst seit 24 Jahren; klagt schon seit langer Zeit über reißende Schmerzen in den Händen; Taubheitsgefühl und Brennen in den drei ersten Fingern der rechten Hand seit einem Jahr. Schon seit Jahren beim Erheben Taubheitsgefühl auch des besonders in den drei ersten Fingern.

Die Untersuchung ergibt normale Verhältnisse bis auf die Sensibilität. Am Dorsum und der Vola manus werden beiderseits an den Endphalangen des ersten bis vierten Fingers, ferner auch an den Mittel- und Grundphalangen des zweiten Fingers leichte Pinselberührungen gar nicht, Nadelstiche nicht schmerzhaft empfunden, sind auch das Unterscheidungsvermögen für Temperatureize (18) abgeschwächt. Auffallend Finger empfindet die Kranke überall normal. Die Erscheinungen besserten sich in massenhafter Behandlung (kurativer Handbad) wesentlich.

Niemals fand sich in unseren Fällen eine Hypalgesie, die auch nur bis zur Handwurzel reichte, geschweige denn über sie hinausgegangen wäre. Frankl-Hochwart dagegen spricht von einem Falle, in dem die Hypalgesie die Schulter erreicht hat. Und auch die Intensität der Störung ging nie über das in dem geschilderten Falle vorhandene Maß hinaus, war im Gegenteil meist eine noch geringere.

Diesen Angaben stehen die neueren Beobachter gegenüber, die die objektiven und subjektiven Sensibilitätsstörungen bei der Akroparästhesie in ganz bestimmten scharf umschriebenen, der radikulären Innervation entsprechenden Gebieten fanden (Dejerine et Egger, Pick, Trombert, Baupp). Zuerst teilten Dejerine und Egger vier derartige Fälle mit. Ich gebe ihren ersten Fall im Auszug:

45-jährige Frau. Im März 1900 klagte die bis dahin gesunde Frau über Schmerzen in den Fingerspitzen, die sie nichts aus dem Schlaf wecken. Die Schmerzen, die ausfallweise besonders morgens auftreten, erstreckten sich von der linken Schulter aus an der Außenseite des Arms entlang bis zum Handgelenk; sie hatte das Gefühl, als ob die ersten vier Finger verstreicht wären. Es fand sich eine hypästhetische Zone für Temperatur und Schmerz an der Außenseite des Armes; am Rumpf erstreckt sich diese Hypästhesie auf das Gebiet der ersten drei Dorsalnerven. An der Hand und den Fingern ist die Sensibilität für alle Qualitäten in erheblichem Maße abgemindert; die Fingerspitzen sind gegen Nadelstiche ganz unempfindlich.

An rechten Arm sind die Störungen nur vorübergehend und nur in geringem Umfang vorhanden.

Wie in diesem Fall war auch in einem Fall Baupps neben radikulärer Sensibilitätsstörung an den Armen eine gürtelförmige Zone in der oberen Partie des Rumpfes vorhanden; in dem von Pick beschriebenen nimmt der Autor eine Mitaffektion radikulärer dorsaler Abschnitte wegen der zwischen den Schultern vorhandenen Schmerzen an.

Am ausgesprochensten sind die Störungen im folgenden, später von Egger mitgeteilten Falle.

Das 68 jährige Fran leidet seit 14 Jahren an Kriebeln in den Händen. Seit einem Jahre hat sie wirkliche Schmerzen nicht nur in den Händen, sondern auch in den Füßen. Daneben bestehen raummotorische Erscheinungen, Asphyxie und Strabismus laevus. Es besteht eine Hypästhesie für alle Gefühlsqualitäten im Gebiete der V.—VII. Cervicalwurzel, links mehr ausgeprägt als rechts, ferner auch im Gebiete der II. Sacralwurzel. Das Lagegefühl ist in den Händen und Füßen sehr mangelhaft; die Vibrationsempfindung ist gleichfalls schwer geschädigt. Die Schmerzenseite an den Armen aufgehoben; das rechte Kniephänomen ist sehr schwach, das linke Arthralphänomen fehlt. Romberggerbes Phänomen.

Es scheint mir sehr zweifelhaft, ob man ein Recht hat, diesen Fall den Akroparästhesien zuzurechnen, ich wäre vielmehr geneigt, ihn als eine sogenannte funikuläre Myelitis zu deuten; und ich glaube, daß man ihn jedenfalls nicht allgemein für die Pathologie und Pathogenese der Akroparästhesien verwenden darf.

In den übrigen Fällen wird man dagegen in der Tat berechtigt sein, die Diagnose Akroparästhesien zu stellen und an dem Vorkommen radikulärer Hypästhesien im Rahmen dieses Krankheitsbildes kann man danach nicht wohl zweifeln, wenn man auch immer bedenken muß, wie schwierig die exakte Abgrenzung geringgradiger Anästhesien ist, und wie leicht da Irrtümer unterlaufen. Eines aber ist ganz sicher: die Regel stellen derartige Vorkommnisse nicht da; ich habe an meinem großen Material trotz aller darauf gerichteten Bemühungen keinen Fall gefunden, in dem die Schmerzen oder die Parästhesien einen radikulären Typus angenommen hätten.

Druckempfindlichkeit der Nervenstämme pflegt zu fehlen, kam aber gelegentlich vor und verband sich wohl auch mit ausstrahlenden Schmerzen.

Die Motilität weist niemals erhebliche Störungen auf, weder ausgedehnte Lähmungen noch Muskelatrophien, noch Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit kamen vor. Einige meiner Kranken berichteten mir über auf der Höhe der Anfälle gelegentlich auftretende motorische Reizerscheinungen, insbesondere Beugekontraktionen einzelner Finger, die offenbar reflektisch ausgehert waren. Von ähnlichen Zuständen macht Egger in seinem oben erwähnten zweifelhaften Fall Mitteilung.

Die Sehnenphänomene zeigen stets ein normales Verhalten.

So beschränkt sich für eine Reihe von Fällen das Symptomenbild auf die Parästhesien und die Schmerzen und verbindet sich in einer Minderzahl dieser Fälle mit leichten Störungen der Sensibilität.

Damit ist wohl für einen Teil der Fälle, doch nicht für alle die Symptomatologie erschöpft: außer diesen Störungen findet sich bei einer Anzahl von Kranken nämlich noch eine Blässe der Haut der Finger und der Hände; unter den subjektiven Beschwerden pflegen dann die Kälteempfindungen stark hervorzutreten.

Wir haben oben in der Analyse der Nothnagelschen Arbeit gesehen, daß Nothnagel diese „vasomotorischen“ Symptome durchaus als integrierende Bestandteile der von ihm beschriebenen vasomotorischen Neurose der Extremitäten ansah. Alle späteren Autoren nehmen insofern einen anderen Standpunkt ein, als keiner von ihnen regelmäßig ein solches Absterben der Finger usw. fand. Die Hautfarbe der Hände ist meist nicht verändert, „indessen ist auch eine auffallend weiße Farbe derselben zusammen mit größerer Kälte während der Anfälle beobachtet worden“ (Schultz). Andere Autoren sprechen noch von einer gelegentlich auftretenden Röte oder Cyanose der betreffenden Partien.

Unsere eigenen Fälle lehren uns über diesen wichtigen Punkt folgendes.

Fünfmal fanden sich Störungen, die den von Nothnagel beschriebenen analog waren, unter meinen ersten 40 Fällen. Das Verhältnis, das ich für die spätere Zeit nicht zahlenmäßig belegen kann, ist auch in meiner späteren Beobachtungsreihe dasselbe geblieben. Das heißt also die Zahl der mit vasomotorischen Symptomen einhergehenden Akroparästhesien dürfte etwa höchstens ein Viertel der Gesamtzahl betragen. Collins vermißte unter seinen 100 Fällen fast stets eine Veränderung der Hautfarbe. Eine charakteristische Schilderung der vasomotorischen Erscheinungen finden wir im folgenden Fall.

37 jährige Frau, Vor 10 Jahren Gebärfieberanfalls. Dieser ist ganz geheilt. Vor etwa 8 Jahren große Aufregung; Ohnmachtsanfall. Seit dieser Zeit allgemeine nervöse Beschwerden, schreckhaft, ängstlich, weinerlich. Periode regelmäßig. Hat viel mit Wasser zu tun. Seit 4 Monaten Beschwerden in den Händen, zunächst Eingeschlafensein der Hände nach dem Erwachen, Taubheitsgefühl, Kriebeln; kramphartiges Zittern in den Händen, das sehr schmerzhaft ist, als ob der Arm auseinander wird; die Schmerzen werden so heftig, daß sie schreien muß. Die Morgens sind die Hände ganz steif, erst wenn sie sie in warmes Wasser gehalten hat, werden sie wieder gut beweglich. Tagsüber werden die Hände zuweilen zufallweise weiß wie Totshände, alles Blut strömt dann aus ihnen heraus; bald darauf werden sie brennend heiß, als ob sie verbrüht wären.

Eine genaue Untersuchung, die sich auch auf etwaige Tetanismsymptome bezog, ergab ein völlig negatives Resultat.

Im ganzen treten in diesem Fall die vasomotorischen Symptome — Blässe und Kälte der Haut abgelöst von reaktiver Rote und Brennen — gegenüber den Parästhesien recht in den Vordergrund. In den folgenden Fällen sind Parästhesien und lokale vasomotorische Symptome mehr zu gleichen Teilen vertreten.

A. E., 16-jähriges Deutschmädchen. Arbeitet in einer sehr kalten Küche. Klagt über Parästhesien, Taubheitsgefühl, Abgestorbensein, Kriebeln in den Fingern, besonders des Morgens und nach dem Tragen schwerer Lasten, seit 8 Wochen Beschwerden in den Händen, seit 4 Wochen in den Füßen. Häufig werden die Finger taubeschlaff und ganz steif, so daß sie sie kaum bewegen kann. Der Zustand dauert mehrere Stunden. Das Kriebeln erstreckt sich bis zur Schulter hinauf. Am Berühren charakteristisches zynisches Geräusch. Die übrige Untersuchung ergibt völlig normale Verhältnisse.

53-jähriger Arbeiter; früher war der Pat. Schlosser, seit längerer Zeit ist er jetzt mit dem Karren von Holz beschäftigt. Vor einem halben Jahre begann das Leiden mit Kriebeln und taubem Gefühl in den Fingerritzen; die Finger waren immer kalt, und bald trat auffallend ein Absterben der Finger bis zum Handgelenk auf. Die Symptome sind morgens am stärksten ausgeprägt. Bei der Untersuchung ist die Palpa der Finger etwas weiß, die Hände und Vorderarme aber mäßig. Das Gefühl für Pinzel und Nadel ist an den Endphalangen der Finger herabgesetzt; nur der Daumen ist in jeder Beziehung verschont. Unger Befund negativ.

Sond wurde meist nur berichtet, daß gelegentlich einmal Totenfingern vorkommen. Hier und da zeigen sich auch einmal etwas abweichende Erscheinungen. Mehrfach waren die Hände eher abnorm rot als weiß, das berichtet auch Dejerine und Savill.

In der ersten der eben mitgeteilten Beobachtungen dürfte es wohl der Erwägung wert sein, ob wir es nicht mit einer Abortivform der Raynaudschen Krankheit zu tun haben, während in den übrigen Fällen eine Einreihung in ein anderes Krankheitsbild als das der Akroparästhesien uns nicht möglich erschien.

Während also aus unseren Erfahrungen in Übereinstimmung mit denen der meisten übrigen Autoren hervorgeht, daß eine lokale Synkope, ein Absterben der Finger für gewöhnlich nicht zum Krankheitsbild der Akroparästhesie gehört, behauptet Urschmann (Lehrb. S. 830), daß ihn eine genau sonderende Annahme und vor allem die klinische Beobachtung seines Materials die vasomotorischen Störungen niemals vernützen ließen. Die Annahmen haben mir, auch wenn sie noch so genau wären, das von Urschmann erzielte Resultat nur selten ergeben, zu dauernder klinischer Beobachtung hatte ich keine Gelegenheit, wohl aber zu stundenlangem Beobachten der Kranken, deren Leiden ja auch so gut wie nie klinische Behandlung erforderte. Ich muß demgemäß auch jetzt noch bei der Behauptung bleiben, daß da wo die vasomotorischen Symptome stärker in den Vordergrund treten, wo sie eine wesentliche Rolle spielen, sich das ganze Krankheitsbild modifiziert und verwischt. Urschmann schien früher geneigt, die Angaben anderer Autoren über Fehlen vasocon-

strieterischer Symptome auf Beobachtungsfehler zurückzuführen. In seiner neuesten Arbeit über den Gegenstand (Kapitel vasomotorische Neurosen in dem Handbuch der inneren Medizin von Mehr und Stähelin herausgegeben, deren Anhängsbogen er mir freundlichst zusandte) meint er die Differenz auf regionale Verschiedenheiten zurückführen zu sollen; mit der Möglichkeit einer etwas abweichenden Klassifizierung muß insofern auch gerechnet werden, als die Übergänge zu der milden Form der Raynaudischen Krankheit fließende sind, dort wo die vasomotorischen Symptome stärker in den Vordergrund treten. Wir begegnen hier zum ersten Male im Laufe unserer Erörterungen einer Art von Krankheitsbildern, die man als Übergangs- und Verbindungstypen zwischen zwei sonst differenten Krankheitsformen auffassen muß. Wir werden im Laufe unserer Ausführungen noch recht oft Gelegenheit haben, auf solche Übergangsformen zurückzukommen: sie sind gerade auf dem Gebiet, das wir behandeln wollen, recht häufig und von großem Interesse für die Aufklärung man vieler uns hier interessierender Fragen.

Verlauf.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle entwickelt sich das Leiden ganz allmählich und aus geringen Anfängen heraus. Ein die Patientin kaum belästigendes Kriebeln oft nur in einer Hand bildet hier den Beginn, und erst allmählich entfalten sich die im weiteren Verlauf für die Kranken oft höchst lästig und unangenehm werdenden Symptome zu voller Höhe. Doch kommt auch ein akuter Beginn vor, so in Oppenheims schon erwähntem Fall.

Genauer beschreibt Friedmann einen akut einsetzenden Fall.

Gustav K., 23-jähriger gesunder kräftiger Mann, dem außer nie körperlich etwas Neuromatenes geblüht hat. Seit einigen Jahren in einer Offizin tätig, wo er kühlt in kalte, kühlt in ziemlich heiße Umgebung in schnellem Wechsel zu greifen hat. Während er vorher noch nie etwas Ähnliches bemerkt hat, bekommt er plötzlich das Gefühl, als ob beide Hände geschwollen wären, dieselben sind steif, ungedenkt; beim Herabhängenlassen Jacken und Hemden in ihnen, als ob sie eingeschlämmt wären, reichten nur an drei Fingern der Daumen Seite, links an allen. Keine Verfärbung. Sensibilität, besonders für warm, beiderseits am Handrücken etwas herabgesetzt. Seit objektiv negativer Befund. Schon nach acht Tagen unter elektrischer Behandlung keine wesentlichen Beschwerden mehr.

In bezug auf den Verlauf hat Friedmann drei Formen voneinander abzugrenzen versucht, eine Form mit passagerem und intermittierendem, eine mit akutem und subakutem und endlich eine mit chronischem Verlauf; zwischen den einzelnen Formen soll kein wichtiger Differenzpunkt in bezug auf die sonstige Ätiologie und Symptomatologie bestehen. Am häufigsten ist nach Friedmann die flüchtige Form. Nach meinen Erfahrungen ist jedoch die chronisch-intermit-

tierende Form viel häufiger, doch mag dabei immerhin berücksichtigt werden, daß bei der flüchtigen Form die Beschwerden so gering sind, daß nur selten ärztlicher Rat eingeholt wird.

Für die akute Verlaufsart kann die oben zitierte Beobachtung von Friedmann als Beispiel gelten.

Im Gegensatz zu diesem Fall mit seiner nur einwöchigen Dauer ist in der Mehrzahl der Fälle der Verlauf ein sehr chronischer und hartnäckiger. Die Beschwerden dauern oft Monate und Jahre lang fort: immer wieder kommen die Kranken, um in ermüdender Eintönigkeit dieselben Klagen zu wiederholen. Bei einer 60jährigen Frau bestanden die Beschwerden seit 10 Jahren dauernd, bei einer 48jährigen seit 25 Jahren, bei einer 39jährigen seit der Mädchenzeit mit Intermissionen. Eine 37jährige Frau hatte schon einmal vor 10 Jahren dieselben Beschwerden, eine 35jährige mit 20 Jahren einen gleichen Zustand. Collins rechnet eine Durchschnittsdauer von 14 Monaten, sah aber eine Patientin, die 28 Jahre mit den Erscheinungen behaftet war. Doch pflegen immerhin die Beschwerden nicht ganz kontinuierliche zu sein, meist tritt das Leiden in einzelnen Anfällen auf: die Lieblingszeit für diese Anfälle sind, wie gesagt, die Morgenstunden. Als weitere die Anfälle auslösende Momente sind besonders Manipulationen mit Wasser zu nennen, einmal soll das kalte, andermal das warme Wasser von ungünstiger Einwirkung sein. Die Arbeit kann die Beschwerden hervorrufen helfen, doch ist ihr Auftreten in diesen Fällen niemals ganz allein und unmittelbar von der Tätigkeit abhängig, was für die Unterscheidung gegenüber den Beschäftigungsneurosen wichtig ist. Oft genug bringt auch die Tätigkeit, wenn sie auch zunächst durch Steifheit und Klammheit der Finger behindert ist, die krankhaften Empfindungen zum Verschwinden. Andere Kranke berichten, daß die Parästhesien besonders nach dem Tragen schwerer Lasten oder auch nach dem Herabhängenlassen der Arme eintreten. In der kalten Jahreszeit werden bisweilen, doch durchaus nicht immer die Beschwerden stärker.

Pathologie.

Wir haben als Komponenten unseres Krankheitsbildes im wesentlichen folgendes feststellen können:

1. Parästhesien, die wir des näheren geschildert haben: Kriebeln, Ameisenlaufen, Taubsein usw.

2. Schmerzen, meist reißenden Charakters und von wechselndem, nicht auf ein Nervengebiet beschränktem Sitz.

3. Störungen der Empfindung, Hyper- und besonders Hypästhesie.

4. Vasomotorische Störungen, Kälte und Blässe der Haut.

Es erscheint mir unmöglich, für alle Fälle einem dieser Symptome eine absolut dominierende Stellung einzuräumen.

In vielen Fällen handelt es sich in der Tat dauernd nur um Parästhesien, es fehlen eigentliche Schmerzempfindungen, es fehlen Sensibilitäts- und vasomotorische Störungen, nichts anderes ist vorhanden als Akroparästhesien. Dann kommt eine zweite Gruppe, die immerhin noch sehr zahlreiche Fälle umfaßt, Akroparästhesien und Schmerzen. Oft ist es hier so, daß die Akroparästhesien zuerst da sind, in milder Form, sich allmählich steigern und nun auch Schmerzen eintreten, aber umgekehrt sind auch hier wieder Fälle vorhanden, in denen Schmerzen im Vordergrund stehen und die Parästhesien nicht einmal so stark sind, als in anderen nicht von Schmerzen begleiteten Fällen.

Auch die objektiven Sensibilitätsstörungen zeichnen nicht gerade die Fälle aus, in denen die übrigen Störungen am stärksten entwickelt sind, und ebenso wenig sind dort, wo vasomotorische Störungen vorhanden sind, die Parästhesien, Schmerzen oder Sensibilitätsstörungen in hervorragendem Maße betont.

Diese Differenzen in dem Krankheitsbilde, die wir demnach nicht ohne weiteres als einfache Intensitätsunterschiede auffassen dürfen, haben zur Aufstellung einer Anzahl von Unterabteilungen der Akroparästhesien geführt.

Einen solchen Versuch hat Friedmann gemacht, der jedoch dabei weniger auf die hier hervorgehobenen Differenzen in der Symptomatologie achtet, sondern sich mehr an die verschiedenen Arten der Ätiologie anlehnt.

Mehr Rücksicht auf die symptomatologischen Differenzen nimmt Haskavce in der von ihm versuchten Einteilung.

Er unterscheidet: erstens Parästhesien ohne vasomotorische Symptome (die eigentlichen Akroparästhesien Schultzes).

Zweitens primäre Parästhesien mit sekundären vasomotorischen resp. vasodilatatorischen od. trophischen Veränderungen (die unten noch näher zu besprechende Rosenbachsche Form).

Drittens sekundäre Parästhesien mit primären vasomotorischen Veränderungen (die Nothnagelschen Fälle).

Diese Einteilung berücksichtigt vor allem das Verhältnis der Parästhesien zu den vasomotorischen Symptomen. Es scheint auch mir dieser Punkt der wichtigste und sehr der Berücksichtigung wert zu sein, und ich glaube, daß wir vollkommen berechtigt oder vielmehr sogar gezwungen sind, die reinen Akroparästhesien von den mit vasomotorischen und ev. trophischen Symptomen vereinigten abzugrenzen. Objektive Sensibilitätsstörungen geringer Art können bei beiden Formen vorhanden sein oder fehlen, und ebenso können eigentliche Schmerzen fast ganz fehlen oder etwas stärker hervortreten. Es scheint

nicht, als ob wir berechtigt sind, je nach dem stärkeren oder geringeren Vorwalten dieser Symptome noch weitere Gruppierungen vorzunehmen, da in bezug auf Ätiologie, Alter, Geschlecht usw. hier zwischen den einzelnen Fällen keinerlei erhebliche Differenzen sich erkennen lassen.

Im Krankheitsbild der beiden letzten Gruppen, die Haskovec aufgestellt hat, spielen vasomotorische Symptome eine erhebliche Rolle: in der zweiten Gruppe sollen sie sekundär den Parästhesien folgen. Als Beispiel hierfür bringt er einen eigenen Fall und zitiert die von Rosenbach beschriebenen Fälle.

Haskovecs eigene Beobachtung ist folgende:

62-jährige Frau, Klimakterium mit 35 Jahren, dabei oftens Schwindel, jetzt mit Jahren mit Unterbrechungen Gefühl, als ob die Hand einschlief, dabei Unfähigkeit zu feineren Arbeiten. Später kommen Anschwellungen über dem rechten Handgelenk hinzu, einmal trat ein herpesartiger Ausschlag auf, der von selbst verschwand. Die Untersuchung ergibt ein, wenn auch unbedeutendes Ödem über dem rechten Handgelenk. Die Haut über den Fingern ist etwas gerötet, auch die Finger selbst sind etwas oedematös. Sensibilität objektiv ohne wesentliche Störung. Ameisenlaufen, Krabbeln in der rechten Hand, Nervosität aus Druck etwas empfindlich, nach einiger Zeit schwinden bei elektrischer Behandlung die Röt- und Schwellung, dagegen bleiben die Parästhesien bestehen.

Rosenbach hat das nachstehende Krankheitsbild entworfen:

Es handelt sich um Kranke, die über vage reißende Schmerzen in den Händen und Vorderarmen klagen. Bei der Untersuchung finden sich an einem oder mehreren Fingern beider Hände die beiden kleinen Tubercula am proximalen Ende der dritten Phalanx aufgetrieben und schmerzhaft. Gewöhnlich sind beide Tubercula eines Fingers gleichmäßig ergriffen, meist sind Finger beider Hände beteiligt, nie sind die Daumen affiziert. Bei Berührungen, Druck usw. der betreffenden Stellen entsteht ein heftiger Schmerz, erst nachdem die Anschwellung längere Zeit geschwunden ist, hört dieser auf. Die Beweglichkeit der Gelenke ist anfangs nur durch den Schmerz behindert. Eine konstante Begleiterscheinung dieser Auftreibungen sind Parästhesien und Schmerzen in den Vorderarmen und Fingern, namentlich an der Streckseite im Gebiete des Nervus ulnaris. Es besteht keine eigentliche Sensibilitätsstörung, sondern nur eine gewisse Hyperästhesie gegen stärkere Reize. Dagegen besteht Kältegefühl, Gefühl von Ameisenlaufen, seltener ein schnell verschwindendes Hitzegefühl. Keine beträchtlichen trophischen Störungen an der Haut, nur bei längerer Dauer ist die Haut über den Anschwellungen blau-rötlich verfärbt und spröde, während sie an der Spitze der Finger oft weiß erscheint. Dauer der Anschwellung wenige Tage bis Wochen und Monate. Rezidive in unregelmäßigen Zwischenräumen. Als Ursache wurde oft stärkere seelische Erregung angegeben. Fast nur Frauen wurden betroffen, und zwar mindestens ebenso oft solche der besseren Stände. Die meisten Fälle kommen zwischen 30 und 50 Jahren vor, das Klimakterium erscheint bevorzugt.

Alle Patientinnen waren im allgemeinen nervös; eine Progression fand, obwohl die meisten Fälle jahrelang bestanden, fast nie statt. Vereinzelt trat allmählich eine Ankylose durch Verdickung des Gelenks ein, diese kommt durch Auflagerung von außen und Verdickung des Bandapparates zustande.

Rosenbach hält es für wahrscheinlich, daß die Affektion ein rein nervöses Leiden darstellt, dafür spricht die auffallende Symmetrie der Lokalisation, das stets beobachtete Freibleiben des Daumens, die auffallende Beteiligung der sensiblen Nerven im Gebiete des Vorderarmes und endlich die hauptsächlich Lokalisation im Verlauf des ulnaren Handrückenastes. Am ehesten dürfte es sich um eine leichte Neuritis, die nur die tieferen, zum Perist ziehenden Zweige betrifft, handeln.

Es ist auffallend, daß über ähnliche Beobachtungen nur wenig bekannt geworden ist.

Unter ganz anderem Titel und mit ganz anderer Beziehung beschreibt Pfeiffer ähnliche Dinge. Er führt sie unter dem Titel „Gichtfinger“ an und identifiziert die von ihm gefundenen kleinen Knötchen mit den sog. Heberdenschen Knötchen. Er beschreibt Anschwellungen an den letzten Interphalangealgelenken, bisweilen ist die ganze Gegend des letzten Fingergelenkes verdickt, so daß die Gelenklinien wie erhabene Wülste hervortreten. Die Daumen bleiben stets frei, die Anschwellungen sind zu Anfang meist schmerzhaft, später oft nicht mehr, häufig gehen lange Zeit eigentümliche Empfindungen in Fingern und Händen der eigentlichen Krankheit voraus, es wird über Taubsein der Finger geklagt und Ähnliches mehr. Es ist bald ein Finger, bald eine größere Zahl befallen, aber wie gesagt, die Daumen bleiben stets frei. Pfeiffer hält die Anschwellungen für ausschließlich gichtischer Natur und in ihrer Beschränkung auf die Endglieder der dreigliedrigen Finger für ein eigentümliches und charakteristisches Symptom, das in dieser typischen Form neben die gichtischen Erkrankungen der Gelenke der großen Zehen gestellt werden muß. Bei chronischem Gelenkrheumatismus bleiben gerade diese Gelenke stets frei. Ein typischer Gichtanfall geht nicht immer voraus, aber Heredität und andere Momente weisen stets auf Gicht hin.

Von anderen sind diese Knötchen wieder anders gedeutet worden. Charcot¹⁾ sah sie ebenfalls, nach ihm sind es nichts anderes, als die durch Knochenauflagerung etwas vergrößerten Tubercula ossea. Harnsaure Salze finden sich absolut nicht in ihnen. Die Knötchen haben danach mit den Tophi der Gichtkranken nichts zu tun. Wie man sieht, ist die ganze Frage noch nicht sprechreif; eigene Erfahrungen habe ich nicht, da ich trotz darauf gerichteter Aufmerksamkeit keinen derartigen

¹⁾ Charcot, Oeuvres complètes, VII, p. 558.

Fall sah. Jedenfalls wird man gut tun, der Rosenbachschen Affektion, die man bisher meist ohne weiteres den Akroparästhesien zuzählte, vorläufig noch eine Sonderstellung zu belassen.

Für die Fälle des Nothnagelschen Typus ist das Verhältnis der vasomotorischen Störungen zu den Parästhesien nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Die ersteren scheinen allerdings oft im Vordergrund zu stehen und die primären zu sein, andererseits ist nicht zu bezweifeln, daß es Fälle gibt, wo ein Absterben einzelner oder mehrerer Finger vorliegt, ohne daß je sensible Reizerscheinungen die Folge gewesen wären. Ich habe das von einer ganzen Reihe Patienten berichten hören, auch Haskovec beschreibt einen Fall, bei dem beim Eintauchen der Hand in kaltes Wasser oder auch spontan meist des Morgens die Haut des zweiten bis vierten Fingers plötzlich erblaßte und keinerlei Schmerzen und Parästhesien dabei auftraten. Bekanntlich ist der einfache „Totenfinger“ überhaupt eine nicht seltene Erscheinung, die sich bei sehr vielen nervösen Personen, ferner auch bei Alkoholismus und anderen Intoxikationen, insbesondere aber bei Erkrankungen der Niere findet. Für die letztere Affektion beschreibt sie auch Senator, nachdem vorher besonders Alibert und Dieulafoy auf sie aufmerksam gemacht haben. Es ist jedenfalls gewiß, daß ganz ausgesprochene und auffallende vasomotorische Reizerscheinungen dieser Art ohne erhebliche sensible Symptome verlaufen können.

Wie schon bemerkt, sind die mit vasomotorischen Symptomen verbundenen Fälle von Akroparästhesien entschieden seltener, als die einfache Form. Beschränken wir uns aber bei der Einrechnung der vasomotorischen Störungen nicht auf die an Händen und Füßen beschriebenen, sondern zählen wir die Fälle dazu, in denen sich sonst irgendwie vasomotorische Symptome zeigten, so vermehrt sich die Zahl hierher zu zählender Fälle ganz erheblich. Wir sahen Kranke, bei denen fliegende Hitze, Rötung des Gesichts, Herzklopfen, Anfälle von Polydipsie und Polyurie, gestrigelte vasomotorische Hauterregbarkeit vorkamen. Häufig vermischten sich die Akroparästhesien mit klimakterischen Erscheinungen zu einem unteilbaren Ganzen, bzw. traten nur als mehr oder minder bedeutsames Symptom der klimakterischen Neurrose auf, wie das vor längerer Zeit Windscheid beschrieben hat. Wir beobachteten Neigung zu Ohnmachten, sahen wiederholt die Kombination mit einer Struma. Savill teilt einen Fall mit, in dem der Morbus Basedowii mit Akroparästhesien einherging und betont, daß er das häufiger gesehen hat. Auffällig oft sahen wir die Kombination mit Migräne, bzw. fanden anamnestisch das Auftreten von Migräne in früheren Jahren verzeichnet. Mehrfach waren hochte Störungen im Bereiche des Halbcephaikus zu konstatieren, Papillen- und Lidpalpeklendifferenzen, auch eine Druckschmerzhaftigkeit im

Gebiet des Ganglion cervicale supremum. Einmal sahen wir einen an die Menière'schen Erscheinungen erinnernden Symptomenkomplex, einmal gab eine Kranke an, daß ihre Hände jetzt immer blau-rot ausäßen, objektiv ließ sich jedoch nur eine geringe Abweichung von der Norm erkennen.

Diese Fälle bilden dann die Übergänge und Kombinationen mit anderen vasomotorischen Neurosen; die Akroparästhesien verlieren hier den Wert einer selbständigen Erkrankung und sinken zu einfachen Symptomen herab. Ich sah sie mehrfach sich mit dem angioneurotischen Ödem verbinden. Solis-Cohen erwähnt sie als ein Symptom seiner „vasomotorischen Ataxie“; auch Herz spricht von ihnen in seinen Erörterungen über vasomotorische Ataxie und namentlich hat Curschmann, wie schon erwähnt, auf ihr Vorkommen bei der Angina pectoris vasomotoria aufmerksam gemacht, die ihrerseits wiederum im wesentlichen nur einen Ausschnitt aus dem größeren Gebiet der Neurasthenie mit vorwiegend vasomotorischen Symptomen darstellt. So wenigstens fasse ich diese Symptombilder auf, die von Curschmann mit dem mir nicht zweckmäßig erscheinenden Namen Angina pectoris vasomotoria belegt werden. Die von Curschmann entworfene Schilderung ist sehr anschaulich. Die Kranken werden plötzlich, oft nachts und morgens, nach Kälteeinwirkungen, nach psychischen und sexuellen Traumata, vom Anfall betroffen. Hände und Füße sterben ab, werden eiskalt und gefühllos, objektive Asphyxie und Synkope ist in solchen Fällen fast stets vorhanden; zu gleicher Zeit kommt es zu einem schmerzhaften, drückenden oder brennenden, oft mit Angst vor Herzschlag und Todesangst verbundenen Gefühl in der Herzgegend. Vielfach besteht heftiges Herzklopfen. — Der Puls soll dabei etwas gespannter sein als normal und eine geringe Blutdrucksteigerung eintreten. Hier rücken die Akroparästhesien ganz in den Hintergrund; die allgemeine Störung ist das beherrschende. Auf diese Dinge komme ich noch zurück. So weisen jedenfalls darauf hin, daß eine gewisse Labilität des Gefäßsystems zu den Grundlagen der Parästhesien gehören kann.

Störungen, die über das Gebiet der vasomotorischen noch hinaus gehen und vielleicht als trophische aufzufassen sind, sind mir selten begegnet. Der folgende Fall stellt ein Beispiel dar.

36-jährige Näherin. Seit einem Jahre Klimakterium, mit sehr heftigen Menstrualschmerzen, die aber bald nachließ, dann fing sie Hände an zu jucken und einzuschälen, besonders des Nachts und des Morgens, außerdem sollen sich in der letzten Zeit an den Händen bläsig Schwellen gebildet haben, für die Pat. eine Ursache nicht weiß. Die Haut der Finger soll sehr spröde geworden sein, schließlich habe sich auch über eine Blase der Finger eingestellt, wenn diese auch nicht gerade wie Toesfinger aussehe. Die Untersuchung ergibt eine eigenartige Beschaffenheit der Haut der Hände. Diese ist fleckweise und zwar rechts stärker als links runzlig, rauh, trocken und abschälend; im Gebiet dieser Hautveränderung

findet sich eine Anzahl Rhagaden, die schmerzhaft sind, aber leicht wieder zuheilen sollen. Es bestehen Parästhesien und ein spannendes Gefühl in den Händen, aber kein Schmerz und keine objektiven Sensibilitätsstörungen. Die Sehnenphänomene an den Armen sind stark erhöht. Keine, nicht pulsierende Struma, kein Gefäßgeräusch über der Struma, kein Exophthalmus, systolisches Geräusch an der Herzspitze, sonst keine Veränderungen am Herzen. Puls augenblicklich beschleunigt, später nicht mehr. *Urticaria factitia*.

Da die Patientin keine Angaben darüber zu machen vermag, wie und wann die Veränderungen in der Haut, die man als eine Xerose der Haut bezeichnen muß, entstanden sind, so können wir über das Verhältnis dieser Störungen zu den übrigen auch nichts Bestimmtes aussagen. Bemerkenswert ist in dem Falle auch noch das Bestehen der *Urticaria factitia*, die ebenfalls im Sinne eines gewissen Grades von Vasolabilität gedeutet werden kann. Ich fand ganz ähnliche Hautveränderungen noch in einem zweiten Fall, ferner einige Male Schwellung der Hände wie auch Savill, die Haut war auffällig glatt und glänzend.

Der Versuch einer Gruppierung der hier beschriebenen Symptomenkomplexe ergibt naturgemäß die Aufstellung von zwei Gruppen. In die erste haben wir die reinen Akroparästhesien zu rechnen, während in die zweite die von Nothnagel geschilderten und mit vasomotorischen Symptomen verknüpften Parästhesien gehören. Eine scharfe Grenzlinie existiert nicht, denn es gibt auch Fälle von Akroparästhesien, wenn sie auch nicht gerade sehr häufig sind, in denen gelegentlich einmal lokale vasomotorische Symptome auftreten, ohne jemals im Krankheitsbild Bedeutung zu erlangen. Unter den der zweiten Gruppe zugehörigen Fällen gibt es solche, bei denen die lokalen vasomotorischen Symptome ganz im Vordergrund stehen, ganz das Bild beherrschen; sie bilden den Übergang zu den später zur Darstellung gelangenden leichteren Formen der Raynaudschen Krankheit. Daß auch Fälle vorkommen, in denen eigentümliche trophische Störungen vorliegen, sahen wir oben. Sie ordnen sich keinem bestimmten Krankheitsbild unter. Ebenso wurden die Übergänge zu den allgemeinen vasomotorischen Neurosen bereits erwähnt. In der Ätiologie besteht wohl kein durchgreifender Unterschied zwischen beiden Gruppen, in der zweiten scheint das Übergewicht der Frauen nicht so bedeutend zu sein. Starke und plötzliche Kälteeinwirkungen, Vergiftungen spielen hier eine größere Rolle. In bezug auf die sensiblen Symptome läßt sich zwischen beiden Gruppen kein bedeutender Unterschied feststellen.

Inwieweit sind wir nun berechtigt, diese Symptomenkomplexe überhaupt als selbständige Leiden aufzufassen?

Schultze beantwortet diese Frage mit folgenden Worten: „Für diese Berechtigung oder wenigstens für die vorläufige Berechtigung spricht der Umstand, daß es schwierig und geradezu unmöglich ist, ihn — den Symptomenkomplex — zurzeit mit einem bekannten ander-

seitigen Krankheitsbild zu identifizieren." Schultzes Meinung geht weiter auch dahin, daß es ebenso wenig angeht, ihn als Teilercheinung irgendeines anderen, bekannten Krankheitsbildes aufzufassen.

Wir haben nun bereits gesehen, daß in der Symptomatologie dieser Zustände andere Krankheitszeichen außer denen der Akroparästhesien und Akrosynkope sich nur in geringer Anzahl finden, hier und da wird über eine Anämie oder über eine Neigung zu rheumatischen Erkrankungen berichtet, kaum mehr. Aber einen wichtigen Punkt aus der Krankheitsgeschichte dieser Personen haben wir bisher absichtlich noch nicht berührt, die Frage nämlich, ob die betreffenden Kranken die Zeichen einer allgemeinen Neurose, insbesondere einer Hysterie oder Neurasthenie aufweisen. Wenn wir den Angaben der früheren Autoren bezüglich dieses Punktes folgen wollten, so könnten wir das Vorhandensein solcher Symptome einfach verneinen. „Allgemeine Neuropathie spielt hier durchaus keine Rolle, die Patientinnen hatten hier und da Kopfschmerz, eine klagte über Schwäche und vermehrtes Durstgefühl. Dies ist alles Positive, was ich in der Anamnese finde, bei allen übrigen stieß das Examen auf durchaus negative Angaben" (Frankl-Hochwart). Schultze erklärt, daß gewöhnlich die Erscheinungen einer allgemeinen Neurose oder Psychose fehlen, und Bernhardt sagt, „die in Rede stehenden Dinge einfach als hysterisch abzuordnen, ginge nicht an", die Patientinnen würden 40–50 Jahre alt, ohne von nervösen Beschwerden etwas zu wissen, und es ließen sich auch keine weiteren Zeichen von Hysterie nachweisen.

Demgegenüber ergeben die Nachforschungen in unseren eigenen Fällen doch ein erheblich anderes Bild. Wir haben (I. Aufl., für die seitdem beobachteten Fälle können wir keine Zahlenangaben machen, doch bestätigen unsere weiteren Erfahrungen durchaus das hier Gesagte) 20mal Angaben über diesen Punkt aufgezeichnet; 10mal wurde ausdrücklich konstatiert, daß allgemein nervöse Beschwerden fehlen, während ihr Vorhandensein in dem Rest der Fälle angegeben wird. Es fanden sich darunter dreimal ausgeprägte hysterische Erscheinungen (Anästhesien und Krämpfe). In allen übrigen Fällen erhoben wir nur die Angaben, daß die betreffenden Kranken im allgemeinen nervös, leicht reizbar, schreckhaft, ängstlich, weinerlich, oft verstimmt waren. Häufig fanden wir als Ausdruck dieser Überreizung des Nervensystems eine Steigerung der Sehnenphänomene an den Beinen, manchmal auch an den Armen; und in einer ganzen Reihe von Fällen konstatierten wir, wie oben schon ausführlich erwähnt, die Zeichen vasomotorischer Instabilität (Migräne, Menière'sche Symptome, fliegende Hitze, Herzklopfen, Neigung zu Ohnmächten, Anfälle von Polyurie, gesteigerte vasomotorische Hauterregbarkeit, Anfälle von Urticaria). Es verdient übrigens bemerkt zu werden, daß einige Maë, (Savill, Dejerine und Egger, eigene Beobachtungen) bei der Mutter

oder Schwester der Kranken dasselbe Leiden bestand oder bestanden hatte. Ich erwähne noch, daß bei einer meiner Kranken einmal Chorea vorausgegangen war.

Frankl-Hochwart kommt auf die Differenzen zwischen seinen und meinen Feststellungen in bezug auf diesen Punkt in der zweiten Auflage seiner Akroparästhesien nochmals zurück (S. 518). Er sagt: „Ich habe eben Fälle, wo Individuen mit typischer Hysterie auch über Parästhesien in den Fingerspitzen klagten, einfach zur Hysterie gerechnet, und nicht in die Statistik der Akroparästhesien aufgenommen; ich gebe zu, daß da verschiedene Ansichten möglich sind.“ Ich meine auch, daß so die Differenzen zu erklären sind, möchte aber nur einen Punkt herausheben und etwas anders fassen. Fälle von ausgesprochener Hysterie und Akroparästhesie sind mir gar nicht so häufig begegnet (s. o.) bzw. habe auch ich dort, wo neben ausgesprochenen Zeichen der Hysterie (Konvulsionen, Anästhesien, hysterische Charakterveränderung) gelegentlich über Parästhesien geklagt wurde, diesen keine Selbstständigkeit anerkannt. Nur die Häufigkeit allgemein neurasthenischer und neurasthenisch-vasomotorischer Symptome muß ich auch jetzt noch betonen. Aber auch hier ist es gewiß nicht leicht und oft völlig unmöglich, eine scharfe diagnostische Grenze zu ziehen, und mit demselben Rechte wird der eine von Akroparästhesien sprechen, wo der andere nur Neurasthenie diagnostiziert.

Auch jetzt noch verharre ich aber durchaus auf dem Standpunkt, daß die Akroparästhesien vielfach als ganz selbstständiges Leiden aufzufassen sind.

Es ist in der Literatur mehrfach der Vorwurf erhoben worden, daß wir die Symptomatologie des Leidens zu eng gefaßt und Übergänge und Beziehungen zu anderen Affektionen nicht genügend berücksichtigt hätten (Herz, Curschmann). Es bezieht sich das zum Teil nicht nur auf die Akroparästhesien, sondern auch auf die anderen hier behandelten Krankheitszustände. Diese Anschauung beruht auf einer Verkenntnis des Zieles, das sich die vorliegende Darstellung gesetzt hatte. Es sollte nicht eine allgemeine Symptomatologie der vasomotorischen und der damit vielfach zusammenvorkommenden trophischen Störungen gegeben werden, sondern der Versuch gemacht werden, gewisse enger zusammengehörige Symptomgruppierungen genau zu beschreiben und soweit als möglich einmal untereinander abzugrenzen und dann auch aus der Gruppe der allgemeinen Neurosen, auf deren Boden sie gewiß vielfach erwachen, herauszuheben. Das von Solis-Cohen, Herz, Curschmann beschriebene Krankheitsbild der sogenannten vasomotorischen Ataxie — der Name scheint mir an und für sich un zweckmäßig zu sein — stellt meines Erachtens nichts weniger als ein abgeschlossenes Krankheitsbild dar. Die unter diesem Namen zusammengefaßten vasomotorischen Störungen kommen bei

allen möglichen Erkrankungen vor (Neurosthenie, traumatische Neurose, Morb. Basedowii, Gefäßkrankheiten, vasomotorische Neurosen im engeren Sinne) und sind demgemäß in den Darstellungen der diese Erkrankungen behandelnden Autoren überall beschrieben worden, keineswegs also so unbekannt und wenig gewürdigt, wie Herz angenommen hat.

In Prozentzahlen ausgedrückt hatten wir in 65% der daraufhin untersuchten Fälle Symptome einer allgemeinen Neuropathie. Dabei mag aber darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Akroparästhesien ihrerseits insofern aus dem allgemeinen Rahmen der neuropathischen Symptome herausfallen, als sowohl ihre psychische Entstehung, wie besonders ihre psychische Beeinflussbarkeit sich kaum je deutlich nachweisen ließen. Und andererseits verdient es jedenfalls volle Berücksichtigung, daß immerhin noch in 35% der Fälle neuropathische Veranlagung nicht nachweisbar war, selbst wenn wir diesem Punkt ausdrücklich Aufmerksamkeit schenken.

Die Akroparästhesien können also auch nach unseren Erfahrungen nicht ohne weiteres als Teilerscheinungen einer allgemeinen Neuropathie aufgefaßt werden, aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle entstehen sie auf dem Boden einer solchen durch Schädlichkeiten spezieller Art, über die wir bereits das Nötige gesagt haben.

Wir sind mit diesen Feststellungen der Frage nach der Natur der Krankheit bereits näher getreten. Da anatomische Befunde nicht vorliegen, müssen wir versuchen, aus dem klinischen Bild die Genese der Krankheit abzuleiten.

Nothnagel hat für seine Fälle, wie erwähnt, als Grundlage einen arteriellen Krampf angenommen. Für diese Auffassung sprechen in der Tat die Blässe der Haut, wie die verschlimmernde Einwirkung der Kälte, und dieser Teil des Symptomenkomplexes kann gewiß nicht gut anders erklärt werden. Curschmann nimmt entsprechend seinen klinischen Beobachtungen an, daß auch den sensiblen Erscheinungen stets ein Gefäßkrampf der peripheren Arterien zugrunde liegt. Es komme — meist auch auf dem Boden einer allgemeinen neuropathischen Veranlagung — zu einer besonderen Labilität und Reizbarkeit auch der peripheren vasoconstrictorischen Nerven. Es ist seiner Ansicht nach wahrscheinlich, daß bei dieser Gruppe von „Vasomotorikern“ dauernde Tonusveränderungen der peripheren Arterien bestehen. Unseres Erachtens ist dieser Erklärungsmodus jedoch unzulässig. Der Annahme einer sekundären Schädigung der peripheren Nervenenden durch ungenügende arterielle Ernährung widerspricht durchaus das klinische Bild, das in der Mehrzahl der Fälle die Akrosynkope überhaupt ver-

missen läßt. Auch die Untersuchungen, die Simons über Gefäßreflexe bei Akroparästhesien mittels plethysmographischer Methoden angestellt hat, — wir kommen auf sie im Kapitel Raynandsche Krankheit noch zurück —, lassen erkennen, daß ein dauerndes Fehlen der Gefäßreflexe nicht vorhanden war. „Die Gefäßreflexe auf Eis oder Essigsäure fehlten immer nur zeitweise und auch das ist nicht häufig.“ Schultze nimmt demgemäß mit Recht an, daß die Gefäßverengung nur eine koordinierte Teilerscheinung der anderen nervösen Symptome ist, und daß irgendeine gemeinsame Ursache sowohl die gefäßverengenden Apparate, als die sensiblen Nerven irgendein krankhaft verändert. Wir wenden somit als Grundlage der einfachen Akroparästhesien eine Affektion der sensiblen Bahnen an irgendeiner Stelle ihres Verlaufes, als Grundlage der vasomotorischen Symptome eine solche der Vasomotoren resp. insbesondere der Vasokonstrictoren zu setzen haben. Die Möglichkeit, daß die letzteren reflektorisch bedingt sind, liegt wohl für eine Anzahl von Fällen vor (siehe darüber die physiologischen Vorbemerkungen), aber auch damit kommen wir dort nicht aus, wo sensible Erscheinungen ganz oder wenigstens anfangs fehlen.

Wo greift die Störung an und welcher Art ist sie?

Sinkler hat Störungen der Blutversorgung des Halsmarks angenommen. Bernhardt meint, daß es nicht berechtigt sei, für alle Fälle ein und dasselbe ursächliche Moment zu supponieren; er ist geneigt Sinklers Ansicht für eine Anzahl von Fällen gelten zu lassen. In anderen Fällen sucht er die Ursache in einer auf die peripheren sensiblen Nerven einwirkenden Schädlichkeit (z. B. hohen oder niedrigen Temperaturen), dadurch sollen Reizzustände in den vasomotorischen Centren des Markes ausgelöst werden. So werden die sensiblen Nerven ungenügend mit Blut versorgt, doch könne auch eine direkte Schädigung der sensiblen Nerven die Ursache sein.

Sehr vorsichtig spricht sich Ballet aus: es wäre vorzuziehen, zu behaupten, daß das Rückenmark oder die Medulla oblongata nichts mit der Pathogenese des Syndroms zu tun haben, vielleicht handle es sich aber in der Tat doch nur um eine Läsion der Nervenstämmen. Wenn ja, so sei sie jedenfalls von der Neuritis verschieden.

Laquer meint, es handle sich um eine Sensibilitäts- (Erschöpfungs- oder Beschäftigungs-) Neurase, von der nicht zu entscheiden sei, ob sie durch Reizung der peripheren Endapparate oder durch Kontraktion der kleinsten Hautgefäße, oder durch einen funktionellen Erschöpfungsstand in einem spinalen Centrum zustande komme.

Auch Schultze äußert sich nur sehr vorsichtig; destruktive Erkrankungen des zentralen Apparates sind nicht anzunehmen, ebenso wenig organische Erkrankungen hinterer Wurzeln oder degenerative Zustände im Sympathicus. Ausführlich wird die Frage behandelt, ob die Ursache der Affektion in anatomisch nachweisbaren Verände-

nungen der sensiblen Nerven, besonders ihrer Endäste und Endapparate zu suchen ist. Dagegen sprechen: Fehlen der Druckschmerzhaftigkeit der Nervenstämme und Muskeln, Fehlen von Muskelatrophie und von Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit, ferner auch der auffallende Wechsel der Erscheinungen, der an die Neuralgien erinnert, und der Mangel an Progression. Die öfter beobachtete Hyperästhesie und mehr noch die Hypästhesie lassen dagegen eher den Gedanken an eine gröbere anatomische Läsion aufkommen, eine definitive Antwort ist noch nicht zu geben. Schultze denkt, ohne diese Ansicht zu urgieren, an eine eventuelle Affektion der Endgezeßspindeln (Renautsche Körperchen). Es ließe sich eine direkte Einwirkung von gewissen Schädlichkeiten (Erfältungen oder Giften) auf die Hautnervenendigungen und die kleinsten sensiblen Nervenästchen mit oder ohne weitere Ausbreitung des Leidens nach oben zu vermuten.

Weniger Zurückhaltung bei Beurteilung dieser Fragen legt sich Friedmann auf. Alles spricht nach ihm für den peripheren Sitz, zwei Momente wirken ein: Empfindlichkeit der Nerven durch die allgemeinen Ernährungsverhältnisse bei den anämischen Personen, und Gelegenheit zu vorübergehenden Blutstauungen, die entweder durch die Kälte direkt erzeugt werden können oder durch irgendeine andere Circulationsstörung im venösen Blutlauf, wie sie z. B. die Nacht mit ihrer Muskelruhe vorübergehend produziert oder schlechte Herzaktion und Arteriosklerose dauernd bewirken. Die Akroparästhesie ist demnach als eine typische und leichte Form von funktioneller Neurose der peripheren sensiblen Nervenenden aufzufassen. Damit ist vor allem eine Progression ausgeschlossen und die Möglichkeit gegeben, daß bei Fortfall der Schädigungen wieder normale Verhältnisse eintreten. Die vasomotorischen Symptome berücksichtigt Friedmann, soweit ich sehe, gar nicht. Edinger ist am ehesten geneigt, ähnlich wie Friedmann, Circulationsstörungen im Bereich der peripheren Nerven als Ursache anzunehmen. Nach Frankl-Hochwart ist es unwahrscheinlich, daß ein anatomischer Prozeß vorliegt, er neigt der Annahme einer vasomotorischen Neurose zu. Auf Grund der Lokalisation der Parästhesien und Hypästhesien in radikulären Gebieten kommen Dejerine und Egger, Rossenda, Frommherz zur Annahme einer irritativen Läsion der hinteren Wurzeln, als Grundlage der Parästhesien; die vasoconstrictorischen Phänomene betrachten sie als reflektorisch durch Übergang der Reizung von den hinteren auf die vorderen Wurzeln bedingt; wo diese vasomotorischen Phänomene fehlen, insbesondere bei den über den ganzen Arm sich ausbreitenden Schmerzanfällen, kommt allein die Reizung der genannten sensiblen Fasern in Betracht. Bouchaud denkt in Rücksicht auf die von ihm gefundene metamere Verteilung der Störungen mehr an spinale Lokalisation, ebenso Pick, der wie schon früher Sinkler, das untere Halsmark als Sitz der Affek-

tion annimmt. Daß der radikuläre Typus nicht immer ausgesprochen ist, kann nach unserer Ansicht davon abhängen, daß die Störungen sich oft weiter ausbreiten, daß sie auch vorübergehend sind, vielleicht auch daran, daß die Alteration eines cervicalen Segments instande ist, Parästhesien in allen Fingern hervorzubringen, vermöge der Überlagerung der einzelnen radikulären Segmente. Wäre die radikuläre (oder spinal-metamere) Ausbreitung der Parästhesien sicher gestellt, so wäre damit zweifellos ein fester Anhaltspunkt für die Lokalisation gegeben. Ich habe bereits betont, daß meine Erfahrungen mir bisher nicht erlauben, diese Ausbreitung als die gewöhnliche anzunehmen, und so stehe ich der Verlegung des Krankheitsprozesses in die betr. genau umgrenzten Gebiete durchaus skeptisch gegenüber, bin vielmehr aus gleich anzuführenden Gründen geneigt, für die Mehrzahl der Fälle einen anderen mehr peripheren Sitz des Leidens zu supponieren.

Shaw will demgegenüber in der Erkrankung der Gefäßwände oder in ohne dauernde Veränderung der Gefäßwände eintretenden passagieren vasomotorischen Störungen die Grundlage der Affektion sehen; er unterscheidet die auf dem Boden der Endarteritis resp. Thrombose entstehenden Parästhesien, zu denen er die Schnitzsche Form rechnet, von den durch toxische Einflüsse hervorgerufenen (Ergotin, Lathyrus, Pellagra), für die es zweifelhaft ist, ob direkt die Gefäßwände oder die vasomotorischen Nerven angegriffen werden.

Wir haben bereits betont, daß es jedenfalls nicht angeht, Parästhesien und vasomotorische Symptome aus der Affektion einer Nervengattung zu erklären, weil dagegen die sich klinisch scharf ausprägende Unabhängigkeit der beiden Symptomengruppen spricht. Wenn wir uns nun der ätiologischen Momente erinnern, die die Entstehung des Symptomenkomplexes begünstigen, so werden wir uns im allgemeinen der Ansicht derer anschließen, die in Veränderungen der letzten sensiblen und vasomotorischen Endigungen die Ursache der Erkrankung suchen. Daß diese Veränderungen einen destruktiv-progressiven Charakter nicht haben können, muß man in der Tat daraus schließen, daß auf Jahrzehnte hinaus (in einem unserer Fälle 25 Jahre lang) eine Weiterentwicklung des Krankheitsbildes im Sinne etwa einer Neuritis mit Lähmungen oder Anästhesien ausbleibt. Von der Neuritis unterscheidet sich die Affektion ja auch schon dadurch, daß ihre Verteilung eine andere ist. Es werden im allgemeinen nicht einzelne Nerven in einem größeren oder geringeren Teil ihres Verlaufes befallen, sondern die peripheren Endigungen einer großen Anzahl von Nerven. Das oft beobachtete Auftreten der Störungen in typischen Anfällen läßt uns die Affektion in die Reihe derjenigen Krankheiten stellen, bei denen das krank machende Agens in gleichsam kumulierender Wirkung periodisch seinen Einfluß ausübt, während in den Intervallen klinisch eine Abnormalität nicht entzagt tritt. Unter diesen Affek-

tionen ist die unserem Symptomenkomplex am nächsten stehende die Neuralgie. Daß die Akroparästhesien keine rechten Neuralgien sind, das braucht nicht auseinanderzusetzen zu werden, es fehlen deren Hauptsymptome, der schwere, heftige Schmerz und die Beschränkung auf ein Nervengebiet ebenso wie die Druckpunkte und die Begleitsymptome der Neuralgie, Rüte, Schweilsekretion usw. Freilich sind auch die Akroparästhesien in gewissem Sinne systematisierte Krankheitserscheinungen insofern, als sie gleichliegende und unter denselben funktionellen und nutritiven Bedingungen stehende Teile des peripheren Nervensystems in Mitleidenschaft ziehen. Als eine weitere Ähnlichkeit mit den Neuralgien müssen wir die so häufig bestehende neuropathische Diathese auffassen. Auf deren Boden vermögen die erwähnten Schädigungen ihren krank machenden Einfluß auszuüben. Wie wir uns hierbei die Wirkung dieser Diathese vorzustellen haben, bleibt hier, wie in allen übrigen Fällen, wo wir mit diesem Begriffe rechnen, ungewiß. Wir können nur umschreibend sagen, durch eine ab origine vorhandene oder irgendwie erworbene Schwäche des Nervensystems besteht in diesem eine Widerstandsunfähigkeit, die schon geringen angreifenden Schädlichkeiten einen krank machenden Einfluß erlaubt. Wir können wohl noch einen Schritt weiter gehen und in einer Anzahl von Fällen annehmen, daß besonders das vasomotorische Nervensystem in einem Zustand übermäßiger Labilität sich befindet. Wo irgendeine nervöse Diathese nicht vorliegt, immerhin also in der Minderheit der Fälle, sind andere Faktoren maßgebend, so eine Anämie, die nach allgemeinen Erfahrungen die Extremitätenenden und die dort liegenden Gefäße am ehesten schädigt, oder Vergiftungen, von denen einzelne, wie der Alkohol, wie wir wissen, besonders die Nerven der gipfelnden Teile affizieren.

Man hat oft aus der symmetrischen Verteilung dieser (und auch anderer) Affektionen auf ein Ergriffensein des centralen Nervensystems schließen zu sollen geglaubt, doch mit Unrecht; denn die Erfahrungen gerade bei der Polyneuritis machen es uns durchaus plausibel, daß auch bei peripherem Krankheitssitz eine mehr oder minder symmetrische Verteilung der Störungen resultieren kann.

Wenn wir nun im einzelnen die Zurückbeziehung der Symptome auf die supponierten funktionellen Alterationen ins Auge fassen, so können wir da nur Vermutungen äußern. Der nicht seltene Übergang der Parästhesien in leichte Hypästhesien läßt es uns wahrscheinlich erscheinen, daß diese auf einer Affektion der sensiblen Nervenendigungen beruhen. Daneben ist die Möglichkeit einer Beteiligung der sensiblen Gefäßnerven, über deren Vorhandensein wir uns oben schon ausgelassen haben in Erwägung zu ziehen, um so mehr als die Art der angegebenen Empfindungen oft von den gewöhnlichen Parästhesien bei der Neuritis, Tabes usw. abzuweichen scheint und vielleicht eine

besondere Art von Schmerz, einen Gefäßschmerz darstellt. Die Kälte und Blässe der Teile ist für gewöhnlich auf eine direkte Affektion der Vasoconstrictoren zurückzuführen; wo sensible Reizerscheinungen fehlen, ist eine andere Erklärung nicht möglich, wo sie sehr in den Vordergrund treten und die vasomotorischen Symptome nur mehr gelegentlich sich zeigen, kann eine reflektorische Reizung der Vasoconstrictoren in Erwägung gezogen werden. Die Vasodilatoren kommen nicht in Betracht, da deren Lähmung, wie ich schon mehrfach betont habe, keine Anämie produzieren kann. Die motorischen Nervenendigungen bleiben stets verschont. Das darf uns nicht überraschen, wenn wir einerseits an die gänzlich verschiedenen Lage- und Ernährungsverhältnisse dieser Nerven denken und ferner berücksichtigen, daß gerade für die bei den Akroparästhesien wirkenden Schädlichkeiten die motorischen Nerven weniger empfindlich zu sein scheinen, als die sensiblen und vasomotorischen. Nach meiner Auffassung stellen also die Akroparästhesien in ihrer einfachsten Form (Schultzescher Typus) eine sensible Neurose dar, in ihrer aus vasomotorischen und sensiblen Symptomen zusammengesetzten Varietät (Nothnagelscher Typus) eine vasomotorisch-sensible Neurose. Es sind meist die peripheren sensiblen Haut- und Gefäßnervenendigungen bei der ersten Form, bei der zweiten dazu noch die peripheren gefäßverengernden Nerven (oder auch deren Ganglien) Sitz der Krankheit. Die Affektion der letzteren ist direkt oder reflektorisch bedingt. In einer Reihe von Fällen, in denen die subjektiven und objektiven Sensibilitätsstörungen einer radikulären Verletzung sich annähern, könnte man wohl an einen sehr central gelegenen Krankheitssitz denken, ohne dabei von der grundsätzlichen Annahme einer vasomotorisch-sensiblen Neurose abgehen zu müssen. Daß der Begriff Neurose hier in diesem Zusammenhange nichts mit einer psychogenen Entstehung des Leidens zu tun hat, bedarf wohl keiner besonderen Betonung.

Diagnose.

Die Diagnose ist für die meisten Fälle der reinen Akroparästhesien nicht schwer, wenn wir uns daran halten, daß andere Symptome außer den Spitzenparästhesien, den Schmerzen und geringen objektiven, meist nicht auf bestimmte Nervengebiete verteilten Sensibilitätsstörungen fehlen. Für die Nothnagelsche Form kommen dazu noch die vasomotorischen Symptome. Diagnostisch bedeutsam ist ferner das Auftreten der Störungen in Anfällen, die sich oft an bestimmte Tageszeiten halten.

Im vorigen Abschnitt haben wir bereits die Punkte hervorge-

haben, die eine Abgrenzung gegen die Neuritis und gegen die Neuralgie gestatten. Auch da, wo bei einer leichten Form der sensiblen Neuritis Motilitätsstörungen und Atrophien ganz fehlen, wird die Beschränkung der Parästhesien auf einzelne Nervenstämme, deren Verlauf sie dann proximalwärts zu folgen pflegen, und die ausgesprochene Druckempfindlichkeit der Nervenstämme, ferner wohl auch das Verschwinden der Schienenphänomene die Diagnose stellen lassen. Bei den Neuritiden fehlen auch die typischen Paroxysmen meist, doch beschreiben Raymond et Courtoislement bei einem Kutscher, Lévi et Wonnser bei Radfahrern Beschäftigungsneuritiden, bei denen die Parästhesien in typischen, nichts besonders starken Anfällen auftreten. Fälle von Neuritiden, die immerhin den Akroparästhesien recht ähnlich sehen können, hat auch Friedmann veröffentlicht. Am ehesten geben wohl die leichten Neuritiden der Alkoholiker zu diagnostischen Erwägungen Anlaß. Die von Buzzard publizierten Beobachtungen, die der Autor selbst als periphere Neuritiden klassifiziert, sind ebenfalls geeignet, die Ähnlichkeit der Symptomatologie der beiden Affektionen vor Augen zu führen. Buzzards Kranke klagten über ein Brennen, Ziehen, Kriechen, Eingeschlafensein, daneben kamen auch vasomotorische Symptome, meist allerdings solche von Gefäßlähmung vor. Die Beschwerden pflegten am Morgen heftiger zu sein und waren in der Peripherie am stärksten entwickelt. Als entscheidende Merkmale der Neuritis finden sich aber stets Lähmungen mit Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit. Es sind demgemäß auch alle späteren Autoren darin einig, die Buzzardschen Fälle den Akroparästhesien nicht zuzurechnen; immerhin dürfen wir in ihnen doch eine wertvolle Bestätigung der Anschauung über die Pathogenese der Akroparästhesien sehen, die deren Ausgangspunkt in leichtesten Veränderungen der sensiblen und vasomotorischen Nerven sucht.

Noch näher stehen den Akroparästhesien Fälle, wie sie Schmidt beobachtet hat. Er konnte bei 21 Kranken neben Akroparästhesien und Parästhesien teilweise neuralgiformen Charakters ein- oder doppelseitige Druckempfindlichkeit des Plexus brachialis feststellen. Es handelte sich stets um Individuen mit tuberkulöser Lungenspitzenaffektion; auf der Seite, wo die Lunge am stärksten erkrankt war, saßen in der Regel auch die stärkeren Parästhesien. Als Unterscheidungsmerkmale gegen die mehr selbständigen Akroparästhesien gibt Schmidt ihre Häufigkeit bei männlichen Individuen und ihre oft konstatierte Einseitigkeit an, ferner die Druckschmerzhaftigkeit der Nervenstämme, er glaubt, daß als ätiologisches Moment hauptsächlich rein mechanische Bedingungen in Betracht kommen, also Druck- und Reizwirkungen leichtester Art, die die erkrankte Lungenspitze auf den benachbarten Plexus brachialis ausübt. Dafür spricht nach ihm auch der häufige

beobachtende Parallelismus der phthisischen Erscheinungen mit den Parästhesien.

Auf die Abgrenzung gegen die Neuralgien braucht nicht noch einmal eingegangen zu werden. Dagegen möchte ich noch einige Worte über die Unterscheidung von den professionellen Neurosen sagen. Es gibt ja auch unter diesen Formen, bei denen nicht sowohl spastische und parästhetische als sensible Symptome das Bild der Krankheit ausmachen. Eine weitere Ähnlichkeit besteht darin, daß auch die professionellen Neurosen sich meist auf dem Boden der allgemeinen Neuropathie entwickeln. Der durchgreifende Unterschied ist der, daß die professionellen Neurosen regelmäßig erst im Anschluß an eine bestimmte Arbeit entstehen, während bei den Akroparästhesien leichte Arbeit im Gegenteil oft von Nutzen ist, und nur die Einwirkung gewisser mit der Arbeit verbundener Schädlichkeiten sie auslöst. Frankl-Hochwart hebt noch besonders das Fehlen der typischen morgendlichen Anfälle bei den Beschäftigungsneurosen hervor. Auch die Einseitigkeit der Parästhesien ist wenigstens für die Dauer bei den Akroparästhesien ungewöhnlich. Bemerkenswert ist auch, daß trotzdem die Kranken ihre Arbeit weiter fortsetzen, durch geeignete Behandlung die Parästhesien verschwinden können, wie ich das zweimal zum Beispiel bei Melkerinnen sah. Eine Beschäftigungsneurose würde unter solchen Verhältnissen sich wohl stets verschlimmern. Immerhin habe ich einige Fälle gesehen, bei anämischen, schlecht genährten jungen Mädchen, die sich beim Schreiben, namentlich beim Maschinenschreiben dauernd überanstrengten, in denen es nicht gelang zwischen Beschäftigungsneurose und Akroparästhesien exakt zu unterscheiden, bzw. habe Fälle beobachtet, wo die Symptome beider Neurosen nebeneinander bestanden. Ich habe ferner auch bei Zigarrenarbeitern Zustände beobachtet, bei denen ich zweifelhaft war, ob sie den Akroparästhesien oder den Beschäftigungsneurosen zuzurechnen sind.

Sehr schwierig kann sich die Beantwortung der Frage gestalten, ob in gewissen Fällen von Hysterie, wo über Kriebeln in den Fingern geklagt wird, dieses Symptom als hysterisches zu bezeichnen und in die Kategorie der übrigen Symptome einzureihen ist. Stellt es sich heraus, daß auch die Akroparästhesien, wie die übrigen Symptome, ihr hysterisches Stigma an sich tragen, indem sie ihre psychische Entstehung verraten und offenkundig dem Einfluß von Vorstellungen untergeordnet sind, also z. B. bei abgelenkter Aufmerksamkeit verschwinden, nur im Anschluß an seelische Erschütterungen auftreten, so werden wir kein Recht haben, diese Symptome von den übrigen hysterischen abzusondern. Frankl-Hochwart betont als Unterscheidungsmerkmal wieder das Fehlen typischer Anfälle, das Fehlen von Verfärbungen, die Einflußlosigkeit thermaler Reize. Diese Merkmale genügen aber keineswegs immer zur Unterscheidung, die morgendlichen Anfälle

fehlen auch bei der typischen Form der Akroparästhesien, nach Verlärfungen sind, wie wir sahen, keineswegs die Regel. Andererseits sind vasomotorische Reiz- und Lähmungssymptome bei der Hysterie durchaus nichts Ungewöhnliches. Wir werden uns daher nicht selten ohne völlige Aufklärung des Verhältnisses der lokalen zu der allgemeinen nervösen Affektion beschreiben müssen, jedenfalls müssen wir betheuern, daß ein enger Zusammenhang zwischen der allgemeinen Neurose und den Akroparästhesien besteht, wenn wir auch, wie schon betont, diese Akroparästhesien nicht durchgehends als Symptom der allgemeinen Neurose auffassen dürfen.

Ganz das gleiche gilt für das Verhältnis der Akroparästhesien zu der Neurasthenie.

Schon vor längerer Zeit hat Berger über eine eigentümliche Form von Parästhesien berichtet, die neben manchem Gemeinsamen doch auch viele Unterschiede von unseren Akroparästhesien aufweisen. Es handelt sich da meist um jugendliche Individuen, bei denen anfallsweise außerordentlich intensive, wenn auch nicht eigentlich schmerzhaft Parästhesien auftreten (ein Gefühl von Ameisenlaufen, Stechen, Prickeln, seltener Brennen). Die abnormen Empfindungen erscheinen nach längerem Stehen oder auch nach wenigen Schritten, nicht so sehr bei längerem, selbst stundenlangem Gehen, sie ziehen von der Hüfte nach den Zehen, entweder gleich doppelseitig oder erst nur auf einer Seite; sie können auch dauernd einseitig bleiben. Regelmäßig besteht ein hochgradiges Schwächegefühl; ein Anfall dauert gewöhnlich einige Minuten, die Anfälle kommen oft, die unangenehmen Empfindungen breiten sich bis in die Hypochondrien aus. Vasomotorische Störungen fehlen, nur einmal fand sich, gleichsam als Aura, eine Hyperhidrosis; trotz jahrelanger Dauer des Leidens finden sich keine weiteren Symptome, in einem Fall waren Kälte und Alkohol von schlechtem Einfluß. Das Leiden ist sehr peinlich und quälend; Arien scheint günstig zu wirken. Der Autor faßt die Affektion als eine eigentümliche Form von Haut- und Muskelparästhesien auf, er glaubt auch für das Schwächegefühl, dem eine nachweisbare objektive Störung nicht gegenüber steht, Parästhesien sensibler Muskelnerven anzuhaldigen zu sollen. Die Affektion scheint nicht häufig zu sein, doch konnte ich einen Fall beobachten, auf den Bergrers Schilderung durchaus paßte. Die Kenntnis des Symptomenkomplexes genügt, um ihn von den Akroparästhesien zu unterscheiden.

Über die Unterscheidung von der Tetanie und den tetanoiden Zuständen macht Frankl-Hochwart folgende Angaben: Bei den ausgesprochenen Fällen von Tetanie besteht natürlich keine Schwierigkeit, „man vergesse aber nicht, daß es auch Fälle gibt, die auch der Tetanie zuzurechnen sind, bei denen die Leute nur über Parästhesien klagen und weder Krämpfe noch Troncausches Phänomen haben.

Es sind dies meist Schuster, Schneider; der Ort, wo sie erkrankten (besonders Wien, wo die Tetanie endemisch ist), die Zeit (März, April) bringen auf die richtige Fährte. Der Nachweis des Chvostekschens Phänomens und der elektrischen Überregbarkeit vervollständigt die Beweisführung, daß es sich um die abortive Form von Tetanie (tetanoid-Zustände) handelt." Auch in seiner Darstellung der Tetanie (II. Aufl. S. 108) macht er auf die Ähnlichkeit von tetanoiden Zuständen und Akroparästhesien aufmerksam.

Auf solche Zustände nimmt wohl F. Parkis Weber Bezug, wenn er von *sensory tetany* und *vasomotor tetany* spricht.

Stornberg hat darauf aufmerksam gemacht, daß im Anfangsstadium der Akromegalie typische Akroparästhesien auftreten, sie gehören zu den frühesten Erscheinungen der Krankheit und gehen oft der Ausbildung der Vergrößerungen voraus. Eine Verwechslung kann auch dadurch begünstigt werden, daß die Symptome beider Affektionen oft mit dem Klimakterium, die der Akromegalie allerdings mit einem pathologisch verfrühten Klimakterium zusammenfallen. Wenn im Anfang nicht immer eine sichere Diagnose möglich ist, so ergibt natürlich sehr bald die weitere Entwicklung genügende Anhaltspunkte für die Annahme der Akromegalie.

Übrigens hat auch Verstraeten schon einen Fall von Akromegalie beschrieben, in dem frühzeitig Akroparästhesien zusammen mit Akrosynkope vorhanden waren, und Souza-Leite teilt einen typischen Fall mit, in dem schon jahrelang Totenfinger vorausgingen. Auch nach unserer Erfahrung treten bei der Akromegalie oft sehr frühzeitig ganz typische Anfälle von Akroparästhesien auf. Darüber berichten auch andere Autoren (Edgeworth).

Wir hatten nun weiter die Differentialdiagnose mit der Erythromelalgie und der Raynaudschen Krankheit zu besprechen, wobei besonders die mit vasomotorischen Symptomen verbundene Notknagelsche Form in Betracht käme. Doch sei diesbezüglich auf die beiden nächsten Kapitel verwiesen.

Von den organischen Krankheiten des centralen Nervensystems kommen differential-diagnostisch nur wenige in Betracht, zunächst die *Tabes dorsalis*. Hier sind bekanntlich oft genug Parästhesien vorhanden, und sie bilden bisweilen auch das erste Symptom der Krankheit. Sie bevorzugen dann besonders das Unterschenkelgebiet; bleiben Akroparästhesien einmal lange Zeit auf dies Gebiet beschränkt, so wird man vielleicht daran denken können, ob sich nicht gelegentlich hinter so harmloser Außenseite die schwere spinale Erkrankung versteckt, da ja die eigentlichen Akroparästhesien nur selten im Gebiet eines Nerven längere Zeit isoliert bleiben. Natürlich werden erst sicherere Zeichen der *Tabes* deren Diagnose gestalten.

Daß gelegentlich auch einmal in Verbindung mit der *Loes spi-*

nalis ein der Akroparästhesie ähnliches Bild wenigstens an den oberen Extremitäten vorkommen kann, beweist folgender Fall.

E. Witte, 43 Jahre alt. Der Mann ist an progressiver Paralyse gestorben; Pat. hatte zwei Aborte und zwei Fehlgeburten; sie ist seit mehreren Jahren nervös. Vor zwei Jahren hatte sie nach einem großen Ärger das Gefühl, als ob ihr Gesicht mit einer kalten Maske zugedeckt würde, das dauerte einige Sekunden. Von dieser Zeit ist sie an Gelenksrheumatismus, bei dem auch die Wirbelsäule affiziert gewesen sein sollte. Jetzt klagt sie über ein Gefühl von Kälte, Kriebeln und Steifigkeit in den Armen, besonders im rechten. Am Morgen ist es so stark, daß sie erst gegen 9 Uhr morgens wieder die normale Gelenkigkeit ihrer Finger zurückbekommt. Das Becken der Halswirbelsäule ist schmerzhaft, die Untersuchung der Sensibilität mit Motilität ergibt an den oberen Extremitäten völlig normale Verhältnisse. Die rechte Pupille und die rechte Lidspalte sind enger als die linke, die Pupillenreaktion und der ophthalmoskopische Befund sind normal. Im vergangenen Jahre bestand zeitweise eine Incontinencia urinae, außerdem im rechten Bein Lähmungsgefühl. Die Kniephänomene sind beiderseits stark erhöht, jedoch bestehen keine Spännen. Beim Erheben des rechten Beines macht sich eine geringe Schwäche bemerkbar, beim Gehen wird das rechte Bein deutlich weniger benutzt, im linken Bein besteht ein leichter, aber deutlicher Grad von Hypalgesie, besonders wird kalt und warm weniger gut unterschieden als rechts.

Es liegt also eine Andeutung des bei *Lues spinalis* so häufigen Brown-Séquardschen Symptomenkomplexes vor. Auch die Blasenstörungen, vielleicht auch die Pupillendifferenz im Verein mit den Angaben der Anamnese machen das Bestehen einer *Lues cerebrospinalis* höchst wahrscheinlich. Zweifelhaft ist, inwieweit die Akroparästhesien hier als selbständiger Symptomenkomplex aufzufassen sind. Man könnte annehmen, daß sie durch leichtespezifisch-syphilitische Reizungen, besonders der Meningen und der extramedullären Wurzeln zustande gekommen sind. Den besten Aufschluß darüber hätte der Verlauf resp. die Reaktion auf die spezifische Behandlung gegeben. Leider konnten wir darüber, da wir die Patientin bald aus den Augen verloren, nichts erfahren.

Ein ähnlicher Fall ist der folgende.

29jährige Frau. Über *luetische* Infektion nichts bekannt. Seit einem Jahre Brennen und Kriebeln in beiden Armen und Händen, seit einem halben Jahre so heftig, daß sie Morphium nehmen muß; die Parästhesien sind morgens am heftigsten. Der Schlaf ist durch sie gestört. Kaltes Wasser verschlimmert; keine vasomotorischen Symptome. Die Untersuchung ergibt nichts außer daß die linke Pupille weiter ist als die rechte, und die linke gar nicht, die rechte spärweise auf Licht reagiert.

Diese Patientin konnte ebenfalls nur einmal untersucht werden, so daß über den Verlauf nichts bekannt ist. In Rücksicht auf die Pupillenstarre liegt die Annahme nahe, daß auch hier die mit ungewöhnlicher Heftigkeit auftretenden Parästhesien auf einer Reizung der hinteren cervicalen Wurzeln durch eine Meningitis posterior specifica beruhen.

Brunn beschreibt folgenden Fall: Bei einer seit langem hyste-

rischen Frau entwickeln sich in Händen und Füßen heftige Parästhesien, zunächst ohne jeden objektiven Befund. Daher wird die Diagnose Akroparästhesien gestellt. Im Laufe der nächsten Monate bildet sich aber eine deutliche Schwäche der Beine heraus, daneben besteht Ataxie, es kommt zu schwerer, immer zunehmender Anämie und die Sektion ergibt eine kombinierte Hinterseitenstrangerkrankung. Ich habe schon oben erwähnt, daß meines Erachtens ein von Egger beschriebener Fall von radikulären Akroparästhesien mir eher zur kombinierten Hinter-Seitenstrangerkrankung zu gehören scheint. Die Verwechslung beider Affektionen bzw. das Übersehen der spinalen, die organische Erkrankung beweisenden Symptome, scheint nach meiner Erfahrung auch sonst nicht ganz selten vorzukommen.

Ich habe einen Fall gesehen, wo es zunächst nicht ganz sicher war, ob die vorhandenen sensiblen und vasomotorischen Störungen — besonders die objektiven Sensibilitätsstörungen waren stark ausgeprägt — den Beginn einer Syringomyelie darstellten, oder einfache Akroparästhesien waren, der weitere Verlauf entschied zugunsten der letzteren Annahme. Peretz bespricht gelegentlich die Erörterungen über Sensibilitätsstörungen bei multipler Sklerose die Differentialdiagnose gegenüber den Akroparästhesien. Das häufige Vorkommen leichter Sensibilitätsstörungen und Parästhesien an den Händen bei multipler Sklerose läßt es verständlich erscheinen, daß derartige differentialdiagnostische Erwägungen gelegentlich im gegebenen Fall nötig werden.

In denjenigen — seltenen — Fällen, in denen die Parästhesien in hemiplegischer Form auftreten, wäre an eine Verwechslung mit anatomisch bedingten Hirnleiden zu denken, soweit diese mit Schädigungen der sensiblen Bahnen in dem hinteren Teil der inneren Kapsel oder mit solchen der Schleife verbunden sind. Doch wird eine genaue Untersuchung wohl immer Anhaltspunkte für eine richtige Wertung der Symptome ergeben. Friedmann beschreibt folgenden Fall.

65-jähriger Mann, vor fünf Jahren Gehirnschlag, vorher gesund, jetzt häufige kurze Schwindelanfälle, starkes Arteriosklerose, Spuren von Eiweiß im Urin. Vor zwei Monaten zum erstenmal plötzlich beim Einsteigen in die Herdtbake zugleich mit einem heftigen Schwindelanfall Gefühl von Krämpfen im fünften Finger und in der Phalanx des vierten. Die Parästhesien halten während der folgenden zwei Jahre an, es kommt nicht zu einem eigentlichen Schlaganfall, und der Schwindel wird allmählich geringer.

Friedmann, der den Fall den Akroparästhesien zurechnet, wenn er ihn auch einer besonderen Gruppe einreicht, supponiert als Grundlage einen Gehirnerd. Er glaubt, daß eine solche Genese bei einseitig begrenzter Verbreitung der Parästhesien überhaupt nicht so selten sei. Daß Parästhesien dieser Art als Vorläufer oder Begleiterscheinungen von Hemiplegien vorkommen, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, wie das übrigens auch sonst wohl bekannt ist. Doch halte ich

es für richtiger, derartige Fälle nicht den Akroparästhesien zuzurechnen, sondern ihnen gemäß ihrer pathogenetischen Stellung ihren Platz bei den Hemiplegien einzuräumen, als deren leichteste Form bzw. als deren Vorläufer sie zu gelten haben. Im Friedmannschen Falle genügen die vorhandenen Symptome, die Arteriosklerose, der Schwindel und der geringe Erweißgehalt des Urins in Verbindung mit der halbseitigen Lokalisation der Parästhesien durchaus, um den ganzen Fall als eine Hemiplegia levissima auf dem Boden der Arteriosklerose zu bezeichnen.

Von Intoxikationen kommt zunächst der Ergotismus in Betracht. Unter seinen Symptomen nehmen bekanntlich Spitzenparästhesien den Hauptplatz ein. Schon ihre große Verbreitung dürfte sie meist von der Akroparästhesie unterscheiden. Dazu kommen anderweitige Vergiftungssymptome, Störungen des Appetits, der Darmfunktionen usw., ferner heftiges Durst- und Hungergefühl, weiter Kontrakturen in zahlreichen Muskelgruppen, so daß in solchen Fällen sich eine Unterscheidung von selbst ergibt. Für die leichtesten Fälle, die noch am ehesten eine Ähnlichkeit mit den Akroparästhesien haben, wird der anamnestiche Nachweis der Ergotinaufnahme die Sachlage klarstellen.

Daß bei Alkoholikern Zustände von Akroparästhesien vorkommen, ist bereits erwähnt. Frankl-Hochwart teilt Ähnliches von Diabetikern mit. Es gibt wohl noch eine ganze Reihe von Dyskrasien, in denen gelegentlich ähnliche Zustände beobachtet wurden. Wir haben bereits den Morbus Brightii erwähnt, ähnlich steht es mit der uratischen Diathese. Meist tritt in solchen Fällen das Grundeiden so stark in den Vordergrund, daß wir keine Ursache haben, den Akroparästhesien eine klinische, speziell eine diagnostische Bedeutung beizumessen. Auf die Diagnose dieser verschiedenen Affektionen einzugehen, ist hier daher nicht der Platz.

Prognose.

Die Prognose ist quoad sanationem nicht immer gut. Daß der Verlauf oft ein sehr chronischer ist, wurde bereits betont, daß jedoch auch in solchen Fällen Heilungen vorkommen, beweisen mir Fälle eigener Erfahrung, wo die Patientinnen wegen eines anderen Leidens die Poliklinik aufsuchten und erzählten, daß sie vor Jahren an Zuständen gelitten hätten, die nach der Schilderung nur typische Akroparästhesien gewesen sein konnten. Häufiger als völlige Heilungen sind langdauernde Intermissionen. Am besten ist die Prognose für die akut entstehenden Formen.

Es steht andererseits fest, daß das Leiden unbegrenzt lange bestehen kann, ohne daß irgendeine Komplikation dazu kommt.

Eine Gefährdung für das Leben des Individuums bedingen die Akroparästhesien natürlich nicht.

Therapie.

In den zahlreichen Fällen, in denen häufiges Manipulieren mit Wasser ätiologisch wirksam war, wird man den Kranken eine Beschränkung dieser Tätigkeit anraten müssen. Auch dort, wo Überanstrengung mit Platten, Nähen, Zigarrenwickeln usw. von Bedeutung für die Entstehung der Akroparästhesien war, wird man solche Tätigkeit verbieten. Freilich sind die Kranken nur selten in der glücklichen Lage, welchem Rate Folge leisten zu können, und wir müssen also oft auf andere Mittel bedacht sein. Am besten hat sich uns die Elektrizität bewährt, besonders in der Form des faradischen Pinsels oder noch besser des faradischen Handbades. Hierdurch wurden die Beschwerden oft wenigstens für längere Zeit gemildert, und die Kranken verlangten, was für den Effekt der Behandlungsmethode spricht, wenn sie sich neuen Schädlichkeiten ausgesetzt hatten und die Akroparästhesien wieder aufgetreten waren, wieder danach zurück. Die Behandlung ist auch von anderer Seite vielfach empfohlen worden; ich will nicht verschweigen, daß ich nach Mißerfolge zu verzeichnen hatte, Fälle bei denen keine Besserung oder gar eine Verschlechterung eintrat. Von anderen Methoden der elektrischen Behandlung ist Galvanisation des Halsmarks empfohlen worden, ferner auch von Haskóvec Franklinisation. Über die von Frankl-Hochwart angeregte Massagebehandlung fehlen mir Erfahrungen, dagegen sah ich von der von Friedmann empfohlenen schwedischen Heilgymnastik auch einige Erfolge.

Weiter werden hydratische Prozeduren in Anwendung gezogen, bald sind warme, bald kalte lokale oder allgemeine Bäder mit Erfolg versucht worden, auch wechselwarme Doucheen wurden angewendet, ferner spirituelle Einreibungen in verschiedenen Formen. In manchen, zum Teil recht hartnäckigen Fällen, hatten lokale lauwarme einprozentige Salzwasserbäder, die jeden Morgen 10–20 Minuten lang genommen wurden, Erfolg, in anderen ließ ich während der Nacht einen Prießnitzschen Umschlag an den Armen machen, am besten in der Form, daß über einen dünnen in Wasser getauchten Strumpf, in den der Arm hineingesteckt wurde, ein dicker trockener Strumpf gezogen wurde. Über günstige Erfolge mit Heißluftbehandlung berichtet Trespe.

Die medikamentöse Therapie ist dort in Anwendung zu ziehen, wo die Akroparästhesien sich auf dem Boden einer Dyskrasie, insbesondere einer Anämie entwickeln. Hier werden die Tonica, Arsen, besonders auch in Injektionen, Phosphor, Chinin, Strychnin, wohl auch

Brom und Baldrian benutzt werden müssen, doch wird vielfach betont, daß hier die Erfolge der Behandlung recht bescheidene sind. Curschmanns rühmt das Chinin, ich möchte in den Fällen, in denen Zeichen vasomotorischer Labilität ausgesprochen sind, nicht auf das Arsen verzichten. Auch Adrenalinpräparate sind empfohlen worden (Solix-Cohen). Die von Saundby proklamierte Behandlung mit Rhabarber und Calomel, die in seinen Fällen glänzende Resultate ergab, kann naturgemäß nur da von Wirkung sein, wo Erkrankungen des Magen-Darmapparates die Akroparästhesien bedingen. Hier würde ich auch einen Versuch mit Magnesium-Perhydrol empfehlen.

Drittes Kapitel.

Die Erythromelalgie.

Im Jahre 1878 beschrieb Weir-Mitchell einen Krankheitszustand, der durch ein paroxysmales Auftreten von Schmerzen, Röte und Schwellung der Füße charakterisiert war. Er gab diesem Symptomenkomplex den Namen Erythromelalgie. Schon einige Jahre vorher hatte er auf ihn aufmerksam gemacht, doch in einer wenig gelesebenen Zeitschrift, und so kam es, daß diese erste Veröffentlichung keine Verbreitung unter den Ärzten fand. Weir-Mitchell stützte sich bei seiner zweiten Publikation auf sechs Fälle eigener Beobachtung und stellte außerdem aus der früheren Literatur noch weitere fünf zusammen, in denen er das Krankheitsbild vorzufinden glaubte. Die beiden ältesten sind die von Graves (1843), dann folgt je ein von Paget (1871), Grenier (1873), Vulpian (1875) beschriebener. Dazu kommt noch ein weiterer von Weir-Mitchell nicht erwähnter Fall von Sigerson.

Die zweite, wichtige und zusammenfassende Publikation über die Erythromelalgie rührt von Maurice Lannois her und stammt aus dem Jahre 1880. Er brachte einen eigenen genau beobachteten Fall bei, erwähnte einige andere inzwischen publizierte und erweiterte unsere Kenntnisse über die Erythromelalgie, der er den Namen *Paralysie vasomotrice des extrémités* zu geben versuchte, in mannigfacher Weise. Die Erwartung der Autoren, daß nun, wo die Aufmerksamkeit auf die Krankheit gelenkt war, die Veröffentlichungen einschlägiger Beobachtungen rascher aufeinanderfolgen würden, erfüllte sich nicht; nur hier und da wurde ein Fall mitgeteilt und erst im Jahre 1894 erschien wieder eine zusammenfassende Schilderung des Krankheitsbildes aus der Feder von Lewin und Benda, die besonders dadurch bemerkenswert war, daß die beiden Autoren zum erstenmal mit voller Sicherheit die Behauptung aufstellten, die Erythromelalgie sei kein selbstständiges Krankheitsbild. Lewin und Benda konnten 40 Fälle (37 aus der Literatur und drei eigene) zusammenstellen. Um die weitere Forschung auf diesem Gebiete hat sich dann noch Eulenburg in mehreren Publikationen verdient gemacht; Dehio veröffentlichte einen ersten anatomischen Befund, der allerdings nur das durch Operation resezierte Stück eines Nerven betraf; Auerbach publizierte den ersten Fall, in dem eine vollständige pathologisch-anatomische Untersuchung des Nervensystems vorgenommen wurde. In späterer Zeit ist Weir-Mitchell selbst wiederholt von neuem auf das Thema zurückgekommen und hat zusammen mit

Spiller anatomische Befunde mitgeteilt. Weiters wichtige Beiträge verdanken wir Sachs und Wiener, Hamilton, Elsner, Lannois und Parot, Cavazzini und Bracci, Rudzki und Hornowski.

Das Symptomenbild gehört zweifellos zu den selten zur Beobachtung kommenden. Ich konnte ca. 130 Beobachtungen sammeln, die aber auch noch nicht einmal alle sicher sind. Von einer Anzahl Publikationen über Fälle von Erythromelalgie sind mir weiterhin noch die Titel bekannt geworden, ohne daß es mir gelang, über den Inhalt dieser Veröffentlichungen etwas Weiteres zu erfahren. Ferner sind an verschiedenen Stellen noch eine Reihe von einschlägigen Beobachtungen kurz erwähnt. Unter 25000 Fällen der Poliklinik von Professor Oppenheim fanden sich nur zwei Fälle. Außerdem hatte ich noch Gelegenheit, einen Fall aus der Privatpraxis von Professor Oppenheim zu beobachten; noch einen vierten Fall habe ich kürzlich beobachtet.

In der folgenden Schilderung werde ich mich zunächst einmal ganz darauf beschränken, festzustellen, unter welchen Verhältnissen „Erythromelalgie“ d. h. das Symptomenbild der „roten schmerzhaften Glieder“ überhaupt vorkommt, und welches die speziellen Kennzeichen sind, die diesen Zustand charakterisieren; dagegen sehe ich vorläufig von einer Schilderung derjenigen verschiedenen Krankheitszustände ab, auf deren Boden das Symptomenbild erwächst. Die Erörterung der schwierigen Frage des Verhältnisses der Erythromelalgie zu diesen Krankheitszuständen verschiebe ich aus mannigfachen Gründen.

Ätiologie.

Alter, Geschlecht. Daß die Erythromelalgie selten ist, wurde schon gesagt. Nach den Meinungen der ersten Autoren, die über Erythromelalgie schrieben, soll sie hauptsächlich bei Männern vorkommen. Meine Zusammenstellungen ergeben zwar auch ein Überwiegen der Männer, doch ist es nicht sehr erheblich und kann sehr wohl zufällig bedingt sein; ich fand, daß 61 mal Männer und 48 mal Frauen betroffen waren; in den Publikationen der letzten Jahre handelte es sich recht oft um Frauen. Benoist berechnet sogar nur 78 Männer auf 71 Frauen. Er hat weniger Kritik bei der Aufstellung seiner Fälle geübt, daher die größere Zahl der verwerteten Beobachtungen. Jedenfalls besteht offenbar kein wesentlicher Unterschied des Geschlechts.

Über das Alter, in dem die Affektion vorkommt, beehrt folgende Tabelle, ich füge in Klammern die Zahlen von Benoist hinzu.

| | | | |
|-----|-------------|----|------|
| Von | 0—10 Jahren | 6 | (6) |
| „ | 11—20 | 3 | (8) |
| „ | 21—30 | 28 | (34) |
| „ | 31—40 | 19 | (29) |

| | | |
|------------------|----|------|
| Von 41—50 Jahren | 15 | (17) |
| „ 51—60 „ | 18 | (22) |
| „ 61—70 „ | 2 | (6) |
| über 70 „ | 2 | (3) |

Die übergroße Mehrzahl der Fälle findet sich demnach in dem Alter von der Pubertät an bis zum Beginn des Senium (68 unter 78 im Alter von 20—60 Jahren). Aber sowohl die Kindheit wie das Greisenalter lässen nicht ganz verschont. Der jüngste Fall, von dem berichtet wird, stammt von Henoch, der bei einem zahnenden Kinde ein der Erythromelalgie sehr ähnliches Krankheitsbild beobachtete; Koppins beobachtete Erscheinungen, die er der Erythromelalgie zuschrieb, bei einem 1½-jährigen Kinde.

Über Fälle bei Kindern berichten auch Städtler und Serio; Baginsky sah einen der Schilderung nach typischen Fall bei einem 10-jährigen Knaben, Heimann einen solchen bei einem 13-jährigen, Graves bei einem 16-jährigen Mädchen. Den ältesten von Erythromelalgie befallenen Patienten beobachtete ebenfalls Graves, eine 82-jährige Frau. Woodnut sah die Affektion bei einem 73-jährigen Manne. In einer Tabelle von Bennist finde ich als ältesten Fall einen von über 91 Jahren genannt; doch ist der Autor nicht angegeben.

Der Beruf und die Lebensstellung sind von keinem wesentlichen Einfluß auf die Entstehung des Leidens, doch kommen zwei Momente immerhin in dieser Beziehung zur Geltung. Wiederholt findet sich in den Anamnesen Erythromelalgiekranker die Angabe, daß das Leiden im Anschluß an Anstrengungen im Beruf entstanden ist, so berichtet Weir-Mitchell von einem Manne, der seine Hand durch Klopfen mit einem kleinen Hammer längere Zeit hindurch sehr angestrengt hatte; die gleiche Veranlassung war in einem Falle Morgans gegeben, beide Male betraf die Erythromelalgie hier die Hände. Noch häufiger kommt als auslösendes Moment eine Überanstrengung der Beine in Betracht, so bei einem Patienten von Grenier, bei Fällen von Weir-Mitchell, bei Lannois, dessen Kranker die ersten Erscheinungen nach anstrengenden Märschen als Soldat empfand, in Morgans zweitem und in Bernhards Fall. Ein Kranker von Sachs und Wiener hatte 10—12 Stunden täglich angestrengt mit der Maschine zu nähen gehabt. Die beiden Autoren behaupten, daß Schneider auffallend oft befallen werden, und schieben das auf die unbequeme, gekrenzte Stellung der Beine dieser Leute.

Von besonderer Bedeutung für das Zustandekommen des Symptomenbildes scheinen aber auch hier, ebenso wie bei der Akroparästhesie gewisse thermische Schädlichkeiten zu sein. Der Einfluß der Kälte, insbesondere der kalten Kälte wird schon von Lannois hervorgehoben. Sturges Kranker war Fischer und gewohnt, mit nackten

Füßen im Meere zu stehen, auch Weir-Mitchells erster Patient war Seemann und als solcher dauernd Kälte und Nässe ausgesetzt. Gerrard berichtet von sechs malayischen Arbeitern, die mit nackten Füßen in sehr wechselnder Temperatur arbeiten mußten und die Erscheinungen der Erythromelalgie darboten. Dehies und Fischers Patientinnen waren Wäscherinnen. Auch Elsners Patientin hatte viel zu waschen, ebenso die von Savill. Thermale Schädlichkeiten wirkten ferner bei Pagets Patienten ein, der sehr viel kalte Bäder und Douchen nahm und täglich seine Füße in eiskaltes Wasser stellte, nebenbei bemerkt, ein gutes Beispiel dafür, daß die Kaltwasserbehandlung sogar auch in ihren Auswüchsen gar nicht so neuen Datums ist, wie meist geglaubt wird. In Mackencios Fall handelt es sich um einen Lokomotivführer, dessen Oberkörper stets sehr heiß war, während die Füße oft genug eiskalt liefen. Ähnliche Verhältnisse lösten der Fall von Auché und Léspinaise, Fall II u. III von Margan, die von Finger, Scheuk, Pezzoli, Pajor Fall I. Ein Kranker Weir-Mitchells hatte vor mehreren Dezennien einen Hitzschlag erlitten und war seitdem immer intolerant gegen kalorische Einflüsse. Bemerkenswert ist auch Wendels Beobachtung: die betreffende Patientin hatte viel mit dem Anzihen von in heiße Karbolsäure getauchten Kleidern zu tun. Es gibt freilich auch genug Fälle von Erythromelalgie, in denen Schädlichkeiten dieser Art nicht vorliegen; so weist Eulenburg darauf hin, daß nur in einem von seinen drei Fällen ähnliche Dinge in Frage kommen. Immerhin glaube ich, daß man diesen Einflüssen eine gewisse Wirkksamkeit nicht absprechen darf.

Auch das häufige Vorkommen von Rheumatismus in der Anamnese der Erythromelalgie-Kranken verdient in diesem Zusammenhang erwähnt zu werden, da nicht zu leugnen ist, daß thermale Einflüsse auch die Entstehung dieses Leidens begünstigen. Prädisponierend wirkten vielleicht in manchen Fällen vorausgegangene schwere Krankheiten, die eine Reduktion des allgemeinen Ernährungszustandes herbeiführten, ohne daß eine engere Beziehung zwischen der vorausgegangenen schweren Krankheit, mag diese nun Typhus oder Dysenterie oder Malaria uvc. gewesen sein, und der Erythromelalgie anzunehmen wäre. In gleicher Weise ist überhaupt jede Unterernährung des Körpers von Einfluß, sei sie nun durch Entlehrungen, durch chronische Krankheiten u. a. bedingt. Es verdient aber hervorgehoben zu werden, daß auch bei einem sehr günstigen Zustande des Allgemeinbefindens Erythromelalgie zur Beobachtung gelangte.

Gifte, seien sie nun organischer oder anorganischer Art, scheinen nichts zur Entstehung der Krankheit beizutragen. Löwen fand ich im ganzen nur sechsmal erwähnt; nur in einem Fall von Personali konnte man an eine direkte Beziehung zwischen dieser und der Erythromelalgie denken, doch ist es sehr zweifelhaft, ob man den Fall als Erythro-

melalgie gölten lassen darf. In einem Fall Luzzatos ist vom Autor ein enger Zusammenhang zwischen der Lues und der Erythromelalgie wohl angenommen, aber nicht sichergestellt worden; in einem späteren von Personali erscheint mir die Diagnose auf Erythromelalgie nicht berechtigt. Alkoholismus findet sich in der Anamnese nur ganz vereinzelt, niemals lag Bleivergiftung vor, einmal wurde bei einem Metallarbeiter an eine schädliche Wirkung des Kupfers gedacht. Der Kranke von Cavazzini und Braeri war ein starker Rancher.

Einige Male betraf die Affektion Frauen im Klimakterium, einmal (Weir-Mitchell Fall VI) traten acht Tage, nachdem Patientin in einen Fluß gefallen war und die gerade bestehenden Menses aufgehört hatten, die ersten Erscheinungen ein. Im ganzen liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, daß die Störung des Ablaufs der genitalen Funktionen, insbesondere Gravidität, Puerperium, Menstruationsanomalien, Klimakterium in irgendeiner Weise vorbereitend auf das Erscheinen der Erythromelalgie wirken; es mag dies besonders im Hinblick darauf hervorgehoben werden, daß wir bei den Akroparaesthesien in dieser Beziehung ein anderes Verhältnis fanden. Schädlich fand sich noch in einigen Fällen ein lokales Trauma (Prentiss, Weir-Mitchell, Lewin-Benda, eigene Beobachtung). In Luzzatos Fall hatten wiederholte Frakturen den später affizierten Teil getroffen. Wir werden auf diese Fälle, die im ganzen eine Sonderstellung einnehmen, später noch zurückkommen haben.

Symptomatologie.

Das Wort Erythromelalgie bezeichnet gut die hauptsächlichsten Merkmale der Affektion „Schmerzhaftigkeit und Rote an den Gliedern“. Das beherrschende und bisweilen im Beginn zunächst einzige Symptom ist der Schmerz und zwar ein Schmerz von ganz besonderer Art, ein brennender, stechender Schmerz, von einer oft überwältigenden, enormen Intensität, als ob lebendes Feuer in der Haut wäre, wie es von einem Kranken geschildert wird. Ein anderer Kranker vergleicht ihn dem von einem starken galvanischen Strom herorgebrachten Gefühl (Collier), eine meiner Patientinnen schildert das Gefühl in ihren Füßen so, als ob sie lange Zeit auf Eis gestanden hätte und dann in eine wärmere Umgebung komme. Die Schmerzen setzen bisweilen von vorn herein mit voller Heftigkeit ein, oder sie entwickeln sich erst langsam zu voller Höhe; dann sind es im Anfang oft mehr unangenehme Sensationen, über die die Kranken zu klagen haben; keine eigentlichen Schmerzen, sondern mehr ein Kriebeln, ein Eingeschlafen-sein, ein taubes Gefühl, allmählich erst entwickelt sich daraus der Schmerz zu einer immer steigenden Intensität, bis schließlich die Kranken durch ihn aufs unerträglichste gequält und gemartert werden,

schlaflos werden und in ihrer Verzweiflung nicht wissen, wo aus noch ein. Diese höchsten Grade werden zwar nicht in jedem Falle erreicht, aber es unterliegt nach der Schilderung zahlreicher Autoren keinem Zweifel, daß die Erythromelalgie zu den allerschmerzhaftesten Affektionen zu rechnen ist, die überhaupt vorkommen. Es ist, als ob kochendes Öl durch die Adern ließe, klagt ein Patient von Benoit. In Garrard's Fällen waren die Schmerzen so intensiv, daß sich wiederholentlich Narkosen als nötig erwiesen. Der Schmerz hat im allgemeinen einen intermittierenden Charakter, insbesondere im Beginn der Affektion, während er später oft genug dauernd wird, aber auch dann noch mit gelegentlichen Exazerbationen einhergeht. In den meisten Fällen wird er durch drei Momente gesteigert, durch Herabhängenlassen des schmerzenden Gliedes, durch Wärme und durch Anstrengung. Eine Horizontallagerung der affizierten Teile, unter Vermöbung irgendwelcher Bewegungen ist wohl ausnahmslos schmerzlindernd, dasselbe gilt in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch für die Applikation der Kälte. Dadurch ist es bedingt, daß im Winter der Zustand der Kranken oft ein leidlicher ist. Aber es werden doch auch Ausnahmen berichtet. Bernhardt erzählt von seinem Kranken, daß er Kälte schlecht vertrug, ebenso war es in Eulenburg's drittem und in Fingers allerdings diagnostisch recht zweifelhaftem Fall, auch Prentiss berichtet ausdrücklich in seiner ersten Beobachtung, daß zwar Hochhalten des betroffenen Armes Erleichterung bringe, aber nicht Kälte. Hamilton erwähnt in seinem Fall, der aber auch sonst atypische Züge aufweist, daß Hitze die Beschwerden lindere, und in Weber's Fall wirkten Hitze und Kälte gleich ungünstig. Cavazzini und Bracci berichten, daß anfangs Applikation von Kälte die Beschwerden steigerte, später wirkte sie sicher lindernd.

Ehe wir uns mit der Verberitung des Schmerzes über die einzelnen Körpergebiete beschäftigen, wollen wir des zweiten charakteristischen Symptoms der Erythromelalgie gedenken, der Röte und Schwellung. Die Röte tritt, was schon die ersten Beschreiber des Symptomenbildes Weir-Mitchell und Lannois hervorheben, oft nicht gleichzeitig mit dem Schmerz, sondern erst einige Zeit nach seinem Erscheinen auf. So war es in Weir-Mitchell's erstem Fall, der einen 40jährigen Seemann betraf; dieser empfand zunächst dumpfe, tiefsitzende Schmerzen im linken, dann im rechten Fuß, und erst nach drei Monaten kam gelegentlich im Anschluß an Anstrengungen Röte und Anschwellung dazu. Noch deutlicher wird das Vorgehen des Schmerzes in folgender Beobachtung Weir-Mitchell's:

16 jähriger Mann. Juni 1871 zwei verstopfte brennende Schmerzen an beiden großen Zehen, im Anschluß an erhebliche Anstrengung; in der Folge keine Schmerzen, keine Veränderung im Aussehen der Teile. Nach sechs Wochen Heilung. Februar 1876 wieder nach Anstrengungen zwei Schmerzen in beiden großen Zehen, besonders

rechts, allmähliche Ausbreitung des Schmerzes auf die *Manu pedis*. Descomptiadlichkeit dieser Teile. Im Dezember desselben Jahres Steigerung der Schmerzen; jetzt zum erstenmal bemerkte der Kranke eine Rote des rechten Fußes, eine Anschwellung seiner Venen.

Die weitere Entwicklung des Falles interessiert uns hier nicht. — Auch in Woodnatts Fall folgte die Rötung erst nach einigen Wochen dem Auftreten der Schmerzen. Sechs bis acht Wochen betrug in Morgans zweitem Fall die Zwischenzeit zwischen dem ersten Auftreten der Schmerzen und der Rote. Ähnlich war es in Senators Beobachtung, in einem Fall von Lewin-Benda usw. Demgegenüber darf aber auch nicht übersehen werden, daß gar nicht selten Rote, Schwellung und Schmerz doch gleichzeitig miteinander auftreten. Als prägnantes Beispiel sei hierzu ein Fall von Eulenburg zitiert, wo bei einer 28jährigen, aus neuropathischer, zu Muskelatrophien disponierter Familie stammenden Dame nach einer schweren Entbindung plötzlich bei Nacht äußerst heftige Schmerzen in beiden Händen und damit gleichzeitig Rote und Hitze der Hände auftraten. Sehr prägnant wird das gleichzeitige Auftreten der Rote, Schwellung und Schmerzen auch von Pezzoli geschildert. Noch zahlreiche weitere Fälle weisen dasselbe Verhältnis auf. Es ist wichtig, von vornherein daran festzuhalten, daß eine bestimmte Abhängigkeit der beiden Symptomgruppen in dem Sinne etwa, daß die Rote irgendwie als ein in direkter Abhängigkeit von den Schmerzen stehendes Symptom aufzufassen wäre, in den klinischen Tatsachen keine Stütze findet. Sehr deutlich zeigt Auché et Lespinasses Fall, daß auch einmal die Rote das primäre und die Schmerzhaftigkeit das sekundäre Symptom sein kann. Die beiden Autoren konnten beobachten, wie z. B. bei Herabhängengelassen des affizierten Gliedes zunächst einmal eine immer tiefer werdende Rote zugleich mit Hitzegefühl und auch objektiver Erhöhung der Hauttemperatur sich einstellte, und wie allmählich aus dem Hitzegefühl ein schmerzhaftes Brennen wurde.

Die Rote ist, in den klassischen Fällen wenigstens und im Beginn der Affektion die der aktiven Hyperämie, eine Kongestionsröte. Die Farbe der betroffenen Teile ist hell- bis purpurrot, verbunden mit einer Turgeszenz der Haut, mit Klopfen und Pulsieren der Arterien, und mit Venenerweiterung. Nach Weir-Mitchells Schilderung wird jedoch die anfänglich aktive Hyperämie allmählich eine passive, die Arterien hören auf zu schlagen, die hellrote Farbe geht allmählich in eine blaßschrote und violette über, und es finden sich deutliche Zeichen einer mangelhaften Oxydation des Blutes. Diese allmähliche Farbenveränderung wurde auch von anderen Autoren beobachtet, und ein Übergang vom hellen Rot durch alle Farbtönen des Rot und Blau zu einem lividen Blau und einem deutlich cyanotischen Aussehen der Teile festgestellt. Das beschreiben z. B.

auch Rudzki und Hornowski. Die Hände waren anfangs purpurrot, heiß, äußerst empfindlich. Nach einigen Tagen werden sie blasser, und allmählich entwickelte sich eine bis zu den Knien bzw. Ellbogen reichende Cyanose, die zwischen bläulich- und dunkelschwarzblauer Färbung variierte. Besonders deutlich war das in Gerhardts Fall zu sehen, den auch Eulenburg später untersuchte.

44-jährige Schneiderin. Schwächliche Konstitution. Früher Herzklopfen, Ohnmachten, unregelmäßige Menstruationen. Ganz plötzlich überwältigende Schmerzen in Händen und Füßen, zugleich damit zufällige, glühend heiße Rote an Fingern und Zehen. Berührungen äußerst unangenehm. Steigerung der Erscheinungen nach einem elektrischen Handbade. Zeitweise sind auch jetzt schon die betroffenen Teile bläulich kalt, mit einzelnen roten Flecken. Die Schmerzen ließen später nach, die Hände wurden livide und kalt; an den Fingern besteht Glassehen. Haut derselben glatt, rot, spärlich, mäßig schmerzhaft, mit einzelnen blauen Flecken. Gefühl von Kriebeln und Kugelschlägen, Hände im ganzen etwas vergrößert, Sensibilität wenig verändert, nur Kältegefühl herabgesetzt. An den Füßen Haut bläulich, trocken, Kälte und Schmerzempfindung deutlich herabgesetzt, letztere noch etwas verlängert. Neben den lokalen Symptomen bestanden die einer progressiven cerebralen Erkrankung mit konjugierten und apoplektischen Anfällen, Tauselzittern, heftiger Kopfschmerz mit Erbrechen, Verwirrtheit, Fehlbildung, Remittenz hämorrh. Der Tod erfolgte im apoplektischen Insult.

In Hamiltons Fall bildete sich bei längerem Stehen sogar eine Bläse der betreffenden Teile heraus.

Die Rötung ist meist eine diffuse, dabei oft gegen die Umgebung scharf abgegrenzte, bisweilen wird die dunkelrote Färbung der Haut von helleren Flecken unterbrochen. Auf Druck verschwindet die Rote momentan, um aber sehr bald wieder zurückzukehren. Sie beschränkt sich im allgemeinen auf die Teile, in denen auch die Schmerzen vorhanden sind, daher meist also auf die Extremitätenenden. Zur Rötung gesellt sich oft eine Schwellung der Haut, die sowie die Rote selbst vorübergehend ist und zum Teil durch die stärkere Blutfülle der Gefäße bedingt wird. Die Gefäße, namentlich die Venen, treten deutlicher hervor, die letzteren sind als dicke, dunkelblaue Stränge sicht- und fühlbar. Die Arterien pulsieren lebhafter als in der Norm. Zur Rote und Schwellung kommt meist noch eine Erhöhung der Hauttemperatur hinzu, die erkrankten Teile fühlen sich heiß an; einige Male hat man auch thermometrisch eine Erhöhung der Temperatur festgestellt. Stange beobachtete einen Fall, bei dem am Fuße außerhalb der Anfälle die Temperatur 24°C betrug; sie erhob sich in den Anfällen bis auf $32,7^{\circ}$, ja auf $34,4^{\circ}\text{C}$. Lannois nahm bei seinem Kranken zahlreiche Messungen vor, sowohl in horizontaler als aufrechter Stellung des Kranken, sowohl in der Ruhe, als nach Bewegung, wenn die erkrankten Teile bedeckt oder frei lagen, und er fand stets eine sehr bemerkbare Differenz gegenüber dem gesunden Fuß. Im Durchschnitt war die Temperatur an diesem um $2-3^{\circ}$ niedriger. Einmal betrug die Differenz sogar $4,7^{\circ}$. In einem bezüglich der Diagnose

allerdings zweifelhaften Falle Lombrosos maß dieser in der Achselhöhle der kranken Seite 38,1, in der der gesunden 37,4°. Personali fand eine Differenz von 1–2° zugunsten der kranken Seite, Lannois et Porat von 1,5–1,8°. Collier hat wieder ausführlichere Messungen angestellt, er bemerkt, daß umgekehrt wie in der Norm die Oberflächentemperatur zuweilen beim Herabhängenlassen des kranken Gliedes steigt und beim Heben sinkt. Er fand z. B. die Temperatur der erkrankten Füße in einem seiner Fälle beim Hochhalten rechts 94,8° F, links 94,6°, beim Herabhängenlassen 96° und 95,8°. In einem zweiten Falle an den erkrankten Händen, wenn der Kranke sie über den Kopf hielt, 89,5°, wenn er sie sinken ließ, 92,5°. Rosen fand die Temperatur der erkrankten Teile um 3°–3,5° C höher als die der gesunden. Es ergeben sich also, wie man sieht, sehr erhebliche und bemerkenswerte Abweichungen von dem normalen Verhalten. In den späteren Stadien findet sich entsprechend dem Eintritt der lividen Färbung und der Cyanose an Stelle der Erhöhung eine Herabsetzung der Temperatur der erkrankten Teile.

Der bisherigen Schilderung können wir bereits entnehmen, daß Schmerz, Röte, Schwellung und Hitze bei der Erythromelalgie für gewöhnlich nicht dauernd vorhanden sind, sondern anfallsweise auftreten. Die Anfälle können, wie erwähnt, durch eine Reihe von Ursachen hervorgerufen werden: durch Wärme, durch Senken des erkrankten Teiles und durch Bewegungen. Das sind wohl die Hauptmomente, aber es gibt doch auch noch andere, und andererseits sind die erst-erwähnten zur Produktion eines Anfalles nicht immer nötig, da solche Anfälle auch ganz spontan auftreten können. Weir-Mitchell bemerkt in seiner letzten Arbeit, daß die reinen Fälle vorzugsweise bei jüngeren Leuten vorzukommen pflegen, während ältere Leute vielfache Abweichungen zeigen. In diesen reinen, frischen Fällen bestehen in der Ruhe resp. bei horizontaler Lagerung des erkrankten Gliedes keine Störungen, aber sofort kommen diese zum Vorschein, wenn das Glied herabhängt; dann pulsieren die Arterien, die Temperatur geht in die Höhe und die Röte wird intensiv. In alten Fällen und bei alten Leuten dagegen gehorcht die Temperatur mehr den normalen Gesetzen und fällt, wenn der Fuß herunterhängt, und die Röte und der Schmerz fehlen auch in der Ruhe nicht ganz. In einem Falle – den ich sah, war es ein außerordentlich frappierender Anblick, wie fast noch in derselben Sekunde, in der die Kranke ihr Bein aus der horizontalen Lage in die senkrechte brachte, zuerst die Zehen tief dunkelrot sich färbten und allmählich diese Verfärbung in abnehmender Stärke bis zur Mitte der Wade sich ausbreitete. Zu gleicher Zeit nahm auch die Temperatur zu, die Schmerzen stellten sich ein, und die Venen schwellen an. Unmittelbar nachdem das Bein wieder in die horizontale Lage zurückgebracht war, verschwanden bis auf einen geringen Rest alle subjektiven und

objektiven krankhaften Erscheinungen. Die Anfälle können aber von viel längerer Dauer sein, besonders, wenn sie spontan auftreten; meist dauern sie mehrere Stunden. *Cristiani* hat solche von mehrwöchentlicher Dauer beobachtet.

Im vorhergehenden habe ich bei der Schilderung des Krankheitsbildes bisher absichtlich unterlassen, auf den Sitz der krankhaften Erscheinungen näher einzugehen. Das müssen wir jetzt nachholen.

In *Weir-Mitchells* erster Beschreibung heißt es, daß das Leiden gewöhnlich mit Schmerzen in den Füßen beginnt, im Fußballen oder an der großen Zehe, oder an den Hacken und von da aus auf die Fußsohlen übergreift; bisweilen gehen die Schmerzen auch auf die Unterschenkel und den Fußrücken über. Auch die späteren Beobachtungen haben ergeben, daß in der Tat die Füße der Lieblingsitz der Erythromelalgie sind. Ich fand als Sitz der Schmerzen angegeben: beide Füße 24 mal, einen Fuß 9 mal, beide Hände 13 mal, eine Hand 4 mal, alle vier Extremitäten 17 mal, einen hemiplegischen Typus 3 mal; in je einem Fall waren linke Hand und beide Füße, linke Hand und rechter Fuß und rechte Hand und rechtes Ohr betroffen. *Lévi* berichtet kurz über einen Kranken, der erythromelalgische Symptome an einem Ohrfläppchen zeigte, in *Cavazzinis* und *Braceis* Fall war erst rechter Fuß, dann linker, dann die linke Hand, dann die rechte, schließlich auch die Nasenspitze Sitz der Erscheinungen. Daraus ergibt sich in der Tat wohl ein Übergewicht der Füße, doch ist es, wie man sieht, kein so sehr erhebliches. Ganz außer Berechnung habe ich diejenigen Fälle bei dieser Zusammenstellung gelassen, bei denen die Schmerzen ausschließlich oder wesentlich im Gebiet eines oder mehrerer bestimmter Nerven sich ausbreiteten; es sind dies im ganzen 14 Fälle, dazu kommt noch der eine der von mir selbst beobachteten Fälle.

An den Füßen sind es bald die Zehen, bald die Fußballen, bald die Hacken, die vornehmlich im Beginn der Sitz der Schmerzen sind; im weiteren Verlauf dehnen diese sich oft genug auch auf die Unterschenkel aus und reichen bis zu den Knien. An den Händen sind fast immer die Finger zuerst betroffen, und erst im weiteren Verlauf kommen Hände und Unterarme an die Reihe. An den oberen und unteren Extremitäten sind die Palmarseiten die vom Schmerz bevorzugten.

Dort, wo die Schmerzen an mehr als einer Extremität auftreten, beobachtet man fast regelmäßig, daß immer ein Glied nach dem anderen befallen wird, z. B. erst der eine Fuß, dann der andere, dann die Hände oder in ähnlicher Weise in mannigfachen Kombinationen. Dabei können sich Zwischenräume von erheblicher Dauer zwischen dem Auftreten der Krankheitserscheinungen in den verschiedenen Gliedern einstellen, und es kann Jahre dauern, ehe der Schmerz seine ertlich größte Ausdehnung erreicht hat. Auch dort aber, wo dies der Fall ist,

pflegen für gewöhnlich noch Intensitätsunterschiede zu bestehen, indem meist, wenn auch nicht immer, das zuerst befallene Glied dauernd der Sitz der heftigsten Schmerzen bleibt. Anders war es z. B. in einer Beobachtung Weir-Mitchells und Spillers, wo zuerst die vierte und fünfte Zehe, dann die zweite und dritte betroffen waren und schließlich erst die große Zehe an die Reihe kam. Hier aber setzte sich die Krankheit fest, während die übrigen Zehen zum Normalzustand zurückkehrten.

In bezug auf die Ausdehnung der Röte genügt es, wenn wir sagen, daß sie im allgemeinen ungefähr dasselbe, meist nur etwas beschränktere Gebiet okkupiert wie die Schmerzen. Wir erwähnten schon, daß ihre Grenzen bisweilen recht scharf sind, während andererseits der Übergang auch ein allmählicher sein kann. Nur vereinzelt wird hervorgehoben — ich erwähne die Fälle von Senator, von Collier — daß die Verteilung der Röte eine exakt symmetrische ist, sonst machen sich in dieser Beziehung allenthalben Unregelmäßigkeiten und Intensitätsschwankungen geltend. Jedenfalls ist, wie aus den oben angegebenen Zahlen hervorgeht, auch ein einseitiges Auftreten der Erythromelalgie durchaus keine Seltenheit. Dagegen sind nur selten andere Teile als die Akra der Sitz der Schmerzen und der Rötung. Senators Kranker hatte vasomotorisch-sensible Reizsymptome an beiden Ellbogen und am linken Knie, Eulenburgs Kranker am linken Ellbogen, in dem atypischen Fall von Schütz-Lassar (Kombination mit Atrophia cutis propria) war Rötung und Schwellung am ausgesprochensten am linken Ellenbogen und am unteren Drittel des linken Unterarmes. Hierher gehört ein Fall von Woodnat.

35-jähriger Mann, stets gesund, Schmerzen zuerst in der linken zweiten Zehe, nach einem Jahre auf die dritte und dann selbst auf die Mehrzahl aller Zehen sich ausdehnend. Schmerz brennend, stechend, sehr intensiv. Nach einigen Wochen rotlich-violette Verfärbung der Haut in ausgeprägten, ergüßförmigen und bei Druck verschwindenden Flecken an den schmerzenden Stellen, links deutlicher wie rechts. Schließlich entstandenen ähnliche ergüßförmige Flecken auf dem linken Unterschenkel und in der Mitte des Rückens. Außerdem brennende Schmerzen und Herabsetzung der Sensibilität am linken Bein.

Ähnliches beschreiben Lewin-Benda.

37-jährige Frau. Lues sehr wahrscheinlich. Augenentzündungen, unter Jodkaligebrauch verschwindend. Vor $\frac{1}{2}$ Jahr rote schmerzhafte Stellen am Hinterhaupt und Nacken, dann Rote, Hitze und Schmerzen am rechten äußeren Fußrand, heftige, mitternächtige Schmerzen ohne Rote auf der Streckseite des rechten Vorderarms. Dann subjektive und objektive Erscheinungen eines schweren cerebralen Leidens (Abnormenurien, Papillenatrophie, Gedächtnisschwäche usw.). Die Schmerzen am Fuß verschwinden, er wird kühl, Mädel rot gespannt, in beiden Seiten des Hinterhauptes breitet eine fleckige, schmerzhaft Rote fort, die aber auch allmählich schwindet.

In dem folgenden von Götze mitgeteilten Falle ist die Lokalisation auch eine vollkommen atypische, indem die Akra ganz frei

bleiben, andererseits der Prozeß sich nicht auf das Gebiet eines Nerven beschränkt. Der Fall bietet auch sonst eine Reihe interessanter Züge, so daß ich ihn hier etwas ausführlicher mitteile.

Eine 55 jährige Dame klagte, daß sie seit ungefähr 4 Jahren an eigenständlichen Anfällen im rechten Vorderarm leide. Schon einige Tage vor Ausbruch derselben empfand sie große Müdigkeit, Müdigkeit und starkes Unbehagen, so daß sie sich nur mit Mühe aufrecht erhalten könne und sich zeitig abends zu Bett legen müsse. Am zweiten oder dritten Tage begänne ein schmerzhaftes Drücken im rechten Vorderarm, eine Stelle von der Größe eines Talers ungefähr in der Mitte der Volarfläche, röte sich, schwellte an und werde heiß, in dem Centrum sei die Färbung etwas geringer, am Rande intensiver, am dann allmählich ablassend in normale Hautfarbe überzugehen. Die Schmerzen werden immer intensiver, ziehen sich durch den ganzen Arm von der Hand bis zur Achselhöhle. Ein Gefühl von großer Müdigkeit und Schmerz befälle den Arm. Plötzlich trete ein Gefühl ein, als ob in der Tiefe etwas springe und sich ergieße, dann fühle sie sofort eine große Erleichterung. Die bis dahin rötliche Stelle verfärbt sich, die Mitte werde bläulich und die Randpartie nehme ein milchfarbig bräunliches Aussehen an. Diese Verfärbung verschwinde allmählich; dann trete die Zeit der Ruhe ein. Immer wieder an der fraglichen Stelle ein neues Gefühl, während des Anfalls bringe horizontale Lage des Armes Erleichterung, Herabsinkenlassen bewirke Verschlimmerung. Anfangs seien die Anfälle in großen Zwischenräumen aufgetreten, dann häufiger und in der letzten Zeit in Zwischenräumen von 10 Tagen bis zu 4 Wochen. Pat. hat früher an einer schweren Supraorbitalneuralgie gelitten, welche nach der Resektion des Nerven heilte. Später traten ausgesprochen hysterische Zustände auf, die aber mit langen Jahren sich nicht mehr bemerkbar machten. Die Menstruation ist schon lange vor dem Einsetzen der Anfälle weggeblieben. Sie schwante immer leicht, doch niemals am rechten Arm leichter als am linken, wohl aber schloßen an jenen die Finger bei jeder Gelegenheit ein, was in diesem nie beobachtet wurde. Eine Ursache der Anfälle weiß Pat. nicht anzugeben. Kälte und Hitze spielen jedenfalls keine Rolle. Es bestehen keine Zeichen auffälliger Nervosität, niemals heftige Infektion, kein Trauma. Die Beobachtung ergibt: Am 8. Februar 1911 zeigen sich die Vorboten: Müdigkeit und Unbehagen, am 10. Februar heftige drückende Schmerzen im rechten Arm von der Hand zur Achselhöhle ziehend, horizontale Lagerung und Unterstützung des Ellbogens bessern die Schmerzen. Herabsinkenlassen des Armes verschlimmert sie. Auf der Volarseite des Unterarmes auf der Höhe des M. pronator supinator longus erscheint ein etwa 10 cm langer, 4 cm breiter roter Fleck, der sich heiß anfühlt und sehr empfindlich ist. Die Rötung ist am stärksten ausgesprochen in den Randpartien. Die Gegend des Supinator erscheint geschwellen. Eine besondere Ausdehnung der Venen ist nicht zu konstatieren, der Puls der Arteria cubitalis ist beiderseits gleich. In der Nacht zum 11. tritt plötzlich eine Besserung ein, die Schmerzen lassen nach, aber die betroffene Partie sowie der ganze Muskel ist noch sehr empfindlich. Die Färbung aber ist eine andere geworden, die Randzone ist milchfarbig, während ungefähr in der Mitte einige deutliche bläuliche Flecke sichtbar sind. Diese Partie ist hypästhetisch, die Randpartien dagegen sind hyperästhetisch. Der Druck auf die Gegend des *Serrus medius* an der Ellenbogen- und am Handgelenk ist sehr schmerzhaft ebenso auch der auf den Radius, während der Ulnar nicht druckempfindlich ist. Die vasomotorischen Erscheinungen und die Drucklocherneigungkeit halten noch einige Tage an. Schließlich besteht nur noch ein rotes Gefühl an der betroffenen Stelle. Schon am 18. Februar beginnt ein neuer Anfall, der in derselben Weise abläuft. Bis zum 21. April wiederholen sich derartige Anfälle noch öfters.

Neben der abnormen Lokalisation ist hier das Auftreten einer

hypästhetischen Stelle, die auch in den späteren Anfällen regelmäßig gefunden wird, bemerkenswert. Außerdem die ausgesprochene Druckschmerzhaftigkeit nicht nur der Nerven, sondern auch der unterhalb der affizierten Stelle liegenden Muskellänge, namentlich des *Musculus supinator longus*. Im übrigen ist das Bild aber doch recht charakteristisch: anfallsweise auftretende Schmerzen und Rötung in Verbindung mit Hitze und Schwellung, so daß an der Zugehörigkeit des Falles zur Erythromelalgie nicht gezweifelt werden kann.

Eine ungewöhnliche Lokalisation finden wir schließlich noch in Lombroso's und Ottolenghi's Fall.

44-jährige Puella publica. Seit vier Jahren Schwindel, Kopfschmerz, seit drei Jahren Beräuhungen, seit zwei Jahren hysterisch-epileptische Anfälle. Vor einigen Zeit Rote der Palmfläche des rechten Hand, als ob diese in eine Farblosigkeit getaucht wäre, Erhöhung der Temperatur, heftige Schmerzen in dem gestrichelten Teil. Außerdem rotes Obe gerötet und schmerzhaft. In der Folge häufiger solche Anfälle, stets mit rechtsseitigem Kopfschmerz, außerdem Miosis rechts, einmal im Anfall Hitzegläuberei, stets spärliche Darms.

Ob man in diesem Fall überhaupt von Erythromelalgie sprechen darf, ist recht zweifelhaft; die vasomotorischen Erscheinungen und die Miosis sprechen deutlich für eine Sympathicuslähmung, zu der freilich die Schmerzen nicht passen, für die letzteren könnte man aber an eine psychogene Entstehung denken.

Weir-Mitchell erwähnt nur kurz, daß er Fälle von „red neuralgia“ gesehen hat, in denen die Störung an irgendeiner Stelle der Oberfläche des Körpers in isolierten Flecken auftrat, und äußert den Verdacht, daß ähnliche Erscheinungen auch an Muskeln und Eingeweiden eintreten könnten. Ich erinnere in dieser Hinsicht an den eben mitgeteilten Fall von Götte. Dehio berichtet, daß an der Gesichtshaut seiner Patientin ähnliche Flecken bestanden, wie am linken Arm und Fuß. Auch el Lospinaesse erwähnt, daß bei den Anfällen Gesicht, Augen und Hoden kongestioniert sind; das sind aber offensichtlich nur Erscheinungen allgemeiner vasomotorischer Labilität. Coiffier erzählt von einer Kranken mit multipler Sklerose, bei der anfallsweise im Nacken Rote und Hitze, aber kein eigentlicher Schmerz auftrat. Auch ich habe gelegentlich sehr ausgesprochene derartige Erscheinungen gerade bei der multiplen Sklerose zu sehen bekommen. Auch hier darf man wohl nicht von Erythromelalgie sprechen. Im ganzen zeigt es sich also, daß tatsächlich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Akra der Sitz der erythromelalgischen Symptome sind. Nur einmal war, darauf sei nochmals ausdrücklich hingewiesen, die Nasenspitze der Sitz der Beschwerden, und nur einmal war ein Ohr befallen; das steht in einem gewissen Gegensatz zu dem, was wir später bei der Raynaud'schen Krankheit finden werden.

Zu den regelmäßigen Symptomen der Erythromelalgie gehört

schließlich noch eine gesteigerte Empfindlichkeit der betroffenen Teile, insbesondere für Berührungen. Die Kranken können keinerlei Druck an den affizierten Stellen vertragen, schon der Druck der Bettdecke wird ihnen lästig und schmerzhaft, sie vermögen es nicht, Strümpfe und Stiefel zu tragen, noch mehr Pein macht ihnen das Gehen, und wenn es überhaupt möglich ist, gehen sie behutsam, leise auftretend, dort, wo nur gewisse Teile der Füße betroffen sind, diese von jedem Druck entlastend. Das Gehen ist darum noch besonders schmerzhaft, weil ja fast regelmäßig allein schon das Herabhängenlassen der Glieder die Beschwerden, Schmerzen sowohl wie Rötung und Schwellung zu steigern geeignet ist.

Ein Blick auf die Kasuistik lehrt uns aber, daß Fälle, in denen sich nichts weiter findet als anfallsweise an den Extremitätenenden auftretende neuralgiforme Schmerzen mit kongestiver Rötung und Schwellung, ohne sonstige Symptome einer Erkrankung des Nervensystems oder anderer Körperorgane und -Systeme, nur sehr selten zur Beobachtung kommen. Einen solchen fast reinen Fall beschreibt Bernhardt:

50jährige Frau. Im Alter von 20 Jahren Typhus, vor drei Jahren Herpes zoster des unteren Brustgürtels, Menopause. Schon seit fünf Jahren Rötung und Schwellung der Hände wie jetzt. Räte an der Volarseite stärker als an Dorsum. Sehr bedeutende, dem Schülz raubende Schmerzen, die durch den ganzen Arm bis zum Puls hinauf ausstrahlen. Kälte wird schlecht vertragen, Gefühl, als ob die Finger immer gepöbbert wären. Objektive keine Störung der Sensibilität, ebensowenig der Motilität. Früher bestanden auch Schmerzen, Schwellung und Rötung an den Füßen, an denen nach langem, angestrengtem Stehen die Affektion überhaupt begonnen hatte. Erst später kamen die Hände an die Reihe und die Füße besserten sich.

Die Art der die Erythromelalgie in diesem engeren Sinne begleitenden Symptome ist nun sehr verschieden. Wir können zunächst lokale und allgemeine Symptome unterscheiden. Dabei verstehen wir unter lokalen Symptomen diejenigen, die sich auf die Abschnitte beschränken, in denen auch die erythromelalgischen Symptome sich finden; sie zerfallen wieder in

- a) sekretorische Störungen,
- b) trophische Störungen,
- c) Sensibilitätsstörungen, insbesondere Anästhesien, Druckempfindlichkeit bestimmter Nervenstämme,
- d) motorische Störungen.

Schließlich sollen daran anschließend die Fälle behandelt werden, in denen die vasomotorischen Erscheinungen ein von dem bisher geschilderten typischen Verhalten abweichendes zeigen.

Störungen der Schweißsekretion und zwar regelmäßig in Form der Hyperhidrosis finden sich in einer ganz erheblichen Anzahl

von Fällen angegeben. Collier betont allgemein, daß er lokales Schwitzen oft beobachtet hat. In einzelnen wenigen Beobachtungen ist demgegenüber darauf aufmerksam gemacht, daß die Schweißsekretion sich normal verhielt, während man in der Mehrzahl der Fälle auf deren normales Verhalten nur aus dem Fehlen irgendwelcher Angaben über Störungen der Funktion schließen kann. Die Schweißsekretion betrifft insbesondere die Innenfläche der Hände und Füße, meist in derselben Ausdehnung wie die Schmerzen und die Rötung; mehrmals wird ausdrücklich betont, daß die Hyperhidrosis sich in plötzlichen Schweißausbrüchen manifestierte (Weir-Mitchell Fall 4, Eulenburg Fall 3 u. a.), die mit den Schmerzfällen koinzidierten; vereinzelt finde ich die Angabe, daß an den affizierten Partien dauernd eine stärkere Neigung zur Schweißbildung bestand (Dehio). In einem Falle Henochs, in dem ein halbes Jahr nach einer Hemiplegie in den gelähmten Teilen Symptome von Erythromelalgie eintraten, ging diesen eine starke Schweißneigung voraus.

Von größerer Wichtigkeit und von größerem Interesse in bezug auf die Auffassung des Symptomenbildes sind die trophischen Störungen. Die früheren Beschreiber des Krankheitsbildes, insbesondere auch Lannois, legten großen Wert darauf, zu konstatieren, daß trophische Störungen in der Regel fehlen. Bereits Graves, der, wie oben erwähnt, den ersten zur Erythromelalgie gerechneten Fall berichtete, macht auf das Fehlen trophischer Veränderungen aufmerksam:

16-jähriges Mädchen, Schwäche nach Diarrhöen. Anfälle von Hitze und Stechen, Röt, Druckschmerzhaftigkeit in der Planta pedis, Schwellung, Frostgefühl des Gefäße; anfallsweise in der Dauer von neun Stunden. Beim Nachlaß des Anfalls Blässe der Haut, Leichenkälte derselben. Absonderliche Steigerung des Schmerzes, nach drei Monaten Neigung zu Herabklappen und Palationen in den Unterschenkeln. Nach drei Jahren, in denen die Anfälle immer wieder auftraten, waren keinerlei Veränderungen in dem Ernährungsstand der Gewebe zu bemerken.

Der Fall ist auch wegen der abweichenden vasomotorischen Erscheinungen (unter dem Bilde der Syncope locale) recht bemerkenswert.

In Pagets Fall dauerten die vasomotorischen Erscheinungen acht Jahr lang, und dennoch war keinerlei trophische Veränderung vorhanden. Ebenso war es in den ersten Fällen Weir-Mitchells und in dem sehr schweren Fall von Lannois. Lannois hebt dies Moment besonders hervor, „c'est l'absence de toute altération de nutrition de tissus, que l'on observe dans un très grand nombre de cas et qui était de plus manifestes chez notre malade. Pendant des mois, pendant des années d'une façon continue ou intermittente les parties affectées sont soumises à une congestion fluxionnaire parfois assez intense pour être regardée comme de l'inflammation par un obser-

valeur non prévus et cependant rien dans les organes ou dans les éléments anatomiques ne vient traduire les troubles nerveux et vasculaires."

Die späteren Beobachtungen lehren uns aber, daß nicht selten sich zu den vasomotorischen und sensiblen Erscheinungen auch „trophische“ gesellen, wobei wir vorläufig naturgemäß über das Verhältnis dieser Symptomgruppen untereinander nichts aussagen können. Die älteste derartige Beobachtung stammt von Grenier (1873), ist also auch Lannus schon bekannt, und er bezeichnet sie auch gerade wegen dieser trophischen Störungen „comme une forme très irrégulière de la maladie."

Im ganzen fand ich aber in nicht weniger als 26 Fällen, also etwa in etwas weniger als einem Drittel der Gesamtzahl, trophische Veränderungen verschiedenster Art. Besonders zahlreich wurden in letzter Zeit derartige Beobachtungen mitgeteilt, doch scheint es mir nicht zweifelhaft, daß in einigen dieser Fälle die Diagnose „Erythromelalgie" zu Unrecht gestellt wurde.

Beginnen wir mit dem Fall Grenier.

22-jähriger Mann. Vor zwei Jahren Lues. Mitte Oktober 1888 nach Überanstrengung in den Zehen und weniger in den Fingern starke Schmerzen und Anschwellung, Rote und Hitze. Die Untersuchung ergibt, daß die Anschwellung nicht auf einem Ödem, sondern auf einer Verdickung des Unterhautbindegewebes beruht. Die Schmerzen sind unerträglich und nur durch Kälte etwas zu lindern. Abnackte Ausdehnung des Erscheinens und Auftreten schmerzloser Partien mit struppem Inhalt. An einzelnen Stellen violette Verfärbung der Haut. Abnackte Desquamation im Verlauf einiger Monate.

Ganz ähnliche Ernährungsstörungen weist Senators Fall auf; anfangs entstanden hier auf einzelnen roten Stellen knötchenartige Erhebungen von Linsen- bis Erbsengröße, mit der geröteten Haut abhebbar; sie machten den Eindruck kleiner Schleimbeutel oder verdickter Drüsen; sie heilten ab und an anderen Punkten traten neue auf; an einzelnen Stellen findet sich eine Verdickung der Haut, namentlich über dem Ellenbogen.

Senators Fall ist im übrigen durchaus typisch; alle vier Extremitäten waren betroffen.

Eine Verdickung des Bandes der Haut am Nagel ebenso wie auch der Fingerbeeren beschreibt auch Gerhardt. Hann teilt einen Fall mit, bei dem die Störungen, die in typischer Weise entwickelt waren, erst den linken, dann den rechten Fuß betrafen, später die linke, dann die rechte Hand. Die Schmerzen waren zeitweilig enorm, hielten einmal in größter Intensität 14 Tage lang an; es bestand eine Schwellung, der später Desquamation folgte. Diesen Vorgang wird man kaum als Symptom trophischer Störung auffassen dürfen, so daß der Hannsche Fall wohl als reiner Typus gelten muß. Etwas weiter gingen die Ver-

änderungen in einem Fall von Kanoky, hier kam es allerdings erst im Anschluß an eine etwas stärkere Muskelaktion zur Abschälung der Haut über den Däumenballen, die sich mehrfach wiederholte, zum Teil unter Auftreten von Bläschen.

In Lewin-Bondas zweitem Falle (51jähriger Kellner) zeigen sämtliche Zehen mit Ausnahme der zweiten linken und der vierten rechten Zehe, die vollkommen normal sind, außer einer dunklen Rötung und Schmerzhaftigkeit eine Verdickung. Die Schwellung ist keine oedematöse, die Haut fühlt sich vielmehr hart und straff gespannt an. Nach der Anamnese sind Rötung, Schmerzen und Schwellung gleichzeitig entstanden, es verschwanden dann zuerst die Schmerzen, während Rötung und Schwellung erst später nachließen.

Eine teigige Verdickung der Haut und der Finger beschreibt Perzoli. Er hebt besonders hervor, daß demgegenüber die Knochen völlig normal sind; eine Verdickung der Haut und der Unterhaut erwähnen auch Rost, Carlslaw, Rosen. Auch in dem einen von mir beobachteten Falle fanden sich Veränderungen, die man als trophische bezeichnen muß, indem auch hier die Haut in toto etwas gedunsen und verdickt erschien, ohne daß doch eine meßbare Zunahme des Umfanges des erkrankten Beines festzustellen gewesen wäre. Genau untersucht und beschrieben sind derartige Veränderungen in einem von Savill mitgeteilten Falle:

32-jährige Frau. Wie immer nervös; früher Frostdenken. Mit 42 Jahren Klimakterium. Seit einigen Jahren viel laßigstossen. Seit einem Jahr schmerzhafte Rötung und Schwellung beider Hände. Die Symptome traten anfangs besonders in nächtlichen Anfällen auf; allmählich wurde das so schlimm, daß sie nachts die schrecklichsten Schmerzen aushalten mußte und überhaupt nicht mehr wagte, sich zu Bett zu legen. Auch wenn sie tagsüber versuchen wollte, einzuschlafen, traten die Schmerzen ein. Herabhängenlassen der Hände lief nach am Tage Anfälle hervor, und auch Eintreten in heißen oder zu kaltes Wasser. Schwellung und Steifheit der Hand nahmen allmählich zu und waren auch zwischen den Anfällen vorhanden. Die Hände waren dauernd karminrot, kongestioniert, fühlten sich wie teigig an, aber Fingersdruck blieb nicht stehen. Wenn die Hände fünf oder zehn Minuten hoch gehalten wurden, verschwand die Schwellung, die Hände erhielten ihre normale Größe und auch annähernd ihre normale Farbe wieder. Es bestand außerdem ein feiner rhythmischer Tremor. Besserung unter der Behandlung mit konstantem Strom und Strychnin, Belladonna, Bism. nigr.

Der Autor weist nach, daß die Schwellung nicht auf Austritt seröser Flüssigkeit, nicht auf elephantiastischer Veränderung, wie bei Erkrankung des Lymphgefäßapparates beruhen kann, sondern daß sie einfach auf eine vasculäre Turgeszenz zurückzuführen ist, zu der sich häufig ein gewisses Maß von Bindegewebswucherung gesellt hat.

Wiederholt wird berichtet, daß die Finger, insbesondere die Endphalangen kuglig aufgetrieben, die Nägel verdickt und krallenförmig umgebogen seien. (Weir-Mitchell, I. Arbeit, 6. Fall, Stillé, Debie, Seeligmüller, Landgraf — hier handelt es sich allerdings nebenbei

um Myxödem —, Fischer, der auch das Auftreten kleiner linien- großer subcutaner Knötchen beschreibt, ferner Heilmann's erster Fall. Nieden). Brüchigkeit und schwärzliche Verfärbung der Nägel konstatierte Pajor. Auch Auerbach sah Brüchigkeit und starke Längsstreifung der Nägel nebst Verdickung der Zehenhaut. Heller hat die bis dahin bekannt gewordenen Fälle von Erythromelalgie zusammengestellt, soweit bei ihnen Nagelerkrankungen auffielen und folgenden Fall eigener Beobachtung hinzugefügt, den er geneigt ist für Erythromelalgie zu halten, obwohl das Symptom der Rötung des erkrankten Fingers wenig ausgesprochen war.

Der 56 Jahre alte Pat. will sonst niemals ernstlich krank gewesen sein. Keine Heredität. Er ist nervös, aufbrausend, gelegentlich melancholisch, viel Aufregungen. 1896 bekam er Schmerzen in den beiden letzten Gliedern beider Zeigefinger, die bald so heftig wurden, daß er keinen Dienst mehr tun konnte. Die Schmerzen, die wohl früher schon gelegentlich aufgetreten waren, wurden unerträglich. Nachts trat keine Exacerbation auf. Später bemerkte Patient eine Rötung der Nagelphalangen vor allem des linken Nagelwalls. Unter zunehmenden Schmerzen ließen schließlich die Nägel beider Finger ab. Die nachwachsenden waren bes auf Defekte in der Mitte normal. Seit dem Beginn der Erkrankung bis zur Zeit der Beobachtung Hellers Ende 1897 sollen die Nägel vier- bis fünfmal abgefallen sein. Es fanden sich beide Zeigefinger leicht gerötet, das Nagelglied des Zeigefingers vor allem links, spindelförmig aufgetrieben, der Nagelwall etwas geschwollen, die Haut der Fingerbeere völlig intakt, die Nägel vor allem der links zeigten große Defekte. Der Nagel saß am freien Rande dem Bette fest auf. Die Schmerzen wurden als unerträglich angesehen. Die Untersuchung des Nervensystems ergab keine Abnormität. Die Therapie bestand in der intensiven Darreichung von Arsen, der lokalen Anwendung heißer Bäder und der Umwicklung der Finger mit Terpentinpaste. In etwa drei Monaten erfolgte Heilung, die Schmerzen hörten ganz auf, die Nägel wurden völlig normal. Im Krankheitsverlauf wurde einmal das Aufsteigen von Bläschen, die an Psoriasis erinnerten, auf den Nagelwällen und der Haut der Finger beobachtet. Die von dem Kranken vorangegangene Ablösung der Nägel beim Eintritt der Bläschenbildung trat nicht ein.

Heller fügt seinem eigenen Falle, dessen Klassifizierung wohl zweifelhaft ist, einen weiteren von Kletz hinzu, der bei einem 31 jährigen, sonst gesunden Manne die Entwicklung einer bläueroten Schwellung an den Zehen vor fünf Jahren, an den Fingernägeln vor drei Jahren beobachtete. Die an der Basis normalen Nägel waren am freien Rande gelb, verdickt und brüchig. Das Nagelbett war am freien Rande verdickt. Der Druck auf den Nagel war schmerzhaft. Die Zehennägel waren in geringerem Grade als die Fingernägel erkrankt. In diesem Falle darf man jedenfalls nicht mehr von Erythromelalgie sprechen.

Hallipeau et Laret beschreiben einen Kranken, dessen Haut mit zahlreichen pigmentlosen Flecken überstreut war, die von papulösen Exkreszenzen mit verstärktem Pigmentgehalt umgeben waren; anfallsweise traten hier Zustände von Erythromelalgie auf.

Sehr interessant ist das Zusammenkommen von Erythromelalgie und Angiokeratomen, das wir einmal beobachteten.

Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann, der ein kaltes Jahr vor der Untersuchung zum ersten Male mit sehr heftigen, zuckenden Schmerzen im Bereich der vorderen Partien des linken Fußes und der linken Zehen erkrankte. Der Schmerz ist von wechselnder Intensität, wird durch Herababgelassen etwas gestoppt, mit dem Schmerz verbindet sich eine heftige Röt- und Hitze. Bei der Untersuchung ergibt sich: die Zehen des linken Fußes und dessen vordere Drittel namentlich an der Plantarfläche gerötet, die Hauttemperatur erhöht, die Endphalangen geschwollen, um $\frac{1}{2}$ –1 cm dicker als rechts. Keine Schweißbildung, starkes Pulsieren der Fußarterien links, Hervortreten der Venen, starke Schmerzen, die im Laufe des Untersuchungsabends zeitweilig eine „durchbohrte“ Intensität erreichten. Außerdem fanden sich an beiden Füßen und Händen kleine, bläurote, punktförmige bis linsen- und erbsengroße Flecken, die auf einer cyanotisch verfärbten Haut sitzen, sie wenig über deren Niveau erhaben sind, unter dem Fingerdruck momentan sich entfarben. Die Haut in diesen Gebieten zeigt zu übermäßiger Schwüschentwicklung. Die Affektion ist im 7. Lebensjahre nach einem kalten Bad entstanden und besteht seitdem unverändert fort. Die Untersuchung des Nervensystems ergibt statt ein negatives Resultat.

Es handelt sich also um recht typische Symptome von Erythromelalgie. Das Vorhandensein der Angiokeratome ist deswegen bemerkenswert, weil es sich bei dieser Bildung um eine Affektion des Hautgefäßapparates, meist oder immer unter dem Einfluß thermischer Schädlichkeiten handelt. Die histologischen Untersuchungen haben ergeben, daß dabei „eine mächtige Erweiterung der papillären und subpapillären Gefäße und die Bildung von Lakunen und cavernösen Räumen vorliegt, die zum Teil bis in die Epidermis reichen und über denen es zu einer Verdickung der Hornschicht kommt.“ (Jarsch, Die Hautkrankheiten, S. 716.) Die Koinzidenz der beiden Erscheinungserreihen ist daher nicht als zufällige anzusehen, sondern deutet auf eine Insuffizienz bestimmter Apparate als gemeinsamer Grundlage.

Es fanden sich ferner wiederholt ausgesprochen atrophische Veränderungen der Haut. Diese sieht dann ganz ähnlich aus wie die nach peripheren Verletzungen auftretende Glanzhaut. Einen solchen Fall beschreibt Weir-Mitchell, und er hebt ihn besonders deswegen hervor, weil er unter den vielen Fällen, die dieser Autor damals schon gesehen hatte, der einzige war, der eine Veränderung der Trophik der Gewebe hat. Ganz wie glossy skin sah die Haut in einem Fall von Dehio aus (s. u.). Ausgedehnte Veränderungen des Ernährungszustandes der betroffenen Gewebe beschreibt Stillé:

29-jährige Frau. Vor drei Jahren fiel sie in einen Fluß, plötzliches Aufhören der Bewegung, nach einer Weile Stechen und Brennen in der Plantarfläche beider Hände, später auch an Handrücken. Leides Aussehen und Hyperäthrose der Fingerspitzen, außerdem Verdickung der Nägel und das drei- bis vierfache und Verkrümmung. Schwund des Muskel- und Fettgewebes und Resorption der letzten Phalangen. Die Haut ist bläulich, die Hände sind sehr schwach.

Es ist freilich sehr zweifelhaft, ob dieser der Erythromelalgie nicht zugerechnete Fall nicht zur Sklerodermie gehört. So möchte

ich auch einen Fall, den Savill als Erythromelalgie oder Sklerodaktylie bezeichnet, unbedingt der letzteren zurechnen.

Auch ein Übergang von Hauthypertrophie in Hautatrophie ist schon festgestellt worden. In dem schon erwähnten Falle, den Gerhardt zuerst sah, fand sich, als Eulenburg ihn untersuchte, an Stelle der Verdickung der Haut usw. eine Atrophie; die Haut war glatt, spröde, rissig, dabei bestand im ganzen eine Vergrößerung der gipfelnden Teile, so daß ältere Schuhe und Handschuhe der Patientin nicht mehr paßten. Glattes, glänzendes Aussehen der Finger bemerkte auch Lévi. Dehio erwähnt für seinen Fall, daß an der Dorsalseite der Finger der kranken Hand die Haut dünn und glänzend war, dagegen waren die Endphalangen kolbig angeschwollen, die Nägel verdickt, klauenartig. Außerdem fanden sich in der Haut flache, fortwährend schwitzende Knötchen. Schwarz fand die Haut pergamentartig verändert, an einzelnen Stellen in nekrotischen Fetzen sich ablösend; in einem Falle Eulenburgs war sie well, glanzlos und spröde und machte den Eindruck, als ob sie zu weit wäre. Schütz beschreibt einen Fall von Erythromelalgie und idiopathischer Hautatrophie, der sehr viel Interesse bietet, in dem aber die vasomotorischen Erscheinungen vom Typus der Erythromelalgie so weit abweisen, daß wir die Beobachtung nicht mehr gut als Erythromelalgie auffassen können, sondern an anderer Stelle auf sie eingehen. Lassar stellte in der Berliner medizinischen Gesellschaft ebenfalls einen Fall von Initialstadium von Erythromelalgie mit Atrophia cutis propria vor, bei dem die Befunde gegen die Zurechnung zur Erythromelalgie ebenfalls sehr erheblich sein müssen. Es handelt sich vielleicht um eine mit dem Schütz'schen Fall identische Beobachtung.

Nach dem Gesagten zeigen also die Haut, und zwar sowohl Epidermis wie Cutis und das Unterhautgewebe, ferner auch die Anhangsgebilde der Haut, die Nägel, die Drüsen und was nochträglich noch erwähnt sei, auch die Haare, zahlreiche dystrophische Veränderungen, die sehr schwer zu klassifizieren sind, da fast jeder Fall sein eigenes, besonderes Gepräge hat.

Es scheinen aber auch die Knochen nicht immer verschont zu bleiben. Wir erwähnten schon die Beobachtung Stillés. Weir-Mitchell und Spiller fanden in ihrem Fall, daß die Knochen der großen Zehe größer waren, als die eines normalen Skeletts; auch Staub berichtet von einer Vergrößerung der Knochen, die besonders deutlich im akuten Stadium der Krankheit war, aber auch noch nachher sich nachweisen ließ. Vielleicht würde eine Röntgenuntersuchung auch noch in anderen Fällen eine Veränderung des Knochengestütes ergeben, besonders da, wo klinisch eine Vergrößerung der erkrankten Teile deutlich war.

Die früheren Beobachter haben mit aller Energie daran festge-

halten, daß der lokale Gewebestod kein Symptom der Erythromelalgie sein könne. Spätere Erfahrungen haben gezeigt, daß die Frage nicht so dogmatisch entschieden werden könne; daß die Erythromelalgie auch in ihrer reinsten Form zu Gewebsveränderungen leichterer Art, die sich langsam entwickeln, führen könne, lehren die eben angeführten Beispiele. Es wurden nun aber allmählich auch Fälle bekannt, in denen das vasomotorisch-sensible Bild durchaus der typischen Erythromelalgie entsprach, in denen dann aber im späteren Verlauf plötzlich eine Gangrän sich einstellte, die ihrer Art und Ausdehnung nach der Raynaudischen Gangrän entsprach. Noch häufiger kam es vor, daß zu den typischen vasomotorischen Symptomen der Erythromelalgie, zuerst ganz passager, dann sich mehr in den Vordergrund drängend, vasomotorische Symptome vom Typus der Raynaudischen sich einstellten, und daß dann späterhin sich auch eine entsprechende Gangrän entwickelte, während sich in anderen Fällen wieder nur die Raynaudischen vasomotorischen Symptome zeigten, dagegen Mortifikation nicht eintrat.

So können wir dazu kommen, folgende Gruppen zu unterscheiden:

- a) Vasomotorische Symptome vom Typus der Erythromelalgie, denen sich früher oder später solche von Raynaudischem Typus hinzugesellten. Gangrän tritt nicht ein.
- b) Vasomotorische Symptome vom Typus der Erythromelalgie, später Gangrän Raynaudischen Charakters.
- c) Vasomotorische Symptome von der Art der Erythromelalgie und der Raynaudischen Krankheit. Schließlich Raynaudische Gangrän.

In diesem Sinne kann also die Gangrän offenbar doch ein Symptom der Erythromelalgie sein.

Ich komme auf diese Frage in anderem Zusammenhange noch ausführlich zurück.

In einem nur kurz mitgeteilten Falle von Gelpke, den der Autor als Erythromelalgie bezeichnet, kam es zu Verstümmelungen wie bei der Lepra. Doch ist die Deutung des Falles als Erythromelalgie, soweit ich nach dem mir zur Verfügung stehenden Bericht urteilen kann, sehr unsicher.

Was die zeitliche Entwicklung der trophischen Symptome anbetrifft, so lassen sich darüber bestimmte Normen aus den bisherigen Beobachtungen nicht ableiten. Während sie oft erst im späteren Verlauf des Leidens auftraten, deuten andere Beobachtungen mehr auf eine gleichzeitige Entstehung der trophischen mit den vasomotorischen und sensiblen Symptomen.

Sensible Störungen. Von diesen haben wir die Schmerzen und die Überempfindlichkeit gegen Druck und besonders gegen Be-

rührungen als in allen Fällen von Erythromelalgie vorhandene Krankheitszeichen bereits geschildert. Jetzt haben wir es besonders mit den Anästhesien zu tun. Diese sind im ganzen recht selten; in der großen Mehrzahl der Fälle wird ausdrücklich angegeben, daß die Sensibilität objektiv völlig intakt ist. In einem diagnostisch recht unklaren, aber von früheren Beobachtern als Erythromelalgie bezeichneten Falle von Sigerson fand sich am rechten Bein eine Abstumpfung der Sensibilität, so daß der Kranke mit der rechten Fußsohle den Boden nicht ordentlich fühlen konnte; andere Teile, die auch die erythromelalgischen Symptome zeigten, waren nicht anästhetisch, an dem Arme bestand sogar eine gesteigerte Empfindlichkeit für kalt, so daß dem Kranken alles, was er anfachte, wie Eis erschien. Sonst fanden sich noch einmal Angaben über eine Herabsetzung der Sensibilität. Sehr geringfügig war diese in Dehio's Fall, wo nur eine geringe Herabsetzung für Berührung bestand, während sonst Hyperästhesie vorlag. In Gerhardt's Fall fand sich neben Hyperästhesie für Berührung eine geringe Herabsetzung der sonstigen Hautsensibilität. Eulenburg fand bei demselben Fall bei späterer Untersuchung neben dem subjektiven Gefühl von Kriechen und Eingeschlafensein in Händen und Füßen, Zunge und Lippen eine deutliche Herabsetzung des Kältegefühls, besonders an den Endphalangen des zweiten und dritten Fingers und an den Füßen. Auch Verlangsamung der Schmerzempfindung bestand. Bei Lewin-Benda's erstem Patienten (21-jähriger Student) bestand in der ersten und zweiten Phalange der Finger der linken Hand eine geringe Analgesie, der Schmerz selbst saß hier nur in der Endphalange. In Fischer's zweifelhaftem Fall sind Tact- und Schmerzempfindung herabgesetzt, in Petzolis Beobachtung die taktile und thermale Empfindlichkeit. In dem schon ausführlich mitgeteilten Fall von Goette bestand eine hypästhetische Zone, die von einer hyperästhetischen umgeben war; in der ersteren wurden Nadelstiche und Pinselberührungen nicht empfunden. Die Zone von Hypästhesie verlagerte sich in den späteren Anfällen etwas; sie fand sich aber immer mit der Ausprägung der Cyanose vergesellschaftet.

Hochgradige Sensibilitätsstörungen bietet ein Fall von Heilmann:

21-jähriges Mädchen, Vor einigen Monaten Infektus. 22. Januar 1896: Beginn der Erkrankung? Brennen, Beulen im ersten bis dritten Finger der rechten Hand, zugleich Anschwellung dieser Teile, anfangs Blau, später blickige Rote der betreffenden Teile. 5. Februar 1896. Daumen, Mittel- und Ringfinger und zugehörige Teile der Mittelhand, besonders in ihren distalen Partien geschwellen, edematös durchtränkt, spiegelglatt, mit roten Flecken auf weißem Grund. Erhöhte Temperatur in dieser Gegend; starke Schmerzen, die durch Kälte gelindert werden. Kriechen im ganzen rechten Unterschenkel. Völlige Anästhesie bis etwa 10 cm über dem Handgelenk am ganzen Dorsum des Unterschenkels und an der radialen Seite des vorderen Fusses. Bei einer zweiten Untersuchung drei Wochen später ist die Anästhesie verschwunden, ebenso fast alle übrigen Erscheinungen.

Die Sensibilitätsstörung ebenso wie die übrigen Erscheinungen erstreckten sich nach Heilmanns Angabe nur auf die Verzweigung des Handrückenastes des *N. radialis*. Die Diagnose Erythromelalgie ist in diesem Fall recht zweifelhaft. In einigen anderen Fällen fand sich zwar auch Anästhesie, doch betraf diese nicht die von der Erythromelalgie befallenen Stellen und war offenbar auch kein Symptom dieser Affektion, so daß wir auf diese Fälle in anderem Zusammenhang noch zurückkommen müssen.

Weitere sensible Störungen werden nicht berichtet, nur finde ich noch einmal eine positive Angabe über Druckschmerzhaftigkeit eines bestimmten Nerven, und zwar war es in zwei Fällen von Morgan jedesmal der *N. plantaris internus*, an dem sie konstatiert wurde, in dem Fall von Gossio der Medianus und Radialis, während der Ulnaris nicht druckschmerzhaft war. Sonst kehrt in fast allen Krankengeschichten die Bemerkung wieder, daß die Nervenstämme nicht druckschmerzhaft waren.

Noch sparsamer als lokale sensible Störungen finden sich lokale motorische Störungen. Niemals bestand eine auf das Gebiet eines oder mehrerer Nerven beschränkte Lähmung mit Atrophie und Entartungsreaktion. Eine gewisse lokale Koinkidenz motorischer mit den sensiblen und vasomotorischen Erscheinungen finden wir bei Sturge, in dessen Fall sich in dem affizierten ganzen rechten Bein eine erhebliche Muskelatrophie entwickelte, die auch durch das Zentimetermaß festgestellt werden konnte. Der Unterschied zugunsten der rechten kranken Seite betrug in der Mitte des Oberschenkels 5 cm, an der größten Circumferenz der Wade 3,4 cm. Die elektrische Erregbarkeit der Muskeln war rechts quantitativ erheblich herabgesetzt, besonders bei direkter Reizung. Auch hier handelt es sich allem Anschein nach durchaus nicht um eine im Gebiet eines Nerven lokalisierte Atrophie, wie Lewin-Benda anzunehmen scheinen, sondern um eine einfache Massenatrophie ohne degenerative Lähmung. Eine allgemeine Abmagerung des von Erythromelalgie hauptsächlich betroffenen rechten Beines zugleich mit einer Schlaffheit der Muskulatur und einer Erhöhung der elektrischen Erregbarkeit beschreibt Weir-Mitchell in seinem dritten Fall. Eine sehr erhebliche Schwäche der Hände findet sich im sechsten Fall der ersten Arbeit von Weir-Mitchell, der bereits ausführlich mitgeteilt wurde; sie war hier so hochgradig, daß Patientin zu gar keiner Tätigkeit mit ihren Händen mehr fähig war. Ferner bestand im dritten Fall Weir-Mitchells eine Atrophie der Unterschenkelmuskeln des betroffenen Beines, weiter auch eine leichte Atrophie des *Musculi vastus externi und interni*, ein geringer Tremor im ganzen Bein, fibrilläres Zittern der Wadenmuskeln, aber keine Motilitätsstörung. In Pezzellis Fall kam es zu einer geringen Schwäche der Hände, außerdem fand sich eine deutliche Ungesticklich-

keit der Hände, so daß Patientin zu feineren Arbeiten untauglich war; doch führt der Autor diese Störungen teils auf die bestehenden trophischen Veränderungen, insbesondere die Verdickung der Finger, teils auf die Herabsetzung der Sensibilität an den Fingerringen, die besonders für Berührung und thermische Reize ausgesprochen war, zurück. Auch Sachs und Wiener stellten eine erhebliche Atrophie des rechten Beines fest, doch ist es zweifelhaft, ob ihre Beobachtung der Erythromelalgie zuzurechnen ist (s. u.). Ich erinnere in diesem Zusammenhange daran, daß in den von mir oben (auf S. 107) genauer mitgeteilten Fällen von reflektorisch-traumatischer Knochenmuskulaturatrophie vasomotorisch-sensible Symptome bestanden, die den für die Erythromelalgie charakteristischen recht ähnlich sind; auf diese Weise entstehen Krankheitsbilder, die nicht nur eine oberflächliche symptomatologische Ähnlichkeit haben.

Wir haben bisher gesehen, daß als Erythromelalgie Affektionen beschrieben wurden, in denen sich zunächst einmal die den Symptomenkomplex konstituierenden Symptome der anfallsweise auftretenden Schmerzhaftigkeit, Rötung und Schwellung fanden, daß aber in sehr zahlreichen Fällen daneben noch eine Reihe lokaler sekretorischer, trophischer, sensibler und motorischer Symptome vorhanden waren.

Wir müssen aber bei näherem Zusehen weiter noch konstatieren, daß auch in den das Krankheitsbild selbst konstituierenden Symptomen mannigfache und nicht unwesentliche Abweichungen von dem ursprünglich gezeichneten Verhalten vorkommen. Diese Variationen betreffen vor allem die vasomotorischen Symptome, während wenigstens in allen Fällen das Symptom des Schmerzes, wenn auch selbst dies nicht immer in ganz charakteristischer Form, festgehalten wird.

Es kommt nämlich in einer ganzen Anzahl von Fällen an Stelle der aktiven Kongestion, also an Stelle der purpurnen Röte, die sich aus normaler Hautfarbe heraus entwickelt, von vornherein einerseits eine mehr bläuliche, cyanotische Verfärbung mit subnormaler Temperatur vor, oder in anderen Fällen ein anfallsweises Auftreten lokaler Blütleere, d. h. eiskalte Beschaffenheit der betroffenen Teile und Totenblässe, Symptome, die wir als Charakteristika eines Stadiums der Raynaudischen Krankheit im nächsten Kapitel kennen lernen werden. Solche Fälle sind, besonders in neuerer Zeit, mehrfach als Kombinationen von Erythromelalgie und Raynaudischer Krankheit beschrieben worden (Mills, Merel-Lavallée, Potain, Schwarz, Elsner, Rolleston, Weber, auch Rests als typische Erythromelalgie mitgeteilter Fall gehört hierher). Collier bemerkt allgemein, daß das Auftreten von Totenfingern bei der Erythromelalgie ein seltenes Ereignis ist.

Ganz deutlich ist das abweichende Verhalten der vasomotorischen Symptome in Graves oben schon mitgeteiltem ersten Fall geschildert. Auf Rötung und Hitze folgte später Leichenkälte.

Sehr interessant ist Pagets ebenfalls zur Erythromelalgie gezählter Fall. Nach Erkältung Eingeschlafensein, Kälte, Totenblässe, zuerst am linken Fuß, einige Jahre später auch am rechten Fuß. Wenn der Kranke einige Zeit geht, werden die Füße kalt, taub, marmoreweiß und sind der Sitz sehr intensiver Schmerzen; wenn er aufhört zu gehen, schwellen die Füße in kurzer Zeit an, werden rot und heiß, und der Schmerz vermindert sich. Keine trophischen Störungen nach achtjähriger Dauer.

Lannois bemerkt, daß hier Röte und Hitze mehr den Charakter reaktiver Erscheinungen haben. Man ist, wie ich glaube, überhaupt nicht berechtigt, den Fall der Erythromelalgie anzurechnen, viel eher gehört er in die Gruppe des Raynaudschen Symptomenkomplexes.

In Sigorsons schon zitiertem Fall war die *Planta pedis* eiskalt; in Weir-Mitchells fünftem Fall der ersten Arbeit kam es im Anschluß an Anfälle von Erythromelalgie sehr häufig zu Blässe und Kälte der affizierten Seite; in seinem zweiten Falle, den er viele Jahre lang verfolgen konnte, sah er nach einigen Jahren an den Fingerringen an die Stelle der Kompression dauernd Cyanose und Kälte treten. Staub sah mitten im Gelbte der Röte vereinzelt anämische, ganz hellweiße Stellen. In Delios Fall ging Blau- und Kaltwerden der Hände und Finger den Erscheinungen der Erythromelalgie voraus. Bei Niedens Patienten war von vornherein neben der Röte auch Cyanose vorhanden, die allmählich immer mehr in den Vordergrund trat.

Hierzu kommen nun noch die oben erwähnten Fälle, in denen von den Autoren selbst schon der Übergang zur Raynaudschen Krankheit angegeben wird. Einzelne unter ihnen zeigen so viel Züge der letzteren Affektion, daß wir an ihre Besprechung erst im nächsten Kapitel gehen wollen (Moll, Rolleston), im Morel-Lavallées Fall traten bei ein und demselben Kranken bald Anfälle von Erythromelalgie und bald von Raynaudschen Symptomen auf.

Interessant ist Potains Fall. Er betrifft einen 20jährigen Menschen, der nach einem Sturz allerlei nervöse Beschwerden bekam. Seit einigen Jahren bemerkte er, daß seine rechte Hand und sein rechter Fuß auch bei Kälte auffällig warm blieben, während die linken Extremitäten sich anfallsweise stark abkühlten. Später bekam er heftige Schmerzanfälle auf der rechten Seite.

Nach Potain handelt es sich um das gleichzeitige Auftreten von Raynaudschen Symptomen und Erythromelalgie bei demselben Individuum. L. Lévi berichtet von einem Fall, in dem die Symptome der Erythromelalgie anfallsweise auftraten und zwar an den oberen und unteren Extremitäten und den Ohrfläppchen, und wo dazwischen

Anfälle von Asphyxie locale traten. In einem zweiten von demselben Autor mitgeteilten Falle handelt es sich um eine Kranke, bei der die Symptome der Erythromelalgie schon sehr gebessert waren, und wo jetzt an beiden Händen, namentlich links und besonders während der Periode Anfälle von Asphyxie locale sich einstellten. Weber teilt folgenden Fall mit:

36-jährige Frau. Seit zwei bis drei Jahren brennende Schmerzen, im Sommer schlimmer. Allmähliche Zunahme der Beschwerden, Schwellung und Eibung, so daß sie seit neun Monaten zu Bett liegt. Die Füße sind brennend heiß, hyperästhetisch, gerötet, die Arterien pulsieren; die Beschwerden sind gesteigert, wenn die Füße kühler werden. Von vortheilhaft wirkt aber Kälte so günstig wie Hitze. Auf der Höhe des Anfalls werden auch die Hände heiß und schmerzen. Die Exservationen gingen bald zurück und es trat eine deutliche Cyanose ein, die wie die Raynaudsche Asphyxie aussah. Außerdem bestand Polycythämie.

Hier zeigen die vasomotorischen Symptome zum Teil durchaus die Züge der bei der Raynaudschen Krankheit beobachteten Phänomene. Dasselbe gilt für einen von Eisner beobachteten 50-jährigen Mann, bei dem mehrere Tage Erscheinungen von Erythromelalgie vorhanden waren, um dann plötzlich einer Asphyxie Platz zu machen. Hier trat an den Fingerspitzen stellenweise Epithelverlust auf (dritter Fall der zweiten Arbeit).

Der in dieser Beziehung wichtigste Fall wird ebenfalls von Eisner mitgeteilt.

35-jährige Frau. Nicht nervös. Im Winter 1892 Kopfschmerzen und Taubheitsgefühl in den Händen, Konjestionen nach dem Gesicht. Winter 1894–1895 Dornen in der Palma und dem Dorsum beider Hände, besonders schmerzhaft Volarfläche der Finger. Schmerzen allmählich, begleitet von einem auf Hände und Unterarme sich erstreckenden rötlichen Eranthem. Februar 1896 Nachlaß und Aufhören des Kopfschmerzes. Allmähliche Zunahme der Schmerzen in den Händen bis zu unerträglicher Höhe, enorme Empfindlichkeit der affizierten Teile. Starke Schweißsekretion. Mäßige Gewebstrophie der Finger, diese spindelförmig. Alles übrige, Motilität und Sensibilität normal. September 1896 verschwand die Haut plötzlich aus dem Daumen, und dieser nahm seine normale Farbe an; es erschienen aber rote Flecke am rechten Tragus und an der rechten Backe, dann Übergang zur Cyanose und Gangrän der Stellen, die abfielen. Ein zweiter congestiver Fleck entsteht über der Mitte des linken Zehnwurdeinsteißes. 16. September Cystose, dann Gangrän der Spitze des Daumens; dazwischen erscheinen neue erythematöse Flecke. Nach Abstoßung der Daumenphalanx Aufhören der Schmerzen, die schon vorher nachgelassen hatten. Es blieben nur noch trophische Störungen bestehen, Steifheit der Finger etc.

Wir haben hier ein kaum zu entwirrendes Durcheinander von teils zur Erythromelalgie, teils zur Raynaudschen Krankheit zu rechnenden Symptomen. Wir haben im Anschluß an typische Erscheinungen der Erythromelalgie nicht minder typische von Raynaudscher Krankheit. Wir wenden auf diese wichtigen und interessanten Übergangsfälle im Verlauf unserer Darstellung noch mehrmals zurückzu-

kommen haben. Es sei nur schon jetzt daran erinnert, daß wir auch in dem vorhergehenden Kapitel solcher Fälle bereits gedacht haben.

Eine ähnliche Beobachtung ist von Rost mitgeteilt worden.

Eine Frau, die bis vor vier Jahren stets gesund gewesen ist, litt vor dieser Zeit an wiederholt auftretenden Kopfschmerzen. Am 26. Januar 1897 plötzlich heftiges Brennen unter den Fingernägeln der linken Hand ohne äußere Verletzung der Hand. Im Fieberstadium schwellten die schmerzenden Finger sehr stark, wurden oedematös, und die Nägel bogen sich um. Status praesens. Die Oberfläche ist glanzlos und ohne Härchen, die Cutis ist verdickt, die Schmerzen werden immer heftiger, die rechte Hand der Kranken ist normal, höchstens ganz wenig gerötet und etwas warm. An der Volarseite des linken Hand, genau im Gebiet des Nerven medianus besteht Schwellung, Verdickung und Verfärbung, der Mittelfinger ist cyanotisch, die anderen sind hell bis dunkelrot, die letzteren Partien fühlen sich heiß an, während der cyanotische Mittelfinger ganz kalt ist. Die Farbe und die Temperatur der Finger unterliegen einem steten Wechsel, häufig sieht die Hand fast normal aus, einmal fand Rost den Mittelfinger fast schwarz, so daß er Gangrän fürchtete. Einige Zeit nachher täuschte er ein Parasthesium vor. Am Handrücken zeigen Mittel- und Zeigefinger dasselbe Verhalten wie an der Vola, am Vorderarm finden sich einige Flecken im Gebiet des Ulnaris. Die Sensibilität ist intakt, ebenso die Motilität, es findet sich überhaupt kein Zeichen eines lokalen oder allgemeinen Nerveneleidens. Die Pulskurve ist in der gesunden und kranken Hand gleich.

In diesen Beobachtungen gesellen sich also zu den sonst sehr typischen Erscheinungen von Erythromelalgie Symptome der verwandten Raynaud'schen Krankheit, die sich im Gebiet der vasomotorischen Phänomene halten, in dem Rost'schen Fall aber schon die Gangrän streifen.

Auf die Beziehungen zwischen Raynaud'scher Krankheit und Erythromelalgie geht auch Bensaït ein.

Viel mehr verwickelt ist der Typus der Erythromelalgie in einem von Mackenzie mitgeteilten und in Zusammenhang zur Erythromelalgie gebrachten Fall, der von einem zahlreichen thermalen Schädlichkeiten ausgesetzten Lokomotivführer berichtet, bei dem in den Füßen heftige Schmerzen und Schwellung der Venen auftraten, aber nur geringe Röte. Die Schmerzen waren so heftig, daß er nicht mehr als eine halbe Stunde am Tage stehen konnte.

Wir haben uns im vorhergehenden in unserer Besprechung auf die Erscheinungen beschränkt, die wir an den speziell affizierten Teilen, insbesondere an Füßen und Händen fanden. Betrachten wir den Allgemeinzustand der von Erythromelalgie befallenen Patienten, so sehen wir auch da mannigfaltig komplizierte und variierende Verhältnisse. Die erste Frage ist die, gibt es überhaupt Fälle, in denen außer den Symptomen der Erythromelalgie, zu denen wir nach den im vorhergehenden festgestellten Erfahrungen sehen den sensiblen des Schmerzes und der Hyperästhesie, den vasomotorischen der Rötung auch die sekretorischen und trophischen rechnen müssen, gibt es überhaupt

Fälle, in denen entweder keine andere allgemeine Störung irgendeines Systems, besonders des Nervensystems vorliegt, oder doch höchstens eine solche, die nur einen sekundären Rang neben der Erythromelalgie einnimmt.

Ich glaube, diese Frage unbedingt bejahen zu müssen und will auf die betreffenden Fälle bald näher eingehen.

Andererseits unterliegt es gar keinem Zweifel, daß in einer sehr großen Anzahl von Fällen neben den lokalen Symptomen der Erythromelalgie eine Reihe von allgemeinen Affektionen vorzuliegen haben, und zwar waren es am häufigsten solche des Nervensystems, sowohl funktioneller Natur, als solche mit centraler (cerebraler oder spinaler) organischer Grundlage, als auch schließlich Erkrankungen der peripherischen Nerven. Im Anschluß an die letzte Gruppe müssen wir auch diejenigen in unserer Darstellung bisher absichtlich vernachlässigten Beobachtungen gedenken, in denen die lokalen Symptome sich ausschließlich im Gebiet eines bestimmten Nerven abspielten. Gegenüber den Erkrankungen des Nervensystems treten die anderen Körpersysteme sehr in den Hintergrund. Am häufigsten fanden sich noch Affektionen des Herzgefäßapparats, ganz vereinzelt kamen andersartige Erkrankungen zur Beobachtung, wie in einem Falle ein Myxödem, in einem anderen (Acrangeli) Osteomalacie.

Beginnen wir mit den Fällen, in denen die lokalen Symptome ganz im Vordergrund stehen. Ein solcher von Bernhardt beschriebener ist oben bereits ausführlich mitgeteilt. Dem Gesagten wäre höchstens namentlich im Hinblick auf die bei der Akroparästhesie gemachten Erfahrungen noch hinzuzufügen, daß die Störungen hier zeitlich mit dem Beginn der Menopause ungefähr coincidieren. In Graves schon zitiertem zweiten Fall traten im Laufe einiger Zeit, nachdem schon die Erscheinungen der Erythromelalgie ausgebildet waren, Palpitationen auf; der Allgemeinzustand war vorzüglich, über irgendeine weitere Affektion des Nervensystems wird nichts berichtet. Die abweichenden vasomotorischen Erscheinungen des Falles wurden bereits erwähnt. Greniers Fall, ausgezeichnet durch schwere Ernährungsstörungen an den affizierten Teilen, bot ebenfalls nur lokale Symptome, ebenso der Patient von Sigerson. Unter den von Weir-Mitchell selbst mitgetheilten Beobachtungen gehören in diese Kategorie die vierte seiner ersten Publikation, wo nur angegeben ist, daß ein dumpfer Schmerz bei extremen Bewegungen des Kopfes und Halses und zeitweise Taubheitsgefühl der Hände — hier saß auch die Erythromelalgie — bestand; ferner ist hieher zu rechnen der fünfte Fall derselben Publikation, wo höchstens eine gewisse Unsicherheit beim Gehen bestand, und der sechste Fall, wo nur noch über motorische Schwäche in den Händen geklagt wird, ohne daß irgend etwas auf Neuritis oder eine sonstige organische Ursache der Schwäche hinwies. Ohne Kom-

plikationen ist ferner Marcacci's Fall, soweit ich dem mir vorliegenden Referate von Lewin-Benda entnehmen kann, Morgans erster Fall, wo der vorausgegangenen und bereits abgeheilten Gonorrhoe doch kaum irgendeine Bedeutung zugesprochen werden kann, Senators Fall, der sehr typisch ist und zu den den Typus der Erythromelalgie fast rein wiedergebenden Fällen zu rechnen ist; nur trophische Störungen finden sich auch in diesem Fall; Senator selber zweifelt freilich an deren Zugehörigkeit zu dem übrigen Symptomenbild. Auch Lewin-Benda's 51-jähriger Keilner bot zur Zeit der Beobachtung nur die Symptome der lokalen Affektion, während früher freilich mannigfache, offenbar zum großen Teil auf Alkoholismus zurückzuführende Beschwerden (Schwindelanfälle, Unruhe, Halluzinationen) bestanden hatten. Weiter sind hierher zu zählen Fischers freilich etwas zweifelhafter Fall und der von Pezzoli, bei dem die bestehende Lungenaffectio nicht anders denn als prädisponierendes Moment angesehen werden darf; in Personalis' erstem Fall bestand eine Lues florida neben den lokalen Symptomen, und es erfolgte eine rasche Heilung innerhalb zweier Monate, doch ist das offenbar kein genügender Grund, dem typisch als Erythromelalgie geschilderten Symptomenkomplex seine Selbständigkeit abzusprechen; ganz dasselbe ist von Luzzato's Beobachtung zu sagen. Pajers beide Fälle sind ebenfalls ohne Komplikationen, ebenso Auerbachs erster Fall, die Beobachtung Carlslaw's. Hierher rechne ich ferner zwei Fälle von Koppius, die Beobachtung von Hann, einen Fall von Benoist, ferner die Fälle von Goette, Setio, Cavazzini e Bracci, Hornowski und Rudzki, Oty y Esquerdo, Jacoby, Kanoky und außerdem schließlich noch die Fälle von Schwarz, Rolleston, Weber, Elsner (drüster Fall der zweiten Publikation), Städtler, die aber keine reinen Typen, sondern Übergangsfälle zur Raynaud'schen Krankheit sind. Dazu kommen noch einige weitere nur ganz kurz mitgeteilte Fälle.

Das sind im ganzen etwa 30 Fälle oder ungefähr 20% aller von mir zusammengestellten Beobachtungen. Es sei hervorgehoben, daß in keinem einzigen dieser Fälle die lokalen Symptome sich auf das Gebiet eines Nerven erstreckten, und daß ebensowenig in irgendeinem derselben irgen welche sonstigen, für Neuritis oder Neuralgie charakteristischen Erscheinungen sich fanden. In keinem dieser Fälle hätte mit genügender Berechtigung die Diagnose Neuritis oder Neuralgie oder die irgendeiner Neurose, viel weniger die einer organischen Krankheit des Nervensystems gestellt werden können; es waren allein oder doch fast allein die Symptome an den Extremitätenenden, die die Beachtung auf sich zogen; aber freilich waren diese Symptome auch wieder wechselnd genug, und die Bezeichnung Erythromelalgie erschöpfte in kaum einem einzigen — vielleicht den von Bernhardt und den von Carlslaw mitgetheilten Fall ausgenommen — den ganzen

Symptomenkomplex, indem zu Schmerz und Rötung die gewissam geschädigten Symptome von Sekretions-, Sensibilitäts- und Ernährungsanomalien kamen.

Im folgenden gehen wir nun zu die Besprechung der Fälle, in denen neben den lokalen Symptomen solche funktioneller Erkrankung des Centralnervensystems vorlagen.

Meist war hier nichts weiter zu konstatieren, als daß die Symptome der Erythromelalgie Personen betrafen, die eine allgemeine neuropathische Diathese aufwiesen. In Paget's Fall handelt es sich um einen Herrn mit nervösem Temperament und sehr labiler Stimmung; in dem, was die lokalen Symptome angeht, recht typischen Fall von Vulpian um eine allgemeine neuropathische Diathese, Lannois sagt von seinem Patienten, er wäre ein sonst gesunder Mann gewesen, „mais à idées un peu exaltées et dénotant un état neurosique un peu spécial“; nächtliche Erregungszustände und Schwindelgefühl waren in Seeligmüllers Fall Zeichen einer gewissen neuropathischen Verfassung des Individuums. Rubelouckit, nächtliches Aufschreien, Schwindelgefühl finden sich in dem zweiten der von Prentiss mitgeteilten Fälle, während dessen erster Patient als sehr nervös bezeichnet wird, über Kopfschmerzen, schlechten Schlaf und nervöse Dyspepsie zu klagen hatte. Ähnliche Beschwerden gaben zwei kurz erwähnte Kranke Lévis an. Mehrere Male fanden sich Kopfschmerz und Schwindel (Eulenburg, Dehio, der auch über Erbrechen berichtet, Lewin-Benda, Staub, in den beiden letzten Fällen traten die Kopfschmerzen in der Form einer typischen Migräne auf). Einfach über Kopfschmerzen ohne sonstige Beschwerden klagten die Patientinnen von Rost und Prentiss.

Auch psychische Störungen sind einige Male beobachtet worden. In Auché-Lespinasses Fall wurde über Ohrensausen während der Anfälle und über eine gleichzeitige melancholische Verstimmung geklagt; Næden berichtet kurz über einen Kranken mit Erythromelalgie, bei dem sich allmählich eine Psychose entwickelte. Cristiani sah zwei Kranke, die beide schwer hereditär belastet, an Psychosen alten Datums litten und sich schon im terminalen Stadium befanden. Bei ihnen traten erst um diese Zeit die Symptome der Erythromelalgie auf. Rosen berichtet von einem Kranken, der in der Jugend ein Schädeltrauma erlitt, in seiner geistigen Entwicklung stark zurückblieb und drei Dezennien später an Erythromelalgie der Füße erkrankte. In allen diesen Fällen, namentlich in den letzten ist offenbar der Zusammenhang zwischen der Erythromelalgie und dem Grundleiden kein sehr enger. Dasselbe gilt für den oben schon erwähnten Fall von Hornowski und Budzki, bei dem die Symptome der Erythromelalgie sich während einer Katatonie entwickelten. Über das häufige Vorkommen vasomotorischer Symptome bei dieser Krankheit, die ge-

legentlich auch einmal den Erythromelalgiesymptomen ähnlich sehen können, berichtet Dide.

Savills Patientin, deren Krankengeschichte früher mitgeteilt wurde, war stets eine nervöse Person gewesen, hatte einmal einen vorübergehenden, eine Stunde dauernden Sprachverlust.

Von großem Interesse ist die Frage nach dem Zusammenhang unserer Affektion mit der Hysterie. Die Kasuistik ist in diesem Punkte nicht sehr reichhaltig, das ausgesprochene Bild der Hysterie fand sich im ganzen nur sehr selten. Ich nenne die eben mitgeteilte Beobachtung Lambrosos, wo hysteropseleptische Krämpfe und Hemianästhesie bestanden, ferner einen mir nur im Referat zugänglichen Fall von Mutschnik mit hysterischen Krämpfen, einen Fall von Berhez mit linksseitiger Hemianästhesie und Einschränkung des Gesichtsfeldes, einen von Oty y Esquerdo; Göttes Kranke, die früher an Hysterie gelitten hatte, habe ich in die vorherige Kategorie eingerechnet; schließlich erwähne ich hier einen Fall von Lévi, wo bei einer 32-jährigen nervösen Frau im Anschluß an einen beim Tode des Kindes aufgetretenen Bewußtseinsverlust Erythromelalgie im linken Fuß sich einstellte.

Ich selbst habe bei einer hysterischen Dame aus der Privatpraxis des Herrn Professor Oppenheim, die ich längere Zeit beobachten konnte, das folgende Bild gesehen.

Es handelt sich um eine etwa 40-jährige Frau, die seit langen Jahren an ganz ausgesprochenen hysterischen Symptomen gelitten hatte. So hatten früher wiederholt Anfälle von charakteristischer hysterischer Aphonie bestanden, ebenso zeitweise Anfälle von hysterischer Strabismus, außerdem waren namentlich die persönlichen Symptome der Hysterie vorhanden, leichter Stimmungswechsel, Übererregbarkeit, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit. Im Sommer 1899 traten plötzlich Schmerzen in dem vorderen Teil des rechten Fußes auf, die die Kranke zunächst beim Gehen erheblich belästigten. Die Schmerzen wurden trotz narkotischer Behandlung heftiger, und es stellte sich in ihnen eine leichte diffuse Schwellung am rechten Fuß bis zum Fußgelenk. Im Oktober 1899 ließ nach den Angaben der Kranken zuerst eine Verhärtung des Fußes auf, die Beschwerden steigerten sich im Laufe der nächsten Monate zu der jetzt, im Februar und März 1900, vorhandenen Höhe. Betrachten wir den erkrankten rechten Fuß, so fällt uns eine geringe diffuse, namentlich um das Fußgelenk etwas deutlicher werdende Schwellung auf, die elastisch ist und einen Fingerdruck nicht bewirkt. In der horizontalen Lage empfindet die Kranke keinen wesentlichen Schmerz, nur etwas Unbequemlichkeit, die Farbe und die Temperatur des Fußes entsprechen den normalen Verhältnissen, wie wir sie am linken Fuß finden. Die Sensibilität und Motilität ist intakt, ebenso die Reflexe, die Nervenstämme sind auf Druck nicht empfindlich, dagegen besteht Empfindlichkeit gegen tieben Druck in der Fußsohle. Das Bild ändert sich sofort, sobald Pat. den Fuß herabhängen läßt, noch mehr, wenn sie versucht zu gehen. Ich habe oben bereits beschrieben, wie der Fuß dann dunkelrot und heiß wird, wie die Venen hervortreten und sehr heftige Schmerzen die Kranke an der Innehaltung dieser Stellung hindern. Im Hyperästhesie. Die Kranke ist dann sehr empfindlich gegen leise Berührungen, weniger gegen stärkeren Druck. Die Behandlung war bisher ohne wesentlichen Erfolg, speziell waren sich die Affektion allen Suggestionversuchen gegenüber als sehr

hartnäckig, trotzdem, wie es schien, die Kranks auf unsere diesbezüglichen Bemühungen einzugehen den guten Willen hatte.

Durch das letztgenannte Verhalten unterschied sich dieser Fall wesentlich von einem, den Lévi beobachtet hat, und der der einzige ist, in dem der hysterische Charakter der Erythromelalgie mit voller Sicherheit in die Augen springt.

Es handelt sich um eine 37-jährige Frau. Mit zwei Monaten Gehörlosheit. Leicht erregbar. Mafte im Alter von neun Jahren eine tote Frau (in umarmen). Eindruck unzulänglich. Seitdem öfter Todesgedanken. Hemiplegie hysterica. Hysterische Anfälle, gefolgt durch Hypnose. 1897 Rheuma, articular, acut.; später psychische Erregung durch Tod der Schwester. Bald danach Beginn der jetzigen Affektion. Schmerzen und ausgesprochene Rötze in den Fußsohlen, die Schmerzen sind brennend, die Arterien klopfen. Die Haut der affizierten Teile schwitzt stark; die Schmerzen rauben den Schlaf. Mannigfache Behandlung bisher ohne dauernden Erfolg. Status praesens, August 1904. Anfallsweise an der Plantarseite der Zehen unerträglich Schmerzen, zugleich eine allmählich intensiver werdende Rötzung und Schwellung ausdruck. Vorübergehend geringe Beeinträchtigung der Sensibilität an den Zehen; außerhalb der Anfälle sind diese kalt, öligartig. In der Hypnose erzählt die Kranke, daß sie immer an ihre Schwester denke. Auf entsprechende Suggestion sofort Besserung; nach kurzer Zeit Heilung, die nur durch einen kurzen Rückfall unterbrochen wird, um dann definitiv zu werden.

Wir haben diesen Fall ausführlich mitgeteilt, weil er, wie erwähnt, eigentlich der einzige in der ganzen Literatur ist, der uns mit völliger Sicherheit die erythromelalgischen Symptome als zum Krankheitsbild der Hysterie gehörig erkennen läßt, insbesondere auch durch deren rasches Verschwinden auf suggestivem Wege. In keinem der übrigen oben mitgeteilten Fälle ist das Abhängigkeitsverhältnis der Symptome der Erythromelalgie von der allgemeinen Neurose so scharf zu erkennen; in einigen von ihnen treten die allgemein-neuropathischen Symptome sehr stark in den Hintergrund, z. B. dort, wo über nichts weiter als über Kopfschmerzen geklagt wird, in anderen erscheinen die Symptome der Erythromelalgie schon eher als Ausdruck einer Neuropathie, die sich auch sonst in zahlreichen und charakteristischen Kennzeichen äußert. Auf die hier sich ergebenden Schlußfolgerungen werden wir in anderem Zusammenhang zurückzukommen haben.

Im ganzen beträgt die Zahl der zu diese Kategorie zu rechnenden Fälle mehr als 20, also etwa 20% der Gesamtbeobachtungen.

Gehen wir nunmehr zu den Fällen über, in denen eine organische Erkrankung des Centralnervensystems vorlag. Nur in einer gewissen Zahl dieser Beobachtungen konnte eine bestimmte Diagnose gestellt werden.

Im Falle Henochs zeigten sich Rötze, Schwellung und Schmerzen ein halbes Jahr nach einer cerebralen Hemiplegie an der gelähmten linken Seite, nachdem einige Zeit vorher schon Schwellneigung bestanden hatte. In Graves erstem Fall war dem Auftreten der Erythromelalgie am rechten Fuß eine leichte linksseitige Hemiplegie voraus-

gegangen. Von Lewin-Benda, die es als zweifellos hinstellen, daß die Erythromelalgie hier zur Hemiplegie sekundär hinzutrat, wird nicht genügend darauf geachtet, daß Erythromelalgie und Hemiplegie gar nicht an derselben Seite saßen.

Um eine sichere, weit vorgeschrittene progressive Paralyse handelte es sich im Falle Macholz, wo Schmerzen, Überempfindlichkeit, dann allmählich mäßige Röte und Schwellung sich acht Wochen vor dem Tode an beiden Beinen entwickelten.

Ich habe vor Jahren noch als Assistent Wernickes an der psychiatrischen Klinik in Breslau einen Kranken beobachtet, der anfangs, in psychischer Hinsicht einen einfachen Depressionszustand darbot, bei dem wir jedoch wegen der Einförmigkeit und geringen Affektbetonung seines Delirs von vornherein an progressive Paralyse denken mußten. Der weitere Verlauf bestätigte unseren Verdacht. In dem depressiven Vorstadium der Paralyse bekam dieser Mann plötzlich eine Schwellung eines Beines mit starker heller Rötung, Hitze und heftigen Schmerzen. Die Symptome steigerten sich anfallsweise, fehlten aber nie ganz; nach einigen Wochen verschwand die Störung spurlos.

In einem von Lewin-Benda beschriebenen Falle, den wir schon mitgeteilt haben (57-jährige Bauerfrau) handelte es sich entweder um Lues cerebri oder progressive Paralyse.

Fünfundfünfzig findet sich Tabes dorsalis (Personali, Auerbach, Woodnutt und Collier, zwei Fälle). Der Kranke Personalis litt schon lange an Tabes, als die Symptome von Erythromelalgie auftraten. In der Beobachtung Auerbachs, die später wegen des Sektionsbefundes mitgeteilt wird, trat die Erythromelalgie dagegen zeitlich und symptomatologisch sehr in den Vordergrund, ebenso wie in dem Falle Woodnutt, in dem die Diagnose Tabes wenigstens wahrscheinlich ist. (Analgie der unteren Extremitäten und lancinierende Schmerzen). Um ausgesprochene Tabes handelt es sich bei beiden Kranken Colliers. Bei dem ersten trat in den letzten Monaten Kriebeln, Röte, Schwellung in den Beinen auf, die Symptome nahmen beim Gehen usw. zu, die Temperatur war um 1° gegen den normalen Zustand erhöht, es bestand weder Schwitzen noch Hyperästhesie. Während starker gastrischer Krisen traten auch an den Händen die Symptome der Erythromelalgie auf, nur fehlte der Schmerz, vielleicht weil die betreffenden Teile analgetisch waren. In ganz ähnlicher Weise fanden sich derartige Störungen ebenfalls zusammen mit gastrischen Krisen und ebenfalls ohne Schmerzen in einem zweiten Falle. Collier bezeichnet diese Zustände deshalb als *vascular crisis*.

Collier fand ferore in nicht weniger als fünf Fällen Erythromelalgie bei multipler Sklerose. Freilich scheint mir sein sechster

Fall in bezug auf die Erythromelalgie diagnostisch zweifelhaft. Sehr typisch ist aber z. B. der erste.

29-jährige Frau. Die multiple Sklerose begann vor zehn Jahren. Schwäche beider Abducentes, Doppeltsehen, leichter Nystagmus, Optikusatrophie, geringere Intentionasthenie, spontane Paraplegie. Seit sieben Jahren: Anfälle von brennenden Schmerzen in beiden Füßen, angeblich mit Hitze und Rote, spontan oder wenn die Füße aus irgendeinem Grunde warm wurden. Dauer der Anfälle drei Stunden, Besserung durch Liegen. Ein Jahr später werden die Füße dauernd rot, aber auch jetzt hatte Senken der Füße unglücklichen Einfluß, die Rötung dehnte sich bis zu den Knien aus, gelegentlich kamen zu den Füßen Blutzungen vor; jetzt sind im Bett die Füße rot bis scharl über die Knien, kalt und dunkel. Beim Aufwachtoben werden sie hell purpurn, sehr heiß, die Haut ist geschwollen, aber Fingerdruck bleibt nicht bestehen; die Ymen treten hervor, die Adern pulsieren. Die heißen Teile brennen heftig, die Temperatur ist auch thermometrisch nachweisbar erhöht, Schmerzen und vasomotorische Störungen treten stets gleichzeitig auf.

Andere Beobachtungen Colliers lösen die Erythromelalgie weniger deutlich im Bilde der organischen Nervenerkrankung hervor.

Einmal sah derselbe Autor sie vorübergehend bei Myelitis, wo sie mit der Besserung der Gefühlbarkeit zurücktrat. Einmal beobachtete sie Schlesinger einige Wochen hindurch bei einem extramedullären Tumor als vorübergehende Erscheinung. Unter heftigsten brennenden Schmerzen stellten sich Rötung und Anschwellung des Fußrückens und der Zehen bei gleichzeitig ausgesprochener Hyperästhesie der sonst unterempfindlichen Haut ein — die Anfälle dauerten von einer halben bis zu mehreren Stunden; der Tumor lag so, daß eine vorübergehende Reizung der hinteren Wurzeln recht gut stattfinden konnte.

Pospelow beobachtete in einem Fall von Gliosis spinalis, in dem anfallsweise auch Raynaudsche Symptome auftraten, einmal von Kopfweh begleitete sehr heftige Schmerzen in der linken Hand, daneben eine glasig-ödematöse Schwellung und rötlich-violette Verfärbung, am Tage darauf enorme Überempfindlichkeit der Handfläche, Schwitzen und Cyanose der Endphalangen. Zwei Wochen später ähnliches im Fuß. Symptome von Erythromelalgie bei Syringomyelie sahen auch Taubert und anscheinend auch Ferranini. Lévi erwähnt kurz einen Fall von Amyotrophie der unteren Extremitäten mit Steigerung der Patellarseflexe und Symptomen von Erythromelalgie. Collier zwei weitere Beobachtungen, in denen eine sichere Diagnose nicht möglich war; in dem einen bestand sicher Neuralgie neben den sehr charakteristischen Symptomen von Erythromelalgie, einzelnes deutete aber auf das Bestehen von multipler Sklerose. (Linksseitiger Fußkloaus, Schwäche beim Urinlassen). In einem zweiten Falle handelte es sich um eine traumatische Neuralgie, wo wieder leichte Blasenschwäche und Fußkloaus auf eine geringe materielle

Schädigung des Rückenmarks hinwiesen. Nach seinen gesamten Erfahrungen steht Collier nicht an, die Erythromelalgie als ein nicht seltenes Symptom spinaler Krankheiten anzusehen.

Endlich wollen wir hier noch Eulenburgs ersten Fall anschließen, wiewohl es zweifelhaft ist, ob das dort bestehende Grundleiden als eine Affektion des Zentralnervensystems aufzufassen ist. Es handelt sich nämlich um eine juvenile Form der Muskeldystrophie, bei einer aus neuropathischer, zu Muskelerkrankungen neigender Familie stammenden Kranken. Erythromelalgie und Muskeldystrophie decken sich hier in ihrer Ausbreitung nicht.

In einer Reihe von Fällen war eine exakte Diagnose der Grundkrankheit nicht möglich, ja in einzelnen von ihnen war selbst die Frage: organische oder funktionelle Affektion des Zentralnervensystems nicht zu entscheiden. An eine Neubildung im Gehirn muß man in Eulenburg-Gerhardts schon oben zitiertem Falle denken.

Zweifellos organischer Natur ist sicher auch die Affektion in Nieldens Fall, der mir wichtig genug erscheint, um ihn in extenso mitzuteilen.

43-jähriger Bergmann. Oktober 1890 nach vorausgegangenem Frontalsturz allgemeine Schmerzhaftigkeit der Hände und Füße, gleichzeitig Rötung des Haut bis zum Ellbogen resp. Kniegelenk und Anschwellung der affizierten Teile. Allmählich kommt es den schmerzhaften Empfindungen nach Taubheitsgefühl; Nägel stärker verhornt gekrümmt. Nach und nach mehr heftiges Ausströmen der erkrankten Partien, Nachlaß der Schmerzen, Abschlebung der Haut. Schließlich Heilung. Nach fast einem Jahre neuer Anfall stärker und länger dauernd, nach drei Monaten der dritte, wieder nach einigen Monaten ein vierter. Schon nach dem ersten Anfall leichte Neuritis optica beider Augen, außerdem Bergmanns-Nystagmus. Drei Wochen nach dem Eintreten des vierten Anfalls rasche Verschlechterung des Sehens, rechts bis zur völligen Erblindung, ausgeprägte Stauungspapille, Papillen träge reagierend; ausgesprochene Erweiterung der Papillargefäße. Keine Schmerzen.

Nach Nielden unterliegt es keinem Zweifel, daß diese Gefäßerweiterung vollkommen konform der an den Extremitäten beobachteten war, und daß es sich bei dem ganzen Bilde um eine angio-paralytische Affektion des Zentralnervensystems handeln müsse. Nieldens Schilderung ist besonders deswegen beachtenswert, weil auch bei der Raynaudschen Krankheit, wie wir später sehen werden, im Auge Veränderungen der Gefäßweite gefunden wurden und zwar gerade solche entgegengesetzter Art, nämlich eine anfallsweise auftretende Verengung der Arteria centralis retinae; wir kommen darauf noch zurück.

Auch im folgenden von Schenk mitgeteilten Falle kann man wohl eine organische Erkrankung des Zentralnervensystems insbesondere des Rückenmarks diagnostizieren, doch ist eine spezielle Diagnose nicht möglich.

29-jähriger Arzt. Viel Erregungen. Dezember 1894 sechs bis acht Tage nach starker Durchkühlung stechende Schmerzen im linken Fuß, Anschwellung des großen Zehs, die bläulichrot aussieht. Einen Monat später Herabsetzung des Taustgefühls an der rechten Hand. Nach sechs bis acht Wochen auch die übrigen Zehen rot und schmerzhaft. Status pericursus. September 1895: Zehen des linken Fußes stark geschwollen, Haut intensive Meurot, schart gegen die gesunde Hautfarbe im ersten Interphalangealgelenk abgesetzt. Erhebliche Hyperalgie an der ganzen linken unteren Extremität. Rechte untere Extremität intakt. An der Extensionsecke des rechten Unterarmes, an der rechten Halsklappe und der ganzen Stirn Analgese. Subjektive Klagen über Empfindungslosigkeit am rechten Arm; kann sich den Rock nicht anknöpfen; schenkt verschiedenen Gegenständen nicht. An den Fingern beider Hände Haut atrophisch und gerunzelt. Keine Lähmung. Spinale Ataxie, Reizberg und Blasenbeschwerden. Links Fuß- und Patellarklonus. Pupillenreaktion gut, ophthalmoskopisch normal.

Schenk meint, es handle sich um einen aufsteigenden myelitischen Prozeß in den Hintersträngen und den in der Nähe derselben gelegenen Vasomotorenzentren, vielleicht handelt es sich auch hier um multiple Sklerose.

In dem Fall von Fischer deuten Schwindel, Kopfschmerzen, Erbrechen und Schließen auf organische cerebrale Affektion. Nicht leicht zu beantworten ist die Frage, ob organische oder funktionelle Nervenkrankheit vorliegt, in einem Fall von Weir-Mitchell (zweite Beobachtung der ersten Arbeit). In diesem Fall standen zuerst die lokalen Symptome der Erythromelalgie völlig im Vordergrund. Im weiteren Verlauf psychische Veränderung, Patient wird einmüde, unwillig, einmal ein Krampfanfall aber ohne Zungenbiß, Sprache hässelnd, Gürtelgefühl. Weir-Mitchell denkt an eine organische Läsion, Lewin-Benda halten das Bestehen einer schweren Hysterie nicht für ausgeschlossen.

Seinen Fall 3 derselben Arbeit konnte Weir-Mitchell lange beobachten. Die schweren lokalen Symptome haben wir oben bereits mitgeteilt; auch hier standen diese im Vordergrund, ehe Symptome einer weiteren Erkrankung des Nervensystems sich zeigten; diese bestanden dann in Schwindel, Gedächtnisschwäche, vorübergehenden Paresen, Blasenbeschwerden, Fuß- und Patellarklonus beiderseits, Gürtelgefühl, Impotenz. Daneben im allgemeinen hysterisches Verhalten. Schließlich trat Exitus ein, doch konnte eine Sektion leider nicht gemacht werden.

Weir-Mitchell denkt für diesen Fall an eine Kombination neuritischer mit späteren spinalen Läsionen; außerdem bestand Hysterie. Einer bestimmten Diagnose entziehen sich auch die Fälle von Golpke, Städler u. a. Der von dem letztgenannten Autor beschriebene Fall verlief unter dem Bilde einer akuten Infektionskrankheit mit epileptiformen Anfällen, Fieber; ich kann ihn nicht zur Erythromelalgie rechnen.

Im ganzen finden wir neben der Erythromelalgie die Symptome

eines organischen Nervenleidens etwa 25 mal, eine Zahl, die von den eben für die beiden anderen Kategorien gefundenen Werten nicht erheblich abweicht. Das Verhältnis, in dem die Erythromelalgie zu der organischen Affektion steht, ist sehr wechselnd. Häufig bestand schon lange Zeit das Bild der Erythromelalgie, ehe sich andere nervöse Störungen dazugesellten, seltener war das Verhältnis ein umgekehrtes. Als auffällige Tatsache wird von Lewin-Benda bemerkt, daß sich unter den hierher zu rechnenden Fällen eine sehr große Zahl solcher organischer Affektionen des Nervensystems fand, bei denen eine sichere Diagnose nicht zu stellen war. Im übrigen kann von einem Vorwiegen einer bestimmten Erkrankung keine Rede sein. Die Zahl, mit der die einzelnen Affektionen vertreten sind, ist ja jedesmal eine sehr kleine.

Wir wollen dieser Gruppe einen isoliert dastehenden, von Landgrät mitgeteilten Fall anschließen, in dem das Symptomenbild der Erythromelalgie sich bei einem Myxödem zeigte. Engelen beschrieb einen Fall, in dem neben den Erscheinungen der Basedowschen Krankheit anfallsweise schmerzhaftes Parästhesien und Rötterfärbung der Hände auftrat.

Als letzte Gruppe der die Erythromelalgie begleitenden nervösen Affektionen betrachten wir diejenige, in denen die Symptome der Erythromelalgie sich mit einer peripheren Erkrankung des Nervensystems vergesellschaftet fanden resp. selbst als Ausdruck einer solchen angesehen werden mußten. Es sind dies im wesentlichen diejenigen Fälle, in denen die lokalen Symptome sich auf das Gebiet eines bestimmten Nerven beschränkten. Es konnte sich da naturgemäß im wesentlichen um zwei Arten von Krankheitsprozessen handeln, um Neuritiden und Neuralgien. Ausgesprochene Symptome einer Neuritis finde ich in keinem Fall. Lewin-Benda führen zwei derartige Fälle an, den von Länneke zitierten von Sturge und einen weiteren von Morgan-Dreschfeld. In diesem Falle betrafen Schmerzen und Rötung am Fuß das Gebiet des Plantaris internus, am Arm besonders das des Medianus. Außerdem fehlten später die Patellarreflexe. Lewin-Benda fassen den Fall als chronische Polyneuritis auf. Es beachtet ein, daß diese Annahme nicht besonders gut gestützt ist. Auch in Sturges Fall sehe ich keinen zwingenden Grund für die Diagnose Neuritis. In Lewins Fall (25jähriger Kaufmann, Ätiologie Trauma) war die Affektion auf das Gebiet des N. ulnaris dext. beschränkt. Die Diagnose Erythromelalgie ist recht zweifelhaft, ausgesprochene neuritische Erscheinungen werden nicht berichtet. Lewin, der auf die Lücken der Beobachtung selbst aufmerksam macht, denkt an eine traumatische Neuritis.

Auch Reinak tritt meine Auffassung, daß die von Lewin-Benda angegebenen Fälle von Neuritis kaum als echte Neuritis anzusehen sind. Viel überzeugender für eine Polyneuritis erscheint ihm ein von

Roß und Bury erwähnter Fall. Hier waren bei einem Trinker mit deutlichen Symptomen von Taubheitsgefühl in den Extremitäten, Wadenkrämpfen, Verlust der Kniephänomene, Anfällen von Absterben der Finger, häufig die Fußsohlen, gelegentlich auch die Handflächen rot, heiß und mit reichlichem Schweiß bedeckt. Roß und Bury berichten an anderer Stelle ihres Werkes noch einen ähnlichen Fall, ebenso erwähnt Auerbach eine Beobachtung Edingers, der bei einem von schwerer multipler Neuritis sich erholenden Kranken Symptome von Erythromelalgie in den herabhängenden Beinen sah. Im ganzen betont aber auch Rentak, daß keinesfalls beweisende Tatsachen dafür vorliegen, daß die Erythromelalgie von peripherischer Neuritis abhängt. Dieser Beweis wird auch durch einen von Lévi kurz erwähnten Fall nicht erbracht, wo eine *Pseudotabes éthylique* vorliegt. Bei dem von Hirose und Shimazono beschriebenen Fall handelt es sich um Erythromelalgie-ähnliche Symptome, die im Verlauf von Beri-Beri auftraten.

In einer größeren Anzahl von Fällen beschränken sich die Symptome der Erythromelalgie auf das Gebiet eines oder mehrerer bestimmter Nerven, ohne daß dabei Symptome einer Neuritis sich kundgegeben hätten. Die letzteren Fälle sind zusammen mit einer Anzahl solcher, in denen in den Krankengeschichten von einer auch nur annähernd genauen Beschränkung auf bestimmte Nervengebiete nicht die Rede ist, von Lewin-Benda, zum Teil sicher mit Unrecht, den Neuralgien zugerechnet worden.

Hierher gehören zunächst die Beobachtungen Morgans. Einmal war hier der Medianus zusammen mit beiden Plantares interni betroffen, zweimal nur ein Plantaris internus und einmal nur ein Medianus, dreimal fanden sich auch Druckpunkte; einmal bestand ausgeprochene allgemeine Nervosität. Weiter sind hierher zwei Fälle von Weir-Mitchell zu rechnen (Fall I und III seiner zweiten Publikation). Im Fall I scheint das Ausbreitungsgebiet des N. tibial. post. einer Seite, der auch druckschmerzhaft ist, der Sitz der Erythromelalgiesymptome zu sein. In dem dritten Falle, der später wegen der bei ihm vorgenommenen Operation noch mitgeteilt wird, beschränkten sich die Symptome auf das Gebiet des N. plantar. intern. dext. In den beiden Beobachtungen von Heimann ist der Handrückenast des N. radialis (einsseitig) befallen. Druckpunkte scheinen hier nicht vorhanden gewesen zu sein. In dem schon erwähnten Fall von Dünger bestanden Zeichen einer organischen cerebralen Erkrankung, dabei traten aber die lokalen Symptome im Bereich des linken N. plantaris und radialis auf. Bowen berichtet folgenden Fall:

29-jähriger Mann. Vor zwei Jahren trat das Leiden zum erstenmal in einem zwei Monate dauernden Anfall auf. Seitdem hat Pat. eine Reihe von Anfällen gehabt, des letzten vor drei Monaten. Am linken Unterarm und der linken Hand, besonders

im Gebiet des vierten und fünften Fingers entwickelt sich ein Erythem, die Haut ist heiß, intensiv rot, geschwollen und es bestehen sehr heftige Schmerzen. Wenn die Anfälle nachlassen, werden die beiden Finger dunkel und es tritt Hyperhidrosis ein. Der Anfall dauert jetzt schon 11 Tage.

Hier erscheint als Verbreitungsgebiet der Erythromelalgiesymptome die achte cervicale und erste dorsale Wurzel.

Schließlich mag hier noch ein Fall Erwähnung finden, den ich den Journalen der Poliklinik von Prof. Oppenheim entnehme. Es geht mir leider nicht mehr, die Patientin selbst nochmals zu untersuchen.

62-jährige Frau. Viel vor etwa 1½ Jahren auf ebener Erde, ohne daß eine schwere Verletzung stattfand, und zwar auf dem linken Ellbogen. Es bestand keine Lähmung eines bestimmten Nervenstumpfs, doch trat mit dieser Zeit allgemeine Schwäche in der linken Hand, eine Blaufärbung und Schwellung derselben und heftiges heftiges Brennen und Stechen ein.

Vor zwei Jahren wegen einer Psychose in der Irrenanstalt. Psychisch hereditär belastet.

Hand an den Fingern und der Hand links teils rot, teils blaues gelblich; außerdem stark glänzend. In dem roten Bezirk heben sich noch einzelne Punkte durch eine purpurne Härte ab; am stärksten sind die Erscheinungen am vierten Finger. Temperatur an der Vola manus im. bedeutend erhöht. Puls auf beiden Seiten gleich. Druck auf den linken Ulnaris unterhalb des Oleranen schmerzhaft, Schwellung der Weichteile, welche der Crista des Knochens aufliegt, aber doch unter der Haut verschluckt ist. Druck auf die Haut nicht schmerzhaft. Keine Störungen der aktiven Beweglichkeit. Händedruck schwach. Ausgesprochenes Hyperalgies im Unterarm. Elektrische Erregbarkeit normal. Pupillen, Lidpalpen gleich weit. Patellarmotilität beiderseits etwas erhöht. An den Beinen keine Bötung.

Hier sind die Störungen auf das Ulnargebiet beschränkt. Für eine wirkliche Neuritis fehlen alle Anhaltspunkte, insbesondere alle Lähmungserscheinungen von seiten sensibler und motorischer Nerven.

Einer kurzen Erwähnung bedürfen zum Schluß noch diejenigen Erscheinungen, die wir auf eine Schädigung des Gefäßnervensystems zu beziehen gewöhnt sind, soweit sie nicht als lokaler Natur schon besprochen wurden. Was die letzteren betrifft, so sei hier nur noch in Ergänzung von früher Gesagtem hinzugefügt, daß am Puls der die affizierten Gebiete versorgenden Arterien niemals etwas Besonderes festgestellt werden konnte. Sphygmographische Untersuchungen hat nur Ross angestellt; er bemerkt, daß die Pulscurve beiderseits gleich war.

Das Herznervensystem scheint nur recht selten betroffen zu sein, über Herzklopfen wurde nur vereinzelt geklagt (Gerhardt, Graves, Lombroso).

Von weiteren herhergehörigen Symptomen sei erwähnt, daß in Weir-Mitchells erstem Fall der zweiten Arbeit ein fortwährender

Wechsel der Gefäßfülle an der ganzen Oberfläche des Körpers auffiel. Über Kongestionen zum Gesicht während der Anfälle berichteten Auché et Lespinasse. Ferner landeten sie ebenso wie Senator und Collier (in einem seiner Fälle) deutliche Dermatographie. Elsner sah ein passageres makulopapulöses Exanthem, das seiner Genese nach vielleicht auch hierher gehört.

Im übrigen ist die Aufmerksamkeit der Beobachter recht wenig auf derartige Symptome wie Dermatographie und ähnliche Gefäßreflexe gerichtet gewesen. Für die Zukunft scheint mir eine genauere Beobachtung dieser Dinge sehr wichtig zu sein.

Im Anschluß an diese Erörterungen findet am besten ein von Schmidt beobachteter und im Verein für innere Medizin in Wien vorgestellter Kranker Erwähnung:

Ein 40-jähriger nicht syphilitischer und nicht alkoholischer Mann erkrankt vor zwei Jahren mit heftigen Schmerzen im rechten Fuß. Es stellt sich eine sehr schmerzhafte Schwellung der Weichteile am Fußrücken ein; die Haut ist hier bläulich verfärbt und heiß, Fuß lag fünf Monate zu Bett, dann verschwand alles. Ein Jahr später trat ein ähnlicher Zustand im Bereich der rechten Hand ein. Heftige stechende Schmerzen im Bereich des dritten bis fünften Fingers, Rötung und Schwellung, abnorme Krümmung der Nägel. Die Schmerzen waren ursprünglich dauernd, sind jetzt remittierend. Die Temperatur der Haut deutlich erhöht, die Venen sind geschwollen, die Arterien pulsieren. Es besteht daneben eine ausgesprochene Polycythämie: 10 Millionen rote Blutkörperchen, Hämatokritgehalt 187%, Mänisken und serienförmliche Veränderungen an der Aorta und den Gefäßen. Außerdem Venenectasie am Hals, Gesicht, Bauchhaut, Mund, Rachen, Kehlkopf, wo sich Schrötter bei der Demonstration aufmerksam machte.

Der Fall bietet also auf der einen Seite durchaus charakteristische Erythromelalgiesymptome, daneben aber auch Zeichen einer allgemeinen, in ihren Zusammenhängen nicht klaren Affektion: Arteriosklerose, Polycythäemia megalo-splenica und allgemeine Vasoparalyse, die Schrötter auf eine verbreitete Gefäßnervenkrankung zu beziehen geneigt ist.

Die Kombination von Erythromelalgie und Hyperglobulie beobachtete auch Wehr einmal.

Die Frage des Zusammenhanges von Symptomen von Erythromelalgie mit Erkrankungen des Herzens und der Gefäße bedarf einer ausführlichen Erörterung, nachdem wir diesen Punkt im Verlauf unserer Darstellung schon mehrfach flüchtig berührt hatten. Die Zahl der Fälle, in denen schwere Gefäßveränderungen vorhanden waren und in Zusammenhang mit den Symptomen von Erythromelalgie gebracht wurden, ist gerade in den letzten Jahren immer größer geworden. Selbständige Erkrankungen des Herzens spielen keine Rolle; ein ausgesprochenes Vitium cordis fand sich niemals. Herzschwäche und ein systolisches Geräusch am Herzen wurden in Weir-Mitchells

erstem Fall beobachtet, ein leichtes systolisches Geräusch auch im zweiten Fall seiner zweiten Publikation.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß in Eulenburgs zweitem Fall eine Neigung zu Blutungen aus den Gefäßen der affizierten linken Hand bestand, und daß das Blut lackfarben aussah. Auch Collier berichtet über gelegentliche Blutungen aus den Gefäßen der erkrankten Beine in dem ersten seiner Fälle, ferner über dauernde Gefäßerweiterung in zwei weiteren Beobachtungen — ähnlich wie in dem oben erwähnten Fall von Schmidt. Häufiges Nasenbluten bestand in Gerhardt-Eulenburgs Fall.

Die Zeichen der Arteriosklerose fanden sich in mannigfachen Abstufungen. Henschs Patient litt an Angina pectoris, in Dünkers Fall ist das Cor etwas vergrößert, die Töne sind unrein, und es besteht allgemeine Arteriosklerose. Galloway, Lannois et Perot, Benoist, Jacoby berichten ähnliches.

Von größerem Interesse sind die Fälle, in denen im Bereich der Erythromelalgiesymptome Gefäßveränderungen, insbesondere Arteriosklerose nachgewiesen wurden.

Ich beginne mit dem Fall Dehies.

56-jährige Wäckerin. Hat viel in Kälte und Feuchtigkeits zu tun. Häufig Bläse und Kaltwerden der Finger und Hände. Dann zuerst in den Fingern der linken Hand und im Zehen des linken Fußes brennende Schmerzen, anfallweise auftretend und mit längeren Intermissionen. Status praesens September 1894. Dauernde Schmerzen in der linken Hand brennenden Charakters, exazerbierend, besonders bei Bewegungen. An der Palmafläche aller fünf Finger ist die Haut dunkelrot, etwas livide, schweißt fortwährend und zeigt flache Knötchen. An der Dorsalfläche der Finger Haut dünn und glänzend. Rötliche Anschwellung des linken Fingers, klammartige Stigmata. Am Fuß ähnliche aber geringere Erscheinungen. Hyperalgie und geringe Hypästhesie bei Berührungen durch Quallen der Haut. Kopfschmerz, Schwindel, zeitweilige Erbrechen. Puls in der A. brachialis an. tuncus.

Klinisch fanden sich neben Zeichen allgemeiner Arteriosklerose also besonders solche einer unbeschriebenen Erkrankung im Gefäßgebiet des linken erkrankten Arms. Bei einer vorgenommenen Operation wird ein Stück des N. ulnaris über dem Handgelenk herausgenommen, und die A. ulnaris unterbunden. Der Effekt ist der, daß die Haut am Kleinfingerhaken wieder normal wird, nur besteht eine Anästhesie im Ulnargebiet. Der übrige Zustand bleibt unverändert. Die mikroskopische Untersuchung des N. ulnaris ergibt normale Verhältnisse, dagegen findet sich eine erhebliche Verdickung der Intima und eine Verschmälerung des Lumens der Arteria ulnaris.

Damit ist durch den anatomischen Befund die klinische Annahme der Arteriosklerose bestätigt.

Schon Auerbach hat gegen die Diagnose der Erythromelalgie in Dehies Fall Einwände gemacht. Daß schon von vornherein wichtige und bemerkenswerte Abweichungen vom Typus vorhanden

waren, können wir aus der im Auszug mitgeteilten Krankengeschichte ohne weiteres entnehmen (häufiges Blau- und Kaltwerden der Hände).

Ich schließe daran den Fall, den Weir-Mitchell und Spiller mitgeteilt haben.

Ein jetzt 61 jähriger Mann erlitt im August 1864 einen Hitzschlag und ist seitdem gegen Hitze sehr empfindlich. Im Juli 1897 hatte er zuerst heftige Schmerzen, Überempfindlichkeit und Hitze im rechten Fuß, wenn er ihn herabhängen ließ. Es entstand dann ein kleines tiefes schmerzhaftes Geschwür an der Außenseite der vierten Zehe, das langsam heilte. Allmählich wurden alle Zehen betroffen, bis die Krankheitserscheinungen sich in der großen Zehe festsetzten. Kälte brachte Erleichterung, Hitze Verschlimmerung; Stehen und Gehen machten die Beschwerden unerträglich. Als Weir-Mitchell den Kranken sah, war die große Zehe rot, aber nicht geschwollen, der Kranke litt dauernd an Schmerzen, aber die genannten Schädlichkeiten steigerten sie außerordentlich. Sensibilität und Motilität intakt, Nervenstämme nicht druckschmerzhaft. Bemerkenswert ist, daß unterhalb des Knies der Puls nicht gefühlt werden konnte. Am 3. April 1908 wurde die große Zehe zusammen mit der Hälfte des ersten Metatarsus abgenommen. Bei der Operation spritzten die Arterien. Es trat langsame Heilung ein, aber dann zeitweilige Schmerzen im Fußballen. Die Prognose blieb also dubios. Die anatomische Untersuchung ergab schwere Degeneration der Zehennerven, die Nervenbündel bestehen hier fast ganz aus Bindegewebe; das Mark ist zerstückelt, die Achsenylinder meist verschwunden. Auch die Gefäße sind schwer erkrankt. Media, Intima und Elastica sind fast bis zum Verschwinden des Gefäßlumens verdickt. Auch die Venenwände sind verdickt.

Auch hier bestätigte der anatomische Nachweis den aus dem klinischen Befunde (Fehlen des Pulses im Gebiet der erkrankten Extremität) zu ziehenden Schluß einer umschriebenen Gefäßwandveränderung.

In seinem klinischen Bild steht der Fall ja der Erythromelalgie außerordentlich nahe. Aber ein Punkt ist doch höchst beachtenswert, das ist das Fehlen des Pulses in der erkrankten Extremität. Bekanntlich hat Erb dies einseitige Fehlen des Pulses in den Fußarterien als ein gewichtiges Kennzeichen des intermittierenden Hinkens beschrieben, und es kann das Symptom andererseits auch für die Diagnose der endarteriitischen Gangrän verwertet werden. Beide Affektionen sind nicht ohne Beziehung zur Erythromelalgie, wenn man diesen Worte einen rein symptomatischen Wert beimißt, d. h. es können erythromelalgische Symptome das Krankheitsbild der Endarteritis obliterans und des intermittierenden Hinkens begleiten. Nach Erfahrungen, die schon Erb gemacht und über die später Oppenheim genauer berichtet hat, spielen zweifellos im Bereiche des intermittierenden Hinkens funktionelle vasomotorische Störungen eine große Rolle, und es gibt

offenbar auch Fälle dieses Leidens, die pathogenetisch ganz oder fast ganz auf funktionelle vasomotorische Störungen zurückzuführen sind. Meist sind diese allerdings vasoconstrictorischen Charakters, aber es kommen auch vasodilatatorische Reizphänomene als Begleitsymptome vor, und wenn die endarteriitische Gangrän zweifellos stets eine gefäßorganische Grundlage hat, so kann doch nicht bezweifelt werden, daß sekundär und durch die Gefäßveränderungen bedingt vasomotorische Reizungen mannigfacher Art ausgelöst werden und die organische Symptomatologie dadurch ergänzt und bereichert werden kann. Überall da also, wo klinisch sichere Zeichen einer organischen Gefäßalteration vorliegen, werden wir der Diagnose (idiopathische) Erythromelalgie mit einer großen Vorsicht gegenüberstehen müssen. Die Zahl dieser Fälle ist nun gar nicht klein. Eine sehr interessante Beobachtung dieser Art verdanken wir Sachs und Wiener.

Ein 26-jähriger Mann, Schneider, der seit zehn bis zwölf Stunden hintereinander Nakanachschmerz hatte, bei dem nichts über frühere herische oder rheumatische Erkrankungen bekannt war, klagte seit August 1887 über starke stechende Schmerzen in der linken Wade, beim Stehen oder Sitzen von fast unerträglicher Intensität. Anfang 1888 Schwellung und Rötung des linken Fußes, im April 1888 wurde der Fuß, wenn der Kranke ihn längere Zeit, verkniet, äußerst schmerzhaft, die Haut war trocken und glänzend, die Arterien pulsierten lebhaft, es bestand Atrophie im Peroneusgebiet, aber keine Entzündungsreaktion. Strenge Verschlimmerung. Oktober 1888 Geschwür auf dem Fußrücken, das nach in die Tiefe ging. Der Puls ist regelmäßig, Herzklappung und Herztonus sind normal. Sehr erhebliche Atrophie des ganzen linken Beines. Das Geschwür wurde immer größer, die zweite Zehe wurde gangränös, dasselbe Schicksal drohte den anderen. 15. November 1888: Amputation des Oberschenkels, Heilung. Die anatomische Untersuchung ergab schwere Veränderungen in der Art. tibial. antica und der Poplitea (beide ihren Verzweigungen). Am stärksten ist die latissa betroffen, selbst in den Hauptstämmen ist es stellenweise zur völligen Verlegung des Lumens gekommen. Am ganzen Unterschenkel findet sich kaum eine normale Arterie. Die Venen waren nur leicht erkrankt. Die Veränderungen an den Nervenstämmen sind verhältnismäßig gering, am stärksten noch im N. peroneus profundus, aber auch da findet sich nur Entartung einzelner Nervenfaser. Von einer völligen Infektion der Nervenschollen oder von einer Perineuritis ist keine Spur nachweisbar.

Sachs und Wiener sind der Ansicht, daß die Arterienkrankung die Ursache der Symptome gewesen ist, während die Nervenveränderungen erst sekundär durch Erkrankung der Gefäße bedingt wurden. Dieser Auffassung möchte auch ich zustimmen. Wenn die Autoren aber daraus schließen, daß es sich bei der Erythromelalgie weit mehr um eine Erkrankung der Arterien, als um eine Affektion der Nerven handelt, so ist dieser Schluß deswegen, zumal in seiner Allgemeinheit, nicht berechtigt, weil gegen die Einreihung dieser Beschreibung in das Gebiet der eigentlichen Erythromelalgie sehr erhebliche Bedenken obwalten. Es scheint mir vielmehr hier der Fall vorzuliegen, von dem ich eben bereits sprach, es handelt sich um das Auftreten erythromelalgischer

Symptome als Begleiterscheinung einer organisch bedingten Erkrankung peripherer Gefäße, im speziellen der Endarteriitis obliterans.

Auch andere amerikanische Autoren haben sich einer ähnlichen irrthümlichen Auffassung hingegeben und sind dadurch zu falschen Schlüssen über das Wesen der Erythromelalgie gelangt. Elsner berichtet folgenden Fall:

Ein 54 jähriges Mann, der vor 36 Jahren Laes akquiriert hatte, klagte zuerst im Alter von 18 Jahren über Schmerzen, Brennen, Hitze und Kriebeln in rechten Fuß, besonders in der rechten zweiten Zehe. Die Schmerzen traten zufällig auf, dabei gaherten die Arterien und die Venen schwellen an. Es trat eine starke Gesichtsröthe in den nächsten Jahren ein. Nach einem Fall vom Wagen wurde der Zustand etwa ein Jahr nach Beginn des Leidens schlechter. Die Veränderungen gingen auf die benachbarten Zehen über und erstreckten sich bis zum Knöchel, dann kam der linke Fuß an die Reihe. Allmählich zunehmende Atrophie der Muskeln. Vier Jahre nach Beginn des Leidens trockne Gangrän der rechten dritten Zehe. In der rechten Arteria dorsalis pedis ist kein Puls mehr zu fühlen. Es sind überall arteriosklerotische Veränderungen vorfinden. Der linke Ventrikel ist hypertrophisch. Nach fünfjähriger Dauer des Leidens Exitus.

Hier sind die Erscheinungen der allgemeinen Arteriosklerose, die sich auf dem Boden der Laes entwickelt haben dürfte, ja deutlich genug ausgesprochen, und das Fehlen des Fußpulses kennzeichnet die starken lokalen arteriosklerotischen Veränderungen im Gebiete der Erythromelalgiesymptome.

Etwas anderes liegt ein zweiter Fall von Elsner. Es handelt sich da um eine 39jährige Frau. Das Leiden begann vor 16 Jahren mit Schmerzen in der Palmarfläche des zweiten linken Fingers. Beim Herabhängen Röte, intensiver Schmerz, Schweißausbruch, Anschwellen der Venen, Klopfen der Arterien, Hitze. Die leiseste Berührung brachte enorme Schmerzen hervor, Hitze steigerte den Schmerz. Kälte brachte in den ersten Jahren Besserung, später war nur durch Aufrechterhalten der Hand eine Erleichterung zu erzielen. Nach zehn Jahren traten zwei oberflächliche Geschwüre an der Haut der ersten und zweiten Phalanx des zweiten Fingers, und zwar an der Palmarfläche auf. Diese heilten und ließen leichte Defekte zurück. Ein Jahr später kleine gangränöse Stelle an der Spitze des zweiten Fingers. Jede Behandlung blieb ohne Erfolg. Der Finger wurde amputiert, zugleich mit einem Teil des Metacarpus. Die Beschwerden hielten auf und sind bis acht Wochen nach der Operation nicht wiedergekehrt. Hier fand sich stellenweise eine leichte Verdickung der Intima, der kleinen und großen Arterien. An einzelnen Stellen der kleineren Gefäße eine Infiltration mit Rundzellen, außerdem war die Hornsubstanz verdickt. Alles Ubrige ist völlig normal.

Hier waren also anatomisch zwar noch leichte organische Veränderungen an den Gefäßen nachweisbar, aber von einer Arteriosklerose im klinischen Sinne von einem Verschwinden oder einer Alteration

des Pulses ist nirgends die Rede, trotz eines Verlaufes, der sich über 1½ Dezennien hinzog.

Eine weitere Beobachtung, auf die wir eingehen müssen, ist die von Hamilton.

Das Leiden begann im 33. Lebensjahre mit Schmerzen in der Magen- und Lebergegend, leichten Ikterus und Schmerzen im linken Zeigefinger. Diese Schmerzen verschwand. Ein Jahr später plötzlich heftige Schmerzen in der rechten großen Zehe. Der Schmerz wiederholte sich anfallsweise, anfangs bestand keine Bätung, später jedesmal mit dem Schmerz auch Bätung. Allmähliche Ausbreitung auf die übrigen Zehen, die Sohle und Hacke des Fußes und Mitbeteiligung des linken Fußes. Bald danach mittlere Zehe des rechten Fußes gangränös, wird amputiert. Allmählich werden die übrigen Zehen beider Füße schwarz, aber nicht gangränös. Beim Antreten stets erhöhte Schmerzen, heiße Räte, die aber bald sich mit dunkleren Flecken durchsetzen. Je länger das Stehen anhält, desto mehr verlieren alle Teile die Farbe, werden blaß, dabei waren die Schmerzen äußerst heftig. Lokale Temperatur nicht erhöht, kein Klopfen der Gefäße, Entsetzen des Fußes in heißes Wasser brachte Linderung, gelegentlich aber auch Kälte. Im Frühjahr 1901 Geräusch am Herzen, Erweik im Urin. Im Dezember 1901 wiederholte Krampfanfälle und Blindheit, außerdem Ödeme. Ende Dezember Exitus. Bei der Sektion findet sich ausgesprochene Vergrößerung des Herzens, besonders eine Hypertrophie der linken Ventrikels, geringes Atherom der Aorta, nekrotische Pericarditis, Nephros. Der Autor sagt selbst, daß über den Zustand der Arterien klinisch nichts erwähnt ist, daß aber Zeichen von Gefäßveränderungen unbedingt vorhanden gewesen sein müssen. Anatomisch fand sich an der operierten Zehe Verdickung der Wänden der mittleren und kleinen Gefäße, was stärksten des Intima. In den großen Gefäßen sind Media und Intima stark verdickt, das Lumen ist zum Teil verschlossen. Das elastische Gewebe hat eine Zunahme erfahren. Ähnliche Veränderungen sind auch in den übrigen Gefäßen des Körpers vorhanden. In den Fußnerven ist ein Anfall von Markschwellung, eine Zunahme von Bindegewebe nachweisbar. Im Stamm des Peroneus erscheint nur eine sehr geringe Zahl von Fasern degeneriert. Spinalganglien und Rückenmark sind normal.

Hier sind also anatomisch wie klinisch schwere arteriosklerotische Veränderungen nachweisbar. Im klinischen Bild sind von vornherein Abweichungen von dem gewöhnlichen Typus der Erythromelalgie zu erkennen. Die Hitze hat einen lindernden Einfluß, die Farbe der erkrankten Teile ist frühzeitig als cyanotisch resp. als blaß gekennzeichnet, und schon im frühen Stadium des Leidens kommt es zur Bildung von Gangrän, die sich ziemlich weit ausbreitet. Ich glaube, daß man auch diesem Fall am besten gerecht wird, wenn man ihn der endarteriellen Gangrän zuzählt, wobei auch hier wieder das Vorkommen erythromelalgischer Symptome als bemerkenswert zu verzeichnen ist.

Eine vorgeschrittene Arteriosklerose bestand auch bei einer Patientin von Kelly, einer 77jährigen Frau, die drei Schlaganfälle erlitten hatte und ein Jahr, nachdem die linke Seite hemiplegisch geworden war, im linken Fuß Symptome von Erythromelalgie, nämlich Schmerzen, Schwellung, Rötung und Hitze zeigte. Neun Monate danach starb sie; eine Sektion konnte nicht gemacht werden. Eine Arteriosklerose bestand ferner auch bei einem alten Mann, den Kaas

demonstrierte. Bei diesem waren vor mehreren Monaten Flecken am rechten Bein entstanden, später trat ein Gefühl des Abgestorben-seins ein und schließlich ein eigentümlicher Farbenwechsel, indem in horizontaler Lage die betreffenden Teile leichenbläß wurden, während beim Herabhängenlassen Rötung und Schmerzen, ebenso wie Füllung der Venen sich einstellten. Hitze steigerte die Beschwerden. In den letzten drei Wochen war an drei Stellen oberflächliche Nekrose eingetreten. Schließlich erwähne ich in diesem Zusammenhange auch noch eine Beobachtung von Kamm, die aber nur ganz kurz mitgeteilt ist. Es handelt sich um einen 36jährigen Mann, der vor 15 Jahren Frostbeulen am rechten Fuß hatte, und sonst immer gesund war. Vor necht Monaten bekam er brennende und stechende Schmerzen und Anschwellung im rechten Fuß. Bei der Untersuchung ergibt sich, daß der Fuß, wenn er herabhängt, heiß, rot und schmerzhaft wird, während beim Erheben ein Absterben des Fußes eintritt. Der Puls ist in der Dorsalis pedis nicht zu fühlen. Die Bedenken, die Diagnose Erythromelalgie bei diesem Falle anzuerkennen, liegen auf der Hand, und ich wäre geneigt, ihn dem intermittierenden Hinken zurechnen.

Von großer Bedeutung ist schließlich noch ein Fall, den Lannois et Parot mitgeteilt haben.

Eine 35 jährige Frau, die stets nervös, reizbar, leicht depressiert war, bekam im Jahre 1887, d. h. 34 Jahre vor der ersten Untersuchung, Schwellung und Rötung der Finger der linken Hand und besonders der zweite Finger war sehr schmerzhaft. Allmählich Ausdehnung der Verfärbung vorw. auf den Handrücken. Die Haut ist rot, gespannt, abschuppend. Einige Jahre später stellte sich in der Mitte des linken Oberarmes eine stützige Schwellung ein, die mit Narbenbildung umherging und mit Wahrscheinlichkeit auf Tuberkulose zurückgeführt wurde. Im Winter 1900 akumulierte sich die Erscheinungen an der linken Hand, Rötung, Schwellung und Schmerzen wurden stärker und reichten bis zum Handgelenk. Im Sommer 1901 plötzlich nach einer Antriebsung Lähmung der linken oberen Extremität ohne Bewußtseinsverlust. Einige Wochen später ebenso Lähmung des linken Beines. Bei der Untersuchung im November 1901 wird eine spontane Parese der linken Seite festgestellt. Der Facialis ist frei, ebenso die Sensibilität. Es besteht eine Hypertrophie des Herzens und Albuminurie, aber keine Ödeme. Die Finger der linken Hand sind jetzt geschwollen, leuchtend rot, sonst ist die Haut vielst mit roten Flecken, glatt, trocken und glänzend bis zur unteren Hälfte des Vorderarmes. Es bestehen spontane Schmerzen, die Hand ist wärmer als die rechte, die Differenz beträgt 1,5—1,8°, die linke Radialis pulsirt etwas stärker, als die rechte. Es besteht eine Tuberculose pulmonum. Eine neue Untersuchung im Juli 1902 ergibt: Hand geschwollen, feucht, violet, fast schwarz, kalt, schmerzhaft. Seit drei bis vier Wochen auch Schmerzen von großer Intensität in den Füßen. In der Pulsa der ersten drei Zehen links und am Außerrande des Fußes gangränöse Stellen. Keine Ödeme, aber Eryth. Im weiteren Verlauf epileptiforme Anfälle. Verschlechterung des Allgemeinzustandes und Exitus Anfang December 1902. Anatomisch findet sich neben den Zeichen der Lungentuberkulose eine Hypertrophie des Herzens, Atherosclerose der Aorta, keine besonders schweren Veränderungen der Arterien der Hirnbasis und multiple Erweichungs-herde in der rechten Hemisphäre. Im Centralnervensystem bestand vorwiegend eine Pyramidenbahndegeneration und zweitens eine Alteration der Zellen des Tractus intermediolateralis, auf die später noch eingegangen werden soll.

Hier bestanden gegen Ende des Lebens zwar deutliche Erscheinungen der Arteriosklerose, aber die Erscheinungen der Erythromelalgie sind viele Jahre vorausgegangen, so daß ein enger Zusammenhang bzw. eine Abhängigkeit der Symptome der Erythromelalgie von der Arteriosklerose nicht ohne weiteres angenommen werden kann.

Wenn wir das hier zusammengestellte Material noch einmal überblicken, so müssen wir sagen, daß die Diagnose Erythromelalgie zwar in einer ganzen Reihe von Fällen gestellt wurde, in denen mehr oder minder ausgesprochene Arteriosklerose nachweisbar war, daß aber von unserem Standpunkt aus in der Mehrzahl dieser Fälle die Diagnose zu großen Bedenken Anlaß gab. Wir sind geneigt, diese Beobachtungen in das Gebiet zweier einander sehr nahestehenden Erscheinungsreihen und Krankheitsbilder zu rechnen: zum intermittierenden Hinken bzw. zur Endarteritis obliterans, und es will uns scheinen, als ob die genannten Beobachtungen wohl geeignet wären, die Symptomatologie dieser Krankheitsbilder zu bereichern durch Hinzufügung von Erscheinungen, die allerdings den bei der Erythromelalgie beobachteten Symptomen sehr nahe stehen. Wir kommen auf diesen Punkt alsbald bei der Besprechung der pathologischen Anatomie und der Pathologie zurück.

Über anderweitige körperliche Störungen ist nichts mehr zu sagen: daß Erythromelalgie sich besonders bei Personen, die an schweren körperlichen Leiden erkrankt sind resp. an Folgezuständen solcher Krankheiten liberieren, findet, wurde oben bei Besprechung der Ätiologie bereits erwähnt, ebenso aber auch, daß sie nicht selten da vorkommt, wo der Allgemeinzustand ein völlig guter ist. Wir werden daher in keinem Falle Störungen dieser Art dem Symptomenkomplexe der Erythromelalgie zurechnen, sondern sie entweder als rein zufällige Akzidenzien oder höchstens als prädisponierende Momente bezeichnen dürfen.

Pathologische Anatomie, Pathologie.

Die Beobachtungen der letzten Jahre haben uns in den Stand gesetzt, von einer pathologischen Anatomie der Erythromelalgie zu sprechen. Es wurde bereits in der Einleitung erwähnt, daß die ersten anatomischen Befunde bei dieser Krankheit von Weir-Mitchell, Dehio und Auerbach herrühren, und zwar betrafen die anatomischen Befunde von Weir-Mitchell und Dehio excidierte Nervenstückchen, während allein Auerbach einen vollständigen Sektionsbefund mitteilte. Später hat dann Weir-Mitchell zusammen mit Spiller noch einen zweiten anatomischen Befund an einer amputierten Zehe und Sachs und Wiener einen solchen an einem amputierten Bein erhoben. Dann folgten die anatomischen Untersuchungen von Elsner,

Lanneux und Porot, die eine vollständige Sektion machen konnten, ebenso wie Hamilton; schließlich sind noch die Befunde von Shaw zu erwähnen.

Der erste von Weir-Mitchell mitgeteilte hieher gehörige Fall ist folgender:

22-jähriger Mann. Februar 1892 fiel ihm ein Stein auf die Vorderseite des rechten Fußgelenkes. Anschwellung des Fußes und des Unterschenkels. Sechs Wochen später begann eine Anschwellung an der Sohle; kein Eiter gebildet. Rechter Fuß wärmer als linker und öfter; in horizontaler Lage schwindet der Unterschied, beim Hinaufsteigen werden erste und zweite Zehe tief dunkelrot, allmähliche Ausdehnung der Rötlichkeit bis über das Malleol. ist. Pulsieren der Arterien, Gefäßwiden der Venen, Hyperästhesie für alle Reize, spontane Schmerzhaftigkeit, Fress- und Aßreflexe des Fußes bei von Störungen. Atrophie der Unterschenkelmuskeln, keine Entzündungsreaktion, keine isolierte Lähmung, leichter Tremor, restlose Spasmen, Fußklonus, Patellarseflex gesteigert. Links alles normal. Die jede Therapie erfolglos blieb, operative Resektion eines Stückes des N. musculocutaneus und der vier Zweige des Saphenus int. Befreiung der beiden plantaren Zweige des Tibialis post. Die Operation brachte erhebliche Besserung, Pat. konnte wieder gehen. Die excidierten Nervenstückchen erwiesen sich bei mikroskopischer Untersuchung als normal.

Dasselbe Resultat hatte die Untersuchung in einem zweiten von Weir-Mitchell mitgeteilten Fall. Auch hier waren resezierte Stücke des Musculocutanens und des Saphenus int. völlig normal. Am fünften Tage nach der Operation trat Gangrän ein, eine Woche später erfolgte der Tod gelegentlich der notwendig gewordenen Amputation.

In dem vorhergehenden Kapitel wurden die anatomischen Befunde in den Fällen von Dehio, Sachs und Wiener, Weir-Mitchell und Spiller, Elsner und Hamilton bereits mitgeteilt. Im letztgenannten Falle handelt es sich um eine allgemeine Sektion, in den anderen wurden nur amputierte Teile untersucht. Wenn wir die in diesen Fällen erhaltenen Befunde noch einmal zusammenstellen, so finden wir, daß es sich in allen in erster Linie um Veränderungen der Gefäße handelte, während die Veränderungen der Nerven demgegenüber durchaus zurücktraten. Im Falle Dehios ergab die mikroskopische Untersuchung des excidierten N. ulnaris normale Verhältnisse, dagegen fand sich eine deutliche Verdickung der Intima und eine Verschnäuerung des Lumens der Arteria ulnaris. Im Falle Sachs und Wiener ergab die Untersuchung schwere Veränderungen in der Arteria tibialis ant. und poplitea nebst ihren Verzweigungen. Am stärksten ist die Intima betroffen, selbst in den Hauptstämmen ist es stellenweise zu einer völligen Verlegung des Lumens gekommen. Die Venen sind nur leicht erkrankt. Die Veränderungen an den Nervenstämmen sind gering, am stärksten noch im N. peroneus profundus, aber auch da findet sich nur Entartung einzelner Nervenfasern. Weir-Mitchell und Spiller fanden eine schwere Erkrankung der Media, Intima und Elastica, die fast bis zum Verschwinden des Gefäßlumens verdickt sind. Auch die Venen-

wandungen sind verdickt. Die Zehenerven zeigen Schwind der Achsen-cylinder, Zerfall des Marks. Eisner stellte eine nur an einzelnen Stellen deutliche Verdickung der Intima der kleinen und großen Arterien fest, an einzelnen Partien der kleineren Gefäße ist eine Infiltration mit Rundzellen sichtbar, die Nerven sind normal. Hamilton fand an der operierten Zehe Verdickung der Wandungen der mittleren und kleineren Gefäße, am stärksten der Intima. In den großen Gefäßen sind Media und Intima stark verdickt, das Lumen z. T. verlegt. Ähnliche Veränderungen sind auch in den übrigen Gefäßen des Körpers nachweisbar. In den Fußnerven läßt sich ein Ausfall von Markseiden und eine Zunahme von Bindegewebe feststellen. Im Stamm des Peroneus scheint nur eine sehr geringe Zahl von Fasern degeneriert, Spinalganglien und Rückenmark sind normal. Schließlich hat auch Shaw über drei Fälle berichtet, in denen er die Diagnose Erythromelalgie gestellt hat und die amputierten Teile anatomisch untersucht wurden. Die Krankengeschichten sind in allen drei Fällen wenig ausführlich, gestatten kein deutliches Bild.

24jährige Frau, seit 2 Jahren Schmerzen im linken Fuß, die blauer beim Herabhängen ist, ebenso in der Wärme. Es findet sich Verdickung der Intima, am stärksten sind die Verdickungen in den Gefäßästen. Die Nerven sind nicht erheblich alteriert.

29-jähriger Mann, bis vor 4 Jahren gesund, dann Gynäcose in der Hand, die durch Wärme getriggert wird, Ödem, trophische Veränderungen der Haut und der Nägel. Verdickung in der Dorsalarterien und Venen, besonders in der Intima. Geringe Veränderungen in der Ventrals und Radialis. Nerven intakt.

20-jährige Frau, vor 18 Monaten nach heftigem Trauma Hand heiß, geschwollen, Haut dann wie poliert. Brennende Schmerzen. Auch hier Veränderungen in den Arterien der Finger. Nerven gesund.

Die Bedenken, die ich schon früher in den Fällen von Dekie, Sachs und Wiener usw. in diagnostischer Hinsicht äußerte, scheinen mir auch gegenüber den Fällen von Shaw durchaus am Platze zu sein, so daß also meiner Ansicht nach in keinem der Fälle, in denen anatomisch schwere Veränderungen der Gefäße nachweisbar waren, die Diagnose als einwandfrei zu gelten hat.

Eine vollkommene Sektion brachte, wie erwähnt, Auerbach in folgendem Falle:

44-jähriger Mann. Wahrscheinlich syphilitisch infiziert. Manigfache Erkältungen und Durchfälle. Winter 1874–1875 Juckreiz und Frieren im rechten Fuß, bald darauf fortwährende Schmerzen im rechten, weniger im linken Bein. 1878 plötzlich für einige Zeit taubes Gefühl im ganzen rechten Bein. Schmerzen traten stärker, besonders nachts; sehr heftiges Hitzegefühl und Rötung, von der Ferse aus allmählich sich auf das ganze Fuß ausbreitend. 15 Jahre lang Beschwerden in derselben furchtbaren Intensität. Manigfache Behandlung durch Nervendehnung ohne Erfolg. Jetzt Morphiumkur. Am ehesten läßt sich kalte Umschläge, Stupas parvus August 1893. Papillen sehr empfindlich, träge Lichtreaktion, Konvergenzreaktion gut. Schwachen im Ausgesprochen. Berührungss-, Schmerz-Temperaturgefühl normal,

doch starke Nachempfindung bei schmerzhaften Reizen. Beiderseits Westphalisches Zeichen. Der ganze rechte Fuß bläut bis zur Mitte des Unterschenkels, im ganzen erheblich geschwollen. Haut gespannt, teilweise sehr heiß. Hirnintelle Lage ebenso wie Kälte vermindert die Bisse. Zehenhaut verdickt. Nägel von parallelen Rissen durchsetzt, z. T. ganz befüllt. Keine Blasen-Mahldarmstörungen, die erst in den letzten Tagen auftraten. 14. März 1896 Tod an Marasmus. Sektion 43 Stunden p. m. Einschießer, wahrscheinlich vorüber Befund in den peripheren Nerven, ebenso an den Spinalganglien. Beträchtliche Degeneration zahlreicher Wurzelbündel in der *Canalis spinalis*, auf der einen Seite mehr als auf der anderen, dem ersten, vielleicht auch dem zweiten Sacralnerven und dem untersten Lendenerven angehörig. Aufsteigende entsprechende Degeneration im Rückenmark, doch so, daß sie in beiden Hintersträngen gleich stark entwickelt ist.

Schließlich muß ich hier noch den Sektionsbefund von dem Falle Lannois und Porot, dessen Krankengeschichte früher schon mitgeteilt wurde, anführen. Es fand sich erstens eine Degeneration der Pyramidenbahnen, die als Grundlage der Hemiplegie in Betracht kommt. Des weiteren ergab die Untersuchung des Rückenmarks mit der Nisslmethode eine Atrophie der ganzen grauen Achse in ihrer linken Hälfte, und zwar im Cervical- und Dorsalmark, nicht im Lumbalmark. Die Zahl der Zellen war ganz erheblich vermindert. Diese Verminderung betrifft zwar alle Zellgruppen, ist aber am stärksten in der äußeren Gruppe. Von den vorhandenen Zellen sind nur wenige annähernd gesund, auch diese im Zustande der Chromatolyse, einige atrophisch pigmentiert. Im Dorsalmark sind die Zellveränderungen ebenfalls noch sehr ausgesprochen. Hier ist das Verschwinden des Seitenhorns und der dort gelegenen Zellgruppen wie auch aus den Abbildungen hervorgeht, sehr deutlich. Rechts liegen etwa fünfzehn meist gesunde Zellen in dieser Partie, links nur zwei bis drei in schwer atrophischem Zustand. Solche Veränderungen sind in allen Schnitten des oberen Dorsalmarks mit derselben Deutlichkeit nachweisbar, auch die Zellen, die an der Basis des Hinterhorns gelegen sind, sind klein, atrophisch, und ein sehr großer Teil der Zellen ist zugrunde gegangen. Die Zellen der Clark'schen Säule sind dem gegenüber intakt. Überall sind die Arterien etwas verdickt. Die untersuchten Nerven (*medianus*, *ulnaris*, *ischiadicus*) zeigen keine Veränderungen.

Zusammenfassend geben die Autoren an, daß die Hauptveränderungen in den Zellen des *Tractus intermediolateralis* sitzen und entsprechend der langen Dauer der Erythromelalgie mehr alten Datums sind.

Schließlich füge ich hier noch den Befund eines Falles an, über den mir Hornowski und Rudzki brieflich Mitteilung machten. Bei einem hereditär belasteten 30-jährigen Mädchen entwickelten sich seit drei Jahren die Symptome einer Kalatonie. Schon bei dem Eintritt in die Irrenanstalt, in der sie von den Autoren beobachtet wurde, war das Aussehen der oberen Extremitäten auffallend. Die Hände besonders

die dorsalen Flächen waren rot mit etwas erhöhter Temperatur. Nach zwölf Tagen Schmerzanfall: die Hände wurden nun purpurrot, geschwollen, heiß. Der Schmerz hörte nach einigen Stunden auf, die Rötung dauerte einige Tage. Allmählich entwickelte sich an allen Extremitäten eine Cyanose, die Farbe variierte zwischen bläulich und dunkelblau. Die Teile waren erkält. Die Cyanose schlug zeitweilig in eine grelle Rötung um, dabei traten Schmerzen auf, die Haut war heiß und geschwollen. Bei solchen plötzlichen Übergängen war die Kranke zeitweilig bewusstlos, doch ohne Krampf. Während 15 Monaten zeigte die Kranke solche Anfälle. Die linke Seite war stärker befallen. Irgendwelche andere nervösen Störungen waren nicht vorhanden. Der Tod erfolgte an Dysenterie. Die Sektion ergab keine makroskopischen Veränderungen, auch mikroskopisch waren keinerlei Veränderungen am Nervensystem nachweisbar; dagegen in den Blutgefäßen der Volamans und der Füße deutliche, auf Verkrümmungen und Zerreißungen der sogenannten Dürckschen Fasern beruhende Alterationen — i. e. der radialen elastischen Fasern in der Wand der Gefäße —, auch in der Haut der Epidermis waren die elastischen Fasern atrophisch. Die Untersuchung der Organe der inneren Sekretion ergab folgendes: eine große Anzahl von chromaffinen Zellen in den sympathischen Ganglien wie auch in der Marksubstanz der Nebennieren; die Zellen waren durch Chromalin sehr dunkel pigmentiert. Die Nebennieren waren groß und schwer. Die Marksubstanz war sehr breit.

In diesem Fall besteht an der Berechtigung der Diagnose Erythromelalgie kein Zweifel. Die gefundenen Veränderungen sind sehr interessant und wichtig. Die Untersuchung erstreckte sich hier zum erstenmal auf Organe, die in diesen Fällen jedenfalls alle Beachtung verdienen. Aber es liegt auf der Hand, daß diese Befunde noch sehr der Bestätigung von anderer Seite bedürfen, ehe der Schluß, den die Verfasser aus ihrer Beobachtung ziehen: die Erythromelalgie ist eine primäre Erkrankung der elastischen Fasern der Haut und der radialen elastischen Fasern der Blutgefäße bei sympathikotonischen Individuen allgemeine Anerkennung findet. Schon jetzt möchte ich hinter das Wort primär ein Fragezeichen setzen. Trotz des negativen Befundes am Nervensystem ist mit der Möglichkeit einer Erkrankung bestimmter sympathischer Abschnitte durchaus zu rechnen; deren Nachweis ist äußerst schwierig; die oben erwähnten Lapinsky'schen Befunde von Veränderungen von Nervenfaser in den Gefäßwänden mit der Methylenblaumethode verdienen in dieser Hinsicht die größte Aufmerksamkeit. Damit haben wir uns aber bereits auf das später zu erörternde Gebiet der Pathologie begeben; kehren wir zur Anatomie zurück.

Ein Blick auf die hier mitgeteilten anatomischen Untersuchungsbefunde lehrt uns weiteres, daß wir auch heute noch von einer sicheren

Kenntnis der pathologischen Anatomie der Erythromelgie weit entfernt sind. Die hier berichteten Beobachtungen betreffen eben klinisch sehr divergierende Fälle, wie nicht mehr weiter ausgeführt zu werden braucht. Daß in einer Anzahl der mit vollkommenem oder partiellem Sektionsbefund veröffentlichten Fälle die Diagnose anzuzweifeln ist, habe ich schon wiederholt hervorgehoben. Der Übersicht halber seien aber die anatomischen Befunde hier noch einmal nebeneinandergestellt.

Einmal fanden sich Veränderungen im Rückenmark, im speziellen eine Zellatrophie im Tractus intermediolateralis (Lannois und Parot) einmal Veränderungen der hinteren Wurzeln (Auerbach); Veränderungen der peripheren Nerven konstatierten Weir-Mitchell und Spiller, Sachs und Wiener und Hamilton, in allen diesen Fällen waren daneben aber auch und zwar in stärkerem Maße, die Gefäße, Arterien und Venen erkrankt. Normal erkrankten sich die Nerven in zwei Fällen von Weir-Mitchell, in den Fällen von Dehio, Elsner und Shaw, während Gefäßveränderungen in den Fällen von Dehio, Weir-Mitchell und Spiller, Sachs und Wiener, Hamilton, Elsner und Shaw, Hornowski und Rudzki vorhanden waren. Im Falle Lannois und Parot, ebenso wie in dem von Hamilton bestand eine allgemeine Arteriosklerose und entsprechende Herzveränderung. Wir sind nicht berechtigt, die Gefäßveränderungen in den acht Beobachtungen als einheitlich bedingt aufzufassen, und auch die Autoren selbst, die sie mitgeteilt haben, geben sich über die Natur der Veränderungen verschiedenen Anschauungen hin.

Trotz der anatomischen Befunde sind wir also in die Notwendigkeit versetzt, in eine ausführliche Diskussion über die Pathogenese der Erythromelgie einzutreten, und uns da mehr oder weniger auf Hypothesen zu stützen.

Weir-Mitchell selbst hat sich in seiner ersten Bearbeitung des Themas sehr vorsichtig über diese Frage ausgesprochen. Er glaubt, daß die von ihm beschriebenen Fälle zusammen mit einigen aus der Literatur entnommenen (von Grenier, Vulpian, Gravez und Paget, dessen Fall allerdings, wie er betont, nicht unbedingt vom Typus abweicht), daß diese Fälle einen unbekannten Typus einer spinalen oder cerebrospinalen Störung darstellen, und daß man sie in Zukunft mit circumscribten Läsionen bestimmter Gegenden zusammen vorfinden wird. Doch betont er, daß das bloße Zusammenkommen von Schmerz mit vasomotorischen Störungen noch kein Recht gäbe, eine Lokalisation der Krankheit zu vermehren. Auch Sturge will eine umfassende Theorie der Pathogenese der Krankheit nicht aufstellen, er sucht nur in seinem speziellen Fall die Gelegenheitsursache für das Auftreten der Krankheit in der produzierten Reizung,

der die vasomotorischen Centren durch Kälte und Nässe mäßigend unterworfen waren.

Lamotte übersieht in seinen Auseinandersetzungen in auffälliger Weise, daß bei der Erythromelalgie außer den vasomotorischen auch mannigfache andere, insbesondere sensible Störungen vorkommen. Indem er nur die vasomotorischen Symptome beachtet und die Erythromelalgie sozusagen als das Gegenstück zur Raynaud'schen Krankheit ansieht, kommt er zu dem Ergebnis, daß die Erythromelalgie nervös wäre, „comme une névrose caractérisée par une diminution considérable du pouvoir excitateur des portions grises de la moëlle qui tiennent sous leur dépendance l'innervation vasomotrice“; wahrscheinlicher erscheint ihm noch, daß dieser Ort der Störung nicht im Rückenmark zu suchen sei, sondern daß die Affektion auf direkte oder reflektorisch bedingte Veränderungen der im Verlauf der vasomotorischen Nervenfasern unweit ihrer Endigungen in den Gefäßwänden gelegenen Ganglien zurückzuführen sei. Von dieser Anschauung ausgehend benennt er die Affektion denn auch als *paralysie vasomotrice des extrémités*, ein Name, der eins der wichtigsten Symptome der Krankheit nicht zur Geltung kommen läßt und daher mit Recht zurückgewiesen wurde. Auch Seeligmüller, der einen Fall in seinem Lehrbuch unter dem Kapitel „über die diffuse Lähmung der Vasomotoren“ angeführt hat und die Ursache der Krankheit in einer Lähmung der betreffenden Centren in der *Medulla oblongata* und im Rückenmark sucht, hat offenbar zu wenig Gewicht auf die sensiblen Störungen gelegt.

Morgan kommt im Anschluß an seine Fälle, in denen sich die Erscheinungen fast stets auf das Gebiet eines Nerven beschränkten, zu folgenden Schlüssen. Die Krankheit ähnelt den Neuritiden und Neuralgien. Als Unterscheidungsmerkmale von den Neuralgien führt er an, daß letztere fast nie doppelseitig seien, daß Kälte meist von ungünstigem Einfluß sei, daß bei Erythromelalgie wenigstens in den späteren Stadien passive, bei Neuralgien aktive Hyperämie vorliege und daß die vasomotorischen und sekretorischen Symptome bei der Neuralgie bei weitem nicht so konstant seien, wie bei der Erythromelalgie; schließlich wäre Lokalisation und Verlauf bei den beiden Affektionen verschieden. Gegen Neuritis spreche, daß meist Sensibilitätsstörungen, Lähmungen, fibrilläre Zuckungen fehlten; dagegen bestände Druckempfindlichkeit, und die Beschwerden würden durch Bewegungen gesteigert. Morgan nimmt an, es handle sich um eine Erkrankung der Nervenscheiden, um eine *Perineuritis*, die durch toxische oder infektiöse Einflüsse bei geschwächtem oder rheumatischem Organismus hervorgerufen werde. Der Schmerz sei durch die *Perineuritis* bedingt, die vasomotorischen Erscheinungen entstanden reflektorisch, durch die Affektion der Nerven würden die vasomotorischen

Centren im Rückenmark erregt und allmählich gelähmt. Wie man sieht, wird in diesem Falle wieder die andere Seite des Symptomenkomplexes in, wie mir scheinen will, unzulässiger Weise bei der Aufstellung der Pathogenese bevorzugt, bzw. eine auf eine Anzahl von Beobachtungen wohl anwendbare Erklärung verallgemeinert.

Am 30. Juni 1892 stellten Gerhardt, Senator und Bernhardt je einen Fall von Erythromelalgie in der Berliner medizinischen Gesellschaft vor. Alle drei rechnen die Krankheit den vasomotorischen Neurosen zu. Am ausführlichsten äußert sich Senator; nach ihm handelt es sich sicher um eine Hyperämie durch aktive Gefäßerweiterung, also um eine Paralyse der Vasoconstrictoren resp. einen Spasmus der Vasodilatoren. Die Ausbreitung auf alle vier Extremitäten, die Symmetrie, die abnorme Erregbarkeit der Gefäßnerven, auch an den nicht pathologischen Stellen (Urticaria) könnte auf einen centralen Sitz deuten, jedoch ist eine periphere Grundlage nicht auszuschließen; auch diese kann, man denke nur an die Polymyritis, eine so verbreitete Affektion bedingen. Auch Senator hebt ausdrücklich den Gegensatz, in dem Raynaudsche Krankheit und Erythromelalgie zueinander stehen, hervor. Wahrscheinlich gäbe es Fälle centralen und solche peripherischen Ursprungs. Die Annahme, daß die Erythromelalgie auf verschiedener Grundlage beruhen könne und nicht eine selbständige Krankheit sei, wird auch von Bernhardt geteilt.

Diese letzte Ansicht wird aber in aller Schärfe erst in zwei ziemlich gleichzeitig erschienenen, eingehenden Arbeiten, die von Eulenburg und Lewin-Benda stammen, ausgesprochen.

Lewin-Benda fassen ihre Meinung in folgendem zusammen: „Der als Erythromelalgie bezeichnete Symptomenkomplex ist keine Krankheit sui generis, sondern teils eine Begleiterscheinung verschiedener Gehirn- und Rückenmarksleiden, teils ein Symptom unter vielen der so überaus symptomreichen allgemeinen Neurosen, Hysterie, Neurasthenie usw., teils ist er als Neuralgie oder Neuritis, teils als Reflexerkrankung aufzufassen. Die Auffassung der Erythromelalgie als vasomotorische Neurose trifft das Wesen der Sache nicht. . . Die vasomotorischen Erscheinungen treten vor dem Hauptsymptom der Schmerzen ganz in den Hintergrund und bilden nur ein nebensächliches Moment. Ihre untergeordnete Bedeutung dokumentiert sich auch darin, daß sie immer erst sekundär auftreten: nicht sie sind es, die den Schmerz hervorrufen, sondern umgekehrt, sie werden von dem Schmerz hervorgerufen, oft erst nach längerem Bestehen desselben.“ Ganz ähnlich liegt die Sache für die Raynaudsche Krankheit, das Gegenstück zur Erythromelalgie. Hier stehen also wieder die sensiblen Störungen ganz im Vordergrund, und die vasomotorischen sind durchaus als sekundäre aufgefaßt.

Eulenburgs Auffassung wird dem klinischen Verhalten der

Symptome der Krankheit weit besser gerecht. Er ist eigentlich der erste, der mit genügender Schärfe ausspricht, daß die Symptome der Erythromelalgie gleichzeitig auf vasomotorischem, sensiblen, oft auch sekretorischem und trophischem Gebiet liegen. Ob die vasomotorischen Symptome durch Depression oder Irritation bedingt seien, wäre kaum zu entscheiden. Eulenburg glaubt, daß die Ursache meist central liege, dafür spreche symmetrisches Auftreten und die Verbindung mit schweren cerebros spinalen Symptomen, aber freilich sei eine gleichzeitige Mitbeteiligung auch peripherischer Nerven keineswegs ausgeschlossen. Obwohl pathologisch-anatomische Befunde bis dahin noch nicht vorlagen, versucht Eulenburg doch eine genaue Lokalisation, und zwar sucht er den Sitz der Erkrankung im wesentlichen in der posterolateralen grauen Substanz.

Wir wollen an dieser Stelle noch kurz der weitergehenden Schlüsse gedenken, die Eulenburg bei dieser Gelegenheit bezüglich einer Reihe von Affektionen zieht, die uns im folgenden in ihrer Mehrzahl noch mannigfach beschäftigen werden. Eulenburg ist geneigt, eine Anzahl von Krankheitszuständen in eine Gruppe zusammenzufassen, die er wie folgt charakterisiert. Es handelt sich um Zustände, die durch Verbindung von lokalisierten, teilweise eigenartigen und typischen Sensibilitätsstörungen mit ebenfalls lokalisierten und eigenartigen Symptomen vasomotorischer, sekretorischer und trophischer Störungen charakterisiert sind, und die in der Regel die Extremitäten, bald die oberen, bald die unteren, bald alle vier, besonders an den distalen Gliedabschnitten, meist in symmetrischer Weise in Mitleidenschaft ziehen. Die Affektionen verlaufen chronisch. Ihren Ausgangspunkt nehmen sie, mag es sich um funktionelle oder organische Schädigungen handeln, von der grauen Achse des Rückenmarks, vorzugsweise sich in deren hinteren und seitlichen Partien etablierend. Durch gelegentlich erfolgende weitere Verbreitung auf weiter nach vorn oder hinten gelegene Abschnitte des Rückenmarksquerschnitts kommt es zu anderweitigen Störungen. Es beachtet ein, daß zu den so charakterisierten Krankheitsbildern die Erythromelalgie zu zählen ist. Auf die anderen Krankheitsbilder, die Eulenburg hier anführt, die Raynaudsche Krankheit, den Graue-Rauziere'schen Symptomenkomplex, ferner die sich auf einen größeren Teil des Rückenmarksquerschnittes erstreckenden und weitere Glieder der Reihe bildenden Krankheitsbilder der Marfan'schen Krankheit, der Syringomyelie, der Tabes ass. gebe ich hier nicht ein.

Ich will nur darauf hinweisen, daß man im Prinzip sich mit der Eulenburg'schen Gruppierung sehr wohl einverstanden erklären kann, wenn auch in vielen Einzelheiten erhebliche Bedenken obwalten. Ergänzend möchte ich auch an dieser Stelle nur wieder, wie schon mehrmals betonen, daß es zahlreiche klinische Bilder gibt, die vermöge

ihrer Symptomatologie in keines der bekannten Krankheitsbilder sich einreihen lassen, und die geeignet sind, als Übergangsformen und Zwischenglieder in die von Eulenburg aufgestellte Reihe sich einzuschieben. Außerdem ist Eulenburgs Aufstellung insofern auch nicht vollständig, als er eine sehr wichtige Affektion, die Sklerodermie, nicht mit in seine Reihe einbezogen hat. Und schließlich gibt die Lokalisation, die Eulenburg versucht hat — Sitz in der hinteren und seitlichen grauen Substanz — zu begründeten Zweifeln Anlaß.

Gehen wir zur Erythromelalgie zurück, so sehen wir, daß Eulenburg vasomotorische, sensible, sekretorische und trophische Störungen bei ihr unterscheidet, ohne in der Pathogenese einem dieser Symptome eine entscheidende Bedeutung beizumessen, daß er sich für einen centralen (spinalen) Sitz ausspricht, aber auch die Annahme einer peripherischen Grundlage nicht gänzlich zurückweist. Als Ursache der Symptome scheint er für die Erythromelalgie kleinere, teilweise nur dynamische funktionelle Veränderungen durch schwächere Veranlagung und durch Erschöpfung der betreffenden gangliösen Apparate anzunehmen.

In seiner späteren, den Gegenstand behandelnden Arbeit nähert sich Weir-Mitchell (1895) im Gegensatz zu seinen früheren Anschauungen mehr der Ansicht derer, die in einer peripheren Neuritis die Grundlage des Leidens sehen, wenigstens in einer Anzahl von Fällen, insbesondere da, wo die Störungen sich auf ein bestimmtes Nervengebiet beschränken. Aber er hat, wie oben bemerkt, in solchen Fällen den excidierten Stamm der betreffenden Nerven mikroskopisch normal befunden, und er kommt daher aus diesen und anderen Gründen zu der Ansicht, es handle sich um „a painful nerve-end neuritis with or without coexistent inflammation of the parent stem.“ Er glaubt, daß durch diese Neuritis die Centren in einen Zustand von Überreizung versetzt werden, durch die Schmerz, Hyperästhesie, Hitze und Rote hervorgebracht werden, und die in einem seiner Fälle durch Resektion des Nerven erzielte Heilung erklärt er so, daß dadurch der Zufuß der Überreizung von seiten der Nervenenden zu den Centren aufgehoben wäre. Freilich können auch in solchen Fällen, wo am ehesten an Neuritis zu denken wäre, Symptome vor, die man gewöhnlich auf spinale Ursachen zurückführt (Fußkloren, Spasmen); aber es seien in seinem Fall die gesteigerten Kniephänomene geschwunden, als nach Exzision und Dehnung des Nerven die Schmerzen nachließen, so daß auch dieses Symptom nicht unbedingt für eine spinale Ursache spreche. Daß eine einfache Erhöhung der Sehnenphänomene an den Beinen, selbst bis zum Klonus ohne ausgeprägte Spasmen nicht notwendig für eine spinale Ursache ins Gewicht fällt, bedarf, glaube ich, keines weiteren Beweises.

Wie man sieht, sind die Ausführungen Weir-Mitchells recht

vorsichtig und der Autor hält sich weit davon entfernt, eine für alle Fälle zutreffende Erklärung geben zu wollen.

Wir übergehen eine Reihe von Autoren, die sich zur Frage der Pathogenese der Erythromelalgie geäußert haben, und dabei, ohne prinzipiell Neues zu bringen, sich bei ihren Aufstellungen immer im wesentlichen an den oder die von ihnen selbst beobachteten Fälle gehalten haben. Sospochen sich für eine centrale Entstehung Prentiss, Nieden, Lévi, Mutschnik, Schenk, Cristiani, Hann, Savill aus, während Pajor, Luzzatto und Bowen an dem peripheren Ursprung festhalten. Collier schließt, und wie man auf Grund seiner Befunde zugeben muß, mit Recht, daß die Erythromelalgie kein seltenes Symptom spinaler Krankheiten sei; er hält es für wahrscheinlich, daß eine Reizung bestimmter Nervenfasern, die die Blutgefäße innervieren, die Ursache des Symptomenkomplexes ist, im weiteren Fortschreiten des Processes würden diese zerstört und es träte dann Vasomotorenlähmung ein. Im übrigen steht die Mehrzahl der genannten Autoren und von weiteren u. a. Rolleston auf dem Standpunkt, daß überhaupt eine einheitliche Pathogenese der Erythromelalgie unwahrscheinlich ist; dementsprechend beantworten die meisten Autoren die Frage ob die Erythromelalgie ein selbständiges Krankheitsbild ist, im negativen Sinne.

Etwas näher müssen wir auf Dehio's Ansichten eingehen, da dieser in der Lage war, sich auf anatomische Untersuchungen zu stützen. Dehio fährt als gegen die Annahme einer neuritischen Entstehung sprechend folgende Momente an: erstens die Verteilung der Störungen, die nicht irgendeinem Nervengebiet entspräche, und ferner die Tatsache, daß die bekannten für Neuritis charakteristischen Zeichen fehlten. Im Gegenteil sei die Ausbreitung der Erkrankung an der Hand sozusagen das Spiegelfeld für die anatomische Lagerung der zugehörigen spinalen Centren, und deshalb spreche alles für eine centrale Ursache der Erkrankung. Aus dem Vorhandensein einer Intima-verdickung der Arterien bei völlig normalem Verhalten der Nerven, ferner aus dem Verschwinden der Hyperämie und der Hyperhidrosis nach Resektion der A. ulnaris und des N. ulnaris schließt Dehio ferner folgendes. Die Hyperämie beruht auf einem abnormen Erregungszustand der Vasodilatatoren, ebenso sind die sekretorischen und sensiblen Störungen auf solche abnormen Erregungszustände zurückzuführen, und damit ist der ganze Symptomenkomplex der Erythromelalgie als Effekt eines abnormen nervösen Erregungszustandes aufzufassen. Er verlegt den Sitz der Erkrankung in die Gegend der Hinterhörner und der Seitenhörner der grauen Substanz des Rückenmarkes; eine Zerstörung dieser Centren liegt nicht vor, nur eine Reizung derselben; aber die Natur der die Reizung bedingenden Veränderungen ist nichts Näheres zu sagen. Als Ursache der lokalen auf einen bestimmten

Gefäßabschnitt begrenzten Arteriosklerose ist entsprechend den von Thoma inaugurierten Untersuchungen eine isolierte Verminderung des arteriellen Gefäßtonus in demselben Gebiet anzusehen. Dehio betont schließlich ausdrücklich, „daß der Symptomenkomplex der Erythromelalgie immerhin eine gewisse Selbständigkeit beanspruchen darf.“

Cavazzini und Bracci beobachteten einen 58jährigen Mann, der seit vier Jahren an den typischen Erscheinungen der Erythromelalgie litt, die sich allmählich vom rechten Fuß auf alle vier Extremitäten ausdehnten. Die Schmerzen wurden durch Gehen so gesteigert, daß Patient immer lag, so kam auf diese Weise zu Beugekontrakturen in den Muskeln. Es bestand nebenbei Arteriosklerose und Vergrößerung des Herzens. Keine Hyperhidrosis, keine Ödeme, keine trophischen Störungen. Während der Anfälle stieg die Temperatur der betroffenen Teile um 2–3°. An diesem Fall stellten die Autoren plethysmographische Untersuchungen an, sie fanden, daß im Anfall jeder angewandte Reiz besonders der Kältereiz eine energische, gegen die Norm gesteigerte Kontraktion der Gefäße bewirkte; die Kontraktion trat sofort ein und dauerte lange an; auch nach Aufhören des Reizes. Nach der Genesung waren die Reflexe normal, später trat übrigens ein Rückfall ein. Die Autoren bekennen sich auf Grund dieser Erfahrungen zu einer ähnlichen Auffassung wie Dehio; sie nehmen als Grundlage des Symptomenkomplexes eine abnorme Reizbarkeit der vasodilatatorischen Centren und eine Hyperästhesie der Gefäße und ihrer Umgebung an.

In seinem kritischen Sammelreferat, das 1900 fast gleichzeitig mit der ersten Auflage dieser Monographie erschien, kommt Kahane zu dem folgenden Resultat. Es liegt kein Grund vor, die klinische Selbständigkeit der Erythromelalgie in Frage zu stellen; das Symptombild kommt teils als selbständige, teils als Begleiterscheinung vor. Man müsse sowohl mit der Möglichkeit einer vasomotorischen Neurose wie mit der Möglichkeit einer anatomisch begründeten Affektion rechnen.

Eine anatomische Begründung für die Ansichten derjenigen Autoren, die für die Pathogenese der Erkrankung eine Affektion der spinalen vasomotorischen Centren heranziehen, ergibt sich, wie es scheint, aus dem Fall von Lannoix et Perot, den wir eben ausführlich mitgeteilt haben. Man muß zugeben, daß der Hauptsitz der evidenten Veränderungen, die in diesem Falle anatomisch nachweisbar waren, spinale Gebiete betraf, die im allgemeinen als die Ursprungsstätte der sympathischen Fasern bzw. als spinale vasomotorische Centren angesehen werden, wenn auch, wie früher betont wurde, unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht noch der vollen Sicherheit entbehren. Die Folgerungen, die die Autoren für ihren Fall aus dem Ergebnis ihrer Untersuchungen

zucken, gipfeln darin, daß sie wären! Die Erythromelalgie ist in diesem Fall das Symptom einer organischen spinalen Läsion, die die Zellen des Tractus intermediolateralis und die basalen Zellen des Hinterhorns betroffen hat. Im allgemeinen, so schließen sie weiter, kann die Erythromelalgie sich als eine vasomotorische Neurose darstellen, die bald an die Erkrankung der peripheren vasomotorischen Nerven, bald und häufiger an die der vasomotorischen Centren besonders der Medulla spinalis gebunden ist; auch ein auf eine Affektion der (peripheren) Arterien zurückgehender Ursprung wird nicht unbedingt abgelehnt. Es ergibt sich für diese Autoren also eine Mannigfaltigkeit der Entstehungsbedingungen. Damit wollen sie aber die Möglichkeit einer Selbständigkeit des Symptomenbildes nicht absegnen.

Unter besonderer Berücksichtigung des Falles von Lannais und Porot, der ja in der Tat sehr wichtig ist, kommt Benoit in dem Bestreben, die widerstreitenden Ergebnisse miteinander in Einklang zu bringen, zu folgender Auffassung: Die Erythromelalgie ist wie die Raynaudsche Krankheit bedingt durch die Störung des peripherischen thermischen Vasomotorenreflexes. Diese Störung wird durch Alteration der medullären vasomotorischen Centren hervorgerufen, Centren, die als Ursprungsstätten des Sympathicums zu gelten haben, und an der Basis der Vorderhörner besonders im Bereich des Tractus intermediolateralis liegen. Diese Veränderungen scheinen bei der Erythromelalgie meist sekundär durch Gefäßveränderungen hervorgerufen zu sein. Die Schwäche dieser Auffassung liegt auf der Hand. Sie nimmt der Erythromelalgie jede Selbständigkeit und läßt sie nur als Symptom gewisser vasculärer Erkrankungen mit bestimmter medullärer Lokalisation gelten, was höchstens für eine Minderzahl von Fällen berechtigt sein könnte.

Besondere Berücksichtigung beanspruchen auch die Ansichten Auerbachs über das vorliegende Thema, da er ebenfalls in einem Falle von sicherer Erythromelalgie eine vollständige Sektion gemacht hat. Leider erklärt sein Befund, was er selbst zugaben muß, die Symptome der Erythromelalgie in keiner Weise. Auerbach bezeichnet ihn mit Recht als den einer Tabes, die sich nur auf einige Lumbal- und Sakralwurzeln erstreckte. Die Hinterstrangsdegeneration ist natürlich eine notwendige Folge der Wurzelekrankung, die Spinalganglien, die peripheren Nerven und die Gefäße scheitern normal zu sein. Von den intra vitam beobachteten Symptomen ist die Deutung der trägen Pupillärlichtreaktion bei dem bestehenden chronischen Morphinismus eine zweifelhafte. Die Wurzelekrankung erklärt die tabischen Symptome der lancinierenden Schmerzen und des Fehlens der Patellarreflexe, der Befund erklärt aber nicht, warum es zur Erythromelalgie kam; denn „wir kennen zahlreiche Erkrankungen von Hinterwurzelfasern, bei denen jenes Symptom nicht beobachtet wurde. Es

muß also in dem untersuchten Fall ein Mehr von Erkrankung bestanden haben, dieses darf man vielleicht in der Beteiligung von vasomotorischen, dem Sympathicus zugehörigen Bahnen suchen" (Auerbach). Es fehlt aber eine bestimmte Möglichkeit, die Erscheinungen der Erythromelalgie auf die konstatierte Wurzerkrankung zu beziehen, schon aus folgendem Grunde. Es ist in dem Untersuchungsprotokoll zwar angegeben, daß die Erkrankung der Cauda equina auf der einen Seite viel stärker war als auf der anderen, aber es fehlt die Angabe darüber, ob die stärker erkrankte Seite die dem Sitze der Erythromelalgie entsprechende war. In den Hintersträngen war überhaupt keine wesentliche Differenz zwischen den beiden Seiten vorhanden. Alles in allem ist eben der anatomische Befund in diesem Falle nur der einer wenig entwickelten Tabes, und als solcher kann er auch nur zur Erklärung der intra vitam beobachteten tabischen Symptome herangezogen werden. Da übrigens auch die Schmerzen auf einer Seite stärker waren, so hätte darin die Inkongruenz der Degeneration der beiderseitigen Cauda equina-Bündel ihr genügendes klinisches Äquivalent gefunden. So scheint uns auch die Auerbachsche Beobachtung nicht die ersuchte Lösung der Frage.

In Weir-Mitchells und Spillers Fall fanden sich kombiniert neuritische und arteritische Veränderungen. Die Autoren halten es für wahrscheinlicher, daß in ihrem Fall für die Symptome der Erythromelalgie die periphere Neuritis verantwortlich zu machen ist. Sie sind der Meinung, daß die Arteriosklerose zum großen Teil oder selbst ganz dem vorgerückten Alter ihres Patienten (61-jähriger Mann) zuzuschreiben ist. In diesem Alter ist diese Affektion etwas Gewöhnliches, die Erythromelalgie dagegen eine Ausnahme. Ferner kommen zwar häufig Taubheit und Kriebeln in den Fingern als Resultat von Gefäßerkrankungen vor, aber ganz ungewöhnlich wären die schweren Zeichen der Erythromelalgie. Spiller hat in einer späteren Diskussion diesen Standpunkt noch einmal und mit guten Gründen gewahrt. Daß aber nicht immer eine Neuritis die Ursache der Erythromelalgie sein kann, beweist auch der Autoren eigene Meinung Auerbachs Fall. Man müsse schließen, daß eine Affektion der sensiblen Fasern zwischen dem Rückenmark — oder vielleicht auch im Rückenmark — und den peripheren Verzweigungen unter gewissen Bedingungen imstande ist, Erythromelalgie zu erzeugen. Spiller meint in der erwähnten Diskussion, daß die Symptome vielleicht nur dann eintreten, wenn die vasomotorischen Fasern ergriffen sind. Wir wäßen ja, daß gewisse Gifte bestimmte Fasern in bestimmten Nerven ergreifen, Eschauer äußerte ähnliche Anschauungen; er denkt an toxische Erkrankungen der Nerven, die aber vielleicht auch die Gefäße mit affizieren, und möglicherweise sei gerade diese Kombination das typische an der Erkrankung. Kast gibt der Ansicht Ausdruck, daß die Ursachen

des Leidens in einer Alteration der Nerven, die die Gefäße versorgen, zu suchen sei.

Diesen Vorstellungen von der vorwiegend oder ausschließlich neurotischen Natur der Erythromelalgie gegenüber fassen Sachs und Wiener ihre Ansicht in folgende Worte zusammen: „Die Erythromelalgie, wenn auch nicht eine selbständige Erkrankungsform, tritt doch öfters als eine unabhängige Symptomengruppe auf; in unkomplizierten Fällen ist dieselbe mit Wahrscheinlichkeit auf Erkrankung der peripheren Arterien zurückzuführen, die obliterierende Endarteriitis mag indirekt mit centralen Erkrankungen zusammenhängen, doch läßt sich nach unserem ersten Fall behaupten, daß dieselbe von solchen Einflüssen unabhängig sein kann. Zieht man ähnliche Krankheitsbilder zum Vergleich heran, namentlich solche, welche nach chronischen Herz- und Gefäßerkrankungen auftreten, so wird es im höchsten Grade plausibel, daß es sich bei der Erythromelalgie weit mehr um eine Erkrankung der Arterien, als um eine Affektion der Nerven handelt.“ Auch Shaw gibt seiner Überzeugung Ausdruck, daß die Erythromelalgie stets dann, wenn sie sich unabhängig von einer Veränderung des Centralnervensystems entwickelt, mit einer Veränderung der lokalen Gefäße einhergeht, und darauf die Krankheit zurückzuführen ist, ebenso Elsner, der die Einseitigkeit des Leidens in Frage stellt.

Hamilton kommt auf Grund der anatomischen Untersuchungen in seinen eigenen und in den Fällen der Literatur zu dem Schluß, daß die Krankheit in nahen Beziehungen zur Friedländerschen Endarteriitis obliterans steht, und eher auf derartige Prozesse als auf eine Veränderung des Rückenmarks zu beziehen ist. Er macht immerhin aber bemerkenswerte Einschränkungen, wenn er sagt, daß bevor wir zu einer definitiven Entscheidung in bezug auf die Lokalisation der eigentlichen Krankheitserscheinungen kommen können, das Gefäß- und das gesamte Nervensystem einschließlich der sympathischen Ganglien sehr sorgfältiger Untersuchungen bedarf. In seinem eigenen Fall wies einseitiges Schwitzen auf das Vasomotoriensystem hin. Auf den Fall von Rudzki und Hornowski, bei dem die Untersuchung zum ersten Male auf das chromaffine System, das ja zweifellos mit dem sympathischen System im engeren Sinne in Zusammenhang steht, ausgedehnt wurde, weise ich hier noch einmal hin. Ich möchte sagen, er erweckt Ansichten und Ausblicke, ohne aber bereits eine sichere Grundlage zu schaffen.

Es stehen sich also in dieser Frage noch mannigfach widerstreitende Ansichten gegenüber. Erinnern wir uns noch einmal des klinischen Bildes, unter dem die Erythromelalgie uns entgegentritt, es werden wir als wichtige Tatsache vor allem festzuhalten haben, was Eulenburg besonders betont, daß wir es bei der Erythromelalgie nicht allein

mit vasomotorischen, sondern auch mit sensiblen, sekretorischen und trophischen Veränderungen zu tun haben. Die klinische Beobachtung gibt uns kein Recht, eines dieser Symptome als das die Krankheit allein bestimmende und charakterisierende zu bezeichnen. Wir können vielmehr die Krankheit resp. das Symptomenbild nicht anders definieren, als daß wir als Kardinalsymptome anfallsweise auftretende, heftige, brennende, meist an den zipfelnden Teilen sitzende Schmerzen und eine an denselben Stellen lokalisierte Hyperämie hinstellen. Die Hyperämie charakterisiert sich wenigstens im Anfang durch ihre Eigenschaften sicher als eine aktive Räte, (Hitze, Schwellung, Gefäßpulsationen); zu diesen beiden Kardinalsymptomen treten in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen Störungen der Schweißsekretion, meist Hyperhidrosis, und der Ernährung der Gewebe, ohne daß die klinische Fieschung zwischen den Kardinal- und den Begleitsymptomen in irgendeiner Weise ein bestimmtes Verhältnis erkennen läßt.

Die klinische Beobachtung berechtigt uns in der Tat nicht, den Schmerzen, wie das vielfach geschehen ist, stets die erste Rolle zuzuteilen, denn wenn diese auch in einer nicht geringen Anzahl von Fällen zölich zuerst auftreten, so gibt es andererseits genug Beobachtungen, in denen beide Symptome gleichzeitig auf der Bildfläche erscheinen, und vereinzelt solche, in denen die Räte die Szene einleitet. Zudem sind wir über den Blutgehalt der tieferen Teile meist im unklaren, es wäre wohl möglich, daß dort eine Hyperämie schon besteht, wenn sie auch klinisch nicht zum Ausdruck kommt.

Wir werden also auch hier wie bei den Akroparästhesien an der relativen Unabhängigkeit der Symptengruppen zunächst festzuhalten haben, wenn wir auch nicht leugnen wollen, daß vielleicht in einem Teil der Fälle die Hyperämie reflektorisch bedingt ist.

Für die Schmerzen haben wir als Grundlage selbstverständlich Erregungen sensibler Bahnen und Centren anzusehen. Die Erscheinungen der Hyperämie werden ausgelöst entweder durch Lähmung der Vasoconstrictoren oder durch Erregung der Vasodilatoren der Arterien und Venen. Es erscheint auch mir näher liegend, da wir nun einmal für die Entstehung der Schmerzen Erregungszustände annehmen müssen, solche auch für die vasomotorischen Symptome als Ursache zu supponieren und somit eine pathologische Reizung der Vasodilatoren anzunehmen. Die Art der Hyperämie scheint die gleiche zu sein, ob sie nun durch Reizung der Vasodilatoren oder durch Lähmung der Vasoconstrictoren zustande kommt. Auf letztere führen wir z. B. die Erscheinungen am Ohr des Kaninchens zurück, dem der Sympathicus durchgeschnitten wurde; auch hier sehen wir aber klar das Bild der aktiven, kongestiven Hyperämie vor uns.

Mit der Annahme eines irritativen Prozesses steht es im Einklang, daß wir für die sekretorischen Störungen, die meist in Form der Hyperhidrosis auftreten, ihrer Natur nach ebenfalls einen pathologischen Reizzustand der sekretorischen Nerven als Ursache für wahrscheinlich halten müssen.

Viel schwieriger ist es, sich von dem Zustandekommen der trophischen Störungen ein einigermaßen klares Bild zu machen. Es scheint mir zunächst, nach der Art und der Häufigkeit der bei der Erythromelalgie beobachteten trophischen Störungen, über die wir oben eingehend berichteten, nicht zweifelhaft, daß wir ihre Zugehörigkeit zu dem Symptomenkomplex der Erythromelalgie anerkennen müssen. Über ihre Pathogenese aber kann man sehr verschiedener Ansicht sein. Sie ohne weiteres als Folgeerscheinung der Gefäßlähmung, also etwa der Überflutung der Gewebe mit Nährstoffen, die dieselben dann nicht zu verarbeiten imstande wären, anzusehen, ist unstatthaft; denn wir finden keinerlei konstantes Verhältnis zwischen der Art, der Intensität und der Dauer der vasomotorischen Störungen und den Störungen der Ernährung. Daß letztere nicht sofort in Erscheinung treten, sondern meist erst nach längerer oder kürzerer Zeit, beweist nichts für ihre sekundäre Natur: sie brauchen eben, ihrer ganzen Art nach, längere Zeit zu ihrer Entwicklung. Zudem beweist eine große Anzahl oben aufgeführter Fälle, daß ein jahrelanges Bestehen schwerer vasomotorischer Störungen sehr wohl mit einer völligen Integrität der Trophik der Gewebe vereinbar ist.

Daß die Ernährungsstörungen nicht direkte Folgen der sensiblen Störungen sein können, liegt auf der Hand. Wir haben es ja nicht mit Anästhesien, sondern mit Hyperästhesien zu tun, und die Patienten werden sich daher vor allen äußeren Schädlichkeiten noch mehr zu schützen suchen, als der normale Mensch.

In den einleitenden Kapiteln haben wir auseinandergesetzt, daß bisher keine Tatsachen der Physiologie oder Pathologie vorliegen, die uns zur Annahme besonderer trophischer Nerven zwingen. Daß auch die trophischen Symptome der Erythromelalgie nicht deartig sind, liegt auf der Hand. Wir kommen vielmehr auch hier mit der Hypothese aus, daß durch die abnormen Erregungszustände in den sensiblen Bahnen, die sowohl die Haut, wie auch die Gefäße und die übrigen Gewebebestandteile versorgen, der trophische Einfluß, den das Nervensystem auf das Gewebe ausübt, in pathologischer Weise modifiziert wird. Wenn wir uns erinnern, daß experimentelle Untersuchungen angestellt worden sind, die durch Reizung gemischter Nerven aktive Hyperämie hervorbrachten, und daß ferner in diesen Versuchsresultaten allmählich anatomisch nachweisbare Gefäßveränderungen etablieren, so werden wir daran denken müssen, ob nicht bei der Erythromelalgie auch allmählich solche Gefäßveränderungen sich einstellen könnten. Es wäre

daher sehr wohl denkbar, die hier gefundenen, unbeschriebenen Gefäßveränderungen in dieser Weise aufzufassen. Es berührt sich dieser Gedankengang sehr nahe mit dem von Debio innegehaltenen. Ich erinnere in diesem Zusammenhange auch an die späteren Untersuchungen von Lapinsky, der nach Durchschneidung der betreffenden peripheren Nerven (s. oben S. 117) nicht allein Gefäßveränderungen feststellte, sondern auch an den die Gefäße begleitenden und umspannenden vasomotorischen Nervenfasern — markhaltigen und marklosen — schwere Alterationen nachweisen konnte. Er sucht in der Degeneration der Nervenfasern die Ursache der Gefäßveränderungen. An pathologischem Material sind derartige Untersuchungen bisher noch gar nicht angestellt worden; die betreffenden histologischen Methoden sind ja sehr empfindlich. Immerhin wäre die Möglichkeit dazu wenigstens dort, wo es sich um Amputationen handelt, wohl gegeben. Ob wir ein Recht haben, auch größere Gefäßwandveränderungen auf (anatomische oder dynamische) Veränderungen des Nervensystems, insbesondere der vasomotorischen zurückzuführen, muß späteren Untersuchungen überlassen bleiben. Jedenfalls werden solche Gefäßveränderungen im weiteren Verlauf ihrerseits wieder neue Ernährungsstörungen hervorzurufen geeignet sein. Sehr bemerkenswert ist, daß nur die Haut und ihre Adhese betroffen werden, während die Muskeln entsprechend ihrer in normaler Weise erhaltenen direkten Innervation nicht oder nur unwesentlich (allgemeine, nicht hochgradige Atrophie) geschädigt werden. Warum freilich in dem einen Fall von Erythromelalgie Ernährungsstörungen auftreten, in anderen nicht, das entzieht sich, wie stets in ähnlichen Fällen, unserer Kenntnis. Unseren allgemeinen Anschauungen entspricht es aber, daß auch hier wieder gerade Reizeffekte trophische Störungen hervorzubringen geeignet sind. Am ehesten deckt sich übrigens die Art dieser Störungen mit der bei den traumatischen Neuritiden beobachteten glossy skin, wie denn überhaupt gewisse Formen der Erythromelalgie unzweifelhaft dem bei dieser Affektion der peripheren Nerven bekannten Bilde sensibler, vasomotorischer und anderer Störungen nahe stehen.

Bisher sind wir bei dem Versuch, eine Pathogenese der Erythromelalgie zu geben, mit der Annahme von pathologischen Reizzuständen in den Bahnen und Centren der sensiblen, sekretorischen und vasodilatatorischen Nerven gut ausgekommen. Dabei hatten wir freilich stets nur das typische, reine Bild der Erythromelalgie vor Augen. Wie steht es mit der Erklärung der zahlreichen abweichenden Formen? Es fand sich da öfter, wie wir sahen, der aktiven Hyperämie vorausgehend, oder auch ganz an ihre Stelle tretend, die lokale Synkope. Wir haben bereits im vorigen Kapitel dies Symptom als durch Reizung der Vasoconstrictoren bedingt geschildert. Also auch hier noch Reizwirkung, die freilich bereits auf andere vasomotorische Nerven übergeht.

Des weiteren tritt bei sehr vielen Fällen von Erythromelalgie, wenn die aktive Hyperämie erst einige Zeit bestanden hat, eine Veränderung des Bildes ein, indem die Rote der kranken Teile sich in eine mehr cyanotische Farbe verwandelt und an die Stelle der Erhöhung der Temperatur eher eine Erniedrigung tritt. Wir haben nun ebenfalls bereits in dem einleitenden Teile Tatsachen kennen gelernt, die den eben genannten in vieler Beziehung ähnlich sind. Wir erfahren, daß allmählich nach Sympathirisdurchschneidung ebenso wie nach Durchschneidung jedes anderen peripheren vasomotorischen Nerven ganz die gleichen Veränderungen in dem klinischen Bilde eintreten, wie wir es eben für die Erythromelalgie erwähnten. (Versuche von Schiff, Landois, Lewaschew, Lapinsky). Die Hauptrolle spielt dabei die Verlangsamung des Kreislaufes, die dadurch und durch die Erweiterung der Gefäße bedingte erhöhte Wärmeabgabe, die verringerte Oxydation des Blutes usw.

In der Mehrzahl der Fälle wird bei der Erythromelalgie durch Wärme, durch Bewegung und durch Herabhängenlassen der erkrankten Glieder Schmerz, Rötung und Hitze gesteigert.

Alle diese Momente bedingen bekanntlich eine Erweiterung der Gefäße, die einen mehr im Sinne der aktiven, die anderen im Sinne der passiven Hyperämie, durch Erschwerung des venösen Rückflusses wirkend. Immerhin scheint die Reaktion auf diese Momente bei der Erythromelalgie doch eine viel erheblichere zu sein als in der Norm. Daß dabei die aktive Hyperämie eine weit größere Rolle spielt als die passive, lehrt die Tatsache, daß sich in diesen Fällen die Temperatur beim Herabhängenlassen nicht unbeträchtlich erhebt, während sie umgekehrt im normalen Zustande, wie Weir-Mitchell festgestellt hat, herabsinkt. (Siehe oben die speziellen Angaben über diesen Punkt.)

Vereinzelte fanden wir auch lokale Symptome sensibler und motorischer Ausfallserscheinungen. Soweit dieselben nicht als Erscheinungen von Komplikationen der „reinen“ Erythromelalgie zu deuten sind, müßte man annehmen, daß der ursprüngliche Erregungszustand zunächst einmal in den sensiblen Nerven einem partiellen Lähmungsstand Platz gemacht hat und dadurch die fast stets recht geringfügigen Anästhesien bedingt sind. Zum Teil dürften übrigens die Anästhesien durch rein mechanische Verhältnisse (Aufquellung, Verdickung der Haut) hervorgerufen sein, wie schon von verschiedenen Seiten betont wurde. Für die Lähmungen müßte man ein Ergriffensein der motorischen Leitungsbahnen supponieren. Doch verdient es gerade alle Beachtung, wie ungewöhnlich diese Symptome bei der Erythromelalgie sind.

Im ganzen können wir also die lokalen Symptome der Erythromelalgie auf Reizzustände in bestimmten sensiblen, vasomotorischen und sekretorischen Bahnen oder Centren

zurückführen. Die weitere Frage ist die, an welcher Stelle ihrer Bahn werden diese Systeme betroffen, und welcher Art ist der Reiz, der sie produziert. Vergewärtigen wir uns den Verlauf der hier in Frage kommenden Bahnen und die Lage der zugehörigen Centren. Schmerz wird durch alle, die peripheren sensiblen Bahnen treffenden Reize ausgelöst, aber es erscheint auch nicht mehr zweifelhaft, daß es auch central entstandene Schmerzen gibt, die allerdings wohl seltener sind. — Über die Bahnen der Vasomotoren, insbesondere auch der Vasodilatatoren haben wir das bisher Bekannte in der Einleitung zusammengestellt. Aus dem dort Gesagten geht hervor, daß die Bahnen dieser Nerrengattung sehr weit ausgedehnt, daß ihre Centren sehr mannigfach und sehr zerstreut sind. Von der Großhirnrinde aus zu subcorticalen Centren, dann weiter zu dem großen Vasomotoriumcentrum in der Medulla oblongata, von da aus weiter auf noch nicht sicher festgestellter, wahrscheinlich in den Seitensträngen liegender Bahn zu den Rückenmarkscentren im Seitenteile der grauen Substanz, im Dorsal- und oberen Lumbalmark, dann von dort aus teils durch die vorderen Wurzeln und die *Rami communicantes* zum Sympathicus und in dessen Verzweigungen weiter zu den spinalen Nerven, teils auch durch die hinteren Wurzeln und teils direkt mit den spinalen Nerven ziehend, fährt ihre Bahn zu den Endverzweigungen, und auch an dieser letzten Station sind wahrscheinlich noch subordinierte Centren eingeschaltet.

Wir sind bisher noch nicht in der Lage, aus klinischen Gesichtspunkten, d. h. aus der Art der Circulationsstörung feststellen zu können, welcher Teil der Vasomotorenbahn pathologisch affiziert ist, während uns das bei den motorischen Reiz- und Ausfallserscheinungen (corticale, spinale, periphere Lähmungen) und auch bei den sensiblen nach der Art (dissoziierte Empfindungslähmung) und Lokalisation (periphere, radikuläre, segmentäre Anästhesien) sehr wohl möglich ist. Diesem erheblichen Mangel unserer Kenntnisse können wir nur dadurch einigermaßen begegnen, daß wir sorgfältig auf die die vasomotorischen Symptome mit gesetzmäßiger Regelmäßigkeit begleitenden andersartigen Symptome achten.

Bei der Erythromelalgie sind das vor allem die sensiblen Reizerscheinungen. Können wir darüber, wo diese sitzen müssen, etwas Bestimmtes aussagen? Zunächst können wir nur negativ feststellen, daß in der Mehrzahl der Fälle die Schmerzen nicht der Bahn eines peripheren Nerven folgen und ferner auch nicht die Grenzen der entsprechenden radikulären Verteilung innehalten. Auch in der Art der Schmerzen dürfte vielleicht ein Unterschied gegen die gewöhnlichen neuritischen und neuralgischen Schmerzen zu finden sein. Dieser tief sitzende, brennende, schlecht abgrenzbare, dauernde, wenn auch exazerbierende Schmerz ist etwas

anderes, als der Schmerz, den uns die an Neuralgie leidenden Kranken im allgemeinen schildern. Analoge Zustände scheinen am ehesten dann einzutreten, wenn im „erfrorenen“ Glieder allzurauch, etwa durch plötzlichen Eintritt in ein warmes Zimmer, das Blut wieder einströmt. Alles das erweckt den Gedanken eines an eine Alteration der Gefäße gebundenen Schmerzes.

Die Frage, inwieweit Gefäßerkrankungen mit Schmerzen einhergehen, und die weitere inwieweit durch Affektion des Sympathicus Schmerzen erzeugt werden, ist bisher nicht exakt gelöst. Es ist ja bekannt, daß im allgemeinen die vom Sympathicus innervierten Gebilde im normalen Zustande nicht schmerzempfindlich sind, daß dagegen bei Erkrankungen dieser Organe ganz enorme, meist schlecht lokalisierte Schmerzen entstehen können (Busch, Lennander, Müller, Hoffmann u. a.).

Die Zahl der centripetal leitenden Elemente des Sympathicus ist nach anatomischen Untersuchungen nicht sehr groß; immerhin sind solche sicher vorhanden und es ist die Annahme wahrscheinlich, daß Reizung dieser Fasern die Schmerzen verursacht. Freilich fehlen solche bei Affektionen des Halsympathicus meist vollkommen, auch wenn sonst sichere Erscheinungen der Reizung dieses Nerven vorliegen, also z. B. Mydriasis und Enge der Gefäße. Die Entstehung der „sympathischen“ Schmerzen muß demgemäß auch in Beziehung zur Art des krankmachenden Reizes stehen. Was insbesondere die Frage der Gefäßschmerzen angeht, so muß da an verschiedene Entstehungsmöglichkeiten gedacht werden, die zum Teil von der Art des zugrunde liegenden Leidens abhängig sind. Über die arteriosklerotischen Schmerzen hat vor kurzem Goldscheider ausführlich gesprochen. Es ist ihnen keine einheitliche Entstehung zu eigen. Durch Druck können vorüberziehende sensible Nerven gereizt werden, das ist ein akzidentelles, nicht im Wesen der Sache liegendes Moment. Die in der Adventitia gelegenen sympathischen Nervengelächte werden gereizt und übertragen ihren Erregungszustand auf die mit dem betreffenden Sympathiegebiet in gleicher Höhe liegenden spinalen Segmente (referred pains im Sinne von Head). Auf der anderen Seite ist es aber durchaus nicht ausgeschlossen, daß die Schmerzen durch die Alteration der centripetal leitenden Nerven der Blutgefäße selbst ausgelöst werden. Wenn diese auch im normalen Zustande ebenso wie die übrigen gleichgearteten Elemente des Sympathicus nicht schmerzleitend sind. Wir werden uns erinnern, daß außer Nervengelächten und freien Endigungen, wie sie Dogiel nachgewiesen hat, auch Vater-Pacini'sche Körperchen in der Gefäßwand (Adventitia) gefunden wurden, die als Reizaufnahmer in Frage kommen. Die Sensibilität der inneren Gefäßwand bildet ein noch „unerforschtes Problem“ (Goldscheider).

Für die Schmerzen bei der Erythromalgie erscheint die An-

nahme, daß sie durch direkte Reizung der in den Gefäßwänden liegenden sensiblen Elemente entstehen, die einfachste und nahelegende zu sein. Vasomotorische und sensible Reizsymptome fallen immerhin örtlich und zeitlich doch recht nahe zusammen. Wie auch bei den Akroparaesthesien sind wahrscheinlich also irritative Zustände der vasosensiblen Fasern verantwortlich zu machen. Dabei ist aber zu betonen, daß auch hier wie bei den Schmerzen der inneren Organe die Entstehung des Schmerzes in Beziehung zur Art des pathogenen Reizes stehen muß.

Hier wie ebenfalls bei den Akroparaesthesien, weicht sowohl die Art des Schmerzes wie die Lokalisation von den neuritischen und zumeistlich den neuralgischen Schmerzen durchaus ab — vielleicht sind die Schmerzen der Beriberi ähnlicher Natur, wo vasomotorische Symptome soweit in den Vordergrund rücken, wo man auch sehr wohl an vasosensible Störungen denken kann und wo auch symptomatische Erscheinungen von Erythromelalgie vorkommen (Shimozono, Hirose). Wichtig für die Auffassung dieser Schmerzen ist auch die Tatsache, daß sie, wie wir ja vielfach betont haben, von solchen Momenten abhängig sind, die die Gefäßfüllung beeinflussen: Hitze, Stellung der Glieder. Wir dürfen als Fazit unserer Erwägungen zunächst nur das folgende sagen: Alles was wir über die Symptomatologie der Erythromelalgie wissen, weist uns auf das Vasomotoriensystem als den Sitz der Erkrankung.

Wenn uns unsere Kenntnisse über die Art und Verteilung der vasomotorisch-sensiblen Erscheinungen der Erythromelalgie keine genauere Lokalisation im Vasomotoriensystem gestatten, so müssen wir versuchen, die übrigen Symptome zur Aufklärung heranzuziehen, bzw. die Grundlage, auf der diese Symptome sich entwickeln, einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.

Wir haben mehrfach gesehen, daß die Symptome der Erythromelalgie nur in einer Minderzahl von Fällen isoliert auftreten, daß meist eine große Reihe anderer Symptome bei den von Erythromelalgie befallenen Patienten vorhanden ist. Diese Symptome lassen sich, wie wir sahen, teils auf Erkrankungen des peripherischen, teils des centralen und zwar sowohl des cerebralen wie des spinalen Nervensystems zurückbeziehen und sind offenbar sowohl funktioneller als organischer Natur.

Das hat mit Notwendigkeit zu der Anschauung geführt, daß die Symptome der Erythromelalgie einem verschiedenen Ursprung haben können, und ich glaube in der Tat, daß diese Anschauung berechtigt ist.

Dort, wo die lokalen Erscheinungen sich im Gebiete eines Nerven abspielen, wird man zunächst an eine lokale Erkrankung eines Nerven zu denken gezwungen sein. Es mag dabei gleich bemerkt werden, daß

wenn diese Beschränkung auf ein Nervengebiet nicht immer eine völlig strikte ist, dies schließlich nicht absolut gegen den peripheren Sitz der Erkrankung spricht. Ein Irradiieren des heftigen Schmerzes kommt wohl auch bei der Neuralgie vor. Außerdem rechnen wir ja mit der Möglichkeit, daß nicht sowohl die spinal-sensiblen, wie die sympathisch-sensiblen Fasern irritiert sind, resp. daß der Schmerz ein im Headsehen Sinne übertragener ist. Bei den vasomotorischen Symptomen ist zu bedenken, daß wir nicht mit aller Sicherheit behaupten können, daß die vasomotorischen Nerven in der Peripherie stets und immer genau dem Verlauf der sensiblen Nerven folgen; ich erinnere an die Untersuchungen von Simons, der wenigstens für die vasomotorischen Fasern der oberen Extremität nachwies, daß sie nur im Medianus und Ulnaris verlaufen; ferner würde eine mannigfache Anastomosenbildung der peripheren Gefäßnerven, die bei der entsprechenden reichen Anastomosierung der Gefäße selbst als wahrscheinlich anzunehmen ist, ein gewisses Überschreiten bestimmter Nervengebiete wohl zu erklären imstande sein. Es hat nun gewiß keine Schwierigkeit, sich vorzustellen, daß durch irgendein krankmachendes Agens nur sensible, vasomotorische und eventuell sekretorische Fasern in einen Reizzustand versetzt werden, während die motorischen frei bleiben. In mehreren Fällen sprach die Druckschmerzhaftigkeit der Nerven auch direkt für einen solchen Prozeß. Freilich hat, wie oben gezeigt wurde, in einem solchen Falle die anatomische Untersuchung im Stamm der betroffenen Nerven keinerlei Abnormität ergeben, so daß der Autor, der dies beobachtet hat, Weir-Mitchell die Ansicht äußerte, es handle sich hier um Reizzustände in den Endverzweigungen des Nerven. Andererseits ist es sehr wohl denkbar, zumal bei der Art des zu supponierenden Reizes, der keine Ausfallserscheinungen, sondern nur intermittierende Reizerscheinungen macht, daß wir mit unseren heutigen Methoden eine pathologische Veränderung, auch wenn eine solche im Stamm des Nerven vorhanden ist, nicht nachweisen können; man denke nur an das gleiche Verhalten bei den Neuralgien. Eine Erfahrung Weir-Mitchells selber spricht sogar in diesem Sinne. Weir-Mitchell konnte in einem seiner Fälle eine fast völlige Heilung durch Excision des Nervenstammes herbeiführen; das ist schwer zu verstehen, wenn wir an einer auf die Endäste des Nerven beschränkten Reizung als Ursache der Symptome festhalten. Weir-Mitchell nimmt eine reflektorisch durch die peripheren Reize bedingte Übererregung der Centren, die nach der Operation natürlich wegfiel, an, um seinen Heilerfolg erklären zu können. Es ist doch wohl einfacher, diese Erklärung fallen zu lassen und sich vorzustellen, daß unsere Untersuchungsmethoden die supponierten Veränderungen im Nerven nicht erkennen lassen, ganz in Analogie mit der Neuralgie; wie bei dieser ist ja trotzdem ein gewisses Mitgriffensein der Centren innerlich wahrscheinlich.

Diese Fälle ähneln in der Tat also den Neuralgien, ohne daß man aber berechtigt ist, sie ohne weiteres den Neuralgien einzureihen. Dagegen spricht das Hervortreten der vasomotorischen und sekretorischen Erscheinungen; auch die Art des Schmerzes ist eine andere als bei der gewöhnlichen Neuralgie; ferner werden oft mehrere, bisweilen symmetrische Nervengebiete betroffen, alles Abweichungen von dem typischen Bilde der Neuralgie; namentlich die häufige Doppelseitigkeit ist eine Erscheinung, die wir bei den echten Neuralgien nur ganz ausnahmsweise finden. Wenn man trotz dieser Abweichungen diese Fälle der Krankheitsgruppe der Neuralgien zurechnet, wie das Lewin-Benda tun, so erweitert man eben den Begriff der Neuralgie, und irgendein Fortschritt ist mit dieser Einreihung dann nicht erreicht.

Ganz ebenso ist es, wenn wir die Fälle der Neuritis zurechnen; ich will bezüglich dieses Punktes die Worte hierkernsetzen, die Weir-Mitchell darüber sagt:

„The tendency of recent writers seems to be toward considering erythromelalgia as a neuritis. But suppose we accept this view, and in the light of the two cases I have given it seems more than probable it by no means sets the matter utterly at rest. Neuritis is becoming a real puzzle. We may have it with paresis and little pain; we may have it without notable paresis and with horrible pain. It exists with or without myositis. Again it may give rise to rheumatism, joint-troubles and alterations of nail and hair. It may fail to disturb nutrition or greatly to alter local heat; and lastly, if erythromelalgia be a neuritis, it may cause pain and flushing and to these, increased enormously by dependency of the part may add a rise of temperature which few local fevers show in acute inflammation. You see that to give a name to a possible cause does not always help us.“

Dabei soll nicht geleugnet werden, daß auch in Fällen echter Neuritis mit motorischen und sensiblen Ausfallerscheinungen sich bisweilen Symptome finden, die denen der Erythromelalgie sehr ähnlich sind und diesen auch wohl völlig gleichen.

In diesen Fällen, wo also die gewöhnlichen, bekannten Symptome der Neuritis vorhanden sind, wird man, falls Zeichen der Erythromelalgie sich dazugesellen, diesen nur einen symptomatischen Wert beimessen können, ebenso wie ja auch im Verlauf einer Neuritis neuralgiforme Schmerzen vorhanden sein können. Meist handelt es sich da übrigens um dauernde Symptome, ohne paroxysmalen Charakter, die mit der Besserung der neuritischen Erscheinungen im engeren Sinne wieder verschwinden. Ich habe das mehrfach bei Glasplätterverletzungen peripherer Nerven, die nach sekundärer Nervennaht langsam heilten, beobachten können. In den Fällen aber, in denen diese motorischen und sensiblen Reiz- und Ausfallerscheinungen nicht vorhanden sind,

scheint es mir unzulässig und gleichbedeutend mit einer Verschleierung unserer Kenntnisse zu sein, wenn wir diese selbständigen Erythromelalgien einfach den Neuritiden zurechnen. Wir können nur sagen, daß in diesen Fällen wahrscheinlich periphere, vaso-motorische, sensible bzw. vasosensible und sekretorische Nervenfasern der Sitz pathologischer Reizzustände sein mögen, die in ihrem Endeffekt aber ein anderes Resultat haben, als das ist, das wir bei den Neuritiden und Neuralgien zu sehen gewohnt sind.

Daß in diesen Fällen der anatomische Nachweis der supponierten Veränderungen bisher noch nicht erbracht worden ist, wurde bereits mehrfach von uns betont; nur im dem Fall von Weir-Mitchell und Spiller wurde ein positiver Befund erhoben, auch hier allerdings nur in einem sehr beschränkten, allein zur Verfügung stehenden Untersuchungsgebiet; und dazu kommt, daß die primäre Natur dieser Nerven degenerations nicht über jeden Zweifel erhaben ist, und daß die Diagnose des Falles mir wenigstens auch nicht völlig sicher erscheint. Es wurden ja allerdings in einigen früher erwähnten Fällen (Weir-Mitchell und Spiller, Sachs und Wiener, Hamilton) anatomische Veränderungen in den peripheren Nerven gefunden. Die Fälle gehören aber nicht hierher, weil die Erythromelalgie-symptome sich hier nicht auf das Gebiet eines peripheren Nerven erstreckten, auch stets mit Gefäßveränderungen zusammen auftraten, ihre primäre Bedeutung also zweifelhaft ist (siehe über diese Fälle weiter unten S. 256). Wir werden uns also mit der Annahme funktioneller besser gesagt für uns noch nicht nachweisbarer Veränderungen begnügen müssen, was im übrigen mit der Tatsache des intermittierenden, von freien Zwischenräumen unterbrochenen Verlaufes der Erythromelalgie wohl in Einklang zu bringen ist.

Es mag zum Schluß noch eine erwähnt werden: die Tatsache, daß in den hinteren Wurzeln gefäßweiternde Fasern verlaufen, wie wir aus den physiologischen Vorbemerkungen wissen, ist sehr geeignet, uns die enge Verbindung von Gefäßweiterung und Schmerz zu verdeutlichen. Es ist daher Auerbachs Ansicht, daß in gewissen Fällen die Erythromelalgie einer Affektion der hinteren Wurzeln ihre Entstehung verdankt, wohl zu berücksichtigen. Kohnstamm hat in seiner sehr bemerkenswerten Arbeit „Über die centrifugale Leitung im sensiblen Endneuror“ auf diesen Punkt verwiesen, und die Erscheinungen der Erythromelalgie zugunsten der Annahme einer doppelseitigen Leitung in den hinteren Wurzeln verwertet. Auf Grund dieser Anschauung, daß Reizung der hinteren Wurzeln auf der einen Seite zu Schmerz, auf der anderen durch centrifugale Fortpflanzung des Reizes zur Gefäßweiterung führt, gewinnt man in der Tat eine frappant ein-

fache Auffassung vom Wesen der Erythromelalgie. Ich habe schon im allgemeinen Teil darauf hingewiesen, daß mir die Doppelseitigkeit der Leitung durchaus plausibel erscheint und die Einführung dieser Annahme in die pathogenetische Auffassung der Erythromelalgiesymptome ist zu rechtfertigen, wenn wir uns ihres hypothetischen Charakters bewußt bleiben. Eine allgemeine Lösung ist naturgemäß auch in dieser Auffassung nicht enthalten.

Für den engen Zusammenhang von Reizzuständen der hinteren Wurzeln und Erythromelalgiesymptomen spricht auch die folgende sehr interessante Beobachtung von Benoist. In einem typischen und sehr schweren Fall von Erythromelalgie bei einem 25jährigen Manne versuchte der Autor den Einfluß einer epiduralen Injektion von Sterain festzustellen; der Patient erhielt von einer 0,1proz. Lösung 60 ccm epidural eingespritzt. Einige Minuten nach der Einspritzung zugleich mit dem Verschwinden der Schmerzphänomene nahm die Haut ihre normale Farbe an, der Patient, der seit langem nur mit nackten Füßen gelegen hatte, konnte sich wieder Schuhe und Strümpfe anziehen, konnte umhergehen, ohne Schmerzen zu empfinden. Mit der Wiederkehr der Gefäßerweiterung kehrten nach einigen Stunden auch die Schmerzphänomene wieder, am Abend dieses Tages brauchte er zum ersten Male seit langer Zeit kein Morphin. Der gleiche Versuch am nächsten Tage ergab zunächst dasselbe Resultat, aber nach fünf Stunden trat — vielleicht war der Patient zu viel gegangen — ein enorm heftiger Anfall auf, so daß der Kranke weitere Versuche ablehnte.

Nicht selten fanden sich bei Patienten, die an Erythromelalgie litten, Symptome spinaler Natur. Diese geben uns natürlich den Anlaß, auch für die erythromelalgischen Symptome eine spinale Genese zu vermuten; eine nähere Ortsbestimmung im Rückenmark stößt dabei auf große Schwierigkeiten, da, wie wir sahen, bei sehr differenten spinalen Affektionen die Zeichen der Erythromelalgie sich einstellen können. Eulenburg hat gewisse Teile der grauen Substanz dafür in Anspruch genommen: die Hinter- und Seitenhörner. Unsere Kenntnisse und Erfahrungen über die Gliose lassen es von vornherein als wahrscheinlich erscheinen, daß Eulenburgs Lokalisationsversuch eine gewisse Berechtigung hatte. Nun ist dann noch der oben schon genauer mitgeteilte anatomische Befund im Falle von Lannous und Parot gekommen, der diese Auffassung zu stützen geeignet ist. Da bei der Syringomyelie beobachteten Symptomen auf vasomotorischem und sensiblen Gebiet tragen in der Tat ja einen ähnlichen Charakter: Thermo- parästhesien und Thermalgien kamen vor; die Schmerzhaftigkeit ist meist allerdings gering ausgeprägt; die vasomotorischen Symptome sind meist insofern abweichend, als eine Gefäßdilatation offenbar

nur selten beobachtet wird. Diese Differenzen mögen aber in der Art der krankmachenden Ursache begründet sein, die bei der Syringomyelie mehr auf raschen Zerfall des Gewebes hinarbeitet, während bei der Erythromelalgie ein dauernder Reiz ausgeübt wird.

Immerhin ist die seitliche und hintere graue Substanz nur eine der Stellen, die in Frage kommt. Auch die Veränderungen anderer Teile des Rückenmarksquerschnitts scheinen geeignet, die Symptome der Erythromelalgie hervorzubringen. In den Seitensträngen liegen die vasomotorischen und sensiblen Bahnen ganz benachbart oder vielleicht gar durcheinander gemischt, und endlich muß man nach den oben erwähnten Erfahrungen vom Vorkommen gefäßerweiternder Fasern in den hinteren Wurzeln auch in deren intramedullären Anteilen vasomotorische und sensible Fasern nahe beieinander suchen. Die Erfahrungen Collins von dem häufigen Vorkommen erythromelalgischer Symptome bei der multiplen Sklerose sind zwar bei der Multiplizität der Herde lokalisatorisch nicht zu verwerten, könnten aber, da bei der Sklerose die graue Substanz weniger beteiligt zu sein pflegt, darauf hinweisen, daß auch Affektionen des Markmantels Symptome von Erythromelalgie hervorrufen. Ich möchte freilich betonen, daß ich trotz eines sehr großen und alle Stadien umfassenden Beobachtungsmaterials von multipler Sklerose Symptome von Erythromelalgie bei dieser Krankheit nur ganz ausnahmsweise beobachten konnte.

Die Verteilung der Störungen bei der Erythromelalgie scheint auf den ersten Blick gegen deren spinalen Ursprung zu sprechen, insofern als bestimmte Gliedabschnitte wie Hände oder Füße erkrankt zu sein pflegen, und daher ein anderer Typus vorzuziehen, als wir ihn bei spinalen Krankheiten zu sehen gewohnt sind. Gerade in neuerer Zeit aber hat Brissaud nachzuweisen versucht, daß diese gliedweise Lokalisation für bestimmte Affektionen des Rückenmarks typisch ist und durch eine bestimmte anatomische Gliederung dieses Organs notwendig bedingt ist. Er hat, namentlich gegenüber Lühr, mit Bestimmtheit die Meinung verfochten, daß die Sensibilitätsstörungen bei der Glosse nur ausnahmsweise einen radikulären Typus innehalten, gewöhnlich dagegen ganze Glieder oder bestimmte Abschnitte derselben, z. B. an der oberen Extremität die Hand, den Unterarm oder den Oberarm betreffen. Er hat zur Stütze seiner Ansichten von der Gliederung des Rückenmarks, die er als spinale Metamerie im Gegensatz zur radikulären bezeichnet, die Erfahrungen beim Herpes zoster, bei gewissen Trophoneurosen, wie der Sklerodermie, und bei allerdings bisher ganz vereinzelter Fälle von Amputationsveränderungen im Rückenmark herangezogen. Diese Anschauungen würden uns die Verteilung der Störungen bei der Erythromelalgie für die „spinalen“ Fälle wohl gut erklären, aber sie bedürfen freilich noch sehr des Beweises. Die späteren Forschungen haben die Ansicht

von der metameren Verteilung der Sensibilitätsstörungen bei der Glauis nicht bestätigt. Die Regel ist sie jedenfalls nicht, doch ist damit nichts gegen die Möglichkeit oder besser gesagt Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Erythromelalgiesymptomen durch spinale Veränderungen gesagt.

Noch unsicherer werden unsere Kenntnisse und noch mehr sind wir auf bloße Vermutungen angewiesen, wenn wir versuchen, für die Fälle eine Lokalisation zu erforschen, in denen die Symptome der Erythromelalgie als Begleiterscheinung cerebraler organischer Erkrankungen vorkommen. Es hätte keinen Zweck, sich hier alle die Orte im Gehirn vorzuführen, durch deren Schädigung der Symptomenkomplex zustande kommen könnte. Auch hier gilt ganz allgemein wieder, daß das örtliche Nebeneinander sensibler und vasomotorischer Bahnen zu berücksichtigen ist. Die Art der Begleitsymptome hat uns in der Mehrzahl der Fälle keinen Hinweis auf den Sitz der Affektionen geben können, am ehesten verständlich ist die Genese der Krankheitszeichen wohl bei der Hemiplegie, da wir ja wissen, daß den motorischen Bahnen benseitig sensible und vasomotorische Züge verlaufen.

Von Wichtigkeit ist eine von uns schon einmal hervorgehobene Beobachtung, die wir Nielsen verdanken, der direkt mit dem Augenspiegel eine Erweiterung der Arterien des Augenhintergrundes beobachtet konnte. Das weist darauf hin, daß bisweilen auch einmal Gefäße an anderen Stellen des Körpers als an den kranken Teilen von derartigen Veränderungen befallen sein können. Ob diese immerhin doch vereinzelt Beobachtung Grund genug zu der Vermutung gibt, daß andere, namentlich cerebrale Störungen, wie sie bei der Erythromelalgie beobachtet wurden, auch auf eine ähnlich bedingte Gefäßerweiterung zurückzuführen sind, lasse ich doch dahingestellt.

Man könnte auch noch die Frage aufwerfen, ob es eine Krankheit sui generis mit centrahem, organischem Ursprung gibt, in der die Erythromelalgie nicht als ein Symptomenkomplex auftritt, sondern im wesentlichen das Krankheitsbild in toto darstellt. Man könnte sich ja vorstellen, daß an den verschiedenen Teilen des centralen Nervensystems sich allmählich dauernd werdende Gefäßerweiterungen einstellen und damit den Grund zu einer Symptomatologie legen, wie wir sie in einzelnen der mitgeteilten Beobachtungen finden, in denen zwar die Diagnose einer Affektion des Centralnervensystems gestellt, nicht aber deren Natur näher bestimmt werden konnte. Ich glaube im Gegensatz zu anderen Autoren, namentlich zu Rosen, die Wahrscheinlichkeit einer solchen Annahme strikte verneinen zu sollen.

Ich habe schon wiederholt erwähnt, daß eine ganze Reihe von Autoren die Erythromelalgie auf Erkrankungen des Gefäßapparates zurückzuführen geneigt ist. Ohne weiteres darf eine Auffassung zurückgewiesen werden, die stets einen solchen Zusammenhang

annimmt. Dagegen sprechen sehr zahlreiche Beobachtungen. Es wurde aber im vorhergehenden immerhin eine Anzahl von Beobachtungen angeführt, bei denen neben erythromelalgischen Symptomen zweifellos Zeichen von Gefäßerkrankung vorhanden waren. Das Verhältnis dieser beiden Erscheinungsreihen scheint mir aber ein anderes zu sein, als die betreffenden Beobachter annahmen. In einer Gruppe dieser Fälle beanspruchen meines Erachtens die Zeichen der Erythromelalgie nur einen rein symptomatischen Wert: die hier in Frage kommenden Affektionen, die Endarteritis obliterans und das ihr nahestehende intermittierende Hinken führen offenbar nicht ganz selten zu Erscheinungen, die denen der Erythromelalgie ganz nahe stehen, bzw. mit ihnen identisch sind, zu arterieller und venöser aktiver Dilatation, Hitze, Klopfen, Schmerzen, und diese Erscheinungen werden auch durch dieselben äußeren Momente in ihrer Entwicklung begünstigt, wie bei der idiopathischen Erythromelalgie. Daneben sind aber die Symptome vorhanden, die nicht zur Erythromelalgie gehören, Verschwinden des Pulses und sonstige Erscheinungen von lokaler schwerer Arteriosklerose. Es läßt sich die Vorstellung sehr wohl verteidigen, daß die organischen peripheren Gefäßveränderungen reflektorisch zur Entstehung von Erythromelalgiesymptomen Anlaß geben. Daß solche funktionelle, reflektorisch bedingte Reizungen in der Klinik der hier genannten Gefäßaffektionen, insbesondere des intermittierenden Hinkens eine große Rolle spielen, wurde schon von Erb betont. Oppenheim und nach ihm andere haben sogar eine rein funktionelle angiospastische Form des intermittierenden Hinkens beschrieben, die Oppenheim auf eine angeborene angio- und neuropathische Diathese zurückzuführen geneigt ist. (Oppenheim, *Lehrb. d. Nervenkrankh.*, V. Aufl. S. 678). Diese Affektion hat, wovon später noch die Rede sein muß, enge Beziehungen zur Raynaud'schen Krankheit. Wo an die Stelle der angiospastischen Diathese die angiodilatatorische tritt, sind die Berührungspunkte zur Erythromelalgie gegeben, mag es sich nun um die organische oder funktionelle Gruppe des intermittierenden Hinkens handeln. Als Typus dieser Gruppe möchte ich den Fall von Weir-Mitchell und Spiller bezeichnen.

Fredrich ist noch ein anderes Verhältnis denkbar. Es muß immer an die Möglichkeit gedacht werden, daß durch die über lange Zeit hin sich erstreckenden Intervallschwankungen der Gefäße schließlich eine organische Gefäßerkrankung hervorgerufen werden kann. Wenn auch über die Häufigkeit dieses Vorkommnisses die Meinungen auseinander gehen, so kann an der Tatsache nicht gezweifelt werden. Wir haben demnach durchaus ein Recht, dort wo lange Zeit unkomplizierte Erythromelalgie vorlag und erst sehr spät sich arteriosklerotische Veränderungen einstellten, an deren sekundäre Entwicklung zu denken. Als Beispiel für ein solches Verhalten möchte ich einen

der von Elsner mitgeteilten Fälle bezeichnen. In diesen Fällen sind naturgemäß die gefäßorganischen Läsionen geringfügiger als bei der ersten Gruppe; ebenso dementsprechend die Folgeerscheinungen, insbesondere die Gangrän. Diese kann also sehr wohl auch bei idiopathischer Erythromelalgie vorkommen, wird dann aber immer doch nur einen beschränkten Umfang haben. Noch eine zweite Entstehungsmöglichkeit der Gangrän ist zu berücksichtigen, die Form die durchaus der Raynaudschen Gangrän entspricht; sie kommt in den früher erwähnten idiopathischen Mischfällen von Erythromelalgie und Raynaud'scher Krankheit vor; ihre Eigenheiten werden uns später zu beschäftigen haben.

Wir haben nun noch auf die Fälle einzugehen, in denen neben der Erythromelalgie nur ein funktionelles nervöses Leiden vorliegt. In manchen von ihnen treten die Allgemeinsymptome hinter den lokalen sehr zurück. Aber auch wo das nicht der Fall ist, dürfen wir nicht, wie Lewin-Benda das tut, die ganze Frage damit zu erledigen versuchen, daß wir diese Fälle einfach der Hysterie und Neurasthenie einreihen. Greifen wir auch hier wieder auf das Beispiel der Neuralgien zurück, oder erinnern wir uns der Beschäftigungsneurosen oder zahlreicher Motilitätsneurosen, so finden wir, wie schon einmal erwähnt, daß auch von diesen Krankheiten sehr häufig neurasthenische und hysterische Personen befallen werden, ohne daß wir doch darum alle diese Affektionen einfach in den Grundkrankheiten aufgehen lassen. Nur da, wo die lokalen Symptome den ausgesprochenen Charakter des Grundleidens tragen, werden wir sie der Grundkrankheit zurechnen dürfen. Besonders augenfällig sind die Fälle, in denen auch die lokalen Symptome den hysterischen Typus haben, psychogen sind und in offenkundiger Abhängigkeit von Zuständen der Psyche stehen. Der Typus solcher Fälle ist der von Lévi beschriebene. Das ist eine Hysterie mit Symptomen von Erythromelalgie, eine Pseudo-Erythromelalgie hysterica, wie es eine Pseudo-Neuralgia hysterica gibt; wie es denn der Hysterie bekanntlich gelingt, überhaupt jedes Krankheitsbild zu imitieren. Daß aber die die Erythromelalgie konstituierenden Symptome psychogenen Ursprungs sein können, braucht für keines von ihnen ausdrücklich erörtert zu werden: Schmerzen, Alterationen der Gefäßfülle und der Schweißbildung stehen nach alltäglicher Erfahrung in Abhängigkeit von psychischen Vorgängen. Aber nicht in jedem Fall liegen die Dinge so klar, wie bei der Beobachtung Lévis. Schon in dem von uns selbst mitgeteilten Falle war die Zugehörigkeit der Erythromelalgiesymptome zur Hysterie weder sicher festzustellen, noch sicher zurückzuweisen, und ich glaube, daß diese Frage auch sonst noch oft mit einem *Nan liquet* zu beantworten sein wird.

Schließlich bleiben noch die Fälle, in denen außer den Symptomen der Erythromelalgie überhaupt keine anderen Störungen vorliegen,

Auch hier bietet die Frage der Lokalisation des Sitzes der Krankheit natürlich große Schwierigkeiten. Man hat für die Frage der Genese der Erythromelalgie noch folgende Punkte berücksichtigt. Das häufig beobachtete symmetrische Auftreten der Störungen und deren weite Verbreitung auf alle vier Extremitäten ev. auch noch auf andere Körperteile, lassen am ehesten einen centralen, (und zwar nach Eulenbarg spinalen) Ursprung erwarten. Abgesehen davon, daß eine ausgesprochene Symmetrie bei unserer Krankheit geradezu selten ist, scheint, wie schon bei den Akroparästhesien erwähnt wurde, nach unseren heutigen Erfahrungen bei der Polyneuritis ein solches Razonnement nicht berechtigt; Symmetrie und weite Verbreitung sprechen nicht mit Sicherheit gegen einen peripheren neuritischen Ursprung. Dagegen könnte man freilich zugunsten einer centralen Genese des Leidens doch noch einzelne Momente ins Feld führen. In erster Reihe kommt die so häufig nachgewiesene allgemeine neuropathische Veranlagung des erkrankten Individuums in Frage, die wir uns doch nicht gut anders als durch eine Schwäche oder abnorme Empfindlichkeit bestimmter Teile des Centralnervensystems bedingt vorstellen können. Und wenn es richtig ist, worauf verschiedene Erfahrungen deuten, daß auch andere als die peripheren Teile des Körpers und seiner Oberfläche befallen sein können, so spricht auch das mehr für einen centralen Ursprung. Wir hätten dann also die selbständige und sich nicht auf bestimmte Nerven beschränkende Erythromelalgie als eine centrale Erkrankung mit sensiblen, vasomotorischen, sekretorischen und ev. trophischen Symptomen anzusehen.

Endlich müssen wir der Frage nach der Art des krankmachenden Reizes näher treten. Daß es eine nur leichte Schädigung sein darf, die die Krankheit bedingt, unterliegt nach allem keinem Zweifel. Über die nähere Natur der Krankheitsursache können wir nichts aussagen, sie ist wahrscheinlich auch verschieden, und das eine Mal toxischer Art, während es sich das andere Mal um reflektorische Einwirkungen bei allerdings erhöhter Irritabilität der in unseren Ausführungen geugsam bezeichneten nervösen Teile handelt. Das Vorkommen erythromelalgischer Symptome bei gewissen organischen Erkrankungen des Nervensystems weist darauf hin, daß auch leichte örtliche Reize, etwa eine sehr geringe Bindegewebsvermehrung, pathogenetisch in Frage kommen. Dabei müssen wir immerhin noch eine bestimmte Art des Reizes, oder vielleicht mit mehr Recht noch eine bestimmte besondere Art der Reaktionsfähigkeit gewisser nervöser Teile annehmen, wenn wir verstehen wollen, warum bei derselben Krankheit nur in einer geringen Minderzahl von Fällen die Erythromelalgiesymptome auftreten. Für diese Fälle ist es möglich, daß in späteren Stadien durch Zunahme der anatomischen Veränderungen größere palpable Störungen

eintreten, daß an Stelle der Reizung die Lähmung tritt und so das Krankheitsbild sich wesentlich verändert.

Die Forschungsrichtung unserer Tage wird von vornherein geneigt sein, das was hier als eine „besondere Art der Reaktionsfähigkeit gewisser nervöser Teile“ in der ersten Auflage in recht unbestimmten Ausdrücken umschrieben wurde, näher zu definieren und wird sie mit raschem Entschluß durch die Annahme einer Störung der inneren Sekretion zu erklären versuchen. Eine tatsächliche Grundlage für diese Annahme glauben, wie schon erwähnt, Rudzki und Hornowski in ihrem Fall gefunden zu haben: Aus einer starken Entwicklung des chromaffinen Systems schloßen sie auf eine durch erhöhte innere Sekretion des Adrenalin-systems bedingte Sympathikotonie des entsprechenden Individuums. Ich habe meiner Skepsis in bezug auf die Realität der Befunde schon Ausdruck gegeben und möchte das noch einmal unterstreichen. Hier ist alles noch Hypothese — der anatomische Nachweis der starken Ausbildung des chromaffinen Systems wie die durch diese bedingte Sympathikotonie; Ausblicke, keine Ergebnisse, Hinweise auf weitere Forschungen, die aber immer das ganze Material berücksichtigen, nicht am einzelnen Fall hängen bleiben sollen. Vielleicht führt der Weg weiter; aber auch wenn wir hier zu Ergebnissen kommen, darf über dieser histologischen die symptomatologische Forschung nicht vernachlässigt werden, wozu an manchen Stellen allzuviel Neigung vorhanden ist.

Mit den im vorstehenden gemachten Ausführungen haben wir die Frage bereits beantwortet, ob die Erythromelalgie eine Krankheit sui generis darstellt oder nicht.

Wir sahen, daß in neuerer Zeit sich die meisten Beobachter der Ansicht zuneigten, die Erythromelalgie als einfachen Symptomenkomplex aufzufassen. Ihren schärfsten Ausdruck hat diese Ansicht bei Lewin-Benda gefunden. Andere, wie Eulenburg, Delio, Kubane, Lannois und Parot, Benoist, wollen ihr eine gewisse Selbständigkeit zuerkennen. Auf die Seite der letzteren stellen auch wir uns. In einer nicht geringen Anzahl von Fällen zwar sind die erythromelalgischen Symptome nur beigeordnete Symptome irgendeines anderen Nerven- oder Gefäßleidens. Es erscheint uns aber nicht zweifelhaft, daß andererseits in einer weiteren Reihe von Fällen außer einer, anfangs wenigstens stets anfallsweise auftretenden schmerzhaften Röte und Schwellung an den gipfelnden Teilen, die von Hyperhidrosis und trophischen Veränderungen begleitet sein kann, sich keine wesentliche Störung findet. Diese Fälle teilen sich insoweit in zwei Gruppen, als in der einen die lokalen Symptome der Bahn bestimmter Nerven folgen, in der anderen diffus auf alle

oder die Mehrzahl der Endglieder verbreitet sind. In diesen Fällen muß man die Erythromelalgie als Krankheitsbild sui generis auffassen, mag sie hier auch auf einem durch eine allgemeine Neuropathie vorbereiteten Boden entstanden sein; selbst das letztere ist aber nicht immer nachweisbar.

Für die erste Gruppe nehme ich als Grundlage der Erkrankung Reizzustände in den peripheren Nerven mit besonderer Bevorzugung vasomotorischer und speziell vasodilatatorischer und sekretorischer Fasern an. Auch die sensiblen Anteile der Nerven sind stets mit betroffen, wahrscheinlich am meisten, ähnlich wie bei den Akroparästhesien, die vasosensiblen Fasern. Von den typischen Neuralgien weicht das klinische Bild der „peripheren Erythromelalgie“ soweit ab, daß eine Trennung der beiden Krankheitsbilder mir unbedingt notwendig erscheint.

Für die zweite Gruppe der selbständigen Erythromelalgien erscheint mir die Annahme einer centralen nervösen Genese die am besten begründete zu sein. Es sind dieselben Teile befallen wie bei der ersten Gruppe, also vasomotorische, sekretorische und sensible Elemente. Häufig gesellen sich trophische Störungen dazu. Die Bezeichnung vasomotorisch-trophische Neurose wird demnach diesem Symptomenkomplex nicht gerecht; es handelt sich um eine Erkrankung mit vasomotorischen, trophischen, sensiblen und sekretorischen Symptomen. Der Sitz der Störung ist im sympathischen System im vageren Sinne zu suchen, an welcher Stelle des Systems, ist nicht zu entscheiden, insbesondere nicht, ob die Ganglien des Sympathicus oder seine centralen Ursprungsgebiete in Frage kommen.

Die Beziehungen dieser Erkrankung zur Raynaudschen Krankheit sind sehr enge; zwischen beiden Formen gibt es zahlreiche Mittelglieder. Das wird im nächsten Kapitel näher zu begründen sein. Die Disposition zur Erkrankung ist anscheinend oft angeboren; daß diese Disposition in einer schärfer umschriebenen und jetzt schon genauer zu definierenden „Sympathikotonie“ liegt, bedarf noch sehr des Beweises.

Diagnose, Differentialdiagnose.

Wir werden bei der Stellung der Diagnose uns stets zweierlei Fragen vorzulegen haben, erstens, handelt es sich um das symptomatische Bild der Erythromelalgie und zweitens, inwieweit muß der vor-

liegende Symptomenkomplex als ein abgeschlossenes Krankheitsbild aufgefaßt werden.

Bezüglich des ersten Punktes werden sich meist keine erheblichen Schwierigkeiten ergeben: die Kombination von aktiver Hyperämie, Rötung, Schwellung mit heftigen Schmerzen und gelegentlich mit sekretorischen und trophischen Störungen der geschilderten Art, dazu das paroxysmale Auftreten der Symptome, ihre Lokalisation, die meist die Extremitätenenden und oft genug diese ausschließlich betrifft, charakterisiert den Symptomenkomplex so gut, daß eine Abgrenzung gegen andere Symptomgruppen nicht schwierig ist.

Ein besonderer Wert wird stets darauf zu legen sein, daß in der Tat auch wirkliche Schmerzen vorhanden sind. Überall da, wo diese dauernd fehlen, auch da, wo etwa nur ein unangenehmes Klopfen und Pulsieren der betroffenen Teile empfunden wird, darf man nicht von Erythromelalgie reden. In dieser Beziehung ist die bisherige Nomenklatur zu wenig streng gewesen. Man hat auch Fälle, in denen die vasomotorischen Symptome völlig das Bild beherrschen, der Erythromelalgie einrechnen wollen. Ebensowenig geht es an, auf die Schmerzen allein, wenn sie auch sonst charakteristisch sind, die Diagnose Erythromelalgie zu basieren. Wir haben freilich im symptomatologischen Teil gesehen, daß in manchen Fällen sich das Symptombild mit Schmerzen einleitet und die Röte erst nachkommt; doch berechtigt uns dies Vorkommen nicht zu einer solchen Erweiterung des Begriffs der Erythromelalgie, daß wir von dem Auftreten der Röte ganz absehen dürfen: wo Röte dauernd fehlt, handelt es sich nicht um Erythromelalgie.

Dagegen können sekretorische und trophische Störungen während des ganzen Krankheitsverlaufes fehlen.

Es geht ferner nicht an, aus der Lokalisation an den Extremitätenenden eine Bedingung *sine qua non* zu machen.

Erhebliche Schwierigkeiten ergeben sich aber auch für die rein symptomatologische Diagnose da, wo die vasomotorischen Symptome sich nicht mehr an den klassischen Typus der Erythromelalgie halten, wenn einerseits die Asphyxie locale, andererseits die Syncope locale sich in das Krankheitsbild einmischen. Beispiele dafür haben wir oben mehrfach gegeben. Es wird in diesen Fällen oft genug unmöglich sein, das Symptombild scharf zu bezeichnen, und so wird dann nichts anderes übrig bleiben, als in diesen Mischformen nach dem Grundsatz *a priori fit denominatio* zu verfahren und nur die eine und dann natürlich die durch ihre Intensität oder ihr zeitlich früheres Auftreten mehr hervortretende Seite des Prozesses bei der Nomenklatur zu berücksichtigen: für jeden der möglichen Zwischenzustände neue Namen zu schaffen, hätte wenig Sinn; die Hauptsache wird auch hier nicht die Namensgebung, sondern eine eingehende Würdigung der

Symptome sein. Es ergibt sich aus dem Gesagten als notwendige Folgerung, daß oftmals eine Trennung der Erythromelalgie von der Raynaudschen Krankheit unmöglich ist, so different auch wieder in anderen Fällen die Krankheitsbilder sein können. Näheres besprechen wir noch im nächsten Kapitel.

Nicht geringere Schwierigkeiten werden auch da entstehen, wo durch das Hervortreten der trophischen Störungen das Symptomenbild eine Modifikation erfährt. Wo diese ganz im Vordergrund stehen und einem Typus angehören, den wir sonst als Charakteristikum eines eigenen Krankheitsbildes anzusehen geneigt sind, wo sie also z. B. dem Bilde der Akromegalie, des Myxödems, der Sklerodermie entsprechen, werden wir auch diese Diagnose zu stellen und die Erythromelalgie bei ihnen, wie ja auch in vielen anderen Fällen, auf die wir gleich eingehen, als rein symptomatologischen Komplex aufzufassen haben. Aber es gibt auch hier Fälle, in denen die einzelnen Symptome so durcheinandergemischt sind, daß von einer der bisherigen Krankheitstypen sich befriedigende Diagnosestellung nicht die Rede sein kann.

Einen solchen Fall hat Meyer beschrieben.

42jährige Frau. Hereditär belastet. Von 15. Jahr an wechselnde Anschwellung beider Hände. 1887 begannen die Hände zu schwellen. Seit zwei Jahren Anschwellung des Gesichts. 1890 zuerst Eiterungen an den Fingern, immer wieder verschwindend, angefaßt von zahlreichen kleinen Verletzungen, die sie sich bei ihrer Beschäftigung (Blumenbinden) zuzog, kurzlebig. Zahlreiche hysterische Klagen, schlechter Schlaf, Herzklopfen, Durst, Kopfschmerzen. Übermäßiger Gebrauch von Morphin und Alkohol. Kolossale Anschwellung der Unterschenkel und Füße, nicht eindrückbar. Haut glänzend und straff, Schwellung der Handrücken, Haut hier dünn, glatt, kühl. Unterleibsaffektion, deswegen Anstrichung des Unterbaues. Am Tage danach an Myxödem einsetzender Zustand. Gedächtnisschwäche, langsame, stammelnde Sprache, Intelligenzabnahme. Nach kurzer Zeit Besserung. Eine von Eulenburg vorgenommene Untersuchung ergibt: Zehen anfangs livide, bläulich, kalt, plötzlich hellrot und glühend heiß, bis fast zur Mitte des Metatarsus, zuerst an der großen Zehe, dann sich weiter ausbreitend; Räte leicht verstreifbar, Hände im gewöhnlich kalt, symmetrisch ohne Schwellbildung. Sensibilität normal, nur leichte Herabsetzung der überaus Empfindung. Weichteile etwas gedehnt. Plötzlich heftige heiße Räte, die Hände werden wärmer, starke Schweißsekretion. Im Gesicht Andeutung ähnlicher Störungen. Früher bestanden typische Migräneparoxysmen, jetzt nicht mehr. Zwischen den zu stehenden Zehen Rötung, stets scharfe Abgrenzung derselben gegen die normal gefärbten Partien. Zeitweise an den Händen das typische Bild der Asphyxie locale mit eisiger Kälte, dunkelbläulicher, fast schwärzlicher Färbung. Vielfach kleine Blautreibungen. Schmerzen, Erythemen.

Der Fall, der auch von Eulenburg in diesem Sinne verwertet wird, zeigt die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit einer bestimmten Diagnose; er hat Erscheinungen von Erythromelalgie — allerdings scheinen typische Schmerzattacken zu fehlen — von Raynaudscher Krankheit, von Sklerodermie; die Schwellungen scheinen mit freilich weniger in das Gebiet des Myxödems und der Akromegalie,

wie das die früheren Autoren wollten, als das der neurotischen Ödeme zu gehören.

Daß auch die Ähnlichkeit zwischen Sklerodermie und Erythromelalgie sehr groß sein kann, lehrt die von uns bereits zitierte Beobachtung Stillés. Wir werden in einem späteren Kapitel noch weiter sehen, daß in frühen Stadien der Sklerodermie Erythromelalgiesymptome vorkommen.

Schwierigkeiten kann auch die Unterscheidung gewisser Formen der Akromegalie von der Erythromelalgie machen, da auch bei der Erythromelalgie eine erhebliche Vergrößerung der Hände und Füße vorkommen kann und auf der anderen Seite die vasomotorischen Erscheinungen bei beiden Krankheiten Ähnlichkeit haben können. Darauf hat bereits Souza-Leite hingewiesen. Freilich hat er in seiner Schilderung das Krankheitsbild der Erythromelalgie erheblich modifiziert. Er berücksichtigt besonders einen Fall, wo bei einer 44-jährigen Frau eine erhebliche Volumenzunahme der Hände und der Finger vorhanden war, daneben eine mit cyanotischen Flecken vermischte Rote und anfallsweise Schmerzen auftraten, schließlich auch ein geringer Grad von Kyphose nachweisbar war. Aber die Vergrößerung der Hände war nicht die der Akromegalie, da die Finger eher zugespitzt waren, es fehlten alle Erscheinungen am Kopf und Rumpf und ferner die sonstigen Begleitsymptome der Akromegalie.

Auch Sternberg berücksichtigt die Differentialdiagnose der Erythromelalgie und der Akromegalie. Für die Diagnose der Erythromelalgie sind nach ihm von Bedeutung: die vasomotorischen Erscheinungen des Syndroms, der Mangel der Beteiligung der Knochen an der Vergrößerung, ferner Sensibilitätsstörungen, in vielen Fällen Symptome einer zugrunde liegenden Erkrankung des zentralen Nervensystems, schließlich der Mangel an Veränderungen am Kopfe. Nicht alle von Sternberg angegebenen Momente sind verwertbar: Objektive Sensibilitätsstörungen fehlen meist auch bei Erythromelalgie; eine Vergrößerung der Knochen scheint, wenn auch selten, vorzukommen. Die Symptome der cerebralen organischen Erkrankung können sich bei beiden Affektionen ähneln. Immerhin wird die Diagnose meist möglich sein. Die Deformitäten am Kopf und am Rumpf, die cerebralen Symptome der Akromegalie, die so oft charakteristisch ausgeprägt sind, namentlich die Hemianopsia bitemporalis, der meist ziemlich rasch progressive Verlauf und anderes mehr werden die Diagnose ermöglichen, aber in einzelnen Fällen werden doch Zweifel übrig bleiben, ob Akromegalie vorliegt oder eine Neurose, die wohl der Erythromelalgie ähnlich sehen kann, aber ihr doch nicht ganz entspricht. Wir werden noch an anderer Stelle auf diesen abweichenden Typus und seine Ähnlichkeit mit der Akromegalie einzugehen haben.

Daß auch beim Myxödem Erythromelgiesymptome vorkommen, haben wir bereits mitgeteilt.

Gerade die Tatsache, daß diese Symptome gar nicht immer den Wert eines eigenen Krankheitsbildes haben, macht die diagnostische Fragestellung zu einer doppelten, da wir uns fragen müssen, liegen überhaupt Symptome von Erythromelgie vor und weiter, haben sie den Wert eines eigenen Krankheitsbildes, oder sind sie Zeichen einer bestehenden Grundkrankheit? Wir haben ja solche Symptome bei zahlreichen Nervenkrankheiten funktioneller und organischer Natur und auch bei einigen Erkrankungen des Gefäßapparates gesehen und haben auch das Verhältnis der Symptome der Erythromelgie zu diesen Krankheiten genügend besprochen. Schwierigkeiten in der Hinsicht, ob idiopathische Erythromelgie oder Erythromelgiesymptome als Teil eines anderen Leidens vorliegen, werden sich am ehesten noch bei der Tabes, bei der Syringomyelie und bei der Hysterie, bei der Endarteriitis obliterans und dem intermittierenden Hinken ergeben. Wir können hier nicht darauf eingehen, die Diagnose dieser Affektionen ausführlich zu behandeln, eine sichere Entscheidung wird meist möglich sein, wenn wir auf die übrigen, häufigeren und bekannteren Symptome dieser Krankheiten genügend achten.

Die Fälle, in denen außer den Symptomen der Erythromelgie noch keine wesentlichen anderen Störungen finden, haben wir oben in zwei Gruppen einzuteilen versucht, die, in denen die Erscheinungen der Erythromelgie sich im Gebiet eines oder mehrerer bestimmter Nerven abspielen und die, wo sie diffus auf die Akra verteilt sind.

Die erstere Gruppe hat, wie gezeigt, mannigfache Berührungspunkte mit der Neuritis und Neuralgie, ohne daß es uns zurzeit berechtigt erscheint, sie in diesen Krankheitsgruppen aufgehen zu lassen. So lange also sich nicht bestimmte Zeichen der Neuritis oder der Neuralgie, insbesondere unbeschriebene Anästhesien und Lähmungen, Druckpunkte usw. finden, dürfen wir in diesen Fällen nicht Neuritis resp. Neuralgie mit Erythromelgiesymptomen, sondern müssen Erythromelgie im Gebiet eines Nerven diagnostizieren.

In der zweiten Gruppe finden wir überhaupt keine Anhaltspunkte für die Diagnose eines bestimmten Grundeleidens; denn die bisweilen vorhandenen Zeichen einer allgemeinen neuropathischen Disposition, die sich ev. nur in einer hereditären Belastung kund tut, geben zu einer bestimmten Diagnose keine Berechtigung. Ob und inwieweit diese zweite Gruppe pathogenetisch von der ersten getrennt ist, darüber ist das, was erwähnenswert erscheint, bereits gesagt; für die

erste scheint ein peripherischer, für die zweite ein centraler Ursprung mehr wahrscheinlich: bestimmtes wissen wir auch hier nicht.

Differentialdiagnostisch kommen naturgemäß nur die Fälle in Betracht, in denen uns die Erythromelalgie als selbständige Affektion entgegentritt.

Am nächsten steht dieser Form der Erythromelalgie eine Affektion, die im ganzen sehr selten, nur einige Male in größeren Epidemien beobachtet wurde: die Akrodynie.

Da diese Affektion in das Gebiet der uns hier beschäftigenden Affektionen fällt, so seien einige wenige Notizen über sie, die ich Eulenburgs Realencyclopädie entnehme, eingefügt.

Zum ersten Male wurde die Affektion und zwar epidemisch in den Jahren 1828/30 in Frankreich beobachtet. Sie betraf besonders schlecht genährte, kachektische Individuen. Sie beginnt mit gastrischen Beschwerden, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Diarrhöen, mit katarthaischen Erkrankungen der Schleimhaut des Gesichts und des Rachens. Dazu kommt eine Röthe der Haut an den Händen und Füßen, zuerst regelmäßig begrenzte bläuliche und braunrote Flecken von Linien- bis Nagelgröße, die allmählich zusammenfließen, sich oft über den Rand verbreiten, während das Gesicht meist verschont bleibt; öfter Bläschen- und Quaddelbildung. Dazu kommt weiter ein Gefühl von Ameisenlaufen und Stechen in Fingern und Zehen, zuweilen von großer Schmerzhaftigkeit, Taubheitsgefühl, Schwerbeweglichkeit der Glieder und Muskelfrämpfe. Starke Abmagerung, Schlaflosigkeit, Schweiß, örtliche und allgemeine Ödeme kommen vor. Zuweilen ist Fieber vorhanden. Dauer der Affektion ein bis drei Wochen bis zwei Monate. Meist günstiger Ausgang.

Die lokalen Symptome sind hier die bei der Erythromelalgie beobachteten, doch ist eine Unterscheidung auf Grund der allgemeinen Symptome der Infektionskrankheit, des epidemischen Auftretens usw. sehr leicht.

Von einer weiteren Reihe von Affektionen gelangt die Abgrenzung dann leicht, wenn auf das Symptom des Schmerzes genügend Rücksicht genommen wird. Hierher gehört das Erythema exudativum multiforme. Das Erythem, das meist auf die Extremitäten, besonders Hände und Fußrücken beschränkt ist, tritt nicht als diffuse Röthung, sondern in Form kleiner runder Papeln, die bald konfluirten, auf (Lesser), bisweilen kommt es auch zu Bläschen- und Blasenbildung; die Anordnung ist eine symmetrische. Heftigere Schmerzen fehlen ganz; dagegen sind leichte Allgemeinerscheinungen einer Infektionskrankheit oft vorhanden. Pedrazzini beschrieb ein durch den *Micrococcus tetragenus* hervorgerufenes Erythem, das von Schmerzen begleitet Erythromelalgie vorgetäuscht haben soll. Aus der Schilderung

geht aber ein durchaus abweichendes Verhalten hervor. Noch weniger gestattet das Erythema nodosum eine Verwechslung.

Unter verschiedenem Titel ist eine Reihe von Zuständen beschrieben worden, die als einziges Symptom eine diffuse Rötze aufweisen. Pick hat solche Fälle unter dem geographischen Namen der Erythromelie mitgeteilt. Es fehlten alle subjektiven Beschwerden, ferner auch sekretorische und trophische Störungen; nur in einem Fall zeigte die Epidermis eine leichte Ranzelung. Als weitere Unterscheidung gegen die Erythromelalgie ergab sich, daß gerade die Extremitätenenden frei blieben, während Unterarme und Unterschenkel befallen wurden. Pick faßt die Affektion als vasomotorische Neurose zentralen Ursprungs auf. In der Diskussion des Pickschen Vortrages berichteten Neumann, Kaposi, Jadassohn über ähnliche Fälle. Blaschko hat unter dem Titel „Symmetrische Erythrodermie der Arme“ einen ähnlichen Fall beschrieben: es hatte sich im Laufe von $1\frac{1}{2}$ Jahren allmählich ein Erythem ausgebildet, das am Oberarm begann und allmählich zur Hand hinunterziehend erst links, dann rechts sich ausgebreitet hatte. Schmerzen fehlten völlig. Ledermann sah einen ähnlichen Fall. Klingmüller beschrieb zwei Fälle von Erythromelie. Die Veränderungen saßen besonders an der Streckseite der Extremitäten, an Hand- und Fußrücken. Klingmüller schließt sich der Pickschen Deutung nicht an, er hält das Leiden vielmehr für eine eigenartige Gefäßerkrankung mit Pigmentverfärbung und sekundäre Hautatrophie und Heller hält den Zustand für das erste Stadium der Sklerodermie. Einen von uns beobachteten ähnlichen Fall wollen wir später, in dem der Sklerodermie gewidmeten Kapitel mitteilen.

Alle diese Fälle sind besonders deshalb sehr interessant, weil sie die Unhaltbarkeit der Ansicht derer ad oculos demonstrieren, die aus der Erythromelalgie eine vasomotorische Neurose machen möchten; sie zeigen eben, daß die bei der Erythromelalgie vorhandenen vasomotorischen Symptome sehr wohl allein vorkommen können. Das beweisen auch die jüngst von Heß und Königstein mitgeteilten Fälle, bei denen im Bereich der distalen Partien der Hände arterielle Hyperämie, Erhöhung der Temperatur, Hyperalgesie ohne spontanen Schmerz und vermehrte Schweißsekretion nachweisbar waren; Erscheinungen, die sich in geringerer Ausbildung übrigens recht häufig zusammenfinden, ohne daß man ihnen den Wert eines abgeschlossenen Symptombildes zusprechen darf. Die regionale Hyperämie als Zustandsbild kommt, wie wir schon gesehen haben und weiter sehen werden, häufig genug auch bei den „spastischen Vasoneurosen“, Akroparästhesie und Raynaudscher Krankheit vor.

Von den Dermatologen sind ferner unter dem Titel der Erythrodermie noch andere Affektionen beschrieben worden, bei denen sich neben der Rötung erhebliche Störungen der Ernährung der Haut

fundes; auch hier fehlt der charakteristische Schmerz, und die vorhandenen Gewebsnährungsstörungen tragen den Charakter lokal entzündlicher Affektionen.

Bei anderen Affektionen ist zwar der sensible Faktor der Erythromelalgie vorhanden, es fehlt aber der vasomotorische.

Hocher gehören die Akroparästhesien.

Wir sahen, daß hier teilweise die Parästhesien von erheblichen Schmerzen begleitet sein können, doch fehlt in der Schultze'schen Form der Akroparästhesie jedes vasomotorische Symptom, während in der Nethazogleschen nur Blässe und Kälte der Haut vorhanden sind. Daß es bei der Erythromelalgie Anfangsstadien gibt, wo vasomotorische Erscheinungen noch fehlen, ist erwähnt; in diesen Fällen ist eine sichere Abgrenzung gegen die Akroparästhesie wohl nicht immer möglich, wenn auch die Intensität der Schmerzen und ihre Lokalisation (sehr oft an den Füßen) sich in diesem Stadium schon Anhaltspunkte für die Diagnose geben.

Auch die Abgrenzung gegen die im vorigen Kapitel erwähnten Berger'schen Parästhesien gelingt leicht. (Fehlen der vasomotorischen Erscheinungen, Lokalisation der Schmerzen und Intensität derselben abweichend von dem bei Erythromelalgie beobachteten Bilde.)

Eine Reihe schmerzhafter, bestimmte Stellen des Fußes betreffender Affektionen sind unter verschiedenen Namen beschrieben worden: bald handelt es sich um einen heftigen, auf die Gegend der Achillessehne beschränkten Schmerz, bald um einen solchen am untersten Punkte des Hackens (Talgia Tarsalgia), bald um einen in der Gegend des vierten und fünften Metatarsophalangealgelenks lokalisierten Schmerz (Morton'sche Krankheit, *névralgie métatarsienne antérieure*). Affektionen, deren Pathogenese noch nicht klar ist, und die zum Teil jedenfalls auf lokalen Schädlichkeiten (Bursitiden, Peritritiden usw.) beruhen. Namentlich bei der letzteren Affektion können, wie ich einer Schilderung Bernhardt's (Die Erkrankungen der peripherischen Nerven, II, S. 467) entnehme und auch nach einigen Fällen eigener Beobachtung bestätigen kann, die Schmerzen von enormer Heftigkeit sein; sie treten in Paroxysmen auf, während in der Zwischenzeit nur dumpfe Schmerzen vorhanden sind; an den schmerzenden Stellen findet sich nur ausnahmsweise Schwellung und Rötung. Dies Zurücktreten der vasomotorischen Symptome ebenso wie die Beschränkung des Schmerzes auf die Basis der letzten Zehen wird eine Unterscheidung von der Erythromelalgie ermöglichen, doch wird in manchen Fällen eine recht genaue Untersuchung und Beobachtung nötig sein.

Unter dem Namen Pododynin oder Podalgia ist nach einer Reihe meistens auf verschiedene Stellen der Füße beschränkter Schmer-

zen beschrieben worden. Auch gegenüber diesen allen wird das Fehlen vasomotorischer Störungen ein genügendes Unterscheidungsmerkmal abgeben.

Dasselbe Unterscheidungsmoment sichert die Differenzierung von der *Akroasia algera*, bei der außerdem die ausgedehnte Bewegungsunfähigkeit (aus Furcht vor Schmerzen) charakteristisch ist.

Es ist gelegentlich vorgekommen, daß eine Erythromelalgie mit einem Panaritium verwechselt und daß daher incidiert wurde. Die Ähnlichkeit kann groß sein, doch fehlt Fieber, Fluktuation, und andererseits sind die Erscheinungen intermittierend, so daß die Entscheidung meist unschwer zu treffen sein wird; immerhin habe ich in einem Fall eigener Beobachtung in den ersten Tagen erhebliche diagnostische Schwierigkeiten gehabt.

Schwieriger wird die Differentialdiagnose gegenüber gewissen Erkrankungen des Gefäßapparates. Bismilen kommt es bei allgemeiner und sich auch auf die Extremitätenarterien ausdehnender Arteriosklerose in den Extremitäten, besonders in den Füßen und Unterschenkeln, zu heftigen, anfallsweise sich verstärkenden Schmerzen und zu einer Verfärbung des betreffenden Teiles, die sich meist als eine dunkel- bis blaurote dokumentiert. Ausbruch hat zwei solche Fälle beschrieben. Beide verschlimmerten sich nach derart, daß eine Amputation des Fußes notwendig erschien; im zweiten Fall starb die Kranke kurz vor der Amputation; die Sektion ergab eine mittelstarke allgemeine Arteriosklerose.

Auch Sachs und Wiener haben zwei Fälle dieser Art veröffentlicht, die in vieler Beziehung große Ähnlichkeit mit der Erythromelalgie haben. Auch ihren dritten Fall habe ich dieser Gruppe zugerechnet, während sie selbst ihn als echte Erythromelalgie auffassen. Ebenso rechne ich auch, wie schon mehrfach betont, den Fall Hamiltons in das Gebiet der endarteriitischen Gangrän, wie denn der Autor selbst auf Grund seines Falles die Erythromelalgie als eine der Endarteriitis obliterans nahestehende Affektion auffaßt. Und ich habe auch in einigen Fällen von Elsner und denen von Shaw erhebliche Bedenken, so der idiopathischen Erythromelalgie zuzuweisen. In allen diesen Fällen waren klinisch die Zeichen der Arteriosklerose im erkrankten Gebiet und darüber hinaus nachweisbar, und die Gangrän wies die Kennzeichen der endarteriitischen Gangrän auf. Es kann zwar bei der Erythromelalgie ein Ausgang in Gangrän vorkommen, wie z. B. einer der Fälle von Elsner beweist, aber die Gangrän tritt dann in anderer Form ein, in der Weise nämlich, wie wir sie bei der Raynaud'schen Krankheit entstehen sehen. Der Unterschied beider Gangränformen soll im nächsten Kapitel noch ausführlich besprochen werden. Diese Fälle unterscheiden sich rein symptomatologisch von dem typischen Bilde der Erythromelalgie dadurch, daß es fast niemals für

längere Zeit zu einer aktiven Hyperämie, zu einem übermäßigen Klopfen und Pulsieren und einer hellen Rötung der betreffenden Teile kommt, sondern meist von vornherein das Bild der funktionell oder mechanisch bedingten Cirkulationsverlangsamung vorhanden ist. Auch der ungünstige Einfluß der Hitze wird oft vermehrt, während Herabhängenlassen der Glieder begreiflicherweise auch hier verschlimmernd wirken kann. Dies, ferner der Nachweis ausgedehnter Arteriosklerose und weiter eventuell der Ausgang in eine umfangreiche Gangrän gestatten eine Unterscheidung. Daß dieselbe jedoch recht schwierig werden kann, beweist der von Dehio mitgeteilte Fall, der vom Autor als typische Erythromelalgie angesehen, von Auerbach, wie erwähnt, der eben geschilderten Gruppe zugerechnet wird. Es muß, und das verneuert die sich hier darbietenden Schwierigkeiten der Diagnose, auch daran gedacht werden, daß an einem arteriosklerotisch veränderten Gefäße reflektorische Störungen der Innervation, die auch zur aktiven Hyperämie führen, vorkommen könnten, und da ferner die von Dehio, im Anschluß an die von Thoma angestellten Forschungen, gemachte Annahme einer durch Innervationsstörungen bedingten sekundären Arteriosklerose ebenfalls gewisse Geltung zu haben scheint, ergötzt sich eine Menge von schwer auseinanderhaltenden Möglichkeiten und Kombinationen, die nicht immer einen sicheren Schluß zugunsten der einen oder anderen Annahme zulassen werden.

Eine weitere differential-diagnostisch in Betracht kommende Affektion ist das „intermittierende Hinken“, auf das Erb vor einer Reihe von Jahren durch eine eingehende Arbeit von neuem die Aufmerksamkeit gelenkt hat. Erb charakterisiert die Affektion in folgendem: völliges oder fast völliges Wohlbefinden in der Ruhe, Beginn des Gehens in ganz normaler Weise, nach wechselnder Zeit Auftreten der Störungen, Schmerzen, Spannungsgefühl, Parästhesien, Gefühl von Lahmheit, so daß schließlich das Gehen verhindert wird; Verschwinden der Symptome nach kurzer Ruhe, erneutes Auftreten nach Bewegungen. Objektiv finden sich Kälte und Cyanose, vorübergehend hellrote Flecken an den cyanotischen Teilen und marmoriertes Aussehen derselben. Zeitweise treten ganz blaue, anämische Stellen auf, einzelne Zehen werden leichenblau, die Haut ist trocken, welk, es besteht oft eine Störung des Nagelwachstums. In fast allen Fällen sind deutliche Veränderungen an den Fußarterien palpabel, oft fehlt der Puls in einer oder der anderen oder selbst in allen Fußarterien — Motilität und Sensibilität sind intakt. Häufig Ausgang in Gangrän. Es sei kurz erwähnt, daß Erb neben der Arteriosklerose der Gefäße noch einem zweiten, funktionellen Element eine große Rolle in der Pathogenese der Krankheit zuweist, einer wechselnden, reflektorisch bedingten Kontraktion der Gefäßwände, nämlich, wodurch erst die Intermissionen des Krankheitsbildes erklär-

lich werden. Oppenheim und andere haben dann sogar eine ausgesprochene funktionelle Art des Leidens beschrieben (s. o. S. 256). Die oben gegebene kurze Beschreibung lehrt, wie ähnlich die Krankheitsbilder des „intermittierenden Hinkens“ und der Erythromelalgie werden können. Unterscheidend ist auch Erb die Art der vasomotorischen Störung, das stärkere Pulsieren der Gefäße, das von Bewegungen unabhängige Auftreten, das Fehlen ausgesprochener motorischer Störungen und gröberer Gefäßanomalien bei der Erythromelalgie. Aber man wird genau zusehen müssen, wenn man Verwechslungen vermeiden will. Ob selbst größte Vorsicht immer helfen wird? Wenn Erb sagt, daß in dem spontanen, vom Gehen unabhängigen Auftreten der Störungen etwas die Erythromelalgie Charakterisierendes liegt, so trifft das für sehr viele Fälle nicht zu, in denen die Patienten in der Ruhe sich verhältnismäßig wohl fühlen; eher dürfte der allerdings nicht immer nachgewiesene schädliche Einfluß der Wärme bei der Erythromelalgie zu berücksichtigen sein. Stärkere Gefäßveränderungen, insbesondere Fehlen des Pulses in den Fußarterien, sprechen zugunsten von intermittierendem Hinken, doch kann der Puls, wie Erb zeigt, in Ausnahmefällen auch beim „intermittierenden Hinken“ erhalten sein. In einer Reihe von Fällen konnte die Röntgenuntersuchung durch den Nachweis einer gleichmäßigen Kalkablagerung in den Arterien zur Stütze der Diagnose verwertet werden. Die vasomotorischen Erscheinungen treten bei der Erythromelalgie meist mehr in den Vordergrund, doch sind namentlich dann, wenn, wie nicht selten, bei der Erythromelalgie Symptome des Angiospasmus sich zu denen der Gefäßerweiterung gesellen, auch in dieser Beziehung Ähnlichkeiten mit den entsprechenden Symptomen bei intermittierendem Hinken vorhanden. Schließlich sprechen von den Begleitsymptomen der Erythromelalgie die einer organischen Erkrankung des Gehirns oder Rückenmarks eher zugunsten der Erythromelalgie. Auch dabei ist aber zu berücksichtigen, daß beim intermittierenden Hinken auch andere Gefäßgebiete und zwar nicht nur die des Armes und des Darms, sondern auch die des Centralnervensystems Sitz gleicher Veränderungen werden können, wie Erfahrungen von Oppenheim, Grasslet, Dejerine, Rosenfeld lehren. Auf diese Weise können auch hier schwere cerebrale und spinale Anfallsymptome sich geltend machen. Schließlich besteht auch eine Gemeinsamkeit darin, daß das intermittierende Hinken sich besonders bei neuropathischen Individuen findet, so daß darin ein Unterschied gegen Erythromelalgie sich nicht ergibt. Sind die Symptome auf ein Nervengebiet beschränkt, so wird man vorzugsweise an Erythromelalgie denken. Man sieht, genug Anhaltspunkte für eine Diagnose, doch keiner so entscheidend, daß nicht in bestimmten Fällen eine Unsicherheit der Diagnose sich ergeben muß, wie dies am besten der von Weir-Mitchell und Spiller mit-

geteilte Fall beweist. Diese engen symptomatologischen Beziehungen zwischen Erythromelalgie und intermittierendem Hinken finden meiner Auffassung nach eine Erklärung in einer gewissen Wesensverwandtschaft der beiden Affektionen, auf die ich im vorigen Abschnitt schon eingegangen bin.

Verlauf, Prognose.

Der Verlauf der Affektion, um welche der verschiedenen Formen der Erythromelalgie es sich auch immer handelt, ist meist ein exquisit chronischer, vielleicht mit Ausnahme der hysterischen Form, wenn auch zu bedenken ist, daß andere hysterische Symptome ähnlicher Genese, wie das *coeleste bleu* sehr hartnäckig sein können. Wir sahen oben, daß die Krankheit in der Mehrzahl der Fälle sich allmählich ausbreitet und zunächst an Extensität und Intensität der Erscheinungen zunimmt, somit also progressiv ist. Einen plötzlichen Beginn erwähnen dagegen u. a. Senator, Gerhardt, Heimann, Nieden. Die Progression macht jedoch oftmals nach verschieden langer Dauer Halt, und die Krankheit bleibt auf dem einmal erreichten Punkt stehen (Weir-Mitchell, Lannois) oder es findet ein allmählicher Rückgang statt. Das ist naturgemäß sehr verschieden nach der Form der Erythromelalgie, die gerade vorliegt. In einer Anzahl von Fällen, in denen die Erythromelalgie als Symptom eines schweren, organischen Hirnleidens erschien, fand sich ein ganz allmähliches Fortschreiten aller Symptome, das sich in einem Fall von Weir-Mitchell über mehr als anderthalb Dezennien fort erstreckte. Fälle mit sehr langer Dauer konnten u. a. auch Paget, Lannois-Strauss, Morgan (IV. Fall), Lannois und Porot beobachten. Aber wie gesagt, ist da nicht immer von einer Progression die Rede, sondern die Affektion bleibt stehen. In einem Fall Eulenburs ist notiert, daß bei einem 54jährigen Schneider zuerst im 22. Lebensjahr Ameisenlaufen, Schmerzen und Rötung auftraten und erst zehn Jahre später eine Steigerung der Beschwerden sich einstellte. Auf zwei Dezennien beläuft sich auch die Krankheitsdauer in Auerbachs Fall. Wiederholt wurde der Exitus an Erythromelalgiekranken konstatiert, davon starben zwei an einer Hemiplegie (Graves, Henoch), einer an Dementia paralytica (Machol). In Weir-Mitchells Fall, der letal endigte, wurde eine Sektion nicht gemacht, eine bestimmte Todesursache ergibt sich aus der Schilderung nicht, Auerbachs Fall wurde oben in extenso mitgeteilt, ebenso die Fälle von Hamilton (Exitus an Urämie), Lannois und Porot, Elsner (Arteriosklerose). Auch eine Patientin Kellys starb an Arteriosklerose. Eine Sektion wurde hier nicht gemacht. In dem Fall von Hornowski und Rudzki erfolgte der Exitus an einer komplizierenden Ruhr.

In einer ganz erheblichen Zahl von Fällen kam es zu einer Beso-

zung der Symptome der Erythromelalgie (Graves, Weir-Mitchell, Seeligmüller, Lewin-Benda, Senator, Rosen, Straub, Mutschnik, Auerbach, Schenk, eigener Fall, Savill u. a.), nach verschieden langer, meist aber mehrere Jahre betragender Dauer. Einige Male, nicht gerade oft, wird auch von einer völligen Heilung berichtet, die in einzelnen Fällen (Grenier, Helmann, Personali, Lévi, Severino, Städtler, Serio) nach mehrmonatlichem, andermal nach jahrelangem Verlauf (Sigerson, Morgan, Lévi) eintrat.

Im allgemeinen sind die Symptome, wenn sie erst einmal zu einiger Höhe gediehen sind, von einer recht erheblichen Hartnäckigkeit.

Die Prognose ist daher in bezug auf das Verschwinden der Symptome der Erythromelalgie eine ziemlich zweifelhafte, eine völlige Heilung ist selten, eine Besserung eher, aber meist erst nach längerer Zeit zu erwarten. Eine Gefährdung des Lebens ist nicht vorhanden; nur dort, wo schwere organische, cerebrale oder spinale oder vasculäre Affektionen vorliegen, können diese zum Tode führen.

Schließlich sei noch bemerkt, daß sich bezüglich der Prognose zwischen den verschiedenen Formen der Erythromelalgie ein deutlicher Unterschied nicht ergibt.

Therapie.

Nach dem, was wir oben über die Prognose der Symptome der Erythromelalgie sagten, wird es nicht wundernehmen, wenn sich ergibt, daß die Behandlung meist nicht von Erfolg gekrönt war. Die Zahl der versuchten Mittel ist dabei eine außerordentlich große gewesen. Das einfachste Mittel, den Kranken Erleichterung zu verschaffen, ist horizontale Lagerung, Vermeidung aller Bewegungen und, wenigstens in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, Kälte. Die Kranken pflegen sich den letzten Umstand oft in ausgedehntem Maße zuzutreiben: der eine konnte nur schlafen, wenn er eiskaltes Wasser neben sich stehen hatte, in das er von Zeit zu Zeit seine Füße steckte. Ein Kranker Weir-Mitchells schnitt sich selbst die Nägel unter kaltem Wasser. Um das Herabhängen der Arme zu vermeiden, trug ein anderer Kranker die Arme stets gekreuzt über der Brust. Von ärztlichen, hydrotherapeutisch-thermischen Maßnahmen stehen uns allgemeine kühle Bäder, lokale kühle Bäder, Douchen und Eishäsen zur Verfügung. Doch vertragen, wie gesagt, nicht alle Kranken die Kälte und vereinzelt bringt sie direkt Verschlimmerungen hervor (Bernhardt, Prentiss, Weber). Meist werden feucht-warme Umschläge in welcher Form auch immer schlecht vertragen, was ich auch von einer meiner Kranken berichten kann. Viel besser wirkten kalte Abwaschungen mit Salzwasser; Crocker berichtet dagegen von günstiger Wirkung heißer Bäder. Die kalte Jahreszeit bringt den Kranken oft einen sehr erwünschten Nachlaß

ihrer Beschwerden. Das Gebot absoluter Ruhe, das meist indiziert erscheint, ist bei der langen Dauer der Affektion nicht immer durchführbar. Von weiteren physikalischen Heilpotenzen ist zunächst die Elektrizität zu nennen. Mit der Faradisierung erzielte Sigerson einen vollen Erfolg, andere sind weniger glücklich gewesen, immerhin wird man die Methode in der einen oder anderen Form, insbesondere als faradische Lokalbäder wenigstens versuchsweise anwenden. In zweiter Linie kommt der konstante Strom in Betracht und dieser meist so, daß die Anode auf die schmerzenden Teile aufgesetzt wird. Wir hatten mit einem durch mehrere Wochen angewendeten galvanischen Fußbad wenig dauernden Erfolg, wenn auch die Kranke während der Durchleitung des Stromes selbst sich wohl fühlte. Savill rühmt langdauernde galvanische Behandlung in einer den jetzt gebräuchlichen Vierzellenbädern ähnlichen Anordnung. Weiterhin wurde eine leichte Massage hiezu mit Erfolg (Pajor) versucht. Kanoky berichtet über einen Erfolg bei Anwendung von Röntgenstrahlen; sicher ist hier große Vorsicht am Platze.

Noch weniger gutes ist von der medikamentösen (außerlichen und innerlichen) Behandlung zu sagen. Es scheint nicht viel Mittel zu geben, die bei dem Leiden nicht versucht wurden, und in einzelnen Fällen wurde an einem Individuum der Reihe nach beinahe die ganze Pharmakopoe ausprobiert. So bekam eine Patientin von Prentiss nacheinander Chloroform, Jodtinktur, Tonica, Coffein plus Phenacetin, Nitroglycerin, wieder Tonica, Wismut, dann wurde sie mit dem konstanten Strom (vom Nacken zur Hand) behandelt, dann kam Cannabis indica an die Reihe und schließlich nahm man zu Morphinum — und diemal mit Erfolg — seine Zuflucht. Das Morphinum als Heilmittel rühmt übrigens auch Morgan. Außerlich kamen oft Jodpinselungen zur Anwendung, Sturge sah gutes von einem Atropinliniment, Szontagh rühmt Ichthyol, Koppins Mentholvaselin.

Innerlich wurden insbesondere die Sedativa, andererseits die Tonica (Eisen, Arsen, Chinin) gegeben. Die ersteren dort, wo ein allgemein neuropathischer Zustand, die letzteren, wo ein schlechter Allgemeinzustand vorlag. Gegen die Schmerzen wurden, und öfter nicht ohne Erfolg, die neueren Antipyretica, insbesondere Antipyrin, Phenacetin, Aspirin usw. verwendet, ferner ebenso Salicyl; Aspirin erwies sich in einem eigenen Fall als ausgezeichnet. Subkutan nahm Weir-Mitchell Opium ohne Erfolg in Verwendung. Da, wo Verdacht auf organische Gefäßveränderungen vorliegt, ist Jodkalium zu verwenden. Zweimal wurde es im Verein mit Quecksilber mit gutem Erfolg bei syphilitischen Kranken gegeben (zweifelhafte Fälle!).

Benolistinjizierte Ergotin mit günstigem Erfolge, der aber dadurch zunächst gemacht wurde, daß dauernd mit der wirksamen Dosis in

die Höhe gegangen werden mußte. Über die von dem Autor versuchten Stovaininjectionen haben wir schon berichtet. In schweren Fällen sollte man sich an das Mittel jedenfalls erinnern.

Die Hypnose brachte Lévi in seinem Fall von ausgesprochener hysterischer Erythromelalgie einen vollen Erfolg.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß bisher fünfmal ein operatives Heilverfahren eingeschlagen wurde (Fall von Dehio, drei Fälle von Weir-Mitchell, einer von Sachs und Wiener). Dehio resezierte ein Stück des N. ulnaris und unterband die Art. ulnaris doppelt. Der Erfolg war kein zufriedenstellender. Die Hyperämie im Ulnargebiet verschwand, ebenso hörte das Schwitzen auf, während alle übrigen Störungen unverändert blieben. Weir-Mitchell nahm in seinem ersten operierten Fall $2\frac{1}{2}$ Zoll des N. musculocutaneus und ebenso viel vom N. saph. major weg und dehnte die zwei Äste des N. tibial. post. am inneren Malleolus. Es trat eine sofortige Besserung bis zu fast völliger Heilung ein; unglücklich verlief die Operation in einem zweiten Fall Weir-Mitchells, wofür wir nur ein kurzes Referat zu Gebote steht. Hier nahm der Autor 4 Zoll vom N. musculocutaneus und 5 Zoll vom Saph. intern. weg und dehnte den Tibial. post. Am fünften Tage trat Gangrän ein, und eine Woche später erfolgte der Tod gelegentlich der beläufig Amputation notwendigen Operation. Im dritten Fall ließ der Autor die erkrankte Zehe amputieren. Nach einiger Zeit schienen sich Schmerzen in der Hacke einzustellen. Sachs und Wiener amputierten in ihrem oft erwähnten Fall das erkrankte Bein am Oberschenkel. Die Erscheinungen verschwanden dauernd. In Elsners Fall wurde der zweite Finger mit einem Teil des Metacarpus entfernt. Der Bericht über den weiteren Verlauf umfaßt nur die ersten acht Wochen nach der Operation. Bis dahin blieben die Krankheitserscheinungen fort. In einem Fall Hamiltons, der kurz erwähnt wird, wurde eine Resektion der sensiblen Zweige des eines Ischiadicus gemacht, für ein halbes Jahr trat Besserung ein, dann kehrten die alten Erscheinungen wieder. Leotta will in einem Fall, bei dem es schon zu Gangrän der großen Zehe gekommen war, von einer Nervensektomie einen Erfolg gesehen haben. Eine Durchschneidung peripherer oberflächlicher sensibler Fasern, die Quinby in einem Fall vornahm, führte zu keinem Erfolg.

Viertes Kapitel.

Die Raynaudsche Krankheit.

Einleitung.

In der ersten Gruppe der bisher von uns besprochenen Krankheitsbilder, bei den Akroparästhesien und der Nothnagelschen Neurose hatten wir es hauptsächlich mit Störungen der Sensibilität und Vasomotilität zu tun; wir sahen in manchen Fällen dieser Gruppe sich das Krankheitsbild sogar noch weiter vereinfachen, indem entweder nur sensible oder nur vasomotorische Störungen vorlagen. In den der Erythromelalgie zugerechneten Krankheitsbildern begegneten wir wieder sensiblen und vasomotorischen Störungen, aber wir sahen im Verlauf unserer Darstellung auch, daß sich nicht selten trophische Veränderungen, die wir als neurastisch bedingte auffassen mußten, zu diesen Symptomen gesellten.

In der Krankheitsgruppe, der wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zuwenden, der Raynaudschen Krankheit, treten die neurotrophischen Störungen stark in den Vordergrund, sie stellen wenigstens in den typischen und voll ausgebildeten Fällen das markanteste Symptom dar; neben diesen trophischen Störungen sind allerdings Störungen der Sensibilität und Vasomotilität durchaus gewöhnliche Erscheinungen und gehören zum Krankheitsbild.

Die trophischen Störungen bieten sich uns bei der Raynaudschen Krankheit sehr häufig in der schwersten Form dar, in der Form des lokalen Gewebstodes, der Gangrän. Diese Gangrän kommt, wie der erste Beschreiber der Krankheit, nach dem die Krankheit ihren Namen führt, gezeigt hat, sehr häufig symmetrisch an den Akren des Körpers vor, und Raynaud hat der ganzen Affektion von diesem, ihrem markantesten Symptom her den Namen *gangrène symétrique* gegeben.

Es mag mir gestattet sein, bevor ich auf die Geschichte der Raynaudschen Krankheit eingehe, einige Worte über den Begriff und die verschiedenen Arten der Gangrän im allgemeinen zu sagen. Ich halte mich dabei an die Darstellung Zieglers (Lehrbuch der pathologischen Anatomie, V. Aufl., I. S. 81). Unter Gangrän oder Nekrose versteht man den Tod einzelner Zellen und Zellgruppen, also den fötlichen Tod im Gegensatz zu dem den Gesamtorganismus betreffenden Tod. Die Schädlichkeiten, welche den örtlichen Tod zur Folge haben, kann man in drei Gruppen einteilen: die erste umfaßt diejenigen, welche das Gewebe direkt durch mechanische oder chemische Einwir-

kung vernichten; so kann eine äußere Gewalt einen Finger zerquetschen, Schwefelsäure ein Stück Haut zerstören. Zweitens können Schädlichkeiten thermischer Art Gangrän zur Folge haben: eine Erhöhung der Temperatur über 54–68° C führt den lokalen Tod eines Gewebes herbei, nach unten liegt die Grenze der Erhaltung des Lebens bei 16 bis 18°. Drittens kann die Behinderung der Ernährungszufuhr durch das Blut eine Ursache der Gangrän abgeben. Es können also Thrombosen, Embolien, Verschlauß der Gefäße durch Druck usw. zu diesem Resultat führen. Ob eine gegebene Schädlichkeit ein Absterben des Gewebes erzeugt, hängt dabei nicht nur von Beschaffenheit und Stärke der ersteren ab, sondern wesentlich auch von dem momentanen Zustand des Gewebes. Eine längere Zeit andauernde mangelhafte Circulation, Veränderungen der Blutmischung, allgemeiner Marasmus setzen die Vitalität der Gewebe herab, und es gehört eine geringere Schädlichkeit dazu, diese Gewebe zum Absterben zu bringen. Die Art der Gangrän kann eine verschiedene sein; für uns kommen zwei Arten besonders in Betracht: die Nekrose mit Ausgang in Mumifikation (sogenannter trockener Brand) und die Nekrose mit Ausgang in feuchten Brand. Der erstere kommt hauptsächlich an Teilen vor, die der Luft ausgesetzt sind, wir finden ihn besonders im Altersbrand der Extremitäten vertreten; auch der Frostbrand pflegt ein trockener zu sein. — Neben diesen Arten der Nekrose gibt es noch andere, die uns hier nicht weiter interessieren, wie die Coagulationsnekrose und die Kolliquationsnekrose.

Wir haben drei verschiedene Arten der Genese der Gangrän kennen gelernt, es gibt aber noch eine Anzahl von Fällen, in denen keins der hier angeführten Momente nachweislich wirksam gewesen ist, das sind diejenigen Gangränformen, die man als neuropathische Nekrosen bezeichnet hat, d. h. solche, die sich nach Läsionen des centralen oder peripheren Nervensystems einstellen. Über ihre Genese sind die Meinungen noch sehr geteilt, es wird von den einen angenommen, daß die wesentliche Ursache der Nekrose eine Läsion spezieller trophischer Nerven sei, während andere neurogene Störungen der Circulation, wieder andere mechanische Verhältnisse als Ursache beschuldigen. Wir haben diese Dinge bereits im allgemeinen Teil erörtert und unsere Meinung über die Genese derartiger neurotrophischer Störungen gesagt. Zu ihnen gehört nun auch die Form der Gangrän, die uns im vorliegenden Kapitel speziell beschäftigen wird.

Quesnay soll — wir folgen hier Hocheneggs Angaben — der erste gewesen sein, der das Entstehen der Gangrän mit Störungen im Gebiet der Nerven zusammenbrachte (im Jahre 1749). Er versuchte auch, seine Ansicht experimentell zu stützen, doch wurde seine Deutung der Experimente von Hébréard und Wall widerlegt. 1807 hat Reil in seiner Arbeit über das Absterben einzelner Glieder, besonders der

Finger, die Ansicht geäußert, daß in diesem Zustand Nerven und Gefäße ihrer Vitalität beraubt sind; wahrscheinlich hebe das Lösen in den Nerven an und gehe von da aus erst ohne Zeitverlust auf die Gefäße über. François suchte 1832 den Beweis zu liefern, daß zwar die Unterbrechung des Nerveneinflusses allein niemals genügen würde, Gangrän hervorzurufen, aber daß sie das Entstehen der Gangrän begünstige, wenn daneben ein Circulationshindernis bestehe.

Die Annahme von einem Einfluß des Nervensystems auf das Entstehen der Gangrän wurde wieder in den Hintergrund gedrängt, als Virchow den Nachweis erbrachte, daß für die große Mehrzahl der bis dahin als Spontangangrän bezeichneten Fälle der Grund der Gangrän in einer primären Verstopfung der zuführenden Arterien zu suchen sei, sei es infolge von Embolie oder von Thrombose. Das Resultat, zu dem Virchow gelangte, war die völlige Zurückweisung der „Spontangangrän“: „so vorzüglich überhaupt in den Vorgängen des Lebens der Ausdruck Spontanität zu gebrauchen ist, so vollständig können wir seiner bei der Geschichte der Nekrose entbehren.“ Aber auch Virchow ging nicht so weit, alle Fälle von spontaner Gangrän durch Verstopfung des Lumens der Gefäße erklären zu wollen; davon hielt ihn die Erfahrung beim Mutterkornbrand ab, von dem er ausdrücklich bemerkt, es scheine, daß anhaltende spastische Ischämie schon die Nekrose bedingen oder diese aufs äußerste begünstigen könne (Handb. d. spez. Path. und Ther., 1854, I, S. 281).

Es waren besonders französische Forscher, die auch jetzt wieder an der nervösen Genese zahlreicher Brandformen festhielten, so Racle, der einen Fall von symmetrischer Gangrän, bei dem zahlreiche nervöse Störungen vorhanden waren, publizierte. Am weitesten ging in dieser Beziehung Zambaco. Dieser stellte, nach Beobachtungen an Kranken mit progressiver Paralyse, die Behauptung auf, daß Gangrän auch infolge gestörter Innervation entstehen könne. „Indem er den Nerven einen direkten Einfluß auf die Ernährung zuerkannte, kommt er, mehr infolge theoretischer Deduktionen als auf Grundlage nackter Tatsachen zu dem Schluß, daß funktionelle Störungen im Nerven ganz allein, ohne jede Alteration der Gefäße, den lokalen Tod herbeiführen können.“ Zambaco geht so weit, daß er das nervöse Element nicht nur bei spontaner, sondern bei jeder Gangrän überhaupt eine große Rolle spielen läßt.

Alle diese Arbeiten wurden aber nur wenig beachtet und blieben ohne weiteren Einfluß. Erst Raynaud gelang es 1862 durch seine Monographie: „De l'asphyxie locale et de la gangrène symétrique des extrémités“ der nervösen Gangrän dauernd das Bürgerrecht zu erwerben. „Je ne propose“ — so lautet der wichtigste disbezügliche Passus seiner Monographie — „de démontrer, qu'il existe une variété de gangrène sèche, affectant les extrémités, qu'il

est impossible d'expliquer par une oblitération vasculaire; variété caractérisée surtout par une remarquable tendance à la symétrie, en sorte qu'elle affecte toujours des parties similaires, les deux membres supérieurs ou inférieurs, ou les quatre à la fois, plus dans certains cas le nez et les oreilles et je chercherai à prouver que cette espèce de gangrène a sa cause dans un vice d'innervation des vaisseaux capillaires".

Wenn nun aber die symmetrische Gangrän auch das hervorstechendste Symptom dieser Affektion ist, die man in der Folge meist als Raynaudsche Krankheit bezeichnet hat, so ist sie doch nach Raynauds eigener Angabe nicht das einzige und nicht das erste. Der Gangrän gehen regelmäßig vasomotorische Störungen voraus, und zwar als erstes Stadium die lokale Synkope, als zweites die lokale Asphyxie. Schon unter den Fällen seiner ersten Arbeit hat Raynaud vier verzeichnet, in denen es überhaupt nur zur lokalen Synkope, vier, in denen es nur zu lokaler Asphyxie kam, ohne daß in einer dieser Beobachtungen je Gangrän eintrat.

Wie es in solchen Fällen stets zu gehen pflegt, war Raynaud keineswegs der erste, der solche Krankheitsfälle gesehen und beschrieben hatte, es hatten schon vor ihm einzelne Ärzte derartige Beobachtungen veröffentlicht, ohne aber ihre nosologische Sonderstellung zu erkennen und zu präzisieren. Raynaud selbst führt eine Anzahl solcher Beobachtungen zur Stütze des von ihm entworfenen Krankheitsbildes an; Herkenegg berichtet von weiteren, ebenso Simpson Birt und Mills; Birt erwähnt einen Fall von symmetrischer Gangrän, der vor 200 Jahren in einem Buch von Simon Fow „a discourse concerning Gods judgement“ beschrieben sein soll. Noch älter ist eine Beobachtung, die in der Collection académique vom Jahre 1775 von Schrader erwähnt wird; hier handelt es sich um einen im Jahre 1769 beobachteten Fall von einer in jedem Monat redivivierenden Gangrän an sämtlichen Fingern und Zehen bei einem 25jährigen Mädchen. Christoph Hertius soll 1685 einen hieher gehörigen Fall beschrieben haben (der Fall wurde von Monro an der von Raynaud zitierten Stelle nicht gefunden, dagegen fand Monro dort zwei von Hanneemann mitgeteilte und vielleicht zur Raynaudschen Krankheit gehörige Fälle), ein weiterer soll nach Monrostein 1703 der Pariser Akademie vorgestellt worden sein. 1807 hat Reil in seiner schon erwähnten Abhandlung die Erscheinungen der lokalen Synkope geschildert und als deren Lokalisation die Extremitäten, ferner die Nasenspitze und Ohrklappen, angegeben. Bocquet berichtet 1808 von einem Fall von oberflächlicher Gangrän an den Fingern und Zehen eines sechsjährigen anatomischen Mädchens. Weitere Fälle haben Molin, Solly, Baillarger, Eitmüller, Henry, Duval, Chadwick berichtet; den Digitus mortuus beschrieb auch Brodie 1832. Dayman

teilte 1883 mit, daß er im Juli 1846 einen Fall von symmetrischer Gangrän veröffentlicht habe, und Camps einen ähnlichen 1855. Ein genaueres Eingehen auf diese historischen Daten unterlasse ich. Man findet Ausführliches darüber in Monros Monographie, S. 18—28.

Alle diese Beobachtungen hatten aber nur den Wert interessanter Kuriosa, deren Deutung eine höchst zweifelhafte war, bis Raynaud, zum Teil auf diese Beobachtungen gestützt, mehr noch aber auf Grund eigener Erfahrungen, das Krankheitsbild der symmetrischen Gangrän zeichnete. Er ist ein Decennium später noch einmal in zwei neuen Publikationen auf den Gegenstand zurückgekommen.

Wenn wir uns, ehe wir weiter gehen, kurz die Hauptzüge der Krankheit, die Raynaud uns kennen gelehrt hat, vor Augen führen, so ergibt sich uns folgendes Bild: Meist bei Frauen und häufig bei nervösen Personen, die etwa im Alter von 18—30 Jahren stehen, kommt es im Anschluß an Kälteeinwirkungen oder an psychische Erregungen, aber auch ohne solche veranlassende Momente anfallsweise zunächst einmal zu einer Blässeigkeit und Weißfärbung gewisser symmetrisch gelegener, gipfelnder Teile; diese Erscheinung der Synkope locale wechelt sehr bald ab oder wird ganz ersetzt durch die der Asphyxie locale, bei der die betreffenden Teile ein durchaus livides, cyanotisches Aussehen annehmen. Beide Zustände zeigen die engste Verwandtschaft, und es kann an einem Teil eine völlige Blässe, an dem dicht daneben liegenden gleichzeitig Cyanose vorhanden sein. Fast stets sind diese Anfälle mit Schmerzen verbunden, die enorm intensiv werden können; dazu kommt oft eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Anästhesie der betreffenden Teile. Der Anfall löst sich, indem unter Krabbeln und Brennen hellere Flecken auf den cyanotischen Stellen erscheinen und sich allmählich wieder völlig normales Verhalten einstellt. Die Anfälle wiederholen sich in wechselnden Zwischenräumen immer in derselben Weise, und in einer nicht geringen Anzahl von Fällen ist mit den Erscheinungen dieser intermittierenden Synkope und Asphyxie locale das Krankheitsbild erschöpft. In schwereren Fällen kommt es nun aber zur Entwicklung der Gangrène symétrique. Anstatt daß sich die Asphyxie vermindert, wird die Cyanose immer tiefer. Die Farbe wird dunkelblau bis schwarz, es kommt zur Abhebung der Epidermis, zur Blasen- und Geschwürsbildung; danach entstehen kleine, feste, schwarze Schoffe, die sich allmählich abstoßen. Der Substanzverlust betrifft nicht allein die Epitheldecke, sondern geht oft bis ins Unterhautbindegewebe. Dagegen kommt es fast nie zu einer Nekrose, die mehr als eine Phalange betrifft. Diese Gangrän, die stets eine trockene ist, ist weiter durch ihre völlige Unabhängigkeit von irgendeiner anatomischen Läsion des Gefäßsystems charakterisiert, ferner durch ihr Auftreten im Laufe eines Anfalls mit vorangehenden schweren vasomotorischen Symptomen und durch ihre Symmetrie, die, wenn sie auch nicht eine vollkommene

im geometrischen Sinne ist, doch fast stets sehr ausgesprochen ist. Sehr wichtig ist, daß der Allgemeinzustand bei der Affektion keine Störung zeigt, daß der Urin frei von pathologischen Bestandteilen bleibt. Raynaud nahm, so viel sei bezüglich der Pathogenese jetzt nur gesagt, an, daß dieses Leiden auf einer direkt oder reflektorisch bedingten erhöhten Reizbarkeit der im Rückenmark resp. in der Medulla oblongata gelegenen vasomotorischen Centren beruhe; jedenfalls erschien ihm eine anatomische Veränderung des Nervensystems der ganzen Art der Krankheit gemäß ausgeschlossen.

Diejenigen, die nach Raynaud über derartige Krankheitsfälle berichtet haben, haben sich in ihren Diagnosen keineswegs immer an diese von Raynaud gegebene Feststellung der wichtigsten Züge der Affektion gehalten; und es sind, namentlich von englischen Autoren unter dem Namen Raynaudsche Krankheit Fälle beschrieben worden, die kaum noch einen Zug mit dem ursprünglichen Krankheitsbilde der Raynaudschen Affektion gemeinsam hatten: da fehlte die Symmetrie und die vorausgehenden vasomotorischen Erscheinungen; das Gefäßsystem war nicht intakt, die Gangrän trat im Laufe einer Infektionskrankheit auf, dehnte sich weit aus, und anderes mehr. Haben wir es in diesen Fällen mit einer ganz unzulässigen Erweiterung des Krankheitsbildes zu tun, so ist andererseits von einem der gründlichsten und scharfzüngigsten Beschreiber der Krankheit, von Weiß versucht worden, das Bild der Affektion auch noch über die von Raynaud selbst gezogenen Schranken einzuziehen, indem er alle Fälle, in denen es nicht zu einer Gangrän kam, sondern nur zu vasomotorischen Störungen und zur Asphyxie locale, ebenfalls ausschloß; er sonderte damit also eine ganze Anzahl von Fällen ab, die Raynaud selbst der Krankheit zugerechnet hatte; es ist hier noch nicht der Ort, über die Berechtigung dieses Vorgehens zu sprechen.

Die ersten zwei Decennien nach der ersten Raynaudschen Publikation brachten nur vereinzelte, meist kasuistische Beiträge zu der Krankheit. (Ruecker, Schouboe, Björing, Brüniche, Estländer, Holm, Hameau, Faure, Fischer, Nielsen, Nedopil, Englisch, Warren, Billroth, Mourson u. a.). Erst im Jahre 1882 folgte eine neue umfassende Darstellung des Krankheitsbildes unter subtiler Analyse eines höchst merkwürdigen und interessanten Falles aus der Feder von Weiß, drei Jahre später eine weitere deutsche monographische, freilich vielfach unvollständige Darstellung von Hochsieg.

Die folgenden Jahre brachten wieder eine jetzt beträchtlich zunehmende Zahl von kasuistischen Beiträgen, unter denen auffällig wenig von deutscher Seite publizierte Beobachtungen waren, während namentlich von England aus zahlreiche Einzelmittelungen allerdings (oft recht zweifelhafter Fälle) erfolgten. Einem englischen Autor,

Monro, verdanken wir auch eine neue Monographie der Krankheit. Die Literatur ist in Monros Monographie ziemlich vollständig benutzt, freilich fehlen einige sehr wichtige, namentlich italienische Arbeiten. Ein wenig später erschien die erste Auflage des vorliegenden Buches, in dem eine möglichst vollständige Bearbeitung des Themas versucht wurde. Seither sind nun sehr zahlreiche kasuistische Beiträge veröffentlicht worden, unter denen immer noch auffällig viele mit unzweifelhaft falscher Diagnose sich befinden. Eine zusammenfassende Darstellung hat das letzte Dezennium nicht gebracht und nur wenige Arbeiten von prinzipieller Bedeutung.

Die Zahl der Beobachtungen mit Sektionsbefund wurde allmählich auch nicht unbeträchtlich, außer Hochenegg berichteten solche: Affleck, Begg, Barlow, Brungues, Billroth, Camillo, Calmann, Castellino e Cardì, Collier, Dehio, Eisenberg, Fagge, de Grazia, Goldstandt, Goldschmidt, Kornfeld, Nonne, Panas, Pitres et Vaillard, Scheiber, Thiersch, West, Wigglesworth, Strauß, Chiavuttini, Belkowsky, Lyle and Greave, Couloujou, Dufour, Sauques et Vincent, Beck.

Die gefundenen Veränderungen betrafen teils das periphere, teils das zentrale Nervensystem, teils das Gefäßsystem, während ein großer Teil der Sektionen überhaupt ein völlig negatives Ergebnis hatte. Schon diese Angaben zeigen genügend, daß trotz der zahlreichen Sektionen eine sichere pathologisch-anatomische Grundlage der Krankheit nicht gefunden wurde.

Auch sind harrn zahlreiche, die Raynandsche Krankheit betreffende Fragen noch der Lösung, ja man möchte sagen, die ganze Sachlage ist heute eine komplizierteres denn je. Ob der Raynandsche Symptomenkomplex überhaupt eine Krankheit sui generis ist, unterliegt noch der Kontroverse. Zahlreiche Beobachter behaupten, daß sowohl wenn er in seiner Totalität auftritt, als auch wenn nur einzelne seiner Symptome zur Beobachtung gelangen, diese Erscheinungen stets nur den Wert von Symptomen haben, von Symptomen, die bei den verschiedensten Krankheiten des Nervensystems sowohl wie des Gefäßsystems als auch bei verschiedenen allgemeinen Erkrankungen, bei Infektionen und Intoxikationen vorkommen. Das Verhältnis der einzelnen Teile des Symptomenkomplexes zueinander erfährt bei den verschiedenen Autoren die verschiedenste Auffassung. Die Genese der einzelnen Symptome wie ihres ganzen Komplexes ist ungeklärt, kurz, eine große Anzahl von Fragen harrt noch ihrer Beantwortung.

Was besonders eine Verständigung erschwert, ist die schon oben erwähnte Tatsache, daß von zahlreichen Autoren Fälle von angeblicher Raynandscher Krankheit beschrieben worden sind, die dem ursprünglichen Typus der Krankheit sehr fern stehen. Es unterliegt

ja keinem Zweifel, daß spätere Erfahrungen das von dem ersten Beschreiber der Krankheit entworfene Bild in diesem und jenem Punkt zu modifizieren geeignet waren. Aber im großen und ganzen darf doch behauptet werden, daß dies Bild ein scharf umrissenes und in sich abgeschlossenes Ganze darstellt, dessen Einzelheiten in fast jedem Punkt wichtig und berücksichtigungswert sind.

Im folgenden sollen uns für den Anfang als Grundlage unserer Beschreibung im wesentlichen die klassischen Fälle dienen, die der Raynaudsche oben schon kurz skizzierten Schilderung konform sind. Auf die zahlreichen, in wichtigen Punkten abweichenden Fälle werden wir später zurückzukommen haben.

Vorher ein Wort über die Nomenklatur. Sie hat schon Raynaud selbst Schwierigkeiten gemacht, er hat mehrfach in seiner Namensgebung gewechselt, und hat schließlich provisorisch den umständlichen Titel „Asphyxie locale et gangrène symétrique des extrémités“ beibehalten. Man kann aber auch gegen diesen Titel außer seiner Länge noch weitere Einwendungen machen: die Gangrän muß nicht immer eine symmetrische sein, in einzelnen Fällen sitzt sie auch nicht an den Extremitäten; sie kann aber auch ganz fehlen. Ebenso kann, wenn auch selten, die lokale Asphyxie fehlen, und was ähnliche Bedenken mehr sind. Später hat man sich zumeist der Bezeichnung „Raynaudsche Krankheit“ bedient, nachdem andere Namen, wie z. B. „jugendliche Gangrän“ mit Recht als verfehlt zurückgewiesen worden sind. Strauß hat neuerdings den Namen angiospastische Gangrän vorgeschlagen, der auch sonst schon benutzt worden war. Ich muß diesen Namen ablehnen, weil er zu viel präjudiziert und eine Anschauung über die Entstehung der Gangrän enthält, die ich nicht teile. Übrigens ist er für die milden Formen der Krankheit, die gar nicht zur Gangrän führen, unbrauchbar. Bei der Schwierigkeit, für diese komplizierte Krankheit einen prägnanten und dabei kurzen Namen zu finden, ziehe ich es vor, die Bezeichnung „Raynaudsche Krankheit“ anzuwenden. Daneben hat man dann auch einfach von „Raynaudschen Symptomen“ gesprochen (Hutchinson: Raynauds phenomena). Auch diese Bezeichnung ist nützlich, wenn man ausdrücken will, daß nicht ein vollkommenes Krankheitsbild vorliegt.

Ätiologie.

a) Geschlecht: Alle Beobachter stimmen darin überein, daß bei weitem mehr Frauen als Männer von der Krankheit befallen werden. Raynaud fand unter seinen Kranken vier Fünftel Frauen, dasselbe Verhältnis geben Grassot und Warren an. Morgan zählte später auf 54 Frauen 39 Männer, hier hatte sich das Verhältnis also

bereits beträchtlich verschoben, da nach dieser Statistik nur 1,4 Frauen auf einen Mann kommen. Ich selbst fand in 180 Fällen Frauen, in 196 Männer betroffen, danach kommen 1,7 Frauen auf einen Mann oder prozentualiter berechnet 62,9% Frauen, 37,1% Männer, was mit *Monro's* aus 180 Beobachtungen berechneten Zahlen fast genau übereinstimmt. (62,6% Frauen und 37,4% Männer.) Das Übergewicht der Frauen besteht also, ist aber lange nicht so bedeutend, wie frühere Beobachter angenommen haben.

Monro sucht eine Erklärung dafür, daß früher das Verhältnis ein so wesentlich anderes war, darin, daß früher nur die schwersten Fälle zur Beobachtung kamen, und daß diese gerade namentlich in Frankreich, von wo ja die ersten Fälle stammten, bei der Frau häufiger waren, wie auch die schwere Hysterie im weiblichen Geschlecht häufiger ist; eine recht problematische Erklärung. Ich möchte demgegenüber darauf hinweisen, daß ich in den Fällen meiner eigenen Beobachtung aus den letzten zehn Jahren (41 Frauen, 16 Männer) gerade bei den Männern die schwersten und typischsten Fälle gesehen habe.

b) Alter. *Raynaud* fand, daß das Alter von 18–30 Jahren von der Krankheit bevorzugt wird; einige Fälle kommen in der Kindheit vor, nach dem vierzigsten Jahre sei die Krankheit selten. *Weiß* fand 70% der Fälle bis zum dreißigsten Jahre, ähnliche Zahlen geben *Castellino* und *Cardi*, *Favier*, *Grasset* an. *Defraux* meint, daß fast alle Altersklassen bis zum fünfzigsten Jahre gleichmäßig betroffen seien, am häufigsten komme die Krankheit vielleicht in der Kindheit vor. *Morgan* stellte aus 93 Fällen ein mittleres Alter von 26,6 Jahren fest; im übrigen fand er folgende Zahlen:

| | |
|-----------------|----|
| von 2½–5 Jahren | 13 |
| „ 5–10 „ | 11 |
| „ 10–20 „ | 15 |
| „ 20–30 „ | 16 |
| „ 30–40 „ | 10 |
| „ 40–50 „ | 13 |
| „ 50–60 „ | 10 |

also ein vorwiegendes Befallenwerden der frühen Kindheit, während die übrigen Lebensalter bis zum 60. Jahre etwa gleichmäßig betroffen waren.

Meine eigenen Zahlen sind folgende: Im ganzen fand ich in 168 Fällen das Alter angegeben:

| | |
|-----------------|----|
| davon 0–5 Jahre | 22 |
| 5–10 „ | 8 |
| 11–20 „ | 25 |
| 21–30 „ | 40 |

| | |
|-------------|----|
| 31—40 Jahre | 27 |
| 41—50 „ | 28 |
| 51—60 „ | 10 |
| 61—70 „ | 6 |
| über 70 „ | 2 |

Montre, der ähnliche Zahlenverhältnisse gibt, rechnet für den Beginn der Krankheit ein Durchschnittsalter von 28,9 Jahren heraus.

Wir entnehmen diesen Zahlen zunächst einmal die bemerkenswerte Tatsache, daß das Kindesalter von der Krankheit sehr bevorzugt wird; für keine andere Zeit finden wir eine so große Zahl wie für das erste Quinquennium. Wie groß die Rolle ist, die der Zufall bei allen diesen, auch relativ großen Statistiken spielt, mag die Tatsache zeigen, daß die Zahlen einer neueren Reihe von 109 Fällen aus der eigenen Beobachtung (48 Fälle) und der Literatur der letzten zehn Jahre, zu einem ganz anderen Resultat führen.

Ich fand:

| | |
|-----------|----|
| 0—5 Jahre | 2 |
| 5—10 „ | 5 |
| 11—20 „ | 7 |
| 21—30 „ | 26 |
| 31—40 „ | 32 |
| 41—50 „ | 23 |
| 51—60 „ | 9 |
| über 61 „ | 4 |

Hier tritt die Bevorzugung des Kindesalters ganz in den Hintergrund. Offenkundig wurden früher die bei Kindern vorkommenden Fälle als besonders merkwürdig vielfach veröffentlicht, während das jetzt nicht mehr geschieht. Der jüngste Fall war ein von Friedel beobachtetes, erst sechs Monate altes Kind. Die kurz wiedergegebene Krankengeschichte zeigt, daß es sich um einen typischen Fall handelt.

Sechs Monate altes Kind. 2. Oktober 1887 plötzlich Schwellung des Handrücken. 14. Oktober, Rötung sämtlicher Finger. 18. Oktober. Die Finger werden vom Mütterch, die Spitze des linken kleinen Fingers ist zwei Tage später schwarz. Status praes. vom 25. Oktober. Das Kind ist sonst völlig gesund, offenbar ohne Schmerzen, Brennen, Jucken, Reiznervenzug irgend normaler Verhältnisse. Sämtliche Finger beider Hände an den beiden letzten Phalangen vom ersten bis zum fünften Finger zunehmend verläßt, die mittlere Phalange rötlich, nach den Endphalangen zu wird die Farbe bläulich bis grauweiß. Die Endphalange des fünften Fingers ist schwarz, verdünnt, ebenso die äußerste Spitze des linken vierten Fingers. Am 1. November ist an der von vornherein weniger affizierten rechten Hand die Verfärbung geschwunden, an der linken Hand ist die Cyanose zurückgegangen, die abgestorbenen Partien sind schwarz, eingetrocknet. Nach ca. zwei Monaten stoßen sie sich ab, im März 1888 finden sich an den betreffenden Stellen strahlenförmige, zum Teil mit dem Knochen verwachsene Narben.

Beck-Kolisch teilen den Fall einer sechsmonatlichen Säuglingsmit; wegen des dabei erhobenen Sektionsbefundes wird später noch von ihm die Rede sein. Nach der Angabe von Beck sah Reiß einen Fall bei einem sieben Wochen alten Kind, und zwar eine symmetrische Gangrän, die später heilte. Lohle beschreibt auch einen Fall bei einem Säugling. DeFrance beschreibt einen Fall bei einem neun Monate alten Kinde, Rivel bei einem zehn Monate alten Kinde, Bjerring einen bei einem $1\frac{1}{4}$ Jahre, Deck bei einem $1\frac{1}{2}$ Jahre alten, Johnston sah (nach Monroe) ein Kind von fünf Jahren, das schon im Alter von drei Monaten Anfälle der Krankheit gehabt hatte. Der jüngste von mir beobachtete Fall war ein vier Jahre alter Knabe, es war ein ganz typischer, mittelschwerer Fall. Jedenfalls weist das Alter bis zu fünf Jahren eine gewisse Prädisposition für die Krankheit auf. In den nächsten Jahren bis zum 20. nimmt sie entschieden an Häufigkeit ab, um dann in der Zeit vom 20. bis 30. Jahre auf einen zweiten Höhepunkt zu gelangen; aber auch die beiden folgenden Dezennien zeigen noch eine erhebliche und fast gleiche Zahl von Fällen, nach dem 50. Jahre wird die Krankheit dann plötzlich recht selten, aber noch zwischen 60 und 70 Jahren finden wir im ganzen zehn Fälle (unter 288) verzeichnet. Der älteste Fall, den ich auffinden konnte, betrifft eine 73jährige Frau, er wird von Henry mitgeteilt.

73jährige Frau. Leidet seit 20 Jahren an Rheumatismus (chron.). Seit zwei Wintern lokale Störungen der Circulation. Seit sehr langer Zeit Nasen im Winter roth und rot, 1881/82 Helixen im Winter schmerzhaft, angeschwollen und schwarz. Seit zwei Wintern an den Wangen blaue, schmerzkalte Stellen; 1893 ähnliches am Dorsum manus, den Handgelenken und den inneren Teilen des Unterarms. Status praesens: Haut der Nase dick und hart, an beiden Backen kupferfarbige, völlig symmetrische Stellen, ähnlich Stellen an Hand, Handgelenken und Unterarmen. Helixen beiderseits geschwollen, blau, empfindlich, ein kleines Stückchen nekrotisch. Am äußeren Mallostin granulierende Geschwüre in einer cyanotischen Umgebung. Später neue gangränöse Stellen an den Ohren. Um bei von pathologischen Bestandteilen. Hat sonst, übrige Organe gesund.

Man wird in diesem Falle trotz des hohen Alters der Patientin an der Diagnose symmetrische Gangrän keine Zweifel hegen dürfen.

Auch Rénou et Follet sahen die Krankheit bei einem 73jährigen Mann.

c) Vorkommen. Die Raynaudische Krankheit ist im ganzen zweifellos eine seltene Affektion, wenn auch nicht so selten, wie man anfangs annahm. Weiß erkannte im Jahre 1882 nur 17 Fälle als echte Beispiele der Krankheit an; doch haben wir bereits berichtet, daß er der Krankheit sehr enge Grenzen zog. Morgau stellte 1889 63 Fälle zusammen, Scheiber 1892 119. Dagegen wollten Castellino und Cardì 1896 bereits über mehr als 300 Fälle berichten können, doch rechnen sie sicher eine große Anzahl dem Krankheitsbilde nicht zugehöriger Fälle zu diesem. Monroe hat aus 180 Fällen seine Zahlen-

angaben geschoßt, die Zahl der von ihm überhaupt gesammelten Fälle ist aber erheblich größer. Ich habe aus der Literatur und meinem eigenen Beobachtungskreis 276 Fälle mit Altersangaben zusammengestellt; über die Fälle, in denen solche (zum Teil nur in meinen Exzerpten) fehlten, habe ich keine zahlenmäßigen Ermittlungen angestellt, doch erreicht die Zahl der mitgeteilten Fälle mit sicherer Diagnose nach meinen Notizen jetzt weit über 300.

Dabei berücksichtige ich hier zunächst nur die unkomplizierten Fälle und schließe alle anderen, z. B. die mit Sklerodermie verbundenen aus. Sicher ist also die Raynaudsche Krankheit eine seltene Krankheit, doch gilt das nur für ihre schweren Formen, während die leichteren nach meiner Erfahrung die auch Eulenburg bestätigt, immerhin häufiger sind. Monroe rechnet aus, daß etwa auf 3000 Kranke ein an Raynaudscher Krankheit erkrankter Patient kommt. Diese Zahlen haben nach der Art ihrer Berechnung natürlich nur sehr approximative Geltung. Unter etwa 7000 Fällen aus der Poliklinik von Prof. Oppenheim fand ich nur fünf ausgesprochene Fälle, aber selbst unter diesen war keiner, in dem die Krankheit zur Gangrän geführt hätte.

Meine in den letzten zehn Jahren gesammelten Erfahrungen geben dann aber doch ein wesentlich anderes Bild. Ich habe in dieser Zeit im ganzen 56 hiesergehörige Fälle gesehen unter etwa 25 000 Kranken. Die Durchschnittszahl ist also viel höher als die von Monroe an gegebene, aber es handelt sich um ein ausschließlich neurologisches Material. In etwa 20 Fällen war es zu ausgesprochener Gangrän gekommen, in einer Reihe anderer waren wenigstens kleine Paronychien oder Geschwüre zu verzeichnen gewesen. Die Krankheit ist nach meinen Erfahrungen demnach viel häufiger als die Erythromelalgie, aber immerhin seltener als die anderen ihr nahestehenden Affektionen. Sie verdient jedenfalls auch vom rein praktischen Standpunkt alle Beachtung, da sie nach allem doch gewiß nicht zu den Raritäten gezählt werden darf.

d) Stand. Der Stand und die Beschäftigung der Personen, die von der Krankheit befallen werden, scheint mir in einer Beziehung von Einfluß zu sein, insofern, als die Beschäftigung in der Kälte oder mit kalten und nassen Gegenständen eine gewisse Wichtigkeit zu beanspruchen hat. So sind Wäckerinnen wiederholt von der Krankheit befallen worden; sonst ist noch bemerkenswert, daß Raynaud selbst die Affektion einmal bei einem Mann auftreten sah, der mit Blei zu tun hatte; das gleiche erwähnen Sainton, Mader, Deslaux. Auch einer meiner Kranken hatte mit Blei zu tun gehabt, schon früher auch Anfälle von Bleikolik gehabt zu haben.

e) Nationalität. Monroe glaubt, daß die Raynaudsche Krankheit in England und Frankreich häufiger ist, als in Deutschland. Er ver-

sucht, dies auch zahlenmäßig festzustellen, ich halte das für sehr zweifelhaft. Doch ist dieser Punkt ja im ganzen recht nebensächlich.

Als wichtiger ätiologischer Faktor macht sich eine hereditäre Disposition geltend, und zwar in zweierlei Richtung, einmal, indem sie eine allgemeine neuropathische Konstitution schafft, ein andermal, indem sie bei der Deszendenz direkt dieselben oder ganz ähnliche Zustände wie bei der Ascendenz hervorbringt. Die allgemeine nervöse Belastung kennzeichnet sich durch das häufige Vorkommen von Nervenkrankheiten in der Familie und ist oft eine recht schwere, so z. B. in einem Fall von Weiß: Großmutter an organischer Gehirnkrankheit gestorben, die Mutter litt an schwerer Hysterie, eine Schwester war gleichfalls hysterisch und zeitweise melancholisch, ein Bruder litt an einer intermittierenden Psychose depressiven Charakters. In einem meiner Fälle war eine Schwester geisteskrank, eine taubstumm, eine Schwester litt an Migräne. Der Vater einer anderen Kranken war Alkoholist und hatte wiederholt Anfälle von Delirium gehabt. Bei einem Patienten von Péhu war der Vater Trinker, die Mutter litt an Migräne, eine Schwester an Epilepsie. Auch bei Aitken's Kranken war der Vater Alkoholist, die Mutter litt an epileptiformen Anfällen, ein Bruder an Ischias. Noch bemerkenswerter sind die Fälle direkter Vererbung. Monro hat in 14 Fällen von 180 diese beobachten können. Schon Raynaud selbst sah das Kind einer seiner Patientinnen (Beobachtung 15 der These) bis zum Alter von fünf Monaten an Asphyxie locale leiden, ähnliche Beobachtungen fand Monro noch zweimal. Bei einer Kranken meines eigenen Beobachtungskreises finde ich die Angabe, daß die 65jährige Mutter der Patientin von Jugend auf an ausgesprochener Syakope locale litt, in einem zweiten Fall war der Vater der Kranken von Jugend auf damit befallen. Der Vater einer meiner Kranken litt wie sie selbst an Asthma bronchiale. Dasselbe Verhalten findet sich ferner auch in Beales zweitem Fall, wo der Vater des Patienten an Kälte und Taubheit der Finger litt und auch zwei Brüder solche Erscheinungen zeigten. Bei Colman und Taylors Patienten zeigten Großvater und Großonkel den Raynandschen ähnliche Erscheinungen, während ein Bruder eine Dystrophie der Nägel aufwies. Bei Smiths Patientin hatte der Vater dasselbe Leiden, bei Simpsons Kranken litten Mutter und Tochter an Totenfingern. Ähnliches berichten Walch und West; bei Pasopolow litt eine Schwester an lokaler Asphyxie und starb geisteskrank, eine andere Schwester litt an Epilepsie und Idiotie, also auch hier besteht wieder eine sehr schwere Belastung. Makins berichtet von zwei Geschwistern, die von der Krankheit befallen waren, und deren Mutter an progressiver Muskelatrophie litt; Arnings Patient hatte eine ebenfalls an Raynandscher Krankheit leidende Schwester; bei einem meiner Kranken war es der Bruder, der dieselben Symptome haben sollte; Brammann stellte drei Brüder,

die an *Gangraena symmetrica* litten, vor, doch scheint mir die Diagnose einer unkomplizierten Raynaud'schen Krankheit für seine Fälle nicht sicher zu sein. Diehl hat in einem eigenen Artikel auf das familiäre Auftreten vasomotorisch-trophischer Störungen aufmerksam gemacht und ein sehr eklatantes Beispiel dieser Art beigebracht, auf das ich an anderer Stelle noch zurückkomme. Nékam berichtet über familiäres Auftreten Raynaud'scher Krankheit, doch erscheint mir die Diagnose sehr zweifelhaft. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang noch eine Beobachtung Goldschmidt's, dessen Patientin an Raynaud'scher Krankheit und Sklerodermie litt; bei ihrer Tochter entstand im Anschluß an eine Verletzung des N. ulnaris in der betreffenden Hand *glossy skin*. Sehr interessant ist folgendes Vorkommen. Die Schwester einer meiner Kranken litt an Sklerodactylie, eine Schwester an Basedow, ein Bruder war an Basedow gestorben. Eine in diesem Zusammenhang zu erwähnende anderweitige hereditäre Belastung sah ich in einem andern Falle: Mutter und Großmutter litten an Gicht, ein Bruder war im Alter von zwölf Jahren an Diabetes gestorben. Der Patient selbst schien auch schon Gichtanfälle gehabt zu haben.

Auffällig oft habe ich gerade in schweren Fällen eine auch sonst nicht selten beobachtete angeborene Ankylose im ersten Interphalangealgelenke der Finger und eine dadurch hervorgerufene an die Krallenhand erinnernde Konfigurationsanomalie der Hand gesehen. Die Ankylose war fast stets am dritten, vierten und fünften Finger am meisten ausgesprochen. In einem der Fälle handelte es sich um eine hereditäre Entwicklungsanomalie. In einem Fall war von Geburt an die eine Lappalte enger als die andere.

Als zweites Moment kommt ätiologisch Chlorose und Anämie in Betracht. Fälle solcher Art wurden veröffentlicht von Schubert, Weihe, Lauer, Israelsohn, Nielsen, Young, Zeller; doch ist demgegenüber hervorzuheben, daß in einer ganz erheblichen Zahl von Beobachtungen der allgemeine Ernährungszustand als ungestört geschildert wurde.

In ähnlicher Weise prädisponierend wie die Anämien wirken wohl auch erhebliche körperliche Anstrengungen. Von solchen Fällen berichtet Hochenezz zwei, die Maydl und Kundrat beobachteten. Einen sehr charakteristischen Fall verdanken wir Myrtle.

45-jähriger Mann: kräftiger Körperbau. Barts in letzter Zeit große Strizpen zu abstecken. Seit einigen Tagen bemerkt er, daß die Finger an beiden Händen besonders die Mittelfinger kühl und blaß werden, der rechte kleine Finger ist kalt wie Eis, das Nagelglied ist blau, taub und steinhart; Oben ebenfalls betroffen. Herz- und Gefäßsystem normal, später auch an den Füßen Erscheinungen lokaler Asphyxie. Unter colorierend existierender Behandlung Rückgang aller Erscheinungen, nur am rechten kleinen Finger Gangrän, die eine Amputation nötig machte.

Shopp berichtet über einen Fall, in dem die ersten Erscheinungen bei den Anstrengungen der Erntearbeit sich einstellten.

Raynaud hat sexuellen Vorgängen eine große Bedeutung für die Ätiologie unserer Krankheit zugesprochen. Er sagt ausdrücklich, daß die einzige gut markierte Ursache der Krankheit bei Frauen in der Unterdrückung der Meneses zu finden war, und als weiteren Beweis für die Wichtigkeit dieses Momentes führt er an, daß eine erhebliche Besserung, wenn nicht gar Heilung der Krankheit wiederholt mit dem Wiedererscheinen der Meneses zusammenfiel. Besonders im Fall 5 bestärkte ihn in dieser Ansicht. Spätere Beobachtungen haben seine Auffassung aber nicht recht stützen können, Menstruationsstörungen kommen zwar im Verlauf der Krankheit vor, aber eine erhebliche Bedeutung kommt ihnen sicher nicht zu, wie auch Moura festgestellt hat. Gravidität als Ursache ist einmal angegeben. Werner berichtete über Steigerung der Häufigkeit und Intensität der Anfälle während einer Gravidität, einmal trat die Krankheit direkt nach der Geburt eines Kindes auf (Dickinson). Sexuelle Exzesse sollen einige Male von Einfluß gewesen sein (Sganza).

Vereinzelt sind Traumen als Ursache der Krankheit angegeben worden, am meisten betont sie Brasch; dessen Kranker hatte sich im Laufe von vielen Jahren allerdings eine außerordentlich große Anzahl ganz leichter Verletzungen der Finger durch seine Beschäftigung an einer Säge zugezogen.

In jeder Richtung interessant ist eine Beobachtung Schäffers mit traumatischer Ätiologie, die ich etwas ausführlicher wiedergebe.

Ein 65-jähriger bis dahin gesunder Mann erlitt am 12. August 1896 einen Sturz aus einer Höhe von mehreren Metern; er wird bewußtlos und liegt überall, besonders rechts kontinuierlich davon. Ende September empfindet er Kriebeln und Pelignen beider Hände und Füße, die allmählich auskugeln. Im November Anfälle von Asphyxie und Sympage locale mit zunehmenden Schmerzen. Ende des Monats kam es zu stürmischen Aufbrüchen der Füße an verschiedenen Stellen und ebenso an den Händen. Ähnliche Beschwerden hielten bis zum nächsten Jahre an. Im Oktober 1900 traten sie erneut auf. Es fand sich eine tiefliegende Verletzung aller Finger und Zehen, die Finger waren geschwollen, an den zweiten bis vierten Fingern fanden sich ringförmige Entzündungen, an den Nagelgliedern des ersten und zweiten Fingers waren Blasen mit blutigem Inhalt vorhanden, ebenso auch an den Mittel- und Endphalangen. Alle diese Veränderungen sind ganz symmetrisch. Die Fußrücken sind beiderseits bläulich bis über die Knöchel. An der ersten, dritten und vierten Zehe finden sich eingetretene Stellen. Eine kaschovite bläuliche Zone breitet sich am Rücken beiderseits in der Höhe des unteren Schafteblattwinkels aus. An den Fingern ist die Empfindung für Berührung ganz erloschen, die Nadelstiche stark vermindert. Starke Schmerzen in den Händen, rechts mehr als links. An beiden Händen traten zeitweilig schmerzhafter Krämpfe auf, indem der zweite und dritte Finger nach dem Daumen, der vierte und fünfte in der entgegengesetzten Richtung gezogen wurden. Allgemein nervöse Beschwerden. Puls normal. Demnächst zweiten Anfall folgte noch ein heftigerer binnen nach $\frac{1}{2}$ Jahren. Bei diesem war die Asphyxie der Augenlider bemerkenswert.

Der Zusammenhang mit dem Unfall schien hier sicher zu sein. Sehr bemerkenswert sind die ungewöhnlichen Lokalisationen der Asphyxie (Rücken, Läder). Garrigues sah Raynaudsche Symptome nach dem Fall einer Last auf den Magen. Cramer beschreibt drei Fälle mit Raynaudähnlichen Symptomen nach Traumen. Man könnte hier die Fälle anschließen, wo unmittelbar nach einer Operation die ersten Symptome sich einstellten, wobei natürlich, ebenso wie übrigens auch beim Unfall der psychische Shok und die Giftwirkung des Narkotikums mitspielen (Holst nach Rippenresektion, Busy nach Urethrotomie).

Ebenso wie starke körperliche, so können auch schwere psychische Anstrengungen und Erregungen allein den Anstoß zum Auftreten der Raynaudschen Krankheit geben. Besonders häufig wurde ein heftiger Schreck angeschuldigt. Bekanntlich ruft bei manchen Personen, die einst nicht wesentlich krank sind, ein Schreck stets Kälte und Blässe der Extremitäten hervor: von einem ausgesprochenen Fall der Art berichtet DeFrance: die betreffende Kranke sah schon im Alter von acht Jahren nach Aufregungen ihre Hände kalt und blaß werden und hatte dabei Kälteempfindung im ganzen Körper; typische Anfälle der Krankheit wurden später durch die gelegentlich eines Brandes empfundene Aufregung ausgelöst. Auch eine meiner Kranken bekam ihren ersten Anfall gelegentlich des Brandes ihres Hauses und des damit verbundenen Ausbruchs einer Psychose bei ihrem Bruder.

Garrigues berichtet, daß eine seiner Kranken instande war, Synkopeanfälle dadurch auszulösen, daß sie intensiv an ihre Krankheit dachte. Sie empfindet dann Kälte und Einschlafen der Finger, Schwierigkeit sie zu bewegen und die Finger werden weiß und bedecken sich mit einigen Tropfen kalten Schweißes. Auch Péhu betont für seinen Fall von *Akroasphyxia chronica hypertrophica* den seelischen Einfluß auf den Zustand der Finger. Höblin berichtete über Entstehung der Symptome nach einem Schreck durch Blitzschlag.

Dehios Kranke wurde durch ein unmittelbares Attentat, das gegen sie unternommen wurde, in Schrecken versetzt. Schwerer Kummer über den Tod naher Angehöriger, aber auch die gewöhnlichen Sorgen des täglichen Lebens wurden als ursächlich wirksam in einem oder dem anderen Falle ins Feld geführt.

Als weiteres auslösendes Moment haben wir einmalige oder längere Zeit fortgesetzte Einwirkung von Kälte und Nässe anzuführen. Sehr häufig finden wir, daß die Leute, die später an Raynaudschen Symptomen leiden, schon von jeher eine übergroße Empfindlichkeit gegen Kälte gezeigt haben. Legroux hat auf die Beziehungen aufmerksam gemacht, die zwischen Frostbeulen und Raynaudschen Symptomen bestehen; er geht so weit, Frostbeulen, Asphyxie locale und Gangrène symétrique als verschiedene Grade einer dystrophie

nécropathique aufzufassen. Auch de Keyser äußert ähnliche Ansichten; daß diese Auffassung nicht richtig ist, werden wir später sehen, doch ist es bemerkenswert, daß in der Tat in den Fällen *legroux* sowohl wie den von *Bouchez*, *Myers*, *Makins*, *Verdelli*, *Dominquez*, *Santvoord*, *Smith*, *Simpson* u. a. Frostbeulen der Entstehung Raynaud'scher Symptome vorangingen, was ich selbst auch mehrfach gesehen habe. Sehr häufig entstand der erste Anfall, wenn der Betreffende einer niedrigen Außentemperatur ausgesetzt war, und auch die späteren Anfälle traten häufiger bei kaltem Wetter ein. Der Winter ist daher für derartige Kranke auch eine gefürchtete Jahreszeit. Nach *Monro* wurde der erste Anfall 22 mal bei seinen 180 Kranken durch Kälteeinwirkung ausgelöst. Bei *Lährs* Patienten kam der erste Anfall zustande, als der Kranke in einer kalten Winternacht vom Tanzen erhitzt ins Freie kam. Besonders ungünstig scheint feuchte Kälte oder Waschen mit kaltem Wasser, kaltes Baden uzw. zu wirken. Eine meiner Patientinnen, eine Blumenwinderin, die viel mit kaltem Wasser zu tun hatte und schon verdam an Frostbeulen gelitten hatte, bekam unmittelbar nach Waschen der Hände mit Schnee und Salz einen schweren Anfall, nach dem die Haut in Fetzen abfiel und die Nägel abgingen.

Auch *Kuntz* berichtet von einem Kranken, der seinen ersten Anfall nach Waschen der Hände mit Schnee und Salz bekam. *Huataks* Patient erkrankte nach einem kalten Bad. Ich füge einen Fall von *Holst* an, dessen Kranker, der aber schon vorher an vasomotorischen Störungen gelitten hatte, nach Reinigung der Kleider mit Benzin Gangrän an der ersten und zweiten Phalange der kleinen Finger bekam. Einer meiner Patienten hatte als Tischler viel mit Polieren von Möbeln (*Spiritus*) zu tun. *Urbantschitsch's* Patient, ein Kutscher, erkrankte unmittelbar, nachdem er einem schweren Hagelwetter ausgesetzt gewesen war. Bisweilen gehen jahrelang während des Winters dem Ausbruch der Krankheit prämonitorische Symptome voraus. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Krankheit bei warmem Wetter zum Ausbruch kam. Schon *Raynaud* selbst berichtet einen Fall, wo die Krankheit in den Handstagen entstand. *Begg*, *DeFrance* haben Ähnliches gesehen. In *Bereads* Fall rief andererseits weder kaltes noch warmes Wasser einen Anfall hervor. *Humphrey* geht so weit, den Einfluß von Kälte und Wärme überhaupt ganz zu leugnen — mit Unrecht. Auffällig ist die Tatsache, daß auch Eintauchen der Hände in warmes Wasser bisweilen die Anfälle hervorzurufen vermag. *Tannahill* sah einen Anfall von schwerer Asphyxie locale im Anschluß an ein warmes Bad, bei *Pasteur* rief Eintauchen der Hände sowohl in kaltes Wasser wie in warmes Anfälle hervor; dasselbe geschah bei *Colman* und *Taylor's* Patienten. Eine meiner Patientinnen, bei der Kälte ohne Einfluß war, berichtet, daß ihre Anfälle im warmen Zimmer

und besonders, wenn sie die Hände an den heißen Ofen hielt, eintreten. In diesem Zusammenhang sei schließlich noch erwähnt, daß einige unserer Kranken in früherer Zeit an rheumatischen Affektionen gelitten hatten (Coleville, Grasset, Patteson).

Das wichtigste aller ätiologischen Momente ist die neuropathische Konstitution des Individuums. Schon Raynaud selbst bemerkte, daß diese Krankheit sich hauptsächlich bei allgemein nervösen Personen zeige. Wir müssen aber die Besprechung dieses Punktes hier wie in den früheren Kapiteln auf eine spätere Zeit verschieben, da auch hier wieder zwischen den Symptomen der Raynaudschen Krankheit und der Neuropathie so enge und schwer zu entwirrende Beziehungen sich ergeben, daß wir erst in dem der Symptomatologie gewidmeten Teile auf diesen Zusammenhang eingehen können.

Weiter gibt es eine ganze Anzahl Fälle, in denen die Raynaudsche Krankheit sich im Verlauf einer chronischen oder akuten Infektionskrankheit oder einer Autointoxikation entwickelte. Ich halte es aus später zu erörternden Gründen für richtig, auch diese Fälle ebenso wie diejenigen, die sich mit Erkrankungen und Abnormitäten des Gefäßsystems verbinden, erst nachher zu besprechen, und auch die ätiologische Bedeutung der Lues soll an späterer Stelle gewürdigt werden, denn in allen diesen Fällen bedarf es erst genauer Nachforschung, um festzustellen, in welchem Verhältnisse Grundkrankheit und Raynaudsche Symptome zueinander stehen.

Hutchinson faßt die zur Entwicklung der Raynaudschen Krankheit führenden Ursachen zusammen, indem er sie als erworbene und als kongenitale unterscheidet. Die letzteren sind die wichtigsten, die befallenen Individuen sind durch die Verminderung der circulatorischen Tätigkeit und durch Erhöhung der Reflexerregbarkeit von jeher ausgezeichnet. Von den erworbenen Ursachen wirken alle diejenigen, die den Körper schwächen, prädisponierend für die Entstehung der Raynaudschen Krankheit.

Symptomatologie.

Getreu dem Prinzip, das wir bei der Beschreibung der vordem behandelten Krankheitszustände befolgt haben, wollen wir auch im folgenden die verschiedenen Arten von Symptomen, die sich bei der Raynaudschen Krankheit finden, jede für sich gesondert beschreiben. Es mag jedoch hier gestattet sein, einen der ersten Raynaudschen Abhandlung entnommenen Fall, der uns von der Gesamtheit der Symptome und dem Verlaufe der Krankheit ein anschauliches Bild gibt, der analytischen Beschreibung der einzelnen Symptome vorauszuschicken. Ich zitiere den Fall nach der englischen Übersetzung der These Raynauds, die, aus der Feder Barlows stammend, im

Jahre 1888 erschien. Es war mir leider trotz vielfacher Bemühungen nicht möglich, die Originalabhandlung zu erlangen.

27-jährige Frau. Hände im Sommer meist rot, oft Trockenheit der Finger. Neigung zu Frostbeulen. Drei Monate nach der zweiten Entbindung Parästhesien in den Fingern. Bald traten Schmerzen in diesen auf, die sich in wenigen Tagen zu einer ungemeinen Heftigkeit steigerten und der Kranken trotz Opium die Nachtruhe raubten. Zugleich wurden einzelne Finger taub und sahen totenblau aus, später nahmen die Endphalangen eine so intensiv schwarze Färbung an, als wären sie in Tinte getaucht worden. Als die Kranke auf Raynaud's Rat die Hände für kurze Zeit in ein Senfbad steckte, wurden diese und die Unterarme sofort tief schwarz. Auch die Nasenspitze wurde, ohne selbst der Sitz schmerzhafter Empfindungen gewesen zu sein, während der heftigen Schmerzen an den Fingern schwarz. Einen Monat später fand sich dasselbe an den Füßen, die Zehen wurden schmerzhaft, die Endphalangen schwarz. Nach weiteren vier Wochen traten an den Nagelphalangen der Finger und zwar an der Pulpa oberflächliche, stecknadelkopfgroße Brand-schorfe auf, während an der Dorsalseite der vier letzten Zehen die Epidermis in Form von, sanguinolentes Serum enthaltenden Brandblasen emporgehoben wurde, die nach und nach zu schwarzen Schorfen vertrockneten. Später hat sich dasselbe Bild auch an beiden großen Zehen. Auch an einer Hinterbacke zeigten sich kleine Schorfe. An den Fingern blieb die Gangrän auf die oberflächlichen Cutischichten beschränkt; an den Zehen dagegen schritt die Gangrän der Fläche und Tiefe nach weiter vor; allmählich waren die Nagelphalangen aller vier Zehen beider Füße gangränös, es hatte sich eine Demarkationslinie gebildet, so daß sie „wie angeheftete Kohlenstückchen“ von den gesund gebliebenen Phalangen herabhängten. Die nekrotischen Phalangen wurden entfernt, worauf die Vernarbung in kurzer Zeit erfolgte. Die Veränderungen waren überall vollkommen symmetrisch. Der Puls war stets normal, solange die symmetrische Gangrän vorhanden war, während vor und nach dieser Periode gelegentlich Unregelmäßigkeiten des Pulses beobachtet wurden. Am Herzen war nie etwas Abnormes festzustellen. Urin frei von pathologischen Bestandteilen. Temperatur stets normal. Keine Ergotinvergiftung. Die Frau blieb in der Zukunft gesund.

Der vorstehende Fall ist typisch; er zeigt uns Symptomatologie und Verlauf der Affektion in klassischer Weise.

Wir sehen zwei oder vielmehr drei Stadien des Krankheitsprozesses. Im ersten beherrschen die vasomotorischen Symptome, denen sich sensible zugesellen, das Bild. Im zweiten kommt es zu schweren trophischen Störungen, zu Nekrose in den betroffenen Teilen. Art und Ausdehnung der Nekrose sind bemerkenswert und charakteristisch. In der dritten Periode der Krankheit sehen wir keine neuen aktiven

Krankheitserscheinungen mehr; die nekrotischen Teile werden abgestoßen, die Stümpfe vernarben. Damit ist für diesen Fall die Krankheitsgeschichte abgeschlossen. Irgendwelche komplizierende Krankheit lag nicht vor.

Die vasomotorischen Symptome verbleiben der ersten Phase der Krankheit ihr Gepräge. Raynaud selbst unterscheidet zwei Formen derselben, die *Synkope locale* und die *Asphyxie locale*.

Die *Synkope locale* (*Anémie locale* Hardy, *regionäre Ischaemie* Weiß, *local asphyxia* Johnson) manifestiert sich in folgender Weise. Die befallenen Teile, ein oder mehrere Finger, seltener Zehen, gelegentlich auch die Ränder der Ohren oder die Nasenspitze werden plötzlich auffällig weiß und kalt. Die Farbenveränderung kann verschiedene Nuancen aufweisen; bald ist es eine wirkliche Totenblässe, ein Weiß mit einem leicht grünen Ton; ein andermal modifiziert eine leichte Beimischung von blau oder einem hellen Rot des Farbenton; man hat die Finger wachsblass oder totenbleich genannt, die Nasenspitze erschien knödelweiß. Mit der Farbenveränderung geht regelmäßig eine erhebliche Temperaturniedrigung einher, wodurch der Eindruck des „doigt mort“, des Totenfingers noch verstärkt wird. Die Temperaturniedrigung soll bis 20 Grad betragen können. Garrigues fand im Stadium der Synkope am Rücken des dritten rechten Fingers 15°.

Sehr häufig finden sich neben den vasomotorischen sensible Erscheinungen, vor allem Parästhesien und Schmerzen. Oft gehen sie sogar den vasomotorischen Erscheinungen voraus, leichte gegen den Stamm zu ausstrahlende Schmerzen treten auf, das Gefühl von Taubsein, von Kriebeln, von Eingeschlafensein, bisweilen auch nur ein unbestimmtes, undefinierbares Bewußtsein, daß sich in dem betreffenden Teile etwas Außergewöhnliches abspielt, wie es Hochenegg nach eigener Erfahrung schildert. Die Schmerzen steigern sich meist mit dem Eintritt der vasomotorischen Erscheinungen, das Gefühl des Eingeschlafenseins wird sehr unangenehm und lästig. In diesem Stadium weist auch objektiv die Sensibilität Störungen auf; es kann trotz heftiger spontaner Schmerzen eine Anästhesie für sämtliche Reize bestehen, oder es kann eine mannigfach abgestufte Hypästhesie vorliegen. Die Schmerzen können anfallsweise zu enormer Heftigkeit anschwellen; bisweilen sind sie nichts schlimmer. Die Sensibilität weist aber im ganzen große und später genauer zu schildernde und zu präzisierende Differenzen auf. Es unterliegt jedenfalls keinem Zweifel, daß es auch Fälle ohne erhebliche subjektive oder objektive Störung der Sensibilität gibt, höchstens finden sich dann leichte Parästhesien.

Erhebliche Störungen der Motilität werden nicht beobachtet, speziell keine circumscripten Lähmungen; nur eine Ungeschicklichkeit und „Klammheit“ der Finger, wie nach stärkerer Kälteeinwirkung, macht sich geltend. Auch leichte Krampferscheinungen, ein geringes Zusammenziehen der Finger kommt vor. Die Finger werden oft in einer leicht gebeugten Stellung gehalten und möglichst wenig bewegt, offenbar um Schmerz zu vermeiden. Auch leichte sekretorische Störungen (kalter Schweiß) wurden beobachtet.

Die Dauer der vasomotorischen Erscheinungen ist wechselnd. Die Blässe und Kälte kann eine fast momentane sein, sie kann Minuten, aber auch Stunden andauern. Sie kann sich sehr oft am Tage wiederholen, 8–10, ja 20–30 mal.

Die Rückkehr zur Norm vollzieht sich in verschiedener Weise; oft kehrt plötzlich das normale Aussehen wieder, andermal kommt es zu einem reaktiven Stadium, in dem an die Stelle der kalten Blässe Hitze und Rötze treten; auch dabei können starke, schmerzhafte Parästhesien vorkommen, namentlich Brennen, „als ob man in Nesseln gefallt hätte.“

Die lokale Synkope, wie wir sie hier schilderten, kommt nicht nur als Teilerscheinung der Raynaudschen Krankheit vor, sondern ist in einer nicht geringen Anzahl von Fällen insofern eine isolierte und selbständige Erscheinung, als sie das einzige Krankheitssymptom bildet. Diese Dinge sind schon vor langer Zeit von Reil in einer Arbeit, die wir bereits erwähnt haben, beschrieben und als „doigt mort“, als „Totenfinger“ bezeichnet worden. Bei nervösen Personen, bei verschiedenen namentlich chronischen Intoxikationen, aber auch bei sonst gesunden Personen treten dann die Erscheinungen der Synkope locale im Anschluß an Temperaturschwankungen, an Gemütsregungen usw. auf. Sehr häufig kommt es bei disponierten Personen morgens beim Waschen dazu. Auch feinere Bewegungen, Nähen usw. rufen sie leicht hervor. Meist sind die Finger befallen, oft symmetrisch an beiden Händen und unter Verschonung des Daumens. Aber auch hier können Nase und Ohren, seltener Kinn und Zungenspitze beteiligt sein. Hochenegg erzählt von einem Kollegen von sehr sanguinischem Temperamente, dessen Nase bei jeder stärkeren Gemütsbewegung kreideweiß und anämisch wurde und sonderbar gegen das sonstige normale Kolorit des Gesichts abstach. Auch dabei können sensible Erscheinungen vorhanden sein, aber auch dauernd und für immer fehlen. Wir haben uns im Laufe unserer Erörterungen schon einmal, im Kapitel über Akroparästhesien mit dieser Affektion beschäftigt; ich kann bezüglich weiterer Einzelheiten auf die dort gemachten Erörterungen hinweisen. Fälle dieser Art haben, wie schon betont, darin ihr besonderes Interesse, daß sie zeigen, wie fließend die Übergänge zwischen den verschiedenen Formen der hier behandelten

Neurouen sind; reine Akroparästhesien ohne vasomotorische Erscheinungen, Totenfinger ohne sensible Reiz- oder Ausfallsymptome, Totenfinger plus sensible Symptome als selbständige Erscheinung und weiter, wie wir eben erfahren haben, als Teilerscheinung der Raynaudschen Affektion kommen vor.

Es sei nur nochmals betont, daß das isolierte Auftreten von Totenfingern keine erhebliche pathologische Bedeutung beanspruchen kann und ganz gewiß nicht zur Diagnose „Raynaudsche Krankheit“ berechtigt. Schon Raynaud selbst bemerkt, daß dieser Zustand mit sonstiger Gesundheit völlig verträglich ist. Auch Menro betont ausdrücklich, daß es nicht angeht, den Totenfinger als Krankheit zu betrachten, andererseits hat er recht, wenn er sagt, daß es sich doch nicht um einen normalen, physiologischen Vorgang handelt, sondern um die krankhafte Steigerung eines solchen normalen Prozesses.

Die zweite Reihe der bei Raynaudscher Krankheit beobachteten vasomotorischen Erscheinungen wurde von Raynaud selbst als *Asphyxie locale* im engeren Sinne bezeichnet; Weiß spricht von regionärer Cyanose, Laveran von Akrocyanosis, Johnson von „*local apnoea*“, Barlow von „*local cyanosis*“, Hutchinson von „*acroasphyxia*“. Raynaud entwirft von dem Zustand der von lokaler Cyanose betroffenen Teile folgendes Bild: Die Haut erscheint bald weißblau, bald violett-grau und ist von eigentümlich durchsichtiger Beschaffenheit; die blaue Farbe kann sich mehr nach dem Schwarz hin vertiefen, wie ein blasser Tintenfleck oder eine etwas stärkere Beimischung von Rot bekommen; bei Druck bleicht ein weißer Fleck längere Zeit bestehen. In den an die betroffenen Teile anstoßenden Partien besteht oft eine bläuliche Marmorierung, die sich ausnahmsweise weiter ausdehnen und über den ganzen Körper verbreiten kann. Zu der Farbeveränderung gesellt sich regelmäßig, mit der Dauer der Cyanose zunehmend, eine Temperaturerniedrigung in den betroffenen Teilen, die allerdings nicht so erheblich zu sein pflegt, wie im Stadium der *Synkope locale*.

Auch hier finden wir mancherlei Farbennuancen. Hochensigg erwähnt ein blaugraues Aussehen der Teile, er glaubt dies sei dadurch hervorgerufen, daß bloß die tieferen Schichten cyanotisch sind und deren Farbe von der darüber liegenden, entweder normalen oder schwach ödematösen Haut als einem trüben Medium zum bleigrau abgestumpft wird; auch Hölzlin beschreibt einen blaugrauen, Goldschmidt einen schiefelernen Farbenton. Ich habe vielfach dasselbe, besonders in Fällen von Kombination von Raynaudscher Krankheit und Sklerodermie beobachten können. Bei diesen Patienten fiel mir auch die eigentümlich durchscheinende, glasige Beschaffenheit der Haut, die sicher nicht allein auf Rechnung der Sklerodermie zu setzen war, auf; ein ähnliches Verhalten der Haut beschreibt auch Bull. Riva sagt

von den Händen seiner Patienten, sie sahen aus wie in Indigo getaucht. Die Färbung ist bald mehr gleichmäßig, bald eine Beckige. Die Grenzen der Verfärbung sind nicht immer scharf, meist nimmt sie nach der Peripherie hin an Intensität zu, sehr stark verfärbt und oft ganz schwarz sind die Finger- und Zehennägel, (wie in Tinte getaucht). Besser als jede Beschreibung geben Abbildungen diese merkwürdigen Verfärbungen wieder, wenn es auch schwer ist, die vielfachen Nuancen mit ihrem häufigen Wechsel festzuhalten (siehe die Abbildungen Tafel V u. VI). Die Verfärbung kann sich ganz plötzlich oder mehr allmählich einstellen; in einer eigentümlich alternierenden Weise geschah das in einem von Leichtenstern mitgeteilten Fall, wo erst die Kuppe des linken kleinen Fingers, dann die entsprechende Stelle des rechten kleinen Fingers und so fort auch die übrigen Finger mit einigermaßen regelmäßiger Abwechselung von der Asphyxie befallen wurden. Was überhaupt die Verteilung der Asphyxie auf die einzelnen Körperabschnitte anlangt, so sei hier nur bemerkt, daß von Asphyxie locale hauptsächlich ebenso wie von Synkope locale die Finger, Zehen, Nase und Ohren befallen werden; eine genauere Darstellung der Lokalisation der Veränderungen verschiebe ich auf später. Wenn man auf die verfärbten Teile einen Fingerdruck ausübt, so macht die bläuliche Farbe einer weißen Platz, aber Raynaud hat bemerkt, daß dieser Farbenwechsel langsamer eintritt als beim Gesunden, und er schließt daraus auf eine verlangsamte capillare Circulation. Ich habe das auch vielfach bei meinen Kranken bestätigen können, ebenso Garrigues; Laignel-Lavastine hat diesem Phänomen größere Aufmerksamkeit geschenkt und genauere Untersuchungen darüber bei der Hemiplegie und der Raynandschen Krankheit angestellt. Er bemerkt, daß die Zeit, die der durch Druck hervorgebrachte weiße Fleck zum Verschwinden braucht, von der Tätigkeit der lokalen Circulation abhängt. Er verschwindet z. B. rascher, wenn die Hand vorher in warmem Wasser war. Bei der Hemiplegie sind die Resultate je nach dem Alter verschieden. Einen Tag nach dem Anfall verschwindet der Fleck rascher als normal, sechs Monate bis zwölf Jahre nach dem Anfall langsamer. Dazwischen liegt ein kurzer Zeitraum, wo die Verhältnisse den normalen, bzw. den der gesunden Seite gleich sind. Sehr lange Meist der Fleck bei Raynandscher Krankheit bestehen. Im warmen Bad verschwindet er an den gesunden Partien sofort, langsam an den kranken.

Exakte zahlenmäßige Untersuchungen dieses Verhaltens fehlen noch, wären aber sehr wünschenswert.

Zur Verfärbung kommen meist zwei weitere, auf denselben Ursachen beruhende Symptome, das ist ein gewisser Grad von Schwellung und eine Temperaturerniedrigung.

Die Schwellung ist eine ziemlich regelmäßige Begleiterscheinung der lokalen Asphyxie, während, was hier noch nachträglich er-

wähnt sein mag, bei der Synkope gewöhnlich eine Volumensverminderung des betroffenen Gliedes festzustellen ist. Lauer konnte in einem Fall eine meßbare Zunahme des Umfangs feststellen. Er fand während des Anfalls von Asphyxie locale an der dritten Phalanx des dritten rechten Fingers 6,5 cm Umfang, nach dem Anfall 6,4 cm Umfang, an der dritten Phalanx des vierten rechten Fingers 6,0 cm während, 5,8 cm nach dem Anfall; für die dritte Phalanx des fünften Fingers betrugen die entsprechenden Zahlen 5,8 und 5,5, für die zweite Phalanx des dritten rechten Fingers 7,3 und 6,5, für die erste desselben Fingers 8,2 und 7,5 cm; es resultiert daraus also eine Zunahme des Umfangs während der Asphyxie bis zu 0,8 cm.

Die Schwellung ist keine ödematöse, Fingerdruck bleibt nicht bestehen.

Die Schwellung soll in einzelnen Fällen sogar der Asphyxie vorausgehen können oder selbst auftreten, ohne daß, an dem betreffenden Teil wenigstens, eine Cyanose sich bemerkbar macht (Raynaud). Sie kann ausnahmsweise erheblich sein und ist nach Monro einmal geradezu enorm gewesen. Die Fälle, in denen sie ganz in den Vordergrund trat, darf man meiner Ansicht nach nicht mehr der lokalen Asphyxie zurechnen, vielmehr handelt es sich hier offenbar um eine angioneurotische Schwellung, wie sie das Hauptsymptom des angioneurotischen Ödems bildet. So fasse ich die von Monro in diesem Zusammenhang zitierten Fälle von Bland und O'Connor auf. Über blüchtige Anschwellungen, die dem Auftreten von Asphyxie locale längere Zeit vorausgingen, berichtet auch Chavanis.

Auch die Temperaturherabsetzung ist mehrfach gemessen worden, so u. a. von Lauer in dem eben erwähnten Fall. Lauer fand rechts, wo Asphyxie locale bestand, an der Innenseite des Oberarms 33,5°, des Vorderarms 31,8°, der Vola manus 30,0°, an den Fingerspitzen 25,8°, während für die entsprechenden Stellen der linken Seite, wo bereits die Reaktion eingetreten war, die entsprechenden Zahlen 33,5°, 33,5°, 34° und 33,6° betrugen; als Resultat ergibt sich eine distalwärts sehr stark zunehmende Temperaturherabsetzung im Gebiet der Asphyxie locale. Das zeigt auch eine Messung von Hnatek. Er fand über den Fingern rechts 21° links 27°, in der Mitte des Handtellers rechts 25°, links 32° und über dem Handgelenk rechts 31°, links 33° C. Die Differenzen zwischen den Temperaturen der einzelnen Finger können je nach deren vasomotorischem Verhalten außerordentlich große sein. Ich fand in einem meiner Fälle: am fünften rechten Finger 33,0, am fünften linken Finger 33,1°, am Daumen beiderseits 23°, am dritten rechten Finger 17°. Diese Verschiedenheiten sind naturgemäß ohne weiteres für das Gefühl erkennbar. In einem anderen Fall betrug die Temperatur über dem rechten Deltoideus 39,8°, in der linken Vola manus 21,5°, am linken zweiten Finger 21,5, am linken vierten Finger

18,5°. In Marchands Beobachtung war die Differenz zwischen der Außentemperatur und der der asphyktischen Teile sehr gering, die Außentemperatur betrug 12,5° C, die der Hände 13,75° C, die der stärker betroffenen Finger nur 13,1° C. Sehr genaue thermometrische Untersuchungen hat Hößlin angestellt; er ist dabei zu überraschenden Resultaten gekommen, indem er fand, daß die Temperatur der von Asphyxie locale betroffenen Körperteile eine excessiv niedrige ist und selbst um vier Grad unter die Temperatur der umgebenden Luft sinken kann. Er führt das letztere auf starke Verdunstung zurück. Er fand weiter, daß mit Abnahme der lokalen Asphyxie eine bedeutende lokale Temperaturerhöhung, bis um 20 Grad, eintritt. Einer künstlichen Erwärmung der von lokaler Asphyxie ergriffenen Teile folgte eine Temperaturabnahme, wenn die Asphyxieanfalle nicht etwa selbst dadurch krupt werden. Selbst in einem Wasserbad von 40° blieben die Hände noch kalt und cyanotisch. Riva maß vor dem Anfall zwischen Daumen und Zeigefinger eine Temperatur von 35,8°, im Anfall von 20,6°, in der Hohlhand von 23,4°. Also auch hier ein enormer Temperaturabfall; ähnliches finden auch Rosenbaum, Bernhardt und auf Grund sehr sorgfältiger Messungen Castellino und Cardi, die einen Temperaturabfall von 13° konstatieren konnten. Péhu hat in seinem Fall (Akroasphyxia chron. hypert.) gefunden, daß zwar normale Werte erreicht werden, daß der Anstieg aber langsamer ist als in der Norm. Das bedarf aber noch weiterer Nachprüfung; das langsamere Ansteigen habe ich einige Male auch feststellen können, andererseits schien mir gerade da, wo subnormale Temperaturen vorhanden sind, mehrfach das Thermometer etwa schon innerhalb 1½ Minuten seinen höchsten Stand erreicht zu haben, während es an normalen Stellen noch weiter stieg. Ehrenberg hat übrigens darauf hingewiesen, daß zwischen den einzelnen Individuen große Differenzen in bezug auf die Hauttemperatur der Finger vorhanden sind, daß aber andererseits bei demselben Individuum meist ein gleichmäßiges Verhalten vorherrscht. Das bestätigt den pathologischen Charakter der bei Raynaudischer Krankheit nachgewiesenen Differenzen.

Als weitere interessante Einzelheiten seien vermerkt, daß Hößlin bei Nadelstichen in das Gebiet der lokalen Asphyxie kaum einen Tropfen dunkles Blut, Bernhardt aus der asphyktischen rechten Hand ein dunkelbläurötes, aus der linken normalen Hand hellrotes Blut erhielt. Haig fand in dem während eines Anfalls entnommenen Blut Zerfall der roten und Zunahme der Zahl der weißen Blutkörperchen (s. u.).

Durch äußere Prozeduren kann die ursprüngliche Farbe der erkrankten Partien mannigfach verändert werden. Wir sahen schon, daß die Cyanose durch Druck momentan verschwindet. Lühr sah bei seinem Patienten, wie durch Eintauchen in Eiswasser eine hoch-

gradige Weißfärbung der Finger eintrat, während nach kurzem Erwärmen eine ziegelrote Verfärbung zum Vorschein kam, die mit einer bläublauen Farbe abwechselte. Durch Hochhalten verschwand die Cyanose zum Teil. Ich selbst konnte vielfach in Fällen von lokaler Asphyxie, beim Eintauchen der Hände in lauwarmes Wasser ziegelrote, fleckige Verfärbung beobachten. Daß kaltes Wasser die Anfälle auslost, wurde in der Regel beobachtet, gelegentlich kommt das auch bei Eintauchen in warmes Wasser vor (Fox). Eine umgekehrte, paradoxe Reaktion (Hanthyperämie durch Eintauchen in kaltes Wasser) wurde von Korak in einem nicht streng hierher gehörenden Fall von allgemeiner vasomotorischer Neurose beschrieben.

Neben der typischen Asphyxie kommen aber auch schon spontan eine ganze Reihe von Modifikationen der vasomotorischen Erscheinungen vor. Weiß beschreibt folgendes: An einzelnen Stellen bekommt die Haut plötzlich eine himbeer- oder fuchsinrote Färbung, die mit scharfen Rändern vom normalen Gewebe geschieden ist und nach sekunden- oder minutenlanger Dauer wieder verschwindet. Veränderungen dieser Art sahen vor Weiß schon Raynaud, Helm und Fischer; auch Schubert berichtet über Ähnliches, ebenso Goldstandt, „als ich die Finger in eine schwache Fuchsinlösung getaucht wären.“ Gränt beschreibt für seinen Fall drei voneinander getrennte Stadien: neben einer Synkope locale, die von Asphyxie locale abgelöst wird, eine dieser folgende Hyperämie von mehrstündiger Dauer. Häufig genug findet man die Zeichen der aktiven Hyperämie als Übergangs- resp. Reaktionsstadium beim Aufhören der Asphyxie locale in ähnlicher Weise, wie wir es bei der Synkope locale schon geschildert haben. Solche Fälle zeigen dann wieder gewisse Beziehungen zur Erythromelalgie. Es braucht sich dabei nicht einmal immer um ein Nacheinander, sondern kann sich sehr wohl auch um ein Nebeneinander von Erscheinungen handeln, an demselben Patienten finden wir zu gleicher Zeit an einer Stelle Zeichen von Asphyxie locale und von arterieller Hyperämie, so z. B. bei dem Fall Deeks, wo zufallensweise die Finger der linken Hand kalt und weiß, die Palma manus heiß und rot war. Ähnliches wird in den Fällen von Höllin, Bride, Mouillet berichtet. Auch ich habe das mehrfach gesehen (siehe auch die Abbildung a auf Tafel VI), und in einem Falle auch entsprechende thermometrische Feststellungen machen können. Ubrigens gehen aber Temperatur und Färbung nicht immer parallel, ich habe mehrfach beobachtet können, daß auch die roten Finger auch eiskalt waren.

Es handelt sich hier wohl um die oben erwähnte von Weiß zuerst beschriebene hellrote oder rosa Färbung, nicht um den gewöhnlichen Zustand der reaktiven Hyperämie. In sehr ausgesprochenem Maße sah ich das in dem Fall, von dem die Abbildung Tafel VII stammt.

Daß in einzelnen Fällen engere Beziehungen zwischen Raynaud-

seher Krankheit und Erythromelalgie bestehen, haben wir oben an geeigneten Fällen bereits gesehen. Während wir dort über Beobachtungen berichteten, die mehr dem Typus der Erythromelalgie entsprachen und nur in einzelnen Erscheinungen der Raynaud'schen Krankheit sich annäherten, finden wir ein umgekehrtes Verhalten vereinzelt ebenfalls berichtet, z. B. in folgender Beobachtung Rolleston's.

29 jähriger Mann, früher Bergmann, klagt über Schürfe der Hände und Füße seit 12 Monaten und seit 6 Monaten über Schmerzen in diesen Teilen und über Empfindlichkeit gegen Kälte. Hände und Füße schwellen an, wenn er sie der Kälte aussetzt und besonders, wenn er sie beschlagen läßt. „His hands went dead and all the same time swelled and throbbled.“ Auch im Sommer aber war er von Beschwerden nicht ganz frei, die Hände sind vergrößert, rot und geschwollen, nicht ödematös, sie sehen denen Akromegalischer ähnlich, sie sind überempfindlich gegen alle Reize, zeitweise traten auch spontane Schmerzen bis zu den Schuften ein. Auch die Füße sind heiß, die Zehen sind dick und klobig und auch rot und überempfindlich; sonst keine Zeichen von Akromegalie, keine Hämogloburie oder Hämaturie. Lasse von letztem Jahre.

Der Fall ähnelt der Raynaud'schen Krankheit durch die Empfindlichkeit des Kranken gegen Kälte, durch das anfallsweise Auftreten von Absterben der Hände und Füße, er erinnert an die Erythromelalgie durch die Überempfindlichkeit und die Röte der Hände. Ich habe in einem Fall eigener Beobachtung, auf den ich wegen einzelner besonderer Züge noch zurückkomme, neben Raynaud'schen Symptomen deutlich Züge von Erythromelalgie feststellen können.

Schon Raynaud selbst hat die wichtige Tatsache festgestellt, daß Synkope locale und Asphyxie locale zwei einander sehr nahe verwandte Zustände sind, die engste Beziehungen zueinander haben und sehr wohl nebeneinander bei demselben Individuum vorkommen können. Diese Angaben sind dann später immer wieder bestätigt worden: an vielen meiner Patienten mit Raynaud'schen Symptomen konnte ich die nahen Beziehungen zwischen beiden Zuständen sehr gut studieren, der Maler hat versucht, diese Nuancierungen im Bild zu skizzieren (siehe die Tafeln V und VI). Für gewöhnlich hatten die Finger und Handrücken das schon erwähnte Blaugrau, schiefenfarbige Aussehen, aber in zahlreichen Anfällen wurde einmal diese, ein andermal jene Phalanx ganz bleich, während sich die Cyanose etwa an der direkt anstoßenden Phalanx zu einem schwärzlichen Farbenton vertiefte. An anderen Stellen löste sich zu gleicher Zeit das Weiß oder Grau in ein immer heller werdendes Rot von eigentümlicher Nuancierung, um wieder an anderer Stelle, meist auf dem Umwege über das Blau in das echte Hellrot der aktiven Hyperämie überzugehen. So bestand oft ein mannigfaches wechselndes Farbenspiel, das in allen seinen Feinheiten auch in den beigegebenen farbigen Skizzen kaum ganz zum Ausdruck kommen kann.

Über das Einsetzen und den Verlauf der Asphyxie locale läßt sich folgendes sagen: entweder entsteht sie direkt aus dem normalen Zustand oder aus der lokalen Synkope. Es ist gar nicht selten, daß die lokale Synkope im ganzen Verlauf der Affektion nicht vorkommt. Viel seltener scheint das völlige Fehlen der Asphyxie zu sein, doch finde ich einen solchen Fall von Santvoord mitgeteilt. Der Autor macht hier selbst auf das Fehlen des Mittelgliedes zwischen Synkope locale und Gangrän aufmerksam; leider kenne ich den Fall nur aus einem Referat.

50-jährige Frau. Seit 30 Jahren abgestorbene Finger, merkt an den vier Fingern der rechten Hand, jetzt merkt an allen Fingern und auch kalte Fäße und Zehen. Die Finger werden zufällweise kalt, nach, weiß und wachsblass. Die Schmerzen sind unbedeutend. Am vierten Finger kommt es gelegentlich zur Nekrose; dieser schwillt an, wird bläulich, schmerzhaft und die letzte Phalanx wird gangränös. Puls beiderseits auch sphygmographisch gleich.

Angenommen soll auch ein Fall Rognettas einen ähnlichen Verlauf genommen haben.

Das umgekehrte Verhalten, das Fehlen der Synkope kommt umgekehrt häufiger vor. Weiß fand unter 17 Fällen nur fünfmal spastische Ischämie beschrieben, während in den übrigen zwölf Fällen die Cyanose primär auftrat. Auch die späteren Beobachtungen bestätigen das häufige Fehlen von Synkope locale (Schulz, Taylor, Simpson, Stanley, Hutchinson und viele andere). Blumenthal beschreibt in einem mit Sklerodermie kombinierten Fall das eigentümliche Verhalten, daß erst die Finger mehr und mehr dunkelrot wurden, und daß daraus sich der Zustand der Synkope locale entwickelte. Meuro bestätigt, daß ausnahmsweise erst Asphyxie locale, dann Synkope und dann wieder Asphyxie eintreten kann. Etwas abweichend präsentierten sich die vasomotorischen Symptome auch im folgenden Fall meiner Beobachtung.

25-jähriger Arzt. Hat schon als Schüler viel an heißen Händen gelitten und im Winter stets viel an den Händen wie an den Füßen gefroren. Seit Beginn des vorigen Winters trat nun zufällweise eine Blutzirkung der Finger ein, die sich in diesem Winter noch verstärkte, während er im Sommer nichts davon bemerkt hatte. Besonders des Morgens beim Waschen der Hände werden die Finger erst zufällig rot, allmählich verwandelt sich das Rot in Weiß und dann in nach und nach sich vertiefendes Blau, das sich bis zur proximalen Fingergrenze erstreckt; die Finger sehen dann wie in Tiefe getaucht aus, es wird ein oder das andere Mal ein Finger abgelassen, wie die Daumen sind meist weniger betroffen. Es genügt schon ein Herabfallen der Temperatur im Zimmer auf 15° zur Auslösung der Anfälle. Es bestehen keine bemerkenswerten anderen Erscheinungen, ebenso wenig sekretorische paroxysmale Symptome, dagegen hat das Schütteln der Hände schon immer Befriedigung, und ist jetzt auch oft vorhanden. Die objektive Untersuchung ergibt keine weiteren Symptome außer den vasomotorischen. Chinin wurde längere Zeit ohne Erfolg genommen. Puls ist nicht merklich, aber die Mutter leidet an Migräne.

Jedenfalls sehen wir an alledem die Tatsache der engen Zu-

samzugehörigkeit aller dieser vasomotorischen Symptome bestätigt.

Beim Nachlaß der Asphyxie locale kommt es entweder zu einem Zwischenstadium aktiver Hyperämie, wie schon oben geschildert, oder zu einem allmählichen Verschwinden der Cyanose, indem hier und da, namentlich von der Peripherie her, aber auch inmitten des cyanotischen Gebietes hellere Flecke auftreten, die sich allmählich ausbreiten. In einer dritten Reihe von Fällen folgt auf die Asphyxie locale direkt das Stadium der Gangrän.

An den asphyktischen Teilen läßt bisweilen eine gewisse Erweiterung der oberflächlichen Hautvenen auf; in seltenen Fällen kann man direkt eine Zusammenziehung dieser Venen sehen; so notiert Weiß, daß wiederholt einzelne Venen des Fußrückens allmählich ihr Lumen verengerten und schließlich ganz verschwanden, während die Zehenrücken in der Zeit allmählich cyanotisch wurden. Auch Barlow hat offenbar Ähnliches gesehen, er bemerkt darüber in seinem Anhang zur Übersetzung der Raynaud'schen Monographie folgendes: In einzelnen Anfällen habe ich an den Venen des Handrückens eine perlchurartige Anordnung gesehen, eine Reihe von kleinen, dunklen Knötchen zog sich, dem Verlauf dieser Venen folgend, über den Handrücken, zwischen den dunklen Knötchen sah man enge, meist farblose Teile der Venen liegen. Sowohl die Knötchen wie diese ungarbarten Partien veränderten ihre Lage unter den Augen des Beobachters, es war klar, daß eine Kontraktionswelle an den Gefäßwänden entlang lief und hier eine Verengung, dort eine Erweiterung des Verlaufs hervorbrachte. Wie man sieht, erinnern diese venösen Kontraktionen sehr an die durch den Gubler'schen Versuch hervorgerufenen passagieren Kontraktionen der Venen.

Die Dauer der Anfälle von Asphyxie ist sehr verschieden und äußerst wechselnd. Der einzelne Anfall kann im Verlauf weniger Minuten beendet sein, kann aber Stunden und selbst Tage dauern, wie in einer eigenen Beobachtung, er kann sich ein- oder mehrere Male am Tage wiederholen, aber kann auch in mehrtägigen und noch längeren Zwischenräumen auftreten. Im allgemeinen dürfte das Stadium der Asphyxie länger dauern, als das der Synkope. Stölzner hat einmal beobachtet, daß sich aus einer chronischen Asphyxie eine paroxysmale entwickelte, viel häufiger ist sicher das umgekehrte Verhalten.

Das dritte Stadium der Krankheit wird durch die Gangrän dargestellt. Damit kommen wir zu den trophischen Störungen, die dem Bild der Raynaud'schen Krankheit seine charakteristischsten Züge verleihen.

Die Gangrän entsteht in den typischen Fällen, nachdem die oben geschilderten vasomotorischen Symptome vorausgegangen waren, auf verschiedene Weise: Es kann zur Bildung kleiner Blasen, die mit

serös-blutigem, bisweilen schwärzlichem Inhalt gefüllt sind, kommen; diese öffnen sich und lassen kleine Echoriationen und Geschwüre zurück, die allmählich unter Bildung fester, kleiner, oft dunkel pigmentierter Narben heilen. Ein andermal platzen die Bläschen nicht, sondern trocknen ein, die Oberhaut löst sich fetzenweise los. Phlepp beschreibt die Vorgänge bei dieser Blasenbildung genauer. Es entwickeln sich kleinere, abtold konfluierende, mit serös-blutigem Inhalt gefüllte Blasen. Nach einigen Tagen entsteht am Rande der Blase ein hämorrhagischer Hof und die Blase trocknet allmählich ein; wenn man die Blase schon früher eröffnete, zeigte sich auf ihrem Grunde nekrotisches Gewebe. Bei erneutem Aufschließen von Blasen wurde dann beobachtet, daß der Erguß jedesmal unter jener Schicht erfolgte, welche den früheren Blasengrund darstellt. Die Ausdehnung der Blasen nahm dabei jedesmal zu. Allmählich bildete sich dann ein trockener fester Schorf, der von einem Demarkationsring umgeben war. An den proximaleren, weniger stark ergriffenen Fingerpartien kam es auch hier zu einfacher Ablösung der oberflächlichen Hautschichten. Auch ohne Bläschenbildung kann sich eine Verdichtung und Verdickung der Haut und eine Abtötung in festen, harten, braunen Schuppen ausbilden. Gerade diese Form der tropischen Störung ist in den milderen Fällen sehr häufig, worauf zuerst Eulenburg aufmerksam machte. Bei genauerem Befragen erhält man in vielen Fällen, in denen die sensiblenomotorischen Erscheinungen ganz im Vordergrund stehen, von den Patienten derartige Angaben, und man erkennt bei genauerem Hinsehen dann die kleinen, stecknadelkopf- bis liniengroßen verhärteten meist etwas dunkler gefärbten Fleckchen und Borken, die ich bisweilen in sehr großer Anzahl an der Pulpa der Finger fand (vgl. die Abbildung b auf Tafel VI). Sie kommen auch neben anderen schwereren tropischen Störungen zur Beobachtung. So habe ich einen Kranken beobachtet, bei dem sich in einem ersten Anfall unter sehr heftigen Schmerzen im Verlaufe von einigen Monaten hunderte derartiger kleiner Stellen bildeten, die als schwarze harte Stellen von der Größe eines Stecknadelkopfes auftraten, anfangs sehr schmerzhaft gegen Berührung waren, etwa 14 Tage so empfindlich blieben und nach weiteren 14 Tagen bis 3 Wochen als harte bröcklige Massen abfielen resp. sich ohne Schmerzen ablösen ließen. An den betreffenden Stellen blieben kleine narbenartige Vertiefungen zurück. Später kam es bei demselben Kranken zu umfangreicherer Gangränbildung.

Geht der Prozeß weiter in die Tiefe, in die Cutis und Subcutis, dann entstehen größere Blasen, von Zehnplennagelstückgröße und darüber, die platzen und sich allmählich mit einem schwarzen, dunklen Schorf bedecken; nach vier bis fünf Tagen wird der Schorf abgestoßen, es bleibt ein torpides, träge vernarbendes Geschwür zurück.

Bisweilen ist dieses ganz scharf umgrenzt, wie mit einem Löffel aus der Haut herausgeschlagen. Die Ausdehnung der Gangrän ist meist eine sehr geringe, sie beschränkt sich oft auf die Epidermis oder greift noch ein wenig weiter in die Tiefe; jedenfalls ist sie in der Regel viel weniger ausgedehnt, als die vasomotorischen Erscheinungen, in deren Gefolge sie entsteht. So sah ich z. B. in einem meiner Fälle nicht nur die Cyanose sondern auch die Schwarzfärbung die Haut an den ganzen letzten Phalangen ergreifen; diese wurde dann aber im Umfang immer geringer und beschränkte sich schließlich nur auf einen kleinen Teil der Fingerkuppen, die dann definitiv der Verschorfung anheimfielen. Der übrige Teil der Phalangen war hellrot, glänzend und glatt geworden. Immerhin kommt es jedoch nicht selten zur Abstoßung ganzer Phalangen. Dann bekommen diese in toto ein schwarzes, verschorftes, kohleartiges Aussehen, sie sind hart wie Holz, bewegungs- und empfindungslos. Die Abbildung auf Tafel VIII, die von einem Fall von Sklerodactylie mit Raynandschen Symptomen stammt, läßt die Art dieser Gangrän aufs schönste sehen und erkennen. Wie schwarze Holzkohlenstifte sitzen die gangränösen Partien auf den gesunden Teilen auf. Allmählich bildet sich um sie herum eine Demarkationslinie, die langsam in die Tiefe schnittet und das tote Gewebe abtrennt, so daß der ganze Teil, wenn auch Knochen und Bänder von der Gangrän betroffen sind, spontan abfällt. Nach Entfernung des toten Anhangs erfolgt bei minimaler Eiterung in weiteren ein bis zwei Monaten die Vernarbung des unregelmäßigen Stumpfes. Dieser sitzt mit breiter Basis auf dem Basalgelenk auf, vermahächtigt sich allmählich gegen die Spitze, ist mit einer papierdünnen, glatten, wenig empfindlichen Haut überzogen, das Unterhautzellgewebe ist bedeutend infiltriert; daher die pumpe und unregelmäßige Gestalt, sowie die stark behinderte Beweglichkeit (Weiß). Die Dauer des ganzen Prozesses ist sehr verschieden und wechselt besonders je nach der Größe der eintretenden Gangrän. Weiß schätzt sie bei Ergriffensein einer ganzen Phalange auf zwei bis vier Monate; bei oberflächlicher Gangrän können wenige Wochen genügen, aber auch da kann sich die Heilung viel länger hinziehen. Die Narben zeigen oft noch lange Zeit, bis zu einem Jahr und darüber hinaus, eine intermittierende, stets sich erneuernde Krustenbildung.

Die geschilderte Gangrän gehört zu der trocknen Gangrän. In der Tat findet man bei unserer Krankheit auch fast stets diese Form; aber vereinzelt sieht man auch einmal eine feuchte Gangrän sich etablieren, besonders wenn es sich um eine etwas ausgedehntere Nekrose handelt. Zwischen beiden Formen besteht ja kein prinzipieller Unterschied, und es hat dementsprechend auch nichts Überraschendes, daß sich gelegentlich an den verschiedenen Körperstellen eines Individuums die beiden Gangränformen zu gleicher Zeit finden (Boggi).

Lokalisation, Ausdehnung der Gangrän. Die Gangrän

betrifft symmetrische Stellen der Akra (Finger, Zehen, Nase, Ohren) und ist auf kleine Partien der betreffenden Teile beschränkt. So lautet die durch die Mehrzahl der Fälle bestätigte Regel. Aber dann kommen die Ausnahmen. Es gibt Fälle, die sonst durchaus das typische Bild der Raynaud'schen Krankheit aufweisen, in denen aber die Gangrän nicht symmetrisch ist; es gibt Fälle, in denen die Gangrän sich nicht auf die Akra des Körpers beschränkt, sondern auch an anderen Stellen, am Sternum, an den Wangen usw. auftritt, ja selbst solche, in denen die tipfelnden Teile überhaupt frei bleiben, und endlich gibt es Fälle, in denen die Mortifikation einen ganzen Gliedabschnitt und noch mehr umfaßt.

Am häufigsten sind die Finger und besonders ihre Endphalangen in symmetrischer Weise betroffen. Es wird stets und mit Recht hervorgehoben, daß die Symmetrie nicht immer eine vollkommene ist, und daß sie namentlich nicht immer von vornherein vorhanden ist. In dem abgebildeten Falle hat die Gangrän zuerst den zweiten und dritten linken Finger gleichzeitig betroffen, ist dann auf den fünften Finger, dann auf den vierten derselben Hand übergegangen, jetzt aber (die Beobachtung ist noch nicht abgeschlossen) kommen anscheinend in derselben Folge die Finger der rechten Hand an die Reihe. Weiß gibt eine Zusammenstellung, nach der bei 13 von 17 Kranken die Symmetrie eine exakte war, daß die gleich liegenden Finger und Zehen entweder gleichzeitig oder in sehr kurzer Zeit hintereinander vom Brande ergriffen wurden; in einem weiteren Fall (Nedopil) wurden zwar auch die gleichnamigen Finger ergriffen, aber nicht gleichzeitig, sondern im Zwischenraum eines Jahres. Bei Weiß eigener Kranken mummifizierten die Phalangen ungleichnamiger Finger, während oberflächliche Schorfe an den Pulpen aller Finger zu wiederholten Malen sich bildeten; doch ist die Symmetrie auch insofern keine exakte gewesen, als die Schorfbildungen nicht immer gleichzeitig an gleichnamigen Fingern auftraten. Diese Erfahrungen sind von späteren Beobachtern nur immer wieder bestätigt worden: in einzelnen Fällen war die Symmetrie von vornherein sehr ausgesprochen in der Mehrzahl stellte sie sich erst allmählich her und war oft blos ganz genaue, insofern namentlich als öfter einmal die vasomotorischen Erscheinungen zwar symmetrisch verteilt waren, die Gangrän aber nicht. Auf die exquisit asymmetrischen Fälle komme ich noch zu sprechen.

Die Verteilung der Gangrän im ganzen ist eine unregelmäßig wechselnde und zeigt die mannigfachsten Kombinationen; was hier von der Gangrän gesagt wird, hat in allen wesentlichen Punkten auch für die Asphyxie locale, bei der ich deswegen auf die Lokalisation nicht eingegangen bin, Geltung. Es können alle Finger und alle Zehen betroffen sein und dazu auch noch Nase und Ohren oder einzelne Zehen und Finger oder nur die Finger oder nur die Zehen oder Extre-

mitäten und Nase (d'Astros, Declaux, Ribadeau-Dumas et Sabaréanu) und schließlich auch nur Nasenspitze und die Ohren (Fox, Nett, Declaux, Ribadeau-Dumas et Sabaréanu) oder auch nur die Nasenspitze (Grasset, Balzer et Fouquet) oder nur die Ohren, besonders die Helices (Beale, Fordyce, Monro, Urbantschitsch, Hallopeau und Lesnier). In einem meiner Fälle fand sich eine schwere Gangrän der Penis Spitze; ich berichte über diesen Kranken noch weiter unten ausführlich.

Monro macht folgende zahlenmäßige Angaben über das relative Verhältnis, in dem die verschiedenen Teile von der Gangrän befallen werden. In 43% der Fälle sind eine oder beide oberen Extremitäten befallen, in 34% sind nur die unteren Extremitäten beteiligt, in 22% untere und obere. Die Fälle in denen sehr zahlreiche Akra betroffen wurden, sind im ganzen selten. Weihe beschreibt einen solchen Fall, ferner Faure, Nielsen — dieser jedoch vielleicht auf hereditär syphilitischer Grundlage und deshalb zunächst nicht hierher gehörend. Hutchinson sah einen 37jährigen Mann, der die Spitzen sämtlicher Zehen und die Ränder beider Ohren durch Gangrän verloren hatte, während die Spitzen der Finger im Zustand der trockenen Gangrän und ganz schwarz waren. Die Gangrän war absolut symmetrisch; aber auch hier erscheint die Diagnose „Raynaud“ nicht über jeden Zweifel erhaben, weil das ganze Bild sich akut unter rheumatischen Schmerzen, schwerer Erschöpfung und in einem einmaligen Anfall entwickelt hatte. Mehrmals fand sich, daß während sonst alle Finger ergriffen waren, die Daumen frei blieben (DeFrance, Taylor u. a.). Sehr ausgedehnte gangränöse Veränderungen zeigt auch Rharas Fall, in dem drei Wochen nach Beginn der Erkrankung die dritten Phalangen von vier Fingern gangränös, ferner fünf Zehen völlig und drei Zehen in ausgedehntem Maße der Nekrose anheim gefallen waren.

Derartige Fälle bilden den Übergang zu solchen, in denen die Gangrän größere Gliedabschnitte befiel. Es ist klar, daß hier besondere diagnostische Bedenken sich erheben, aber es unterliegt keinem Zweifel, daß solche Fälle vorkommen. So beschreibt Barlow, der ein sehr guter Kenner der Raynaudschen Krankheit ist, einen Fall, in dem die Gangrän so tief griff, daß die Amputation im mittleren Drittel der Wade notwendig wurde. Die Untersuchung des amputierten Teils ergab keine wesentlichen Veränderungen, weder in den Gefäßen noch in den Nerven, nur geringe Wandverdickung der Arterien und Venen. In einem Fall Spillmanns, der mir nur im Referat vorliegt, sollen beide Hände bis zu den Handgelenken, beide Füße und Ohren und die Nasenspitze der Patientin gangränös geworden sein. Ein von Hauptmann berichteter Fall: Gangrän an beiden Unterextremitäten bis zwei Zoll oberhalb des Knies, ferner beide obere Extremitäten bis drei Zoll oberhalb der Ellbogen gangränös, Nase und Ohren ebenfalls

dunkel verfärbt, erscheint mir diagnostisch höchst zweifelhaft und nicht der Raynoldschen Krankheit zugehörig. In einem später nochmals zu erwähnenden Fall von Affleck waren links der ganze Fuß, rechts fast alle Zehen gangränös; die Gefäße an dem amputierten Glied waren normal. In einem Fall Beggs bestand ausgedehnte Gangrän an Armen, Beinen und Nasenspitze. Eine ungewöhnliche Ausdehnung zeigten die gangränösen Veränderungen auch in dem in mannigfacher Beziehung interessanten Fall von Arning.

Die zur Zeit der Untersuchung 31-jährige Pat., deren drei Jahre jüngerer Schwester nach ärztlicher Schilderung an der gleichen Affektion gelitten hatte und vor einiger Zeit gestorben war, hatte schon mit dem dritten Lebensjahr Frostbeulen an Händen und Füßen; stets waren die Extremitäten, Ohren und Nasenspitze kalt; häufig hatte sie Anfälle von schwerem Kopfschmerz und vorübergehender Amnesie. Vor zehn Jahren stellten sich die ersten Spuren symmetrischer Gangrän an den Fingerspitzen ein, später traten geschwulstige Prozesse an der Nasenspitze und den Ohrenscheln ein, dann auch an den Füßen, stets begleitet von sehr heftigen Schmerzen. Bei der Untersuchung fanden sich von beiden Händen nur noch Stümpfe, in der linken verkrüppelten Mittelhand sahen noch kurze, unförmliche Reste der Finger, nur die Daumen waren noch etwas besser erhalten. Überall fanden sich an den Fingernarben tiefe nekrotische Geschwüre von großer Schmerzhaftigkeit; die Füße hatten ein ähnliches Bild. Bei einer zwei Jahr später vorgenommenen Untersuchung hatte der Prozess noch weitere Fortschritte gemacht. Die Sensibilität war in jeder Beziehung argstört, ebenso die Treflik der Muskeln, die elektrische Erregbarkeit und die Reflexe. Nichts was auf Lepra hindeutete, konnte gefunden werden. Die Blutkreislaufstörung ergab schwere Veränderungen (s. u.). Durch konsequente Stützgebekhandlung wurde eine Besserung erzielt.

Die Gangrän kann auch auf die gleichseitigen Extremitäten oder sogar auf eine Hand oder einen Fuß beschränkt sein. Raynaud selbst teilt einen Fall mit, in dem die eine Seite wenigstens ganz vorzugsweise beteiligt war.

3½-jähriger Knabe; heruntergekommenes skrophulöses Kind. Vor drei Wochen Schwellung beider Beine, zwei bis drei Tage später werden die Spitzen der Zehen blau, erst heller, dann dunkler, schließlich wie in Tinte getaucht. Links bildet sich die Erscheinungen allmählich zurück, rechts werden sie im Gegenteil noch stärker. Drei bis vier Tage lang auch Erscheinungen von Asphyxie locale an den Fingern beider Hände, besonders an den Nägeln. Nach zehn bis zwölf Tagen bilden sich am rechten Fuß schwarze Flecken und Schorbe, die sich allmählich abheben. Auch am Stoßbein ein kleiner Schorf. Der Puls ist auch in den Fußarterien stets deutlich vorhanden, im allgemeinen nur etwas verregelmäßig. Nach einigen Wochen war das Kind völlig gesund, und nach 1½ Jahre später, als Raynaud es wieder sah, befand es sich im besten Wohlbefinden.

Hier betraf also die Gangrän nur den rechten Fuß, am linken Fuß und an beiden Händen bestanden nur vasomotorische Symptome. Ganz ähnliches Verhalten zeigt ein Fall von Björing. Einseitige Gangrän oder einseitige Asphyxie locale wurde ferner beschrieben von Colsen, Dominguez, Germer, Eichhorst, Pasteur, Zeller, Minor, Smith, Andersen, Parkinson. Wir können nicht auf

jeden einzelnen Fall eingehen, es mag genügen, wenn wir noch an einem oder dem anderen typischen Fall zeigen, daß gelegentlich einmal die Symptome völlig einseitig entwickelt sein können. Raynaud hat freilich erhebliche Bedenken dagegen geäußert, einen Fall seiner Krankheit zuzurechnen, bei dem die Asymmetrie sehr deutlich hervortritt. Er selbst hat eine derartige Beobachtung gemacht, sie betrifft den sechsten Fall seiner zweiten Arbeit. Es handelt sich um einen 44jährigen Mann, der vor elf Jahren an Cyanose der rechten Zehen und geringer Asphyxie des linken Fußes gelitten hatte; sieben Jahr später betraf in einem zweiten Anfall die Asphyxie den rechten Fuß, die Gangrän die linke große Zehe. In späteren Anfällen wurden dann nochmals erst die rechten Zehen, dann die linken gangränös und schließlich kamen noch die linken Finger mit geringer Gangränentwicklung an die Reihe. Nach Raynards Ausdruck bestand hier also mehr ein Alternieren als eine Symmetrie der Gangrän. Ich stimme mit Monro überein, daß dieser Fall unbedingt der Raynardschen Krankheit zugehört, und ich glaube auch, daß es Fälle gibt, die trotz völliger Asymmetrie hierher zu rechnen sind. Dazu gehört z. B. die folgende Beobachtung Zellers.

20jähriges Mädchen. Stets sehr züchtig. Seit zwölf Jahren Epitheliomien und Schwielen. Nie Frostbeulen an den Fingern. Oktober 1897 Schmerzen in den Gelenken des rechten Armes, Knieleiden in den Fingerspitzen der rechten Hand, dann — ist weiß, dann bläulich. Im November 1897 plötzliche Verdickungen; starke Schmerzen, besonders des Nachts, zeitweilig völlige Gefühlslosigkeit der ersten Phalangen sämtlicher Finger dieser Hand. Einen Morgen plötzlich sämtliche fünf Fingerspitzen dunkel, blau und gefühllos; akute Anschwellung des Dycnosens nach dem Stumpf zu. Schließlich sind sämtliche Finger der rechten Hand bis zur Mitte der zweiten Phalanx nekrotisch und müssen an dieser Stelle amputiert werden. Die Heilung ging sehr langsam vor sich. Der Puls an den rechten Arterien war gegenüber dem der linken entschieden stark herabgesetzt. Eine beständige Fälschung dafür zu geben war nicht möglich; es konnte sich um den Ausdruck eines dauernden Gefäßspasmus in diesen Arterien handeln, oder um eine kongenitale Verengung. Eine Schmerzhaftigkeit des Gefäßrohrs bestand ebenso wenig wie eine Verhärtung von denselben. Auch die Pulscurve war, mit dem Sphygmographen aufgenommen, normal. Es bestand keine Dysurie, kein Ergasmen, keine Karbunkelinfektion, es war kein Trauma vorangegangen. Interessant ist die Tatsache, daß bei der Operation die Arterien nicht spazierten, während eine starke vasomotorische Wirkung stattfand.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß es sich hier um einen typischen Fall echter Raynardscher Krankheit mit völlig einseitigem Sitz handelt. Auf die Ursachen der Einseitigkeit in diesem und ähnlichen Fällen gehe ich später ein. Ich möchte übrigens bemerken, daß auch nach meiner Ansicht unter den Fällen, die als einseitige Raynardsche Gangrän beschrieben sind, sich eine ganze Reihe finden, bei denen die Diagnose Raynardsche Krankheit nicht zu rechtfertigen ist. Dahin rechne ich auch einen jüngst beschriebenen sehr interes-

santen Fall von Benders, auf den ich noch zurückkomme. Eine fast vollkommene Beschränkung der Symptome auf einen Finger sah ich in einem eigenen Fall. Bemerkenswerterweise war es hier gerade der sonst oft frei bleibende oder weniger schwer affizierte Daumen, der hauptsächlich befallen war.

Bei einer 34jährigen Arbeiterin trat ein Jahr vor Beginn der Beobachtung ein Absterben des rechten Daumens ein; er wurde in ganzer Ausdehnung weiß, und dabei äußerst schmerzhaft. Diese Anfälle dauerten stundenlang; die Synkope wurde zeitweilig von Asphyxie locale und regionaler Hyperämie abgelöst. Zusammen mit der Synkope stellte sich Engpfaßungslosigkeit ein. Nach einigen Wochen trat eine Besserung ein, der vor vier Monaten eine heftige Exacerbation folgte. In den anderen Fingern hat Pat. antwortig Kriebeln, nie Schmerzen, nie vasomotorische Symptome, vor einigen Jahren soll einmal vom zweiten linken Finger der Nagel abgegangen sein. In der letzten Zeit sind die Schmerzen wieder sehr arg, es treten lokale Synkope und lokales Rhabd sehr häufig auf, daneben trophische Störungen, kleine bald einziehende Bläschen und eine Verhärtung der Haut bildet sich aus. Die Unterarmhaut des sonst nicht nervösen Frau ergibt: Haut des Daumens an der Endphalanx glatt, kaltes mit kleinen, perispiraligen, strahligen Nadeln, mit der Einstiche etwas vermehren. Vasomotorische Erscheinungen von dem geschilderten Typen. Auf dem Röntgenbild (siehe Abbildung auf Tafel IX) ausgesprochene atrophische Störungen in den Daumenphalangen. Hyperästhesie für Nadelstiche an der Endphalanx des Daumens, sonst Sensibilität frei. Im weiteren Verlauf dauernd Abstoßen der Haut in gelben, lachen Schuppen, der Nagel wird stark beschlig, ist mit dem Nagelbett wie verklebt. Die Schmerzen sind für Monate hinaus sehr heftig. Alle anderen Finger sind dauernd frei.

Der Fall, der durch das starke Hervortreten einer mit heftigen Schmerzen einhergehenden lokalen Hyperämie Züge der Erythromelalgie aufweist, bildet durch die ganz ungewöhnliche, während der ganzen Krankheitszeit von nunmehr fast zwei Jahren anhaltende Beschränkung auf einen Finger, für die eine Ursache nicht zu finden war, eine große Ausnahme.

Die Gangrän und ebenso die einfache Asphyxie locale betrifft nicht immer die bisher nur genannten Stellen, also Finger, Zehen, Nasenspitzen, Ohren, Kinn, sondern sie kann sich ausnahmsweise an jeder beliebigen Stelle des Körpers lokalisieren. Fälle der Art sind nicht einmal besonders selten.

An der Zunge wurden bisher mehrfach (von Powell, Mills, Fournier et Sabaréanu, Fox) derartige Erscheinungen konstatiert. Mills Patientin empfand einmal nach eifrigem Tanzen ein Gefühl von Verbranntsein an der Zunge, zugleich wurde die Zungenspitze bläulich. Powell konnte im Verlauf der Affektion einmal bemerken, daß die Zungenspitze cyanotisch wurde und sich ein Geschwür an ihr bildete. Der Patient von Fournier et Sabaréanu berichtete, daß er mehrere Male des Morgens beim Aufwachen im kalten Zimmer eine Steifigkeit der Zunge bemerkt habe, und daß diese beim Herausstrecken im Spiegel ganz blaß und blutleer erschien, auch einer

meiner Patienten bekam häufig mit Synkope der Hände und Füße zusammen eine solche der Zunge. Bei einer Kranken, die Hüllin beobachtete, wurde im Anfall die ganze vordere Hälfte der Zunge weiß, ihr Volumen schien kleiner. Patientin klagte über ein pelziges Gefühl in ihr, an anderen Tagen sah die Zunge auffallend blaurot aus.

An den Mamillae beobachtete Raynaud einmal eine Asphyxie locale, begleitet von Schmerzen, Fox ein Weißwerden, ebenfalls von Schmerzen begleitet.

Blumenthal sah Asphyxie und Synkope locale an den Lippen, ebenso Monroe, Hüllin solche des Kinns. Mehrmals waren die Wangen betroffen (Schuboe, Weiß, Winkhoff, Fischer, Mendel), ebenso mehrere Male die Nates (Schuboe, Weiß, Raynaud, Schäffer), die Kreuzbeingegend (Weiß, Raynaud), die Augenlider (Tannahill, Schäffer). Eine, soweit ich sehe, sonst nicht beobachtete Lokalisation konstatierte ich in einem eigenen Fall, nämlich eine Gangrän des Penis.

Ein 53jähriger Ingenieur teilte mit, daß er in Griechenland von 12–14 Jahren viel an Malaria gelitten habe. Seit acht Jahren habe er typische Migräneanfälle. Ein Jahr vor Beginn des jetzigen Leidens habe er Anfälle von Colitis intermittens gehabt und dabei bis zu 12 cm lange Stühle entleert. Darüber haben ausgeprägte allgemeine nervöse Beschwerden bestanden. Ohne Vorboten trat dann plötzlich unter heftigsten Schmerzen eine Gangrän der Spitze des Penis ein; es bildete sich im Laufe von drei Wochen da ein Stück, das wie Hartgummi aussah, so daß man daran klopfen konnte; das war im November. Im Mai des nächsten Jahres löste sich das kleine nekrotische Stückchen los. In der Zeit der Nekrosierung der Penisspitze traten unter ausgeprägten vasomotorischen Erregungen, die am Penis gefühlt wurden, an genau symmetrischen Stellen des ersten, dritten und vierten Fingers kleine nekrotische Stellen auf, beziehungsweise kleine Herde von verdickter Haut, die sich nach 14 Tagen abtöten; das geschah unter mäßigen Schmerzen. Nachher waren diese Teile noch öfter auffallend rötlich violett. Kälte wurde hier dauernd sehr unangenehm empfunden. Seit einigen Wochen hat er jetzt Schmerzen an den Zehen und es stoßen sich hier die Nägel ab; dabei treten Anfälle von Asphyxie locale ein, die auch von mir direkt beobachtet wurden. Sonst läßt die jetzige Untersuchung nachfolgendes erkennen: Verkümmern der Zeheknägel. Der Penis ist sehr klein, deformiert, an der Spitze noch empfindlich und rot, aber es soll eine vollkommene Erektion möglich sein. An den Händen keine Neigung zur Cyanose, und einige kleine strahlige Entzündungen und Verdickungen an den Fingerbeeren. Alles Übrige von seiten des Nervensystems ist intakt. Bemerkenswert ist noch, daß der Ruckdruck stark erhöht ist, und daß Spüren von Abwesen vorhanden sind. Nach der Angabe des Kranken ist die Albuminurie zuerst gelegentlich die Gangränierung des Penis aufgetreten (vielleicht nur damals zuerst bemerkt worden). Sie soll in der Zwischenzeit mehrfach ganz verschwinden sein. Eine mikroskopische Untersuchung des Urins konnte nicht vorgenommen werden. Am Harnes war sonst nichts nachweisbar. Meines erste Untersuchung war im Juli 1909. Nach betrieblichen Nachrichten, die ich jetzt erhielt, hat sich der Zustand indes (April 1912) nicht wesentlich geändert, es treten an Fingern und Zehen noch immer rasenartige Reizerscheinungen auf. Der Urin soll jetzt wieder frei von Albumen sein.

An der Diagnose wird man in diesem Falle nicht zweifeln können, trotz der offenbar bestehenden Schrumpfnieren, handelt es sich um einen echten Raynaud — auf diesen Punkt kommen wir noch zurück. Ich möchte noch ausdrücklich auf die vorausgegangene Malaria und die Kombination mit der Migräne und der *Ulcitis membranacea* aufmerksam machen.

Die Schleimhaut der großen Labien war in dem Fall von Weiß, die der großen und kleinen Labien und der Vagina in dem von Lustig befallen. Schließlich fanden sich an verschiedenen proximalen Stellen der Extremitäten und auch an einzelnen Stellen des Stammes vereinzelte oder multiple gangränöse Stellen, und auch diese mehrmals in ausgesprochen symmetrischer Verteilung (Beader, Fox, Köster, Mangue, Smith, Schulz, Wynhoff, Tannahill, Renshaw, Hutchinson, Lustig). Es ist aber sehr bemerkenswert, daß mit der abnormen Lokalisation der Gangrän sich fast immer auch weitere Abnormalitäten im Verlauf und der Symptomatologie der Affektion verbinden, so daß in der Mehrzahl namentlich der zuletzt genannten Fälle die Diagnose unsicher ist. Interessant ist folgender Fall von Tannahill.

Jüngeres Kind. Im Alter von zwei Jahren Schmerzen an Händen und Füßen. Frühjahr 1885 bei Kälteeinwirkung Füße und Unterarmenkel rot; deswegen warmes Bad. Nach diesem Eintreten eines großen dunklen Fleckes an jedem Oberarm an der Außenseite oberhalb des Ellbogens. Einige Monate später mehrere Anfälle von Asphyxie locale, an der auch die Ohren mehrmals beteiligt waren. Um dieselbe Zeit treten die ersten Anfälle von Hämaturie auf, die mither mit der Asphyxie locale immer alternierten. In einem Anfall ein halbes Jahr später traten im Anschluß an eine intensive, beide Füße bis zu den Knöcheln und beide Hände umfassende Asphyxie am linken Fuß zwei oberflächliche gangränöse Stellen auf. In einem späteren Anfall wieder entsprechende fleckige Cyanose an der Extensorseite des linken Unterarms; später eine solche an der Innenseite des Unterschenkels.

Das ist gewiß ein typischer Raynaud, aber freilich kommt es hier in den die proximalen Teile der Extremitäten betreffenden Anfällen auch nur zu schwerer Asphyxie locale, nicht zur Gangrän; ebenso fand sich in einem Fall von Schäffer außer der Asphyxie der Lider eine Asphyxie am Rumpfe in Form einer handbreiten bläulichen Zone in der Höhe des unteren Schulterblattwinkels. Naunyn's Kranke zeigte zwei in der mittleren Axillarlilie verlaufende Bänder, die in Nabelhöhe durch eine Querleiste verbunden sind, die am Rücken unvollständig angedeutet ist. In einem Falle von Danlos bildete sich am dritten Tage einer intensiven Asphyxie eine kleine nekrotische Stelle unmittelbar über dem Handgelenk.

In den Fällen von Köster, Smith, Hutchinson, Renshaw, Didier, in denen es sich in der Tat um multiple, symmetrische Gangrän handelt, fehlen alle vorausgehenden vasomotorischen Symptome, die betreffenden Fälle scheinen mir der multiplen neuro-

tischen Hautgangrän anzugehören. Ähnlich steht es mit dem Fall von Schulz, der zudem noch im Verlauf eines Typhus abdominalis auftrat, in Fox' diesbezüglichem Fall bestand Diabetes, in Beaders (symmetrische Stellen beiderseits unter den Knien gangränös) fehlen vorausgehende vasomotorische Erscheinungen. Wir wollen in der Analyse dieser Fälle hier nicht weiter gehen, da wir uns sonst zu weit in das Kapitel der Diagnose der Raynaudschen Affektion einlassen, aus unseren Erörterungen wollen wir nur das uns nochmals vor Augen führen, daß die vasomotorischen Symptome der Asphyxie locale vereinzelt (so z. B. bei Rhum) und multipel (außer in dem erwähnten Fall von Tannenhill auch noch bei Féré, DeFrance, Monro, Osler) am Stamm und den proximalen Abschnitten der Extremitäten vorkommen, daß aber multiple gangränöse Stellen in solchen Fällen nur ganz ausnahmsweise beobachtet werden (Weiß, Lustig).

Neben der Gangrän finden sich im Verlauf der Raynaudschen Krankheit noch andere trophische Störungen: zu einem großen Teil gehören diese in das Gebiet der Sklerodermie und Sklerodactylie. In einer immer mehr anwachsenden, recht beträchtlichen Zahl von Fällen, die sonst durchaus das typische Gepräge der Raynaudschen Krankheit aufweisen, fanden sich an den Händen ausgesprochene sklerodermatische Veränderungen. Da wir aber auf die Beziehungen zwischen Raynaud und Sklerodermie im Laufe unserer Untersuchungen noch ausführlich zurückkommen müssen, wollen wir uns vorläufig mit der Feststellung dieser Tatsache begnügen.

Hinter den gangränösen und sklerotischen Veränderungen treten anderweitige trophische Störungen zurück.

Raynaud beschreibt in einem Fall (II, 3) mit oft wiederholten Anfällen von Asphyxie locale eine dauernde Vermehrung des Bindegewebes in der Vola manus, an anderer Stelle hebt er hervor, daß die einzige Veränderung der Ernährung der von Asphyxie befallenen Gewebe in einer übermäßigen Zunahme des Fettgewebes besteht, diese führt zu einer abnormen Weichheit, zu einer Art Pseudödem. Diese eigentümliche Auflockerung des Gewebes, der diesem einen samtartigen Charakter verleiht, ist vielfach zu beobachten, insbesondere auch in den Fällen chronischer Asphyxie, über die später gesprochen werden soll. Hochenggg erwähnt trophische Veränderungen, die er als unmittelbare Folgen von immer an derselben Stelle lokalisierten Anfällen von Asphyxie locale auffaßt. „Die Finger und Zehen erhalten in solchen Fällen eine eigentümlich zugespitzte konische Gestalt; in anderen werden sie mehr plump. Während die erste Erscheinung auf einen durch die häufige Circulationsstörung bedingten mangelhaften Ernährungszustand dieser Teile und eine dadurch bedingte Atrophie des Unterhautzellgewebes zurückgeführt werden muß, ist das Plumper-

werden auf die nach Schwanden der Circulationsstörung sich einstellende Lähmung der früher kontrahiert gewesenen arteriellen Gefäße zurückzuführen und als Hypertrophie des Zellgewebes zu deuten." Es ist nicht zweifelhaft, daß der hier gegebenen Schilderung Hocheneggs zum Teil Veränderungen zugrunde liegen, die den sklerodermatischen außerordentlich ähneln. Ebenso steht es mit den von Fox berichteten Veränderungen: alle Finger eiskalt, leicht bläulich, spindelförmig, Haut durchscheinend, Nägel mannigfach deformiert, Knochen atrophisch. Fox selbst ist allerdings mit der Diagnose Sklerodactylie, die er sehr wohl in Erwägung zieht, nicht einverstanden, doch werden wir ihm da widersprechen müssen. Anderson schildert in einem Fall von sehr häufig wiederkehrender localer Cyanose (ohne locale Synkope) ein Aussehen der Finger, als ob sie aufgeblasen wären, dabei ist die Fingerhaut verdickt.

Monro bemerkt, daß es bei langdauernder Asphyxie zu Exsudation und Schwellung der Sehenscheiden kommen kann, die bestehen bleiben kann und gelegentlich wohl zur Entstehung von Kontrakturen führt.

Hochenegg machte die Beobachtung, daß hier und da Rupturen aus den überfüllten und durch die Stase in ihrer Ernährung geschädigten Gefäßen eintreten, so daß häufig nach Ablauf der lokalen Asphyxie kleine oder größere Ecchymosen vorhanden sind. In manchen Fällen sollen sich solche Blutungen ins Gewebe nach jedem Asphyxieanfall einstellen, und dann noch lange nach Ablauf der Cyanose vorhanden sein, um unter den gewöhnlichen Farbenveränderungen allmählich resorbiert zu werden. Ich finde nicht, daß sonst solche Blutungen in nennenswerter Zahl beschrieben wurden, doch haben mehrere meiner Kranken über ähnliche Vorkommnisse berichtet; so erzählte ein Patient, daß wenn er die im Stadium der Asphyxie oder Synkope befindlichen Hände in kaltes Wasser steckt, Bluthäsen entstanden. Criegern sah in einem Fall von Raynaud'scher Erkrankung in Kombination mit Nephritis chronica und entsprechenden Herzveränderungen eine Hautblutung von der Anschauung einer Herpes zoster; hier bestand allerdings auch sonst eine hämorrhagische Diathese, Menorrhagien, Nasen-, Nierenbluten, aber die Anordnung der Blutung entsprechend der Ausbreitung eines Herpes zoster ist sehr bemerkenswert.

Sehr wichtig ist eine weitere trophische Veränderung, die einige Male erwähnt wird, das ist ein allmähliches Größerwerden der Hände und Füße. Eine gewisse geringfügige Vergrößerung, die im wesentlichen auf der oben erwähnten, bei häufig wiederholten Asphyxieanfällen oder bei der chronischen Asphyxie oft beobachteten Auflockerung der Haut beruht, ist sehr häufig. Stärkere Grade kommen viel seltener zur Beobachtung (Rolleston, Diehl, eigene Beobachtung). Die Abhängigkeit der Vergrößerung von der Asphyxie kann dadurch be-

sonders deutlich werden, daß mit dem Verschwinden der vasomotorischen Störungen auch die Vergrößerung verschwindet. Über eine Vergrößerung der Nase berichten Aka et Lafan. Die Nase war in diesem Fall auch der Sitz der übrigen vasomotorischen Störungen. Es ist dies Symptom deswegen beachtenswert, weil es zu Schwierigkeiten in der Differentialdiagnose zwischen Akromegalie und Raynaudscher Krankheit führen kann.

In Weiß' Fall wucherte die Epidermis in der Hohlhand und an den Fingern zu harten, trocknen, in großen Fetzen abziehbaren Schwarten. In zwei Fällen eigener Beobachtung bildete sich eine Verdickung der Palmarfascie aus; es mag sich da wohl um in den tieferen Partien einsetzende sklerodermatische Veränderungen gehandelt haben.

In einer ganzen Reihe von Fällen wurden mannigfache Veränderungen in dem Ernährungsstand der Nägel gefunden.

Weiß schildert folgende Veränderungen: Die Nägel aller Finger waren schmutziggelblich gefärbt, bucklig aufgetrieben und von Längsrissen durchfurcht; an den beiden Daumen war die Lunula quer gefurcht und das dahinter liegende Nagelstück mattweiß, von perlmuttartigem Glanze. Colman und Taylor erwähnen eine besonders auffallende Brüchigkeit der Nägel. Delamare wendete seine Aufmerksamkeit in drei Fällen von Raynaud besonders den Nagelveränderungen zu; im ersten fand er am rechten Mittelfinger, der allein eine gangränöse Stelle gezeigt hatte, folgendes: „l'ongle est cassé, son bord libre est grenu, grisâtre, adhérent au derme sous-unguéal“. In einem zweiten Fall waren alle Nägel mit Ausnahme der des Daumens abnorm — es hatten auch an allen diesen Fingern gangränöse Plaques bestanden. Die Nägel sind verdickt, längsgerieft, von vorn nach hinten gebogen, mit der Tendenz in das Fleisch einzuwachsen. Sie sehen zum Teil wie schlecht gepflegte Zehennägel aus. Ähnliche Veränderungen wurden weiter beschrieben von Colman, Humphrey, Legroux, Lühr, Mongour, Simpson; letzterer bezeichnet sie als auffällig fest, hypertrophisch und empfindlich beim Schneiden. Die Nagelveränderung ist zweifellos ein sehr häufiges Symptom. Wo die trophischen Störungen die Nagelmatrix ergreifen, müssen sich naturgemäß Veränderungen der Nägel einstellen. In einem Fall, den Heller mitteilt — er rechnet ihn offenbar irrtümlich zur Morvaseschen Krankheit — sind die Nagelveränderungen, wie wir selbst sie öfter gesehen haben, sehr anschaulich geschildert. Bei der Gangränesezierung bildeten die Nägel eine „dicke, schwarze, steinharte Masse, die auf der letzten Phalanx wie eine Kappe aufsaß.“ Während sich diese Kappe bekerte, wuchs der Nagel unförmlich nach vorn, so daß er wie eine Vogelkrallen aussah. Diese klauenartigen Verunstaltungen der Nägel habe ich oft gesehen (s. auch die Abbildungen). Sie sind dann nicht nur von vorn nach hinten, sondern auch von rechts nach links über-

mäßig stark gewölbt, verdickt, verhärtet, dabei spröde, so daß sie immer wieder am freien Rand abbrechen; häufig ist eine Längsriefung sehr ausgesprochen. Wiederholt beobachtete ich, daß das Eponyehium, das Nageloberhäutchen nicht in der gewöhnlichen Weise vom Nagel abzuziehen und zurückzuschieben war; es schien dann verdickt und vielleicht auch etwas mit der Unterlage verwachsen zu sein.

Schließlich wollen wir noch das im Lauf der Raynaudschen Krankheit mehrfach beobachtete Auftreten von Panaritien erwähnen (Castellino und Cardi, Calman, Leloir et Merklen, Mansbach, Mills, Vulpian, Cohn, eigene Beobachtung). Calman hat sie in dreien seiner Fälle beobachten können, sie sind schmerzhaft und gehören nach Calman zum Bild der Raynaudschen Affektion, man habe sie vor dem nicht beachtet; sie entstanden durch Infektion von außen her, würden durch die Anästhesie der betreffenden Teile während der Anfälle und auch durch die verminderte Widerstandskraft der Gewebe, welche unter ungünstigen Ernährungsverhältnissen stehen, begünstigt. In zweien seiner Fälle bestanden neben den Panaritien sklerodermatische Veränderungen an den Fingern, im dritten, einem auch sonst typischen Fall von Raynaud nicht. In einem Fall von Castellino und Cardi lag ebenfalls Sklerodactylie vor. In einem schwer zu klassifizierenden Fall von Leloir et Merklen, in dem neben Sympkope lokale ein Ekzem in der Volarfläche der Hand und der Finger bestand, waren die Finger beider Hände geschwellen, rot, in einem Zustand von leichter Elephantiasis, und es bestand daneben ein Panaritium perungueale.

Ausführlicher sei Mills Fall mitgeteilt, der schon vor langem publiziert, große Ähnlichkeit mit der erwähnten Beobachtung von Calman zeigt. Der Autor selbst hat ihn nicht unter der Diagnose Raynaudsche Krankheit veröffentlicht, sondern als „vasomotor and trophic affection of the fingers“, er gehört aber unzweifelhaft zu unserer Affektion.

Frau, litt seit 15 Jahren an Schweißhänden. Dann lag sie an über kalte Hände und Füße zu klagen. Plötzlich eines Tages wurden die linken fünf Finger kalt, weiß, taub; allmähliche Zunahme dieser Störung, bis alle Finger ergriffen waren. Dann kam es zu einer multiplen Abschwellung an den Fingern. Die Farbe der Finger wechselte von blau zu bläulichweiß und totweiß. Der Nagel des kranken Fingers baldernach atrophisch. Einmal nach einem Typhus Zosterparotitis blauschwarz (s. v.). Kälte und Ausbleich waren verschlechternd. Zweimal trübte Dürbe auf der Hand, bei kaltem Wetter schman mit der cyanotischen Umgebung karminierend.

Ich selbst habe in den letzten Jahren eine Reihe dergartiger Fälle beobachtet. Es handelt sich meist um wenig umfangreiche Panaritien, mit geringer Eiterproduktion, die zum Teil äußerst schmerzhaft waren, und nur sehr langsam mit Hinterlassung kleiner Narben heilten. Sie saßen mehrfach vorzugewiese geringueal und gingen dann oft mit Nagelveränderungen einher. Es ist gar nicht immer leicht, nach den An-

gaben der Kranken eine Entscheidung darüber zu treffen, ob es sich um Bildung kleiner Nekrosen oder um Panaritien handelt. Tatsächlich gehen diese Vorgänge gelegentlich auch ganz unmerklich ineinander über. In einem meiner Fälle etablierten sich auch schmerzhafte schwer heilende Geschwüre an den Heles. Jedenfalls kommen also in der Tat multiple schmerzhafte Panaritien und Abszesse im Laufe einer Raynaudschen, sonst unkomplizierten Erkrankung vor und zwar an den Teilen, die auch sonst die ausgeprägtesten Veränderungen zeigen; etwas häufiger noch treten sie da auf, wo neben anderen tropischen Störungen sklerodermatische Veränderungen vorliegen. Es ist sehr wichtig, sich dieses Umstandes zu erinnern, da ja bekanntlich multiple Panaritien, die allerdings meist, wenn auch nicht immer, schmerzlos verlaufen, ein sehr oft gesehenes und wichtiges Symptom bei gewissen Rückenmarksaaffektionen (Syringomyelie, Morvansche Krankheit) darstellen. Die Fälle von Mills und Calman sind genau genug geschildert, um eine solche Affektion ausschließen zu können; dagegen bedarf es in dem einen Fall von Castellino und Cardi sorgfältiger diagnostischer Erwägungen, um zu entscheiden, ob Raynaudsche Krankheit mit Sklerodactylie plus Morvansche Erkrankung oder nur die erstere Affektion vorliegt, und wir werden später sehen, daß die Autoren selbst zu keinem sicheren Ergebnis gelangten. Auch in Mansbachs Fall erscheint mir die Diagnose unsicher oder sogar zugunsten einer Gliosis zu entscheiden, während in meinen eigenen Fällen das Fehlen aller motorischen Störungen, aller Anästhesien und aller sonstigen spinalen Symptome eine Gliosis ausschließen ließ. Ich habe auch einige der Fälle viele Jahre lang beobachtet, und mich überzeugen können, daß nicht etwa späterhin eines der Symptome eintrat, das zu einer Änderung der Diagnose hätte Anlaß geben können.

Die Untersuchung mit Röntgenstrahlen hat uns weitgehende Aufklärung über das Verhalten der tieferen Teile, insbesondere der Knochen, gebracht. Wir selbst (Oppenheim und ich) haben alsbald, nachdem man den Wert der Röntgenstrahlen für die Untersuchung der Knochen erkannt hatte, in unseren Fällen von Raynaudscher Krankheit und von Sklerodermie Untersuchungen angestellt und darüber auf dem ersten Ärztekongreß für Radiologie berichtet. Fürnrohr hat diese Berichte in seinem Buch „die Röntgenstrahlen im Dienste der Neurologie“ erweitert und fortgesetzt. Auch von anderer Seite sind zahlreiche Untersuchungen unternommen worden. Ich nenne diejenigen von Lippmann, Beck, Lustig, Albers-Schönberg, Fox, Phelps, Neubert u. a. Das erste, was bei diesen Untersuchungen auffiel, war die starke Atrophie der distalen Partien der Phalangen. So berichtet Levy-Dorn von dem Röntgenbild der linken Hand der Patientin, die Lippmann vorstellte und die auch ich gesehen habe, daß sämtliche Knochen der ersten

Phalanx einer Atrophie anheimgefallen sind (vgl. dazu die Abbildungen auf Tafel X und XI). Die erste Phalanx des Zeigefingers ist zum größten Teil verschwunden, weniger ausgesprochen ist diese Atrophie an den übrigen Fingern. Er fügt gleich hinzu, daß auch die Mittelphalangen anscheinend an der Atrophie beteiligt sind, sie scheinen etwas verkürzt. Neben den atrophischen wurden alsbald auch geringere Proliferationsprozesse beobachtet. Wichtig sind die Untersuchungen, die später dann Arning in einem schweren Fall von Raynaud durch Albers-Schönberg anstellen ließ. Die Handwurzelknochen erschienen intakt, doch fand sich schon am Os lunatum anscheinend eine leichte Strukturverdichtung, am Metacarpus I besteht eine leichte Auflockerung der Struktur des Knochens und feine Auflagerungen an der radialen Seite des letzteren. Metacarpus II—V sind an ihrem distalen Ende aufgelockert und es finden sich geringe Grade von periostalen Auflagerungen an der Basis, besonders deutlich eine kallenwandförmige Auflagerung von verknöchertem oder verkalktem Gewebe an der Basis des V. Metacarpus. Von den Grundphalangen ist von der 4. und 5. nur noch ein Rest sichtbar. Es sind sehr durchsichtige Teile, deren Knochenstruktur gar nicht mehr sicher nachweisbar ist. Dabei machen die Mittelstücke der Phalangen einen etwas massiveren Eindruck als die proximalen Endstücke. An der Grundphalanx des ersten Fingers finden sich ebenfalls knöcherne Auflagerungen. Die Mehrzahl der übrigen Phalangen fehlt vollkommen.

Von Bedeutung sind dann besonders die Untersuchungen von Phelps. Eine Röntgenaufnahme der Hand, aufgenommen zur Zeit, als sich der letzte und zugleich schwerste Schub der Krankheit entwickelte, etwa sechs Wochen nach Beginn der Erkrankung zeigte nur eine sehr geringe Aufhellung im Knochengewebe der Endphalanx sowie an den distalen Enden der zweiten Phalanx. Die Lucken in der Substantia spongiosa erscheinen etwas größer, die Corticallis etwas zarter. Die Veränderungen waren verhältnismäßig wenig ausgesprochen, so daß man sie nicht mit absoluter Sicherheit für krankhaft halten konnte. Der spätere Verlauf der Erkrankung und vor allem eine spätere Röntgenaufnahme zu einer Zeit, wo die Heilung der Haut schon eine fast vollkommene war, brachte den deutlichsten Nachweis einer ausgesprochenen Knochenatrophie. Die Spongiosamassen in dem erwähnten Gebiete waren wesentlich weiter geworden, die Corticallis hatte sich beträchtlich verschmälert und an den Fingern, wo der Prozeß auch an den Weichteilen schwere Veränderungen gesetzt hatte, war eine vollkommene Resorption an den Spitzen der Endglieder eingetreten. So sieht man daß am Zeigefinger die Endanschwellung des letzten Phalangealgliedes vollkommen verschwunden ist, am Mittelfinger zeigt sie eine unregelmäßige, zackig gebuchtete Kontur, am kleinen Finger ist sie in toto, namentlich aber an der Spitze

rechte, verschmälert und verkürzt. Der Gelenkraum für die Zwischenfingergelecke ist an mehreren Stellen scheinbar verschwunden. Zwei Monate später wurde nochmals eine Röntgenaufnahme derjenigen Finger gemacht, welche bei der letzten Untersuchung die schwersten Veränderungen gezeigt hatten; es erwies sich, daß sowohl an den Knochen als auch an den Gelenken eine deutliche Besserung stattgefunden hatte; die Corticalis, welche früher, namentlich an den Endgliedern bis auf eine kaum nachweisbare Lamelle geschwunden war, zeigte nun ganz erhebliche Dickenzunahme und zwar in ganz normaler morphologischer Ausbildung. Auch die Spongiosahäuten waren kräftiger und massiver, ihr Maschenwerk von annähernd normaler Dichtigkeit. Auch die Gelenkspalten und Knorpelknochengrenzen an den distalen Gliedern kamen wieder deutlich zum Ausdruck. An den verstümmelten Endphalangen des zweiten und fünften Fingers rundete sich das äußerste Ende, welches bei der vorigen Aufnahme ein unregelmäßiges, zackiges Aussehen zeigte durch Anbildung einer neuen Corticalis. Phlépé betont, daß es sich nach seinen Befunden in seinem Fall unzweifelhaft um die chronische Form der Knochenatrophie handelt, ferner, daß es sich nicht um sekundäre Entzündungserscheinungen handeln könne, weil der Beginn der Knochenatrophie schon zu einer Zeit nachweisbar war, wo noch relativ wenig entzündliche Veränderungen bestanden. Im ganzen ist Phlépé geneigt anzunehmen, daß die Veränderung der Knochen gleichzeitig mit den Veränderungen an den Weichteilen beginne.

Auch ich konnte an meinen Fällen die weite Ausdehnung der Knochenveränderungen wiederholt recht prägnant nachweisen (vgl. dazu die Abbildungen auf Tafel XII—XIV). Sehr deutlich sind stets an den Endphalangen die atrophisierenden Prozesse, bei denen es gelegentlich auch zu kleinen proliferativen Prozessen kommt, wie das auch schon erwähnt wurde. Teile dieser Endphalangen verschwinden ganz und zwar auch an Stellen, wo es sich nicht um schwere trophische Störungen an der Haut und dem Bindegewebe, nicht um Parastien oder Gangrän gehandelt hat. Darüber hinaus aber sieht man in den Mittel- und Grundphalangen zum Teil auch in den Metacarpal Veränderungen, die dadurch charakterisiert sind, daß die Corticalis sich allmählich immer mehr verschmälert, ihre Grenze unscharf wird und die Spongiosamaschen sich erweitern. Durch die allgemeine Aufhellung des Knochenschattens tritt das Strukturbild des Knochens bei dieser Form der Atrophie schärfer hervor. Die Spongiosahäutchen werden dünner, ihr Schatten auf der Platte „wie mit einem zugespitzten, harten Bleistift“ gezeichnet. Das ist auch in meinen Fällen der häufigste und am meisten charakteristische Befund. Auch leichte proliferierende Prozesse kommen wie erwähnt gelegentlich zu Gesicht: so sah ich in einem Fall (Abbildung auf Tafel XII) kleine stalaktitenförmige

Auflagerungen an der Spitze der Endphalanx des dritten Fingers an einer Stelle, wo in der Haut schwere trophische Veränderungen gesessen haben. In einem meiner Fälle fand ich (Abbildung auf Tafel XIII) an dem distalen Ende der Grundphalanx des fünften Fingers eine scharf umschriebene atrophische Stelle, wie man sie nach einem Ausspruch von Levy-Dorn besonders bei rheumatischen Knorpelerkrankungen findet. Bemerkenswerterweise hatte nun dieser Patient früher auch am Gichtanfallen gelitten. Daneben zeigt das Röntgenbild weiter die charakteristischen Veränderungen der Raynaud-Kranken, die atrophischen Zustände an den Endphalangen mit partiellem Verlust der Endphalangen und die chronisch-atrophischen Veränderungen in den Mittel- und Grundphalangen zum Teil auch noch in den Metacarp, bestehend in der Verdünnung der Corticalis sowie der Spongiosabälkchen und der daraus resultierenden eigentümlich scharfen Zeichnung des Knochens. Abweichende, nicht rein atrophische Prozesse zeigt auch das Röntgenbild eines sehr typischen Falles von Raynaudscher Erkrankung, und zwar sehen wir hier an der Endphalanx des zweiten Fingers Veränderungen, die auf eine eigentümliche Ablagerung von knöchernem Detritus hindeuten und die sich im Röntgenbilde als eine scharfe, helle, wohl abgegrenzte schmale Linie darstellt. (Abbildung auf Tafel XIV.)

Es handelt sich hier um eine 42jährige Frau, die vor einem Jahr kaltes Gefühl, Schmerzen, Kneistufen und Absterben des zweiten und dritten rechten Fingers bekam, die Schmerzen wurden außerordentlich heftig, kamen in der Kälte besonders aber auch bei allen Beschäftigungen, besonders heftig beim Waschen. Im Sommer darauf hatte sie fast gar keine Beschwerden, während es im Winter des vorigen Jahres zum Verlust des Nagels des rechten dritten Fingers und zu heftigen Geschwülsten an den Fingerspitzen gekommen war. Die Geschwüre waren damals nachgeheilt. Seit einigen Wochen sind nun erneut starke Beschwerden aufgetreten. Die Pat. hat früher viel an linksseitigen Kopfschmerzen mit Nausea gelitten, der Vater leidet an Asthma, die Pat. selbst hat früher auch asthmatische Anfälle gehabt. Wesentliche allgemeine nervöse Beschwerden bestehen nicht. Die Haut und das Unterhautgewebe beider Arme ist etwas gedünnt und trock. Die Färbung ist fleckig, cyanotisch marmoriert. Die Haut der Hand und der Finger rechts ist geschwollen, der Zeigefinger ist heiß und glänzt. Mittel- und Endphalanx des rechten zweiten Fingers nach dem Teil distal tödlich in anderen Monaten wieder blau mit einzelnen blutigen verfarbten Flecken. Ähnliche Stellen finden sich auch am Nagelfeld des dritten rechten Fingers und an den Kuppen dieser beiden Finger der linken Hand. Am zweiten Finger besteht ein Verlust der Haut in etwa Pfennigstückgröße. Diese Stelle ist ganz außerordentlich empfindlich (vgl. die Abbildung). Es läßt sich eine lokale Hypästhesie und Hyperalgie für Pinus an allen Fingern der rechten Hand nachweisen, dagegen keine Temperaturerniedrigung. Der Fuß ist in den beiden Ballen zu fühlen und ohne Differenz. Die Gelenkhaut ist ganz normal. Die Sensibilität und Motilität an oberen und unteren Extremitäten normal. Wenn die Hände in die Wärme kommen, so bewegen sie so, als ob die Knochen in Flammen stünde, wie die Pat. sagt. Nach Anlegung der Beckenkompressionsbinde zum Zweck der Blutdrucksenkung kommt es zu einer tiefen Cyanose des ganzen dritten rechten Fingers. In der chirurgischen Klinik

wird die Pat. nach Nücke (s. unten) behandelt. Die Schmerzen in den beiden besonders erkrankten Fingern, namentlich in dem zweiten, haben bald nach der Operation nachgelassen, es trat eine allmähliche Heilung innerhalb 14 Tagen nach der Operation ein. Einige Monate später im März 1911 hatte Pat. besonders über Schmerzen



Fig. 2.

Gangränöses Geschwür an der Spitze des Zeigefingers.

in der linken Hand zu klagen, bei der auch häufig Anfälle von Cyanose und auch Anfälle von Synkope sich bemerkbar machten. Die Untersuchungen mit dem Gärtnerschen Tausimeter ergaben sehr tiefe Werte in den Fingern beider Hände, z. B. rechter dritter Finger 20, linker dritter Finger 60, linker zweiter Finger 40, rechter vierter Finger 50 mm Quecksilber. Die plethysmographischen Untersuchungen, über die später berichtet werden wird, ergaben erhebliche Abweichungen von der Norm.

Wie Phlepos betont, ist es sehr wichtig zu wissen, daß die Veränderungen, die man an den Knochen findet, im weiteren Verlauf der Erkrankung sich mehr oder minder vollkommen zurückbilden können. Zusammenfassend kann man sagen: die Veränderungen, die die Röntgenuntersuchungen an den Knochen erkennen läßt, können sehr frühzeitig einsetzen, wahrscheinlich zugleich mit dem Auftreten der übrigen trophischen Veränderungen, sie beschränken sich keineswegs auf die distalen Abschnitte der betreffenden Partien, also etwa auf die Endphalangen, sondern sind in viel größerer Ausdehnung nachweisbar, selbst bis zum Handgelenk hin. Sie bestehen im wesentlichen in atrophischen Prozessen, die zu einer Verdünnung der Corticalis, zur Erweiterung der Zwischenräume und zu einer schärferen Zeichnung der

Spongiosa führen; neben den atrophischen Prozessen kommen, wenn auch in viel geringerer Ausdehnung, auch hypertrophische Prozesse vor; die Veränderungen sind der Rückbildung fähig.

Neben den vasomotorischen und den trophischen Symptomen stellen die sensiblen die dritte wichtige Symptomenreihe im Bild der Raynaud'schen Affektion dar. Wir sind im Laufe unserer Darstellung schon vorübergehend auf diese Symptome eingegangen, wollen aber im folgenden noch einmal zusammenfassend über sie berichten.

Wir haben schon, daß die Synkope lokale mit sehr heftigen, mit geringeren, aber auch ganz ohne subjektive Sensibilitätsstörungen verlaufen kann. Diese Divergenz macht sich auch in allen übrigen Stadien der Krankheit geltend: in dem einen Fall von Asphyxie sind die befallenen Teile der Sitz der unerträglichsten, heftigsten Schmerzen, im anderen fehlen die Schmerzen, einmal entsteht die Gangrän fast schmerzlos, ein andermal ist sie der Anlaß zu den größten Qualen für den Kranken. Es ist auffällig, wie wenig diese doch gewiß nicht unwesentliche Differenz von den Autoren beachtet und gewürdigt wird.

Raynaud selbst räumt den Schmerzen eine große Rolle im Symptomenbild der Krankheit ein. Nach ihm ist der Schmerz schon bei der lokalen Asphyxie ein fast konstantes Symptom; er kann so stark sein, daß er den Kranken aufschreien läßt; es ist eine schmerzhaft Taubheit, gefolgt von Brennenden und schließenden, auf Druck zunehmenden Schmerzen. Während dieser Zeit besteht totale Hautanästhesie. In der reaktiven Periode kommt es zu Krämpfen und Stechen, als ob der Kranke in Brennesseln gegriffen hätte. Bei der Gangrän erreicht der Schmerz oft eine wahrhaft erschreckende Intensität. Er ist nicht auf die befallenen Teile beschränkt, sondern strahlt überall hin aus, es ist ein Reißen und Brennen, anfallsweise auftretend und meist mit Verstärkung der Cyanose zunehmend. „Ich habe sonst ruhige und geduldige Personen vor Schmerz heulen sehen, zusammengekauert in ihrem Bett sitzend, sieht man diese unglücklichen Geschöpfe ihre ganze Zeit damit verbringen, vergeblich eine Stellung zu suchen, in der sie Erleichterung finden oder abwechselnd den einen oder den anderen Teil zu reiben, indem sie dabei fortwährend stöhnen und von Zeit zu Zeit einen durchdringenden Schrei ausstoßen.“

Vergleichen wir mit dieser Schilderung, die uns die denkbar schwersten Schmerzanfälle in ergreifenden Worten vor Augen führt, das, was Hochenegg über diesen Punkt sagt: „Die lokale Asphyxie ist an und für sich für den Träger mit keinerlei Schmerzen verbunden, und wenn solche angegeben werden, so sind sie bedingt durch das zur lokalen Asphyxie führende Leiden. Das einzig unangenehme Gefühl, das wir dem

Zustand als solchem zuschreiben müssen, ist das Gefühl der Kälte und des Polzigseins, sowie hier und da ein leichtes Prickeln in den betroffenen Teilen“. Ähnlich steht es nach Hocheneggs Anschauungen mit den Schmerzen bei der Gangrän.

Weiß wiederum schildert die Schmerzen in ähnlicher Weise wie Raynaud: „Störungen der Sensibilität fehlen, wie von allen Autoren übereinstimmend angeführt wird, niemals bei dieser Neurose.“ Das näheren charakterisiert er die Schmerzen als diffus über die betreffenden Extremitäten verbreitet, nicht genau lokalisiert, aber hauptsächlich in den auch von den vasomotorischen und trophischen Symptomen affizierten Gebieten; sie sitzen in der Haut, aber auch in Muskeln, Knochen, Gelenken, sind von unerträglicher Intensität, brennend, „als ob die Extremitäten in einen Schraubstock gespannt oder mit Zangen gekneipt würden, oder als würden Stücke vom Leibe gerissen.“ Die Nerven waren im Fall von Weiß nicht druckempfindlich.

Wenn wir die bisher mitgeteilten Beobachtungen insgesamt berücksichtigen, so werden wir sagen müssen, daß unzweifelhaft in der Mehrzahl der Fälle von typischer Raynandscher Krankheit Schmerzen, und zwar meist von beträchtlicher Intensität, vorhanden sind, Schmerzen, die der Zeit ihres Auftretens nach und gemäß ihrem sonstigen Verhalten durchaus als integrierender Bestandteil der Krankheit anzusehen sind. Wir können hier nicht alle die Beobachtungen aufzählen, die dieser Behauptung als Grundlage dienen, weil wir sonst die Mehrzahl der Beobachtungen zitieren müssen. Die Schmerzen können von vornherein sehr hochgradig sein (Riva), sie sind nicht gerade selten überhaupt das erste Zeichen der Affektion (Barlow), sie können erst allmählich zu voller Höhe ansteigen und exazerbierend-remittierend der Kurve der vasomotorisch-trophischen Anfälle folgen, wobei sie im Moment des Eintritts der Gangrän ihren Höhepunkt erreichen, aber sie können auch umgekehrt anfangs sehr heftig, im Verlauf der Asphyxie lokale weniger intensiv werden, und der Eintritt der Gangrän erfolgt dann schmerzlos (Rhata). Sie können, wie schon Raynands und Weiß' Schilderungen zeigen, von unerträglicher, qualvollster Höhe sein. Castellino und Cardì beschreiben einen solchen Fall. Schubert, Sainton, Taylor, Phelps haben Ähnliches berichtet, einige meiner Patienten, die durchaus glaubwürdig waren, haben mir versichert, daß die Schmerzen zeitweilig zu unerträglicher Höhe anschwellen; eine Morphiuminjektion von 0,03 brachte in dem schwersten Fall dieser Art, den ich sah, keine Linderung. Aber sie sind andererseits in nicht wenigen Fällen nicht sehr intensiv. Ein Merkmal haben sie stets, von dem es keine Ausnahme gibt, sie sind immer mehr oder weniger diffus, schlecht begrenzt, nehmen bald ein größeres, bald ein kleineres Gebiet ein, sind aber niemals in die Bahn eines Nerven gebannt; auch bei Beschränkung der trophischen und vasomotorischen Störungen

auf die Finger können sich die Schmerzen weit ausdehnen und über den ganzen Arm sich erstrecken. Phlepe legt Wert auf die Angabe seines Patienten, daß die Schmerzen in den Knochen zu sitzen scheinen, doch wird das nicht immer betont. Ihrem Charakter nach sind sie meist brennend, stechend, reißend, oft blitzartig wie die Schmerzen bei Talcs, einige Male wurde über ein äußerst unangenehmes Kältegefühl geklagt. Die Kranken versuchen ihre schmerzenden Glieder vor Stoß und Erschütterung aufs sorgfältigste zu schützen; namentlich Stoß gegen die Fingerkappen pflegt besonders empfindlich zu sein. Phlepe betont die Druckschmerzhaftigkeit der Knochen auch in einem Gebiet, das über das der manifesten sensibel-trophischen Störungen hinausgeht. Eine Druckschmerzhaftigkeit der Nervenstämmen besteht gewöhnlich nicht.

Aber es können die Schmerzen auch im ganzen Verlauf der Krankheit fehlen oder nur ganz vorübergehend und bedeutungslos sein.

Raynaud selbst hat schon eine solche Beobachtung mitgeteilt, sie betrifft den ersten Fall seiner zweiten Arbeit. Hier trat die Asphyxie in den früheren Perioden der Krankheit so ohne jedes subjektive Symptom auf, daß der Patient, der am Morgen die dunkle Verfärbung seines kleinen Fingers sah, glaubte, daß diese zufällig entstanden sei, durch Berührung mit irgendeinem abfärbenden Gegenstand in seiner Hausrasche. Auch im weiteren Verlauf des typischen Falles traten spontan keine Schmerzen auf, und auch Parästhesien waren nicht vorhanden. Freilich war die Sensibilität für Berührung völlig aufgehoben, später war im Moment des Aufhörens des Anfalls ein mäßig schmerzhaftes Prickeln vorhanden. In einigen späteren Beobachtungen (Lutz, Santvoord, Targowla) fehlen ebenfalls Schmerzen fast völlig. Immerhin sind diese Fälle im ganzen recht selten, und fernerhin sind bei ihnen auch sonst meist gewisse Abweichungen von dem typischen Krankheitsbilde vorhanden.

Bei Targowla handelte es sich um eine intermittierende Asphyxie locale bei einem Melancholiker; das Stadium der Gangrän wurde nicht erreicht.

Interessanter sind die beiden Fälle von Lutz und von Santvoord. Bei beiden kam es zwar zur symmetrischen Gangrän, aber bei beiden waren die vasomotorischen Symptome nicht ganz entwickelt, ohne freilich völlig zu fehlen. Lutz' Fall ist auch wegen der außerordentlichen Symmetrie der Gangrän beachtenswert.

34-jähriger Mann, groß, kräftig, starker Biertrinker. Öfter Verdauungsstörungen und Kopfschmerzen. Im Mai 1883 an der rechten Hand besondres am Handrücken rote Flecken, die nach wieder verschwinden; die Haut an dieser Hand hat sich bald hier, bald dort in kleinen Schüppchen ab. Große Müdigkeit, Schlafsucht. Im weiteren Verlauf in mehreren über Monate auseinanderliegenden Anfällen Entwicklung gangränöser Flecken am Handrücken und Fingern (erste und zweite Phalanx) in absoluter Symmetrie.

Hier haben wir also von vorausgehenden vasomotorischen Symptomen nur einen rasch verschwindenden Rubor; der Fall von Santvoord ist durch das Fehlen eines Zwischengliedes zwischen Synkope brade und Gangrän ausgezeichnet.

Auch ein Fall von Legroux muß hier erwähnt werden, bei dem sich, nachdem früher schmerzhaftes Frostbeben bestanden hatten, schmerzlos und allmählich erst Cyanos, dann Ulcerationen entwickelt hatten; außerdem fanden sich an der Haut sklerodermatische Veränderungen. Man sieht auch hier die zahlreichen Abweichungen vom Typus: in der Diskussion, die der Krankenvorstellung folgte, wurde denn auch, besonders von Verchère, der an Morvancs Krankheit dachte, die Diagnose bezweifelt. Der Fall gehört einem Typus an, über den ich später noch sprechen will, und der von dem eigentlichen Raynaudschen jedenfalls abweicht.

Einzelne Stadien der Krankheit können dagegen häufiger und in sonst ganz typischen Fällen ohne Schmerzen verlaufen, und überhaupt ist die Verteilung der sensiblen Reizerscheinungen über die einzelnen Stadien der Krankheit eine sehr wechselnde. So waren in einem Fall Landrys, den Raynaud zitiert, die Schmerzen zur Zeit der Asphyxie am stärksten und verminderten sich mit dem Einsetzen der Synkope. In anderen Fällen kann der Schmerz mit der Synkope einsetzen und während der Asphyxie völlig fehlen. Monroe berichtet von einem Fall, bei dem in dem Moment, wo die Schmerzen einsetzen, die blaue Verfärbung blässer wurde. Im Fall Howens waren während der Synkope noch keine Schmerzen vorhanden, zu dieser Zeit bestanden höchstens unangenehme Empfindungen. Bei Leichtensterns Kranken fehlten die Schmerzen auch beim Beginn der Asphyxie noch vollständig, erst mit deren Ausbreitung kam es zu Kriebeln und Kältegefühl, dann allmählich zu heftigem Brennen und neuralgiformen Schmerzen. Die angeführten Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, daß die einzelnen Stadien der Krankheit nicht gar so selten ohne Schmerzen verlaufen, und daß sich in dieser Beziehung eine bestimmte Regel nicht aufstellen läßt. Am ehesten scheinen Schmerzen im Stadium der Asphyxie zu fehlen und besonders da, wo diese sich nicht ganz akut entwickelt. Ich habe jedenfalls einige Fälle gesehen, wo das Stadium der Asphyxie ohne Schmerzen verlief, während sowohl bei der Synkope wie bei der Gangrän der Schmerz heftig war. Ein Verlauf der ganzen Krankheit ohne jeden Schmerz ist sicher sehr selten.

Auch die objektiven Sensibilitätsstörungen sind wechselnd und mannigfaltig.

Eins ist aber auch ihnen allen gemeinsam: sie halten sich nicht an die Grenzen eines bestimmten peripheren Nerven.

Meist handelt es sich um An- oder Hypästhesien. In seltenen Fällen ist die Anästhesie eine sehr ausgesprochene. Raynaud beob-

achtete eine totale Lähmung der Empfindung, so daß der Gang ataktisch wurde: *L'anesthésie était telle qu'elle empêchait complètement la marche, le malade était incapable de dire, si ses pieds reposaient sur du marbre ou sur la planche.* Im Gegensatz dazu sind aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die objektiven Sensibilitätsstörungen nicht sehr ausgesprochen, dabei in den verschiedenen Fällen äußerst variabel. Es gibt eine ganze Reihe von Beobachtungen, in denen auch in den Anfällen die Empfindung ganz normal bleibt, ich habe selbst eine Anzahl solcher Fälle gesehen, ein andermal ist sie zwar in den anfallsfreien Zeiten intakt, während der Anfälle aber gestört. Im allgemeinen scheint nach den vorliegenden Beobachtungen die Abstumpfung der Sensibilität im Stadium der Synkope locale intensiver zu sein, als in dem der Asphyxie locale. Auch dieser Satz erheidet aber Ausnahmen. Was die einzelnen Gefühlsqualitäten angeht, so läßt sich darüber kaum etwas Allgemeines sagen, jeder Fall hat seine Besonderheiten. Da finden wir in Calmans erstem Fall z. B. während der Synkope die Haut der betroffenen Teile völlig gefühllos, während in der anfallsfreien Zeit keine Sensibilitätsstörung besteht, im vierten Fall ist die Sensibilität intakt, im fünften ebenfalls, bis auf eine geringe Herabsetzung der Temperaturempfindung an der Beugeseite der Finger, im sechsten Fall ist die taktile Sensibilität an den Fingerspitzen etwas abgestumpft, sonst ist alles normal. Genaue Sensibilitätsprüfungen hat Lühr vorgenommen. Bei starker Cyanose werden keine Pinäberührungen zuweilen nicht gefühlt, für Stiche besteht Hyperalgesie, eiskalte und heiße Gefäße werden als warm bezeichnet. Passive Lageveränderungen werden falsch angegeben; mit Abnahme der vasomotorischen Störungen schwanden diese Symptome schließlich überhaupt; ein andermal besteht umgekehrt wie hier eine Analgesie, während das Berührungsgefühl erhöht ist (Riva). Es kommt vor, daß nur die Tastempfindung alteriert ist, während alle übrigen Reize gut empfunden werden (Rosenbaum); ähnlich liegen die Dinge bei Rham: völliges Schwünden des Berührungsgefühls, bei starkem Druck unangenehme aber nicht schmerzhaft empfindung, Nadelstiche kaum schmerzhaft. Wie variabel die Resultate der Sensibilitätsuntersuchungen für die einzelnen Fälle sind, dafür mag eine kleine Anzahl eigener typischer Fälle, die ich nicht besonders ausgesucht habe sprechen.

I. Abstumpfung aller Qualitäten, besonders der Berührung an allen letzten Phalangen.

II. Leichte Abstumpfung der Empfindung für Berührung und Heiß und Kalt an beiden Händen in einem Fall, bei dem die Symptome vor sieben Jahren in einem Anfall sich ausgebildet hatten.

III. Abstumpfung nur des Berührungsgefühls an den zweiten und dritten Phalangen aller Finger mit Ausnahme des Daumens.

IV. Abstumpfung für alle Qualitäten an der ganzen Hand bis zum

Handgelenk, ziemlich scharf abstechend, keine Andeutung von radikulärer Verteilung.

V. Hypästhesie für alle Qualitäten an beiden Händen distalwärts zunehmend, besonders die Wärmeempfindung ist sehr beeinträchtigt. Nirgends geht die Störung über das Handgelenk hinaus, Fall IV und V sind die, die die schwerste Sensibilitätsstörung meiner Beobachtungsreihen zeigen. Die Fälle waren im übrigen mäßig, mit kleinen Nekrosierungen einhergehend.

VI. Nur Hypalgesie und Thermhypästhesie an der zweiten und dritten Phalange des zweiten und dritten Fingers. Der Fall ist viel schwerer als IV und V.

In der Mehrzahl meiner Fälle fand ich aber gar keine objektiven Sensibilitätsstörungen. Nicht gerade häufig wurde eine lokale oder allgemeine Überempfindlichkeit beobachtet, die z. B. im Fall Mouillots soweit ging, daß jede Bewegung der Hände unterbitten mußte, also eine *Akinesia algera* zustande kam.

Bemerkenswert sind die seltenen Fälle sehr ausgebreiteter und hochgradiger Anästhesien. Wir erwähnten oben schon einen derartigen von Raynaud mitgeteilten Fall. Noone sah bei seinem Patienten im Zustande der Cyanose einen hohen Grad von Hypalgesie der Finger. Sehr ausgebreitet war die Sensibilitätsstörung in einem sonst typischen Fall von Hastreiter. Hier bestand anfangs völlige Anästhesie bis 4 cm über dem Knöchel. Patient fühlte nicht, worauf er trat, diese verschwand ebenso wie die Cyanose nach zwei Tagen, um mit der Cyanose am dritten Tage wiederzukehren; die Anästhesie dehnte sich in einzelnen Anfällen noch weiter, bis 15 cm oberhalb des Knöchels aus. In einem Fall, den Schäffer mitteilt, war in den erkrankten Partien die Empfindung für Berührung ganz erloschen, die für Nadelstiche stark vermindert, da es sich aber um einen Traumatiker handelt, müssen diese Angaben mit Vorsicht verwertet werden.

Was die Verteilung der Sensibilitätsstörung anlangt, so habe ich schon hervorgehoben, daß sie niemals sich auf das Gebiet eines peripheren Nerven erstreckte. Aber auch einen radikulären Typus habe ich in meinen Fällen nicht feststellen können, und auch in der Literatur fand ich keine entsprechenden Angaben, was ich besonders in Rücksicht auf das früher bei den Akroparästhesien Besprochene bezeichne. Caffigaris fand einmal eine Sensibilitätsstörung mit schräger Abgrenzungslinie, die er als Ausfluß einer spinalen Lokalisation auffaßt.

Das Verhältnis der einzelnen Qualitäten zueinander entbehrt auch der Regelmäßigkeit; oft ist die Berührung stärker als die übrigen Qualitäten gestört, vielfach die Wärme- und Kälteempfindung stark beteiligt, doch meist mehr in der Form der Thermoparästhesien. Vereinzelt sind die Beobachtungen von dissociierter Empfindungsstörung vom Typus der bei der Syringomyelie vorkommenden, sie sah zuerst

Weiß in seinem Fall. Wir geben die Angaben von Weiß im folgenden ihrer Wichtigkeit wegen in extenso:

Im Verlauf der zweiten schweren Attacke kam es zu folgenden Störungen: Ein Handbad von 27–30° wurde als kaum bis bezeichnet, erst ein solches von 40° erzeugte ein angenehmes Wärmegefühl. Im Durchschnitt wurden Temperaturdifferenzen von 6–8° nicht erkannt. Knieen, Nadelstiche, starker Druck wurden an einzelnen Stellen schwach, an andern gar nicht empfunden; ebenso bestand starke Herabsetzung der faradischen Sensibilität. Dagegen blieben der Ostasim und das Taupgefühls während der ganzen Zeit intakt. Außerdem bestand eine Verlangsamung der Schmerzempfindungsleitung: Pat. empfand bei Nadelstichen zunächst sofort das Gefühl der Berührung, erst zwei bis drei Sekunden, nachdem die Nadel entfernt war, gab die Kranke eine geringe Schmerzempfindung an. Im weiteren Verlauf trat ein Rückgang der Störungen ein.

Ähnliches hat DeFrance in einem mit Sklerodaktylie verbundenen Fall beobachtet: starke Verminderung der Schmerzempfindung, taktile Empfindlichkeit besser erhalten, fast normal, sehr starke Störung der Wärmeempfindung, die schon seit langem bestand.

Eine Störung der Sensibilität, wie sie der Fall von Weiß in ausgeprägter und charakteristischer Form, etwas mehr verwaschen auch die Beobachtung von DeFrance bietet, ist natürlich in höchstem Maße beachtenswert, weil uns die bei Syringomyelie und Hämatomyelie gemachten Erfahrungen zu einer einigermaßen bestimmten Lokalisation einer derartigen Empfindungsstörung (in der grauen Substanz des Rückenmarks) berechtigen, insbesondere wenn wir die weiteren noch zu erwähnenden Begleiterscheinungen von seiten der Pupillen und Lidspalten im Fall Weiß, die gleichzeitig mit dieser Störung auftraten, in Betracht ziehen.

Aus den mitgeteilten Beobachtungen über objektive Sensibilitätsstörungen im Verlauf des Raynaud ist folgendes zu entnehmen. Sie fehlen oft ganz. Wo sie vorkommen, sind sie nicht immer dauernd vorhanden, schwanken im Laufe der Beobachtung, sind meist nicht sehr intensiv. Das Verhältnis der einzelnen Qualitäten zueinander ist ohne bestimmte Regel, eine syringomyelische Dissoziation stellt eine große Ausnahme dar. Auch für die Ausbreitung läßt sich eine bestimmte Regel nicht aufstellen; sie beschränken sich nicht auf das Gebiet eines bestimmten peripheren Nerven, halten sich auch nicht an die bekannten radikulären oder spinalen Territorien; sie breiten sich im Gebiet der vasomotorisch-trophischen Störungen, oder in einem Teil desselben aus, indem sie einzelne Phalangen oder die ganzen Finger oder die ganze Hand resp. den ganzen Fuß in Mitleidenschaft ziehen. Sie gehen mit der Schwere der sonstigen Erscheinungen nicht parallel, können jedenfalls auch in sehr schweren Fällen fehlen. Im ganzen spielen sie demnach eine untergeordnete und sekundäre Rolle. Doch wäre es ein Fehler, sie ganz zu vernachlässigen.

Ich möchte noch erwähnen, daß ich in einigen meiner Fälle eine ausgesprochene Druckschmerzhaftigkeit des Ganglion cervicale superius gefunden habe, bzw. daß Druck in die Gegend des Unterkieferwinkels sehr unangenehm empfunden wurde. Der Wert dieses Symptoms ist nicht hoch einzuschätzen, immerhin schien es mir nötig, es vorläufig zu registrieren.

An die Besprechung der sensiblen Symptome schließen wir das Wenige an, was wir über sekretorische Störungen wissen. Raynaud sah häufiges im Stadium der Synkope locale kalte Schweiß ausbrechen; auch Rham beobachtete in diesem Stadium eine übermäßige Schweißsekretion, während Vulpian dasselbe an den cyanotischen Stellen sah. Auch Mourou erwähnt das Vorkommen von Hyperhidrosis localis. In Phlepe's Fall bestand ein enormes Schwitzen der Hohlhand, so daß der Schweiß in Tropfen abfiel. Auch ich sah gelegentlich starkes Schwitzen der Hand. Einige Male (Castellino und Cardi, Calman) wurde von den Autoren ausdrücklich bemerkt, daß keine Anomalien der Schweißsekretion bestanden, die auch in vielen Fällen meiner eigenen Beobachtung normal war; sonst wird dieser Punkt überhaupt nicht erwähnt; Störungen von Belang haben dann jedenfalls nicht vorgelegen.

Hier fügt sich am besten ein Fall von Friedemann ein, der eine intermittierende Achylia gastrica beobachten konnte.

Eine 23jährige aus nervöser Familie stammende Frau war selbst bis vor 5 Jahren gesund; bald nach dem Auftreten einer hartnäckigen Malaria zeigten sich die ersten Symptome des jetzigen Leidens, Synkope und Asphyxie locale; allmählich traten typische Störungen vom Charakter der Sklerodermie auf; es kam zu einer ausgebreiteten Hypoästhesie fast am ganzen Körper und einer Veränderung der Berührung- und Tactempfindung. Bei stark ausgesprochenen Asphyxie tritt auch eine Kontraktion der Gefäße des Augenhintergrundes ein. Das auffallendste Symptom aber ist eine intermittierende, an den asphyktischen Tagen auftretende Achylia gastrica.

Die Art des Auftretens der Achylie läßt in diesem Falle keinen Zweifel aufkommen, daß es sich um eine zum Symptombild der Krankheit gehörende Erscheinung handelt. Da es sich aber, soweit man bisher sehen kann, um ein ganz isoliertes Vorkommnis handelt, kann man gewiß, trotzdem die Beziehungen zwischen Magensaftsekretion und Innervation seitens der sympathischen Systeme bekannt sind, daraus keine weitergehenden Schlüsse ziehen.

Über motorische Störungen ist sehr wenig zu sagen. Lähmungen bestimmter Muskeln oder Muskelgruppen gehören nicht zum Bilde der Krankheit und wurden auch niemals berichtet. Davon gibt es nur eine, aber höchst interessante Ausnahme, und zwar ist es wieder der Fall von Weiß. Gleichzeitig mit den oben geschilderten Sensibilitätsstörungen traten hier in dem zweiten schweren Anfall folgende Motilitätsstörungen auf: es machte sich eine allmählich sich

steigernde Funktionsstörung der *Musculi interossei* und der Muskeln am *Thenar* und *Hypothenar* geltend. Proportional der zunehmenden Funktionsstörung trat eine Abmagerung ein, so daß nach einiger Zeit die Daumen- und Kleinfingerballen sich abflachten und die Zwischenknochenräume eingesunken waren; gleichen Schritt damit ging eine Abnahme der Erregbarkeit gegen den faradischen und konstanten Strom. Nach ca. drei Monaten war die faradische Erregbarkeit völlig erloschen; schließlich verschwand auch die galvanische Erregbarkeit, ohne daß *Ea R* eintrat. Auffälligerweise war die indirekte faradische und galvanische Erregbarkeit bereits gestört, als die Willkürbewegungen und auch die direkte elektrische Erregbarkeit noch intakt waren. Die Störungen besserten sich mit der Beganzung der *Ganglia*, und nach ca. sechs Monaten vom Beginn der Störungen an waren sowohl für die elektrische Reizbarkeit als auch für die willkürliche Motilität wieder normale Verhältnisse eingetreten.

Defrance beschreibt in seinem ersten Fall ebenfalls eine Abflachung des *Thenars* und *Hypothenars*: „*Aspect rappelle l'atrophie musculaire du type Aran-Duchenne, au début*“; doch fehlt eine genaue Funktionsprüfung ebenso wie eine elektrische Untersuchung, so daß wir von einer weiteren Verwertung dieses Befundes absehen müssen.

Englisch sah in seinem ersten Fall eine Abmagerung des Fußes und der kleinen Beuger und Strecker, die auf elektrische Reize nicht reagierten, dagegen reagierten die langen Beuger und Strecker normal; im zweiten war die elektromuskuläre Erregbarkeit der *Interossei* ziemlich gleichmäßig herabgesetzt, die Muskeln am Vorderarm, namentlich die Strecker reagierten auch schwächer als normal.

Eine leichte Atrophie des *M. interos. primus* der linken Hand mit Herabsetzung der faradischen Erregbarkeit bei normaler galvanischer beschrieb Goodhart.

Die folgende eigene Beobachtung zeigt ebenfalls eine bemerkenswerte Muskelatrophie.

Die jetzt (1896) 64jährige Frau macht folgende anamnestischen Angaben: In den 80er Jahren habe sie einmal einen heftigen Gelenkheumatismus durchgemacht, an sie unter Salicylbehandlung völlig gewunden. In ihrem 48. Lebensjahr, nach Eintritt des Klimakteriums, seien zum erstenmal Anfälle aufgetreten, die sie wie folgt schildert. Es machte sich in beiden Händen zunächst ein sehr starkes Kältegefühl bemerklich, so stark, daß sie metallische Gegenstände, z. B. Türklinken nur anfassen konnte, wenn sie sich die Hände mit Tüchern umwickelt hatte. Auf das Stadium anorgasmischer Kälteempfindung folgte nach der Stillierung eine ausgesprochene Synkope locale, die Hände, insbesondere die Finger wurden gelblich-weiß, und es trat zugleich ein schmerzhaftes taubes Gefühl in diesen Teilen ein. Unter sehr erheblicher Zunahme der Schmerzen, die spontan, aber namentlich bei jeder auch noch so leinen Berührung sich einstellen, trat dann an die Stelle der Weißfärbung der Hände ein deutlich dunkler Farbenton, so daß die Hände abendlich braunlich-schwarz wurden. Die Handrücken waren weniger stark verfarbt. Auch während des Stadiums der *Asphyxie locale* bestand ausgesprochenes Taub-

belegte sich an den erkrankten Teilen, so daß sie Bekleidungen und Nadeln etc., wie sie bestimmt angibt, nur unendlich langsam. Nachdem dieser Zustand einige Monate gedauert hatte, trat wieder ein Farbenwechsel ein, die Hände wurden nun rot, dabei brennend heiß, aber der eigentliche Schmerz ließ nun nach. Derartige Anfälle kamen fast täglich, der Kontakt kalter Außentemperatur usw. war nicht besonders deutlich. Normal kam es dabei zu Ödemen oder Geschwulstbildung. Allmählich sind diese Anfälle dann seltener und immer seltener geworden, nach Verlauf eines Decenniums hörten die Verletzungen ganz auf, und es traten nur noch gelegentlich Parästhesien ein, die in einem Gefühl bestanden, als ob die Fingerspitzen nach und verbrannt wären, oder als ob sie mit Waife ausgepoliert seien. Das Gefühl ist allmählich ein fast dauerndes geworden, das nur gelegentlich noch Exacerbationen erfährt. Es ist so stark, daß sie feinere Arbeiten — Putz im Nähen — nicht mehr machen kann, meist war es nur an der rechten Hand ausgesprochen, jetzt ist es auch an der linken vorhanden, während die vorerwähnten Anfälle von vornherein beiderseitig gleich stark entwickelt waren. Schmerzen hat sie dabei nicht, auch kein abnormes Kältegefühl. Seit dem Jahre 1890, also etwa seit dem Ende der Periode der vasomotorischen Anfälle, hat sich ganz allmählich und unbemerkt eine Abmagerung der Muskulatur beider Hände ausgebildet, die gleichmäßig geschäht werden soll. Die Kranke ist im allgemeinen etwas nervös, leicht aufgeregter, schreckhaft, ängstlich; gelegentlich leidet sie an leichten Schwindelgefühlen. In der Jugend hat sie, das ist auch bemerkenswert, viel an Frost der Hände gelitten. — Die Farbe der Hände ist zurzeit dauernd eine eigentümlich braun-violette, dabei diffus und distal zu den Fingerspitzen hin an Intensität zunehmend. Die letzten Fingerglieder sind etwas kalzig angeschwollen, ohne daß man jedoch von einem mehr pathologischen Zustand reden darf. Salzsäurevolante bestanden nirgends, die Nägel sind ohne Besonderheiten. Die Haut an allgemein verändert, spröde nicht verlickt oder verdickt, oder mit der Unterlage verwachsen. Starke Mundtrockenheit, sowie die Muskeln der Zehen und besonders des Daumenballens sind deutlich atrophisch, an beiden Händen in ungefähr gleichem Maße, dabei besteht aber keine deutliche Krallenhand. Der Atrophie entspricht nur ein allfälliger geringer Grad von Funktionsminderung, d. h. entsprechenden Bewegungen — Öffnung und Aduktion der Finger und des Daumens, Beugen der Grund-, Streckung der Endphalangen — sind durchaus ausführbar, wenn auch nur etwas verminderte Kraft. Es bestehen keine wesentlichen Störungen der elektrischen Erregbarkeit, weder qualitativer noch quantitativer Art. Auch die Sensibilität ist in allen Qualitäten völlig intakt. Die Papillen und Lelapalten sind gleich. An den Beinen bestehen keine Störungen, auch die Patellarseize sind normal.

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die von der Patientin so charakteristisch geschilderten Anfälle solche von Aphasie und Synkope locale waren. Diese Diagnose ist sicher zu stellen, obwohl wir keine Anfälle mehr selbst beobachten konnten; übrigens weist auch die jetzt noch bestehende cyanotische Verfärbung auf solche Anfälle hin. Es hat sich nun im Laufe von Jahren während des Fortbestehens dieser Attacken eine Muskelatrophie in den vasomotorisch erkrankten Gebieten entwickelt, die sich als eine einfache durch die elektrische Untersuchung dokumentiert. Die Art der Atrophie erinnert in vieler Beziehung an die bekanntere Form der ischämischen Muskellähmung, sie weicht jedenfalls von dem im Weißschen Fall erwähnten Typus deutlich ab und hat wahrscheinlich auch eine andere Genese. Wichtig und bemerkenswert ist in unserem Fall noch das

Fortbestehen akroparästhetischer Erscheinungen ohne Raynaudsche Symptome und schließlich auch die für die Prognose wichtige Erkenntnis, daß die Asphyxie locale nach jahrelangem Bestehen fast spurlos verschwinden kann.

Kehren wir zu den uns im Augenblick beschäftigenden Muskelaffektionen zurück, so ist zunächst noch eine Beobachtung von Riva zu erwähnen, der schon in einem im Jahre 1871 publizierten Fall schwere Beweglichkeitsstörungen mit Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit beschrieb; es scheint sich aber hier doch wesentlich um Störungen gehandelt zu haben, die nur in den Anfällen selbst sich zeigten; dann konnte Patientin die Hand weder zur Faust ballen, noch öffnen, der Induktionsstrom brachte keine Kontraktion hervor und bewirkte auch gar keine Empfindung, während die Sensibilität für Berührungen erhöht war. Auch Bernhardt sah Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit im Anfall. Die Musculi interossei der rechten Hand, die besonders kalt und cyanotisch war, reagierten auf den faradischen Strom in exquisit träger und langsamer Zuckung, wobei die Muskeln sekundärläng starr blieben. Ähnliches bemerkte auch Lühr, er sah bei starker Cyanose die elektrische Erregbarkeit der Interossei sich vermindern und die Kontraktion wurde dabei etwas langsamer. — Es sind dies, wie bekannt, Abweichungen von der Norm, wie wir sie auch sonst, bei gesunden Menschen unter dem Einfluß der Kälte beobachten können.

Auf Scheibers Beobachtung, bei der ebenfalls ein erheblicher Grad von Muskelatrophie vorlag, gehe ich hier noch nicht ein, da der Fall auch sonst noch zahlreiche Abweichungen vom Typus der Raynaudschen Krankheit aufweist.

In einem Fall von Hell traten bei einer Frau, die seit 20 Jahren an Raynaudscher Krankheit litt, und bei der neben Cyanoseanfällen in den Fingerspitzen auch Eiterungen vorhanden gewesen waren, Atrophien der Interossei und Lumbricales ein. Die elektrische Erregbarkeit war normal. Auch der Fall von Weber dürfte hierher zu rechnen sein, ebenso von Kreckentz und vielleicht auch ein solcher von Menski. In dem Falle von Phelps bestanden keine Atrophien einzelner Muskeln; die beobachteten Störungen der elektrischen Erregbarkeit: mäßige Herabsetzung und Überwiegen der ASZ über die KSZ können sehr wohl sekundäre, durch Schwellung und Kälte bedingt sein.

Im weiteren Verlauf unserer Beobachtungen haben wir das Vorkommen von Atrophie der Muskeln bei Störungen der peripheren Vasomotilität häufiger beobachtet. Luzzato hat darüber aus der Oppenheim'schen Poliklinik berichtet und einen Teil unserer Fälle etwas genauer mitgeteilt; zum Teil handelte es sich um typische Raynaudsche Formen, wie z. B. im Fall 3 seiner Arbeit und in einigen später von

mit gesehenen Fällen. Zum Teil waren es Fälle, die mehr in das Gebiet der chronischen Asphyxie hinein gehören, wie etwa der folgende.

Tryphinger junger Mann. Hat viel in kaltem Wasser zu tun und klagt über eine mit einiger Zeit eingetretene Schwäche der linken Hand und eine wesentlich in der Kälte sehr ausgesprochene Blaufärbung der Hand und der Finger. Die Hand soll außerdem magerer geworden sein. Bei der ersten Untersuchung, die in einem ziemlich kalten Zimmer stattfindet, ist eine ausgesprochene Blaufärbung der Finger zu konstatieren; die Zwischenknochenmuskeln und die Muskeln des Daumenballens sind entschieden atrophisch, und es besteht eine ziemlich ausgesprochene Krallenhandstellung. Die Prüfung der groben motorischen Kraft ergibt eine auffällig geringe Dababe, alle Bewegungen werden ausgeführt, nur mit etwas vermindertem Kraft. Elektrisch findet sich eine mäßige quantitative Herabsetzung der Erregbarkeit und eine ganz geringe Verlangsamung, die wir auf die Kälte der Hände zu beziehen geneigt sind. An einem der nächsten Tage, an dem warmes Wetter ist, ergibt die nochmalige Untersuchung nur noch Spuren der Krallenhandstellung, die Hand ist in diesem Tage ganz warm.

Wir haben uns im weiteren Verlauf der Beobachtung von dem Einfluß der Kälte auf die Stellung von Hand und Fingern direkt überzeugen können. An einem kühlen Tage fand sich, nachdem der Pat. längere Zeit seine Hände in kaltem Wasser getaucht hatte, folgendes Bild. Beide Hände rot-ergastet, zufälligerweise Syndaktylie der Fingerringen, linke Hand kühler als rechte. Krallenhandstellung mit leichter Spreizung der Finger, Fuß beiderseits gleich. Schwierigkeit der Abduktion der Finger und der Streckung der Endphalangen. Elektrische Untersuchung.

Paradisch: N. ulnaris am Ellenbogen r. 125 l. 125 mm RA.

„ „ „ Handgelenk r. 120 l. 115 „

M. Interos. I r. 125 l. 75 „

„ II r. 125 l. 80 „

„ III r. 115 l. 90 „

„ IV r. 115 l. 90 „

„ Abductor digiti. min. r. 115 l. 80 „

„ Opposens r. 105 l. 80 „

„ Abductor pol. r. 115 l. 75 „

Galvanisch: N. ulnaris am Ellenbogen r. $\frac{1}{2}$ l. $\frac{1}{2}$ RA

„ „ „ Handgelenk r. $\frac{1}{2}$ l. $\frac{1}{2}$ „

M. Interos. I r. 4 l. 4 „ Die A.S.Z. ist

„ II r. $\frac{1}{2}$ l. $\frac{1}{2}$ „ etwas stärker

„ III r. 6 l. 6 „ als die R.S.Z.

„ IV r. 4 l. 6 „ und ein wenig

Hypothexar r. 5 l. 5 „ langsam, aber

nicht warm-
förmig.

Die Sensibilität, die Reflexe usw. wiesen keine Störungen auf. Im weiteren Verlauf der Beobachtung, die sich auf einige Jahre erstreckte, fand keinerlei Progression statt. Bei der letzten Untersuchung waren die Symptome nur noch in abgeschwächtem Maße vorhanden.

Derartige Fälle einer Kombination von asphyktischen Zuständen in den Händen (und Füßen) mit und ohne paroxysmale Steigerung der vasomotorischen Phänomene, mit ziemlich beträchtlicher Muskelatrophie haben wir, wie erwähnt, nicht gar so selten in den letzten Jahren beobachtet. Charakteristisch erscheint meist das Mißverhältnis

zwischen der zufälligen Atrophie und den geringen funktionellen Störungen. Elektrisch bestand quantitative Alteration oder eine Andeutung von Ea R. Auf die Genese dieser Atrophie, die ich als eine den vasomotorischen Störungen koordinierte (mit Phleps) ansehen möchte, hier näher einzugehen, ist nicht der Ort.

Bemerkenswert sind die Erscheinungen von Muskelatrophie in dem freilich nach meiner Auffassung nicht streng hierher gehörenden Fall von Benders. Der Beginn der Atrophie war in diesem Fall nicht beobachtet worden, erst als schon schwere vasomotorische und trophische Störungen an der rechten Hand in Form von Angiopsasmen und Gangrän bestanden. — denen, wie sich später wenigstens an den analogen Verhältnissen am Fuß zeigen ließ, eine schwere Endarteritis zugrunde lag —, wurde eine Atrophie des Daumens und Kleinfingerballens und der übrigen kleinen Handmuskeln bemerkt, die auch wieder ohne eine Einschränkung der betreffenden Bewegungen sich ausbildete. Eine elektrische Untersuchung ist anscheinend nicht vorgenommen worden. Später trat eine bis zum Schluß der Beobachtung noch fortschreitende Besserung ein. Auch hier handelte es sich offenbar um eine „vasomotorische“ Muskelatrophie, die von Benders direkt auf die von ihm supponierten Angiopsasmen zurückgeführt wird. Die Pathogenese dieser Atrophien wird uns ausführlicher noch später beschäftigen.

In einigen meiner Fälle wurde über leichte motorische Reizerkrankungen, über ein krampfhaftes Verziehen der Finger und Zehen, das mit Schmerzen verbunden war, geklagt. Auch Schäffer macht für seinen Fall dementsprechende Angaben.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sind nur insoweit Bewegungsstörungen vorhanden, als mechanische Momente, wie Schwellung und Steifigkeit der betreffenden Teile, sie bedingen.

Im ganzen werden wir sagen dürfen, daß die motorischen Störungen, von wenigen, freilich sehr beachtenswerten Ausnahmen abgesehen, ganz zurücktreten.

Im Anschluß an die Muskelatrophien sei bemerkt, daß gelegentlich einmal eine Erhöhung der iliomuskulären Erregbarkeit vorkommt (Holm). Dies Symptom hat ja nur eine geringe Bedeutung.

Tischerbach hat einmal eine Aufhebung der Schmerzphänomene an den Beinen beobachtet, und zwar handelte es sich um ein zeitweiliges Verschwinden der Knie- und Achillesreflexe bei einer 29jährigen Frau, das zusammen mit den Raynaud'schen Symptomen eintrat. Mit Besserung der vasomotorischen Störungen kehrten die Reflexe auch wieder. Ich kenne den Fall leider nur aus einem Referat.

Einzig Mal wurde eine Erhöhung des galvanischen Leitungswiderstandes notiert (Lähr, Rosenbaum).

Ich glaube, mit den bisher besprochenen Symptomen die Symptomatologie des Raynaud, soweit sie sich auf die Störungen an den Akren bezieht, erschöpft zu haben. Im Laufe unserer bisherigen Betrachtungen haben wir jedoch schon einige Male Gelegenheit gehabt, zu sehen, daß Symptome ganz derselben Art sich gelegentlich einmal auch an anderen Stellen des Körpers lokalisieren. In der Kasuistik der Raynaudischen Krankheit gibt es nun noch ein paar Fälle, die uns in interessanter Weise mit noch weiteren, eigentlich lokalisierten Symptomen, offenbar desselben Charakters, wie wir sie an den Extremitätenenden finden, bekannt machen.

Besonders der Fall von Weiß, dem wir schon eine ganze Anzahl auffälliger Einzelheiten entnommen haben, bietet uns noch mehr solche Beispiele. Erstmals kam es im Verlauf des schon erwähnten zweiten schweren Anfalls zu Lähmungserscheinungen im Gebiet des linken Hals sympathicus: die linke Wange wurde plötzlich ungewöhnlich rot und warm, die Temperatur im linken Meatus auditorius war 3° höher als rechts; der normal gespannte linke Bulbus war tief in die Augenhöhle zurückgesunken, die Pupille war stark verengert, reagierte nur träge auf Lichteinfall, es bestand Hyperhidrosis sinistra. Nach einer Woche war alles bis auf einen geringen Grad von Retraktion des linken Bulbus wieder normal; die Erscheinungen wiederholten sich mehrere Male und kamen auch auf der rechten Seite zur Beobachtung, zuweilen auch beiderseits gleichzeitig, wenn auch nicht in kompletter Form.

Mit dem Beginn der Rückbildung der Sympathicussymptome trat eine andere, höchst merkwürdige Erscheinung auf; es entwickelte sich ein Schwund der Weichteile der linken Gesichtshälfte, insbesondere des Fettgewebes, ohne weitere Veränderungen der Haut, der Muskulatur usw., die Hemiatrophie hielt etwa 14 Tage lang an, darauf fand ein allmählicher Wiederaufbau statt, ohne daß aber bis zum Abschluß der Beobachtung eine völlige Restitution zustande gekommen war.

Als weiteres hierher gehöriges Symptom sind im Weißschen Fall Arthropathien eigentümlicher Art aufgetreten. Anfangs wurden ausschließlich die Fingergelenke, später neben diesen das linke Kniegelenk und verschiedene andere große Gelenke betroffen, es kam jedesmal zu einem Erguß in die Gelenkhöhlen und außerdem zu einer Anschwellung des Unterhautzellgewebes in weiter Umgebung der betroffenen Gelenke; meist gingen neuralgiforme Schmerzen dem Erguß voraus; es bestand keine Rötung, keine Druckschmerzhaftigkeit, keine Temperaturerhöhung, schneller, wie sie kamen, vergingen die Ergüsse auch wieder, in wenigen Tagen. Auch Sonthey beschreibt einen Fall, in dem es zum Erguß in beide Kniegelenke kam, doch erfahren wir nichts Näheres über die Dauer und den Charakter der Gelenkaffektion. Die Weißsche Schilderung erinnert sehr an den Hydrops

articulär, intermitt. bzw. an das flüchtige Ödem; ein Auftreten von flüchtigen Ödemen bei einem Kranken mit Raynaudschen Symptomen sah ich in folgendem Fall.

Ein 21-jähriger Student, der ausgeprägte algonurische nervöse Symptome darbot, gibt an, daß von vier Jahren morgens beim Waschen die Finger ganz weiß werden, anfangs nur für ganz kurze Zeit. Allmählich trat eine Verschlechterung ein. Die Anfälle blühten sich, auf die Symploke lokale folgte eine Apherie locale, die Fäße wurden mitgeriffen. Vor zwei Jahren erlitt bekanntlich er zum ersten Male plötzlich eine Anschwellung in der Gegend des rechten Handgelenkes, die nicht schmerzhaft war, und bei der sich die Farbe der Haut nicht veränderte; das Handgelenk konnte er für ein paar Tage nicht gut bewegen. Im nächsten Jahre wurden die vasomotorischen Anfälle immer stärker, doch traten nie Parasthesien oder Gangrän ein; dagegen kam es häufig unter ziehenden Empfindungen zu Anschwellungen einzelner Finger, die dann schwer beweglich wurden, besonders rechts, auch das Handgelenk wurde auch wiederholt betroffen. Mehrfach kam es im letzten Jahre zu einer anfallsweise auftretenden Unfähigkeit, die Arme zu strecken, durch Anschwellung der Beugeseite der Arme, auch an den anderen Extremitäten traten ähnliche Erscheinungen ein. Bei meinen Untersuchungen konnte ich nicht wiederholt sowohl von dem Auftreten der vasomotorischen Erscheinungen, wie der angioneurotischen Ödeme überzeugen. Sonst fand sich nichts Bemerkenswertes, außer der für die Raynaudsche Krankheit charakteristischen Überbuchtung des Blutdruckes in der Peripherie. Messung mit dem Gaitnerschen Tonometer ergab oft nur 20–30 mm Hg.

Hier handelte es sich demnach um das Auftreten von flüchtigen Ödemen, und zwar artikulären, paraartikulären und muskulären (s. u.) bei Raynaudscher Krankheit. Diese Kombination wurde auch sonst beobachtet. Stern sah einen Fall von Raynaud mit Schwellungen im Gesicht; in einer Beobachtung von Peinar trat das flüchtige Ödem als erstes Symptom des Leidens auf, um dann den vasomotorischen Phänomenen Platz zu machen. — Das Erscheinen von Urticaria im Laufe der Raynaudschen Krankheit wird in der Literatur erwähnt (Lustig); ich selbst habe das dreimal beobachtet. Wir kommen auf diese Kombination später noch zurück.

Im Verlauf der Weißschen Beobachtung kam es einmal auch zu einer passageren Sprachstörung. Patientin wurde bei vorher gutem Befinden plötzlich blaß, fand ganz alltägliche Worte erst nach einigem Besinnen, sprach manches verkehrt aus und verwechselte ein Wort mit dem anderen, war sich dessen aber wohl bewußt. Dabei bestand starkes Herzklopfen, der Puls war frequent und sehr gespannt. Ophthalmoskopisch erschienen die Retinalarterien hell konturiert und ihr Kaliber auffällig verengt. Nach 15–20 Minuten war alles vorüber. Nach einigen Wochen trat noch einmal ein solcher Anfall ein, dann nie wieder. Die Art und das Auftreten der Sprachstörung entspricht genau dem Bild, das wir in den interessanten Fällen von Hemiparalysen mit passagerer Aphasie zu sehen bekommen.

Im letzten Fall ergab, wie geschildert, die ophthalmoskopische Untersuchung ein abnormes Bild, nämlich eine übermäßige Kontraktion

der Retinalarterien. Derselbe Befund ist schon von Raynaud selbst in folgendem Fall erhoben worden:

50jähriger Arbeiter. Vor 40 Jahren Malacia. Im Winter 1871/72 erst an der linken, dann an der rechten Hand Anfälle von Synkope und Asphyxie locale. Die Spitzen der Finger werden kühl, blaß, die Hände viel cyanotisch; die Wiederkehr zur Norm erfolgt aus der Peripherie oder von einer centralen Stelle aus. Leichte Sensibilitätsstörungen. An den Füßen ähnliche Anfälle, nur weniger stark; Nase, Ohren frei. Dauer der Anfälle ein bis zwei Stunden, besonders wenn Pat. ins Feuer kommt oder die Hände in warmes Wasser steckt. Während der Anfälle ist das Sehen gut, während der darauf folgenden Zeit dagegen wird das Sehen besonders links schlechter, es kehrt zur Norm zurück, sobald an den Händen ein neuer Anfall beginnt. Die in den Zwischenzeiten zwischen den Anfällen vorgenommene ophthalmoskopische Untersuchung ergab folgendes: Die A. centralis retinae und ihre Verzweigungen sind an ihrem Ursprung in der Nähe der Papille eng als in ihrem weiteren Verlauf. Hier und dort sieht man an ihnen eine partielle Abschnürung. Die Papille ist deutlich, es bestehen sehr starke Venenpulsationen, die ihrer Intensität nach weit über das in der Norm beobachtete Maß hinausgehen. Am linken Auge sind die Pulsationen ausgesprochen stärker als am rechten. Während der Asphyxieanfälle sind die Venenpulsationen auch vorhanden, aber viel weniger intensiv. Die Arterien erlangen während dieser Zeit ihr normales Kaliber nicht völlig wieder, sondern weisen stellenweise fadenförmige Verdünnungen auf. Die Behandlung mit dem konstanten Strom brachte für beide Seiten von Erleichterungen erhebliche Besserung, so daß nach einigen Wochen der ophthalmoskopische Befund völlig normal ist und längere Zeit hindurch keine Anfälle von Asphyxie mehr aufgetreten sind.

Raynaud glaubt sich berechtigt, und darin werden wir ihm zustimmen, einen engen Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungsreihen annehmen zu dürfen, wenn er auch keine Erklärung für das Abwechseln der Störungen geben kann.

In einem zweiten von Raynaud selbst als nicht ganz überzeugend angesehenen Fall kam es im Moment des Eintritts der Cyanose zu einer beträchtlichen Verdunklung des Sehens, die mit dem Verschwinden der Cyanose auch verschwand. Auch hier fand sich eine Verengung der Arterien des Fundus oculi, diesmal aber, entsprechend den subjektiven Beschwerden, während der lokalen Asphyxie; die Gefäße erweiterten sich beim Beginn der Reaktion, es bestand diesmal keine Venenpulsation.

Es leuchtet ein, wie wichtig die unmittelbare Beobachtung einer auffallweisen arteriellen Verengung für die Frage der Pathogenese der Krankheit ist.

Spätere Beobachter, nach außer Weiß, haben in vereinzelten Fällen ähnliche Angaben gemacht, wie Raynaud, wozugegen in einer weiteren Anzahl von Fällen der ophthalmoskopische Befund ausdrücklich als normal angegeben wird.

Bland fand in seinem Fall den Augenhintergrund auffällig blaß und weiß, die Gefäße undeutlich, während nach drei Tagen der Augenhintergrund normal war. Eine Verengung der Arterien des Augen-

hintergrundes fand auch Morgan, doch war dieselbe dünner, früher sollen zeitweise Sehstörungen dagewesen sein. Nash sah in seinem ersten Fall die spasmodische Kontraktion der Arterien des Fundus oculi, „die für Raynaud charakteristisch ist“, in einem zweiten Fall sah er dasselbe und nebenbei an der Stelle des gelben Flecks jederseits einen unregelmäßigen dunkelgrauen Flecken. Stephenson sah in seinem Fall wiederholt zwei bis drei Minuten dauernde Anfälle von völligem Sehverlust, von denen er annimmt, daß sie auf einem Spasmus der A. centralis retinae beruhten, doch fehlt die ophthalmoskopische Untersuchung. Warren konnte einen Gefäßkrampf an der A. centralis retinae beobachten. Weaver fand die Papillen röter als normal und weniger scharf begrenzt. In Roques' Fall bestand ganz wie bei Raynauds zitierter erster Beobachtung eine anfallsweise auftretende und mit der Asphyxie alternierende Amblyopie; im Moment der höchsten Amblyopie war dabei der Augenhintergrund völlig normal, nur waren die Gefäße auffällig zart, doch war es zweifelhaft, ob ein pathologischer Zustand vorlag. Übrigens ist der Fall durch eine bestehende Nephritis interstitialis kompliziert. Simpson fand öfter Pulsation der Retinalvenen, doch ist er nicht sicher, ob dieser Befund pathologische Bedeutung hat. Calmette erwähnt drei an Malaria leidende Kranke, die Anfälle von Asphyxie locale und Augenstörungen hatten. In zweien von ihnen fand sich eine Verengerung der Retinalarterien, und in dem dritten Venenpulsation. Zweimal sollen die Augensymptome zugleich mit den Anfällen von Asphyxie locale aufgetreten sein. In Friedemannus Fall kam es, wie schon erwähnt, wenn die Asphyxie locale an den Händen sehr stark war, zu einer deutlichen Kontraktion der Gefäße des Fundus.

Mantle gibt an, im Stadium der Synkope eine Zusammenziehung der Gefäße des Augenhintergrundes beobachtet zu haben.

Garrigues berichtet, daß in seinem Fall die Arterien des linken Augenhintergrundes während des Anfalls blasser waren als rechts und blasser als nach dem Anfall. Eine Sehstörung bestand dabei nicht. Fox erhielt in zwei Fällen von seinen Patienten die Angabe, daß sich das Sehen vorübergehend verschlechtert; das kam in einem Falle ein Jahr lang alle 14 Tage; objektiv fand sich nichts. Ich selbst habe weder in noch außerhalb der Anfälle jemals trotz darauf ausdrücklich gerichteter Aufmerksamkeit eine Veränderung des Augenhintergrundes finden können, und auch nie Angaben über Sehstörungen von meinen Patienten erhalten. Im ganzen sind also die Resultate der ophthalmoskopischen Untersuchungen, auf die man große Erwartungen gesetzt hatte, recht spärliche geblieben. Raynauds interessanter und wichtiger Fund ist nur ganz vereinzelt bestätigt worden, die Schwierigkeit der Untersuchung ist ja in solchen Fällen auch erheblich. An der Realität des Vorkommens spasmodischer Kontraktionen an

der A. centralis retinae ist aber jedenfalls nicht zu zweifeln. Raynauts Befunde wurden von bekannten Ophthalmologen (Galezowski, Panas) kontrolliert und bestätigt. Es ist in diesem Zusammenhang von Interesse zu hören, daß Benson in einem Fall von Migräne eine Kontraktion der Gefäße des Augenhintergrundes eintreten sah.

Anfallsweise Kontraktionen von Arterien wurden vereinzelt auch noch an anderen Stellen nachgewiesen.

Grasset bemerkt allgemein, daß der Puls (in der Arteria radialis) in der Synkope fast unzufühlbar werden kann. Einzelbeobachtungen der Art wurden mitgeteilt von Bernhardt, Calwell, Fuchs, Macpherson, Pasteur, Holst, Cushing.

In Bernhardts erstem Fall war die linke Radialis deutlich abgespannter, harter Strang zu palpieren, aber weder an ihr noch an der A. ulnaris und brachialis war ein Puls fühlbar. Ähnliches fanden Calwell und Macpherson. Fuchs konnte feststellen, daß die Palpation zuerst intensiver Anfälle von Cyanose etwas niedriger war als sonst. In Pasteurs Fall war der Puls an der A. radialis der affizierten linken Hand entschieden weniger voll als an der rechten. Weaver konnte bei seiner Kranken anfangs den Puls gut fühlen, später zeigten sich wechselnde spastische Zustände in den Arterien der Vorderarme, besonders an der rechten A. ulnaris und der linken A. radialis, indem einmal der Puls deutlich zu fühlen war, ein andermal nicht. Weaver bezeichnet dies Verhalten direkt als durch passagere Spasmen bedingt und bringt es in Analogie mit dem bei der A. centralis retinae beobachteten. In einem Falle von Holst war während des Anfalls der Puls in der linken Radialis nicht fühlbar, außerhalb der Anfälle links schwächer. Auch Cushing berichtet über einen Fall, in dem der Puls in der einen Radialis nicht deutlich zu fühlen war. In einem Fall von Fox war der Puls in der Radialis einmal während eines Anfalls schwächer. Interessant ist eine Beobachtung Schlesingers, der in einer Diskussion kurz erwähnte, daß er Raynautsche Symptome auf der Seite, wo sich eine Halsrippe fand, entstehen sah, und daß hier der Radial- und Brachialpuls fehlte. Ich selbst habe einen gleichen Fall beobachtet. Zoja hat in einem Fall Untersuchungen mittels des Plethysmographen angestellt. Es handelte sich um einen Trinker mit typischen Anfällen von Asphyxie und Synkope locale. Im normalen Zustand war der Puls ausgesprochen trikot, während der Synkope war dagegen nur noch eine leichte menükröte Elevation vorhanden; bei der Asphyxie locale endlich war er katakrot, oft mit einer ganzen Anzahl von Schwingungen, die ziemlich schwach waren und dem absteigenden Schenkel der Kurve ein eigenartliches Aussehen gaben. Die Kurve der drei Phasen hängt danach hauptsächlich von dem Zustand der Gefäßwand ab; Zoja meint, das gäbe zu denken

und wies darauf hin, daß vielleicht die peripheren Gefäßzentren den Hauptsitz der Krankheit darstellen.

Andererseits wurde auch sphygmographisch eine völlige Integrität des Pulses an der Radialis nachgewiesen.

Man wird im allgemeinen in Fällen, in denen sich Veränderungen in dem Spannungszustand der Arterien und dem Verhalten des Pulses finden, mit der Verwertung dieser Beobachtungen sehr vorsichtig sein müssen; nur dann, wenn wirklich ein Intermittieren dieser Erscheinungen nachweisbar ist und in den Zwischenzeiten zwischen den Anfällen alles wieder zur Norm zurückkehrt, wird man von einem passageren Spasmus der Gefäße reden und ihn als namentlich pathogenetisch wichtiges Symptom der Krankheit verwerten dürfen. In dieser Beziehung ganz besonders bemerkenswert ist ein Fall von Westphal.

Es handelt sich da um eine 41-jährige Frau, die mit der Kindheit an Epilepsie leidet, bei der in den letzten Jahren eine immer mehr hervortretende Demenz zu konstatieren ist. Die epileptischen Anfälle sind dadurch bemerkenswert, daß sie regelmäßig von deutlichen Sprachstörungen aphasierischer Natur begleitet werden. Bei dieser Frau haben sich während der Beobachtung der letzten Jahre eine Reihe von sehr merkwürdigen Krankheitserscheinungen entwickelt. Es handelt sich einerseits um schmerzhaft tonische Krampfanfälle an den oberen und unteren Extremitäten, an der Kaumuskulatur, im Orbitarum oculi, andererseits um anfallsweises Auftreten der eigenartigen vasomotorischen Störungen an Händen und Füßen. Die Krampfzustände tragen den Charakter der Tetanie, lassen sich aber von der echten Tetanie ausmachen dadurch unterscheiden, daß die für diese charakteristischen Symptome (das Erboste Phänomen, das Trochanterische Phänomen) fehlen. Sie sind ferner dadurch ausgezeichnet, daß sie suggestiv resp. psychogen ausgelöst werden. Ein ganz besonderes Gepräge erhält diese Anfälle durch eigenartige vasomotorische Störungen, die zum Teil mit den Krampfzuständen der Muskeln vergesellschaftet auftreten, sich wie diese auf suggestiven Wege hervorgerufen lassen, mitunter aber auch in selbstständigeren Anfällen, ohne gleichzeitiges Auftreten der Muskelkrämpfe verlaufen. Diese Anfälle werden eingeleitet durch kribbelnde und stechende Empfindungen, namentlich in Fingern und Zehen, die sich allmählich bis zu heftigen Schmerzen steigern. Betroffen von den Anfällen werden beide Hände und Füße in toto, bald auch nur einzelne Teile derselben. Sie sollen sich auf beiden Seiten meist in ganz symmetrischer Weise em. Die betroffenen Extremitätenabschnitte erscheinen mitunter stark cyanotisch violett gefärbt, mitunter sehen sie schwarzweiß aus und fühlen sich eiskalt an. Am diesen schwarzweißgefärbten Teilen entleert sich selbst bei tief geführter Naselstirnchen kein Tropfen Blut. Wiederholt wurde der Übergang der Synkope in Asphyxie beobachtet. Dadurch, daß die Erscheinungen der Synkope und Asphyxie in verschiedensten Abständen nacheinander regelmäßig die verschiedensten Partien der betroffenen Extremitätenabschnitte ergreifen, wird oft ein sehr wechselvolles und mannigfaltiges Farbenspiel an diesen Teilen hervorgerufen. Die Dauer dieser vasomotorischen Anfälle ist eine sehr verschiedene, längere, die Synkope dauert meist nur Minuten, die Asphyxie kann sich aber Stunden und Tage hinziehen, an den Füßen sah man die Asphyxie nach wochenlangen Bestehen allmählich verschwinden. Während der Anfälle erscheint die Taub- und Schmerzempfindung an den betroffenen Partien deutlich herabgesetzt. Das auffallendste Symptom war das Verschwinden der Fußpulse.

während des geschilderten Anfalls. In den anfallsfreien Zeiten, in denen sich die Füße in der Färbung und in der Temperatur in keiner Weise vom normalen unterscheiden, waren alle vier Fußpulse deutlich fühlbar. In vielfachen Untersuchungen ist es dagegen niemals gelungen an den Füßen während des Bestehens der ausgesprochenen weißen oder blauen Verfärbung auch nur einen der vier Fußpulse nachzuweisen. Beim Abklingen des Anfalls, beim Nachlassen der starken Verfärbung gelang es dann in der Regel wieder nach längeren Suchen den Puls auf der einen oder anderen Seite zu finden, und erst beim Verschwinden aller vasomotorischen Störungen wird das Verhalten der Fußpulse regelmäßig wieder das normale. Frühere Veränderungen des Radialpulses waren während der Circulationsstörungen an den Händen nicht zu konstatieren; einige Male bestand der Eindruck, als ob der Puls schwächer wäre, als in der anfallsfreien Zeit. Nach Angaben des Mannes sollen diese Erscheinungen bei der Frau vor einer Reihe von Jahren eingetreten sein, als Krampfanfälle in den Muskeln sich noch nicht bemerkbar machten. Durch diese vasomotorischen Störungen an den Füßen wurden namentlich plötzlich auch Störungen des Gehens hervorgerufen. Pat. klagt dazu gewöhnlich schon einige Zeit vor Beginn des Anfalls über große Ermüdbarkeit beim Gehen und über Parästhesien in den Füßen. Beim Einsetzen des Anfalls läßt sie plötzlich stehen und kann vor Schmerzen und Spannen in den Füßen, welche diese ausgesprochene Verfärbung zeigen und sich ganz kalt anfühlen, nicht mehr weiter gehen. Diese Zustände wurden öfters beobachtet, ohne daß besondere Muskelspannungen an den unteren Extremitäten vorhanden waren. Namentlich treten dann aber die vasomotorischen und tetanischen Krämpfe zu gleicher Zeit an einer, mehreren oder allen Extremitäten auf. Eine Abhängigkeit der vasomotorischen Störungen von dem Akte des Gehens konnten nicht konstatiert werden. Sie treten sowohl in der Ruhe bei der im Bett liegenden Pat., beim Sitzen wie auch namentlich beim Gehen auf und führen dann zu den geschilderten Behinderungen des Gehens. Es ließ sich auch nicht nachweisen, daß ein Ansetzen die Erstörung zum Schwanden bringe. Es ist sehr bemerkenswert, daß späterhin ein sehr erheblicher Rückgang der Erscheinungen eintrat sowohl der Tetanie-ähnlichen Krampfanfälle wie der vasomotorischen Symptome. Die Füße zeigen in Hinblick auf Farbe, Temperatur und Stärke der Fußpulse schon mit über Jahresfrist ein ganz normales Verhalten.

Das Bemerkenswerte des Falles liegt einerseits in dem Nachweis der psychogenen Entstehung der vasomotorischen Störung, er steht in diesem Sinne ganz besonders der Beobachtung von Lévi nahe. Ein hervorragendes Interesse verdient er aber auch wegen des Nachweises des Verschwindens der Fußpulse, wenn es auch nicht ganz richtig ist, wie Westphal annimmt, daß es sich dabei um ein bisher in der Literatur nicht beschriebenes Vorkommen handelt. Dieses Verschwinden der Fußpulse ist ja bekanntlich eines der Hauptsymptome des intermittierenden Hinkens und wenn wir nun bedenken, daß dies Verschwinden des Fußpulses gelegentlich auch mit einer starken Störung des Gehens einhergeht, so läßt sich ohne weiteres verstehen, daß in einem solchen Falle die Diagnose des intermittierenden Hinkens nahe liegen würde. Insbesondere erinnert eine solche Beobachtung an die Fälle des intermittierenden Hinkens, die Oppenheim als *benigna form* resp. als intermittierendes Hinken auf Grundlage einer vasomotorischen Neurose beschrieben hat. Wir müssen auf diesen Punkt später noch eingehen. Hier genügt es

darauf hinzuweisen, daß die Abweichungen vom intermittierenden Hinken doch ganz erhebliche sind, und daß insbesondere die Tatsache, daß die Anfälle unabhängig vom Gehen entstehen, daß sie in der Ruhe auftreten, und daß sie durch Ausruhen keineswegs aufgehoben werden, daß diese Tatsache von großer Bedeutung ist. Es handelt sich in Wirklichkeit also nicht um intermittierendes Hinken, eine Auffassung, die sich mit der von Westphal gegebenen auch durchaus deckt, der sich darüber dahin äußert: daß kein Fall von intermittierendem Hinken vorlag, geht aus dem Auftreten der Anfälle bei völliger Ruhe der Patientin, dem Fehlen aller vasomotorischen Störungen in anfallsfreien Zeiten usw. hervor. Die Gesamtheit der Erscheinungen zeigte, daß zu gewissen Zeiten das fragliche Leiden durch eine eigenartige vasomotorische Neurose vorgetäuscht wurde.

Somit ist in den unkomplizierten Fällen von Raynaud der Puls stets deutlich fühlbar, wenn auch oft etwas schnell und klein; einige Male wurde eine anfallsweise auftretende Tachykardie beobachtet. Phelps betont ausdrücklich, daß die Herzaktion auf der Höhe der Erkrankung beständig mehr oder weniger beschleunigt war, die Pulzzahl betrug bei vollkommener Ruhe gewöhnlich um 114, stieg bei ganz mäßiger Arbeit auf 144, gleichzeitig war eine mäßige Arrhythmie zu beobachten. Größere Unregelmäßigkeiten, auffällige Schwäche und ähnliche Abnormitäten wurden zwar oft genug konstatiert, aber sie waren ohne engere Beziehung zur Krankheit selbst und gehörten vielmehr einem komplizierenden Leiden an. Das Herz weist ebenfalls normale Verhältnisse auf. Gelegentlich fand sich — das wird schon von Raynaud beschrieben — ein leises, inkonstantes akzidentelles Herzeräusch, was um so weniger verwunderlich ist, als die Raynandsche Krankheit, wie bemerkt, öfter auf dem Boden der Anämie zu entstehen pflegt. Pollard beschreibt in seinem nicht streng hierher gehörigen, der multiplen neurotischen Hautgangrän zuzurechnenden Falle neben typischer paroxysmaler Tachykardie eine gleichzeitig auftretende und dann sich wieder zurückbildende Dilatatio cordis.

In den letzten Jahren haben die Blutdruck- und plethysmographischen Untersuchungen eine große Wichtigkeit für unser Leiden gewonnen. Ich habe mich seither bei einer ganzen Anzahl von Patienten durch Messung mit dem Blutdruckapparat von Riva-Rocci überzeugen können, daß der Blutdruck in den anfallsfreien Zeiten im wesentlichen normal ist. Untersuchungen während der Schmerzattacken selbst geben insofern kein einwandfreies Bild, als durch die Untersuchungen die schon vorhandenen Schmerzen noch gesteigert werden und dadurch ein blutdrucksteigerndes Moment eingeführt wird. Hnatek fand in seinem Fall im Beginn des Anfalls einen Blutdruck von 184, nach dem Anfall einen solchen von 145, bei

einem zweiten Anfall im Stadium der Cyanose 175, im Stadium der sekundären Röte 130–140. Er meint, daß das Steigen des Blutdrucks im Beginn des Anfalls und das Absinken nach dem Anfall zur Norm auf eine primäre Kontraktion aller Gefäße hinweist und in Analogie zu setzen ist mit der direkt zu beobachtenden Kontraktion, etwa in der Arterie der Netzhaut. Weiterhin hat Phelps Untersuchungen dieser Art vorgenommen. Er fand an der rechten oberen Extremität, an der sich der letzte schwere Schub der Erkrankung eingestellt hatte, 133 mm, links 118 mm Druck. Von diesem Anfall war die linke Extremität verschont geblieben. Vergleichsbestimmungen an der linken unteren Extremität ergaben 144 mm. Bei Palpation des Druckes wurde die auffällige Beobachtung gemacht, daß der Puls schon bei einem Druck von 60 mm nicht mehr tastbar war, so daß also der Blutdruck einen viel zu niedrigen Wert bekommen hätte, wenn die Bestimmung mit der palpatrischen Methode gemacht worden wäre. Dieses frühzeitige Verschwinden des Pulses wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen von mehreren Beobachtern festgestellt. Es betraf die linke obere Extremität, welche sich damals im März 1908 seit drei Wochen in einem Stadium langsam fortschreitender Besserung befand. Spätere Kontrolluntersuchungen im September 1908 in einem Stadium, wo links schon vollkommene Verheilung der äußeren Hautveränderungen eingetreten war, rechts noch nekrotische Schorfe an vereinzelten Stellen lagen und auch noch zeitweilig leichtere Schmerzen und Parästhesien auftraten, ergaben rechts 134 mm, links 118 mm. Die Amplitude war rechts größer, 70 mm als links, wo sie nur 50 mm betrug. Bei den späteren Messungen war die auffällig leichte Unterdrückbarkeit des Pulses nicht mehr vorhanden, so daß die Druckbestimmung mittels der palpatrischen Methode nur einen ganz geringen Minderwert gegenüber der oszillatorischen ergab. Phelps macht selbst darauf aufmerksam, daß die Ergebnisse zur Zeit der Anfälle deswegen nicht rein waren, weil bei der zur Durchführung des Versuches notwendigen Umschnürung schon vorhandene Schmerzen sich erheblich steigerten. Die Tatsache, daß der Blutdruck an der unteren Extremität nicht unwesentlich höher gefunden wurde als an der oberen, scheint ihm auszudrücken, daß der Blutdruck im allgemeinen erhöht war, unabhängig von der durch die Umschnürung hervorgerufenen Steigerung der Schmerzen. Ob aber die im übrigen in dem krankhaften Prozesse begründeten Schmerzen als Ursache der Drucksteigerung in Frage kommen, oder wieviel aus anderen pathologischen vasomotorischen Ursachen eine Erhöhung des Blutdrucks vorlag, vermag er selbst nicht zu entscheiden. Diese Frage bleibt also noch kontrovers.

Ich habe bei meinen Kranken weiterhin zahlreiche Untersuchungen zur Messung des peripheren Blutdrucks an den Fingern vermittelt des Gärtnerischen Tonometers vorgenommen, und habe

dabei zunächst eine Erscheinung beobachtet, die ganz interessant ist, wenn sie auch keineswegs etwas Überraschendes hat. Es stellte sich bei dieser Blutdruckmessung nämlich folgendes heraus. Die durch die Umschnürung hervorgerufene künftliche Synkope locale überdauerte den mechanischen Reiz bzw. die mechanische Blutabschnürung sehr häufig für lange Zeit, so daß auch nach Abnehmen des Ringes und nach Ansohaltung jeder Kompression für längere Zeit eine vollkommene Blässe bestand, die sich erst ganz allmählich wieder löste; auf diese Weise blieb also nach Beendigung der Messung der Blutdruck in den Fingerarterien immer noch Null. Es beweist das offenbar die gesteigerte mechanische Erregbarkeit dieser kleinen Fingerarterien, indem die durch den mechanischen Reiz hervorgerufene Kontraktion lange anhält und erst ganz allmählich sich löst. Ähnliche Beobachtungen haben auch andere Autoren gemacht, z. B. Polnar, der ausdrücklich bemerkt, daß bei seinen Untersuchungen mit dem Gärtner'schen Apparat die Blässe einige Zeit andauerte, und der so ebenfalls auf einen Krampf der kleinen Arterien bezieht. Auch Péhu und Brissaud, Hallion et Meige haben dasselbe bemerkt. So machen auch auf das damit in eine Reihe zu stellende langsame Verschwinden des Fingerdrucks aufmerksam und weisen darauf hin, daß in diesen Fällen auch das warme Wasser viel langsamer als bei Gesunden zu einer Gefäßerweiterung führt. Die mit dem Gärtner'schen Apparat angestellten Untersuchungen ergeben zahlenthätige Belege für die große Differenz der in den periphersten Partien der Finger herrschenden Blutdruckverhältnisse. So fand ich bei einem Patienten den Blutdruck im zweiten rechten Finger gleich 0, im zweiten linken Finger gleich 70, im dritten rechten gleich 90, im dritten linken Finger 100. In einem anderen Fall dritter rechter Finger 20, dritter linker Finger 60, vierter rechter Finger 30, vierter linker Finger 90, zweiter rechter Finger 90, zweiter linker Finger 40.

Plethysmographische Untersuchungen sind bei der Raynaud'schen Krankheit zuerst von Camillo Verdelli angestellt worden. Es waren leichte Fälle ohne Gangrän, aber mit Akrosynkope, Akroasphyxie und auch mit trophischen Störungen. Die Untersuchung, mit einem Apparat von Riva gemacht, stellte auch der Ansicht des Autors eine Instabilität des Tonus der Gefäße fest, die bei Gesunden nicht vorkommt. Nach Simons beweisen die Schwankungen, die Verdelli mit seinem primitiven Apparat aufgenommen hat, in der Tat mit großer Wahrscheinlichkeit Schwankungen des Tonus, die man bei heilem Gefäßsystem und auch beim normalen zeitweilig sieht, vorausgesetzt, daß man denselben Menschen genügend häufig untersucht. Es läßt sich aber nicht entscheiden, ob die Gefäßreflexe bei dem Kranken Verdelli wirklich ebenso abließen wie beim Ge-

sunden, oder ob der Apparat den Unterschied zwischen beiden nur nicht zum Ausdruck brachte.

Gleichzeitig und unabhängig von Verdelli stellten Castellino und Cardi ihre plethymographischen Untersuchungen an zwei Kranken mit symmetrischer Gangrän an. Sie kommen zu dem Schluß, daß es sich um einen Torpor der Gefäßreflexe handelt, der durch einen dauernden Spasmus der Hautgefäße verursacht ist, der wieder seinerseits von einem Reizzustand der vasomotorischen Centren abhängt. Castellino und Cardi haben aber Schwerkranken im Anfall untersucht. Wendet man bei diesen Kranken, bei denen eine Vasokonstriktion infolge des Anfalls bereits in hohem Grade besteht, noch schmerzhaft Reize an, so kann es natürlich nur noch zu einer sehr geringen oder zu gar keiner Veränderung der Gefäße mehr kommen. Vielleicht kommen für die Veränderungen der Gefäßreflexe auch noch die mikroskopisch festgestellten Wandveränderungen der Gefäße in Betracht.

Viele Jahre nach diesen Untersuchungen prüfte Curschmann das funktionelle Verhalten der Gefäße bei trophischen und vasomotorischen Neurosen: bei fünf Fällen von Raynaudscher Krankheit (zwei schwere, zwei mittelschwere und ein beginnender Fall), in einem Falle von Sklerodermie mit Raynaudschen Symptomen, bei drei Kranken mit Akroparästhesien zum Teil mit erythromelalgischen Erscheinungen, bei zwei Fällen von intermittierendem Hinken, endlich bei einer Frau mit angioneurotischem Ödem der Arme und Hände. Er untersuchte die Reflexe mit dem Plethymographen von O. Müller, wenn irgendmöglich bei jedem Patienten zwei- bis dreimal zu verschiedenen Zeiten. In allen Fällen von Raynaudscher Krankheit war die Radialarterie eng, mäßig rigide, nicht geschlängelt. Curschmann fand bei allen seinen Kranken mit Raynaud und Sklerodermie konstant Fehlen der Gefäßreflexe auf Temperatur-, Schmerz- und psychische Reize, trotz des verschiedenen Grades des Leidens und des verschiedenen Alters der Kranken. Auch bei den Akroparästhesien fehlte jede thermische Reaktion (s. S.), während bestimmte psychische Reize regelmäßig eine normale, aber wenig ausgiebige Volumenveränderung bewirkten. Es war ohne Bedeutung, ob die Kranken gerade einen Anfall gehabt hatten, oder frei von subjektiven Störungen waren. Einmal beobachtete Curschmann auch auf Wärmerreize eine paradoxe Vasokonstriktion statt der normalen Vasodilatation. Er betont mit Recht, daß bei seinen Kranken in der Mehrzahl Arteriosklerose als Ursache der fehlenden Reflexe wohl auszuschließen war.

Weitere Untersuchungen stellte Phelps an. Eine auf der Höhe der Erkrankung aufgenommene Volumenskurve zeigte bis auf sehr geringe Respirationsschwankungen keine Veränderungen des Volumens. Jede Art von Reiz ließ das Volumen unverändert. Als einzigen Reizeffekt konnte man bei einem stärkeren akustischen Reiz, der mit geringem

Erschrocken vorhanden war, eine minimale Vergrößerung der Puls-
höhe mit ebenso geringer Erweiterung der Pulsängen und im Anschluß
daran ein etwas stärkeres Hervortreten der respiratorischen Schwankung
feststellen. Das Volumen blieb jedoch ganz unverändert. Bei einer
späteren Kurve, welche in einem Stadium weit vorgeschrittener Rekon-
valenzzeit aufgenommen wurde, finden sich weit bessere Verhältnisse.
Die Atmungschwankungen sind hier weniger ausgeprägt, auf äußere
Reize stellen sich ganz normale Volumenschwankungen ein, die auch
mit vollkommen normal ausgeprägter Veränderung der Puls-
höhe und -länge einhergehen. Bezüglich der ersten Kurve bemerkt Phleps
noch, daß während der Aufnahme heftige Schmerzen bestanden. Bei
dieser Sachlage ist nach seiner eigenen Auffassung eine eindeutige Ver-
wertung der plethymographischen Ergebnisse sehr fraglich, da es bekannt
sei, daß bei Schmerzen Effekte anderer Reize sehr schlecht
zu studieren sind, gleichwie bei psychischen Spannungszuständen. Es
dominiere in diesen Fällen eben der Schmerzreiz oder die Spannung
so sehr, daß andere Reize nur außerordentlich gering zur Geltung
kommen. Immerhin ist der Grad aller jener Zeichen, welche die Kurve
als eine Schmerzkurve erkennen lassen könnten, viel stärker ausge-
sprochen als in vergleichbaren anderen Fällen. Man müßte, wenn man
den Schmerz allein als Ursache der Auffälligkeiten in der Kurve
bezeichnet, doch wenigstens konstatieren, daß der Effekt ein weit
größerer ist als in normalen Fällen und könnte hierin einen Ausdruck
dafür sehen, daß die vasomotorischen Centren in diesem Falle vielleicht
übermäßig stark erregbar waren. Andererseits kann man aber doch
daran denken, daß eine centrale Innervationsstörung vorliegt, welche
infolge des krankhaften Prozesses die Gefäße in einem mehr oder weniger
bestimmten Tonus erhält und dadurch keine Schwankungen zustande
kommen läßt. Weiterhin hat dann Stursberg ein 25jähriges
Mädchen mit Morbus Raynaud und leichter Sklerodermie unter-
sucht. Er fand zunächst eine normale Gefäßreaktion, dann aber bei
mehreren an einem Tage aufgenommenen Kurven ein sehr unregelmäßiges
Verhalten, bald normale Reaktion, bald Neigung zu spontaner
Kontraktion, bald nahezu völliges Fehlen einer Reaktion auf Kältereiz.
Ebenso wie Carlschmann bemerkte er einmal eine paradoxe Kon-
striktion auf einen Wärmereiz. Er hält sie für psychogen, weil das
warme Bad bei der Kranken unangenehme Empfindungen in den
Fingern hervorgerufen hatte.

Die ausge dehntesten Untersuchungen dieser Art hat dann Simons
an den Kranken vorgenommen, die er in unserer Poliklinik zu be-
obachten Gelegenheit hatte. Ich habe alle diese Kranken selbst mit-
gesehen und beobachtet. Sämtliche Kranke sind nur im anfallsfreien
Stadium untersucht worden. Die kürzeste Beobachtungsdauer zweier
Kranken war drei Wochen, alle übrigen Fälle sind monatelang, einige

über ein Jahr lang immer wieder plethysmographiert werden. In bezug auf die Technik der Untersuchung verweise ich auf die Originalarbeit von Simons. Als für Raynaud-Kranke besonders wichtige Vorsichtsmaßregel bezeichnet Simons die Notwendigkeit, eine dem Kranken adäquate Temperatur in dem den Arm umgebenden Wassermantel zu finden, da diese Kranken besonders empfindlich gegenüber auch ganz geringen Temperaturdifferenzen sind. Besonders Vorsorge muß auch dafür getroffen werden, daß während der Untersuchung das Wasser sich nicht abkühlt. Zur Prüfung der Reaktion auf thermische Reize verwendet Simons anschließend das Eis. Bei jedem Gesunden tritt dabei eine rasche Verengung der ganzen Peripherie




Fig. 4a.

Akroparästhesien plus Akroanästhesie. Von + bis - Eisreiz der Stirn.

ein, die nach Aufheben des Reizes durch eine Erweiterung abgeköst wird, so daß das Armevolumen bald dasselbe ist wie am Anfang des Versuches. Häufig erweitert sich der Arm auch noch etwas stärker. Diese Späterweiterung dauert nur kurze Zeit. Die den Eisreflex be-

gleitende Empfindung, die tiefe Verlassung des Gehirns und der höchsten vasomotorischen Centren ist für den Ablauf des Reflexes völlig gleichgültig. Höchstens der Schmerz bei langdauerndem Eisreiz könnte noch die Kontraktion der Gefäße, also die Volumsverringering




Fig. 4b.

Derselbe Fall. Fortlassend aufgenommen. Dritter Reflex: von + bis - Eisreiz der Stirn.

verstärken. Finden sich bei dieser Prüfung, sobald es sich nicht um Arteriosklerose oder ähnliche Gefäßveränderungen handelt, Störungen, so beweist das eine Insuffizienz der niederen Centren. Der große Vorteil der Anwendung des starken Eisreizes ist also die Unabhängigkeit vom psychischen Einfluß. Viel kompliziertere Bedingungen liegen bei der Prüfung mit psychischen Reizen vor. Die Analyse der von Simons untersuchten Kranken ergab in der Hauptsache immer den gleichen Befund. Gefäßreflexe auf Eis oder den auch in Anwendung gezogenen Essigreiz fehlten immer nur zeitweise, niemals vermißte man sie dauernd bei demselben Kranken, wenn man ihn oft und lange untersuchte. Auch der Raynaud-Kranke hat in der Ruhe, außerhalb seines Anfalls, bei seltener und oberfläch-

licher Prüfung derselben Gefäßreflexe wie der Gesunde. Je häufiger man sich aber mit demselben Kranken beschäftigt, um so mehr finden sich doch kleine und große Abweichungen vom normalen. Am bemerkenswertesten erschienen Simons die von ihm häufiger beobachteten Dissoziationen der niederen Centren. Bei der gleichzeitigen Volumenaufnahme beider Arme verhalten sich die Gefäße jeder Körperseite auf denselben Reiz nicht mehr gleichsinnig, sondern verschieden, verengt sich der eine Arm oder bleibt stumm und der andere erweitert sich u. a. m.




Fig. 4e.

Derselbe Fall: von + bis — Kreis der Stirn.

Für dieses Verhalten seien in folgendem einige Beispiele gegeben. Bei einer jungen Frau mit Akroparästhesien, Akroasphyxie und Synkope und einem eigentümlichen intermittierenden Haaranfall (s. u. die Krankengeschichte auf S. 900) zeigt das Verhalten der Volumenkurve beider Arme die folgende Abweichung von der Norm. An dem ersten Tage ist das Verhalten beider Arme völlig gleichsinnig und normal. An

einem anderen Tage sieht man bei dem ersten Reflex auf den Eisreiz wieder normale Verhältnisse beider Arme (Fig. 4a). Aber schon bei dem dritten Reflex bleibt der linke Arm deutlich zurück (Fig. 4b). Bei einem der folgenden Reflexe findet man einen normalen Anstieg mit der normalen Gegenreaktion vom rechten Arm und wieder ein Nachhinken des linken Armes (Fig. 4c). Bemerkenswerterweise hatte die Frau im Anfall im linken Arm subjektiv die stärkeren Beschwerden. Andere Aufnahmen zeigten und zwar ziemlich häufig, daß die ersten Reizungen keinen oder nur einen geringen Erfolg hatten, bis allmählich oder plötzlich der normale Reflex abläuft. Man muß wohl an eine Bahnung denken, denn die Lösung eines vorhandenen Krampfes ist unwahrscheinlich, da die Pulsgroße sich nicht verändert. Figur 5 beweist die zeitweise normalen Gefäßreflexe bei einer schweren Raynaud-



Fig. 5.

Markus Raynaud. Von + bis — Eisreiz der Stirn.

Kranken mit sklerodermatischen Veränderungen. Figur 6a, b, c zeigt wiederum die Dissociation der Centren bei einer Kranken mit den schwersten Raynandschen Symptomen. (S. Krankengeschichte auf S. 330). In der Kurve 6a finden sich am linken Arm die unvollkommenere Erweiterung, während am rechten Arm gleichzeitig die Gegenreaktion übertrieben abläuft. In Figur 6b sieht man wieder die normalen Reflexe, in Figur 6c ist das Verhalten des rechten Armes normal, aber der linke hinkt nach. Klinisch bestanden hier im linken Arm stets mehr Be-

schweren als im rechten. Die Kurve der Figur 7 stammt von einem schweren Fall von Raynaud mit sklerodermatischen Veränderungen.



Fig. 6a.

Marion Raynaud. Von + bis — Eintritt der Stütze.




Fig. 6b.

Dieselbe Fall. Von + bis — Eintritt der Stütze.

Bei fast allen Aufnahmen, die zum Teil monatelang aneinanderlagen, zeigte sich hier fast immer eine Dilatation am linken Arm auf Eisreiz. Simons schließt aus seinen Untersuchungen folgendes: Die lange fortgesetzte plethysmographische Analyse bei den vaso-motorisch-trophischen Neurosen ergibt auch im Latenzstadium eine funktionelle Schwäche der nervösen Centren, die sich im Schwanken der Reflexe, in einem versteckten Hinken eines oder beider Centren, einer anderen Verarbeitung der Reize, einer rascheren Ermüdung usw. verrät. Der stärkste Ausdruck der Funktionsstörungen ist vielleicht die Asynergie der niederen Centren auf periphere Reize.

Volumen-
kurve des
rechten
Armes

Volumen-
kurve des
linken
Armes




Fig. 6c.

Derselbe Fall. Von + bis — Eisreiz der Stirn.

Der Urin ist gewöhnlich frei von pathologischen Bestandteilen. Dagegen ist seine Menge in den Anfällen öfter vermehrt, dabei ist er auffällig hell und klar (Urine nerveuse nach Raynaud, ähnliches bei Warren, DeFrance, auch bei anderen Autoren und vielfach in Fällen meiner eigenen Beobachtung). Neben der Polyurie besteht häufig Polydipsie. Lévi sah in einem Fall während des Anfalls Anurie completa, doch handelte es sich wohl um eine hysterische Anurie.

Die Angaben, die wir oben bezüglich des normalen Verhaltens des Gefäßsystems, des Herzens und der Nieren machten, müssen aber

eine gewisse Einschränkung erfahren. Es sind in einer Reihe von Fällen Veränderungen in allen diesen Organen gefunden worden, und zwar handelte es sich da um Beobachtungen, in denen sonst die typischen Erscheinungen Raynaud'scher Erkrankung auftraten. Es wurden



Fig. 7.

Moritz Raynaud. Von + bis — Einzie der Stim.

Fälle beobachtet, in denen eine allgemeine Arteriosklerose bestand, und in denen es daneben anfallsweise zur Cyanose oder zu oberflächlicher symmetrischer Gangrän kam, es wurde aber Patienten berichtet, bei denen ein ausgesprochenes Vitium cordis vorlag, und wo außerdem wiederum die intermittierenden Erscheinungen der Raynaud'schen Erkrankung auftraten, und schließlich beobachtete man bei typischen Raynaud'schen Fällen das Vorkommen von gewissen pathologischen Bestandteilen im Harn, vor allem Hämoglobulinurie, ferner Hämaturie, Albuminurie, Melliturie. Die Besprechung aller dieser Fälle und Erscheinungen soll einem späteren Abschnitt vorbehalten bleiben; hier möchte ich nur bemerken, daß mit der Verweisung der Besprechung dieser Symptome in ein späteres Kapitel

nicht ohne weiteres gesagt sein soll, daß in Fällen dieser Art die Diagnose Raynaud'sche Krankheit etwa immer unberechtigt sei; es sind nur Zweckmäßigkeitsgründe, die mich von einer sofortigen Besprechung der Fälle im Rahmen des der Symptomatologie gewidmeten Kapitels absehen lassen.

Der Allgemeinzustand ist meist nicht wesentlich gestört oder wenigstens treten Störungen desselben erst allmählich ein und sind sekundär bedingt, sei es durch die Schmerzen, die die Ruhe und den Schlaf rauben, sei es durch die mit der Abstoßung gangränöser Körperteile notwendig verbundenen Erscheinungen; im übrigen ist die Reaktion des Körpers auf diese Prozesse oftmals auffällig gering; freilich handelt es sich ja auch meist um sehr beschränkte und oberflächliche Nekrosen. Da, wo der Allgemeinzustand schlecht ist, ist es meist sehr fraglich, ob die allgemeine Schwäche und Anämie nicht vielmehr erst die Prädisposition zum Auftreten der Raynaud'schen Krankheit geschaffen haben. In den Ausnahmefällen, wo es sich um Abstoßung größerer Teile handelt, kann eine entsprechende Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens zustande kommen (Nielsen, Begg). Von allgemeinen nervösen Symptomen seien noch genannt periodischer Hang zum Gähnen und Schlaflosigkeit. Öfter geht den Anfällen eine psychische Depression voraus. Unlust zu jeder Tätigkeit, Neigung zum Weinen, Appetitlosigkeit, Unruhe, Angstgefühle. Mader berichtet, daß in seinem Falle die Attacken von Synkope unter Schütteln und Zähneklappern einsetzen. Der Kranke wurde sehr aufgeregt, sein auch sonst vorhandenes Stottern nahm zu. Ähnliches ist auch sonst beschrieben worden. Auch hier bleibt es aber zweifelhaft, wieviel auf Rechnung der oft vorhandenen allgemeinen neuropathischen Diathese, wieviel auf Rechnung speziell der sich entwickelnden Raynaud'schen Krankheit kommt.

Verlauf, Komplikationen.

Das Charakteristikum des Verlaufs der Raynaud'schen Krankheit ist ihr Auftreten in Anfällen. Abgesehen davon stehen sich in ihrer Verlaufsweise die größten und mannigfaltigsten Verhältnisse geltend.

Zunächst stellen sich meist allmählich zunehmend Erscheinungen von lokaler Synkope und lokaler Asphyxie ein; wir haben schon einmal bemerkt, daß es sich da häufig nicht um zweigeteilte Stadien handelt, in deren einem nur Erscheinungen von Synkope locale, im anderen von Asphyxie locale auftreten, sondern wir sehen zu gleicher Zeit an dem einen Finger die Synkope, am anderen die Asphyxie sich entwickeln, verschwinden, sich kombinieren und sich gegenseitig ersetzen. Die Anfälle von Asphyxie locale werden durch mannigfache Gelegen-

heitsmomente, wie wir oben bereits geschildert haben, ausgeübt. Raynaud hat diese Periode als *période d'invasion* bezeichnet; nach ihm dauert sie meist nur wenige Tage, niemals länger als einen Monat. Während dieser Zeit kommt es dann also immer wieder zu neuen Paroxysmen von *Asphyxie locale*. Auch die Dauer des einzelnen Paroxysmus ist sehr verschieden. Sie braucht nur wenige Minuten zu betragen; Barlow sah dagegen Anfälle, die sieben Stunden dauerten, doch waren bei demselben Fall die meisten Anfälle kürzer als eine Stunde. Höblin beobachtete einen 13stündigen Anfall. In Colman und Taylors zweiter Beobachtung dauerte die *Synkope locale* eine Viertelstunde, die *Asphyxie locale* stundenlang. Da, wo *Synkope locale* und *Asphyxie locale* getrennt auftreten, wird das Zeitverhältnis meist so sein, daß die *Synkope* nur ein kurzes Stadium der Einleitung darstellt. Als zweites Stadium (*période d'état*) bezeichnet Raynaud das, in dem die in Paroxysmen auftretenden Schmerzattacken die größte Rolle spielen — es dauert einige Tage, am Ende desselben ist die Gangrän aufgetreten. Diese Abgrenzung scheint mir keine glückliche zu sein, weil sie auf das alte variable Element des Schmerzes ein übergroßes Gewicht legt. Wir werden von einer Einteilung in bestimmte Abschnitte bei der großen Mannigfaltigkeit des Verlaufes überhaupt nicht viel Vorteil haben. In typischen Fällen ist der Verlauf der, daß unter immer größerer Intensität der Lokalerkrankungen der *Asphyxie locale*, oft genug allerdings auch unter Zunahme der Schmerzen schließlich an irgendeiner Stelle, meist an den Spitzen der Finger oder Zehen eine oberflächliche Gangrän eintritt. Damit pflegt dann wohl für die betreffende Stelle die Krankheitshöhe erreicht zu sein, aber während hier die Elimination des toten Gewebes beginnt, kann im Verlauf erneuter heftiger Asphyxieanfälle an anderer Stelle die Gangrän sich von neuem etablieren; wie multipel die Gangränbildung werden kann, habe ich bereits an einigen frappanten Beispielen gezeigt. Die Zeit, die zur Abstoßung der nekrotischen Teile nötig ist, schwankt natürlich ebenfalls sehr und hängt einerseits von der Ausdehnung und Tiefe der Gangrän, andererseits von dem Ernährungszustand des Individuums ab. Der gesamte Anfall hat nach Raynaud meist eine Dauer von 3—4 Monaten, in Ausnahmefällen kann er länger, aber auch kürzer dauern. Eine sehr wenig umfangreiche gangränöse Stelle bei einem meiner Kranken heilte erst in fünf Monaten; jedenfalls schreitet die Heilung wohl immer auffällig langsam vor. Folgender von Dehio beobachteter Fall mag zur Illustrierung des Gesagten dienen.

Stjåléniges Fräulein, war in letzter Zeit viel mit Waschen beschäftigt. Nach einem heftigen Schreck ruht zwei Tage lang krampfhaft Steifigkeit der Finger, dann wurde zuerst der linke vierte Finger blau und schwell an. Einige Stunden später waren alle Finger beider Hände von der Cyanose ergriffen, abendschlief mit der Cyanose soll auch *Synkope* vorgekommen sein. Es bestanden sehr heftige Schmerzen.

die Mittelhand war geschwollen und heiß anzufühlen, diese Verhärtung und Schwellung verschwand jedoch bald. Die Finger wurden immer dunkler und schließlich trat nach vierzehn Tagen Gangrän ein, die fast genau symmetrisch an den Endphalangen aller Finger lokalisiert war; die Gangrän war eine trockene, die abgestorbenen Teile waren gefühllos, es bestand nur eine Abstumpfung des Gefühls. Keinerlei Muskelatrophie. Langsam bildete sich eine Demarkation heraus, einzelne Teile wurden abgestoßen, während andere einige Monate später abgetragen wurden. Damit hörte dann die Krankheit auf, es bestanden nur noch geringe Schmerzen in den Stängeln, und diese fühlten sich kühl an. Auf die bei der Untersuchung der amputierten Teile gefundenen Veränderungen und die Deutung dieser Befunde gehen wir hier nicht ein.

Im vorliegenden Fall erschöpfte sich die Krankheit in einem einzigen Anfall. Das soll nach Weiß auch die Regel sein, er fand dies Verhalten in 71% der Beobachtungen. Ich kann für dies Verhältnis keine Zahlen angeben, habe aber in der Tat auch Fälle gesehen, wo sich das Leiden nur in einem einzigen Anfall zu manifestieren schien und dann abgeschlossen war. Einige dieser Kranken habe ich auf Jahre hinaus verfolgen können. In, wie mir scheint, zahlreichen Fällen traten zwar schwere trophische Störungen nur in einer Attacke auf, aber leichte oder schwerere vasomotorische Störungen wiederholten sich doch nach Abklingen des eigentlichen Anfalls recht häufig.

Als weiteres Beispiel einer unkomplizierten Raynander'schen Krankheit mit typischem Verlauf darf auch folgender Fall von Rhazi gelten.

Säugiges Mädchen, Vater Alkoholik, Pat. aufgenommen am 9. März 1897.

Im Dezember 1896 traten heftige Schmerzen in Händen und Füßen auf; es bestand starke Anämie, leichte Erregbarkeit, starker Schweiß. Status praesens vom 9. März. Sehr mageres, schwaches Kind, kann kaum allein gehen, völlige Appetitlosigkeit. Starker Durchfall, Zunge trocken, bleich. Arterieller Herzschlag. Puls 120, leicht unterdrückbar. Lungen, Nasen normal. Am stärksten heftige brennende, stechende Schmerzen in Händen und Füßen, am heftigsten im linken zweiten bis vierten und im rechten zweiten Finger. Diese sind sehr bleich, kalt, etwas feucht. Sensibilität für Berührung hier völlig geschwunden. Nachdem werden kaum empfunden und bringen kein Blut zum Vorschein. Motilität gut. Derselbe Zustand besteht an den drei ersten Zehen rechts und an allen Zehen links. Im Verlauf weniger Tage bessert sich der schlechte Allgemeinzustand, eine geringe Temperaturerhöhung, die bestanden hat, verschwindet; aber an den Extremitäten erscheinen zuerst an der Nagelphalanx der zweiten rechten Zehe graublaue Flecke, die auch dunkler, fast schwarz werden; es sind jetzt die beiden ersten Phalangen weiß, die Nagelphalanx ganz dunkel verfärbt, zwischen beiden scharfe Grenze. Ähnliches Bild an den drei mittleren Fingern der linken Hand. Abmählich kommt es zur trockenen Gangrän an den Endteilen und zwar in starker Ausdehnung, daß das Wochen nach Beginn der Erkrankung die Endphalangen von vier Fingern nekrotisch sind, während fünf Zehen völlig verloren sind, und drei andere Zehen wenig umschriebene gangränöse Flecken zeigen. Nur selten noch Schmerzen, aber nach wenigen Tagen in beiden Händen und im linken Fuß von neuem heftige Schmerzen, drei Tage lang, die erst aufhören, als von die gangränösen Stellen herum sich eine deutliche Demarkation bildet. Etwa später Auftreten von lokaler Asphyxie in einem Fleck am linken Vorbrunn, der nach vier Tagen verschwindet, ähnliche, weniger große Flecken entstehen hier nochmals nach einigen Tagen; zwei Monate

nach Beginn der Erkrankung list sich die linke kleine Zehle spontan ohne Schmerzen los; drei Tage später werden die anderen nekrotischen Teile, dass das Pat. Schmerzen empfindet, entfernt. Rasche Heilung mit kleinen Narben.

Die Anämie besteht hier auch nach dem Verschwinden der Raynaud'schen Symptome fort, ein Umstand, den der Autor mit Recht in dem Sinne deutet, daß die Anämie nicht viel mehr als eine Prädisposition für das Entstehen der Krankheit bewirkt haben kann und nicht etwa die direkte Ursache der Gangrän gewesen ist. In anderen Fällen kommt es zu einer Wiederholung des ganzen Ensembles des Anfalls in mehrmonatigen oder -jährigen Zwischenräumen, so bei Schäffers Kranken, der $1\frac{1}{2}$ Jahr nach dem ersten einen zweiten, $1\frac{3}{4}$ Jahr nach dem zweiten einen dritten Anfall hatte, oder bei Maders Patienten, der drei mehrere Monate dauernde Anfälle in Abständen von je $1\frac{1}{4}$ Jahren hatte. Ähnliche Beobachtungen finden sich vielfach; die meisten Paroxysmen weist ein von Weiß berichteter Fall auf, bei dem es im Verlauf einiger Jahre zu mehreren schweren und einer großen Anzahl leichter Attacken kam.

Der Verlauf der Krankheit kann in verschiedener Richtung vom typischen Bild abweichen. Nicht eben selten finden sich Erscheinungen des regionären Rhabd, den wir oben beschrieben, der teils als reaktives Stadium, der Asphyxie folgend, teils als selbständige Erscheinung beobachtet wird.

Ferner können Anfälle von Asphyxie locale sehr lange, oft viele Jahre lang immer wieder kommen, ehe es einmal zu einem Anfall kommt, in dem Gangrän eintritt. In einem von DeFrance berichteten Fall bestanden solche Zustände bei der jetzt 46-jährigen Patientin seit ihrem sechsten Lebensjahr; sieben Jahre, bevor DeFrance sie sah, waren zum erstenmal kleine, geschwärzte Stellen im Anschluß an Anfälle von Asphyxie locale entstanden, die sich nach einer Pause von zwei Jahren wiederholten, um nun immer wieder in gewissen Abständen aufzutreten. In dem schon berichteten Fall von Arning bestanden schon seit dem dritten Lebensjahr vasomotorische Störungen und seit dem 20. Lebensjahre der zur Zeit der Untersuchung 31-jährigen Kranken Nekrosen.

Eine sehr lange Leidenszeit hatte eine Patientin vor mir hinter sich, als ich sie zum erstenmal sah.

Es war eine 43-jährige Frau, 3 Monate nach dem Tode des Vaters geboren, seit der Jugend an schweren Migränaufällen leidend, mit Hämorrh. und Übelkeit. Sie hatte schon im 7. Lebensjahre Anfälle von Synkope mit vorübergehender Gefühlslosigkeit, ab und zu auch Anfälle von Cyanose und von Nekrosierung der Fingerspitzen. Seit ihrem 18. Lebensjahre litt sie an sehr schwerhäuften Parastemien, die sehr langsam im Laufe von 4–5 Monaten keilten. In den letzten Jahren traten auch in den Füßen ähnliche wenn auch weniger heftige Zustände auf; es wurden immer öfter Nase, die Ohren von vasomotorischen und trophischen Störungen betroffen. Im Sommer war der Zustand meist besser. Ich fand folgendes: die Stirnhaut der Hände

Milchweiß, dabei fortwährender Farbenwechsel, vom tiefen Blau zu lebhafter Blässe, oder zu rothlicher Cyanose; Schmerzen im Augenblick abklingend. Zeichnen früherer ischämischer Prozesse in Form kleiner, fester, strahliger Narben; die Nägel sind schalenförmig verdickt, die Hände schwitzen leicht, werden gelegentlich auch heiß. Die Cyanose greift auch noch auf die Unterarme über. Sensibilität und Motilität der Arme und Beine völlig intact. Die Zehen des rechten Fußes cyanotisch, auch die Haken intensiv grubförmig gefaltet. Bei Mykoseanfällen sollen sich die vasomotorischen Störungen akzentuieren. Die Pat. ist jetzt nie mehr ganz frei von Beschwerden, aber es kommt immer noch zu erheblichen Exacerbationen.

Eine andere meiner Kranken, die zur Zeit der Untersuchung 22 Jahre war, hatte die ersten Asphyxieanfälle im Alter von zehn Jahren, eine andere bekam ihre Gangrän sechs Jahre nach dem Auftreten der ersten vasomotorischen Erscheinungen. Fournier et Salavréann berichten von einer Kranken, die die ersten vasomotorischen Symptome im 4.—5. Lebensjahr bekommen hatte und zur Zeit der Untersuchung 43 Jahre alt war.

Ähnliche, wenn auch nicht soweit zurückliegende, gleichsam prämonitorische Anfälle von Asphyxie locale berichtet auch Riva. Barlow, Smith u. a. Einen Fall von klassischer symmetrischer Gangrän, bei dem im Laufe von 19 Jahren zahlreiche Anfälle stattgefunden hatten, die allmählich zu einer schweren Verunstaltung der Hände geführt hatten, berichtet Sturmudorf (mir nur im Referat bekannt gewesen).

Das Gegenstück dazu geben die Fälle ab, in denen die Affektion sich in ganz kurzem Zeitraum, im Verlauf weniger Tage entwickelte und abließ. Murray berichtet einen Fall, in dem nach Vorangehen einer geringen Verführung und unter großen Schmerzen im Verlauf von einer Stunde beide Füße schwarz und geschwollen waren, nach einer weiteren Stunde dasselbe Bild an den Händen sich einstellte und der Tod drei Tage nach Beginn der Erkrankung eintrat. Der Puls war unregelmäßig, der Urin normal. In diesem Fall wird man die Diagnose Raynoldsche Krankheit stark bezweifeln müssen, zumal eine Sektion nicht gemacht wurde. March beobachtete einen 28jährigen Mann, der plötzlich eines Tages im Winter erst Weißwerden und Absterben der Finger, dann Cyanose derselben bekam, schon am nächsten Morgen entstanden kleine Blasen an den Fingern, die sehr rasch platzten und langsam heilende Geschwüre hinterließen. Seit dieser Zeit leidet der Patient chronisch an auffallend auftretenden ähnlichen Zuständen.

Im Durchschnitt darf man die Krankheitsdauer bei den Fällen mit mittellanger Verlaufszeit, die die häufigsten sind, in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Raynoldschen Angaben auf mehrere Monate schätzen.

Es scheint keine bestimmte Beziehung zwischen der Dauer der Affektion und ihrer Schwere zu bestehen; im allgemeinen jedoch wird man sagen können, daß dort, wo sehr lange Anfälle von Asphyxie locale

vorausgegangen sind, ehe es einmal zur Gangrän kommt, letztere nicht sehr ausgedehnt zu sein pflegt. Sherrill beschreibt einen solchen Fall, der als Paradigma für ähnliche gelten kann. Hier waren seit fünf Jahren beständig Anfälle von Asphyxie locale aufgetreten. Erst jetzt kamen gelegentlich kleine Substanzverluste vor.

Auch im einzelnen Anfall besteht keine sichere Beziehung zwischen der Dauer der vasomotorischen Symptome und dem ex. Eintritt der Gangrän. So sah Berend sehr schwere Anfälle von Asphyxie locale mit mehr als 2stündiger Dauer ohne Gangrän verlaufen, während in anderen Anfällen schon nach wenigen Stunden sich Gangrän entwickelte.

Eine sehr wichtige Frage ist die, ob es Fälle Raynaud'scher Erkrankung gibt, die von vornherein chronisch ohne das Intervalltreten von Paroxysmen verlaufen. Ganz ohne Zweifel gehört der paroxysmale Verlauf zu den bedeutsamsten Zeichen unserer Krankheit; wenigstens in den ersten Entwicklungsperioden der Affektion finden sich zwischen den Anfällen immer vollkommen freie Zeiten, allmählich kann sich das wohl ändern, in dem Sinne, daß geringe Störungen, namentlich eine geringe Asphyxie dauernd vorhanden ist, aber auch da sind Exacerbationen noch immer die Regel. Das ist eine Verlaufsthem, wie wir sie auch bei anderen Neurosen mit anfänglich typischen Paroxysmen finden. So sehen wir in späteren Jahren die Migränekranken nicht gar so selten an einem dauernden Kopfschmerz leiden, der nur von Zeit zu Zeit eine Steigerung erfährt. Oft ist mit dieser Ausdehnung der Krankheitssymptome auf einen längeren Zeitraum zugleich eine Intensitätsabnahme verbunden, und auch das finden wir bei der Raynaud'schen Krankheit wieder. Aber dürfen wir eine Form dieser Krankheit anerkennen, in der sich die vasomotorischen Symptome von vornherein in chronischer und progressiver Weise entwickeln?

Wir kennen eine solche Verlaufsthem nur für die Asphyxie locale; von einer chronisch sich entwickelnden Synkope locale sind mir wenigstens keine Beispiele bekannt geworden. Es sind nun in der Tat solche Fälle chronisch-progressiver Asphyxie locale als Raynaud'sche Krankheit beschrieben worden, aber ihre Zahl ist außerordentlich gering. So stellte Humphrey einen derartigen Fall vor. Es bestand bei einer 35jährigen Frau seit neun Jahren Schwellung und Cyanose an Fingern und Zehen, einzelne Phalangen waren durch Nekrose zugrunde gegangen. In der Diskussion wurde die Diagnose wegen Fehlens der Anfälle bestritten. Eine weitere Beobachtung stammt von Monroe. Es war ein sehr komplizierter Fall bei einem 1½jährigen Kinde, wo neben den vasomotorischen Symptomen, die übrigens über den ganzen Körper verstreut waren, ein angeborener Hydrocephalus und eine Tracheocele vorlag. Bemerkenswert war schließlich noch das Fehlen von Schmerzen. Towle berichtet von einem 17jährigen Mädchen, das

vor drei Jahren eine vorübergehende Cyanose der Hände ohne sensible Reizsymptome zeigte und bei dem allmählich die Cyanose tiefer und dauernd wurde; daneben traten heftigste, krampfartige Schmerzen auf; jetzt besteht eine dauernde Cyanose, sehr heftige Schmerzen, die Hände sind kalt, die blaue Färbung schwindet auf Druck nur für einen Augenblick. Sie erstreckt sich bis über das Handgelenk. Towle betrachtet den Fall nur als possible case of Raynauds disease. Monro hat in seiner Monographie auf das Vorhandensein von Paroxysmen bei unserer Krankheit überall den größten Wert gelegt. Auch ich glaube nicht, daß diese Fälle, zu denen nur noch wenige andere kommen, die nicht genau genug beschrieben worden, um zur Entscheidung der Frage benutzt werden zu können, daß diese wenigen Fälle genügen, um eine Varietät der Raynaudschen Krankheit, die ohne Anfälle verläuft, aufstellen zu können; ich verweise im übrigen auf das nächste Kapitel.

Ich habe bisher nur von den Fällen gesprochen, in denen sowohl lokale Synkope wie lokale Cyanose wie Gangrän auftraten. Aber es gibt zahlreiche Fälle, in denen eins oder das andere dieser Symptome vermißt wird. Ich habe schon früher erwähnt, daß nicht selten die Synkope locale völlig fehlen kann, daß sie Weiß sogar in 17 Fällen nur einmal fand. Monro gibt an, daß lokale Synkope in 50%, lokale Asphyxie in 94% und Gangrän in 68% der Fälle vorkommen. Auch ich kann nur bestätigen, daß die Synkope locale in vielen Fällen fehlen kann, und daß nur sehr viel seltener — auch das wurde bereits erwähnt — zwischen Synkope locale und Gangrän das Mittelglied der Asphyxie locale fehlt.

Dann aber gibt es nach meinen Untersuchungen wieder sehr viele Fälle, in denen es überhaupt nie zur Gangrän kommt, sondern nur Anfälle von Synkope und Asphyxie oder auch nur letztere allein eintreten, und schließlich kommt auch die Synkope locale als ein gar nicht seltener und längst bekanntes Symptom anfallsweise vor (Totenfinger). Zuerst hatte Eulenburch darauf hingewiesen, daß in vielen Fällen wenigstens eine Andeutung gangränöser Prozesse wohl nachweisbar ist, und zwar in der Form kleiner Substanzverluste besonders an den Fingerspitzen. Ich kann das auf Grund zahlreicher eigener Erfahrungen nur bestätigen. Wenn man genauer nachforscht, erhält man in vielen Fällen die darauf hinweisenden anamnestischen Daten und findet bei genauer Inspektion auch die entsprechenden geringfügigen und wenig ausgedehnten Einziehungen oder Verhärtungen der Haut. Wenn solche kleinen Defekte wohl auch einmal der Nachforschung entgehen, so darf doch nicht daran gezweifelt werden, daß eine nicht kleine Anzahl von Fällen auch bei längerer Dauer ohne irgendwelche Veränderungen nekrotischer Art verlaufen kann. Die Zahl derartiger Fälle ist in meinem Beobachtungskreis nicht gering; viele solche Fälle mögen, besonders wenn die Schmerzen sich in erträg-

lichen Grenzen halten, nicht zur Kenntnis des Arztes kommen. Fürstner hat ebenfalls derartige Beobachtungen mitgeteilt, wo nur vasomotorische Symptome ohne große Schmerzen das Krankheitsbild darstellen, bzw. solche, in denen es erst nach Jahren oder Jahrzehnten zu wenig umfangreichen Nekrosen an den Fingerspitzen kommt. Wenn er erwähnt, daß öfter später Sklerodaktylie sich entwickelt, so bringt er uns damit auf ein anderes Gebiet, das eingehender Besprechung unterzogen werden muß. Auch solche Fälle habe ich gesehen; ich erwähne nur ein 17jähriges Mädchen, das seit fünf Jahren an Anfällen von Asphyxie litt; hier fanden sich keine Substanzverluste, aber die Haut fühlte sich doch etwas glatt und gedunsen an. Es begann sich schleichend eine Sklerodaktylie anzubahnen.

Celman und Taylor sahen einen Patienten, bei dem seit 20 Jahren Anfälle von Asphyxie lokale und Synkope lokale aufgetreten waren, jetzt zeigten allerdings die Hände sklerodermatische Veränderungen, die aber doch erst nach dezentennlangem Bestehen sich entwickelt hatten. Derartiger Beispiele gibt es mehr.

Es ist bestritten worden (Weiß), daß Fälle, in denen es nicht zur Gangraena symmetrica kommt, überhaupt der Raynaud'schen Affektion zuzurechnen sind. Diejenigen, die das getan haben, sind allerdings in die eigentümliche Lage gekommen, gegen Raynaud selbst kämpfen zu müssen, der solche Fälle — wenigstens solche von Asphyxie lokale — hierher gerechnet hat. Wir müssen bezüglich dieses Punktes auf das Kapitel Diagnose verweisen; ich möchte aber doch betonen, daß ich diesen Standpunkt für unberechtigt ansehen muß.



Wir haben in unseren bisherigen Erörterungen immer nur von den „typischen“ Fällen Raynaud'scher Krankheit gesprochen, und wir haben nur die Ätiologie, die Symptomatologie und den Verlauf dieser Fälle gewürdigt.

Die Literatur der letzten Dezennien, schon seit dem Erscheinen der ersten Raynaud'schen Arbeit ist reich an Veröffentlichungen, in denen Fälle der Raynaud'schen Krankheit oder des Raynaud'schen Symptomenkomplexes publiziert sind, die erheblich und in nichts weniger als gleichgültigen Punkten von dem Bild abweichen, das Raynaud selbst uns entworfen hatte, und das von keinem der späteren besser als von Weiß wiederum uns vor Augen geführt wurde. Wenn ich noch einmal die Kennzeichen dieser Erkrankung zusammenfassen darf, so sind es folgende. Am häufigsten bei neuropathisch veranlagten, manchmal auch bei anämischen oder sonst in ihrer Ernährung etwas beeinträchtigten Personen, nicht selten aber auch bei völlig gesunden Individuen, treten, sei es im Anschluß an eine starke Gemütsbewegung

oder zu eine Kälte Wirkung oder auch ohne erkennbare Ursache, selten ganz plötzlich, meist allmählich sich entwickelnd, vasomotorische und fast regelmäßig sensible Störungen auf, die sich hauptsächlich an den Akra lokalisieren. Es sind die Erscheinungen der *Syzyge locale*, der *Asphyxie locale*, seltener des *regulären Ruber*, begleitet von meist heftigen Schmerzen und von geringen objektiven Sensibilitätsstörungen, die anfallsweise kommen, tage- und wochenlang das Krankheitsbild beherrschen, meist symmetrisch zugeordnet sind, ohne daß die Symmetrie stets eine mathematisch genaue ist, während eine ausgesprochene Asymmetrie wohl vorkommt, aber doch eine große Ausnahme bildet. Auf diesem Standpunkt der vasomotorisch-sensiblen Erscheinungen kann das Krankheitsbild Jahre, Jahrzehnte und auch für immer verharren. In vielen Fällen und bei den schwereren meist schon im Laufe der ersten Wochen kommen dazu trophische Störungen, in Form einer ebenfalls meist symmetrischen, oberflächlichen, trockenen Gangrän, die auch wieder die Akra befällt, ausnahmsweise auch anders lokalisiert und asymmetrisch ist. Auch andersartige trophische Störungen kommen vor, entweder isoliert oder mit der Gangrän zusammen, in erster Linie spontane Parastisien. Mit einem Gangränanfall kann die Krankheit sich erschöpfen, der Patient ist nach Abstoßung der gangränisierten Teile wieder gesundet, es können aber auch jahrelang neue Anfälle sich immer wiederholen. Anzeichen einer schweren organischen Erkrankung des Nervensystems sowohl wie des Gefäßsystems und der inneren Organe fehlen; der exquisit paroxysmale Charakter der Krankheit mit freien Zwischenräumen läßt dauernde, große Veränderungen irgendwelcher Art und in irgendwelchem Körpersystem nicht vermuten.

Mit dem letzten Satz sind wir über das, was wir bisher gefunden haben, allerdings bereits etwas hinausgegangen, es ist eine Vorwegnahme späterer Überlegungen, die hier jedoch notwendig erschien.

So unmissen scheint das Bild der Raynaudschen Erkrankung genügend sicher erkennbar zu sein und sich unschwer von anderen Erkrankungen abtrennen zu lassen. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn wir uns den Beobachtungen zuwenden, bei denen sich wichtige Abweichungen von dem entworfenen Bilde ergeben.

Und schon auf ätiologischem Gebiet fangen diese Schwierigkeiten an.

Es gibt Fälle, in denen sich die Raynaudschen Symptome im Anschluß an Infektionskrankheiten entwickeln.

So sind Fälle Raynaudscher Krankheit beschrieben worden nach Typhus exanthematicus (Estländer, Fieber), Typhus abdominalis (Bräniche, Boretius, Hastreiter, Sarda, Grubert, Richard, Schulz, Zerhus, Fermet), Cholera (Reiche, Gaillard), Diphtherie (Powell), Pneumonie (Seidelmann,

Dufour, Wandel), Influenza (Verdeli, Batman, Dardignac, Laurenti, Rendu) Erysipel (Angelesco, Helm, Raynaud, Englisch, Defrance (L. Fall), Pocken (Raynaud, Fall 9 der These, Defrance), Scarlatina (Dixon, Monro), Masern (McCall, Anderson, Myers, Gaspardi, Courchet), Keuchhusten (Phocas, Hennecart).

Die Zahl der hierhergehörigen Fälle ist, wie die eben gegebene Aufstellung lehrt, erheblich, doch sind die Beziehungen zwischen der vorausgehenden Infektionskrankheit und den Raynaudschen Symptomen sehr differente.

In eine erste Gruppe gehören die Fälle, in denen sonst typische Fälle von Raynaud auf dem Boden der durch irgendwelche Infektionskrankheit bedingten Unterernährung entstanden. Hier lag mehrmals zwischen der Infektionskrankheit und dem Ausbruch der Raynaudschen Krankheit ein Zwischenraum von mehreren Wochen bis Monaten; diese Fälle unterscheiden sich danach in nichts von denen, die etwa auf dem Boden einer konstitutionellen Anämie entstanden sind; so traten bei dem Fall von Weiß die ersten Erscheinungen in der Bekenvalenz von einem leichten Typhus abdominalis auf, und Zerkow sah einen Fall nach einem schon gänzlich abgelaufenen Abdominaltyphus, Anderson einen solchen zwei Monate nach Eintritt von Masern, Englisch drei Monate nach einem Erysipel usw.

Ohne Bedeutung ist es natürlich auch, wenn Raynaud (Fall 9 der These) im Verlauf der Krankheit einmal Pocken auftreten sah. Dixon beobachtete ein Mädchen, das im Alter von 7 Jahren Scharlach hatte, im Alter von 19 Jahren an Raynaudscher Krankheit litt. In diesem Fall ist die vielleicht als Zwischenglied wirkende Albuminurie bemerkenswert. Monro sah einen Kranken, der mit 13 Jahren Scharlach und mit 16 Jahren Rheumatismus hatte, aber von größerer Wichtigkeit für die Genese der Raynaudschen Krankheit war wahrscheinlich die später erworbene Phthise. In einem zweiten Fall trat die Raynaudsche Krankheit ein Jahr nach Scharlach, zwei Jahr nach Chorea auf. Hutchinson beschreibt einen Fall, in dem lokale Synkope etwa zugleich mit Masern und Keuchhusten begann, Calwell einen solchen, in dem Masern kurze Zeit nach einem Anfall der Raynaudschen Krankheit auftraten.

In solchen Fällen wird man bei sonst typischem Verhalten des Krankheitsbildes keinen Wert auf die Infektionskrankheit zu legen brauchen.

Dem geraden Gegensatz zu diesen Fällen stellen diejenigen dar, in denen bei einem durch die Infektionskrankheit schwer erschöpften Individuum, dessen Blutzirkulation auch nach stetigen Anzeichen defekt ist, ohne charakteristisch vorausgehende, vasomotorische Symptome sich eine oft ausgedehnte Gangrän entwickelt, die innerhin eingemauert symmetrisch sein kann. Hier ist naturgemäß zu allererst daran zu denken, daß es sich um eine durch malarische Thrombose bedingte Gangrän handelt,

und doch sind solche Fälle als Raynaud'sche Krankheit beschrieben worden, so u. a. von Bellamy, wo bei einem vierjährigen Kind eine ausgedehnte symmetrische Gangrän beider Füße sich entwickelte, die eine A. femoralis pulslos war, und am vierten Tag der Tod eintrat. Die Diagnose wurde allerdings hier sofort im Anschluß an die Vorstellung des Falles angefochten.

Viel schwieriger zu beurteilen und zu klassifizieren ist aber eine Reihe weiterer Fälle, bei denen symmetrische Gangrän oder symmetrische Asphyxie im Verlauf einer Infektionskrankheit und besonders zu einer Zeit auftrat, wo keinerlei sonstige Zeichen auf eine allgemeine Schwäche der Circulation hindeuten, also namentlich im Beginn der betreffenden Krankheit.

So beschreibt z. B. Holm den Fall eines 21-jährigen Menschen, der im November 1871 an einem Erysipelas migrans erkrankte, und bei dem am 12. Dezember am zweiten und dritten Finger der rechten Hand, ebenso am zweiten und vierten Finger der linken und an beiden zweiten und vierten Zehen Asphyxie locale eintrat. Nach einigen Wochen gesellte sich eine ziemlich oberflächliche Gangrän der betreffenden Teile dazu. Ähnlich liegt die Sache in der Beobachtung von Richard, die Raynaud'sche Krankheit im Verlauf eines Typhus betrifft. Ein 16-jähriger Junge wurde sieben Wochen nach Beginn des Fiebers eingeliefert, an mehreren dem Druck ausgesetzten Stellen fanden sich Schorfe, die vier äußeren Zehen jedes Fußes waren tiefrot, kalt und unempfindlich. Die Fußarterien pulsirten, aber die Art. tibialis postica konnte nicht gefühlt werden. Die afficirten Teile wurden gangränös, mehrere Phalangen wurden abgestoßen. In den Arteriae tibiales war später der Puls wieder fühlbar. Bei einem Bruder des Kranken, der zur selben Zeit an Typhus litt, entstand eine ganz oberflächliche symmetrische Gangrän an den Zehen; eine Schwester hatte einige Tage Asphyxie locale ohne Gangrän. Im ersten Fall fand Richard in allen kleinen Gefäßen bräunliche, homogene Thromben, aber keine Endarteriitis, und er hält, anscheinend mit Recht, diese Thromben für sekundär entstanden. Bräuniche erwähnt einen vierjährigen Knaben, der in der dritten oder vierten Woche eines mäßig starken Typhus cyanotische Stellen am linken Ohr, an der Nasenspitze und an den Zehenspitzen bekam. Diese Teile waren alle eiskalt und der Sitz heftiger Schmerzen. In kurzer Zeit trat Genesung ein. In einer Beobachtung, die Haxtreiter mittheilt, ist der Zusammenhang zwischen Typhus und Raynaud'scher Krankheit ein weniger enger. Auch Fischer hat Ähnliches beobachtet.

Der folgende Fall, den Seidelmann mittheilt, macht in seiner Bezeichnung ebenfalls Schwierigkeiten.

20-jährige Frau, 16. April 1893 Paris, zugleich damit vorst eine feggebestige Pneumonie vor, die Temperatur bei 10 Grad ab; am 26. April ist Pat. fieberfrei, es bildete sich auch ein pleuritische Exsudat, aber am 5. Mai war Pat. ganz frei von lokalen Beschwerden und Erscheinungen. An diesem Tage bildeten sich an den

Derselbe leidet beide Hände kleine Hämorrhagien, in den nächsten Tagen auch an der Streckseite der Unterarme, am 12. Mai war davon nichts mehr zu sehen. Am 15. Mai plötzl. Schmerzen, Rötze und Kriebels in den Fingerspitzen beider Hände, Cyanose aller Endphalangen der Finger der linken und des Daumens und kleinen Fingers der rechten Hand; am 18. Mai schwellen die Finger und der Rücken der linken Hand stark und unter sehr heftigen Schmerzen an, es tritt etwas Fieber ein, die übrigen Finger der rechten Hand, am 23. Mai auch die Ohrläppchen wurden cyanotisch; die Sensibilität etwas, einzelne Teile des Fingers wurden kalt, nachbleich, am 25. Mai bildet sich links eine trockene Gangrän der Endphalangen, am 26. Mai tritt Cyanose der Zehen mit heftigsten Schmerzen. Unter solchen Erscheinungen kommt es allmählich zur Amputation sämtlicher Finger und Zehen in verschiedenen Umlänge, an den Zehen waren zum Teil nur oberflächliche Hautpartien nekrotisch geworden. Erst am 18. November 1901, also nach 9 Monaten, ist dieser Prozess vollendet.

In vielen Beziehungen entspricht der Fall durchaus der typischen Raynaudischen Krankheit, mit ungewöhnlicher Ausdehnung der Gangrän wie etwa in dem oben erwähnten Falle von Arning. Es bestanden vasomotorische Symptome, die Symmetrie ist ausgesprochen, die Ohrläppchen sind befallen. Das ganze Leiden erschöpfte sich in einem Anfälle, aber auch das kommt, wie wir gesehen haben, oft genug vor. Abweichend ist vielleicht nur, daß sich die Cyanose ganz kontinuierlich in die Gangrän umwandelte, ohne daß sich da irgendwelche Schwankungen zeigten. Ob die Pneumonie atologisch in Betracht kommt, läßt sich nicht sicher entscheiden, es war auch ein Pueras vorausgegangen. Eine bestimmte Entscheidung vermag ich nicht zu treffen, um so weniger als beiden in der Krankengeschichte Angaben über den Puls in den peripheren Arterien fehlen. Man könnte immerhin, wie auch Dufour für seinen Fall das tut, an eine direkte toxische Wirkung auf die peripheren Teile denken, ohne die Vermittlung des Nervensystems in Anspruch zu nehmen.

Estlander hat sich besonders mit den Fällen von symmetrischer Gangrän im Verlauf des Typhus exanthematicus beschäftigt. Er beobachtete in 21 Fällen von Typhus exanthematicus Gangrän als Komplikation; in 14 von diesen wurden Thromben in den Hauptarterien gefunden, in 7 Fällen dagegen waren die Arterien frei; hier erschien die Gangrän zu Beginn des Fiebers, war immer doppelseitig und beschränkte sich meist auf einige Zehen oder einen größeren Teil des Fußes.

Powells Fall erscheint mir interessant genug, um ihn wenigstens in seinen Hauptzügen hier wiederzugeben.

23-jähriger Mann. Im Anschluß an akute Krankheit, wahrscheinlich Diphtherie, plötzlich des Morgens Cyanose der Nase, nach 1–2 Tagen Ausbleiben an den Palmar der Finger und an den Ohren. Am Ende der dritten Woche Gangrän der Finger bis zu zweiten Phalanx und der Hähren; später Gangrän an einzelnen Zehen. Zehenspitze schmerzhaft, geschwollen, livide, an der Spitze ein Geschwür; dabei gute Allgemeinzustand, etwas Erstick im Lira, geringe Schmerzen und Kriebels. Nach 1 1/2 Monaten Demarkation. Dann langsame Heilung.

Powell glaubt, daß die symmetrische Gangrän hier die Stelle der sonst beobachteten postdiphtherischen Lähmung einnimmt.

Es mag im Anschluß an diese Andeutungen der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden, daß einige Male auch eitrige Prozesse dem Erscheinen der Raynaudschen Symptome vorausgegangen sind (Raynaud, Wilks, Southey). Es scheint nicht, daß zwischen diesen beiden Affektionen ein irgendwie engerer Zusammenhang besteht.

Desto wichtiger sind die Beziehungen zwischen der Malaria und der Raynaudschen Krankheit. Raynaud selbst hat bereits drei Fälle dieser Art beschrieben, aber er scheint diesem Zusammentreffen keine Bedeutung beigemessen zu haben. Der zeitlich erste hierher gehörige Fall ist der von Marchand (sechster Fall der Raynaudschen These), der aus dem Jahre 1837 stammt, der zweite ist der von Landry. Weitere Beobachtungen sind veröffentlicht worden von Rey, Marroin, Charpentier, Faulquier, Béhier, Fischer, Khmielewsky, Hare, Calmette, Mourson, Petit et Verneuil. Namentlich die drei letzten Autoren haben den Gegenstand ausführlich behandelt, auch in der Monographie Mentos findet sich darüber eine sehr ausführliche Erläuterung. Mourson fand in seinen 180 Fällen wenigstens 15 oder 8,3% mit sicherem Malaria-Attendenzien, während nur 28 oder 15,6% sicher stets frei von Malaria gewesen waren. In der großen Zahl der Fälle, die dann noch übrig bleiben, finden sich keine Angaben über diesen Punkt. Mourson, der schon im Jahre 1880 22 derartige Fälle zusammengestellt hatte, stellte als Resultat seiner Untersuchungen fest, daß Malaria oder selbst der Aufenthalt in einem mit Malaria behafteten Lande sich sehr häufig in der Ätiologie der Raynaudschen Krankheit findet, daß Asphyxie locale entweder zugleich mit dem Fieberanfall oder ihm folgend, oder ganz an seine Stelle tretend beobachtet wurde. Bemerkenswert ist an den von Mourson angeführten Fällen, daß es niemals zur Gangrän kam, immer nur zur Asphyxie oder selbst nur zur Synkope. Aber schon vor Mourson hatte Fischer einen Fall beschrieben, bei dem Gangrän eingetreten war.

Häufiges Murren, litt vier Wochen lang an Intermittens, während der letzten Anfälle wurden der vierte und fünfte Finger beider Hände kühl, wie eingeklappt und empfindlich. Nach acht Wochen ein gleicher Anfall, hierauf wurde die Spitze des linken kleinen Fingers taub, nach einigen Tagen bemerkte Pat. dieselben Erscheinungen an beiden Ohren, drei Wochen später an beiden Wangen, nach weiteren 14 Tagen an der Nasenspitze. Nach der Bemerkung stießen die kranken Stellen sich los, und es erfolgte Heilung ohne erhebliche Narbenbildung. Nach zwei Monaten derselbe Prozess nochmals an beiden Ohrläppchen, auch hier bald Heilung. Allgemeinbefinden gut.

Hier standen symmetrische Gangrän und Intermittens in nahem, zeitlichem Zusammenhang, so daß mit Recht an eine Beziehung zwischen den beiden Affektionen zu denken ist.

Petit und Verneuil stellten folgende zwei Kategorien auf: Lokale Asphyxie und der Fieberanfall fallen zeitlich zusammen, dabei können die vasomotorischen Erscheinungen dem Frost vorausgehen oder mit ihm koexistieren, oder im Stadium des Schwitzens auftreten. In einer zweiten

Gruppe ist die lokale Asphyxie unabhängig von der Zeit des Fieberanfalls, sie kann ihm folgen, ihn ersetzen oder mit ihm abwechseln, ist aber selbst apyretisch. Das Fieber kann jahrelang der Asphyxie vorausgehen, so daß ein Übersehen des Zusammenhanges leicht denkbar ist; im Vergleich zu der Häufigkeit der Malaria ist die Asphyxie eine seltene Erscheinung. Das Malariafieber allein vermag sie nicht hervorzurufen; andere Faktoren, wie z. B. Kälteeinwirkung sind dann noch zuzusetzen. Ob in den Fällen, in denen viele Jahre zwischen der Malaria und der Raynandschen Krankheit lagen, ein Zusammenhang wirklich besteht, ist gar nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Es sind das Fälle, zu denen z. B. die von Grassot, Henry, Giovanni mitgeteilten gehören.

Wir gedenken im Anschluß an diese Fälle vielleicht am besten einer Beobachtung Simons, in der sich eine erhebliche Milzvergrößerung und daneben eine ziemlich ausgeprägte Leukocythämie fand; die Zahl der weißen Blutkörperchen war auf 1:15 rote gestiegen. Simon sah die Raynandschen Symptome als Folge dieser Leukocythämie an, während Raynaud selbst, der den Fall erwähnt, die Kombination der beiden Affektionen als einen Zufall auffaßt. Monroe findet es auffallend, daß so selten eine Vermehrung der weißen Blutkörperchen bei der Raynandschen Krankheit beobachtet wurde, da doch Malaria in der Anamnese häufig ist, und bei Malariaen oft erhebliche Vermehrung der weißen Blutkörperchen gefunden wurde.

Die Frage, ob wir die Fälle, in denen wir die Raynandsymptome im engen Zusammenhang mit der Infektionskrankheit auftreten sehen, den typischen Fällen Raynandscher Krankheit zählen dürfen, ist von den Autoren verschieden beantwortet worden.

Für diejenigen, die in dem Raynandschen Symptomenkomplex überhaupt keine Krankheit im genere sehen, sondern ihn stets auf dem Boden irgendeiner andern Krankheit und direkt durch diese hervorgerufen entstehen lassen, erledigt sich die Frage nach: wir haben es hier mit Raynandschen Symptomen auf dem Boden der Infektionskrankheiten zu tun, wie sonst mit solchen auf dem Boden der Neurosen, der organischen Nervenkrankheiten usw. Hochenegg ist wohl der erste und schärfste Vertreter dieser Auffassung, die wir in dieser Form und Ausdehnung, wie schon unsere bisherige Darstellung zeigt, nicht gelten lassen können.

Für Wolff, der die Auffassung vertritt, es handle sich bei Raynaud um eine selbständige Neurose, ergeben sich bezüglich der Stellung der im Rede stehenden Fälle große Schwierigkeiten; das sieht man schon daran, daß er in ihrer Beurteilung nicht konsequent verfährt. In seiner kritischen Besprechung der bis dahin publizierten Fälle sagt er folgendes: „Ansehbar sind die Fälle von Estlander, da eine Gangrän im Laufe eines Typhus exanthematicus denn doch eine andere Deutung wahrscheinlich macht und außerdem die bei ihnen stattgehabte große Ausdehnung der brandigen Zerstörung bei symmetrischer Gangrän nicht vorkommt“, was nach unserer

heutigen Erfahrung nicht absolute Geltung hat. Demgegenüber läßt aber Weiß die zwei Fälle von Fischer — symmetrische Gangrän im Verlauf einer Malaria und eines Typhus — gelten, wenn auch letztere nicht ganz unumfechtbar seien, und ebenso akzeptiert er in dem oben zitierten Fall von Holm die Diagnose Raynaudsche Krankheit.

Das ist zweifellos ein inkonsequenter Standpunkt, der nicht zu halten ist. Bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse werden wir nach meiner Ansicht nicht umhin können, diese Fälle, sofern sie nur in ihrem sonstigen klinischen Verhalten den Charakter der Raynaudschen Affektion genügend deutlich zum Ausdruck kommen lassen, den typischen Fällen zuzurechnen. Wir werden aber immerhin gut tun, sie in einer Untergruppe auszusondern, da ja der Verdacht nicht ganz abzuweisen ist, daß irgendwelche Veränderungen der Blutbeschaffenheit, über die wir zurzeit keine Kenntnis besitzen, hier das Zustandekommen der typischen Gangrän unterstützen. Sie gehören demnach in die Gruppe, die Monroe als „Raynaud disease due to a morbid blood-state“ bezeichnet.

Ebenso wie im Verlauf akuter kommt der Raynaudsche Symptomenkomplex auch im Verlauf chronischer Infektionskrankheiten vor. Namentlich in den letzten Jahren ist von vielen besonders französischen Autoren, auf die wichtige Rolle aufmerksam gemacht worden, die die Tuberkulose insbesondere die der Lungen in der Ätiologie der Raynaudschen Krankheit spielen soll, während man früher geneigt war, nur die allgemeinen die Ernährung schädigenden Einflüsse dieser Krankheit gelten zu lassen. Rénou, Mariel, Séo, Byers, Gaston et Emery, Guillaïn et Thaon, Gandois, Milor, Wolff, Bonenfant, Danlos, Diehl, Bouchez, Declaux, Urquhart, Defrance, Brengues haben auf diesen Punkt ihre Aufmerksamkeit gerichtet. Daß hier wirklich ein engerer, ätiologischer Zusammenhang bestehen soll, scheint mir auch heute noch sehr zweifelhaft. In meinen Fällen habe ich schwere tuberkulöse Erscheinungen niemals gesehen, habe nie einen Fortschritt der etwa vorhandenen Symptome einer Spitzenaffektion erlebt und kann auf Grund der eigenen Erfahrungen nicht zugeben, daß die Intoxikation mit dem Gift des Kochschen Bacillus die Raynaudsche Krankheit hervorruft. Unter dem Einfluß der Kachexie, die sich in vorgeschrittenen Fällen von Tuberkulose der Lungen noch mit besonders schlechter peripherer Circulation verbindet, entstehen wohl Symptomenbilder, die den Raynaudschen vasomotorischen Symptomen ähneln, aber keine eigentliche Raynaudsche Krankheit. Auch die von Péhu aufgestellte Behauptung, daß die dem Raynaud sehr nahe stehende chronische Akrosphyxie, die ich in der ersten Auflage dieses Buches zuerst beschrieben habe, ihre Ursache in einer tuberkulösen Infektion hat, kann ich nicht zugeben. Darauf komme ich noch zu sprechen.

Anders als mit der Tuberkulose steht es mit der Lues.

Der Punkt, in dem die Lues von der Wirkungsweise der übrigen Infektionen abweicht, ist der, daß die Lues bekanntlich sehr oft Gefäßveränderungen, und was hier hauptsächlich in Betracht kommt, eine Endarteritis der kleinsten Gefäße bedingt, nebenbei ja auch organische Veränderungen des Nervensystems hervorbringen kann; wir werden daher die im Anschluß an Lues sich einstellenden Raynaudschen Symptome mit den Fällen zusammen behandeln, in denen irgendwelche andere Gefäßveränderungen vorliegen.

Wir kommen nun zu der Besprechung derjenigen Fälle, in denen neben dem Raynaudschen Symptomen Zeichen einer solchen Autointoxikation des Körpers vorhanden sind, die sich regelmäßig durch abnorme Bestandteile im Urin des Kranken kundgibt. Wir kennen Fälle Raynaudscher Krankheit, in denen im Urin Eiweiß oder Zucker vorkam, oder wo das Phänomen der Hämoglobinurie bestand. Beginnen wir mit den letzteren. Wir müssen zu diesem Zweck das Wichtigste über die einfache paroxysmale Hämoglobinurie vorausschicken. Außer der durch Vergiftungen, durch Einwirkung extremer Kälte- oder Wärmegrade, durch manche Infektionen bedingten Hämoglobämie und der aus dieser folgenden Hämoglobinurie, gibt es eine Gruppe von Krankheitsfällen, wo bei sonst gesunden Menschen anfallsweise eine Hämoglobinurie auftritt. Strömpell schildert sie (Lehrb. d. spez. Pathol. IV. Aufl. II. S. 219) wie folgt: Die Krankheit tritt in einzelnen Anfällen auf, sehr oft beginnt der Anfall mit häufigem und anhaltendem Gähnen, dann Schmerzen in den Gliedern, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Kälteverden der peripheren Körperteile, Hände, Nasenspitze u. a. Bald darauf Schüttelfrost und Temperaturerregung, zuweilen heftige Schmerzen in der Lebergegend, dann Absinken der Temperatur, Schweißbildung, ikterische Hautfärbung, häufig Urinkrisis. Dauer des Anfalls einige Stunden bis einen halben Tag. Der Harn zeigt eine dunkle, blätige, fast schwarze Färbung; die spektroskopische Untersuchung ergibt die Linien des Hämoglobins, zuweilen auch des Methämoglobins, während mikroskopisch unzählige rote Blutkörperchen nicht nachweisbar sind; dagegen finden sich oft unregelmäßig gestaltete Körner, die als Hämoglobinkörner angesprochen werden, teils frei, teils an hyalinen oder epithelialen Cylindern. Die Untersuchung des Bluts während des Anfalls ergibt auch in diesem schon eine Auflösung des Hämoglobins im Blutserum, also deutliche Hämogloburämie, außerdem Poikilocytose, geringe Neigung der roten Blutkörperchen zu Geldrollenbildung. — Die Veranlassung zu dem einzelnen Anfall, das ist für uns besonders interessant, liegt unzweifelhaft oft in peripheren Abkühlungen, wodurch ein Zerfall der roten Blutkörperchen angeregt wird. Daher sistieren die Anfälle fast immer im Sommer und lassen sich künstlich durch absichtliche, starke Abkühlung der Haut des Patienten hervorrufen. Ätiologisch kommen hauptsächlich Lues, vielleicht auch Malaria, ferner für den einzelnen Anfall auch starke körperliche Anstrengungen in Betracht.

Diese kurze Schilderung läßt uns sofort erkennen, wieviel Ähnlichkeit in vieler Beziehung das Krankheitsbild der paroxysmalen Hämoglobinurie mit dem der paroxysmalen symmetrischen Gangrän hat. Da ist es denn besonders bemerkenswert, daß in zahlreichen Fällen beide Krankheiten nebeneinander resp. in Abhängigkeit voneinander vorkommen. Der erste derartige Fall ist schon 1871 von Hutchinson beschrieben worden; einen weiteren Fall beschrieb Wilks 1879, ferner haben Beiträge zu dieser Frage gebracht Southey, Dickinson, Druitt, Abercrombie, Myers, der zuerst in einem Fall von Asphyxie locale und Hämoglobinurie auch Hämoglobinämie feststellte, ferner Beale, Bland, Brandt, DeFrance, Haig, Barlow, Bristowe und Copeman, Morgan, Osler, Tanna-kill, Warren, Dyce Duckworth, Henry.

Die Zahl von elf Fällen, die Mouró angab, war schon damals (1889) zu niedrig gegriffen. Seither sind nur auffällig wenig neue Fälle dieser Art mitgeteilt worden; ich fand nur noch die von Rietschel, Mantle, Evans, Mott und Miura. Unter meinen Fällen war keiner, bei dem sich, wenn auch nur anamnestisch Hämoglobinurie feststellen ließ. Die Urinuntersuchung hat in diesen Fällen das Bild ergeben, das wir auch sonst bei der Hämoglobinurie zu sehen gewohnt sind. Der Urin ist blutig oder dunkelrotbraun, er zeigt spektroskopisch Methämoglobin allein oder mit Hämoglobin zusammen, auch die Guaiacprobe ergibt den Nachweis von Blut. Gewöhnlich findet sich mikroskopisch amorphes Blutstoff in verschiedener Form, dagegen keine roten Blutkörperchen. Der Eiweißnachweis gelingt stets leicht, häufig landen sich verschiedenartige Cylinder. Der Urin unterscheidet sich also durchaus von den Fällen mit Hämaturie, aber es gibt doch nach Übergänge zwischen diesen beiden Formen. So fanden sich in den Fällen von Henry und von Wilks gelegentlich einige rote Blutkörperchen. In einem Fall Southey's waren diese in ziemlichlicher Zahl vorhanden, während sonst die Erscheinungen durchaus denen der paroxysmalen Hämoglobinurie gleichen. Ich will anhangsweise gleich bemerken, daß Hämaturie einige Male bei der Raynoldschen Krankheit ohne Beziehung zur Hämoglobinurie vorkam (Selig-Cohen, Morgan, Hutchinson, Bland). In allen diesen Fällen war die Blutmischung unbedeutend und meist akcidentell bedingt.

Die Fälle von Hämoglobinurie zeigen nur aber in einzelnen mancherlei Abweichungen. Während in der einen Reihe von Beobachtungen durchaus die Raynoldschen Symptome hervorstechen und die der Hämoglobinurie nur gelegentlich zum Vorschein kommen, ist es ein andermal gerade umgekehrt (Druitt, Dickinson, Rietschel). Was das zeitliche Verhalten der beiden Affektionen betrifft, so finden wir Fälle, in denen Anfälle von Hämoglobinurie zunächst den von Asphyxie locale vorausgehen, während beide Affektionen dann später zusammen vorkommen, wir finden Fälle, und diese bilden die Mehrheit, wo erst die Anfälle von Asphyxie locale erscheinen und dann sich zu ihnen die von Häm-

globinurie gesellen, und wo dann beide Symptomenkomplexe weiter regelmäßig zusammen auftreten, und schließlich gibt es auch Beobachtungen, wo Hämogloburie und Asphyxie locale stets alternieren. Ein solcher Fall mag hier etwas ausführlicher mitgeteilt werden. Er stammt von Tannahill.

7jähriges Kind. Im Alter von zwei Jahren Schmerzen in Händen und Füßen, Frühjahr 1883 bei Kälteeinwirkung Füße und Unterschenkel rot, deswegen warmes Bad, in diesem entsteht ein großer schwarzer Fleck an jedem Oberarm an der Außenseite oberhalb des Ellbogens. Die Anfälle wiederholten sich an verschiedenen Stellen; im Juli zum erstenmal Anfall von Hämoglobinurie. Seitdem wiederholte Anfälle von Hämoglobinurie und lokaler Asphyxie, die jedoch nie mortal waren; unter 20 beobachteten Anfällen von Asphyxie locale kommt es nur einmal zu symmetrischen Gangrän.

Rietschel glaubt darauf aufmerksam machen zu sollen, daß in dem mit Hämoglobin eingegehenden Fällen die Gangrän meist an den sonst viel seltner betroffenen Öhren sitzt. Es dürfte das wohl kaum irgendeine Bedeutung haben.

Das Blut wurde in diesen Fällen einige Male untersucht, zuerst, wie erwähnt, von Myers. Er fand auch hier ähnliche Veränderungen wie sonst im Blut bei paroxysmaler Hämoglobinurie. Die meisten roten Blutkörperchen waren von normaler Form, einzelne gezähnt, sie hatten wenig Neigung, sich zu Geflochten zu vereinigen, zeitweise fand er helle oder dunkelrot gefärbte Körperchen von der Gestalt der roten Blutkörperchen. Haig konstatierte eine große Verminderung der roten Blutkörperchen nach dem Anfall, ihre Zahl betrug vor dem Anfall 3 800 000, eine Stunde nach dem Anfall und während der Hämoglobinurie 3 000 000. In einer Blutprobe, die während eines Anfalles entnommen war, fanden sich zahlreiche zerfallende rote Blutkörperchen und eine übergroße Zahl von weißen.

Eine interessante und wichtige Beobachtung verdanken wir Colman und Taylor. Ein zehnjähriges Mädchen litt an Anfällen von Synkope, im Urin war weder Blut noch Hämoglobin, noch Eiweiß. Es wurde mehrmals einem ischämischen Finger eine Blutprobe entnommen in der Weise, daß vor dem erwarteten Anfall eine Ligatur lose um den Finger gelegt wurde, die im Moment des Anfalls angezogen wurde. In dem entnommenen Blut war das Serum gefärbt, zahlreiche rote Körperchen waren geschrumpft und unregelmäßig, einige von normaler Form, aber farblos. Die weißen Blutkörperchen waren normal; es bestand also Hämoglobinurie und trotzdem keine Hämoglobinurie. Wie schon an anderer Stelle betont wurde, ist ein solches Verhalten aber nicht die Regel, sondern es findet sich meist eine normale Konstitution des Blutes.

Für das Verhältnis, in dem Raynaudsche Symptome und Hämoglobinurie zueinander stehen, sind mannigfache Erklärungen versucht worden, auf die wir, da wir einmal auf den Gegenstand so nahe eingegangen sind, hier gleich zu sprechen kommen wollen, obgleich wir

damit in die Erörterung der Pathogenese der Krankheit übergehen.

Die Ähnlichkeit, die zwischen beiden Symptomenengruppen obwaltet, und auf die wir schon hinwiesen, ist insbesondere von Barlow hervorgehoben worden. Bei beiden kommen Anfälle insbesondere bei Temperaturveränderungen vor, bei beiden treten die Anfälle vorzugsweise im Winter auf, den Anfällen gehen bei beiden Gähnen, Erbrechen usw. voraus, und auch bei einfachen Anfällen von Hämoglobinurie werden die Glieder kalt und blau; bei beiden kommen häufig Abdominalschmerzen vor usw. Der beste englische Kenner der Hämoglobinurie Dickinson geht, diesen Erwägungen Folge leistend, soweit, zu sagen (nach Barlow) „Indeed the two conditions seem to approach each other and mingle as to make it impossible, to make a distinct demarkation between them.“ Demgegenüber hat aber Morgan doch auch Verschiedenheiten hervorgehoben. Die paroxysmale Hämoglobinurie ist nach ihm viel häufiger bei Männern, ist meist begleitet von schweren Konstitutionsanomalien — was aber mit der Schilderung anderer Autoren nicht übereinstimmt — es finden sich bei ihr Störungen in den Abdominalorganen, gelbliche Verfärbung wie bei Morbus Addisonii, und Intermittens ist sehr häufig in der Anamnese vermerkt.

Auch Monro hat dem Verhältnis der Hämoglobinurie zu der Raynaudschen Krankheit eine ausführliche Besprechung gewidmet. Auch er erkennt als beides gemeinsam das paroxysmale Auftreten, die ausübende Wirksamkeit der Kälte und das häufige Einsetzen mit Empfindungen von Schauer usw. an. Auch er findet einen gewissen Unterschied in der Beteiligung der beiden Geschlechter an den beiden Krankheiten: während die Raynaudsche Krankheit bei Männern in 37,4%, bei Frauen in 62,6% vorkommt, ist die Hämoglobinurie für sich viel häufiger bei Männern: 71,4% zu 28,6%. Die entsprechenden Zahlen für das kombinierte Auftreten beider Erkrankungen weichen nur wenig von den letztgenannten ab, es sind: 63,6:36,4%. Die Malaria ist in der Anamnese der nur an Hämoglobinurie Leidenden viel häufiger, sie beträgt hier nicht weniger als 71%, während sie, wie schon erwähnt, bei der Raynaudschen Krankheit nur in 8,3% sicher nachweisbar war und in der Anamnese der an beiden Krankheiten zugleich leidenden Patienten nur einmal notiert ist. Beide Affektionen kombinieren sich gelegentlich mit Urticaria, und ebenso kommt auch bei beiden gelegentlich Epilepsie vor. So findet also auch Monro neben einer großen Zahl von gemeinsamen Eigenschaften gewisse Differenzpunkte zwischen den beiden Krankheiten; auch er macht darauf aufmerksam, daß die einzelnen Fälle, in denen sie beide zusammen vorkommen, in tiefen Richtungen voneinander abweichen, indem einmal Züge des einen, andermal Züge des anderen Krankheitsbildes zeitlich und der Intensität nach stark hervortreten.

In einer Anzahl der mitgeteilten Fälle gewinnt man durchaus den Eindruck, daß die Hämoglobinurie nur die Teilerscheinung eines allgemeineren Leidens ist, als das man die Raynaudsche Erkrankung anzunehmen hätte; das ist eine Anschauung, wie sie z. B. Abercrombie vertritt. Die Hämoglobinurie könnte dabei auf doppelte Weise entstehen. Von einen Erklärungsmodus können wir von Versuchen ableiten, die schon vor längerer Zeit von Ehrlich und Boas angestellt wurden. Boas fand nämlich bei gewissen Personen, daß, wenn sie den vermittelst einer elastischen Ligatur abgeschnürten Finger einer Hand eine Viertelstunde lang in Eiswasser steckten, in jeder dem Finger entnommenen Blutprobe die charakteristischen Kennzeichen der Hämoglobinurie vorhanden waren, während die Untersuchung des übrigen Körperblutes ein fast ganz negatives Resultat ergab.

So könnte man annehmen, daß sekundär in gewissen Fällen von Asphyxie locale von den asphyktischen Extremitätenenden aus eine Hämoglobinaemie und dadurch eine Hämoglobinurie erzeugt wird. Moura ist geneigt, diese Erklärung ganz allgemein zu akzeptieren. Eine zweite Möglichkeit wäre die, daß es durch einen Vorgang, analog dem, der sich in den Arterien der Gliedmaßen abspielt und hier zur äußerlich sofort sichtbaren Asphyxie locale und zu hievon nachweisbaren Blutveränderungen führt, in den Nierenarterien oder anderen Arterien innerer Organe direkt zur Hämoglobinaemie käme; diese Erklärung würde besonders für die Fälle sich eignen, in denen die Hämoglobinurie der Asphyxie locale vorausgeht (Henry) oder wo beide Zustände miteinander alternieren. Moura widerspricht freilich einem solchen Erklärungsversuch; er meint, es müßte in einem solchen Fall nicht Hämoglobinurie, sondern Hämaturie die Folge sein; die geringen Beimischungen körperlicher Bluthbestandteile, die sich im Urin in mehreren Fällen fanden, bezieht er auf die durch das ausgeschiedene Hämoglobin bedingte sekundäre Hyperämie der Nieren. Haig sucht sowohl die Anfälle von Asphyxie locale wie die von Hämoglobinaurie auf eine Anhäufung von Harnsäure im Blut zurückzuführen (Uricacidämie), wodurch einerseits ein die peripheren Arterien zur Kontraktion bringender Reiz, andererseits ein Zerfall der roten Blutkörperchen mit ihren Folgen herbeigeführt würde; hiernach wären Raynaudsche Erscheinungen und Hämoglobinurie Folgen derselben Ursache, also koordiniert und ständen nicht im Verhältnis von Ursache und Wirkung. Doch hat diese Erklärung sicher nur ganz beschränkte Geltung.

In vielen Fällen wird man annehmen müssen, daß die Grundkrankheit die Raynaudsche Krankheit ist, und daß die betroffenen Individuen durch eine auffällige Resistenzunfähigkeit ihrer roten Blutkörperchen ausgezeichnet sind; dadurch kommt es von den Nieren oder von den peripheren Teilen her zur Hämoglobinaemie und Hämoglobinurie. Wodurch diese abnorm geringe Vitalität der roten Blut-

körperchen bedingt ist, ist hier, wie aber auch sonst in den Fällen von paroxysmaler Hämoglobinurie zweifelhaft. Man hat an den schädigenden Einfluß früherer Lues und früherer Internittien gedacht und mit der betreffenden spezifischen Therapie auch Erfolge erzielt. Auch in einzelnen Fällen von Raynaudscher Krankheit plus Hämoglobinurie findet man diese Krankheiten in der Anamnese (s. v.). Ich möchte im übrigen nicht behaupten, daß diese Erklärung von der sekundären Rolle der Hämoglobinurie überall ausreicht. Das Bestehen einer primären Intoxikation des Bluts, die zur Hämoglobinämie führt, und die dann ihrerseits erst wieder die lokale Asphyxie bedingen könnte, muß ebenfalls in Erwägung gezogen werden. Sichere Hinweise für eine solche Annahme im einzelnen Fall besitzen wir nicht, wenn wir nicht das zeitliche und Intensitätsverhältnis der beiden Erscheinungsreihen dafür gelten lassen wollen.

Es gibt weiter eine Anzahl von Fällen von Raynaud, in denen Albuminurie beobachtet wurde. Auch hier müssen wir zwei verschiedene Dinge unterscheiden, Fälle mit dauernder und solche mit intermittierender Albuminurie.

Die letztere wurde nur zweimal beobachtet; einmal von Henry in einem Fall, wo auch Hämoglobinurie vorkam, und wo dann zeitweise der Urin zwar dunkel aussah, aber die Untersuchung auf Blut ein zweifelhaftes Ergebnis hatte; einen zweiten Fall beobachtete van der Hoeven; ich kenne ihn nur aus einem Referat, danach handelte es sich um einen typischen Fall von Raynaudscher symmetrischer Asphyxie und Gangrän, in dem der Urin intermittierend Erweiß enthielt; mit der Heilung der Raynaudschen Krankheit schwand auch der Eiweißgehalt des Urins. Der Autor führt ihn auf einen temporären Kontraktionszustand der Nierenarterien zurück. Auch in einem Fall Colsons (s. v.) fand sich eine passagere Albuminurie und ebenso sah Riva einmal vorübergehend Albuminurie. In einer Anzahl von Fällen fand sich dagegen dauernd Erweiß, bald in geringer Menge und zum Teil als Folge einer Herzaffektion (Penny, Atkin, Beale, Bland, Castellino und Cardi, Powell, Colson, eigene Beobachtungen), bald in erheblicher Menge mit deutlichen anderen Zeichen einer schweren Nierenaffektion (Debove, Roques, Haig, Morton, Garland, Kröner, Dickinson und Huber), die mehrmals (Roques, Morton, Jacoby, dessen Fall siehe später), auch durch die Sektion bestätigt wurde. Debove war der erste, der einen solchen Fall berichtet; besonders instruktiv ist der von Roques.

Königliche Fran. Gesellschaft geschrieben, cynisch. Extremitäten kälter, Attemp. Puls klein, teilweise Schwellen. Diese Störungen seit einem Jahr, nach der zweiten Entbindung aufgetreten. Seit einem Vierteljahr auffallendes Blöckchen und Kältegefühl der Finger; drei- bis viermal am Tage ohne Schmerzen; jetzt nur selten Mitle Anzeichen an der großen Zehe. Nach einigen Tagen beiderseits erste und

linde Zete bläulich und schmerzhaft. Arterienpuls fühlbar; die Erscheinungen der Asphyxie locale stamm auch an den Händen. Nach kurzer Remission neuer Anfall mit Gangränbildung. Der Allgemeinzustand hat sich gebessert; im Urin starke Eiweißhalt. Intermittierende Schüttelung, diese verkehrt regelmäßig mit den Erscheinungen der Asphyxie locale ab, der Art, daß sobald das Sekes schlechter wird, eine vorübergehende Linderung der heftigen, die Asphyxie begleitenden Schmerzen eintritt. Im Moment der höchsten Asphyxie ergibt die ophthalmoskopische Untersuchung keine Spur von Retinitis albuminaria; der Augenhintergrund ist normal bis auf eine zufällige Zerstörung der Gefäße, von der er jedoch nicht sicher ist, ob sie pathologisch ist. Die Sektia ergibt Hypertrophie des linken Ventrikels, Vegetationen an der Aortenklappe, Nephritis interstitialis, die Arteriae pulmonales und aortales nicht verändert.

Der Autor betont, daß die Gangrän mit der Herzaffektion nicht in Zusammenhang zu bringen sei, da gegen multiple Embolien der ganze, remittierende Verlauf der Affektion spreche. Andererseits glaubt er auch nicht an eine rein zufällige Koinzidenz, da besonders nach den Erfahrungen von Dieulafoy, der „Doigt mort“ im Laufe einer Nephritis auffällig oft vorkomme, und der Totendfinger stelle ja den ersten Grad der Asphyxie locale dar. Am ehesten müßte man auch hier wieder an einen Reiz der im Blut des an Nephritis Leidenden aufgespeicherter toxischer Produkte, sei es auf die peripheren Gefäße direkt, sei es auf das sie innervierende Centrum denken. Auf die interessante Störung des Sehens, die in Analogie mit ähnlichen, oben schon erwähnten zu setzen sein dürfte, sei in Roques Fall noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

Sehr bemerkenswert ist eine Mitteilung Aitkens. Ein 43-jähriger Mann aus nervös behaueter Familie stammend, bat zuerst im Jahre 1887 vasomotorische Symptome, anfallsweise auftretendes Taubsein, Schmerzen und Cyanose der Endglieder dar, anfangs wurden die Anfälle häufiger, später seltener, aber heftiger. Sie betrafen Finger und Zehen und waren meist doppelseitig, wenn auch nicht absolut symmetrisch, häufig trat Gangrän ein. Seit dem Jahre 1889 bestand eine chronische interstitielle Nephritis, in letzter Zeit waren Zeichen chronischer Urämie vorhanden, Retinitis albuminaria, der Puls war gespannt, aber selbst, wenn die Cyanose einseitig war, zeigte er keine Differenzen zwischen den beiden Seiten. Häufig fand sich etwas Hämoglobin im Urin. Aitken stellte nur fest, daß während der vasomotorischen Anfälle die Harnstoffausscheidung vermindert war, und er nahm an, daß ein Gefäßkrampf nicht allein in den Gefäßen der Extremitäten, sondern auch in denen der Nieren vorhanden war, und daß die Verminderung der Harnstoffausscheidung das Resultat dieses Gefäßkrampfes sei. Die Zahlen, die Aitken gibt, zeigen in der Tat konstant eine erhebliche Verminderung der Harnstoffausscheidung während der Anfälle, meist um 80–120 g.

Auch in dem Fall, den Kröner mitgeteilt hat, bestanden typische

Erscheinungen Raynaud'scher Krankheit. Hier hatte vor neun Jahren eine heftige Nephritis eingesetzt, es ließen sich später bald nur noch minimale Mengen von Eiweiß im Urin nachweisen, aber im Juni 1899 kam ein neuer Anfall der Nierenerkrankung und im August traten vasomotorische Erscheinungen an der Nasenspitze und an sämtlichen Fingern und Zehen auf. Sehr bald kam dazu Gangrän an mehreren Fingern, und vier Wochen später etablierte sich ein neuer Anfall von Asphyxie, dem dann eine stärkere Abschuppung der Haut der betroffenen Teile folgte.

Ich habe früher einen Fall eigener Beobachtung ausführlicher mitgeteilt, bei dem vorübergehend Albuminurie bestand. Ich habe noch zwei weitere derartige Fälle beobachtet, der eine betraf einen 40-jährigen Herrn, der zweite eine 49-jährige Dame. Ihre Krankengeschichte ist folgende:

Vater an Paralyse gestorben; ein Bruder des Vaters rückenmarksleidend, Eltern blutsverwandt. Bis zum 40. Jahre gesund, wenn auch immer nervös. Danach Metrorrhagien, Schwindelgefühl, Herzklopfen von steigender Intensität, März 1910 Myomoperation, seitdem Verstärkung der nervösen Beschwerden, und Anfälle von Asphyxie lokale an den Fingern und fleckweise auch an den Unterarmen, ebenso an den Zehen; seltener Synkope. Anfang Dezember „Nagelbettentzündung“ der zweiten rechten Zehe mit äußerst heftigen Schmerzen. Untersuchung am 11. März 1911. An der zweiten Zehe des rechten Fußes fehlt der Nagel, das Endglied zeigt ein oberflächliches, leicht wucherndes Geschwür; immer noch starke Schmerzen; Asphyxie lokale an verschiedenen Stellen der Finger und Zehen, aber auch der Unterarme und Hände. Car nach rechts und links etwas verbreitert, zweite Töne akzentuiert, Blutdruck 180 mm nach Riva-Rocci, im Urin Spuren von Albumen, normale Menge. Allgemeine nervöse Beschwerden. Ende März leichte Verfärbung des Endgliedes der rechten dritten Zehe, die allmählich zurückging — bei der Entlassung bestand aber hier immer noch eine leichte Cyanose. 8. April. Unter starken Schmerzen wechselnde Cyanose der fünften linken Zehe. 10. April. Die Cyanose ist dauernd und tiefer geworden, sehr heftige Schmerzen. 11. April. Nekrotische Stelle an der Innenseite der linken fünften Zehe. Das Geschwür zeigt eine sehr geringe Heilungstendenz, die Schmerzen lassen nach. Heilung des Ulcus nach sechs Wochen. Fußarterienpulse stets deutlich.

Gibert beschreibt einen Fall Raynaud'scher Erkrankung bei einem vierjährigen Kind, das eine akute Nephritis durchgemacht hatte. Er weist darauf hin, daß in der Ätiologie viele Ähnlichkeiten zwischen Raynaud'scher Krankheit und Nephritis aufzufinden sind.

Es liegt auf der Hand, daß dann, wenn wir im Urin Eiweiß finden, die Diagnose einer Raynaud'schen Gangrän nur mit besonderer Vor-

sicht wird gestellt werden dürfen; insbesondere werden wir auf das Intermittieren im Krankheitsbild zu achten haben, um Verwechslungen mit einer durch Gefäßaffektion direkt bedingten Gangrän zu vermeiden; die Art der Gangrän allein kann uns da keineswegs vor diagnostischen Irrtümern schützen; in den zitierten Fällen von Roques, Kröner, Aitken, Gibert, wie in meinen eigenen dürfte gegen die Diagnose Raynaud'scher Gangrän nichts einzuwenden sein; und ebenso wenig in einzelnen anderen der mitgetheilten (Colson, Debove, Bland u.w.).

Insmerhin werden wir aber auch diese Fälle einer besonderen Gruppe zurechnen, da sie zum mindesten in ätiologischer Beziehung eine Sonderstellung einnehmen; doch soll davon später noch ausführlich die Rede sein.

Für die oben erwähnten Fälle einer intermittierenden Albuminurie wird noch eine besondere Erklärung in Betracht kommen müssen. Es ist wohl denkbar, daß es sich in diesen Fällen nur um das Resultat einer wenig ausgebildeten Hämoglobinnämie handelt, eine Erklärung, die Moure ausdrücklich auf einige der berichteten Beobachtungen anwendet.

In je einem Fall von Raynaud, Hameau, Fox und Leclerc fand sich Zucker im Urin. — In Raynaud's Fall, mitgeteilt in einem Anhang zur These von Brouardel (*Traitement du diabète*, Paris 1869), und später noch in Raynaud's Artikel im *Nouveau Dictionnaire*, bestanden seit acht Jahren anfallsweise Zustände von Asphyxie locale, bis plötzlich sich völlig symmetrisch innerhalb zweier Monate eine Gangränna sicca entwickelte und zu gleicher Zeit ein ausgesprochener Diabetes; Gangrän und Diabetes bedient unter antidiabetischem Regime. — Nach Raynaud handelt es sich um einen nervösen Diabetes. „C'est lui qui agissant comme cause surajoutée est venu transformer en lésion de gangrène les accidents d'asphyxie locale qui avaient déjà altéré les tissus.“ Eine gleiche Entstehungsweise könnte man für einen Fall von Fox supponieren. Wenn es aber schon in diesen Fällen sehr zweifelhaft erscheint, ob man die Berechtigung hat, von Raynaud'scher Gangrän zu reden — man kann wohl besser die Sache so auffassen, daß sich eine diabetische Gangrän in den durch die vorausgehende Asphyxie locale unterernährten Geweben entwickelte —, so darf man in einem viel zitierten Fall von Hameau noch weniger die Diagnose Raynaud stellen, da hier die Gangrän ganz im Einklang mit der gewöhnlichen diabetischen Gangrän eine entschiedene Tendenz zur Progression zeigte. Allerdings soll der Urin anfangs zuckerfrei gewesen sein und erst allmählich Zucker sich eingestellt haben, so daß Hameau von intermittierender Glykosemie spricht. Zudem sollen alle anderen Zeichen von Diabetes zugeföhrt haben. — Über einen gewissen

Grad von Wahrscheinlichkeit wird in allen diesen Fällen die Diagnose jedenfalls nicht hinauskommen.

In einer Beobachtung von Fabre wurde die Glykosurie als sekundäre Folge der Gangrän angesehen. Bei einem 18jährigen Mädchen, das bis dahin an lokaler Asphyxie der Nase, Wangen, des Kinns, der Ohren, der Finger und Zehen gelitten hatte, trat unter Fieber eine Gangrän der meisten Finger und dabei eine Glykosurie auf. Es kam im Verlauf einiger Monate zu mehreren Rückfällen, der Zucker verschwand aus dem Urin, bevor noch die Gangrän geheilt war.

In einer Beobachtung von Radziszewski fand sich bei einem 57jährigen Alkoholisten mit symmetrischer Gangrän der Finger beider Hände neben einem geringen Eiweiß- ein beträchtlicher Zuckergehalt im Urin. Die Deutung dieser Beobachtung ist keine sichere, an der Diagnose Raynaudsche Gangrän wird man erhebliche Zweifel hegen dürfen. Busy erwähnt, daß er in zwei Fällen von Diabetes sehr abgeschwächte Symptome von Raynaudscher Krankheit gesehen habe, auch Apert erwähnt ein solches Vorkommen.

In selteneren Fällen fand sich ein Diabetes insipidus. Raynaud selbst erzählt von einem seiner Kranken, daß er an excessivem Hunger und Durst litt und auch Polyurie hatte. Eine zweite Beobachtung stammt von DeFrance. Es ist zu beachten, daß Polyurie auch bei allgemeinen Nervenosen vorkommen kann, und daß dies Symptom daher gelegentlich der Grundkrankheit angehören kann, mit der sich der Raynaudsche Symptomenkomplex kombiniert hat.

Ganz vereinzelt wurden Raynaudsche Symptome bei zur Gicht neigenden Leuten beobachtet. Daß Haig auf eine „Uricacidsemie“ zur Erklärung der Gefäßspasmen in einigen Fällen rekurriert, wurde bereits erwähnt.

Gewisse Beziehungen zwischen einer individuellen oder familiären Disposition zur Gicht auf der einen Seite und zum Auftreten von paroxysmalen vasomotorischen Erscheinungen vom Typus Raynaud oder auch von anderem Typus (angioneurotisches Ödem Migräne usw.), andererseits sind auch mir mehrfach entgegengetreten. Ich neige mich aber durchaus der Anschauung zu, daß in derartigen Fällen weder nach der einen noch nach der anderen Seite hin das Verhältnis von Ursache und Wirkung vorliegt, sondern daß es sich um Erscheinungen handelt, die auf dem gemeinsamen Boden einer fehlerhaften Anlage sich entwickeln. Der folgende Fall eigener Beobachtung mag als Beispiel für einige ähnliche gelten.

Der 42jährige Pat. gibt an, daß Mutter und Großmutter an Gicht gestorben sind, und daß ein Bruder im Alter von 12 Jahren einem Diabetes erlegen ist. Er hatte als Kind seine Hände viel amputriert, war stets etwas nervös, verlor immer Wärme besser, hatte aber niemals Erfrierungen. Als Kind litt er viel an Kopfwehen. Im Alter von 35 Jahren hatte er einen typischen Gichtanfall im zweiten

und dritten Finger der rechten Hand. Einige Monate später wiederholte sich der Anfall, um endlich auch ein paarmal wiederzukehren und zwar auch an anderen Gelenken (Kniegelenk usw.). Im Alter von 37 Jahren traten besonders bei kühler Wetter Verfallungen auf, in erster Linie Blaufärbung der Hände, die dabei sehr kalt wurden. Seit drei Jahren gesellen sich dazu an den Kuppen der Finger und um die Nägel herum auftretende trophische Störungen: es bilden sich unter heftigen Schmerzen schwarze harte Stellen, in der Größe einer Stecknadelspitze und größer; nach Ablauf von 14 Tagen konnte der Pat. diese dann „streukarten und bröckligen Massen“ beschreiben. Es bleiben kleine Vertiefungen zurück. Nur die Daumen blieben frei. Im Frühjahr dieses Jahres (1907) bildete sich eine tieble Verhärtung am rechten Zeigefinger unter den unglücklichsten Schmerzen; Pat. bekam (sich) Morphium subcutan ohne wesentliche Linderung. In diesem Zustand kam Pat. zu mir. Es fand sich eine gangränöse Partie, die allmählich sich vergrößerte und dann fast die ganze Nagelgegend des zweiten Fingers einnahm. Nach etwa drei Wochen begann unter der nekrotischen Partie etwas Eiter hervorzutreten; erst da liess die Schmerzen zu nachlassen; allmählich hob sich die nekrotische Stelle ab und konnte schließlich mit der Pinzette völlig entfernt werden. Zur völligen Heilung brauchte die kleine Wunde sechs volle Monate. Inzwischen waren an dem anderen Fingern Anfälle von Asphyxia locale immer wieder aufgetreten. Vom Oktober 1907 bis Mai 1908 kam es wieder zu ganz kleinen ohne wesentliche Schmerzen verlaufenden Sekretionsergüssen. Seitdem hat Pat. Ruhe, seine Hände sind kälteempfindlich und zeigen immer noch etwas an Asphyxia. Die Narbe, die die geschädigte, eiter- und blutreiche Ganglia zurückgelassen hat, ist auffällig klein. Die Behandlung bestand in Durchschneidung von großen Dosen Pyrazinol, das die Schmerzen beseitigte. Eisen-Aren-Strychninmischen und Anordnung einer entsprechenden, sehr fleischreichen Diät. Ein Versuch mit Blutsäure-Stanzung mußte wegen der enormen Schmerzen und einer ab und zu eintretenden Schwellung der Hand aufgegeben werden. Das Röntgenbild zeigt an dem entsprechenden Finger deutlich trophische Veränderungen, außerdem an der Gangliophalanx des fünften Fingers eine Veränderung, die auf eine tieftische Affektion dieses Teiles hinweist (siehe Tafel XIII).

Der Patient bietet demnach das Bild einer voll entwickelten Raynaudischen Krankheit, stammt aus gichtischer Familie — bemerkenswert ist auch, daß ein Bruder im Kindesalter an Diabetes starb — und hatte selbst typische Gichtanfälle.

Auch eine Reihe von exogenen chronischen Intoxikationen verdient an dieser Stelle Erwähnung. Sie schaffen freilich alle, wie übrigens auch die eben besprochenen Autointoxikationen komplizierte Verhältnisse, indem sie stets das Gefäßsystem zu schädigen imstande sind und demgemäß eine Abgrenzung von dem im nächsten Abschnitt zu besprechenden Faktoren nicht möglich ist.

Ich erwähne zuerst den Alkoholismus. Ich habe in einem meiner Fälle die Symptome des chronischen Alkoholismus dem Erscheinen der Raynaudischen Krankheit vorausgehen sehen. In der Literatur finde ich noch bei Laurenceaux zwei so aufgefaßte Fälle, von denen der zweite sicher nicht höhergehört, während der erste wohl als Raynaudische Krankheit anzusehen ist. Auch Poirer berichtet einen ähnlichen Fall. Ein übermäßiger Kaffeegenuß wird offenbar mit Recht von Goebel für seine Patientin als ätiologisches Moment an-

gegessen. Diese ein 30-jähriges Fräulein hatte seit ihrem 14. Lebensjahre in zwei Tagen stets ein Viertelpfund Kaffee verbraucht.

Übermäßiger Nixotingenauß war in einem Falle eigener Beobachtung in Rechnung zu ziehen. Zassedahelleff erwähnt dasselbe. Der chronische Saturnismus wird in Fällen von Salnton, Busy, Dorlaux erwähnt. Ich habe einen sehr typischen Fall, der in vieler Beziehung bemerkenswert ist, bei einem Patienten gesehen, der vormals Schriftsetzer, dann Gastwirt war, sich also den Schädigungen des chronischen Saturnismus und Alkoholismus ausgesetzt hatte.

20-jähriger Mann, zum ersten Male untersucht 24. Dezember 1901. Vor sieben bis acht Jahren traten, als er als Schriftsetzer tätig war, ohne daß er je Betäubung gekannt hatte, plötzliche Anfälle von Schmerzen im Leibe auf, die als „Neuralgie der Lebensnerven“ bezeichnet wurden. Es schloß sich an enorm intensive Schmerz-anfälle geknüpft haben, die schließlich bis zu 12 Stunden dauerten, früher durchschnittlich nach 4–5 Stunden aufhörten; sie kamen zweimal täglich, meist in mehrtägigen bis mehrwöchigen Zwischenräumen. Keine Übelkeit, häufiger Stuhlverstopfung. Wenn der Anfall vorbei war, fühlte er sich gesund, nur ein leichtes Unbehagen im Leibe blieb zurück. Der Schmerz war derart, daß er fast wahnsinnig wurde und das Bewußtsein sich verlor. Er bekam keine Morphiumdosen. Die Anfälle dauerten fünf Jahre, dann verschwanden sie ganz von selbst. Schon seit Beginn der Erkrankung hatte er nicht mehr mit Blasen harig gehabt. Seit drei-vierzig Jahren sind neue Erscheinungen aufgetreten. Zunächst wurde jedesmal nach dem Waschen der zweite linke Finger weiß, gelblich, taub. Das ging ein halbes Jahr so, immer betraf die Symphe mit dem zweiten linken Finger. Vor drei Monaten trat dann an diesem Finger eine Asphyxie lokal und schloß sich sehr heftigen Schmerzen wie Gangrän an. Die Asphyxie lokal dehnte sich dann auch auf den dritten Finger und den zweiten und dritten rechten Finger aus. Ödeme, Nae und Fäße blieben frei. Allgemein nervöse Beschwerden bestanden nicht. Der Status ist der folgende. Endglied des zweiten linken Fingers deformiert, Haut-Merit, eingezogene Narbe an der Spitze. Patient hat hier das Gefühl, als ob man auf eine Wunde faßt. Dritter linker Finger dunkelblau, kalt, Nagel nicht verändert. Endphalangen des zweiten und dritten rechten Fingers schwarz, als ob man sie in stehende verdünnte Tinte getaucht hätte. Haut an der Spitze des zweiten Fingers deutlich verhärtet, der übrige Finger ist weiß. Die Sensibilität ist für alle Qualitäten auch für heiß und kalt völlig normal. Schmerzphänomene vorhanden. Pupillen, Lidspalten gleich. An den Beinen nichts außer Plantarhyperästhesie; keine Druckschmerzhaftigkeit der Muskeln und Nervenscheiden. Herz perkutatorisch und auskultatorisch normal, Puls 76 regelmäßig.

17. November 1901. Seit einige Zeit ist auch der rechte Daumen befallen, während der Unterscheidung deutlich Asphyxie im Gesens und in beiden dritten Fingern. Temperaturunterschiede zwischen den einzelnen Fingern sehr erheblich. Am fünften linken Finger 33,9°, am Mittelfinger 17°, am rechten Daumen 20°; bei einer zweiten Prüfung fünfter linker Finger 33,5°, rechter Daumen 23° C bei 17–18° Zimmertemperatur.

25. Oktober 1903. Eine neue Gargula ist nicht aufgetreten. Patient ist seit einem Jahre wieder Schriftsetzer. Das hat ihm nichts geschadet. In der warmen Stube ist alles gut, in der kalten Luft und bei kalter Zimmertemperatur werden dagegen die Finger steif, schmerzen bei Berührung und verhärtet sich weiß und blau. Bei der Untersuchung sind die Finger so kalt, daß man das Gefühl hat, sie anzufassen; dabei sind sie zum Teil heiß (auch auch da sehr kalt), zum Teil kühlt, Alkoholgeruch schließt sich diesem einem Zustand, als die Finger durch selbst über normale Farbe und Temperatur bekommen.

Über die Natur der ersten Schmerzanfälle im Leib kann man sich kein bestimmtes Urteil bilden; ich nehme an, daß sie doch mit der Beschäftigung mit Blei zusammenhängen, atypische Bleikolikfälle darstellen, späterhin dürfte der Patient zweifellos in Alkohol excediert haben. Die vasomotorisch-tropischen Symptome waren sehr ausgeprägt, ebenso die Symmetrie meist scharf akzentuiert. Obwohl gangränöse Stellen im Laufe mehrerer Jahre nicht wieder auftraten, könnte man das Leiden nicht als abgeschlossen betrachten, die vasomotorischen Symptome hielten an und waren für den Patienten dauernd äußerst störend. Die momentan günstige Wirkung des Alkoholgenußes erklärt sich aus dessen gefäßerweiternden Wirkungen.

Es gibt weiterhin Fälle, in denen neben den Symptomen der Raynaudschen Krankheit solche einer organischen Erkrankung des Gefäßsystems sich finden.

Monro machte darüber folgende Zahlenangaben. Er fand in 22 von 180 Fällen irgend eine Abnormalität des Herzgefäßsystems notiert, das ist in 12%; doch ist die Befestigung dieser Veränderungen sehr verschieden. Wiederholt schienen sie nur die gewöhnlichen Begleiterscheinungen der nephritischen Erkrankung zu sein, ein andermal fand sich ein Geräusch am Herzen, das nur auf die Anämie zurückzuführen war. Die beobachtete Tachykardie war mehrenmal nur das Symptom der mit der Raynaudschen Krankheit kombinierten Neurose. Abgesehen von diesen Fällen fand Monro noch zwölfmal Veränderungen des Herzgefäßsystems, das wären 7%. Diese Zahl ist aber sicher zu niedrig gegriffen, wenn wir alle die Fälle in Rechnung ziehen, die als Raynaudsche Krankheit beschrieben wurden, und bei denen sich Arteriosklerose fand. Freilich ist in einem erheblichen Teil dieser Fälle die Diagnose „Raynaudsche Krankheit“ unberechtigt.

Eine organische Erkrankung des Herzens fand Raynaud selbst schon in drei Beobachtungen aus der älteren Literatur (Henry, Godin, Topinard). Eine Beobachtung, die recht geeignet ist, die sich hier darbietenden Schwierigkeiten zu illustrieren, stammt von Celson.

45-jähriges Kind. Vater starb im: Vor einiger Zeit Mütter. Vor sechs Wochen, nachdem das Kind einer Kälteeinwirkung ausgesetzt war, Schwellen in der linken Hand mit Schwellung; am nächsten Morgen trat Gangrän ein. Status praesens 21. März 1904. Kleines Kind; Untersuchung des Herzens ergibt einen Herzfehler. Freistoßnormal, raturale, Celson diagnostizierte eine Insuffizienz des Atriums pedunculale. Die Arterien sind normal. Puls beiderseitig gleich, im Venen etwas Erweitert und einige feine Gefäße; etwas Odem an den Knöcheln; beim Liegen Dyspnoe. An der linken Hand ist die linke Phalanx des vierten und fünften, zum Teil auch der ersten Fingers gangränös, trocken, schwarz, keine deutliche Demarkationslinie, keine Rötung, keine Eiterung; Venenerweiterung an der Vorderseite beider Unterarme. Sensibilität im Gebiet der erkrankten Hand schon vermindert, spontane

Schmerzen in dieser Hand. Rasche Besserung im Krankenhaus. Abheilung des gangränösen Teils, völlige Heilung nach $2\frac{1}{4}$ Monaten. Dann wieder plötzlich Schwellung in den Fingern der linken Hand, diese weißbläulich und eiskalt; der Zustand hielt zwei Tage in solcher Intensität an, um im Laufe von vier bis fünf Tagen allmählich zu verschwinden; auch das linke Oberlid drei Tage lang geschwollen und cyanotisch. Wenig später sah Colson, daß die letzten Phalangen des dritten und vierten linken Fingers sich zu verkleinern anfangen, die Haut wird hier glänzend, glatt, beschämt; das verschwindet nach 10 Tagen am vierten Finger, bleibt am dritten bestehen, dann kommen trophische Störungen der Nägel, diese sind verdickt, unregelmäßig querschnittig. Bald wird auch die Haut am Daumen und Kleinfingerballen glatt und glänzend. Dabei sind die Finger bald heiß und rosa, bald kalt und blaß, bald mit kleinen, runden, roten Flecken bedeckt, bald cyanotisch, kalt und geschwollen. Diese verschiedenen Zustände folgen unregelmäßig und ohne bekannte Ursache aufeinander. In letzter Zeit trat während zweier Tage plötzlich eine große Menge Eiweiß mit einigen hyalinen Cylindern im Urin auf. Nachher ist dieser wieder normal. Der Allgemeinzustand ist jetzt gut.

Hier ist Ätiologie und Symptomatologie eine höchst mannigfaltige; wir haben Maseru, Kälteeinwirkung, einen Herzfehler, schlechten Zustand der Gesamternährung; symptomatologisch sind neben der Gangrän noch andere trophische und eine Vielzahl vasomotorischer Störungen zu beachten, dazu kommt noch die allem Anschein nach intermittierende Albuminurie. Der Verlauf ist deutlich intermittierend. Bemerkenswert ist schließlich noch die Einseitigkeit der Störungen. Jedenfalls werden wir, wie das auch der Autor dieser Beschreibung feststellt, nicht daran denken dürfen, die Gangrän hier als direkte Folge des Herzfehlers — hervorgerufen durch Embolie oder Thrombose — anzusehen, sicher handelt es sich um eine der Raynaud'schen Erkrankung sehr nahestehende Affektion, wenn auch gewisse Abweichungen deutlich hervortreten. Derartige Fälle sind nicht häufig; ich zitiere noch einen von Monroe, in dem eine erhebliche Verengung der Herzaufgang nach links und nach rechts bestand, und in dem von vasomotorischen Symptomen Cyanose der Hände, der Füße, der Nase und der Ohren vorhanden war. Die Cyanose nahm durch die Einwirkung von Kälte, von Bücken usw. zu und war mit einem Abschülfern der Haut der Hände verbunden, die Nägel waren deformiert. Die Beobachtung ist sehr sphaeristisch mitgeteilt, und, wie man sieht, nicht gerade sehr typisch. Weitere Beispiele dieser Kombination finden wir bei Hale White (sehr komplizierter Fall von nicht unzweifelhafter Deutung), bei Bull, Bourcelly.

In anderen Fällen sind die Verhältnisse etwas einfacher zu übersehen. Einige Male waren die Veränderungen am Herzen so wenig ausgeprägt, daß man bei dem Fehlen sicherer anderer Zeichen eines Vitium cordis nicht bestimmt sagen konnte, ob überhaupt eine und speziell welche organische Herzerkrankung vorlag (Haig, Raynaud, Hauptmann). Natürlich ist es ja auch nicht ausgeschlossen, daß beide Affektionen zufällig nebeneinander und unabhängig voneinander

bei demselben Individuum sich finden; einen solchen Fall glaubt Leichtenstern beobachtet zu haben. Auch ein Fall von Garrigues ist so zu deuten. In anderen Fällen ist an die Möglichkeit zu denken, daß die Raynaudschen Symptome und die Herzaffektion einer gemeinsamen Ursache ihre Entstehung verdanken, z. B. einer rheumatischen Affektion. In einer weiteren Reihe von Fällen, unter denen ich die von Pisarzewski und Jacobl nenne, wird man die Diagnose Raynaudsche Krankheit nicht gelten lassen können, sei es, weil über wichtige Punkte nicht genügende Angaben vorliegen oder weil, was gesagt wird, auf einen anderen Ursprung der Gangrän hindeutet. Lévillé hat zwei Fälle von Raynaudscher Krankheit bei Pericarditis beobachtet. Er meint, daß die funktionelle Schwäche des Myokard die Ursache der Raynaudschen Symptome sei.

Sehr bedeutsam sind auch die Beobachtungen, in denen es sich um die Kombination der klinischen Erscheinungen einer Arteriosklerose mit der Raynaudschen Krankheit handelt. Auf das Wort „klinische Erscheinungen“ muß dabei ein ganz besonderes Gewicht gelegt werden; wir werden nämlich später sehen, daß in einer Reihe von Fällen die anatomische Untersuchung eine Arteriosklerose der kleinsten Gefäße ergiebt, die klinisch überhaupt nicht nachweisbar war. Diese Fälle bleiben hier, wo wir es nur mit der Symptomatologie zu tun haben, außer Betracht. Im engen Anschluß an die Beobachtungen mit Arteriosklerose sind diejenigen zu besprechen, in denen Lues vorausgegangen war, da ja gerade diese Infektion sehr häufig Gefäßveränderungen schafft. Immerhin soll dabei nicht übersehen werden, daß die Lues auch noch in anderer Weise in Wirksamkeit treten kann, indem sie teils unmittelbare Folgen der Infektion produziert, oder den Allgemeinzustand verschlechtert, oder schließlich auf das Nervensystem krankmachend wirkt.

Fälle mit allgemeiner Arteriosklerose sind von Bouveret, Bourelly, Jacoby, Osler, Ransom, Kingdon, Porter, Bret et Chaliel, Skop u. a. beschrieben worden. Bourelly hat, wie ich einer Angabe von DeFrance entnehme, der Kombination der Raynaudschen Erkrankung mit der Arteriosklerose seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt und sie in einer These behandelt. Ich selbst habe zwei Fälle dieser Art beobachtet, von denen der eine schon oben ausführlich mitgeteilt wurde. In meinen Fällen konnte an der Diagnose Raynaudsche Krankheit nicht gezweifelt werden. Im übrigen liegt es auf der Hand, daß gerade in diesen Fällen die Erkennung und Klassifizierung des Leidens eine recht schwierige ist, da auch eine andersartige Gangrän Erscheinungen hervorrufen kann, die in sehr vielen Beziehungen den Raynaudschen ähneln. Gerade von Fällen dieser Kombination ist eine große Anzahl beschrieben worden, die nach meiner Ansicht nicht als Raynaudsche Krankheit aufgefaßt werden dürfen. Die

diagnostischen Unterscheidungsmerkmale sollen in dem der Diagnose gewidmeten Kapitel näher auseinandergesetzt werden.

Cursehmann betont, daß auf dem Boden der echten Angina pectoris nicht selten paroxysmale Krampfzustände in den peripheren Arterien der Extremitäten vorkommen, die den genuinen vasomotorischen durchaus ähneln. Gelegentlich ereignen sich solche Zufälle auch ohne gleichzeitige stenokardische Erscheinungen. Er hat in zwei derartigen Fällen die Sektion machen können und fand die vermutete Coronarsklerose. Salvini berichtet von einem 70jährigen Manne, bei dem nach einigen besonders schweren Anfällen von Angina pectoris an Stelle des Krampfes und Engschlaffenseins der linken Hand eine Cyanose und oberflächliche Hautgangrän eintrat, die in drei Monaten heilte. In diesen Fällen haben die Raynaudschen Erscheinungen eine rein symptomatische Bedeutung, in ähnlicher Weise wie wir das oben für die auf dem Boden der Arteriosklerose aufgetretenen Erythromalgiasymptome gezeigt haben. Es gibt in der Literatur noch eine Reihe weiterer Fälle, die zum Teil als Raynaudsche Gangrän bezeichnet wurden, die aber als endarteriitische Gangrän mit vorübergehenden vasomotorischen Reizerscheinungen aufzufassen sind (Spiegler, Necker, Fuchs, Caroten u. a.). Wir kommen darauf noch zurück.

Buxy macht auf die Rolle aufmerksam, die die Aplasia oder besser Hypoplasia arterialis congenita für die Entstehung der Raynaudschen Krankheit spielt. Diese gibt sich schon vor dem Auftreten eigentlicher Raynaudscher Symptome in der Neigung zu Schwindel, Frost, Erfrierungen usw. kund. Davon haben wir in dem der Ätiologie gewidmeten Abschnitt schon gesprochen.

Raynaud berichtet eine Beobachtung von Portal aus dem Jahr 1826 und von Henry aus dem Jahr 1837, in denen in der Anamnese Lues erwähnt wurde, doch hat Raynaud diesem Zusammenkommen keine Bedeutung beigelegt. Erst viel später ist man darauf aufmerksam geworden, daß in einer nicht geringen Anzahl von Fällen die Lues anamnestisch nachweisbar ist. Nach DeFrance hat Liston ebenfalls im Jahr 1836 eine Beobachtung veröffentlicht, die vielleicht als Raynaudsche Krankheit zu deuten ist, und bei der sich Lues fand. Von den späteren Autoren, die über diesen Punkt berichtet haben, seien genannt: Amann, Castellino und Cardi, Elsenberg, Fordyce, Giovanni, Germer, Jacoby, Klotz, Morgan, der wohl der erste war, der den Zusammenhang beider Affektionen — im Jahre 1889 — betonte, Irwin Morton, Nash, Puzey, dessen Beobachtung aber zu Unrecht der Raynaudschen Erkrankung zugerechnet wird, Riva, Tennton, Balzer et Fonquet, Lustgarten, eigene Beobachtung, Phelps. Dazu kommen noch eine Anzahl Fälle, in denenluetisch-luetische Kranke von der Raynaudschen Krankheit befallen

wurden. Es sind die Beobachtungen von Hutchinson, Marsh, Humphrey, Krizowski, Young, Wherry, Dyce-Duckworth, Pasteur, Rietschel, Schiff, Spieler, Stöltzner. In den Fällen hereditärer Lues tritt nur ausnahmsweise mit Bestimmtheit hervor, daß die Raynaudsche Krankheit eine Folge der Lues ist. Als Beispiel dafür kann der von Krizowski angegebene Fall dienen.

2jähriger Knab, hereditäre Lues, Binneauschlag. Im Februar 1894 im Freien und nachher noch 1–1½ Stunden im Zimmer wurden die Hände des Kindes ganz blau und empfindungslos, ebenso die Füße und die Ohrenschalen. Allmählich wurden die blauen Teile cyanotisch und schmerzhaft. Über Nacht kehrte die normale Färbung wieder. Gegen Mitte April wurden die Ohren wieder cyanotisch und blieben es beständig, bis Anfang Mai an dieser Stelle schwarze Blasen auftraten. Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Darckhülle, Erbrechen, Fieber. Status praesens am 25. Mai 1894. Augen normal, Herztätigkeit klein, Herzton rein, Puls 108, Arterien weich, Leber, Milz vergrößert, hart, Dehnungsschmerzen, der Urin ist dünn, Hantische im allgemeinen bläß, Ohrenschalen weißlich, die oberen Partien fast schwarz, an beiden Halsen exzessiv symmetrisch gangränöse Stellen von Bohnengröße, nur die Haut betreffend, funktionslos, festhaft. Nach 12 g Quersilber und 6 g Jodkal sind die Ohrenschalen normal, an Stelle der Gangrän finden sich nur oberflächliche Narben; es war keine lokale Therapie in Anwendung gewesen worden.

Diese Beobachtung läßt an Exaktheit nichts zu wünschen übrig, sie stellt einen klassischen Typus der Raynaud'schen Krankheit dar und ein Zweifel daran, daß die hereditäre Lues hier eine bedeutsame Rolle gespielt hat, ist bei der Wirksamkeit der antisypilitischen Therapie kaum angebracht. Freilich ist zu bedenken, daß auch spontan, namentlich gerade bei Kindern, die Raynaudsche Gangrän rasch zur Heilung gelangt. In manchen anderen Fällen ist der Zusammenhang bei weitem kein so enger, und meist ist die Wirksamkeit der Lues wohl nur in der durch sie bedingten Verschlechterung des Allgemeinzustandes zu suchen. In einem schon erwähnten Fall von Rietschel bestanden Raynaudsche Symptome neben paroxysmaler Hämoglobinurie auf dem Boden der Lues. Wie ich aus einer gütigen brieflichen Mitteilung von Herrn Prof. Neumann-Berlin weiß, hat auch er mehrfach bei Kindern die Lues als ätiologisches Moment der Raynaud'schen Krankheit erkannt und unter diesen Umständen durch antisypilitische Behandlung Heilung erzielt. Daß die Diagnose auch hier mit Vorsicht gestellt werden muß, ist besonders zu betonen. Einzelne der mitgeteilten Fälle sind keine Raynaudsche, sondern unilaterale Gangrän (Schiff).

Was die erwarbene Lues anbelangt, so sind die Autoren, die diese Kombination erwähnt haben, bereits genannt. Die Zahl, die Mouré hier anführt, bleibt sicher weit hinter der Wirklichkeit zurück, er hat nur 2,8% ausgerechnet. Eher schon stimmt die von Castellano und Cardi genannte Zahl. Diese geben eine Zusammenstellung, wonach sich unter 366 Fällen von Kranken mit Raynaud 22 mal Lues fand,

Die einzelnen Fälle haben eine sehr verschiedene Bedeutung. In einigen von ihnen finden wir einfach die Tatsache verzeichnet, daß zu irgendeiner Zeit einmal bei der betreffenden Person Lues vorausgegangen ist; damit werden wir nicht viel anfangen können. Demgegenüber gibt es dann Fälle, in denen der klinische Nachweis einer auf dem Boden der Syphilis entstandenen Gefäßerkrankung geführt wurde, und ferner solche, in denen durch den Erfolg der antisypilitischen Behandlung der Nachweis des syphilitischen Ursprungs der als Raynaudsche Krankheit aufgefaßten Symptome wahrscheinlich gemacht wurde.

Morgan's Fall, an dem dieser Autor zuerst die Beziehungen zwischen Lues und Raynaud'scher Erkrankung studierte, ist einer von denen, die am schlagendsten den Zusammenhang beider Affektionen zu demonstrieren geeignet sind.

35-jähriger Mann, aus gesunder Familie. Vor sechs Jahren stieß Lues mit Sekundärschönheiten. Zuletzt Knochenschmerzen im ganzen Körper, nachts stärker, dann Bienen in den Fingern und Ohren und Gefühl von Kälte, dabei Abnahme der Berührung- und Schmerzempfindlichkeit. Die betroffenen Teile sehen ganz weiß aus, und die Blässe steigt in Anfällen zu. Dauer dieser Periode sechs Wochen, dann wurden die Finger rötlich, später bald schwarz, ebenso auch die Nägel; zugleich damit Aufsetzen von Schmerzen; die Fächerveränderung erstreckte sich periodisch abwechselnd bis zum Hand-Fingergelenk. Nach einigen Tagen Bildung von Geschwüren, Ohren zum Teil purpurn, Nase bläulichschwarz, vom Ohr strömen sich kleine eitrige Stöckchen ab. Arterien der Betina eng, aber keine nennenswerte Verengung. Antisypilitische Behandlung brachte sofort Besserung, die Anästhesie verschwand, die gangränösen Stellen stießen sich ab und vernarben. Die Farbe wurde wieder normal. Nach einigen Monaten wegen fortgesetzter Kopfschmerzen erneute antisypilitische Behandlung mit gutem Erfolg.

„Die Raynaud'schen Symptome erschienen hier als Manifestationen der tertiären Syphilis, indem sie gleichsam die Knochenschmerzen ersetzten.“ Morgan ist geneigt, auch in diesem Fall an der Berechtigung der Diagnose „Raynaudsche Krankheit“ zu zweifeln, weil strukturelle Veränderungen tardiver Syphilis da waren und die Erscheinungen so rasch auf antisypilitische Behandlung verschwanden. Ich glaube nicht, daß diese Bedenken ausreichend sind.

Die Symptome der Raynaud'schen Affektion weichen in diesem Fall kaum von dem typischen Bilde ab; bemerkenswert ist höchstens die Tatsache, daß von vornherein die vasomotorischen Symptome dauernd vorhanden waren, wenn sie sich auch anfallsweise akzentuierten; auch dies Moment genügt aber nicht, um die Diagnose zu erschüttern.

Im ganzen sind Fälle, die dem geschilderten gleichen, durchaus nicht häufig. Ähnliche Beobachtungen verdanken wir noch Jacoby, Klotz, Morton, Lustgarten, Phelps, in dessen Fall die Wirksamkeit der antisypilitischen Therapie zugunsten eines engeren Zusammenhanges spricht. Andere Fälle sind nicht von derselben Beweiskraft.

kraft. In dem Fall von Eisenberg, der durch Sektionsbefund ausgezeichnet ist, hatten sich die vasomotorischen Prodrome der Schilderung nach ziemlich abweichend gestaltet. Die Entwicklung scheint, in dem größten Teil des Verlaufs wenigstens, keine intermittierende, sondern eine chronisch-progressive gewesen zu sein, die gangränösen Stellen sind außerordentlich multigel (zahlreiche Stellen an Wangen, Händen, Unterschenkeln). Die Sektion ergab zum Teil eine Arteriitis gummosa, zum Teil einfache Verdickung der Gefäßwände und Adhärenz der Gefäße. In einem Fall von Giovanni war, soweit sich dem mir zu Verfügung stehenden Referat entnehmen kann, der Verlauf ebenfalls chronisch, und die Heilung erfolgte unter allgemein robotisierender Diät. Übrigens war hier Arteriosklerose klinisch nachweisbar, und im Urin fand sich etwas Eiweiß. Es mag im Anschluß daran bemerkt werden, daß Eiweiß sich in einer ganzen Anzahl von Fällen von Kombination der Raynaudschen Krankheit mit Herz- und Gefäßaffektionen nachweisen ließ.

Kann man bei derartigen Fällen betreffs ihrer Zugehörigkeit zur Raynaudschen Affektion noch zweifelhaft sein, so ist eine solche in anderen Fällen (Ornellas, Schuster, Puzey) ohne weiteres zurückzuweisen. Im Fall von Ornellas war z. B. der Puls abgeschwächt, und es handelte sich um eine progressiv fortschreitende Gangrän. Daß ein Kleinerwerden der Pulswelle in gewissen Arterien auch bei Raynaud vorkommt, haben wir ja schon erwähnt, doch liegen in solchen Fällen immer nur temporäre Zustände vor, wie auch in den höhergehörigen Fällen von Lustgarten und Phleps. Wenn Balzer und Fouquet im Anschluß an einen einschlägigen beobachteten Fall davon sprechen, daß das Luostoxin durch Vermittlung des Nervensystems die Gangrän hervorrufen soll, so ist das eine ganz unbezogene Vermutung.

Überblicken wir noch einmal das zuletzt Gesagte, so stellt sich uns als Resultat folgendes dar. Es gibt einige wenige Fälle, in denen neben den typischen Raynaudschen Symptomen scheinbar unabhängig ein organisches Herzleiden vorliegt. Es gibt ferner ebenfalls seltene Beobachtungen, in denen neben einer Arteriosklerose die Erscheinungen der Raynaudschen Krankheit in typisch intermittierender Weise beobachtet wurden; und es gibt Fälle, in denen bei Personen mit einer akquirierten oder hereditären Lues und bisweilen einer wahrscheinlich durch diese bedingten spezifischen Gefäßerkrankung typische oder fast typische Erscheinungen Raynaudscher Erkrankung sich entwickeln und unter dem Einfluß spezifischer Therapie wieder verschwinden. Es sind daneben aber eine beträchtliche Zahl von Beobachtungen unter dem Namen Raynaudsche Erkrankung resp. Symptome

publiziert worden, die in der einen oder anderen Richtung vom klinischen Bilde dieser Krankheit erheblich abweichen und deshalb zu Unrecht ihr zugerechnet wurden.

In einer weiteren Reihe von Fällen, in denen über Raynaudsche Krankheit berichtet wird, finden wir zugleich noch Symptome, die auf eine Erkrankung des zentralen oder peripheren Nervensystems hinweisen.

Wir beginnen mit der Besprechung der Beobachtungen, in denen sich Symptome eines organischen Hirn- oder Rückenmarksleidens fanden. Am häufigsten war es ein Symptom einer Hemiplegie (Hochenegg, erster Fall, Raynaud II. Arbeit, dritter Fall, Reader, Bernstein, Osler, Scheiber, Simpson, Dukeman). Briessaud et Salin sahen neben einer allmählich entstandenen Pseudohalbparalyse typische Raynaudsche Erscheinungen, Nadaschew beobachtete sie bei *Dementia paralytica*, ebenso Iseveico, der in drei Fällen allerdings nur Asphyxie locale-Anfälle sah. Hydrocephalus sah Barlow in zwei Fällen, ferner Brengues in Verbindung mit einer anatomisch nachgewiesenen Pericerephalitis chron. und einer leichten Sklerose des Rückenmarks und Monro. Gliosis fand Hochenegg (zweiter Fall), Gowen (schon im Jahre 1873), vielleicht lag auch in Braumanns Fällen eine solche vor, auch Pospelow beschreibt Syringomyelie mit Symptomen Raynaudscher Erkrankung, ferner Chiavutini, Tedesco; Tabes dorsalis fanden Hochenegg (dritter Fall), Kornfeld, Perrin; Strauß sah die Kombination mit multipler Sklerose, Bride in einem Fall die Symptome einer späten Vorderhornkrankung, Calman einmal die eines Tumors medullae spinalis, in einem zweiten Fall sah er einen Tumor der Cauda equina, ebenso beobachtete Schlesinger einen Tumor medull. spin. mit Raynaudschen Symptomen (derselbe Fall wie Calman?). Das Zusammenvorkommen von Raynaud und Pachymeningitis cervicalis hypertrophica erwähnt Busy, das mit einer Radiculitis chronica syphilitica Gilbert et Villaret. In diesem Zusammenhang erwähne ich noch eine Beobachtung von Sudeck, der nach einer Lumbalanästhesie mit Novocain-Suprarenin eine auf das Gebiet des N. peron. superficialis sich beschränkende symmetrische Gangrän entstehen sah. Wir finden hier also die mannigfachsten Affektionen vertreten. Es bedarf einer genaueren Analyse der einzelnen Fälle, um festzustellen, in welchem Verhältnis die beiden Symptomgruppen zueinander stehen; auch hier werden wir es, wie schon in vorhergehendem Abschnitt, nicht vermeiden können, Dinge zu besprechen, die das Kapitel Diagnose berühren, da wir für die betreffenden Fälle uns immer erst über die Berechtigung der Diagnose „Raynaudsche Krankheit“ informieren müssen.

Einen typischen Fall von Asphyxie locale bei einer 62jährigen Frau, die zwei Jahre früher eine im Verlauf weniger Tage vorübergegangene Hemiplegia sin. erlitten hatte, beschreibt Raynaud selbst. Die Symptome der Asphyxie und Gangrän waren durchaus symmetrisch, Herz und Gefäße waren normal. Hier kann man die beiden Affektionen kaum in Beziehung zueinander bringen, höchstens könnte man, trotz der ausdrücklichen Angabe, daß das Herzgefäßsystem normal war, doch wegen der Hemiplegie an eine leichte Arteriosklerose denken, und man müßte den Fall dann der oben behandelten Gruppe zurechnen, in der geringe arteriosklerotische Veränderungen des Raynaudschen Symptomen vorangingen. Es wäre ja noch eine zweite Auflösung möglich, die nämlich, daß die rasch vorübergehende Hemiplegie ihre Ursache in einer lokalisierten Gefäßkontraktion an der betreffenden Stelle des Großhirns gehabt hätte; dafür spricht einigermaßen der rasche Verlauf dieser Affektion. Wir hätten es dann mit derselben Erscheinung zu tun, wie wir sie in der transitorischen Aphasie im Fall Weiß oben bereits kennen gelernt haben. Die Diagnose Raynaudsche Krankheit erscheint mir auch in einem Fall von Simpson (Edinb. med. Journ., 1893, I, Fall 1) sicher; die Hemiplegie trat hier ein, nachdem schon über ein Jahrzehnt lokale Synkope in Anfällen vorangegangen war, und auch Anfälle von lokaler Cyanose waren eher da, als die Hemiplegie, die übrigens auch hier eine leichte war; über eine Bevorzugung der hemiplegisch affizierten Seite durch die Raynaudschen Erscheinungen erfahren wir nichts, auch sonst ergibt sich kein Anhaltspunkt für die Auffassung, diese als Symptom der Hemiplegie anzusehen; auch für die umgekehrte Annahme ist eine Stütze in der Krankengeschichte nicht zu finden. Osler berichtet einen Fall, in dem transitorisch neben den Erscheinungen von einseitiger Asphyxie und oberflächlicher Gangrän an einigen Fingern vorübergehende Anfälle von erst rechtsseitiger Hemiplegie mit Aphasie, dann auch von linksseitiger Hemiplegie auftraten. Nach einigen Monaten erfolgte unter Ausbildung einer rasch sich bis zum Ellbogen ausdehnenden Gangrän der Tod im Coma; doch mußte eine Sektion leider unterbleiben, so daß eine völlige Aufklärung des komplizierten Falles nicht zu geben ist. Der Autor selbst betrachtet die Hemiplegie und Aphasie als „*referred complication of Raynaud's disease*“.

Interessant, aber leider nur etwas fragmentarisch mitgeteilt, ist eine ähnliche Beobachtung Dukemans. Eine 57jährige Frau war bis vor kurzer Zeit gesund, nach einer Indigestion wird sie erregt, schlaflos, ruhelos, ängstlich. Der linke Ringfinger schwillt bis zum zweiten Gelenk an, wird cyanotisch, kalt, die Sensibilität ist für Schmerz aufgehoben. Am nächsten Tage finden sich vier symmetrische Flecken auf der Außen- und Hinterseite der rechten Wade, in zwei Wochen wird die Haut des affizierten Fingers nekrotisch unter scharfer Demar-

kation, die Flecken am Bein verschwinden. Nach drei Wochen ist alles geheilt, aber 14 Tage später tritt eine Kräfteabnahme ein, eine rechtsseitige Hemiplegie stellt sich ein, es kommt zu einer Gangrän am rechten vierten Finger, und die Kranke stirbt nach 16 Tagen im Coma. Herz, Gefäße, Nieren dauernd normal. Keine Sektion. Auch die folgende Beobachtung von Brissaud et Salin ist recht bemerkenswert. 67jährige Frau. Seit Beginn der Menopause Mitte der fünfziger Jahre vasomotorische Störungen in den Extremitäten, Asphyxie und Sykops locale, später Veränderungen der Haut im Gesicht und an den Händen im Sinne einer Sklerodermie und Sklerodaktylie. Seit einigen Monaten zunehmende Schwierigkeit zu sprechen, zu schlucken, Speichelfluß. Bei der Untersuchung finden sich einerseits die Erscheinungen der Raynandschen Krankheit zusammen mit Sklerodaktylie und Sklerodermie, andererseits die der auf arteriosklerotischen Veränderungen beruhenden Pseudo bulbärparalyse. Man muß in diesen Fällen doch immer wieder an eine genetische Zusammengehörigkeit der funktionellen vasomotorisch-trophischen und der organisch-arteriellen Veränderungen denken.

Im Gegensatz zu diesen Fällen ist die Diagnose Raynandsche Krankheit in Hocheneggs erstem und in Badders Fall höchst zweifelhaft, und in Schellbers Fall, wo es sich um einen chronisch-progressiven Zustand handelt, sicher zurückzuweisen.

Über die zwei Fälle von Raynandscher Krankheit bei Hydrocephalus, die Barlow gesehen haben will, stehen mir zu einer Beurteilung ausreichende Notizen nicht zur Verfügung. Brengers Fall soll wegen der an den peripheren Nerven gefundenen Veränderungen später besprochen werden. In einem Fall von Monro, wo von Jugend auf Störungen der Circulation in der Haut bemerkt wurden und später Symptome eintraten, die den Raynandschen ähnlich waren, ohne doch namentlich in ihrer Entwicklung mit ihnen übereinzustimmen, bestand neben anderen Wachstumsanomalien (Tracheocele, Deformität des Gaumens) auch kongenitales Hydrocephalus; eine Abhängigkeit der Symptome von Asphyxie und Gangrän vom Hydrocephalus ist nicht anzunehmen, auch Monro selbst macht diese Annahme nicht.

Ein besonderes Interesse bieten die Beziehungen zwischen Raynandscher Krankheit und Syringomyelie. Wie schon erwähnt, soll Gowers bereits 1873 ein Zusammenvorkommen von Syringomyelie und Raynaud beschrieben haben; doch gab es ja 1873 überhaupt noch keine sichere Symptomatologie der Syringomyelie. Als wichtigster Beleg für das Zusammenvorkommen von Syringomyelie und Raynaud bzw. sogar für die Entstehung der Raynandschen Erscheinungen als Symptom der Syringomyelie wird aber immer der Fall von Hochenegg (l. c. S. 601ff.) angesehen.

Wenn wir auf ihn näher eingehen, werden wir sehen, daß die Diagnose Raynaudsche Krankheit hier völlig ungebracht ist.

51jähriger Mann von früher Jugend an starke Skoliose. Vor sechs Jahren angeblich Schwinde im rechten Bein, die sich zunahm, nach einiger Zeit Abnahme des Tastetakt, schließlich auch der Muskelkraft im linken Arm. Vor 14 Tagen plötzlich ohne bekannte Veranlassung und ohne irgendwelche Schmerzempfindung Ausbuchtung der linken Hand und des linken Vorderarms. Haut hier bläulich. Status praesens am 2. Februar 1924. Skoliose. Kopf auffallend groß. Pupillen gleich weit, Reaktion prompt. Linker Vorderarm vom Übergang des oberen zum mittleren Drittel auf ganze linke Hand sehr stark geschwollen und milchig. Hand bläulich, in der Vola manus Epidermis in einer großen Blase abgelöst. An der rechten Hand Mittelfinger mit stark verdickter und verdickter Endphalanx, Nagel verdickt; im rechten Bein Muschelschwärze; sonst andere Extremitäten normal. Anamnese und Thermoanamnese zu der ganzen oberen Extremität und an beiden oberen Extremitäten, am linken Arm „kann auch nicht die kleinste Stelle aufgefunden werden, wo Gefäßperipherien erfolgen.“ „Elektronenkalare Erregbarkeit normal.“ Es besteht Fieber. Zwei Tage später an der rechten Hand Daumen und Zeigefinger, erstere nur im Bereich der ersten Phalanx, stark geschwollen, bläulich, brist. Am nächsten Tage Tod unter Kollapsoerscheinungen. Die Sektion ergibt eine typische hochgradige Gliomatose mit Höhlenbildung, besonders stark in der Höhe des Hals- und oberen Brustmarks; die Nerven des Homs brachialis waren beiderseits, mehr nach links teilweise atrophisch; nirgends für Nervenzusammenhangs Befunde.

Ich brauche wohl kaum zu begründen, warum man auch unseren Auserkennungen von der Art der Raynaudschen Symptome im vorliegenden Falle nicht von dieser Affektion sprechen darf. Die an der rechten Hand vorhandenen vasomotorischen Erscheinungen entsprechen durchaus nicht dem, was wir bei Raynaud sonst sehen. Die Gangrän an der linken oberen Extremität, über deren Entstehung nichts Sicheres bekannt ist, nimmt im Verlauf von wenigen Tagen einen sehr großen Umfang an, von einem Intermittieren der Erscheinungen ist keine Rede; es fehlen die Schmerzen. Daneben finden sich die Erscheinungen von seiten des Rückenmarks so ausgeprägt, daß wenigstens bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse die Diagnose Gliosis trotz der nicht vollständigen klinischen Untersuchung sich sofort ergibt. Es liegt somit keinerlei Veranlassung vor, die hier im Gebiet der schweren spinalen Läsionen beobachteten trophischen Störungen von den so häufigen Störungen ähnlicher Art, wie wir sie sonst bei Gliosis beobachten, abzutrennen und als Raynaudschen Symptomenkomplex aufzufassen.

Schlesinger¹⁾ betont in seiner Monographie der Syringomyelie ausdrücklich, daß es auffällig sei, „daß der von Raynaud beschriebene Symptomenkomplex bisher so wenig Beachtung in der Literatur der Syringomyelie gefunden hat, obwohl es unzweifelhaft Fälle gibt, welche dieses Symptom als auffallendstes zeigen.“ Nach

¹⁾ Schlesinger, Die Syringomyelie. H. A. H. Wies. 1902, S. 24.

Schlesinger wurde von Gilles de la Taurette und Zagnelmann eine eigenartige Gangränform beschrieben, die bei einem Syringomyeliker durch 20 Jahre alljährlich spontan auftrat und die Kuppen der sämtlichen Fingerspitzen betraf. Diese und eine von Schüppel beschriebene Form, bei welcher es zu einer spontanen Gangrän der Kuppe des rechten Zeigefingers kam, rechnet Schlesinger zur Raynaudschen Krankheit, ob mit Recht, kann ich nach den vorliegenden wenigen Notizen nicht sagen. Dagegen muß ausführlicher eine Beobachtung von Paspelow mitgeteilt werden, in der es sich in der Tat um typische Raynaudsche Symptome handelte.

Stärkster Anfallsanfall, in der Jugend Malaria. Dezember 1894 schmerzhafte Paronychien, die schwer heilen, vorher schon Fingerteile und Crura der Hände und der Nase, besonders im Winter.

Status praesens im Dezember 1895: Leichte Sklerose, Hände kühl und symmetrisch, besonders die rechte, die kälter und feuchter als die linke ist. Hauttemperatur rechts 32,2°, links 34°. Haut stark gespannt, glatt, glänzend, Muskeltrophie mit Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit. Starke Anästhesie besonders für Schmerz und Temperatur; rechte Papille enger als linke, Steigerung der Patellarseizung. Nach einigen Monaten traten zeitweilig außerordentlich heftige Schmerzen der rechten Handfläche mit Apoplexie, besonders des Zeig- und Mittelfingers ein. Hauttemperatur lokal stark herabgesetzt, rechts 32,2°, links 34°, starkes Schütteln.

Im späteren Verlauf waren hier auch einmal Symptome von Erythrozytenfähe vorhanden, die wir schon oben mitteilten. Da außerdem auch noch Zeichen von Sklerodermie vorliegen, ist die ganze Beobachtung äußerst bemerkenswert. Maixner berichtet ebenfalls einen Fall von Raynaudschen Symptomen bei Gliosis. In drei von Bramann mitgeteilten Beobachtungen, die drei Geschwister betreffen, handelt es sich vielleicht auch um eine Kondensation von Raynaudschen Symptomen und Gliosis, doch ist die Diagnose hier in beiden Beziehungen unsicher.

Den Bramannschen Fällen ähnlich sind die von Bruns beobachteten, bei denen von fünf Kindern einer Familie vier unter den Erscheinungen einer langsam progressiven Syringomyelie des Sarralmarks erkrankten; neben ulcerativen fanden sich stets zum Teil symmetrisch auftretende, schwere gangränöse Prozesse, aber ohne charakteristische Raynaudsche Symptome. In dieselbe Gruppe gehören auch die Beobachtungen von Oehlecker, bei denen es sich ebenfalls um eine eigentümliche atypische familiäre Form der Syringomyelie der untersten Rückenmarksteile zu handeln scheint. Auch die Familie Nékam scheint hierher zu gehören und nicht zur Raynaudschen Krankheit.

Über McBrides Fall (Poliomyelitis ant. ant.) vermag ich nach den mir zugänglichen Referaten nicht zu urteilen. Eine zweifelhafte Tabes dorsalis soll in einem weiteren Fall von Hochenegg die Grundlage für Raynaudsche Symptome abgegeben haben; auch für diesen Fall

scheint mir die letztere Diagnose nicht die richtige, wenn man eben nicht dem Krankheitsbild eine ganz unzulässige Erweiterung angedeihen lassen will. Auch hier gehören die Erscheinungen vielmehr in die Kategorie derjenigen trophischen Störungen, die wir bei der Tabes sowohl als noch häufiger bei der Syringomyelie sehen. Die Entwicklung und der Verlauf dieser Störungen ist von dem bei wirklicher Raynaud'scher Erkrankung zu beobachtenden entschieden wesentlich verschieden; im übrigen kann man auch in diesem Fall von Hochsinnig eher an Ghosis (lambalis?), denn an Tabes denken. Kornfelds Fall gehört insofern nicht hierher, als sich neben der Tabes eine doppelseitige akute Neuritis fand, auf die auch der Autor selbst die Gangrän zurückführt, in Perrins Fall bestand neben einer beginnenden Tabes eine Arteriosklerose. Der Fall gehört demnach eher in die Gruppe Gefäßerkrankungen und Raynaud'sche Symptome.

Im strikten Gegensatz zu den letzt erwähnten Fällen, in denen jedesmal die Diagnose Raynaud nicht aufrecht zu erhalten war, stehen zwei von Calman mitgeteilte Beobachtungen, in denen die betreffenden Erscheinungen allen diagnostischen Anforderungen durchaus entsprechen. Wir geben die erste dieser Beobachtungen etwas ausführlich wieder.

21jähriger Mann. Seit einem Jahr Krampfschmerzen, Schübe in den Beinen, und drei Monaten objektive Sensibilitätsstörungen. Vasomotorische Störungen seit einigen Monaten. Status praesens: Blasenmastdarmfunktions. Menstruelle Schübe beider Beine, Sensibilitätsstörung in den unteren Extremitäten. Patellarseiznen fehlen. Kein Eiweiß im Urin. Zeitweilig flüchtige Ödeme in den Füßen. Symptomatische Raynaud'sche Krankheit aufsteigend, erst Synkope, dann Uremie, einige Male symmetrische, gangränisierende Stellen. Anfangs besonders auch nach typische Ödeme von Erythromyalgie. Tod an Pneumonie. Sektion: Tumor ausgehend von den Wurzeln des dritten und vierten Lendenmarkes, Kompression der Rückenmarks, periphere Nerven mäßig degeneriert, entsprechend den Rückenmarkveränderungen. Gefäße durchgängig. Wunde nur unwesentlich verändert.

Ähnlich ist das Bild in Calmans zweitem Fall. Calman nimmt zur Erklärung an, daß ein vom Rückenmark ausgehender Reiz vom krankhaften Kontraktion der kleinen Gefäße bedingt hatte.

Eine ähnliche Beobachtung verdanken wir Schlesinger (vielleicht handelt es sich um dasselbe Falle, die Calman publiziert hat). Dieser hat typische Raynaud'sche Symptome in einem Fall von Sarkom der Rückenmarkshäute am distalen Ende des Vertebralkanals beobachtet. Sie traten hier monatelang auf, und die Diagnose des Rückenmarkstumors wurde anatomisch erwiesen. Es war zuletzt zu symmetrischer Gangrän der Zehen gekommen, die Obduktion zeigte, daß die Gefäße keine anatomische Läsion aufwiesen. In einem zweiten Fall hat der Autor bei einem nur klinisch beobachteten, dem ersten bis auf die Einzelheiten sich anschließenden Falle ebenfalls durch Monate

diese Symptome gesehen. Er bezieht sie auf eine passagere Warzelreizung, und zwar auf Reizung der vasomotorischen Fasern (lokale Synkope) mit konsekutiver Lähmung derselben. Es handelt sich nach seiner Ansicht nicht um zufällige Kombination der beiden Krankheiten, denn das Auftreten der vasomotorischen Störung fiel zeitlich mit dem Manifestwerden anderer Rückenmarkssymptome zusammen, und die Affektion zeigte sich nur an den unteren, auch sonst allein betroffenen Extremitäten.

Gilbert et Villaret teilen die folgende Beobachtung mit:

Da Klühöfer Mann, der häufig, ebenso wie zwei seiner Brüder an Fingereckelungen gelitten hatte und dessen Vater seit 20 Jahren im Winter kalt, weiß und unempfindlich waren, bei dem seit derselben Zeit regelmäßig im Januar die Nägel der großen Zehen abfallen, stift im letzten Jahr zwei Unfälle, einmal eine Verletzung der beiden äußeren Zehen des rechten Fußes, drei Monate später einen Erguß in das rechte Kniegelenk, erkrankte soll das rechte Bein einschlafen, an Kraft abnehmen und dünner werden. Vor 14 Tagen stellte sich an der Innenseite beider großen Zehen eine Entzündung ein, und Schmerzen an der Hinterseite des rechten Beines. Die Untersuchung ergab eine gangränöse Stelle an der Innenseite der großen Zehen, rechts stärker als links mit Ödem an beiden Unterschenkeln und Füßen, außerdem Sensibilitätsstörungen an beiden großen Zehen und darüber hinaus am Fußrücken und am rechten Unterschenkel. Die Lymphknoten ergaben Lymphödem und erhöhten Erythrophakt. Es trat allmählich nach wiederholten Lumbalpunktionen Heilung ein.

Die Autoren lehnen mit Recht die Diagnose Raynaud'sche Krankheit ab; sie nehmen eine durch Reizung der hinteren Warzeln bedingte neurogene Gangrän an, deren Entstehung durch eine vorhandene familiäre Disposition, die in einer erhöhten Vasalabilität bestand, begünstigt wurde. Die Affektion der hinteren Warzeln war ätiologisch nicht aufzuklären. Die Autoren dachten an eine hereditär-syphilitische Erkrankung.

In einer Beobachtung, die ich selbst machen konnte, fand ich das Symptom der paroxysmalen lokalen Asphyxie neben Krankheitserscheinungen von seiten des Nervensystems, die eine bestimmte Diagnose nicht stellen ließen. Wir mußten zwischen Gliosis und Tabes schwanken und konnten sogar nicht einmal sicher ausschließen, ob sich nicht vielleicht doch das ganze Krankheitsbild nur als Neurose erklären ließ. Wir kommen auf diesen Fall seines großen diagnostischen Interesses wegen noch zurück. In einer Beobachtung Hutchinsons fand sich einmal Ungleichheit und Lichtstarre der Papillen, in einer Beobachtung Monros war die eine Pupille beträchtlich weiter als die andere.

Strauß berichtet folgenden Fall.

Bei einer 26jährigen, seit fast 6 Jahren an den Erscheinungen einer multiplen Sklerose des Gehirns und Rückenmarks leidenden Frau traten seit einem Schlag zu 4 Fingern der linken und 2 Fingern der rechten Hand gleichzeitig an sämtlichen Zehen eine bläulich-grüne Verfärbung auf. Die betroffenen Teile fühlten sich erkalt.

an, und das subjektive Kältegefühl in denselben ist so stark, daß man gestiftet ist, sie in Watte einzupacken; daneben bestehen sehr heftige Schmerzen in Händen und Füßen. An den Nägeln der nicht betroffenen Finger sind zunächst nur schwarzebraune bis dunkelbraune hämorrhagische Punkte und Streifen sichtbar. Am Hand- und Fußrücken erscheint sodann ein leichtes Ödem, die Verfärbung wird dunkler, schwarzblau, tritt sich in geringem Grade auch den bisher verschont gebliebenen Fingern mit und geht sogar auf den rechten Vorderarm über. Auf Fingerdruck verschwindet die Anschwellung noch, aber nur langsam, um allmählich wiederzutreten, später läßt sie sich durch Druck überhaupt nicht mehr beseitigen. An den von Anfang an am schwersten betroffenen Fingern der linken Hand treten schließlich nach etwa 5 Tagen die Zeichen der Mummifikation, des trockenen Brandes auf, namentlich die Nagelplatte wird abgeplattet, zerbröckelt, die Haut an den Fingerbeeren beginnt sich in Falten zu legen. Auch Nasenspitze und die äußeren Ränder der Ohrenschale selbst des Unklappen haben inzwischen, jedoch nicht gleichzeitig, die blaugraue Verfärbung angenommen und fühlen sich ebenfalls kalt an. Die Sensibilität ist an den erkrankten Teilen überall erloschen, die Berührung äußert sichmerzhaft. Inzwischen ist Pat. stark kollabiert, und unter dem Zeichen der Herzschwäche tritt schließlich am 11. Tage nach Beginn der beschriebenen Erscheinungen der Tod ein.

Die Sektion ergibt im wesentlichen, abgesehen von einer schweren Cystitis und Pneumonie mit multiplen Abscessen in den Nieren, eine Bestätigung der klinischen Diagnose: eine diffuse und irreversiblen, teilweise sehr vorgeschrittene Nekrose des Gehirns und Rückenmarks. Insbesondere finden sich zahlreiche Herde im verlängerten Mark, die alle schon makroskopisch deutlich frisch aussehen und weniger blass sind als an anderen Stellen, sich auch bei der mikroskopischen Untersuchung als frische Erkrankungsherde erweisen. Unter anderem ist die obere Olive betroffen.

Die Diagnose des Falles scheint mir, was die trophischen Störungen angeht, keineswegs so sicher zu sein, wie der Autor annimmt. Zum Bild der Raynandschen Krankheit im engen Sinne paßt vieles nicht. Bei einer schwer kachektischen, hoch fiebernden, an einer Pyelonephritis leidenden Kranken auftretende, ohne Intermissionen aus der Cyanose sich zu Gangrän entwickelnde Nekrosen, dies Bild entspricht in sehr wichtigen Punkten nicht dem der Raynandschen Krankheit und die aus einem solchen Fall abgeleiteten pathogenetischen Schlußfolgerungen müssen gewiß sehr vorsichtig aufgenommen werden. Es ist durchaus zweifelhaft, ob die hyalinen Thromben oberhalb der Nekrosen, die sich bei der Sektion fanden, wirklich, wie der Autor will, sekundär sind. Ich verweise in diesen Beziehungen auf das, was ich früher über das Auftreten von Gangrän bei infektiösen Erkrankungen sagte.

Damit ist das erschöpft, was symptomatologisch über die Kombination von Krankheiten des zentralen Nervensystems und Raynandscher Krankheit bekannt ist.

Wir kommen nun zum Kapitel Neuritis plus Raynandsche Krankheit. Wir müssen uns hier bezüglich dieses Punktes kurz fassen. Getreu unserem, auch bei früheren Abschnitten des Kapitels angewendeten Verfahren haben wir an dieser Stelle nur der Beschuck-

tungen Erwähnung zu tun, in denen schon klinisch sichere Zeichen einer Neuritis in deren allgemein bekannten Symptomen sich ergeben haben. Solche Beobachtungen sind aber sehr selten, während Fälle, in denen die nachträgliche anatomische Untersuchung irgendwelche Veränderungen der peripheren Nerven ergab, viel häufiger sind. In die erste Kategorie gehören die Beobachtungen von Bury, Wetzel, Handford, Munro, Beervoets, aber ich kann nicht sagen, daß auch nur in einem dieser Fälle die Diagnose „Raynaud'sche Krankheit“ überzeugend nachgewiesen ist. In Wetzel's Fall handelt es sich um eine 70jährige Person, die an einer ausgesprochenen Arteriosklerose litt. Die Arteriosklerose ihrerseits bewirkte neuritische Veränderungen an verschiedenen Nerven, und ich glaube, daß auch die vasomotorisch-trophischen Erscheinungen auf die Arteriosklerose zurückzuführen sind, wenn auch die Asphyxie mehrmals anfallsweise auftrat. Noch viel weniger ist in Handford's Fall von einer Berechtigung der gestellten Diagnose „Raynaud'sche Gangrän“ die Rede. Es liegt da ein sehr komplizierter Fall vor: es bestand eine ausgedehnte Neuritis mit Veränderungen der Haut, die bei dieser Krankheit ja gewöhnlich sind. Später zeigten sich noch Symptome der progressiven Paralyse. Bury hat einen Fall von multipler Neuritis mit ausgedehnter motorischer Lähmung und ausgesprochenen vasomotorischen Störungen, die schließlich in symmetrische Gangrän ausgingen, beschrieben. Leider steht mir über diese Veröffentlichung nur ein kurzes Referat zur Verfügung, das eine Beurteilung nicht gestattet. In einer früheren Arbeit hat er mit Boß zusammen sieben Fälle Raynaud'scher Krankheit zusammengestellt, in denen nur zum Teil klinische Zeichen einer peripheren Neuritis vorhanden waren. (Die Fälle von Wigglesworth, Rakhrantoff, Affleck.) Er kommt zu dem Resultat, daß der Raynaud'schen Krankheit einigermaßen analoge Symptome gelegentlich auch durch periphere Neuritis herbeigeführt werden könnten, daß es aber nichts weniger als bewiesen wäre, daß die Raynaud'sche Krankheit selbst von einer Neuritis abhängt. Fagge hat einen Fall von intrathorakalem Tumor veröffentlicht, der durch Druck auf die Nerven lokale Asphyxie hervorgerufen haben soll.

Wie man sieht, ist also der Zusammenhang zwischen den Erscheinungen der peripheren Neuritis und der Raynaud'schen Erkrankung überall ein sehr lückiger und nicht beweisender. Auch Remak¹⁾ erkennt zwar die „häufige Kombination mit Neuritis“ an, meint aber, daß „das Abhängigkeitsverhältnis keineswegs geklärt ist“. Wir werden noch mehrfach Gelegenheit haben, auf das Verhältnis der beiden Krankheiten zu sprechen zu kommen.

¹⁾ Remak, Neuritis und Polynurie. Wien 1900, S. 162.

Schon in dem Kapitel Ätiologie haben wir betont, daß die Symptome der Raynaudschen Krankheit sich häufig bei Personen finden, die mehr oder minder deutliche Zeichen einer allgemeinen oder speziellen funktionellen Erkrankung des Nervensystems bieten. Bereits Raynaud selbst beobachtete die Prädisposition allgemein nervöser Personen für die auch ihm benannte Krankheit. In einer nicht gerade großen Zahl von Fällen finden wir solche Symptome einer ausgeprägten Hysterie (Chauffard, Raynaud, Armaingaud, Barot, Minor, Thèze, Lévi, Osler, Pisarszewski, Souques, eigene Beobachtungen, Savill). Für diese Kombination gelten dieselben Erwägungen, die wir bezüglich des Vorkommens von Erythromelalgie und Hysterie im vorigen Kapitel angestellt haben. Auch hier verdanken wir eine wichtige Beobachtung Lévi.

33jährige Frau, 1891 Rheumatismus articularum acutus. Hebung nach fünf Wochen. Viele psychische Erregungen, dadurch reizbar, menschenfeindlich, im Februar 1893 hysterischer Anfall. Schon im Mai 1892 sah sie im Anschluß an Aufregungen ihre Finger bleich werden, zu gleicher Zeit stellte sich hier ein Gefühl von Kälte ein, einige Tage später dasselbe an den Zehen. Nach sechs Wochen kamen Anfälle von Asphyxie locale, die sich allmählich häuften. Unter der Beobachtung Lévis traten sehr häufig diese Krümpfe von Synkope und Asphyxie auf, die Kranke klagte über ein Gefühl des Durchblutens an Fingern und Zehen, während sie zugleich am ganzen Körper schauderte, die rechte Backe zitterte sich stärker als die linke, die Kranke schritt übermäßig, besonders im Gesicht und am Rumpf. Dann werden die Finger bleich, und nach 12–20 Minuten folgt die Asphyxie der Synkope, meist nicht zugleich an allen Fingern. Der Übergang ist durch ein Gefühl von Stechen markiert, das verschwindet, wenn die Asphyxie aufhört. Zwischen tritt letztere ohne Synkope ein. Die Finger sind während der Anfälle taub, und die Empfindlichkeit für Kälte und Wärme ist aufgehoben. Es kommen 20–12 Anfälle an Tage, es besteht Anorexie und teilweise vollständige Antriebslosigkeit, außerdem Verstopfung. In der Hypnose wird Asphyxie durch Erwärmung der Glieder umstände, unter denen Pat. lebt, hervorgerufen und verschwindet, wenn Heißeres eingeatmet wird. Durch weitere, hypnotisch-suggestive Behandlung tritt eine allmähliche Besserung, aber keine Hebung ein. Auch die profusen Schweisse bestehen fort und außerdem treten flüchtige Ödeme auf.

Lévi spricht in seinem Falle von einer besonderen, hysterischen Form der Raynaudschen Krankheit. Der plötzliche Beginn, die psychische Bedingtheit der Anfälle und ihre Beeinflussung durch die Hypnose sind in diesem Sinn zu verstehen. Die Kennzeichen der Raynaudschen Krankheit waren insgesamt vorhanden.

Auch Souques glaubte bei seiner Patientin die Anfälle suggestiv günstig beeinflussen zu können, doch ist die Beobachtungsdauer eine zu kurze.

Es wird ebenso wie bei der Erythromelalgie sehr schwierig sein, das gegenseitige Verhältnis der beiden Affektionen im Einzelfall genau zu präzisieren. Die psychogene Natur besonders der vasomotorischen Symptome wird sich nur selten so klar darstellen, wie in Lévis Fall.

Auch die Tatsache, daß es zur Gangrän kommt, wird nicht ohne weiteres gegen die hysterische Natur der Affektion sprechen können, da, wie wir in einem späteren Kapitel sehen werden, eine hysterische Gangrän nicht außerhalb jedes Bereichs der Möglichkeit liegt.

Savill betont mehrfach die Häufigkeit des Vorkommens „vasomotorischer und exsudativer“ Hautveränderungen im Bilde der Hysterie; er ist der Ansicht, daß die pathogenetischen Bedingungen für die Hysterie und die vasomotorischen Neurosen außerordentlich ähnliche sind, bzw. daß die Hysterie „is largely an angioneurosis“; auf diese Weise versucht er in, wie ich meine, unzulässiger Weise die Grenzen getrennter pathologischer Gebiete und räumt ihnen eine Selbstständigkeit, die ihnen unbedingt gebührt.

Bei der Neurasthenie sind lokalisierte und paroxysmisch auftretende vasomotorische Störungen sehr häufige Erscheinungen, es kommen z. B. Anfälle von Absterben einzelner Glieder mit Taubsein, Kräheln usw. häufig vor. Binzowanger beschreibt eigenartige, auf kleinere Hautbezirke beschränkte vasomotorische Störungen, die durch abnorme Rötung und Parästhesien gekennzeichnet sind. Auch Determann spricht von lokalem Gefäßkrampf bei Neurasthenie, besonders bei der cardialen Form, und ferner erwähnt er die häufigen lokalen Erytheme. Die Häufigkeit aller Arten vasomotorischer Symptome im Bilde der Neurasthenie ist ja auch ganz allgemein bekannt; wie sie besonders stark in den Vordergrund treten, hat man von einer Neurasthenia vasomotoria gesprochen. Schwere Raynaud'sche Symptome scheinen dagegen nach allen Erfahrungen nicht häufig zu sein, wenn man eben von der Erscheinung des Totenfingers absieht. Kriege hat den vasomotorischen Störungen der Haut bei der traumatischen Neurose eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt und hat auch einen Fall beschrieben, wo auch einem ersten Unfall in der betroffenen Hand häufig Cyanose und Kälte auftrat, die auch in der anderen Hand sich einstellte, als auch dieser Körperteil eine traumatische Schädigung erlitt.

Sellis-Cohen hat unter der Bezeichnung vasomotor ataxia einen Zustand von Instabilität des Mechanismus der Bluteirculation beschrieben, der sich bei manchen Personen findet, und durch die Leichtigkeit der Störung und die langsame Restitution des Gleichgewichts in den Funktionen des Herzgefäßapparats charakterisiert ist. Die Erscheinungen sind am auffälligsten am Herzen und den peripheren Gefäßen, aber wie man annehmen darf, kommen analoge Zustände auch in den Gefäßen der Drüsen und Eingeweide, besonders an den Nieren, am Magen Darmapparat und am Gehirn vor. Die Phänomene sind entweder spasmodischen oder parästhetischen Charakters, oft finden sich beide Arten der Störung bei dem gleichen Patienten. Sie sind stets in gewissem Grade paroxysmal. Sellis-Cohen rechnet

zu den so bedingten Krankheiten den Morbus Basedowii, der den Typus „of relaxing variety of vasomotor ataxia“ darstellt, und die Raynoldsche Krankheit, die als lokale Synkope des extremen Typus der „constrictor variety“ liefert, während sie als Asphyxie locale beide Typen, den der Verengung und den der Erschlaffung, in sich vereinigt. Durch diese Zusammengehörigkeit kommt es, daß der Morbus Basedowii und die Raynoldsche Krankheit oft zusammen vorkommen und sich gelegentlich mit anderen ähnlichen Zuständen, wie der Angina pectoris und dem angioneurotischen Ödem vereinigen.

Hertz hat in seiner sehr bemerkenswerten Studie zur Lehre von den Neurosen des peripheren Kreislaufrapparates sich in vieler Beziehung den Ansichten von Salis-Cohen angeschlossen, sie nach einigen wichtigen Richtungen hin modifiziert, und Salis-Cohen selbst ist auf sein Thema neuerdings noch einmal ausführlich zurückgekommen. Er betont, daß die Erscheinungen der vasomotorischen Ataxie am ganzen Körper, an einer Stelle und an vielen Stellen sich geltend machen können. Er unterscheidet konstriktive Symptome, meist aber nicht immer irritativen Ursprungs, die an der Haut als erythematische oder typhoide imponieren, je nachdem mehr das arterielle oder das venöse System befallen ist, und dilatatorische Symptome, die nicht immer parästhetischer Natur sein müssen; sie manifestieren sich als aktive oder passive Hyperämie oder als Ödem. Diese beiden Symptomenreihen können sich miteinander vermengen, zur selben Zeit, beim selben Patienten, sei es an denselben, sei es an verschiedenen Stellen. Es gibt auch Fälle, wo die eine oder die andere Erscheinungsreihe vorherrscht, oder selbst ganz isoliert vorhanden ist. Alle diese Phänomene wechselnder Blutfülle sind an der Haut, dem Augenhintergrund, an den Schleimhäuten der oberen Luftwege direkt sicht- und nachweisbar, betreffen aber offenbar auch alle anderen Organe des Körpers, den Magendarm-, den Urogenitalapparat, den respiratorischen Apparat und bedingen die mannigfachen visceralen Erscheinungen, die als viscerale Angioneurosen bzw. als viscerale Krisen der vasomotorischen Ataxie aufgefaßt und beschrieben werden. Dahin gehören asthmatische Attacken, Heufieberanfälle, gastrische Krisen mit Erbrechen und heftigsten Schmerzattacken mit den verschiedenen Sekretionsanomalien, seröse und membranöse Koliken und Diarrhöen, Leberkrisen, Polyurie, vorübergehende Albuminurie, Menorrhagien und die verschiedenen Formen der cardiovascularen Störungen, wie paroxysmale Tachykardie, Angina pectoris vasomotoria, Synkope usw. Auch Hämorrhagien sind diesem Bild nicht fremd. Am häufigsten ist die Epistaxis, auf die wir später noch zu sprechen kommen, aber auch retinale Hämorrhagien, Hämoptoe, Hämaturie, Hämaturie, und die schon erwähnten Meno- und Metrorrhagien kommen vor.

Alle diese Symptome treten paroxysmal oder nicht paroxysmal

auf, sie können von kurzer Dauer sein, eine längere Zeit in Anspruch nehmen oder unbeschränkt lange andauern. Die Attacken können in kurzen oder längeren Zeiträumen in regelmäßigen oder unregelmäßigen Intervallen rezidivieren. Der Schmerz ist häufig ein hervorstechendes Symptom der Paroxysmen, aber er kann auch dauernd fehlen oder unbedeutend sein.

Die Grundlage, auf der sich dieser so außerordentlich mannigfaltige Symptomenkomplex entwickelt, ist in folgenden Momenten gegeben. Es liegt eine konstitutionelle Disposition vor, bestehend in einer abnormen Beschaffenheit, des gesamten sympathischen oder vasomotorischen oder „autonomen“ Systems. Es kann sich da um eine übermäßige oder eine abnorm geringe Ansprechbarkeit dieses Systems handeln, sei es durch einen Defekt der Reizbarkeit oder der Hemmung; das Resultat ist dasselbe: ein ungesellhaftes Gleichgewicht im Ablauf der circulatorischen Beziehungen. Dazu kommt als auslösendes Moment irgendein exogenes oder endogenes Toxin, eine Erregung, ein thermaler Reiz. Nicht immer sind wir übrigens in der Lage, ein solches Moment herauszufinden. Und schließlich sind oft als für die Lokalisation der Symptome bedeutsam gewisse weitere Bedingungen zu erwähnen: die Stellung des betreffenden Körperteils, irgendein lokaler Reiz, ein leichtes Trauma, lokale oder allgemeine Überanstrengung usw. Es besteht eine gewisse Tendenz zur Wiedererkrankung einmal erkrankter Stellen.

Die Anschauungen von Herz berühren sich in sehr vielen Punkten mit denen von Solis-Cohen, insbesondere was die Phänomenologie angeht. Die Störungen des Blutgehalts der Haut führt er dabei nicht allein auf eine Affektion der peripheren nervösen Apparate zurück, sondern vindiziert auch dem Gewebe selbst eine große Rolle, das nach seiner Anschauung nicht nur Stoffe an sich zieht, sondern auch den Blutstrom reguliert, indem es je nach Bedarf aktiv seine Interstitien erweitert und verengt und damit Widerstände herabsetzt oder verstärkt, die für die örtlichen Kreislaufverhältnisse vielleicht noch von größerer Bedeutung sind als für die allgemeinen. Man wird dieser anregenden Hypothese unter vielen Verhältnissen sich erinnern dürfen, dabei aber doch der ganzen Lehre von der Vasomotor ataxia Solis-Cohens und Herz in gewissem Sinne ablehnend sich entgegenstellen müssen. Was die beiden Autoren uns geben, ist meines Erachtens kein Kapitel aus der speziellen Krankheitslehre, sondern eine allgemeine Symptomatologie gewisser, meist funktionell-nervöser Kreislaufstörungen. Erkennt man die Vasomotor ataxia als Krankheitsbild oder selbst auch als Krankheitsgruppe an, so vereinigen sich in ihr ganz differente Affektionen, zwischen denen vielleicht einige Beziehungen existieren, die aber in wichtigen Punkten völlig voneinander abweichen. Man wird sagen dürfen, daß die Labilität des Vasomotorensystems in der Mehrzahl dieser Zu-

stände nachweisbar ist, die z. B. auch beim Morbus Basedowii hervortritt und einen Teil seiner Symptome bedingt, aber man wird nicht dazu seine Zustimmung geben können, wegen der Wesensgleichheit einiger Züge des Symptomenbildes, den Basedow mit der Raynandschen Krankheit auf der einen Seite, mit der Neurasthenia vasomotoria auf der anderen Seite zusammenzustellen. Mit einer gewissen Reserve dürfen wir vielleicht sagen, der Ausdruck vasomotorische Ataxie deckt sich mit dem Begriff funktionelle Störungen im Bereich des autonomen Systems, aber wie sich diese funktionellen Störungen zu einzelnen Symptomenbildern und Krankheitszuständen zusammenschließen, das muß dann eben der Gegenstand weiterer Forschung sein und bleiben, und es wäre durchaus falsch, hier sich zu bescheiden und mit diesem ungelösten, schlecht abgegrenzten, in seinen Einzelheiten ungenügend erkannten Komplex aller möglichen Krankheitszustände differenter Ätiologie, Pathogenese und Prognose zu arbeiten.

Ich sprach eben davon, daß sich nach meinen Anschauungen der Begriff der vasomotorischen Ataxie in gewissem Sinne etwa mit dem funktioneller Störungen im Bereich des vegetativen (autonomes plus sympathisches System) Systems deckt. Neuere Forschungen haben sich bemüht, für diese gewiß durchaus unbefriedigende und allenfalls generelle Bezeichnung spezifische Bedingungen aufzufindig zu machen und sind, wie schon an anderer Stelle erwähnt wurde, in Anlehnung insbesondere an die früher mitgeteilten differentiellen pharmakologischen Eigenschaften der verschiedenen Unterabteilungen des großen vegetativen Systems, dazu übergegangen, die Einzelsymptome schärfer zu definieren. Es ist der Begriff der Vagotonie und der Sympathikotonie geschaffen worden, es ist eine Gegensätzlichkeit zwischen vagotonischen und sympathikotonischen Erscheinungsreihen angenommen worden. Eppinger und Heß haben eine klinische Studie über Vagotonie veröffentlicht, Heß und Königstein unter demselben Gesichtspunkte über Neurosen der Hautgefäße geschrieben. Es hat sich alsbald herausgestellt, daß diese supponierte Gegensätzlichkeit in Wirklichkeit nicht existiert (Petrén und Thorling, Bauer, Falta, Newburgh und Nobel), daß es also nicht angeht, auf diesem Boden neue Krankheitsbilder zu schaffen. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, daß diese neuen Forschungen Ausblicke und Forschungswegen zu einer Vertiefung unserer Kenntnisse der einzelnen Symptome darstellen, und daß sie voraussichtlich in der nächsten Zukunft sehr eifrig verwendet werden werden. Ich bin überzeugt, daß sie auch für die Kenntnis der Symptomatologie der vasomotorisch-trophischen Neurosen fruchtbringend sein werden.

So sehr ich es also auch ablehne, eine Vasomotor ataxia bzw. die neuere Bilder der Vagotonie und Sympathikotonie als Krankheitsbild zu generis anzuerkennen — nebenbei sei be-

merkt, daß auch im einzelnen die Auffassung Solis-Cohens von seinen vaskulären Angiospasten und vasomotorischen Krisen als reinen vasomotorischen Phänomenen in vielen Fällen mir wie vielen anderen durchaus unbenutzbar bzw. direkt falsch erscheint — so sehr stimme ich auch, insbesondere auf Grund eigener Erfahrungen dem zu, daß bei der Raynaudschen Krankheit sehr häufig Erscheinungen einer allgemeinen vasomotorischen Labilität vorhanden sind, und daß sich mannigfache Übergänge zu anderen vasomotorischen Neurosen finden.

Unter 36 schwereren Fällen Raynaudscher Krankheit aus den letzten Jahren fand ich in 22 die Angabe, daß die Kranken „nervöse“ Menschen waren, sie waren ängstlich, aufgeregt, schreckhaft, kurzum lösten die Symptome einer Neurasthenie. In einer Gruppe von Fällen traten neben den lokalen Erscheinungen der Raynaudschen Krankheit die Symptome vasomotorischer und kardialer Labilität sehr in den Vordergrund. Hier ergaben sich bisweilen in dem Sinne diagnostische Schwierigkeiten, als bei zeitlichem oder dauerndem Zurücktreten der Raynaudschen Phänomene diese ihre Selbständigkeit verloren und damit der Fall aus dem Gebiet der Raynaudschen Krankheit in das der Neurasthenie mit vasomotorischen Erscheinungen rückt. Diese Gruppe ist aber nicht sehr groß.

Auffällig oft sah ich die Kombination Raynaudscher Krankheit mit Migräne. Auch andere haben darüber Mitteilung gemacht (Blumenthal, Waldo, Arning, Mantle). In Arnings Fall kam es im Laufe der Migräne zu passagerer Amaurose. In einem meiner Fälle wurde ausdrücklich betont, daß die vasomotorischen Erscheinungen zur Zeit der Migräne stärker ausgeprägt sind. In einem anderen Falle traten neben Attacken von Migräne Anfälle von Colitis membranacea sehr in den Vordergrund. Wood teilt die Krankengeschichte eines Mannes mit, der an lokalisierten Kopfschmerzen litt, die den Charakter der an den Fingern empfundenen Schmerzen hatten. Sie wechselten bisweilen mit diesen ab, und traten ein andermal in deren Gebiet auf. Wood bezieht sie vermutungsweise auf eine lokalisierte meningale Kongestion. Wir werden für alle diese Fälle an entsprechend lokalisierte angiospastische Zustände denken müssen.

Eine zufälligerweise auftretende Polyurie berichtete einer meiner Kranken, ein bei der vasomotorischen Neurasthenie häufiges Symptom.

Solis-Cohen bringt eine Anzahl von Beispielen, in denen sich Akroasphyxie bei mehr oder weniger ausgeprägten Fällen von Morbus Basedowii fand. Auch Möbius hatte das schon beobachtet. Piazza teilt einen Fall mit, in dem sich zu einer seit dem 6. Lebensjahre bestehenden, wohl charakterisierten Raynaudschen Krankheit im 12. Lebensjahre ein voll entwickelter Morb. Basedowii gesellte. In

einer Reihe von Fällen, die Sattler¹⁾ zusammenstellt, kam es zum Auftreten einer symmetrischen Gangrän (Marsh, Fournier und Olivier, Rahejae, Hay, Bartholow, Thompson), die in allen Fällen größere Teile der Gliedmaßen oder ausgedehntere Hautpartien betraf. Ich kann mich, entgegen der Ansicht von Sattler, in keinem dieser Fälle davon überzeugen, daß eine Raynaudsche Gangrän vorlag. Dagegen sprach das Fehlen der vasomotorischen Vorläufer, die große Ausdehnung, die abnorme Lokalisation aus. Esch; offenbar handelte es sich fast stets um sub finem vitae entstandene, auf den Marasmus zurückzuführende Gangränformen.

Die Kombination von ausgebildeten Typen der Krankheit ist somit offenbar äußerst selten. Ich kenne nur den oben erwähnten Fall von Piazza. Daß aber im Laufe der Raynaudschen Krankheit Basedow-Symptome vorkommen, kann ich im Einverständnis mit Solis-Cohen durchaus bestätigen. Auch Mantle macht darauf aufmerksam. Mehrfach hatte sich eine weiche, bisweilen pulsierende Struma entwickelt, in einem Falle wurde mir von der Patientin angegeben, daß die Augen größer geworden seien, es bestand Hitzegefühl, Herzklopfen, Tremor der Hände, aber keine Struma, und die Tachykardie war weder bedeutend noch konstant, so daß man eben doch auch wieder nicht von einem voll entwickelten Basedow sprechen dürfte.

Steinberg berichtet von einer Kombination von Struma und Raynaudschen Symptomen, die Schwester der Patientin litt an einer Struma und hatte nebenbei Symptome von Tetanie.

Die Kombination von Migräne, Raynaudschen Symptomen und einer „instabilité thyroïdienne“ bietet ein Fall von Léopold-Lévi et de Rothschild, dessen Krankheitsgeschichte ich in kurzem Auszug hier wiedergebe.

65jährige Frau. Seit 25 Jahren leidet sie an vasomotorischen Anfällen im Bereich des linken Ringfingers; und zwar kommt es da zur Anphyxie locale verbunden mit einer Anschwellung und mit sehr heftigen bis zur Schwellenüberwindenden Schmerzen. Niemals Gangränbildung. Außerdem bestehen typische Anfälle von Migräne, die alle sechs Wochen eintritt, und die oft unmittelbar anhaltender Kopfschmerz, und schließlich finden sich die Zeichen einer unregelmäßigen Funktion der Thyroidea, die im Sinne von Solis-Cohen und Herz als vasomotorische Ataxie anzusehen wären: die Kranke ist sehr kühlempfindlich, neigt zu Hämorrhoiden, Diarrhöen, hat Tachykardie usw. Unter Thyroideabehandlung trat eine Besserung ein.

Inwieweit die theoretischen Anschauungen der Autoren, die von einem Hypo-Hyperthyreoidismus sprechen, berechtigt sind, soll hier nicht erörtert werden. Herz, der ähnliche Fälle beobachtet und seiner vasomotorischen Ataxie eingereicht hat, spricht sich meines Erachtens sehr mit Recht skeptisch über die Annahme eines solchen pathogenetischen Zusammenhanges aus.

¹⁾ Sattler, Die Basedowsche Krankheit. Jena 1909, S. 101.

Ehrenberg sah die Kombination von Raynaud und Myxödem, letzteres wurde durch Thyreoëdin günstig beeinflusst, ersteres nicht.

In einzelnen Fällen wurden noch andere Symptome beobachtet, die in einem gewissen gegenseitigen Zusammenhang stehen, wie flüchtige Ödeme und Urticaria. Die Urticaria ist als gelegentliche Komplikation der Raynandschen Krankheit beschrieben worden, wenn auch nicht gerade häufig (Solis-Cohen, Lustig, eig. Beob. u. a.). Von dem Vorkommen flüchtiger Ödeme und Raynandscher Symptome soll später noch die Rede sein. Eine sehr merkwürdige Kombination habe ich in dem Falle einer 40jährigen Frau gesehen. Diese litt seit drei Jahren an den typischen Erscheinungen der Raynandschen Krankheit. Den Beginn hatten morgentliche Parästhesien gemacht; später stellten sich Anfälle von Synkope und Asphyxie locale an den Händen ein, seit einem Vierteljahr kam es zu kleinen Nekrosen an den Palpa der Finger, die äußerst schmerzhaft waren. Bei der Untersuchung am 15. Dezember 1910 sind die Finger beider Hände sehr kalt, teils leichenblau, teils livid, es finden sich einige kleinstrahlige Narben an der Palpa der Finger, die Finger sind in leichter Flexionsstellung fixiert. Die Vola manus hat im ganzen ein bunttes Aussehen; rote und bläuliche Stellen wechseln ab. Bei dieser Frau hatten sich nun im Verlauf der letzten dreiviertel Jahre Anfälle von sehr schmerzhafter Anschwellung beider Parotiden eingestellt, die sich in raschen Zwischenräumen wiederholten, und es einer allerdings der Intensität nach sehr schwankenden dauernden Schwellung der Ohrspeicheldrüsen führten. Daneben kam es zu gleichwertigen Schwellungen der anderen Mundspeicheldrüsen und auch der Tränenrüsen, aber auch zu passagieren Ödemen in der Haut der Lider. Es resultierte auf diese Weise das Bild der sogenannten Mikuliczschen Krankheit. Auch im Verlauf der Beobachtung des nächsten Jahres sahen wir diese wechselnden Zustände immer wieder auftreten. Die Abbildung Figur 8 versucht anschaulich zu machen, wie stark die Schwellung der Ohrspeicheldrüsen gelegentlich wurde. Auch die Raynandschen Symptome traten immer wieder auf, ohne daß ein Parallelismus zwischen den beiden Erscheinungsreihen bestand. Die Tafel XV gibt das Röntgenbild die Hand der Kranken; neben den gewöhnlichen atrophischen Veränderungen der Knochen zeigt es besonders deutlich das Verschwinden der Gelenkräume zwischen den einzelnen Phalangen, und beweist damit das Vorhandensein schwerer artikularer Läsionen, auf die wir im Kapitel Sklerodermie noch zurückkommen werden. Ich zähle die Anschwellungen der Speichel- und Tränenrüsen den flüchtigen Ödemen zu (intermittierende Parotisschwellungen sind früher in diesem Sinne gedeutet worden; v. darüber im Kapitel angioneurotisches Ödem) und nehme einen engen Zusammenhang zwischen ihnen und den Raynandschen Symptomen an. Vielleicht konnte in einem solchen

Fall aus der Art des produzierten Speichels (Sympathicus- oder Vagus-Speichel) auf die Art des zugrunde liegenden nervösen Prozesses geschlossen werden. In meinem Fall war es leider unmöglich, derartige Untersuchungen auszuführen.



Fig. 8.

Schwellung der Peristilen bei Raynaudscher Krankheit

Zu den oben schon erwähnten allgemeinen Symptomen motorischer Instabilität gehören dann auch Symptome, die in einer ausgebreiteten Marmorierung der Haut bestehen. Einen solchen Fall hat z. B. Luerke beschrieben. Hier fand sich eine fleckige, cyanotische Verfärbung eines großen Teils der Haut des Rumpfes und der Extremitäten. Versuche mit elastischer Ligatur der Extremitäten mittels der Adressalbinde ergaben nach Entfernung der Binde stets ein eigentümlich buntes, marmoriertes Aussehen der Haut, ein Bild, wie es Luerke sonst nie erzielen konnte, höchstens annähernd noch bei Frost der Hände. Es handelte sich offenbar um eine weit verbreitete Störung des Tonus der Hautgefäße. Bemerkenswert ist auch hier wieder das häufige Auftreten flüchtiger Ödeme an den Unterschenkeln. Eine ähnliche Erscheinung lag in zwei Fällen vor, die Cayafy unter dem Namen „Symmetrical congestive mottling of the skin“ beschrieben hat. In dem zweiten seiner Fälle fehlten Raynaudsche Symptome freilich gänzlich.

Über das Vorkommen Raynaudscher Symptome bei der als Epidermolysis bullosa hereditaria beschriebenen Affektion berichtet Linsler. Er beobachtete in je zwei Familien eine größere Anzahl von Fällen dieses seltenen Leidens, auf das ich in anderem Zusammenhang nochmals zu sprechen komme. Besonders in der zweiten Familie fand er

und zwar nicht nur bei den an der Epidermolyse leidenden Kranken selbst, sondern auch bei anderen Familienmitgliedern Raynaud'sche Symptome. Es handelte sich hier um zwei Brüder von 12 und 14 Jahren, die die Symptome der Krankheit seit dem dritten und vierten Lebensjahre zeigten. Sie bekommen besonders unter dem Einfluß der Kälte Blasen an den Händen und an anderen Stellen; allmählich sind die Nägel an Händen und Füßen ausgefallen, die Haut ist an den Fingern teilweise atrophisch. In der Familie der Mutter besteht eine große Empfindlichkeit gegen Kälte. Die Mutter selbst leidet seit 6–8 Jahren an Anfällen von schmerzhafter Synkope. Der eine Patient bekam auf ein geringes Trauma hin eine Gangrän der Hälfte des vierten Fingers der rechten Hand; durch Eintauchen der Hände in Wasser von 35°, bei dem jungen Patienten schon durch Streichen der Hand an einem Bratenglas, das warmes Wasser enthielt, läßt sich ganz akutes Erblauen der Finger erzielen, die dann eine Zeitlang ganz weiß bleiben. Im ganzen betonte Linsler für seine Fälle das Bestehen abnormer vasomotorischer Reizbarkeit, teilweise mit Steigerung bis zur Raynaud'schen Krankheit.

Auch kleine Hämorrhagien der Haut sind gelegentlich beschrieben worden (c. n.). Zweifelsfrei ist, ob in diese Kategorie auch die Blutungen aus inneren Organen gehören. Wir haben davon schon gesprochen, als wir die Hämaturie erwähnten. Verhältnismäßig häufig wurde Nasenbluten beobachtet, nach Monroe in 6% der Fälle. Sicher liegt oft nur eine zufällige Koinzidenz vor. An einer engeren Zusammenhang ist vielleicht in einem Fall zu denken, den Warren beschreibt, wo häufiges Nasenbluten 14 Tage lang dem Auftreten der lokalen Asphyxie vorausging. Raynaud beschreibt einen Fall, in dem einige Tropfen Blut jeden Morgen aus der Nase heraussamen, und zwar noch in einem frühen Stadium der Krankheit. Boscillon ist Nasenbluten mit anderweitiger Hämorrhagie vergesellschaftet, so in einem Fall Hutchinsons mit Hämaturie und Blutung aus dem Gaumen, in einem Fall Blands, der schon erwähnt wurde, mit Blutungen an verschiedenen Stellen der Oberschenkel. Auch Hämoptysis und Hämatemesis wurden beobachtet. Natürlich ist in allen diesen Fällen große Vorsicht in der Beurteilung der genannten Symptome notwendig, und man wird nur in den seltensten Fällen dazu kommen, sie als vasomotorische Störungen auffassen zu dürfen, wie oben schon im Gegensatz zu der von Sallé-Cohen vertretenen Auffassung betont wurde. In einem meiner Fälle berichtete die Patientin von einer starken Neigung zum Bluten, einer Andeutung von Hämophilie; sie hatte einmal eine Spontanblutung im Handgelenk, einmal eine gefährliche Blutung bei einer Zahnextraktion und litt unter Menorrhagien. Zingerle hat Ähnliches beobachtet.

Von anderen Neurosen erwähnen wir das gelegentliche Vorkommen

von Chorea (Osler und Munro). Letzterer beschreibt einen Kranken, der im Alter von sieben Jahren an Chorea erkrankte, ein Jahr später Scharlach bekam, während im Jahre darauf die lokale Cyanose einsetzte. Neuralgische Anfälle fanden sich in der Anamnese der von Höllin und Marfan beobachteten Kranken.

Pospislaw beschreibt Onychophagie bei einem Raynaud-kranken. Auch ich sah das einmal.

Die Kombination eines tieferen Schreibkrampfes mit einer Akrozyanose berichten Brissaud, Hallion et Moïge.

Von meinen Patienten litten drei an Zwangsvorstellungen, bei dem einen, von dem ich oben schon gesprochen habe, bestand Harnstollern, ein zweiter im ganzen sehr nervöser Kranker hat Schmutzfurcht, Zählzwang und Ähnliches in nicht sehr ausgeprägter Form. Bei einem dritten führte der Zwang sich fortwährend die Hände waschen zu müssen, zu immer erneuten Schädigungen der Hände, da durch den intensiven Gebrauch der Wassers stets neue vasomotorische Anfälle ausgelöst wurden. Pachs beschreibt folgenden Fall.

Häufige Frau. 35-jährig, ohne als Kind. Stets Zwangsdenken. Seit 5 Jahren bemerkt sie, wenn es mit ihren Zwangsvorstellungen schlauer ist, Hände und Schwanzenden der Finger beider Hände. Der Parafingern beider Hände, wie auch objektiv deutlich zu verfolgen; die Schwanz der Krallen konnten an der Farbe ihren Seelenzustand erkennen. Übrigens kamen Anfälle von Cyanose und Synkope auch außer dem Einfluß der Kälte vor.

Der direkte Einfluß seelischer Alterationen ist von mir schon früher als ätiologischer Faktor gewertet worden.

Echte Epilepsie fand sich in den Fällen von Bland, Féré, Féré et Batigne, Osler, Mantle. Auch ich selbst habe wiederholt von Epileptikern die Angabe gehört, daß sie gelegentlich an Kälte und Cyanose der Hände litten.

Epileptiforme Anfälle und Symptome von Asphyxie lokale zusammen fanden Raynaud, Thèze und Thomas. Besonders der von letzterem mitgeteilte Fall ist bemerkenswert. Es handelte sich um einen 23-jährigen Mann, der an lokaler Asphyxie aller vier Extremitäten, der Ohren und der Nase litt. An der Nasenspitze kam es bisweilen zu Nekrosen. Die Anfälle kamen nur im Winter und waren von schweren epileptischen Konvulsionen und Hämoglobinurie begleitet. Das Verhältnis der einzelnen Symptome war es, daß den Konvulsionen Hämoglobinurie folgte, während die vasomotorischen Erscheinungen ihnen vorausgingen. Nach drei Jahren hörten die Konvulsionen auf, aber die anderen Symptome blieben, und es kamen paroxysmal auftretende Schmerzen im Abdomen hinzu, und die Milz vergrößerte sich beträchtlich. Hier scheint ein enger Zusammenhang der offenbar gleich bedingten Erscheinungen zu bestehen. Ob die zuletzt erwähnten Schmerzen im Abdomen mit in das Krankheitsbild

hinein gehören, ist zweifelhaft, aber immerhin möglich. Wenigstens gibt es bei einer Affektion, die uns noch beschäftigen soll, und die auch gewisse Beziehungen zur Raynaudschen Krankheit hat, bei dem arteriellen Ödem, solche abdominalen paroxysmalen Schmerzen.

Geistige Störung in Kombination mit Raynaudscher Krankheit wurde nach Monro in 4½% der Fälle beobachtet, wenn man von der durch die Epilepsie bedingten Abschwächung der Geistestätigkeit absieht. Auch hier ist die Kombination von sehr wechselnder Bedeutung, einmal fand sich die Raynaudsche Krankheit bei einfach schwachsinnigen Personen (Bregues, Stanley). In dem Fall von Péhu bestand einfache Imbecillität; als sonstiges Degenerations-symptom sind die in diesem Falle nachgewiesenen markhaltigen Nervenfasern am Augenhintergrund aufzufassen. Hier ist kein Grund, die Raynaudschen Phänomene nicht als selbständiges Krankheitsbild aufzufassen. Zweifelhaft wird ihre nosologische Stellung in Fällen ausgesprochener Psychosen, Bland sah sie bei akuter Manie, Macpherson bei Amentia. Hier traten im Verlauf beider Krankheiten einander parallelläufige Schwankungen ein. Nedopil, Pospelow, Shav, Targowla beobachteten sie bei melancholischen Patienten. Daß gerade bei diesen Kranken die Blutzirkulation in den peripheren Teilen oft eine ungenügende ist, und daß sie viel an kalten, cyanotischen Händen und Füßen leiden, ist eine alltägliche Erfahrung. Dide et Durocher sahen Asphyxie locale und Erscheinungen von Pseudoödem bei Katatonikern. Etwas mehr Selbständigkeit wird man den vasomotorischen Symptomen dann zusprechen müssen, wenn sie der Entwicklung der geistigen Störung vorausgehen, wie z. B. Targowlas Kranker schon ein Jahr vor dem Einsetzen der Melancholie Anfälle von Asphyxie locale hatte. Sehr interessant ist das von Ritti beschriebene Vorkommen der Raynaudschen Symptome in der depressiven Phase des circulären Irreseins bei zwei Kranken. Auch Urquhart erwähnt in zwei Fällen die Kombination von Raynaudscher Krankheit und Psychose, ebenso Pechkranz. In einem Fall Hutchinsons entwickelte sie sich zugleich mit einer Verschlimmerung des schon länger bestehenden geistigen Defekts.

Von Böttiger ist ein Fall von Akromegalie, kompliziert durch Erscheinungen der Raynaudschen Krankheit, beschrieben worden. Diese Kombination hätte ein großes Interesse, da, wie wir auch schon bei der Erythromelalgie sahen, die beiden Krankheiten einige gemeinsame Züge haben. Ich glaube aber nicht, daß in Böttigers Fall die Diagnose „Akromegalie“ richtig ist, sondern nehme an, daß hier nicht eine Kombination zweier Krankheiten vorliegt, sondern vielmehr eine einzige Krankheit, die freilich der Raynaudschen Krankheit sehr

nals steht. Andere derartige Beobachtungen sind von Sternberg, Kapuzi, Hoffmann und anderen beschrieben worden. Ich will unter Beifügung eigener Beobachtungen im nächsten Abschnitt darauf zurückkommen.

Ich habe viermal die Kombination Raynaud'scher Krankheit mit Dystrophia muscul. progr. beobachtet. In dem einen stand die Dystrophie im Vordergrund der Erscheinungen, die Raynaud'schen vasomotorischen Symptome waren in typischer Form nachweisbar, nicht etwa daß nur die bei Dystrophie so häufige Cyanose der Extremitätenenden bestand, einmal waren beide Symptomenkomplexe wenig entwickelt. Die beiden anderen Fälle scheinen mir einer ausführlicheren Mitteilung wert.

Währinger Goldschäfer. Bei dem bis dahin gesunden Manne trat vor 3 Jahren zuerst Kälte und Verengern des Daumens on. Im nächsten halben Jahr bildeten sich ähnliche Symptome an allen übrigen Fingern; die Finger wurden anfallweise, namentlich unter dem Einfluß der Kälte weiß, es bildeten sich Bläschen an den Fingerkuppen, die zu stärkerer oder schwächerer Eiterbildung Anlaß gaben, dann eintrockneten, es kam auch unter Dunkelhaltung zur Verockerung und Abstoßung kleiner Gewebestücke. Seit 1½ Jahren merkt er Erschwerung des Schluckens, Pfeifens, Sprechens, seit einem Jahre Schwierigkeit den Kopf zu halten, Schwäche der Arme und des Rumpfes. Keine Blasenbeschwerden, Pat. hat jahrelang sehr intensiven Tinslängen eingenommen. Status: Er besitzt eine ausgesprochene Dystrophia muscul. progr. vom Typus facio-oculo-humeralis. Angesichts matt. Mundspitzen, Pfeifen, Schlingen mangelhaft, Unfähigkeit den Kopf zu halten. Schädel entlang der Schulterblätter, Atrophie der Psoas-major-musculi, entsprechende Störungen in der Funktion beim Heben der Schultern, Heben und Auswärtsziehen des Oberarms, Steifung des Unterarms. Gang leicht watschelnd. Exsperkationen aus der Rückenlage erschwert, dabei Exsperkation. Keine qualitativen Störungen der elektrischen Erregbarkeit. Finger in fixierter Beugelkontraktion durch Ankylose in dem Interphalangealgelenken, zum zweiten bis fünften Finger rektend. Beim Betreten des Zimmers Finger beider Hände weiß, bläuen (nachher Fuchsweißel, wie ein rote, ich eine tiefblaue Agklyzie. Beide Hände sehr kalt. Haut an den letzten Phalangen mit der Unterlage fest verwachsen, glatt, auch die Unterhautgewebe zum Teil geradezu knötig verdickt, fest, schwingig. Diese Veränderungen reichen bis zur Mitte der Vorderarme und betreffen hier auch die Muskulatur. Nase dünn, Haut etwas glänzend, aber überall im Gesicht gut verchieblich.

Wir haben hier zwei voll entwickelte Symptombilder, eine Dystrophia muscul. progr. und eine Raynaud'sche Krankheit mit Zeichen von Sklerodaktylie. Die Erscheinungen der Raynaud haben sich früher eingestellt, die Progression der beiden Krankheiten ist später aber ziemlich gleichmäßig gewesen. Man kann die eine Affektion nicht der anderen subordinieren, ob die Kombination aber eine rein zufällige ist, wage ich nicht zu sagen, eine angeborene Veranlagung wird man, glaube ich, für beide annehmen müssen.

Noch komplizierter ist der folgende Fall, in dem bei einer Frau mit ausgesprochen hysterischen Symptomen einmal eine ganz rudimentäre Muskelatrophie, ferner die Raynaud'schen Symptome und

schließlich ein an und für sich schon sehr seltenes Symptom, nämlich eine mehrfach recidivierende totale Alopecie nachweisbar waren.

Sch.: bei der ersten Untersuchung 28. Juli 1886 31 Jahre alt. Aus gesunder Familie; nach einem schweren psychischen Shock im Alter von 17 Jahren mehrere Stunden lang Schwindelkrämpfe; vier Wochen danach beginnt ein Haarausfall in Form von allmählich konfluierenden kreisförmigen Flecken; im Laufe eines halben Jahres hat die Pat. ihr bis zum Ende reichendes sehr starkes Kopfhaut, ebenso auch die Brauen und Wimpern verloren, nicht z. B. die Scham- und Achselhaare. Nach zwei Jahren begann das Haar wieder zu wachsen, fiel aber dann wieder aus, und Pat. blieb bis zum 26. Jahre völlig kahl. Dann trat erneut ein ziemlich reichlicher Haarwuchs auf, so daß Pat. einen „Pitschkopf“ hatte. Im ersten Porroperium gehen dann die Haare wieder vollständig aus, nach einiger Zeit begann ihr Wachsen von neuem, aber in drei nachfolgenden Porroperien verlor sie es wieder. Zur Zeit der ersten Untersuchung zwei Jahre nach der Geburt des letzten Kindes war sie völlig kahl, bis auf ganz spärliche wellartige Haare, auch Augenbrauen und Wimpern fehlten. Seitdem ist das Haar wieder langsam gewachsen, am Kopf in einem eigentümlich weiten Durchmesser, die übrigen Haare sind jetzt 45 cm lang. Ein Büschel am Hinterhaupt ist ganz weiß, Augenwimpern und Cilien jetzanzähmlich normal. Im 30. Lebensjahr erkrankte sie unter den typischen Erscheinungen der Asphyxie und Symplocie Israels, bei Kälte und Aufregungen, Anfangs nie im Sommer. Dabei Kriebeln und Kältegefühl, auch die Lippen wurden zeitweilig weiß. Diese Erscheinungen wiederholten sich in den nächsten Jahren sehr vielfach, es kam gelegentlich auch zu einer Nekrose am letzten vierten Finger, die unter Hinterlassung einer noch jetzt bestehenden, auf Druck empfindlichen Verdickung heilte. Die einzelnen Anfälle dauern 10 Minuten, sie wurden in ihrem typischen Ablauf von uns oft beobachtet. Es bestehen demnach hysterische Symptome, Pat. ist empfindlich, reibbar, Weinkranke, Glober. Seit der Jugend Narkotikosen. Mit dem Beginn der rheumatischen Erscheinungen stellte sich eine Schwierigkeit den Kopf zu halten ein, auch eine gewisse Benommenheit, des Tages machte sich geltend. Es fand sich eine sehr ausgesprochene Schwäche der Nackenmuskeln, die auch stark atrophisch waren, eine Atrophie und Schwäche im mittleren und unteren Cervikal, in den langen Rückenmuskeln, besonders im Deltoides. Gang wackelnd. Nur quantitative Störungen der elektrischen Erregbarkeit. Das Muskelleben ist in den letzten Jahren nicht vorgeschritten. Allmählich ist auch sonst eine Besserung eingetreten, in den vasomotorischen Phänomenen, besonders in den letzten Monaten nach Vasothylidol-Expositionen.

Die neuropathische Diathese ist hier zu manifester Hysterie entwickelt. Die rezidivierende Alopecia totalis ist in Rücksicht auf ihre Entstehung und ihren Verlauf wohl unbedingt als trophoneurotisch aufzufassen und als solche zu den Raynaudschen Symptomen in enge Beziehung zu setzen. Das Verhältnis der ganz atypischen und rudimentären Dystrophie — als solche muß die Muskelschwäche aufgefaßt werden — ist auch hier wieder unklar, obwohl ich auch hier nicht entschließen kann, an ein rein zufälliges Zusammentreffen zu glauben. Ich erwähne noch, daß von dieser Patientin die plethysmographischen Kurven, die Figur 1a—c darstellt, stammen, sie lassen eine schwere Störung der Gefäßreflexe erkennen.

Wir haben im Lauf unserer bisherigen Darstellung und besonders auf den letzten Seiten wiederum wiederholt Veranlassung gehabt, darauf hinzuweisen, daß zwischen den von uns speziell im Bereich unserer Besprechung gezogenen Krankheitsbildern und Symptomenkomplexen die mannigfaltigsten Übergänge bestehen. Ein hierher gehöriges Kapitel müssen wir uns für spätere Besprechung noch aufsparen, das sind die Beziehungen, die die Raynaudsche Krankheit und die Sklerodermie zueinander haben. Diese Beziehungen sind, das mag hier nur erwähnt werden, sehr enge, wenn wir danach urteilen dürfen, wie oft Symptome beider Krankheiten sich zugleich bei demselben Individuum verfinden. Bald handelt es sich um sonst typische Fälle der Raynaudschen Krankheit, in deren späteren Stadien sich neben den klassischen trophischen Störungen der symmetrischen Gangrän auch solche vom sklerodermatischen Typus finden, bald steht umgekehrt die Sklerodermie im Vordergrund, und nur episodisch hören wir von den Raynaudschen Symptomen, meist nur von Asphyxie und Sympoke locale, bald wieder vermag auch eine genaue Analyse uns keinen Anschluß darüber zu geben, was im Krankheitsbild primär ist, ob die Symptome der Sklerodermie oder die der Raynaudschen Krankheit. Es hat sich nicht ganz vermeiden lassen, daß wir in unserer Darstellung schon auf einen oder den anderen Fall Bezug genommen haben, der einzelne Züge der Sklerodermie an sich trägt. Die Fälle sind auch hienieden, so von Raynaud selbst in einer seiner Beobachtungen, als Asphyxie locale klassifiziert worden. Der Zusammenhang beider Affektionen ist eben ein so inniger, daß eine absolut scharfe Trennung nicht möglich ist. Eine ausführliche Beschreibung der Kombination von Raynaudscher Krankheit und Sklerodermie soll aber erst im nächsten Kapitel gegeben werden.

Pathologische Anatomie.

Die Zahl der unter dem Titel Raynaudsche Krankheit beschriebenen Fälle, bei denen eine Sektion vorgenommen werden konnte, ist im Lauf der Zeit ziemlich groß geworden. Nach häufiger hat sich erklärlicherweise die Gelegenheit geboten, pathologisch-anatomische Untersuchungen an den spontan oder durch künstliche Hilfe abgestorbenen nekrotischen Teilen vorzunehmen. Die Resultate dieser Untersuchungen sind aber recht verschiedenartig ausgefallen, und oft genug haben die betreffenden Beobachter, gestützt auf den ihnen gerade zur Verfügung stehenden Fall, von diesen aus unzulässige Verallgemeinerungen vorgenommen. Wenn wir hienur in Erwägung ziehen, daß die Diagnose Raynaudsche Krankheit oder auch Raynaudscher Symptomenkomplex nicht selten gestellt worden ist, ohne daß dazu genügende Berechtigung vorlag, so werden wir im folgenden uns nicht damit be-

zuziehen können. Die Resultate der pathologisch-anatomischen Untersuchungen einfach nebeneinander zu stellen, sondern wir werden uns hier jeden einzelnen Fall, oder wenigstens jede Gruppe von Fällen genau darauf ansehen müssen, ob die Diagnose zu Recht gestellt wurde oder nicht. Auch in diesem Kapitel wird sich daher ein Vorgehen auf diagnostische Fragen nicht immer gut vermeiden lassen.

Wir beginnen mit denjenigen Fällen, in denen Veränderungen des centralen Nervensystems nachgewiesen und als Grundlage der Raynaudschen Affektion aufgefaßt wurden. Die Ausbeute ist hier gering; als einer der wichtigsten Fälle wurde immer der von Hochenegg angesehen, in dem neben einer anatomisch nachgewiesenen Syringomyelie angeblich Raynaudsche Krankheit bestand. Wir haben den Fall bereits ausführlich mitgeteilt und festgestellt, daß die Diagnose Raynaudsche Krankheit hier sicher nicht zu Recht besteht. Auch meine Zweifel bezüglich der Richtigkeit der Diagnose Raynaudscher Krankheit in dem von Strauß mitgeteilten Fall von multipler Sklerose habe ich oben schon begründet. Über einen Fall von Chiaruttini (Gliom des Rückenmarks) stehen mir nur so spärliche Notizen zu Gebote, daß ich ihn nicht verwerten kann. Auch in einem Fall von Berkowsky gibt die klinische Diagnose zu schweren Bedenken Anlaß; es handelt sich um einen 41jährigen Mann mit schwerer Arteriosklerose, Myocarditis und Nephritis, bei dem drei Monate vor dem Tode unter Vorausschicken cyanotischer Verfärbungen multiple Gangrän an den Zehen, Fingern, Ohren, Nase, Hand sich einstellten. Es fehlten Angaben über das Verhalten der entsprechenden Blutgefäße, und auch bei der Sektion wurde deren Verhalten nicht beachtet. Im Rückenmark fanden sich Veränderungen, die offenbar im wesentlichen als perivasculäre Sklerosen aufzufassen und mit den übrigen arteriosklerotischen Organveränderungen in Parallele zu setzen sind. Irigandweiche Aufklärungen liefert uns dieser Fall nicht. Der hienhergehörige erste Fall Calmans ist eben mitgeteilt: die Diagnose Raynaudsche Symptome ist hier unanfechtbar, anatomisch fand sich ein Sarkom, von dem dritten und vierten Lumbalnerven ausgehend und das Rückenmark komprimierend. Es ist sehr bemerkenswert, daß auch in diesem Fall die Störung primär nicht am Rückenmark, sondern an den Nervenwurzeln saß. Ebenso komprimierte in Schlesingers Fall der Tumor die Wurzeln der Cauda equina. Ich habe keine weiteren Fälle in der Literatur finden können, in denen der anatomische Nachweis einer centralen Affektion des Nervensystems erbracht worden wäre; dabei sehe ich von den Fällen ab, in denen sich zwar eine centrale Läsion fand, daneben aber periphere Veränderungen (der Nerven oder der Arterien) bestanden, die als Ursache der Raynaudschen Erscheinungen betrachtet wurden (Bréguet, Kornfeld, Thiersch).

Viel öfter war Gelegenheit, Veränderungen der peripheren

Nerven in Fällen Raynaud'scher Krankheit zu konstatieren; es ist demgegenüber gewiß bemerkenswert, daß, worauf wir schon einmal hingewiesen haben, klinisch die sicheren Kennzeichen der Neuritis sich nur ganz ausnahmsweise auffinden ließen. Es werden hierher gerechnet die von Altleck, de Grazia, Mounstein, Kornfeld, Wigglesworth, Pitres et Vaillard, Wredensky beschriebenen Fälle; in einer Reihe weiterer Beobachtungen fand sich neben der Erkrankung der peripheren Nerven auch eine solche der Gefäße. Sehen wir uns die zuerst erwähnten Beobachtungen näher an, so überrascht uns wieder vielfach die Ausdehnung der Bezeichnung Raynaud'sche Krankheit auf in wesentlichen Zügen abweichende Krankheitsbilder. In den beiden von Pitres und Vaillard mitgeteilten Fällen, ebenso in den von Mounstein und Wredensky finden wir eine akut, ohne charakteristische vasomotorische Symptome sich entwickelnde, von vornherein oder in rascher Progression ganze Teile der Extremitäten befallende symmetrische Gangrän. Es scheint den Autoren, und manchmal sind es weniger die Autoren selbst, als die, welche die Fälle nachträglich interpretieren resp. klassifizieren, in solchen Fällen zur Diagnose ausreichend, wenn nur das Gefäßsystem klinisch oder anatomisch intakt ist, es gilt dann also jede „neuritische“ symmetrische oder auch asymmetrische Gangrän als Raynaud'sche Gangrän und damit der ganze Fall als Raynaud'sche Krankheit.

Sehen wir uns einmal den allgemein, wenn auch charakteristischerweise nicht vom Autor selbst als Raynaud'sche Krankheit klassifizierten Fall von Mounstein an:

Mittliger Mann. Beginn der Erkrankung vor zwei Monaten. Am 4. Juni wurde die Amputation des betreffenden Unterschenkels am oberen Drittel gemacht. Eine Woche darauf erfolgte der Tod des Pat. bei hohem Fieber. Im Urin kein Eiweiß, kein Zucker. Die rechte untere Extremität hatte — an der Leiche — folgendes Aussehen: Die erste, zweite und fünfte Zehe lebten, die dritte und vierte sind isoliert. Das Phalangenmetatarsalgelenk ist locker und besteht aus fetigen, grau gefärbten Massen. Der Hautdefekt erstreckt sich rings um alle Zehen herum, in einer Entfernung von 2 cm; an der Ferse und an der inneren Seite des Fußrandes befindet sich ebenfalls eine Partie abgestorbenen Gewebes, am Fußrücken mehrere Lacerationen in der Haut. Der ganze Unterschenkel ist stark oedematös. An der A. tibial. post. sind zwar einige verkalkte Stellen vorhanden, doch nirgends eine obstruierende Thrombose, alle übrigen Arterien und Venen sind normal. Der N. tibial. post. ist im unteren Abschnitt bis auf das Doppelte seines oberen Umfanges verdickt; mikroskopisch erwiesen sich die Gefäße als fast völlig normal; an den Nerven der affizierten rechten unteren Extremität fand sich Schwund des Myelins, Vermehrung des Rindgewebes, besonders an den der Gangrän näher liegenden Stellen, während nach oben in die Zerklüftung des Myelins wech in den Vordergrund trat; ferner fand man hier sowie in den begleitenden Gefäßen starke Vermehrung der Kerne; an den Nerven des linken Beins ebenfalls Zerklüftung des Myelins an verdickten Fasern und etwas Kernvermehrung. Von den Nervenwurzeln des Lendensteils des Rückenmarks waren nur die der rechten Seite von Neuritis befallen. Das Herz ist im wesentlichen gesund, ebenso Gehirn und Rückenmark (mikroskopisch).

Mounstein glaubt, daß die essentielle Neuritis als das wesentlichste Moment bei der Erzeugung dieser Gangrän anzusehen sei. Auch diese Behauptung ist keineswegs unbestreitbar, manches, wie die Doppelseitigkeit der Nervenänderungen bei einseitiger Gangrän, spricht dagegen; aber, wie dem auch sei, wo liegt hier die Berechtigung, den Fall der Raynaudschen Krankheit einzunordnen? Es fehlt jede klinische Beobachtung, die Gangrän ist ausgedehnter als sonst bei der Raynaudschen Krankheit, und ist asymmetrisch; nur wenn man jede Gangrän, die anscheinend spontan entsteht, und bei der man mehr oder minder ausgedehnte Nervenveränderungen nachweist, wenn man jede solche Gangrän als Raynaudsche auffaßt, ist auch der Fall von Mounstein ein Beispiel Raynaudscher Krankheit. Übrigens rechnet ihn auch Monro, wie ich sehe, nicht der Raynaudschen Krankheit zu, wie überhaupt dieser Autor sowohl wie Remak¹⁾ eine Reihe von sonst meist dieser Affektion zugeschriebenen Fällen anspricht. Nicht besser begründet ist die Diagnose Raynaudsche Gangrän in beiden Fällen von Pitres et Vaillard, die in der Überschrift zu ihrer Arbeit übrigens viel weniger vorgehend von *gangrènes massives des membres d'origine névritique* sprechen. Sehen wir uns deren ersten Fall, den übrigens auch Brongues mitteilt, genauer an.

Bei einem 24jährigen imbecillen Mädchen, bei dem in den letzten Jahren hässliche Sprache, Zittern, Steifigkeit und Unbeweglichkeit der Glieder aufgetreten waren, bemerkten die Eltern folgendes — ich zitiere wörtlich — „que ses deux pieds étaient froids, violacés et insensibles“. Die klinische Untersuchung ergibt, daß beide Füße bis zu den Knöcheln schon schwer gangränös, völlig unempfindlich und kalt sind; an der Außenseite beider Waden finden sich außerdem zwei 5 cm im Durchmesser große Scharfbildungen. Pulsion der Aa. crurales fühlbar, die der Arter. popliteae nicht, wohl wegen der starken Kontraktion der Beine im Kniegelenk. Die Gangrän macht Fortschritte, es treten neue gangränöse Stellen an den beiden Glutaealgegenden auf, später auch noch an anderen Orten; der Tod erfolgt, nachdem die Kranke stark abgemagert ist, und unter Eiter und abundanter Eiterung. Die Sektion ergibt völlige Integrität des Herzens, der Arterien und Venen, Hydrocephalus internus, Perimeningitis chron., leichte, diffuse Sklerose des Rückenmarks und eine schwere Degeneration der Nerven an beiden Unterschenkeln in der Nähe der gangränösen Stellen.

Brongues, der seiner These den Titel „Etude sur les formes graves de la maladie de Maurice Raynaud“ gegeben hat, rechnet den Fall dieser Krankheit zu, während auch er doch höchstem

¹⁾ Remak, Neuritis und Polyneuritis. *Nathurgs spezielle Pathologie und Therapie* XI, 3, 3. S. 256.

als Gangraena necrotica zu gelten hätte; auch das ist freilich nicht bewiesen, kaum wahrscheinlich.

Der zweite von Pitres et Vaillard mitgeteilte Fall verdient ebenfalls nicht die Bezeichnung „Raynudsche Krankheit“. Hier stellte sich bei einem 56jährigen Fräulein, das sonst gesund und hereditär nicht belastet war, vor einem halben Jahr Ermüdung und Taubheitsgefühl in den Beinen ein, vier Monate darauf wurden die Füße blaß, schwellen dann an, wurden schmerzhaft und bedeckten sich mit roten Flecken. Die Untersuchung ergibt systolisches Geräusch an der Herzspitze, starke Diastolen, an beiden Füßen symmetrische Gangrän mit Aufhebung der Sensibilität bis über die Mitte der Füße. Die Gangrän delimitiert sich in den nächsten Tagen bis zum Unterschenkelgelenk aus, die Kranke stirbt im halluzinatorischen Zustand unter hochgradiger Erschöpfung nach 17 Tagen. Das Gehirn, das Rückenmark, das Herz und die Gefäße erweisen sich bei der Sektion als normal, speziell sind sowohl Arterien wie Venen an den Beinen völlig intakt. Der Nervus plantaris internus sinister enthält keine gesunden Fasern, sie sind teils ganz geschwunden, teils zerfallen. Der Tibialis posterior sinister und dexter und der Tibialis anterior sinister zeigen ähnliche Veränderungen, der Popliteus internus sinister ebenso wie die rechtsseitigen Nervi poplitei sind sehr wenig verändert, während der Popliteus externus sinister wieder keine normalen Fasern enthält. Der rechte Achillessehne ist normal.

Etwas mehr nähert sich der von Wigglesworth mitgeteilte Fall den klassischen Fällen der Raynudschen Gangrän. Freilich erfahren wir auch da nichts über vorangehende vasomotorische Symptome; es handelt sich um eine 26jährige Frau, die an Epilepsie litt und auch psychisch zeitweise Störungen darbot. Das Herz war hypertrophisch, der Urin enthielt etwas Eiweiß, die Hände waren klein, die Muskeln überall atrophisch, und an mehreren Fingern waren einzelne Teile untergegangen. An der rechten Hand war am ersten, zweiten und vierten Finger nur ein Teil der ersten Phalange noch vorhanden, am dritten nur die erste Phalange, der fünfte war normal. An der linken Hand fehlten dem Mittelfinger die beiden letzten Phalangen, die anderen waren intakt, standen aber in Beugekontraktur. An beiden Füßen fanden sich Nekrosen an den großen Zehen. Über die Entstehung dieser Defekte war nichts zu erfahren. Während der Beobachtung bildeten sich nun kleine Exkoriationen an verschiedenen Fingern und Zehen, einmal am rechten Oberarm, und die ausgeprägteste Gangrän entstand auf der Dorsalseite des zweiten Interphalangealgelenks des linken vierten Fingers; sie machte eine Amputation nötig. Der Tod erfolgte plötzlich nach einem epileptischen Anfall. Die Sektion ergab eine Nephritis, das Gehirn erschien normal.

An den Nerven fand sich neben einer (wohl artifiziellen) Ver-

breiterung der perineuralen Lymphräume eine Hypertrophie der Nervenscheiden und eine Degeneration der Nervenfasern; die Affektion war eine sehr ausgebreitete und hatte, wenn auch in wechselnder Intensität alle dreizehn untersuchten Nerven befallen, eine Tatsache, die uns in der Beziehung dieses Befundes auf die circumscripte Gangrän immerhin höchst zweifelhaft machen muß.

Sicher der Raynaudschen Krankheit zuzurechnen ist der von Affleck beobachtete erste Fall, in dem neben den Erscheinungen der lokalen Cyanose und der lokalen Synkope an den Füßen, an denen schließlich auch eine ziemlich ausgedehnte Gangrän eintrat, später typische vasomotorische Anfälle an den Ohren sich einstellten. Die Untersuchung des amputierten linken Fußes ergab Integrität der Blutgefäße; an den vom Krankheitsherd am weitesten entfernten Teilen des N. plantaris internus fand sich eine ausgedehnte Neuritis; manche von den Nervenbündeln waren ganz zerstört. Kornfelds Fall ist komplizierter, es bestanden tabische Symptome und außerdem eine rechtseitige Peroneuslähmung, ferner Raynaudsche Symptome an den Zehen beider Füße. Die Sektion ergab neben der Tabes eine akute Neuritis beider Peronei. In einer Beobachtung de Grazias, wo bei einem elfjährigen Kind nach Typhus Gangrän mehrerer Finger beider Hände eintrat, fand sich an den amputierten Teilen Verdickung und Verwachsung des Epä- und Perineuriums, das Endoneurium war etwas geschwollen; auch einige Nervenfasern waren alteriert; dagegen waren die Gefäße völlig normal. Das mir allein vorliegende Referat gestattet kein sicheres Urteil über diesen Fall.

Inwieweit in den erwähnten Fällen und namentlich in den von Affleck und von Kornfeld mitgeteilten die Neuritis wirklich als Ursache der intra vitam beobachteten Symptome von Raynaud anzusehen ist, bleibt der Besprechung im nächsten Kapitel vorbehalten.

Wir schließen an diese Fälle zunächst diejenigen an, in denen sich Veränderungen am Gefäßsystem fanden.

Wir haben schon oben, daß einmal klinisch die Erscheinungen der allgemeinen Arteriosklerose vorhanden waren; einen Fall, in dem die Sektion gemacht werden konnte, beschreibt Thiersch. Hier war nach mehrwöchentlichem Vorgehen intermittierender, typischer, vasomotorischer Erscheinungen und heftiger Schmerzen an allen Zehen beider Füße, bald hier, bald da eine meist oberflächliche Gangrän eingetreten. Die Erscheinungen allgemeiner Arteriosklerose waren klinisch nachweisbar. Drei Jahre lang bestand dieser Zustand, ab der Tod infolge einer Apoplexie eintrat. Die Sektion ergab eine große Haemorrhagia cerebri, Lumen der Carotiden weit und klaffend, Arteriosklerose der Carotiden und der Basilaris. Herz vergrößert, besonders der linke Ventrikel, Arteriae coronariae stark. In der A. cruralis und

poplitea Endarteriitis obliterans bis zur Obliteration, in der Arteria tibial. post. mikroskopisch ungewöhnlich starke Arteriosklerose. Medulla und Kleinhirn normal — Atheromatose und Herzerweiterung beschreibt auch Cattle in einem zur Obduktion gekommenen Fall. In einem von Breagues mitgetheilten ähnlichen Fall ist die Diagnose Raynaud in keiner Beziehung gerechtfertigt. Eine anatomische Erkrankung des Herzens bestand auch in einer von Raques mitgetheilten und schon von uns erwähnten Beobachtung.

Bereits unter den von Raynaud selbst aufgeführten Beobachtungen finden sich zwei, in denen die Sektion Veränderungen am Herzen nachwies. In der einen, von Godin mitgetheilten, bestanden die Zeichen eines Klappenfehlers, ebenso in einer zweiten von Tassinard. White beschrieb einen Fall, der klinisch sehr vom Raynaud'schen Typus abwich. Es bestanden die Symptome eines Herzleidens, gelegentlich Cyanose, und einzelne Teile der rechten oberen und beider unteren Extremitäten wurden gangränös. Die Sektion ergab neben Veränderungen in der Lunge auch solche am Herzen und einen Einholst in der rechten Arteria, dagegen waren die Arteria tibialis postica und die Arteria dorsalis pedis beiderseits normal, ebenso wie die Nerven. Schließlich sei auch noch eine Beobachtung von Colcott Fox erwähnt, die ebenfalls einen sehr komplizierten Fall mit anatomisch nachgewiesener Herzhypertrophie betrifft. In einer weiteren Reihe von Fällen deckte die Sektion Veränderungen des Gefäßsystems auf, ohne daß klinisch Zeichen einer Erkrankung der Gefäße zum Ausdruck gekommen wären. In einem von Eisenberg mitgetheilten und von uns schon erwähnten Fall handelte es sich um eine Endarteriitis syphilitica, wir haben bereits festgestellt, daß auch in diesem Fall die Diagnose Raynaud noch zweifelhaft erscheint. Zuerst — schon im Jahre 1870 — scheint Begg als Ursache der symmetrischen Gangrän Gefäßveränderungen angesehen zu haben. Er fand in seinem durch die Schwere und Extensität der Gangrän ausgezeichneten Falle, der aber ohne Zweifel als Raynaud'sche Krankheit anzusehen ist, eine organische Veränderung der Capillaren; leider kann man sich aus seiner Schilderung kein sicheres Bild von der Art dieser Veränderungen machen. Sicher scheinen aber die großen Gefäße nicht alteriert gewesen zu sein. Sehr interessant und sehr wichtig sind die beiden von Castellino und Cardi mitgetheilten Beobachtungen. Beide Male fand sich hier eine Erkrankung der periphersten Enden der Arterien an den spontan abgestoßenen Extremitätenenden. Wir gehen im folgenden einen etwas ausführlicheren Bericht über den ersten Fall, der klinisch durchaus den Typus eines echten Raynaud darstellt; eine geringe und unwesentliche Abweichung von diesem wäre höchstens darin zu erblicken, daß sich auch die ersten Anzeichen einer Sklerodaktylie bemerkbar machen.

21jähriger Mann, Malum von geringer Größe bis vor 1½ Monaten, kein Alkoholismus, keine Lues. Vor 14 Tagen plötzlich im Anschluß an heftige Aufregung Anfallsanfall an der Spitze des dritten und vierten linken Fingers (zufällig auch an dem Finger ergreifen); diese wurden weißblau und kalt; die Erscheinungen von Schmerz und Kälte wurden nach stärker, nach einigen Tagen tritt eine Farbenveränderung ein, die Haut der affizierten Finger wird bläulich und geschwollen. Status praesens: Zarter Allgemeinbau, Puls 72, geringer Mittelnerv, Urin normal, leichte Einschränkung des Gehörvermögens, sonst Nervensystem normal. Betroffene Hand rot-cyanotisch, links etwas weniger, alle Finger außer den beiden Daumen geschwollen und gelötet, nach der Spitze zu wird die Farbe immer mehr blau. Beiderseits Kältegefühl und Parästhesien. Haut sonst normal, nur am Unterarm etwas ödematös und kalt; an der Hand Haut sehr gespannt, hart, schwer faltbar, Nägel anfangs rotlich, Mehl und schwarz, blühend, überwacht. Keine abnorme Schweißsekretion. Erste Schmerzanfälle, so daß man den Kranken vor Selbstbeschädigung schützen muß; dabei keine objektive Sensibilitätsstörung. Die erhebliche Erhöhung der Temperatur der betroffenen Teile wird nach thermometrisch festgestellt; nur am Daumen nimmt sie etwas ab. In der nächsten Zeit wurden anfallsweise die Spitzen der Finger schwarz, das Ödem verschwand, das Volumen der Hand wurde geringer, die subjektiven Beschwerden litten mit dem Erscheinen einer Dermokloneurie nach. Betroffen waren die erste und zweite Phalanx aller Finger; die sekundären Teile wurden angetastet. Rasche Heilung. Die Untersuchung ergab an den kleinen Blutarterien etwas verdickte Intima, doch die Gefäße überall durchgängig, häufige kleinstufige Infarkte von distalen Arterien kreuz. In den AA. collaterales waren die Veränderungen viel intensiver, die Intima war stark verdickt, es fanden sich Thromben im Lumen der Organisation, die roten Blutkörperchen waren in Pigment umgewandelt; die Muscular war intakt, die Adventitia war etwas infiltriert. Die Vasa vasorum zeigten starke Intimaverdickung, ebenso die Gefäße der Nerven, von denen die kleinsten völlig verschlossen waren; die Nerven selbst waren normal.

Ähnliche Veränderungen fanden sich auch in Castellinos und Cardis zweitem Fall, der durch das Vorkommen multipler Panaritien und eines erheblicheren Grades von Sklerodermie, auch im Gesicht, und an anderen Stellen des Körpers, etwas atypisch ist. Ebenso ist auch ein schon ein Decennium früher von Goldschmidt veröffentlichter Fall dadurch kompliziert, daß das typische Bild der allgemeinen Sklerodermie und nur daneben Zeichen von Raynaud vorlagen. Immerhin wollen wir schon hier das Ergebnis der pathologisch-anatomischen Untersuchung in diesem Fall, bei dem eine Totalsektion stattfinden könnte, erwähnen. Auch hier fand sich eine Verdickung der Wände der kleinen Gefäße, besonders der Intima der Arterien; stellenweise bestand völliger Verschluß, und zwar nicht nur an den Gefäßen der klinisch veränderten Teile, sondern auch an denen der von intravitalen Veränderungen freigebliebenen, und ähnliche Erscheinungen bestanden auch an den kleinen Gefäßen der Lungen und Nieren; dagegen blieben überall die großen Arterien völlig normal, ebenso waren die untersuchten Nerven normal. Auch Noone hat eine ähnliche Gefäßerkrankung beschrieben.

Zu derselben Kategorie gehört auch der folgende von Lyle und Greaves mitgeteilte Fall.

54jähriger Mann. Raynaud'sche Krankheit mit psychischen Störungen. Tod an Erstickung und Lungenödem. Sekundäre Sklerose der Lungenarterien, Ödem der Lungen, perikarditischer Erguß. Sklerose der kleinen Lungenarterien, des Arterien des Extremitäten, und Sklerose der Gelbfalten und Bartholin'schen Stränge, zum Teil auch der Seitenstränge, während die große Substanz im wesentlichen intakt ist. Das Bemerkenswerteste ist, daß die kleinen spinösen Arterien ebenso wie die der Pia durch endotheliale Wucherungen fast völlig okkludiert sind.

Nach der Ansicht der Autoren, die sich auf den angegebenen Befund stützt, sitzt die initiale Läsion beim Raynaud an den kleinsten Arterien, nicht nur der Extremitäten, sondern auch der tieferen Teile (Auge, Rückenmark, Lunge).

Ein großes Interesse bietet der von Beck klinisch, von Kolisch anatomisch untersuchte Fall.

Es handelt sich um einen 6 Monate alten Säugling, das erste Kind gewisser Eltern, das ein Vierteljahr lang gestillt, dann künstlich ernährt wurde, wobei es sich gut entwickelte. Vor 8 Wochen bemerkte die Mutter plötzlich bei gutem Wohlbefinden des Kindes, daß die linke Hand, beide Füße und die rechte Ohrmuschel bläulich verfärbt waren. Nach ungefähr 6 Stunden soll alles verschwunden gewesen sein. Diese rotblauen bis blaurotbraunen Verfärbungen traten nun beinahe jeden Tag auf und betrafen oft nur eine Hand oder einen Fuß, nicht selten beide Hände, Füße und Ohren. Dabei sollen die betroffenen Teile angeschwollen sein und sich kalt angefühlt haben. Das Kind sei dabei immer sehr munter gewesen und habe bei Berührung des betroffenen Körperteiles laut geschrien. Bei der ersten Untersuchung am 23. September 1908 findet man ein in seiner körperlichen Entwicklung zurückgebliebenes Kind. Die linke Hand und der linke Fuß sind rotblau verfärbt, mit scharfer Grenze zum Unterarm und Unterschenkel, fühlen sich kalt an, bei Berührung schreit das Kind laut auf. Die Schwellungsbildung ist offenbar in den betroffenen Teilen stark erhöht. Die übrige Untersuchung, insbesondere die des Herzens, der Gefäße und des Nervensystems ergibt nichts Besonderes. Wassermann ist negativ, ebenso die Piquette-Reaktion auf Tuberkulose. Am nächsten Tage verschwindet die blaurote Verfärbung des linken Fußes, am übernächsten auch die der linken Hand, am 26. September linke Hand wieder bläulich rot verfärbt, am 28. September die linke Hand blaurotbraun mit scharfer Grenze nach dem Unterarm zu, geschwollen, sehr schmerzhaft. Auf dem Handrücken haben sich mehrere, mit Hautgestülften Blasen gebildet. Das Kind schreit viel. Am nächsten Tage wieder gelbliche Besserung. Am 2. Oktober plötzlich rechte Hand blaurotbraun, die Verfärbung geht mit unregelmäßiger Grenze bis zum unteren Drittel des Unterarmes. Gegen Abend bläut die Hand wieder ab. Am 8. Oktober Verfärbung der linken Ohrmuschel, abends plötzlich intensive schmerzlose Verfärbung der linken Hand mit scharfer Grenze zur normalen Hand. Die Hand ist stark geschwollen, steif, kalt, sehr druckempfindlich. Es bilden sich auf dem Handrücken wieder Hautgestülpte Blasen. Diese Erscheinungen wechseln weiter, am 11. Oktober erkrankt das Kind an einer Entzündung, der es am 20. Oktober erliegt. Die anatomische Untersuchung ergibt: mikroskopisch sind Gehirn, Rückenmark und periphere Nerven vollkommen normal. An der linken Radialis findet sich eine starke Intimaverdickung. Diese besteht aus hartem, kernarmem Gewebe. An einzelnen wenigen Stellen ist es zu einer Verdickung der Intima gekommen. Es finden sich keine zelligen Infiltrate, keine regressiven Veränderungen, zahlreiche elastische Fasern. Dasselbe läßt sich an der rechten Arteria radialis nachweisen, hier ist aber die Elastica verdickt und in ihren inneren Lagen zum Teil abgebrochen. Solche polsterartigen und leinwandartigen Verdickungen finden sich an vielen Stellen der Arteria radialis, geringere Veränderungen an der

Arteria axillaris. Dagegen leiden sie an den kleineren Gefäßen. Meist ist die Hälfte des Gefäßquerschnittes von der Verdrickung eingenommen. Ähnliche Verdrickungen (und auch an den Gekrösarterien nachweisbar), ferner auch an den Venen der Hand und der Unterarme und zwar besonders an den größeren. Die Verdickungen haben hier dasselbe Aussehen wie an den Arterien, nur sind sie etwas locker. Media und Adventitia sind ohne Reaktion. Es besteht also eine hochgradige hyperplastische Intimaverdrickung.

Kolisch nimmt an, daß es sich wahrscheinlich um eine Affektion des Gefäßnervenapparates handelt, die zu spastischer Kontraktion der Gefäße und damit zu den klinischen Veränderungen geführt hat, und er erklärt daraus die hyperplastischen Vorgänge an den Gefäßen. Dafür spricht nach seiner Ansicht auch das Mitbefallen sein der Venen. Die Störungen an den Hirnarterien beweisen, daß in diesem Fall wahrscheinlich das gesamte Gefäßnervensystem unter pathologischen Bedingungen gestanden hat. Der Hinweis, daß die Gefäßveränderungen nicht primäre zu sein scheinen, ferner der Hinweis darauf, daß jedenfalls die klinischen Erscheinungen nicht in direkter Abhängigkeit von den Gefäßveränderungen stehen können, ist sehr wichtig und bedeutsam. Daß es sich hier nicht um eine einfache endarterielle Gangrän gehandelt haben kann, liegt nach den ganzen Erscheinungen auf der Hand. Es ist ja gar nicht zu einer wirklichen Obliteration des Lumens der betreffenden Gefäße gekommen.

Viel weniger eindeutig als dieser klare Fall scheint mir der zu sein, den Benders ausführlich publiziert hat, den ich schon wiederholt erwähnt habe.

Hier handelt es sich um eine 44jährige Frau, die am 11. Januar 1910 an einem hämorrhagischen Zerebral erkrankte und am 22. Januar in eine Anstalt aufgenommen werden mußte. Am 31. Januar bekam sie zusehends im Anschluß an sehr heftige Bewegungen, die sie mit ihrem Gesamtkörper ausgeführt hatte, bei denen vielleicht die Wundheile eines intensiven Stoß erhalten hatte, heftige Schmerzen im rechten Arm und rechten Bein. Am nächsten Abend fällt auf, daß die Finger an dem schmerzhaften Arm Meib und kalt sind, am 2. Februar findet sich an den Spitzen des Daumens, des Zeigefingers, des Mittelfingers und Ringfingers der rechten Hand eine schwarze Verfärbung, diese schwarzen Teile sind trocken und hart, ebenso gangränöse Partien an allen Zehenspitzen des rechten Fußes. Die Arteria radialis fühlt sich rechts etwas härter an als links, zeigt aber einen deutlichen Puls. An der Hand begrenzt sich die Gangrän scharf auf Teile der letzten Phalangen, am Fuß beschränkt sie sich weiter nur auf einen am 12. Februar ist der ganze Fuß gangränös und noch an der Vorderseite des Unterschenkels finden sich talergroße Blasen, die nach ihrer Entleerung einen Ektasierverlust mit Hautschwarzen Boden zurücklassen. Am 14. März wird das rechte Bein 1) am unterhalb des Knies amputiert. An der Hand treten starke blutige Granulationen auf und mit Abstoßung der nekrotischen Spitze des Zeige- und Ringfingers tritt eine allmähliche Heilung ein. Im weiteren Verlauf sind an der Hand noch heftige Sensibilitätsstörungen und Atrophie der Muskeln nachweisbar, die allmählich aber wieder verschwinden, ebenso wie die vasomotorischen Störungen. Die Wunde am Bein heilt allmählich, die Umverteilung von Chylus und Nerven an dem gesamten Teil des amputierten Beines verläuft folgendermaßen: Es handelt sich eine sehr starke Endarteriitis, wodurch in

den größeren Gefäßen nur noch ein sehr verkümmertes Lumen übrig geblieben ist, während in den kleineren Venen sowohl wie in den Arterien eine völlige oder fast völlige Verstopfung des Lumens eingetreten ist. Wo das Lumen noch etwas größer war, stülpte sich hier und da die verdickte Intima polsterartig in das Lumen hinein. Diese Auswüchse sind, zumal an den Spitzen noch deutlich als organisierte Thromben zu erkennen, im jungen Bindegewebe findet man nämlich noch Blutkörperchen eingeschlossen. Die Untersuchung der Nerven war in ihren Resultaten negativ, weder Faserverlust noch Entartung war irgendwie nachweisbar.

Die Muskulatur verhielt sich auf dem Durchschnitt ungefähr, neben Teilen, wo sie als normal gelten konnte, kommen andere vor, bei denen die glatten Muskelfasern zufällig aneinander gewichen sind. Hier sind auch die Zellkerne weniger gut gefärbt. Von Hyperplasie der Vasa vasorum war nirgends eine Spur zu entdecken. Die Adventitia ist normal.

Auch Benders schreibt der Endophlebitis und Endarteritis keine große Rolle für das Entstehen der Gangrän zu. Eher ist er geneigt, der Thrombenbildung einige Bedeutung zu messen, doch wagt er nicht zu entscheiden, wie groß diese sei. Er ist jedenfalls der Auffassung, daß die Alterationen der Gefäßwand durch einen Gefäßspasmus zu erklären sind. Meine Bedenken gegen die Auffassung des Benderschen Falles als eines solchen von Raynoldscher Krankheit beruhen auf der an und für sich recht seltenen Asymmetrie, auf dem Fehlen stärkerer vasomotorischer Erscheinungen vor dem Einsetzen der Gangrän, auf der großen Ausdehnung der Gangrän am Fuße und schließlich auch auf den schweren anatomischen Veränderungen der Gefäße, die in so großer Entfernung von den gangränösen Stellen nachweisbar waren. Immerhin will ich keineswegs behaupten, daß man in der Rubrizierung des Falles nicht schwankend sein kann.

Sehr geringfügig sind die Veränderungen der Gefäße in einem Barlowischen Fall. Hier waren die Arterien thrombosiert, aber es war sehr zweifelhaft, ob diese Thrombose nicht eine Folge der Gangrän war. Die mittlere und äußere Wand waren etwas verdickt, sowohl in den Arterien wie in den Venen, aber auch diese Veränderungen waren frische, die Nerven waren in diesem Fall ebenso wie in den übrigen, zuletzt erwähnten intakt. Sehr geringfügig sind auch die Veränderungen, die Verdelli beschreibt. Seine sehr genaue, klinisch interessante, sonst wenig gründigte Beobachtung teile ich etwas genauer mit.

Ein 1-jähriges Kind erkrankte mit Fieberkrämpfen und leichten Magenbeschwerden. Nach 3—4 Tagen traten zahlreiche livide und rote Flecken am ganzen Körper auf. Diese wurden allmählich blau und schwarz, an den Hals- und Fußrücken hoben sich große Blasen, die eine weiß, trübe Flüssigkeit enthielten. Außerdem waren, als der Arzt das Kind zuerst sah, die Finger holzartig schwarz und kalt, an der linken Hand mehr verändert wie an der rechten. Am linken Fuß sind die Spitzen der Zehen ebenfalls von einer trockenen Gangrän befallen, kleine nekrotische Flecke finden sich ferner auch an den Wangen, an der Nase und den Ohren. Die nekrotischen Teile stellen sich langsam ab, und es erfolgt eine allmähliche Heilung. Einige Monate später kam das Kind wieder in Behandlung mit ausgeprägten Anfällen von lokaler Apoplexie und Cyanose an den Enden.

Es handelt sich hier um einen Fall Raynaud'scher Erkrankung mit umgekehrter Reihenfolge der Symptome, indem wahrscheinlich unter dem schädigenden Einfluß einer Infektionskrankheit, die wohl eine Influenza war, erst symmetrische Gangrän und erst nach deren Ablauf die Störungen der Vasomotilität eintraten. Die Untersuchung der abgestorbenen Teile ergab nun hier eine Erweiterung der Capillaren, eine geringe Verdickung der Arterienwände und eine kolossale Erweiterung namentlich der Venen, deren Wände nicht wesentlich verändert waren. Alle Gefäße waren thrombosiert, nur selten fanden sich neugebildete Capillaren. Die Nerven zeigten nur Veränderungen, die Verfasser als Folgen der Gangrän ansieht.

Dieser Befund leitet uns zu denjenigen Fällen über, in denen sich in den Endverzweigungen sowohl der Gefäße wie der Nerven anatomische Veränderungen nachweisen ließen. Auch hier müssen wir wieder Beobachtungen ausscheiden, in denen die Diagnose „Raynaud“ unangewandt ist. Als solche möchte ich den dritten Fall von Bregues nennen, ebenso einen bisweilen hierher gerechneten Fall von Panas. Bervuets beschrieb 1894 einen Fall von Polynouritis mit schließlich symmetrischer Gangrän bei einem 36jährigen Alkoholisten. Die Untersuchung der amputierten Extremitäten ergab neben der Neuritis noch sehr starke Arteritis obliterans. Welches der primäre Prozeß war, ist nicht sicher, ob der Fall der Raynaud'schen Krankheit zugehört, vermag ich nach den mir vorliegenden Notizen nicht zu beurteilen. Ähnliche Befunde konnte Bervuets noch in einem zweiten Fall erheben. Recht zweifelhaft ist auch eine Beobachtung von Rhakmaninoff, der bei einem herabgekommenen Menschen Gangrän beider Füße im Verlauf dreier Tage sich entwickeln sah und eine Amputation beider Unterschenkel im oberen Drittel vornehmen mußte. Die Untersuchung ergab degenerative Neuritis aller Nerven, und zwar sind die Veränderungen an den feinsten Verzweigungen überall stärker als an den Stämmen, die kleinen Gefäße sind bis zum völligen Verschwinden des Lumens verengt, insbesondere sind auch die Gefäße innerhalb und außerhalb des Perineuriums erkrankt. Es erscheint mir sehr verführerisch, die Nervenkrankung von der der Gefäße herzuleiten. Ähnliche Befunde, insbesondere auch Erkrankung der Gefäße der Nerven konnte auch Giovanni erheben. Im Gegensatz zu Rhakmaninoff und wohl auch Giovanni hält Bervuets die Nervenveränderung für die primäre.

Sehr typisch ist in klinischer Beziehung Dehlos Fall:

37-jähriges Fräulein. In letzter Zeit viel mit Waschen beschäftigt. Nach einem solchen tragen zuerst im kalten Wasser Finger Blaufärbung und Anschwellung auf, einige Stunden später sind alle Finger beider Hände ergripen. Abwechselnd mit dem Cyanose voll auch Synkope beider Hände vorgekommen sein. Sehr heftige Schmerzen. Mittelfinger geschwollen, heiß anzufühlen, diese Verfärbung und Schwellung

schwand jedoch bald. Die Finger werden immer dunkler, und nach 14 Tagen trat Gangrän ein, die fast ganz genau symmetrisch die Fingerspitzen beider Hände betraf; die abgestorbenen Teile sind gefühllos, sonst besteht nur eine Abkämpfung der Sensibilität, keine Muskelatrophie. Langsame Demarkation, Abstoßung einzelner Teile; einige Monate später wurden einige andere abgetragen. Damit künte die Krankheit völlig auf, nur bestanden noch einige Schmerzen in den Stümpfen, und diese lösten sich kühl aus. Die Untersuchung zu dem vierten Monate nach dem Auftreten der Gangrän angestrichen Stücken ergab eine kleine Endarteritis und Endophlebitis, und eine geringe Nervenregeneration.

Dohio selbst ist sehr geneigt, schon die Gefäßveränderungen, ganz gewiß aber die Nervenveränderungen als sekundäre anzusehen. — Collier beschrieb einen Fall, der in seiner Symptomatologie an Raynaud erinnert, und bei dem sich außerdem die Symptome einer subakuten Peritonitis gefunden hatten. Der Tod trat im vierten Monat der Krankheit ein. Teile der vier inneren Zehen des linken Fußes waren gangränös geworden, im Peritoneum fanden sich zahlreiche alte Adhäsionen, namentlich in der Gegend des Plexus solaris. Das Gehirn, das Rückenmark und der linke Nervus tibialis waren, auch mikroskopisch untersucht, intakt. Es bestand ein geringer Grad von Endarteritis der kleinen Gefäße in der Nähe des abgestorbenen Gewebes, die Collier als sekundär auffaßt.

Um die Liste der bei der Raynaudschen Krankheit erholten positiven Befunde zu vervollständigen, haben wir nur noch einen Falles von Fagge zu erwähnen, den Morgan zitiert. Hier fand sich, nachdem intra vitam vasa motorisch-tropische Störungen an den Händen bestanden hatten, ein Mediastinaltumor, der den ersten Nervus dorsalis und den Stamm des Sympathicus mitgriffen hatte.

Völlig negativ war der Befund in einer Anzahl von Beobachtungen, die natürlich besonderes Interesse bieten. Als ersten erwähne ich einen von Goldstandt beschriebenen, allerdings recht schwer zu beurteilenden Fall.

Eine 25jährige Näherin, die in die äußere Station der Charité aufgenommen wurde, sagte an sämtlichen Fingern eine äußerst eigenartige, monstöse Verformung, als ob die Hände in eine schwere Pochschüttung getaucht worden wären. Sie war sonst gesund, gegen Kälte nicht empfindlich. Vor vier Jahren erkrankte sie zum erstenmal mit dieser eigenartigen Verformung der Hände mitunter heftigen Schmerzen. Fast ein halbes Jahr dauerte das Uebel, bis sie im Sommer wieder gesund wurde. Zwei Jahre später trat eine ähnliche Affektion auf, verschwand nach zwei Monaten wieder, um jedoch schon nach einem Jahr wiederzukommen und nun nicht mehr ganz zu regnen. Jetzt sind die Finger sämtlich hell schmelzhaft, etwas geschwollen und adhärent, dabei besonders heftige Schmerzen. Die Sensibilität ist im wesentlichen intakt. Am zweiten und dritten Finger rechts und am zweiten Finger links entstanden einige kleine Blasen, die unternimmt wurden. Da erkrankte Pat. plötzlich an einer schweren Infektionskrankheit unbekannter Genese und unmittelbar darauf trat teils Cyanose, teils Rubeor der Extremitätenenden ein und schon nach 24 Stunden der lokale Teil der betreffenden distalen Teile. Die Sektion

der nach acht Tagen gestorbenen Pat., die trotz aller den heftigsten Schmerzen gelitten hatte, ergab die Zeichen einer über den ganzen Körper verbreiteten Sepsis, deren Genese unklar blieb. Das Nervensystem war ganz intakt, allerdings scheinen die peripheren Nerven nicht untersucht zu sein. Auch die übrige Untersuchung war von einer makroskopischen. Auch das Gefäßsystem war normal.

Augenscheinlich war, so schließt Goldstaubt seine Mitteilung, unter dem Einfluß einer Infektionskrankheit aus einer vasomotorischen Störung ein symmetrischer Brand geworden.

Viel einfacher ist Samuel Wests Fall. Er fand bei einem an einer Lungenentzündung zugrunde gegangenen jungen Menschen, der seit einem Jahr an Anfällen von Synkope und Asphyxie locale und an ganz oberflächlicher Gangrän der Finger gelitten hatte, die Art. radialis, den Nervus medianus und die Medulla bei mikroskopischer Untersuchung normal. Ganz negativ war auch der Sektionsbefund in einer leider nur fragmentarisch mitgeteilten Beobachtung Billroths. Die ältesten Sektionsbefunde mit negativem Ergebnis stammen von Sully 1839 und Raynaud selbst. Sully fand den Sympathicus normal, ebenso die Arterien in den abgestoßenen Gliedern. Raynaud beobachtete (Fall 9 der These) eine Frau, die neben den Symptomen der Raynaudschen Krankheit an Leukocythämie litt (siehe oben). Das Herz und die Arterien waren, wie auch Injektionspräparate lehrten, normal. Ein zweiter Fall von Raynaud mit negativem Sektionsbefund ist der 17. seiner These; auch hier waren die Arterien gesund, nur adhärirten sie etwas am Knochen. Die letztgenannten Befunde sind natürlich nicht sehr verwertbar, weil die Sektionsergebnisse zu unvollständig beobachtet und mitgeteilt sind.

Auch unter den spärlichen Sektionsbefunden der letzten zehn Jahre fanden sich drei mit negativem Sektionsergebnis. In einem Falle von Souques et Vincent (Asphyxie und Gangrène symétrique im Endstadium einer Bronchiektasie) war das Nervensystem makroskopisch normal. Dufour fand in seinem Fall keine Veränderungen des peripheren Nervensystems, auch die kleinen Arterien waren normal. Coulaujon (17jähriges hysterisches Mädchen, symmetrische Gangrän beider drei letzten Zehenendphalangen, Tuberc. pulm.) fand die N. ischiadici und peronei, ebenso wie die Arteria femoralis und tibial. post. ohne Veränderungen. Man sieht, wie fragmentarisch alle diese Mitteilungen sind.

Überblicken wir die Resultate der pathologisch-anatomischen Untersuchungen bei der Raynaudschen Krankheit, so kommen wir zu einem wenig tröstlichen Ergebnis. Wir müssen von vornherein Danks beistimmen, wenn er sagt, daß eine hinreichend genügende Untersuchung der in Frage kommenden Gewebe bei einem typischen Fall von Raynaudscher Krankheit überhaupt noch nicht vorliegt. Das gilt heute noch genau so wie vor zehn

Jahren, als die erste Auflage dieses Buches erschien. Keine der erwähnten Untersuchungen mit negativem Befund ist so genau, daß wir mit einiger Sicherheit sagen könnten, die Raynaudi'sche Krankheit hat keine uns zurzeit erkennbare pathologisch-anatomische Grundlage, insbesondere fehlen überall die Untersuchungen der Gefäßnerven in der Art, wie sie Lapiusky im Experiment vornahm. Ich verkenne keinen Augenblick die technischen Schwierigkeiten derartiger Untersuchungen. Was die positiven Befunde angeht, so sind sie, wie wir sahen, von einer auf den ersten Blick beängstigenden Mannigfaltigkeit, doch lassen sie sich immerhin in zwei oder drei Kategorien zusammenfassen: es fanden sich Veränderungen des Gefäßsystems und Veränderungen des Nervensystems resp. beider gleichzeitig. Wir können den Befunden aber noch weiter entnehmen, daß in der Regel weder Veränderungen des Herzens noch der größeren Gefäße noch auch grobe Veränderungen des Centralnervensystems die pathologisch-anatomische Grundlage der Raynaudi'schen Krankheit bilden können, da wir diese in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle völlig vermiesen und dort, wo wir sie finden, kaum je als wesentlich ansehen können. Schwieriger wird die Frage nach der Bedeutung der an den feineren Verzweigungen der Gefäße oder der Nerven oder beider zugleich gefundenen Veränderungen. Wir wollen als vorläufiges Ergebnis hier nur noch einmal ausdrücklich konstatieren, daß das Vorkommen derartiger Veränderungen kein konstantes ist, daß sie ganz fehlen können, daß die Gefäße allein, daß die Nerven allein, und daß beide zusammen ergriffen sein können, ohne daß klinisch ein sicherer Unterschied zwischen den einzelnen Fällen in die Augen springt. Daß solche Ungleichheiten in den Einzelbefunden zu besonderer Vorsicht in Bezug auf ihre Verwertung für die Pathogenese mahnen, zu deren Besprechung wir jetzt übergehen wollen, liegt auf der Hand. Vorher sei nur noch bemerkt, daß wir von einer Besprechung der pathologisch-anatomischen Verhältnisse der nekrotischen Teile aus dem Grund absehen können, weil dieselben in keiner Weise von den sonst bei Gangrän beobachteten abweichen, mag es sich nun um die häufigen Fälle von trockenem oder um die selteneren von feuchtem Brand handeln. Verdelli hat in seinem Fall genaue Untersuchungen darüber angestellt, ohne jedoch etwas erheblich Neues zu finden.

Pathologie.

Wir werden, ehe wir uns mit der Frage der Pathogenese der ganzen Krankheit beschäftigen, zunächst einmal die der Einzelsymptome zu erledigen haben, und wir beginnen da mit der Frage: Wie entstehen die Zustände der Synkope locale und der Asphyxie locale? Beide Symptome gehören, wie uns die klinische Beobachtung

gelehrt hat, so eng zusammen, daß wir schon von vornherein zu der Annahme geführt werden, es müßten recht verwandte und leicht ineinander übergehende Ursachen für beide vorhanden sein.

Wenn wir uns die klinischen Erscheinungen der Asphyxie und Synkope locale kurz noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen, ihr göttliches und rasches Entstehen aus dem normalen Zustande heraus, ihr Auftreten bald an dieser, bald an jener Stelle des Körpers, wobei eine entschiedene Vorliebe für die zipfelnden Teile und für Symmetrie bevertrifft, ihr Verschwinden, das nicht weniger rasch vor sich geht wie ihr Auftreten, und wobei immer wieder der normale Zustand an die Stelle des krankhaften tritt, wenn wir alles das berücksichtigen, so brauchen wir, meine ich, eine ganze große Kategorie von Ursachen für diese Symptome nicht erst in Erwägung zu ziehen, alle die nämlich, durch die an irgendeiner Stelle des Gefäßsystems ein dauerndes organisches Hindernis gesetzt wird, und wir können somit mit einem Schlage von allen organischen Gefäßerkrankungen absehen; wir dürfen uns vielmehr darauf beschränken, den wechselnden Füllungs- zustand der Gefäße, der diesen Erscheinungen zugrunde liegen muß, auf Störungen der Innervation dieser Gefäße zurückzuführen. Diese Auffassung ist schon seit Raynaud die einzig herrschende gewesen. Bei Anschauungen, wie sie z. B. Lewandowsky vertritt, würde es allerdings zunächst nicht annäherlich sein, die supponierten Kaliberschwankungen der kleinen Gefäße auf ein Eigenspiel ihrer glatten Muskulatur zurückzuführen. Wenn man das vielleicht auch nicht ganz ausschalten kann, so darf man doch wohl auch bei der ausgebreiteten Verbreitung der vasomotorischen Erscheinungen diesem Moment in keinem Fall eine ausschlaggebende Rolle beimessen. Über die Modalitäten der Gefäßinnervationsstörung hat man mannigfach diskutiert. Raynaud selbst dachte sich die Sache folgendermaßen. Die Synkope locale entsteht durch eine Kontraktion der kleinen, und wie die passageren Kontraktionszustände an der A. radialis beweisen, bisweilen auch der größeren Arterien; damit ist auch eine Kontraktion der Venen verbunden, die ebenfalls gelegentlich klinisch nachweisbar wird. Die Asphyxie locale stellt den weiter vorgeschrittenen Zustand dar; es erfolgt eine unvollständige Reaktion, die Venen, die die sparsamsten kontraktilen Elemente haben, erreichen zuerst ihren gewöhnlichen Zustand wieder; während die Arterien noch geschlossen sind, fließt das Blut von den größeren Venenstämmen in die kleineren Venen und Capillaren zurück, und die Extremitäten nehmen infolgedessen den lividen Farbenton an, der ein sicheres Kennzeichen für die Anwesenheit venösen Blutes im Capillarnetz ist. Da der Rückfluß nicht bis in die Arterien hinein stattfindet, ist die Farbe auch nicht eine so dunkle wie sonst bei der Cyanose, mehr ein Gemisch von Blässe und Bläue. Als ein sehr wesentlich seine Theorie

unterstützendes Moment sieht Raynaud den von ihm geführten Nachweis einer Kontraktion der *A. centralis retinae* an. Man wird ihm darin unbedenklich recht geben können. Wir erwähnten, daß auch vereinzelte spätere Beobachter dies ebenso wie einen passageren Kontraktionszustand in einzelnen peripheren größeren Arterien sehen konnten. Aber schon Weiß bemerkte, daß gegen die von Raynaud angenommene Erklärung der Asphyxie locale, die danach ja immer ein höheres Stadium der Synkope locale sein müßte, die klinische Erfahrung spricht, da die Asphyxie locale sehr oft primär ohne eine vorausgehende Synkope locale entsteht. Annehmen zu wollen, wie dies vereinzelte Beobachter tun, daß in diesen Fällen die Synkope wohl stets vorhanden gewesen, aber bei ihrer kürzeren Dauer übersehen worden sei, hieße dem Tatsachen Gewalt antun. Weiß hat deshalb eine andere Erklärung versucht. Er führt als Beweis dafür, daß auch den Venen ein hoher Grad von Kontraktilität zukommt, die von uns schon zitierten Versuche von Gullier an; er konnte diese an sich und anderen und auch an Venen des Fußes reproduzieren. Da danach also auch die Venen einen mittleren Grad von Spannung besitzen, hält Weiß den Schluß für gerechtfertigt, daß der physiologische Venentonus auch krankhaft geändert werden könne; zu einer Steigerung dieses normalen Venentonus, zu einem Venenkrampf kommt es nach seiner Annahme im Stadium der Asphyxie locale; unter Umständen führt dieser zur Versperrung des Lumens der Venen, und der venöse Rückfluß des Blutes kann dadurch aufgehoben werden; dadurch entsteht Stauung in den Capillaren und mehr oder weniger hochgradige Cyanose. Weiß konnte in seinem Fall wiederholt beobachten, wie einzelne Venen des Fußrückens sich gradatim spontan bis zum vollkommenen Verschwinden ihres Lumens zusammenzogen (s. o.), und wie in demselben Maße die zuvor ganz normal aussehende Rückseite der Zehen erythematös wurde; das gab ihm die Gewißheit, daß seine Erklärung der Asphyxie locale die richtige sei.

Weiß hat, wie schon oben erwähnt, noch eine dritte Art vasomotorischer Symptome beschrieben, den regionalen Rhabd, bezüglich dessen er entweder an eine Lähmung der Vasoconstrictoren oder an eine Hypertonie der Vasodilatoren denkt; er ist geneigt, der letzteren den Vorzug zu geben, weil sie in Übereinstimmung mit den Erscheinungen der Ischämie und der Asphyxie ebenfalls auf einen Reizzustand in den Nerven zurückzuführen wäre.

Dem wird man zustimmen können, wenn auch keineswegs ausschließen ist, daß es sich in anderen Fällen um eine „reaktive“ Hyperämie handelt, daß auf die Steigerung der Vasoconstrictorenreaktion eine übermäßige Erschaffung, eine Vasoconstrictorenlähmung folgt.

Die sonst nach von den Autoren gegebenen Erklärungen der hier zur Besprechung stehenden Phänomene weichen in keinem wesentlichen

Punkt von den von Raynaud und Weiß aufgestellten ab; die meisten späteren haben sich in bezug auf die Asphyxie locale, geleitet von der nicht zu bestreitenden Tatsache ihres primären Auftretens, Weiß angeschlossen. Erwähnt sei nur noch, daß Weber betont, es sei wahrscheinlich, daß sich die glatte Muskulatur der Haut bei lokaler Synkope im Zustand der Kontraktion befinde und die Synkope dadurch entstehe. Hochenegg will einer weit verbreiteten Kontraktion der glatten Hautmuskeln deswegen eine Bedeutung beimessen, weil anders das subjektive, oft äußerst bedeutende Kältegefühl der betreffenden Kranken nicht zu erklären sei, denn unmöglich könne es auf die auf einen kleinen Abschnitt beschränkte lokale Anämie zurückgeführt werden. Es sei dazu bemerkt, daß der klinische Nachweis einer solchen Kontraktion, der doch nicht schwer zu erbringen wäre (*Cutis amorina*), nirgends geführt ist, das subjektive Kältegefühl entspricht bisweilen übrigens eines mehrmals nachgewiesenen objektiven Hypothermie.

Monro bemerkt, daß bei der lokalen Asphyxie eine Teilnahme der kleinen Arterien an der Kontraktion nicht immer ganz ausgeschlossen werden könnte. Er führt als Beweis eine Beobachtung Barlow's an, der in einem Fall von Asphyxie ohne Synkope sah, wie die dorsalen Venen der Hand in charakteristischer Weise sich zusammenzogen, und wie während dieser Anfälle auch der Puls in der Radialis fast unfehlbar wurde, während er in der Zwischenzeit normal war. Die Art, wie die vasomotorischen Phänomene im Laufe eines Anfalls variieren, läßt ihn vermuten, daß eine Kontraktionswelle die peripheren Gefäße entlang zieht und dabei Arterioles, Capillaren und kleine Venen erreicht.

Huáték hat auch von einem Kontraktionszustand in den größeren Venen gesprochen und zwar hat er diesen aus seinen Blutdruckuntersuchungen erschlossen. Er fand nämlich ein Ansteigen des Blutdrucks im Beginn des Anfalls: Blutdruck hier 184, während nach dem Anfall ein Blutdruck von 145 im Stadium der Asphyxie, im Stadium der Rüte nur von 130—140 nachweisbar war. Er nahm daher für das Stadium der Asphyxie eine Kontraktion der größeren Venen an, die ein gewisses Plus an Herzkraft nötig mache. Ich habe Huáték's Angaben in meinen Fällen niemals verifizieren können; allgemeine Geltung kann diese Annahme demgemäß nicht beanspruchen (s. o.).

Im Gegensatz zu den bisher zitierten Erklärungen hat Hutchinsan den Standpunkt eingenommen, daß die bei Raynaud'scher Krankheit — und auch sonst — beobachteten vasomotorischen Symptome sich einer stets gleichen und bestimmten Erklärung nicht fügen, und daß hier durch dieselben Ursachen je nach der ursprünglichen Anlage und individuell äußerst wechselnd sich die verschiedenen Zustände ergeben. Es geht dabei von der Tatsache aus, daß die Wirkung der Kälte

auf die einzelnen Individuen eine sehr variable sei. Bei Individuen z. B. mit dicker Haut und starkem subkutanen Fett- und Bindegewebe tritt eine intensive Rötterfärbung ein, in dieser erscheinen dann oft hellere Flecken, bei anderen führt Kälte rasch zu lokaler Synkope, nach einer Periode von Blässe werden die betreffenden Teile dann cyanotisch; solche Individuen haben meist eine feine Haut, wenig subkutanen Fettgewebe. Ganz ähnlich sei auch bei Raynaud das Vorkommen verschiedener vasomotorischer Zustände auf dergleichen individuelle Abweichungen mit zurückzuführen; bei Menschen mit stark entwickeltem Venensystem z. B. komme es leichter zu ausgeprägter Cyanose, und dabei sei auch der Zustand des Herzens und der Lunge noch sehr berücksichtigungswert. Ich glaube, daß dieser von Hutchinsonson angeführte Gesichtspunkt, daß man nämlich sowohl die lokale als die allgemeine Konstitution des Individuums bei dem Versuch der Erklärung der vasomotorischen Phänomene wohl beachten soll, alle Aufmerksamkeit verdient. Es erscheint mir, auch davon abgesehen, bei dem heutigen Zustand unserer Kenntnisse nicht möglich, aber auch gar nicht einmal so wichtig, die verschiedenen Phasen der Asphyxie, der Synkope und auch des Rubor, dessen Existenz wir mit Weiß durchaus anerkennen müssen, auf bestimmte krankhafte Zustände bestimmter Nervenkategorien zurückzuführen. Zahlreiche Erfahrungen lehren uns, daß aus unbekannten, aber jedenfalls sehr geringfügigen Ursachen eine Reizung bestimmter Vasomotoren sehr rasch in eine Lähmung umschlägt, daß eine solche vasomotorische Instabilität, wie man dies nennen könnte, bei zahlreichen neuropathischen Individuen jeden Augenblick, sei es durch eine Gemütsaufregung, sei es durch einen äußeren Anlaß, einen Temperatur-, einen schmerzhaften Reiz sich zeigen kann, und andererseits reichen unsere Kenntnisse zurzeit keineswegs aus, um zu entscheiden, ob eine Rôte, die wir finden, auf einer Lähmung der Vasokonstriktoren, oder auf einer Reizung der Vasodilatoren beruht, ob wir es im gegebenen Moment mit einer primären oder mit einer reaktiven Rôte zu tun haben. Wir sehen klinisch oft in regellosem Durch- und Nacheinander an nebeneinanderliegenden Stellen hier Blässe, dort Cyanose, da Rôte entstehen.

Die klinischen Beobachtungen, die wir früher aufgezählt haben, haben uns genugsam davon überzeugen können, daß bei unseren Kranken Zeichen einer solchen vasomotorischen Instabilität auch an anderen als den gipfelnden Teilen des Körpers vielfach vorhanden sind. Hier liegen offenbar weit verbreitete Störungen der vasomotorischen Hautreflexe vor, die bei dem Gesunden vorhanden und in sehr mannigfacher Form ausgebildet sind. Als einen solchen sehr wichtigen, in der Narkose beständig vorhandenen, unter spinalem Einfluß stehenden

Gefäßwandreflex bezeichnet Bayliss¹⁾ die Tatsache, daß durch einfachen Druck des Gefäßinhaltes auf die Wandungen eine Konstriktion ausgelöst wird, bei Steigerung des Druckes kommt es zu einer erhöhten Konstriktion, so daß also beim Herabhängen eines Gliedes eine allzu große Anordnung der Gefäße vermieden wird. Dieser Reflex fehlt offenbar häufig bei den Neurosen unseres Gebietes, worauf Phlego hinweist. Der Ablauf anderer vasomotorischer Hautreflexe auf innere und äußere Reize zeigt vielfache Abweichungen von der Norm, die auch untereinander variieren können, es kommt zu einer überlangen Fortdauer des Reizeffektes (Konstriktion oder Dilatation), z. B. beim Eintauchen in kaltes oder heißes Wasser, beim Druck auf umschriebene Hautflächen, oder es kommt beim Umschlagen von einem Reizdefekt zum anderen zu übergroßen Ausschlägen oder zu abnorm langer Dauer der reaktiven Phase. Bei der Messung des Blutdruckes mit dem Gartnerischen Apparat (s. o.) ist es mir sehr oft aufgefallen, daß die durch das Überstreifen des Ringes erzeugte Konstriktion und Symploxe längere Zeit nach Abnahme des Ringes bestehen blieben (der Blutdruck blieb null oder annähernd null); es überdauerte also der mechanisch gesetzte Reizeffekt (Konstriktion der Arteriden) die Ursache des Reflexes längere Zeit. Cushing, der zu therapeutischen Zwecken das Anlegen eines Touraiquet empfiehlt, nahm an, daß dadurch ein „blocking effect“ auf die Konstriktoren ausgeübt wurde, und es dadurch zu einer völligen Erschlaffung der kleinen Arterien und zu aktiver Hyperämie komme; bei meinem Versuche läßt der höchste Grad der Hyperexcitabilität, bei dem seitigen die darauf physiologischerweise folgende Lähmung der Excitabilität zustande. So liegen die verschiedenen Reizfolgen sehr nahe beieinander, hängen von der Höhe des Reizes, der augenblicklichen Disposition des Individuums, wie sie aus äußeren (Temperatur) und inneren (ererbtem Zustand, Kräftezustand) Bedingungen hervorgehen, ab, ohne daß aus diesen Differenzen Schlüsse über das Wesen des Leidens bzw. auch des einzelnen Phänomens zu entnehmen sind. Wenn wir „beim Gesunden“ innerhalb gewisser variabler Grenzen auf periphere Reize gewisse vasomotorische Reflexe eintreten sehen, eine Kombination und Folge von Vasodilatation und -Konstriktion sowie von sekretorischen Erregungen, das Ganze als eine komplexe, zeitlich begrenzte, in sich geordnete Reaktion“, so ist dieser Mechanismus beim „Vasomotoriker“ nach verschiedenen Richtungen hin gestört. — Erst die Zukunft kann lehren, wozu die eigentliche Ursache der die „Vasomotoriker“ auszeichnenden eigentümlichen Reaktionsform liegt, was an den Symptomen vagotonisch oder sympathikotonisch ist; vieles bei der Raynaudschen Krankheit wie bei den

¹⁾ Bayliss, Die Innervation der Gefäße. Ergebnisse der Physiol. V. S. 301.

verwandten Zuständen spricht ja für eine gesteigerte „Sympathikotonie“.

Wir könnten also wohl sagen, wir haben es hier mit Zuständen zu tun, die auf abnormen Vorgängen im Vasomotoriensystem beruhen, ob auf Reizung oder Lähmung, ob in den Vasodilatoren oder in den Vasoconstrictoren, das entzieht sich unserer Beurteilung, ist aber auch für die Gesamtaufassung des Krankheitsbildes von außerordneter Wichtigkeit. Eine aber wird immerhin noch zu erwägen sein: wenn auch die vasomotorischen Erscheinungen selbst uns nicht mit Sicherheit zwischen Reizung und Lähmung unterscheiden lassen, so können uns vielleicht die diesen koordinierten Symptome die anderen nervösen Störungen ein Mittel an die Hand geben, zwischen diesen beiden Dingen zu wählen, und diese Erwägung führt uns in der Tat mehr auf Reiz-, denn auf Lähmungsstände. Doch auch dagegen werden wir einwenden müssen, daß es uns nicht an Erfahrungen fehlt, die uns darauf hinweisen, daß im selben Nervengebiet Fasern verschiedener physiologischer Dignität verschieden auf dieselbe Ursache reagieren, so daß die einen auf den krankmachenden Reiz mit Lähmung, die anderen mit erhöhter Reizbarkeit antworten. Insbesondere die Erfahrungen am Hals sympathicus haben uns mit derartigen Tatsachen genugsam bekannt gemacht.

Wir können demnach alles in allem die von Raynaud und noch mehr von Weiß versuchten Erklärungen wohl annehmen, unter der Reserve jedoch, daß mannigfache individuelle Verschiedenheiten vorliegen, und daß ein Zustand leicht in den anderen übergehen kann. Jedenfalls ist, und auch die klinische Beobachtung läßt uns darüber nicht im Zweifel, keine Rede davon, daß wir es hier mit einer gesetzmäßigen Aufeinanderfolge verschiedener, *totu coelo* differentor Zustände, etwa in der Reihenfolge Synkope locale, Asphyxie locale und als reaktiver Zustand Rubor zu tun haben, vielmehr sind prinzipiell alle diese Erscheinungen gleichwertig und keine verdient symptomatologisch-diagnostisch den Vorrang.

Wo aber sitzt nun in der weit ausgedehnten Bahn der Vasomotoren der krankmachende Reiz? Wir sind leider — genau wie bei der Erythromelalgie — nicht in der Lage, aus der Analyse der Symptome selbst auf den Sitz der krankmachenden Ursache zu schließen, während wir bei den motorischen und sensiblen Störungen durch deren Art und Verteilung oft ohne weiteres auf eine bestimmte Lokalisation geführt werden. Wir müssen daher auch hier bei dem Versuch der Lokaldiagnose auf die Begleitsymptome, insbesondere auf die häufigen sensiblen, Rücksicht nehmen; das soll erst später geschehen, wenn wir die Pathogenese der gesamten Affektion besprechen.

Das zweite Hauptsymptom der Raynaud'schen Krankheit sind die trophischen Störungen, unter denen am häufigsten und am charakteristischsten die Gangrän hervortritt. Wir brauchen auf die klinischen Kennzeichen, die genügend erörtert sind, nicht noch einmal zurückzukommen. Dagegen wird es gut sein, wenn wir an dieser Stelle nicht nur die Pathogenese der im Verlauf der Raynaud'schen Krankheit auftretenden Gangrän würdigen, sondern die Frage etwas weiter fassend, uns mit der neurotischen Gangrän überhaupt beschäftigen. In der Literatur finden wir häufig eine ungenügende Scheidung der beiden Gangränformen, insofern Raynaud'sche Gangrän und neurotische Gangrän als gleichbedeutend angesehen werden, ganz gleich, ob die Gangrän sich im Verlauf der Raynaud'schen Krankheit und mit den bekannten klinischen Kennzeichen der Raynaud'schen Gangrän ausgesetzt findet oder nicht. Ich glaube, daß wir berechtigt und verpflichtet sind, einen Unterschied zu machen: man wird die Raynaud'sche Gangrän als eine Unterform der neurotischen Gangrän ansehen, aber nicht ohne weiteres beide Begriffe identifizieren dürfen. An dieser Stelle aber erscheint es vorteilhafter, von dem allgemeinen Begriff auszugehen und die ganze Frage der neurotischen Gangrän in Angriff zu nehmen. Wir haben schon zweimal im Verlauf unserer Abhandlung diesen Punkt erörtert, erst im allgemeinen Teil, dann in der historischen Einleitung zu diesem Kapitel. An letzter Stelle haben wir über die Forscher berichtet, die vor Raynaud noch die Möglichkeit, daß Gangrän im Gefolge und infolge von Nervenkrankheiten auftreten kann, in Erwägung zogen und befürworteten. Zu ihnen also gesellte sich Raynaud auf Grund der klinischen Beobachtung seiner Fälle. Aber wenn wir näher zusehen, müssen wir bemerken, daß Raynaud nur mittelbar die Gangrän in Abhängigkeit von nervösen Störungen bringt; die dafür entscheidende Stelle seiner Monographie lautet wörtlich wie folgt: „Syncope and local asphyxia succeed one another rapidly, the venous blood becomes insufficient to nourish the parts: the colour becomes deeper and deeper, small blood-stained infiltrations take place through the walls of the venules; these walls may themselves become granular, in one word, there is confirmed gangrene, and gangrene, which may go to the fall of many ends of fingers or toes.“ Und weiter: „... „But on final analysis all these varieties of functional lesions, which may each present an infinity of shades, realise always one or other of the two conditions, which I have previously indicated as essential to dry gangrene, that is to say absence of blood, or presence of blood unsuitable to nutrition.“ Danach ist also auch die Gangrän eine direkte Folge von ungenügender Versorgung der Gewebe mit Blut, und nur diese ungenügende Blutversorgung ist neuropathischen Ursprungs, oder wie Weiß das Verhältnis kurz geklärt, die symmetrische Gangrän ist die letzte Konsequenz einer Angioneurose.

Gegen diese Auffassung hat Weiß — und auch ihm viele andere — Einspruch erhoben. Die Erwägungen, von denen Weiß sich dabei leiten ließ, sind folgende. Es ist sehr fraglich, ob ein Gefäßkrampf allein genügen kann, um den Tod gewisser Gewebsteile herbeizuführen, wenn er auch ohne Zweifel geeignet ist, die Ernährung der betreffenden Teile zu schädigen. Vieles spricht dagegen. Cohnheim führte an der Frochizunge eine viele Stunden dauernde Totelligatur durch, ohne wesentlichen Schaden für das Organ. Bei Warmlüthern konnte Litten eine drei bis vier Stunden dauernde Absperrung der Art. renalis eintreten lassen, nach der sich keine anämische Nekrose ausbildete. Auch beim Menschen kommt es nach temporärer Absperrung eines Hauptarterienstammes wieder zu völlig normaler Gefäßbewegung. Ähnliches wurde nach sehr intensiver und langdauernder spastischer Lähmung beobachtet (Fälle von Lamotte und Vallée). Das Vorkommen des Totenfingers, auch in seiner ausgeprägten Form, ist sehr häufig, und wie selten kommt es danach zu Gangrän. In vielen Fällen fehlt klinisch überhaupt das Stadium der Synkope locale, da kann natürlich Blutmangel nicht als Ursache der Gangrän angesehen werden, hier müßte die von Raynaud in Betracht gezogene Überflutung mit venösem Blut als Ursache des Gewebstodes angeschuldigt werden. Aber auch diese Möglichkeit bestreitet Weiß, indem er darauf hinweist, daß bei gewissen körperlichen Leiden jahrelang die höchsten Grade von Cyanose bestehen können, ohne daß Gangrän jemals eintrete. Diesen Gründen gegen die Raynaudi'sche Auffassung fügt Weiß noch zwei weitere hinzu: erstens fand er in seinem Fall Gangrän auch an der durch Sympathicuslähmung hyperämischen Seite des Gesichts, wo weder von einer Anshungerung der Zellen durch Mangel an Ernährungsflüssigkeit, noch von einer Überflutung mit ungeeignetem Blut die Rede sein konnte. Als letzten Grund führt er an, daß in seinem Fall die Schoßbildung an korrespondierenden Stellen der Nase und am Kreuz, ferner auch an einzelnen Fingerringen ohne direkt vorausgehende vasomotorische Erscheinungen erfolgte. Wir haben in der Besprechung der Symptomatologie unserer Krankheit bereits gesehen, daß auch andere Beobachter dies Verhalten feststellen konnten. Hier stets den Einwurf angemessener Beobachtung zu erheben, erscheint mir verfehlt; in einem so gut studierten Fall wie dem von Schulz z. B. der in Krankenlaubebeobachtung stand, ist das sicher unberechtigt, wenn auch Weiß selbst die Möglichkeit zugibt, daß in seinem Fall der Schoßbildung unbeachtet gebliebene Gefäßkrämpfe vorausgingen, oder, daß der Angiospasmus sich nicht durch Lähmung der Haut verraten müßte, weil er in tieferen Hautschichten abläuft. Weiß ist demgemäß auch sehr vorsichtig in der Erklärung der Gangrän, oder vielmehr, er versucht überhaupt keine bestimmte Erklärung. Er denkt an die von Virchow so ge-

nannte „Opportunität zur Nekrose“, einen Zustand, in dem schon ein momentaner Notstand das Absterben der Zellen bedingt, oder doch die Gewebe soweit schädigt, daß es schon durch eine kurze Ischämie zu einer anämischen Gewebsalteration kommt. Wie man sieht, vermeidet also Weiß eine klare Stellungnahme; jedenfalls kann er sich nicht entschließen, die Gangrän als eine direkte Folge nervöser Störungen aufzufassen.

Seit den Forschungen von Weiß hat das Tatsachenmaterial, auf das wir uns bei Erörterung dieser Frage zu stützen haben, doch aber schon einen beträchtlichen Zuwachs erhalten. Es sind nämlich am Nervensystem in Fällen spontaner Gangrän eine Reihe von positiven anatomischen Befunden erhoben worden. Man hat diese Befunde in ursächlichen Zusammenhang zur Gangrän gebracht und hat alle diese Fälle, deren neurotische Natur man für erwiesen hielt, unterschiedlos der Raynandschen Krankheit eingeordnet, sehr mit Unrecht und sehr zum Schaden einer klaren und einheitlichen Auffassung des Krankheitsbildes.

Ich habe schon in den allgemeinen Besprechungen die Frage von der Abhängigkeit der Hauternährung vom Nervensystem berührt. Es ist nicht gut zu vermeiden, selbst unter der Gefahr der Wiederholung schon einmal gesagter Dinge, auf diesen Punkt nochmals einzugehen.

Von klinischer Seite wurde die neuropathische Natur gewisser Fälle von Gangrän der Haut schon seit längerem behauptet, insbesondere war es der *Decubitus acutus*, dessen neurogene Entstehung erst Samuel, dann Charcot verteidigten. Die von Weir-Mitchell zuerst beschriebenen Veränderungen der Haut (glossy skin) nach Verletzung peripherer Nerven wurden im selben Sinn gedeutet. Conryba beschrieb einen Fall von *Decubitus sacralis* im Anschluß an eine Läsion des *filum terminale*; Duplay et Morat waren die ersten, die anatomische Veränderungen peripherer Nerven bei gewissen Formen des *Malum perforans pedis* nachwiesen. Eine Reihe weiterer hierher gehöriger Tatsachen findet man bei Leloir zitiert, der seinerseits im Jahre 1881 gemeinschaftlich mit Dejerine bei anatomisch-pathologischer Untersuchung zweier Fälle von Gangrän als deren Ursache eine parenchymatöse Neuritis nachweisen zu können glaubte. Das Resultat seiner Untersuchungen und der einiger Vorgänger faßt er dahin zusammen: „Des eschares sont donc évidemment sous la dépendance d'une lésion du système nerveux central ou périphérique“. Und weiter: „La cause principale, si non unique des eschares d'origine nerveuse dépend d'une altération profonde de l'affluence trophique exercée par le système nerveux sur la nutrition de peau“. Zwei seiner Fälle speziell: „portent à admettre la névrite périphérique primitive comme cause de certains cas de gangrènes nerveuses et à ajindre

te groupe de gangrènes nerveuses d'origine périphérique aux sphères trophiques dépendant d'une lésion d'origine centrale".

Dejerine et Leloirs Untersuchungen fanden ihre Fortsetzung in Studien, die Pitres et Vaillard anstellten. Wir haben ihre Beobachtungen, die man oft ohne Berechtigung der Raynaud'schen Krankheit zugerechnet hat, schon angeführt. Wir wiederholen hier nur die Ansicht der Autoren, die dahin geht, daß die Neuritis hier die Gangrän bedingt habe; nach ihrer Auffassung sprechen dafür das plötzliche Auftreten der Gangrän, die Anästhesie und die Schmerzen in ihrem Verlauf, die exakte Symmetrie und vor allem die Tatsache, daß die Nerven bei einer Gangrän vasculären Ursprungs keine neuritischen Veränderungen zeigen. „Il existe dans ces deux cas une relation de cause à effet entre la lésion névritique et le sphacèle". Für ein solches Verhältnis tritt auf Grund seines oben zitierten Falles auch Mounstein ein, ebenso Wigglesworth und Korasfeld. Viel vorsichtiger spricht sich dagegen Affleck aus. Die von ihm gefundene Neuritis in den Nerven des amputierten Beines sei von großem Interesse, weil eine Anzahl von Forschern jetzt der Meinung sei, daß periphere Neuritis bei der Entstehung der Gangrän eine große Rolle spiele. — Es fehlt aber auch nicht an Stimmen, welche die angebliche ursächliche Rolle solcher Neuritiden für die Entstehung der Gangrän völlig bestreiten. Von ihnen ist vor allem Dehio zu nennen. Alle Wahrscheinlichkeit spricht nach seiner Ansicht dafür, daß die Nerven degenerieren sich erst sekundär der Gangrän angeschlossen hat und von dieser hervorgerufen ist. Er beruft sich auf Kopp, der gezeigt hat, daß in der Umgebung künstlich herangerufener Geschwüre stets eine hochgradige Degeneration der benachbarten peripheren Nerven entsteht, ferner auf Untersuchungen von Friedländer und Krause (Fortschritte der Medizin 1885), daß die ihrer normalen Endigungen beraubten Nervenstämme in amputierten Gliedmaßen einer aufsteigenden Atrophie verfallen; letzter habe man (Mounstein, Zöge v. Mantouffell) bei sicher arteriosklerotischer Gangrän Nervenveränderungen gefunden. Dehio schließt: die Degeneration der Nerven bei symmetrischer Gangrän ist für eine sekundäre Veränderung zu erklären, die mit der Pathogenese der Krankheit nichts zu tun hat.

Man kann die Argumente, die Dehio gegen die Neuritis als Ursache der Gangrän vorgebracht hat, noch beträchtlich vermehren und erweitern. In der Mehrzahl der mitgetheilten Beobachtungen gibt schon die genauere Analyse des Einzelfalles selbst zu erheblichen Bedenken Anlaß. Bei Mounstein waren, wie er selbst angibt, an den Nerven der linken gesunden Extremität dieselben Veränderungen wie rechts zu konstatieren, nur in weniger ausgedehntem Maße. In dem zweiten Fall von Dejerine et Leloir handelte es sich um eine

Tabes; untersucht wurden nur die zu den gangränösen Teilen führenden Nerven, daß die übrigen normal seien, schlossen die Autoren aus der Tatsache, daß man sonst noch nie bei Tabes Veränderungen peripherer Nerven gefunden habe, eine Behauptung, die bei dem heutigen Standpunkt unserer Kenntnisse gewiß nicht aufrecht erhalten werden kann. In dem ersten Fall Dejerine et Leloirs handelte es sich ebenso wie bei beiden Fällen Pittres' und Vaillards um Patienten, die im Zustand schwerer Kachexie gestorben sind; auch dabei findet man häufig geringe Veränderungen peripherer Nerven, ohne irgendwelche Erscheinungen von Gangrän; indem fehlt in Pittres' und Vaillards Fällen überhaupt der Nachweis, daß die übrigen, nicht zu gangränösen Teilen führenden Nerven intakt waren. Auch die weiteren, oben zitierten Beobachtungen sind schon an und für sich in keiner Beziehung beweisend für das, was sie beweisen sollen: es ist nicht einmal der Versuch eines Nachweises gemacht, daß zwischen gangränösen Veränderungen und Nerven degenerations ein starrer Parallelismus in der Lokalisation besteht, d. h. daß auch wirklich nur in dem Teil des Nerven, der das gangränöse Gebiet innerviert, sich eine Degeneration findet; es ist auch keinerlei Erklärung dafür unternommen worden, warum gerade in diesen Fällen die Erkrankung der Nerven, die doch sonst zu sensiblen, motorischen und vasomotorischen Anfällen und Reizerscheinungen führt, nichts weiter als eine so schwere Ernährungsstörung bedingte. Auffällig ist auch das Fehlen gerade dieser sonstigen, regelmäßigen klinischen Erscheinungen einer Neuritis; nur bei Kerafeld konnte intra vitam eine Lähmung der vom Peroneus versorgten Muskeln nachgewiesen werden. Daß diejenigen viel zu weit gehen, die die spontane Gangrän stets, wenn eine Veränderung der Gefäße fehlt, auf Neuritis zurückführen wollen, beweist die Tatsache, daß sich anatomisch eine solche in derartigen Fällen gar nicht immer nachweisen ließ. Das Gesetz der retrograden Veränderungen in den Nerven, die ja auch Dehio schon zur Erklärung der gefundenen neuritischen Veränderungen heranzieht, hat nach unseren heutigen Kenntnissen eine noch über die frühere Ansicht hinausgehende Geltung, und ist in der Tat sehr wohl für die Auffassung dieser Degenerationen als sekundärer zu verwerten. Alle diese Erwägungen scheinen zu folgenden Schlüssen zu berechtigen: Eine Degeneration peripherer Nerven fehlt in einer Anzahl von Fällen von spontaner, im speziellen auch Raynaud'scher Gangrän sicher. Dort, wo sie gefunden wurde, kann sie nicht als alleinige oder wesentliche Ursache der Gangrän angesehen werden, sondern ist entweder sekundär bedingt oder auch als selbständige Ernährungsstörung, die eventuell auf derselben Grundlage wie die

Gangrän entstanden und dieser koordiniert, nicht übergeordnet ist, aufzufassen.

Zu einer ähnlichen Auffassung wie der hier vertretenen sind auch Remak und Mauro gekommen. Remak¹⁾ drückt sich nachdem er das ganze Material vorgebracht hat, wie folgt aus: „Wir müssen also zurzeit verzichten, über die Beziehungen der lokalen Äpdyxie und symmetrischen Gangrän zur Neuritis etwas Endgültiges anzusprechen. Wenn auch die häufige Kombination mit Neuritis anzuerkennen ist, so ist doch keineswegs das Abhängigkeitsverhältnis geklärt. Und Mauro²⁾ sagt: „Biswellen fand sich Neuritis im Zusammenhang mit Gangrän, aber in einer großen Zahl dieser Fälle handelt es sich nicht um typische Beobachtungen Rarnaudscher Krankheit, und jedenfalls ist nicht bewiesen worden, daß die Neuritis nicht eine sekundäre Erscheinung und eher ein Teil der Gangrän, denn deren Ursache ist.“ Ganz anders liegt die Sache, wenn wir uns fragen, ob denn solche Veränderungen nicht wenigstens als „Hilfsmoment“ eine Rolle spielen können. Diese Frage darf unbedingt bejaht werden; daß überhaupt pathologische Zustände im peripheren Nervensystem die Ernährung der Gewebe in pathologischer Richtung beeinflussen können, haben wir ja bereits im allgemeinen Teil vielfach gesehen.

Wir sind von der Frage ausgegangen, gibt es überhaupt eine durch Veränderungen im Nervensystem bedingte Gangrän. In den letzten Zeiten haben wir uns aber nur mit der angeblich infolge peripherer Nervenkrankung bedingten beschäftigt. Wie steht es nun mit der durch Erkrankung des centralen Nervensystems hervorgerufenen? Die neueren Arbeiten haben zur Lösung dieser früher sehr viel diskutierten Frage nicht mehr viel Material beigebracht. Die genauere Kenntnis der Syringomyelie hat uns gelehrt, daß in direkter Abhängigkeit von Zerstörung gewisser Partien der grauen Rückenmarkssubstanz schwere Ernährungsstörungen der Haut, ihrer Anhangsgebilde und auch der Knochen eintreten können. Daß unter solchen Bedingungen die Ernährungsstörungen auch gelegentlich einmal unter zurzeit nicht genauer festzustellenden näheren Bedingungen die Form der Gangrän annehmen können, darauf scheint u. a. der oben bereits zitierte Fall von Hoehenegg und einige andere Fälle von Gangrän bei Gliosis zu deuten (siehe Schlesinger, Die Syringomyelie, II. Aufl. S. 84). Auch die Erfahrungen bei anderen Rückenmarkskrankheiten, bei der Poliomyelitis anterior acuta z. B., ferner auch bei der Tabes, veranlassen uns, eine direkte Abhängigkeit der Ernährung der Gewebe der Haut usw. von gewissen centralen Nervenpartien anzunehmen, wie wir das im allgemeinen Teil bereits auseinandergesetzt haben.

¹⁾ l. c. S. 365.

²⁾ Mauro, Monograph S. 191.

Was nun speziell die Fälle Raynaudscher Gangrän anbetrifft, so sind diejenigen, in denen auch nur ein Nebeneinandervorkommen von zentraler Nervenkrankung und Gangrän beschrieben ist, wie wir gesehen haben, sehr selten. Es gehören die Fälle von Calmann und von Schlesinger und vielleicht der eine oder der andere der bei Hemiplegie beobachteten hierher, während etwas häufiger die Kombination echter vasomotorischer Phänomene des Raynaudischen Typus mit centralen Nervenkrankungen vorlag. In den Fällen von Calmann und Schlesinger handelte es sich um eine Kompression der Rückenmarkswurzeln, und man wird nach dem ganzen klinischen Verhalten in diesen Fällen nicht gut daran zweifeln dürfen, daß diese Kompression eine wesentliche Ursache der vasomotorisch-trophischen Störungen gewesen ist. Andererseits werden wir auf Grund der Erfahrungen bei der Syringomyelie vermuten dürfen, daß Veränderungen in bestimmten Teilen der grauen Substanz zu trophischen Störungen nekrotischer Art führen können. Es scheinen dies besonders die dorsal von den Vorderhörnern gelegenen Partien zu sein. Freilich beobachten wir solche trophische Veränderungen in den Fällen von Syringomyelie kaum je ohne das Hinzutreten anderer Störungen, insbesondere der Sensibilität oder Vasomotilität.

Soweit bisher eine anatomisch-pathologische Grundlage für die vermutete neurogene Gangrän nachgewiesen zu sein schien, bestehen also sehr erhebliche Unsicherheiten und Bedenken. Auf der anderen Seite scheint mir aus der sorgfältigen Analyse der klinischen Symptome der Raynaudschen Gangrän die Notwendigkeit hervorzugehen, eine direkte Abhängigkeit der nekrotischen Störungen von Alterationen des Nervensystems anzunehmen, wie ich das auch im allgemeinen Teil schon auseinandergesetzt habe. So im Sinn von Raynaud unmittelbar in Abhängigkeit von vasomotorischen Störungen zu bringen, und als direkte Folge von ungenügender Versorgung der Gewebe mit Blut aufzufassen, erachte ich auf Grund tatsächlicher und logischer Erwägungen für unmöglich. In neueren umfangreichen experimentellen und klinisch-pathologischen Untersuchungen hat Krühlich versucht, eine Erklärung für die Entstehung der multiplen nekrotischen Hautgangrän und damit auch für die Raynaudsche Gangrän zu geben. Da ich im allgemeinen Teil diese Untersuchungen nur kurz berührt habe, muß ich hier ein wenig näher auf sie eingehen. Krühlich geht in seiner Abhandlung „Die angioneurotische Entzündung“ von den experimentellen Phänomenen aus, die er bei mehreren Kranken mit nekrotischer Hautgangrän (siehe dieses Kapitel) beobachtet hat. Die Reizungen werden mittels leichter oder etwas stärkerer faradischer Ströme, mittels Nadelstichen, Kochsalzeinführungen, warmer Bäder vorgenommen; jedes Phänomen leitet sich mit einer aktiven Hyperämie ein, die oft viel umfangreichere Partien einnimmt, als die späteren nekrotischen Erscheinungen; sie ist

in der Mitte diffus, am Rande fleckförmig; Dauer 1–2 Stunden, die centralen Partien bleiben 1–2 Tage hyperämisch, Stadium der „vasodilatatorischen Hyperämie“. Dies fand sich nach schwachen elektrischen Reizungen und warmen Bädern. Die Rötung kann sich mit einem Ödem kombinieren. Es wurde eine anatomische Untersuchung eines durch zweimaliges Elektrisieren während 36 Stunden hyperämisch und ödematös erhaltenen Hautstückes vorgenommen. Die Gefäße zeigten eine Vermehrung ihrer fixen perivascularären Zellen und eine vermehrte Anlagerung von Mastzellen. Das Bild entsprach dem einer *Urticaria perstans*.

Im zweiten Stadium bleibt nach Verschwinden des Ödems für einige Zeit im Umkreis der Quaddel dauernd eine Gefäßschädigung bestehen, ein scharf umschriebener hyperämischer Fleck, der bald erythematös wird. In der Folge stoßen sich Anteile der Epidermis ab, manchmal bildet sich eine schlappe Blase. Das Bild, als „dilatatorisches Erythem“ bezeichnet, trat nach stärkerer elektrischer Reizung auf. Anatomisch finden sich hier bereits die Zeichen der Entzündung.

Dauert die Exsudation fort, so wird die Epidermis abgehoben, die Stelle näßt, bedeckt sich aber bald mit einer fest haftenden Kruste, unter der die Cutis in verschiedenem Grade anämisiert ist. Dem Grade dieser Anämie entsprechend kommt es dann zu tiefer oder oberflächlicher Nekrose. Der Vorgang spielt sich in einigen Minuten ab und ließ sich bei drei Kranken experimentell erzeugen. Die anatomische Untersuchung ergab in diesem Stadium folgendes. Zwischen normale Epithelinseln sind zahlreiche Bläschen eingestreut; die Kerne des Epithels sind schwerer färbbar; die Blasen reichen bald bis zur Cutis, die Papillen sind dann also sackt, manchmal sind sie aber auch nur oberflächlich und lassen eine Anzahl von Zellreihen frei. In der Cutis besonders unter den Bläschen bestehen die Zeichen intensiver Entzündung, um die Gefäße herum finden sich Erscheinungen von Zellnekrosen, Fibrinausscheidungen, das perivascularäre Infiltrat verfolgt die Gefäße bis zur Subcutis. Krebich betont kleine Unterschiede zwischen den Erscheinungen des Zoster „hystericus“, Pemphigus und Pemphigus gangrenosus, die uns hier nicht weiter interessieren.

Die Pathogenese dieser Vorgänge ist nach den Anschauungen Krebichs die folgende. Die Veränderungen der neurotischen Gangrän führt er auf Reizung vasomotorischer Nerven zurück, wobei der Reizeffekt teils ein motorischer, teils ein solcher ist, welcher die Gefäßwand in ihrer Durchlässigkeit beeinflusst. Die Hyperämie muß eine Wirkung der Reizung von Vasodilatoren sein, das danach auftretende Ödem kann nicht als Transsudat aus gelähmten Gefäßen aufgefaßt werden, sondern es muß ebenfalls auf Dilatatorenwirkung bezogen werden. Es ist wie auch die chemische Untersuchung ergibt, kein Transsudat, sondern ein ganz besonders konstituiertes Exsudat: Blutplasma mit allen

Pfeinregenerationen, und sein Austritt beruht auf der durch die Vasodilatatorerregung bedingten größeren Durchlässigkeit der Gefäßwände. Die Exsudatbeschaffenheit erklärt aber noch nicht die kolloidalen Veränderungen; damit diese eintreten, muß das Gewebe vorher abgestorben sein. Diese Nekrose kommt nach Kreibichs Ansicht in letzter Linie durch die Anämie zustande; diese soll wiederum durch den rasch ansteigenden Druck des Exsudats hervorgerufen sein. Kreibich will die Anämie bei allen Phänomenen der neurotischen Gangrän beobachtet und gesehen haben, daß vom Grade der Anämie auch der Grad der Nekrose abhängig sei. Er bestreitet das Vorkommen einer Gangrän ohne vorangehende vasomotorischen Phänomene. In Übereinstimmung mit den Ansichten vieler anderer Autoren nimmt er eine reflektorische Entstehung von Vasodilatatorerregung an und spricht in diesem Sinne von einer Entstehung der Erscheinungen auf dem Wege des Spätreflexes.

Die Anschauungen von Kreibich sind ja um dessentwillen schon nicht ohne weiteres auf die Raynaud'sche Gangrän zu übertragen, weil hier nicht eine Vasodilatator- sondern eine Vasokonstriktorerregung vorausgeht. Auf die Raynaud'sche Gangrän geht Kreibich nur flüchtig (l. c. S. 117) ein. Er ist geneigt, hier die Gangrän einfach als Folge des Konstriktorenkrampfes anzusehen, gibt aber selbst zu, daß der experimentelle Nachweis nicht vorliegt.

Aus seinen experimentellen und pathologischen Untersuchungen hebe ich das eine hervor, daß sich er ohne eine Annahme einer direkten Gefäßwandschädigung nicht auskommt; wenn er für seine Fälle das auf diese Weise hervorgerufene Exsudat als direkte Ursache der Gangrän ansieht, so hat er das durch seine Beobachtungen durchaus nicht bewiesen, vielmehr eine recht gekünstelte Erklärung versucht. Mit der Annahme einer „trophischen“ Gefäßwandschädigung hebt er die Nekrose aber ohne weiteres aus dem Rahmen der rein vasomotorischen Phänomene. Die Anschauungen von Kreibich hat sich Benders zu eigen gemacht. Mir erscheint es viel plausibler, diese trophische Wirkung recht auf die Gefäßwände zu beschränken, sondern auch das umgebende Gewebe direkt an den Lebensprozesse und an dessen pathologischer Veränderung teilnehmen zu lassen, eine Anschauung, die mit der von Herz vertretenen nahe Berührungspunkte hat. So erhalten wir auch für die einander offenbar recht unentstehenden Phänomene der multiplex neurotischen Gangrän, die mit vasodilatatorischen Erscheinungen, und der Raynaud'schen Gangrän, die mit vasokonstriktorischen Erscheinungen einhergeht, einander parallelaufende Entstehungsmechanismen.

Die Frage, ob vasokonstriktorische Phänomene der Nekrotisierung immer vorausgehen müssen, ist damit ihrer prinzipiellen Wichtigkeit entkleidet, immerhin bleibt es sicher, daß wir bisweilen klinisch nichts

davon feststellen können, und die vielen Autoren aus theoretischen Gründen nötig erscheinende Ergänzung unserer klinischen Beobachtung muß ich als unbegründet ablehnen.

Phlepx hat sich im ganzen meiner Auffassung von der primär neurotischen Entstehung der Gangrän angeschlossen. „Die vermehrte Durchlässigkeit der Gefäßwänden würde also in unseren Fällen eine selbständige direkte zentrale Störung der Gefäßinnervation ausdrücken, sowie Vasodilatation und Konstriktion, ohne daß die erhöhte Permeabilität als Folge der Verengung oder Erweiterung aufzufassen wäre, dabei ist selbstverständlich auch ein gemeinsames Vorkommen dieser verschiedenen Interventionsstörungen vollkommen erklärlich.“ Das sind Anschauungen, wie ich sie in der ersten Auflage bei Besprechung der Pathologie des blühtigen Oedems ausführlich begründet habe. Und ferner sagt er: „Wir wissen, daß (für die Nekrose) nach unseren heutigen physiologischen Anschauungen neben dem Blutkreislauf noch eine weitere Komponente in Frage kommt, von welcher der Stoffwechsel durchaus nicht im letzten Sinne abhängig sein wird, dies ist die spezifische Leistung des Gewebes entsprechend seinem spezifischen zelligen Elementen. Bei Entstehung der Nekrose werden wir also auch an Veränderungen dieser Art denken müssen und die Nekrose zum Teil wenigstens von solchen nervösen Störungen ihren Ausgang nehmen lassen. Bei dieser Auffassung müssen wir sie den Erscheinungen, welche wir an den Gefäßen beobachteten, bis zu einem gewissen Grade koordinieren.“

Phlepx weist weiter darauf hin, daß ihm mit dieser Annahme nicht unvereinbar erscheine, daß gerade die am meisten oberflächlich gelegenen Schichten der Haut, welche gar nicht direkt nervös innerviert sind, zuerst die Zeichen der Nekrose an sich tragen. Die periphersten Partien scheinen am meisten gefährdet, wie vielfache Erfahrungen auch sonst zu lehren scheinen.

Ich komme also zu dem Schluß, daß es eine durch Veränderungen, die sich im Nervensystem abspielen, hervorgerufene, nicht sekundär auf Anämie zurückzuführende Gangrän der Haut gibt. Die bisherigen Untersuchungen haben keine anatomische Grundlage für diese Gangrän erwiesen, da die gefundenen Veränderungen nicht eindeutig sind. Das kann aber durchaus nicht wundernehmen; die Veränderungen sind in erster Linie im vasomotorischen System zu suchen, und wenn wir an die Schwierigkeiten dieses Nachweises denken, wenn wir uns an die Lapinskyschen Untersuchungen, über die früher berichtet wurde, erinnern, so werden wir einen anatomischen Nachweis erst auf Grund einer weit feineren Untersuchungstechnik erwarten dürfen, die sich soweit als möglich an Lapinskys Vorgehen anschließt.

Wenn wir zu der Annahme kommen, daß es eine primäre zentro-

tische Hautgangrän gibt, so ist damit noch nicht bewiesen, daß die Raynandsche Gangrän eine solche ist, beziehungsweise daß sie sich stets auf diesem neurotischen Boden entwickelt. Es hat in der Tat eine ganze Reihe von Autoren gegeben, die die Gangrän direkt auf eine organische Gefäßerkrankung, nicht etwa nur auf eine vasomotorisch ausgelöste Gefäßzusammenziehung bezogen haben. Auch mit dieser Annahme müssen wir uns auseinandersetzen.

Es ist ja freilich selbstverständlich, daß man dabei nicht die groben Veränderungen großer Gefäße im Auge hat, deren Verstopfung oder Thromboseierung zu der bekannten Form des ausgebreiteten Brandes führt; beschuldigt wurden vielmehr die endarteriitischen Veränderungen kleiner und kleinster Gefäße; wie Garrigues sagt: die nekrotischen Veränderungen sind die Folgen der arteriitischen Erkrankung, die sich von anderen vasculären Formen nur durch ihre Beschränkung auf kleine Gefäße unterscheidet. Wir haben die anatomischen Grundlagen, auf die sich diese Auffassung stützen will, schon im vorigen Kapitel gegeben, wir haben im Abschnitt Symptomatologie auch das schon zusammengestellt, was klinisch für eine angiopathische Genese der Gangrän sprechen könnte, indem wir auf deren Koinkidenz mit lokaler und allgemeiner Arteriosklerose auf dem Boden der Lues, der Nephritis usw. hinwiesen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die in einzelnen eben näher besprochenen Fällen von Raynandscher Krankheit gefundenen Veränderungen in den kleinsten Blutgefäßen insofern sind, eine ihrem Umfang nach beschränkte, oberflächliche, an den getroffenen Teilen sitzende Gangrän hervorzubringen. Diese Züge trägt die Raynandsche Gangrän. Aber sie ist doch noch weiterhin dadurch gekennzeichnet, daß die Tendenz zur Progression absolut, wenigstens in den klassischen Fällen fehlt, daß sie in Attacken kommt, zwischen denen freie Zeiträume liegen, daß sie demgemäß auch eine wechselnde pathologische Grundlage zur Voraussetzung haben muß, nicht einen stationären Zustand. Das sind sehr gewichtige Bedenken, die wir schon allein aus der Art der Gangrän schöpfen. Wir müssen ferner darauf hinweisen, daß die Gefäßveränderungen zwar einige Male aber keineswegs immer gefunden worden sind, und daß, wie die Klinik lehrt, mit den trophischen Störungen eng verbunden vasomotorische Störungen auftreten, die durch die organischen Gefäßveränderungen nicht ohne weiteres erklärt sind. Wo die letzteren vorhanden sind, müssen sie naturgemäß für die Ernährung der ihnen unterstehenden Teile von größter Bedeutung sein; aber die eben erwähnten Bedenken machen es mir unwahrscheinlich, daß diese vasculären Läsionen die primäre und einheitliche Ursache der bei Raynaud beobachteten trophischen Störungen darstellen, vielmehr weist auch die Analyse dieses Teils des Symptomenkomplexes auf eine neurotische Ursache, deren Sitz nur das Vasomotorensystem sein kann.

Zu dem weiter bei der Pathogenese der Raynaudschen Krankheit zu berücksichtigenden Symptomen gehören die sensiblen. Sie haben ganz wie bei der Erythromelalgie und bei den Akroparästhesien eines gemeinsamen, allerdings etwas Negatives. Sie erstrecken sich nämlich, mögen es Anästhesien, Hyperästhesien oder Schmerzen sein, nicht auf das Gebiet eines einzelnen Nerven, sondern verbreiten sich vielmehr diffus über die betreffenden Extremitäten und umfassen örtlich meist dieselben Gebiete wie auch die vasomotorischen und eventuell die trophischen Störungen, nur daß die Schmerzen wenigstens proximalwärts weiter ausstrahlen bis zur Wurzel der Extremität und darüber hinaus. „Betreffs des Sitzes der Sensibilitätsstörungen deutet das Nichtbeschränktbleiben der Schmerzen an den Verlauf bestimmter Nerven, die diffuse Verbreitung, das gleichzeitige Auftreten an beiden Extremitäten, das Übergreifen auf die tieferen Gebiete, die partiellen Gefühlsparesen und in meinem Fall außerdem die verlangsamte Schmerzempfindungsleitung ganz entschieden auf eine centrale Läsion“. Es wäre demnach in unserem Fall der Sitz der Sensibilitätsstörung in die graue Substanz zu verlegen. Die Reaktivierung der normalen Sensibilität spricht für eine transitorische, leicht reparable Läsion und diese dürfte höchst wahrscheinlich auf eine durch vasomotorische Einflüsse bedingte Ernährungsstörung zurückzuführen sein“ (Weiß). Wenn Weiß auch mit diesen Ausführungen für seinen höchst charakteristischen, aber doch auch symptomatologisch vereinodet dastehenden Fall recht hat, so ist es doch zweifelhaft, wie weit man von seinem auf andere Fälle exemplifizieren darf, in denen vielleicht niemals ausgesprochene objektive Sensibilitätsstörungen vorhanden waren. Der Fall von Weiß gibt uns bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse sogar das Recht, in der Lokalisation seiner Erscheinungen noch weiter zu gehen und uns noch bestimmter auszusprechen, als es dem Autor selbst damals möglich war. Wir erinnern uns, daß neben der temporären Sensibilitätsstörung mit dem ausgesprochenen Charakter der dissoziierten Empfindungslähmung noch eine passagere Funktionsstörung in den kleinen Handmuskeln mit Atrophie und quantitativen Störungen der elektrischen Erregbarkeit und ferner Lähmungserscheinungen im Gebiet des Hals-sympathicus, Röte, Hyperämie der linken Wange, Enge der linken Lidspalte, Enophthalmus und Enge der Pupille auftraten. Alle Erscheinungen waren, wie gesagt, passager. Wir finden hier, das fällt sofort auf, einen Symptomenkomplex, wie wir ihn bei der Gliosis cervicalis nicht selten zu sehen Gelegenheit haben; auch die bei Weiß beobachteten Arthropathien würden sich dem Symptomenbild der Gliosis cervicalis einfügen. Der Unterschied ist nur der, daß wir es bei der Gliosis mit einer allmählich einsetzenden und regelmäßig zu irreparablen Störungen führenden Läsion zu tun haben. Als deren Grundlage sehen wir bei der Autopsie eine durch Gliomatose und Höhlenbildung

bedingte Zerstörung der grauen Substanz. Diese wohlbekannten und zahltesten Erfahrungen berechtigten uns nach meiner Meinung auch eine gleiche Lokaldiagnose für den Fall von Weiß zu stellen, also die Sensibilitätsstörungen und die übrigen erwähnten Erscheinungen auf eine Störung in der grauen Substanz des unteren Cervicalmarks zu beziehen. Für die Sensibilitäts- und Sympathicusstörungen kommen nach allen Erfahrungen dabei vor allem die seitlichen und hinteren Abschnitte der grauen Substanz in Betracht. Hier dürfte eine vorübergehende Erkalteungsstörung (durch spastische Ischämie) die Ursache der Erscheinungen gewesen sein. Damit ist aber für die Pathogenese der Sensibilitätsstörungen in den übrigen Fällen nichts gewonnen, die ja meist einen durchaus anderen Charakter tragen. Ich kann hier im wesentlichen auf das hinweisen, was ich in den beiden vorangehenden Kapiteln über die Entstehung der sensiblen Symptome gesagt habe. Eine bestimmte und exakte Lokalisation der sensiblen Reiz- und Ausfallserscheinungen konnte nicht festgestellt werden, so daß von der Annahme einer gewöhnlichen Neuritis abgesehen werden muß. Auch die Art des Schmerzes ist eine andere, als bei dieser. In Rücksicht auf gewisse Angaben anderer Forscher über die radikuläre Verteilung der Sensibilitätsstörungen bei den Akroparästhesien will ich nur erwähnen, daß ich bei meinen Raynaudkranken etwas derartiges nicht gesehen habe. Die Art des Schmerzes, wie dessen engere Beziehungen zu den vasomotorischen Phänomenen lassen uns auch hier wieder am ehesten an die vasosensiblen Fasern denken. Wo diese irritiert werden, ob in der Peripherie oder im Centrum, wissen wir nicht.

Die Symmetrie der Erscheinungen ist oft als charakteristisch für deren zentralen Ursprung angenommen worden; doch haben die Erfahrungen bei der Polyneuritis uns gelehrt, daß eine ausgesprochene Symmetrie durchaus nicht immer für einen cervico-centralen Ursprung spricht.

Auf die anatomisch wiederholt konstatierte Neuritis können wir schon deswegen die sensiblen Symptome kaum je beziehen, weil wir dann doch unbedingt also dem Ausbreitungsgebiet der peripheren Nerven entsprechende Verteilung zu erwarten hätten.

Es bleibt noch der Einwand zu berücksichtigen, daß die sensiblen Symptome für die Frage der Pathogenese schon deswegen nicht verwertbar seien, weil sie stets sekundär bedingt seien. So sagt Monro, daß die Ausfallserscheinungen der Sensibilität offenbar auf Rechnung des ungenügenden Blatzufusses zu den Nerven zu setzen seien. Raynaud legt sich die Frage vor, ob die spontanen Schmerzen bei der Synkope und Asphyxie direkt der Gefäßkontraktion ihre Entstehung verdanken, so daß man also von einem schmerzhaften Gefäßkrampf sprechen müßte. Demgegenüber ist einzuwenden, daß der Schmerz ja sehr oft fehlen kann, besonders bei dem einfachen Totenfinger, wo

doch sicher ein intensiver Gefäßkrampf vorliegt. Moore bemerkt auch diese Schmerzen auf den durch das veränderte Blut auf die Gewebe ausgeübten Einfluß. Aber auch diese Erklärung genügt nicht, wenn wir bedenken, daß bei anderen Störungen der Bluteirculation, die zu hochgradiger Asphyxie führen, jede sensible Reiz- und Ausfallserscheinung völlig fehlen kann. Wir werden also die sensiblen Störungen, namentlich die Schmerzen, nicht als Folgen der vasomotorischen Störungen auffassen können, wogegen auch oft die zeitliche Inkongruenz beider spricht.

Auch die seltenen Muskelatrophien sind pathogenetisch unklar und sicher nicht in jedem Fall gleich bedingt. Ihre Grundlage im Weißschen Fall ist vielleicht, wie Weiß meint, in einer ischämischen Ernährungsstörung der Vorderhörner zu suchen; freilich fehlt eine qualitative Veränderung der elektrischen Erregbarkeit. Vielleicht beruht sie in einigen Beobachtungen auf einer Lähmung in den betreffenden Muskeln selbst; wir kennen ja eine ischämische Lähmung und Atrophie. Einige wenige Male war sie sicher der direkte Ausdruck einer komplizierenden echten Neuritis. Scheiber sucht sie in seinem Fall als reflektorisch bedingt aufzulösen und setzt sie in Parallele zu den arthritischen Muskelatrophien.

Einer genaueren Beschreibung und Analyse hat Phleps die bei der Raynaudischen Krankheit vorkommenden Muskelatrophien unterzogen. Ich bin auf diese sogenannte vasomotorische Atrophie schon im allgemeinen Teile (S. 90) genauer eingegangen. Phleps setzt sie in Parallele mit den cerebralen und den arthropathisch-reflektorisch entstehenden Atrophien und betont die Gemeinsamkeit der pathogenetischen Beziehungen für die Veränderungen an der Haut, den Gelenken und Knochen. Es können sich nach dieser Anschauung Muskelatrophien einstellen, auch dann wenn die gewöhnlichen funktionellen Beziehungen des Muskels zu seinem spinalen Centrum intakt und die Kontraktionsfähigkeit somit erhalten bleibt. Diese Atrophien werden auf Störungen im peripheren vasomotorisch-trophischen Reflexapparat im Ursprungsgebiet des peripheren Sympathicus zurückgeführt. Soweit bei der Raynaudischen Krankheit überhaupt Muskelatrophien der hier in Frage stehenden Art (einfache Atrophie, keine qualitativen Störungen der elektrischen Erregbarkeit, fehlender oder geringer Funktionsanfall, diffuse nicht spinal-neuritische Verbreitung) vorkommen, schließe ich mich diesem Erklärungsmodus an. Für die allgemeine Auffassung der Krankheit entnehmen wir nach dieser Seite der Pathogenese den Hinweis auf die Erkrankung des vasomotorischen Apparates. Auch Bender akzeptiert diese Anschauung.

Die Kombination von Raynaud und Dystrophia musculorum progressiva wurde von mir beobachtet und erwähnt. Sie weist auf interessante gemeinsame Beziehungen hin, die aber auf ganz anderen

Gebiete liegen, dem der kongenitalen fehlerhaften Anlage vasomotorischer und motorischer Apparate. Auf die Rolle, die eine Hypoplasia arterialis für die Entstehung der Raynaudschen Krankheit spielt, macht Bury aufmerksam.

Keines der Einzelsymptome vermag uns einen ganz bestimmten positiven Anhaltspunkt dafür zu geben, in welchem Teil des Nervensystems wir die Veränderungen zu suchen haben, durch die das Krankheitsbild zustande kommt. Aber sie alle weisen uns auf das Nervensystem und im speziellen das vasomotorische als Locus morbi hin. Wenn wir uns weiter der Feststellungen bezüglich der Anamnese erinnern, wie oft eine neuropathische Belastung bei Raynaud-Kranken vorzuliegen hat, wenn wir an die zahlreichen Kombinationen von Raynaudscher Krankheit mit Nervenkrankheiten und namentlich mit Neurosen erinnern, so haben wir gewiß genug Anhaltspunkte dafür, von vornherein bei der Raynaudschen Krankheit eine nervöse Genese zu vermuten. Mit wenigen Ausnahmen vertreten auch die früheren Autoren diesen Standpunkt. Nur die, welche auf ihre Einzelbefunde am Gefäßsystem einen unmotiviert großen Nachdruck legen, sind geneigt, an eine Angiopathie zu denken.

Raynaud selbst sah das Wesen der Krankheit in folgendem: Es ist eine Reizung eines bestimmten vasomotorischen Centrums im Rückenmark anzunehmen. Ist diese Reizung eine tetanische, so kommt es zum Stadium der „Agidité“, überschreiten sie gewisse Grenzen in der Dauer, so kommt es zur Gangrän. Wenn nur Teile dieses Centrums betroffen sind, so werden nur bestimmte Abschnitte der Extremitäten, einzelne Finger usw. die Krankheitserscheinungen zeigen. Der Wechsel zwischen Asphyxie und Synkope locale kommt in der oben schon geschilderten Weise zustande, ebenso die Gangrän in direkter Folge wiederholter Anfälle von Asphyxie und Synkope locale. Da in der Medulla spinalis gelegenen vasomotorischen Centren weisen eine abnorm große Erregbarkeit auf, so daß sie durch Reize zur Kontraktion gebracht werden, die unter normalen Verhältnissen ohne so erhebliche physiologische Wirkungen einhergehen. Die Tatsache, daß gerade die Extremitäten mit großer Vorliebe der Schauplatz dieser Erscheinungen werden, findet ihre Erklärung darin, daß diese, mit verhältnismäßig größter Oberfläche ausgestattet am meisten Wärme abgeben und hier daher zuerst die Störungen, die durch die fehlerhafte Blutversorgung bedingt werden, zum Ausdruck kommen. Über die Art des auf das vasomotorische Centrum einwirkenden Reizes wissen wir nichts Bestimmtes, es könnte sich um Sklerosen des Gewebes, um Giftwirkung usw. handeln; der Reiz kann direkt am Ort des Centrums einwirken, aber er kann auch reflektorisch wirksam werden. So lehrt ein Experiment von Thelazan und Brown-Séquard, daß die Gefäße der einen Hand sich kontrahieren, wenn die andere in kaltes Wasser gesteckt wird, d. h. die Reizung der

Enden der sensiblen Fasern der einen Hand breitet sich bis zum Rückenmark aus und geht dort auf die sympathischen Nerven beider Seiten über. Sicher ist in vielen Fällen von Asphyxie locale der Reiz reflexorisch angelegt. Die Intermissionen der Erscheinungen, das häufige Zurückgehen zur Norm läßt es als wahrscheinlich annehmen, daß die krankmachende Ursache nicht eine organische, statische, dauernd einwirkende, sondern auch ihrerseits eine intermittierende ist.

Wir würden den Raynandschen Erklärungsversuch also dahin zusammenfassen können, daß es sich um eine centrale vasomotorische Neurose handelt, und zwar genauer um eine direkt oder reflexorisch angeregte Steigerung der Erregung des vasomotorischen Centrums. — Für Raynaud ist der von ihm geschilderte Symptomenkomplex eine *entité morbide*.

In der Folge ist diese Theorie in jeder ihrer Einzelheiten angegriffen worden. Man hat die Raynandsche Krankheit überhaupt nicht als Neuropathie, sondern als Angiopathie ansprechen wollen. Diejenigen, die ihr ihre neuerege Entstehung beilegen, haben den centralen Ursprung der Affektion bestritten, oder sie haben geäußert, daß es sich überhaupt oder ausschließlich um eine Erkrankung des Systems der Vasomotoren handelt, oder sie haben an die Stelle der Neurose die organische Erkrankung des Nervensystems setzen wollen. Kurz und gut, kein Punkt der Raynandschen Aufstellungen ist übrig geblieben, der nicht einen heftigen Angriff erfahren hätte, und besonders groß ist die Zahl derer gewesen, die unserer Krankheit überhaupt eine Einheitlichkeit abgesprochen haben, und sie als die Folge der verschiedensten Läsionen des centralen und peripheren Nervensystems sowohl als des Gefäßsystems entstehen ließen. Oft genug war dabei die einzelne Beobachtung, über die der Autor gerade verfügte, entscheidend für ihn, um dieser oder jener Entstehungsweise den Vortag zu geben. Es mag uns gestattet sein, aus der großen Reihe der Autoren einzelne Vertreter einer jeden Ansicht auszusuchen und uns mit ihren Gründen für ihre Anschauungsweise bekannt zu machen.

Wir beginnen mit den Autoren, die die Theorie Raynands der Hauptsache nach akzeptierten und nur in Einzelheiten modifizierten. Wir nennen als solche Bland, Calmann, Gandois, Germer, Gibert, Grassart, Henty, Hutchinson, Krisowski, Israelsohn, Laurenti, Leichtenstern, Morgan, Minor, Munro, Nedopil, Shaw, Strauß, Sachs, Urquhart, Warren, Vespa und Zeller. Auch Monro ist hier zu nennen. Er hält es für unzweifelhaft, daß eine genügend lange ausgedehnte Asphyxie auch Gangrän hervorbringen kann. Dabei will er nicht leugnen, daß die trophischen Emationen der lokalen Nerven durch den krankhaften Zustand der betroffenen Teile ungünstig beeinflusst werden und so sich ihrerseits an der Produktion der Nekrosen beteiligen. Aber die erstaunliche Art, in der

extrem asphyktische Teile wieder zur Norm zurückkehren, ruft auch seiner Auffassung doch den Eindruck hervor, daß alles, was zur Vermeidung einer Gangrän notwendig ist, nur in einer Wiederherstellung des Lumens der Blutgefäße besteht.

Wir könnten dieser langen Reihe von Namen auch den von Weiß noch anfügen, denn im letzten Grunde gehört auch Weiß zu den Verfechtern der Theorie von der centralen vasomotorischen Neurose, wenn er auch Modifikationen und Einschränkungen genug an ihr vornimmt. Das hauptsächlichste Bedenken, das Weiß hat, ist das, ob es allein durch Alteration der Gefäßinnervation zu einem Absterben der Gewebe kommen kann. Wir haben oben bereits die Stellung von Weiß zur Frage der neurotischen Gangrän pränotiert. Er läßt am Schluß seiner Ausführungen diesen Punkt eigentlich in *suspense*: Die Erneuerung der Einflüsse, welche bei der Gangränesezierung eine Rolle spielt, müßte weitere Forschung vorbehalten bleiben. Doch versucht er schließlich mit folgenden Worten noch eine einheitliche Pathogenese zu geben: „Bei nervös belasteten Kranken wird zuweilen das vasomotorische Centrum entweder reflektarisch durch Reizung sensibler Nerven oder durch psychische Emotionen oder automatisch durch uns unbekannte Einflüsse in Hypertonie versetzt. Die natürliche Folge muß eine excessive Erregung der Vasomotoren sein, die ihrerseits neuen Gefäßkrampf produziert. Von der Dignität der Tode, in welchen sich der Angiospasmus abspielt, werden nun die weiteren Erscheinungen abhängen. Bei Krampf in den arteriellen Hautgefäßen zeigen diese ein kadaverisches Aussehen, bei Vasenkrampf resultiert regionale Cyanose und bei Krampf der Vasodilatoren regionale Rötung. Bei spastischer Ischämie des Sprachcentrums wird Aphasie, bei jener der Regio ciliospinalis werden orthopupilläre Phänomene, bei jener der Vorderhörner Ernährungsstörungen der Muskeln und Gelenke, bei jener der mit der Haut funktionell in Verbindung stehenden Abschnitte der Hinterseitenstränge Ernährungsstörungen der Haut und der epidermoidealen Gebilde in Erscheinung treten.“

Krisowsky hat sich bemüht, die Einwendungen von Weiß gegen die vasomotorische Genese des Brandes, wie sie Raynaud begründete, zu entkräften. Da es sich um neuropathische Individuen handelt, wäre es wohl möglich, daß auch eine kurz dauernde Nahrungsentziehung schon zur Nekrose der Gewebe führe. Daß man oft symmetrische Gangrän ohne lokale Synkope sehe, lege daran, daß diese wegen ihrer kurzen Dauer einfach übersehen wurde. Der Unterschied zwischen lokaler Asphyxie bei Raynaud und bei Herzfehlern — auf letztere hatte Weiß mit dem Hinweis exemplifiziert, daß hier selbst bei hoher Intensität Asphyxie nie Gangrän bedinge — liege darin, daß hier eine plötzliche Herabsetzung des Sauerstoffverhältnisses, dort eine allmähliche, eine Gewöhnung der Gewebe an veränderte Ernährungsverhält-

nisse zulassende vorliege. Gegen die Theorie von Weiß vom venösen Tonus im Vasomotorenzentrum spreche andererseits direkt, daß derselbe für den Menschen doch noch erst bewiesen werden müsse. Wenn die Venen kontrahiert seien und der Blutzufuß fortbestehe, müßte es zu Ödem kommen, nicht zu Gangrän; diese würde bei Stase in den Capillaren und unveränderter Zufuhr arteriellen Blutes eher feucht als trocken sein. Wir werden an anderer Stelle sehen, daß die Ansicht von Krisowski über die rein mechanische Genese des Ödems zwar weit verbreitet, aber unrichtig ist; wir wissen ferner, daß ein venöser Tonus auch beim Menschen sicher vorhanden ist, und schließlich können wir doch die Tatsache nicht ohne weiteres bei Seite schieben, daß von einwandfreien Beobachtern Gangrän der oberflächlichsten Hautpartien ohne vorausgehende vasomotorische Erscheinungen gesehen wurde.

Strauß hat sehr energisch die Ansicht verächtet, daß die Raynandsche Krankheit eine reine Angioneurose ist. Seine Beweisführung ist aber durchaus unzulänglich. Er betont, daß die Gangrän sich nicht an die spastische Ischämie, sondern die spastische Cyanose anschließt; diese wirke auf die Zellen viel deletärer ein, da es bei ihr zu einer hochgradigen Venostität des Blutes kommt und die Zellen beständig mit ihren eigenen Stoffwechselprodukten umspült werden. Dies im Verein mit der durch Gefäßkrampf bedingten Unterernährung ist ausreichend die Gangrän hervorzubringen. Alle die Schwierigkeiten, die sich aus dem Mangel an Parallelismus zwischen vasomotorischen und trophischen Störungen ergeben, kennt Strauß offenbar nicht. Er knüpft seine Erörterungen allerdings auch hauptsächlich an eine Beobachtung an, deren klinische Stellung sehr zweifelhaft ist. Sachs, der dem Begriff der Raynandschen Krankheit eine ganz unzulässige Erweiterung andeuten läßt, schließt sich Strauß an. Seine Fälle sind fast alle solche von endarteritischer Gangrän.

Über die Ursache des Tonus des Vasomotorencentrums, der ja sicher vorliegt, wurden verschiedene Vermutungen aufgestellt. Zeller unterscheidet folgende verschiedenen Bedingungen. Direkte Reizung des Centrums bei Überanstrengung, Chlorose usw. durch Kohlensäureüberschuß, bei einigen Infektionskrankheiten durch unbekannte giftige Stoffe, bei centraler Erkrankung durch Veränderungen des Blutdrucks infolge von Veränderungen des Volumens der betreffenden Organe, bei Hysterie durch psychische Reize, wie Scham, Schmerz usw. Er berücksichtigt besonders die Fälle von einseitiger Raynandscher Gangrän und sucht für jeden einzelnen derselben (sowie eigenen, die von Bland, Pastenz, Eichhorst) die jedesmal verschiedenen Bedingungen des Eintretens der Gangrän zu erörtern. Andere Autoren suchen die Ursachen der reflektorischen Reizung des Vasomotorencentrums in der zum Teil auch anatomisch nachgewiesenen Erkrankung peripherer Organe, wie der Nerven oder der

Arterien (Vordelli), oder selbst gewisse Eingeweide, besonders des Uterus (Warren), hielten sich also von dem Fehler derjenigen fern, die in diesen Erkrankungen selbst die Ursache der ganzen Krankheit sehen. Die erhöhte Excitabilität des Vasomotorcentrums sucht Gerner durch „abnorme Querleitung“ zu erklären. „Reize, die sonst in physiologischer Weise vom Gefäßcentrum aus wirken, gewinnen nach Verlust der Markscheiden vielleicht durch Querleitung größere Ausdehnung.“ Schade nur, daß diesen schönen detaillierten Vorstellungen so wenig positive Befunde zugrunde liegen. Das vasomotorische Centrum wird entsprechend den allgemein über seine Lage herrschenden Vorstellungen meist in der Medulla oblongata, oft auch in den verschiedenen Höhen des Rückenmarks gesucht. Das Zusammenkommen von Raynaud mit Diabetes wird von Shaw zur Unterstützung für die Lokalisation der primären Schädigung in der Medulla oblongata herangezogen, ein höchst vages und unberechtigtes Vorgehen bei der Seltenheit der Coincidenz beider Krankheiten. Daß es gerade die Extremitäten sind, die in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle der Sitz der Krankheitserscheinungen sind, rühre von ihrer weiten Entfernung vom Centrum selbst her.

Von der Erwägung ausgehend, daß untergeordnete vasomotorische Centren auch in den peripheren Teilen des Körpers vorhanden sind, haben einige Forscher der Vermutung Raum gegeben, daß nicht die übergeordneten Centren im Centralnervensystem, sondern diese tieferen Centra der Sitz der Krankheit sind. Vulpian hat im allgemeinen darauf aufmerksam gemacht, daß es falsch wäre, diese peripheren Organe zu übersehen. Bonveret betont für die Raynaudsche Krankheit die Möglichkeit, daß die Reflexsteigerung durch die peripheren Centren bedingt sei. Morgan ist geneigt, eine gleiche Annahme wenigstens für die Fälle zu machen, in denen es sich nur um die Erscheinungen der Synkope locale handelt, hier seien nur die kleinen Ganglien in den Blutgefäßen betroffen, die höheren Centren seien frei. Pagge nimmt für manche Fälle etwas Ähnliches an, wenn er, von seinem Fall ausgehend, sich vorstellt, daß durch die Sklerose der Arterien eine mechanische Einwirkung auf die in ihnen verlaufenden Vasomotoren ausgeübt würde, dadurch käme es zu einem Gefäßkrampf ohne Dazwischentreten der nervösen Centra. Grasset läßt die Frage, ob die peripheren oder centralen vasomotorischen Centren betroffen sind, offen. Auch Hamilton hat schon vor langem auf Grund eines der Raynaudschen Krankheit zum wenigsten sehr nahestehenden Falles ähnliche Anschauungen vertreten.

Wir haben im allgemeinen Teil die anatomischen und physiologischen Verhältnisse dieser peripheren vasomotorischen Centren geschildert, und wir haben auch dargetan, daß ihnen eine gewisse, wenn auch beschränkte Selbstständigkeit zukommt. Es wäre daher von vornherein

nicht ohne weiteres auszuschließen, daß durch krankhafte Veränderungen dieser peripheren Bahnen Erscheinungen zustande kommen, die den bei der Raynandschen Krankheit beobachteten ähneln. Aber es gibt doch eine ganze Anzahl Momente, die uns die Ursache unserer Krankheit mehr in den centralen Teilen suchen lassen müssen.

Hierher rechnet die direkt beobachtete Kontraktion der A. centralis retinae beziehungsweise anderer größerer Arterien, die auf eine Kontraktion centraler Arterien deutenden Symptome der Aphasia, der Erscheinungen von Sympathikuslähmung und Motilitätsstörung usw. im Fall Weiß, die Hämoglobininurie, die weite Verbreitung der Störungen über den ganzen Körper in einer Reihe von Fällen; großes Gewicht wird man auch auf das häufig beobachtete Zusammenvorkommen centraler Affektionen (Psychosen, Neurosen) mit Raynaud legen dürfen. Dagegen sei nochmals darauf hingewiesen, daß in der Symmetrie der Symptome kein sicherer Hinweis auf ihre centrale Natur liegt. Ob in Fällen, wo es sich nur um das unkomplizierte Phänomen des Doigt mort handelt, gelegentlich einmal nur die peripheren vasomotorischen Ganglien betroffen sind, mag dahingestellt bleiben; Monro, der sonst die centrale Genese der Krankheit vertritt, gibt für diesen Fall die Möglichkeit einer solchen Entstehung zu. Hnátěk glaubt auf Grund der Tatsache, daß die einzelnen Finger sich oft ganz verschieden verhalten, auf eine Mitbeteiligung des peripheren Vasomotorenapparates schließen zu sollen. Der Grund ist offensichtlich nicht stichhaltig. Bei den auf Affektion der spinalen motorischen Centren beruhenden progressiven spinalen Muskelatrophien findet man z. B. sehr oft ein geradezu elektives Befallenwerden einzelner Muskelgruppen in der Peripherie; und über die Representation der einzelnen Hautbezirke in den vasomotorischen Centren wissen wir gar nichts Sicheres. Ich finde keinen Anhaltspunkt, aus der Art der vasomotorischen Symptome den Sitz der ihnen zugrunde liegenden Störungen im vegetativen System zu erschließen. Daß neben den im Vordergrund stehenden sympathikotonischen auch vagotonische Symptome vorkommen, scheint mir sicher zu sein, an welcher Stelle sie ausgelöst werden, werden wir erst auf Grund genauerer Kenntnisse der Qualitäten dieser Symptome erkennen können, die wir vielleicht mittels pharmakologischer Untersuchungsmethoden werden gewinnen können. Aber die eben erwähnten allgemeinen Momente der Verbreitung der Störungen, des Zusammenstehens und -Vorkommens mit allgemeinen Neurosen wiegen meines Erachtens schwer zugunsten der Annahme einer centralen Natur des Leidens und sprechen gegen alle Theorien, die diese Krankheit auf irgendeine periphere Affektion, sei es nun eine Erkrankung der peripheren Nerven oder eine solche der Arterien, stützen wollen.

Gehen wir zunächst einmal auf die neuritische Theorie ein.

Sie hat ihre Hauptstütze in den anatomischen Befunden von Neuritis bei Gangrän.

Wir können uns in der Erörterung der hierhergehörigen Theorien nach dem, was wir über die angebliche Abhängigkeit der Gangrän von der Neuritis gesagt haben, jetzt kurz fassen. Wir sehen, in keinem Fall ist der Nachweis, daß die Gangrän von einer Neuritis abhängt, gelungen. Gegenüber der Raynaudschen Affektion versagt diese Theorie neben allen den Mängeln, die ihr als einer „peripherischen“ anhaften, um so mehr, als die Annahme einer Neuritis — ebenso wie irgendeiner anderen organischen Erkrankung — es schwer verständlich erscheinen läßt, wie die intermittierenden und wechselnden vasomotorischen Erscheinungen, das Schwanken zwischen normalem und pathologischem Verhalten, möglich sind. Übrigens spricht, wie schon hervorgehoben, auch das Fehlen der gewöhnlichen klinischen Zeichen der Neuritis gegen eine solche Annahme.

Ausführlich diskutiert Monro diese Fragen. Vasomotorische Phänomene wurden wiederholt bei echter Neuritis gefunden, es können in den früheren Stadien alkoholischer Lähmungen die vasomotorischen Phänomene selbst anfallsweise auftreten. Bei schwerer Schädigung kann auch Gangrän vorkommen, bei der Lepra und vielleicht auch bei Beri-Beri ist den neuritischen Veränderungen ein erheblicher Anteil an der Genese der Gangrän, die auch symmetrisch sein kann, zugeschrieben worden, aber selbst wenn die vasomotorischen Phänomene bei der Alkoholneuritis von dieser direkt abhängen — die Möglichkeit, daß sie z. T. von Veränderungen des centralen Nervensystems beeinflußt sind, ist nicht ausgeschlossen — so unterscheiden sich doch die beiden Krankheiten stets deutlich voneinander, so daß auch Monro zu einer Abhönung der peripheren neuritischen Genese der Raynaudschen Krankheit kommt.

Die Theorie von der Erkrankung peripherer Arterien als Ursache der Raynaudschen Krankheit hat dieselben ausschlaggebenden Bedenken gegen sich wie die der Neuritis — sie ist eine periphere und ist eine organische Erkrankung. Auch sie ist, wie wir oben gesehen haben, auf anatomische Befunde gestützt worden, und hier wie so oft, gilt für eine Anzahl der Autoren der anatomische Befund als ein soß me tangere, gegen den man mit „blauen Hypothesen“ nichts ausrichten kann; es ist etwas gefunden worden, was man sehen und fühlen kann, also fast mit allen Hypothesen, i. e. mit aller Überlegung, mit jedem Versuch logischer Kritik. Goldschmidt geht in diesem Mangel von Kritik gegenüber anatomischen Befunden am weitesten. Ihm ist es nicht zweifelhaft, daß die Veränderungen an den Gefäßen, die er fand, der Grund sowohl für die Sklerodermie als für die Raynaudsche Krankheit sind. Die Theorie einer vasomotorischen Aktion sei eine rein theoretische. Dabei ist in dem Fall Goldschmidts

mit seiner Annahme die Tatsache von vornherein unvereinbar, daß die Gefäßveränderungen viel weiter ausgedehnt waren, als die gangränösen und ekzematösen Erscheinungen; sie fanden sich nicht nur an einer Anzahl innerer Organe, wo die Erkrankung eventuell symptomlos hätte verlaufen sein können, sondern auch in der Haut der Füße, die nicht verändert war; es ist gar kein Grund abzusehen, warum, wenn Gefäßkrankung und Raynaudsche Symptome wirklich im Verhältnis von Ursache und Wirkung ständen, sich die Füße nicht mit denselben Krankheitserscheinungen präsentierten wie die Hände.

Nicht alle die Autoren, die in ihren Fällen eine Gefäßkrankung fanden, haben dieser auch eine ursächliche Rolle zuerkannt; viele haben es wenigstens vermieden, in der Gefäßkrankung allein die Ursache der Raynaudschen Erkrankung zu sehen. Kriewski z. B. versucht für seinen mehrfach zitierten Fall folgende Erklärung: Es bestand hereditäre Lues, dadurch war eine chronische diffuse Arteritis syphilitica in den kleinen und kleinsten Gefäßen des Gehirns sowohl wie der Extremitäten bedingt; wegen des Sitzes in den kleinsten Gefäßen waren die Veränderungen nicht zu palpieren, und sie bewirkten auch nur eine Verengung des Gefäßlumens, keinen Verschuß. Zur Erklärung der der Gangrän vorausgehenden Anfälle von Synkope und Asphyxie reichen diese Veränderungen aber nicht aus, dafür muß man noch einen reflektorischen, durch die Kälte bedingten Reiz auf die Extremitäten annehmen, welcher in letzteren durch Vermittlung des vasomotorischen Centrums einen Angiospasmus erzeugte; Angiospasmus plus Gefäßveränderungen zusammen riefen Asphyxie locale usw. hervor, für sich allein ist keines der beiden angegebenen Momente genügend wirksam. Kriewski hält es für möglich, daß ein ganzer Prozeß im Gehirn dabei direkt einen Reiz auf das Vasomotorenzentrum ausgeübt habe, so daß also auch hier ein centrales Moment mit im Spiel gewesen sein kann, durch das am besten die auffallende Symmetrie erklärt würde. Auch Fordyce versucht in einem ähnlichen Fall eine ähnliche Erklärung. Ebenso bevorzugen Castellino und Cardi wenigstens für einen Teil der Fälle eine Erklärung, die der oben gegebenen nahe steht. Ihre sorgfältigen und mühsamen Untersuchungen rechtfertigen ein genaueres Eingehen auf ihre Ansichten. Sie gehören zu den Autoren, die verschiedene Formen Raynaudscher Erkrankung unterscheiden, ebenso wie Hochenegg, DeRance, Kornfeld, Levi, Nonne, Scheiber, Sturmdorf, Hutchinson und manche andere. Nach Castellino und Cardi gibt es eine symmetrische Gangrän neuropathischen Ursprungs und davon wieder eine *Forma nervosa*, bei der organische Veränderungen im Nervensystem ganz vermißt werden, und eine *Forma neuritica*, bei der die oben geschilderten neuritischen Veränderungen gefunden werden, und zweitens gibt es eine symmetrische Gangrän angiopathischen Ursprungs,

die einmal durch diffuse Arteriosklerose der kleinsten Gefäße bedingt ist, und zweitens durch eine Sklerose der Gefäße der Nerven. Wir haben schon, daß in beiden von den Autoren persönlich beobachteten Fällen die Arterien der Nerven und die kleinen Hautarterien beteiligt waren; auf erstere führen sie die symmetrische Gangrän, auf letztere die daneben vorhandenen Erscheinungen von Sklerodermie zurück. Sie rechnen ihre Fälle zur angiopathischen Form der Raynaudschen Krankheit. Aber das Nervensystem ist nach ihrer Ansicht in solchen Fällen doch auch beteiligt. Dafür sprechen in ihren Fällen die Symmetrie, die Tachykardie und die Hypothermie, die durch sorgfältige thermometrische Messungen festgestellt wurde, und auf die asymptotischen Teile nicht beschränkt war. Als weitere Stütze für die Annahme der Beteiligung des Nervensystems sehen die Autoren das Ergebnis der plethysmographischen Untersuchungen an, die sie bekanntlich zu der Annahme eines Torpor der Gefäßreflexe führte. In der Tat sind ja die plethysmographischen Untersuchungen, über die oben berichtet wurde, ein absoluter Beweis für die Beteiligung des Nervensystems und machen, wenn das überhaupt noch nötig wäre, mit aller Sicherheit jede rein angiopathische Theorie unmöglich. In ihnen zeigt sich mit besonderer Schärfe der Wechsel der Erscheinungen, wenn, wie Simons das durch seine kontinuierlichen Untersuchungen feststellte, an dem einen Tage normale Reflexe nachweisbar sind, an dem anderen schwere Störungen sichtbar werden, deren Einzelheiten früher mitgeteilt wurden. Diese Reflexe benutzen als Weg: peripherer sensibler Nerv — Spinalganglion — hintere Wurzel — von da Übergang auf die vasomotorischen spinalen und sympathischen Centren — periphere vasomotorische Bahn. Es spricht alles dafür, daß der motorische Teil des Reflexbogens Sitz der Läsion ist. Mit Castellino und Cardi scheint es auch mir ebenso wie Phleps am meisten plausibel, daß es sich um eine pathologische Steigerung des Tonus der vasomotorischen Centren handelt, der aber kein dauernder, sondern ein intermittierender ist. Vereinzelte Erfahrungen einer paradoxen Reaktion beweisen, daß daneben auch noch andere pathologische Verhältnisse wirksam sein müssen. Worauf letzten Endes diese intermittierende Hypertonie beruht, wissen wir nicht. Daß psychische, thermische, andersartige sensible Reize die Tonussteigerung manifest werden lassen, beweisen die klinischen Erfahrungen; daß ein von der inneren Sekretion gelieferter Stoff (Adrenalin) die Bedingungen für die Hypertonie liefert, ist eine naheliegende, aber bisher unbewiesene Vermutung, durch die das eigentliche Problem übrigens nur verschoben wird.

Wir dürfen nun aber, wenn wir den Veränderungen der Nerven und Gefäße keine pathogenetisch ausschlaggebende Rolle zuschreiben, nicht in den entgegengesetzten Fehler verfallen, diese Veränderungen

ganz zu vernachlässigen. Was die Läsionen der peripheren Nerven angeht, so ist ihre Bedeutung von uns schon oben diskutiert worden. In der Mehrzahl scheint es sich in der Tat um sekundäre oder akzidentelle Befunde zu handeln (auf dem Boden der Kachexie entstanden, durch die Nähe gangränöser oder eitriger Prozesse bedingt). Mit der Möglichkeit, daß in den nachgewiesenen Läsionen der Nerven auch solche von vasomotorischen Fasern mit inbegriffen sind, und daß diese doch in näherem Zusammenhange mit dem eigentlichen Krankheitsprozesse stehen, muß man namentlich auf Grund der Lapinsky'schen Untersuchungen rechnen, der, wenn auch nicht in den Nervenstämmen, so doch in den Verzweigungen, und zwar sowohl an markhaltigen wie an marklosen Fasern (s. u. S. 116) Veränderungen fand. Die Nervenveränderungen könnten dort, wo sie mit den Gefäßveränderungen zusammen vorkommen, auch durch diese bedingt sein.

Was die letztgenannten angeht, so erscheinen sie für den weiteren Verlauf der pathologischen Geschehnisse naturgemäß von größter Bedeutung. Ihre Entstehung kann, und da stützen wir uns wieder auf die Ergebnisse der Lapinsky'schen Untersuchungen, in unmittelbarer Abhängigkeit von den im Vasomotorensystem sich abspielenden Prozessen stehen. Denn die Abhängigkeit des Aufbaues der Gefäßwände von ihren Vasomotoren scheint mir außer allem Zweifel zu sein. Unter diesen Bedingungen sind sie rein sekundär, gehören aber unmittelbar zum Krankheitsprozeß. Als Folge vasoconstrictorischer Reizprozesse scheint Benders die in seinem Falle beobachteten Gefäßveränderungen aufzufassen. Des weiteren möchte ich noch an die Thomas'schen Anschauungen erinnern, nach denen Gefäßwandveränderungen durch den häufigen Wechsel in der Weite der Gefäße entstehen; eine Anschauung, die allerdings nicht ohne Widerspruch geblieben ist.

Daß sowohl die neuritischen wie die vasculären Veränderungen ihrerseits wieder dadurch noch in den Mechanismus der Krankheit eingreifen können, daß sie reflektorisch wirkend den Reizzustand des Vasomotorenapparates steigern, ist klar. Daß besonders die für die Ernährung so wichtigen Gefäßreflexe (Kathagel) dadurch ungünstig modifiziert werden, verdient ebenfalls Erwähnung.

Da wo ausgedehntere, auf die größeren Gefäße übergehende arteriosklerotische Veränderungen vorliegen, könnten diese in derselben Weise reflektorisch auslösend wirken und die sonst vorhandene Krankheitsdiathese zur wirklichen Krankheit führen.

Wir begeben uns in diesen Fällen schon auf symptomatologische Grenzgebiete und müssen große Vorsicht anwenden. Wir müssen hier an die Möglichkeit noch anderer Zusammenhänge denken, wie wir das oben bei den ganz analog liegenden Verhältnissen der Erythromelalgie bereits ausführlich auseinandergesetzt haben.

Wie die Arteriosklerose von Erythramelalgiesymptomen, so kann sie auch von Raynaudschen Symptomen begleitet sein; die vasomotorisch-konstriktorischen Phänomene können ebensogut wie die vasomotorisch-dilatatorischen in und von diesen erkrankten Gefäßen ausgeht werden. Das wird uns im Kapitel Diagnostik noch beschäftigen.

Kehren wir zu unseren pathogenetischen Erörterungen zurück.

Daß die Annahme einer reinen Angioneurose nicht haltbar ist, glaube ich gezeigt zu haben. Das Symptom der Gangrän verlangt eine andersartige Erklärung.

Wir sahen, daß Weiß die Bedenken gegen die ursprüngliche Raynaudsche Auffassung der Entstehung der Gangrän durch neurogene vasomotorische Störungen zuerst ausführlich begründete, ohne jedoch bezüglich der Pathogenese der Krankheit zu einer positiven Auffassung zu kommen. Vor Weiß hat schon Mills für das Zustandekommen der trophischen Veränderungen Störungen der trophischen Centren in Anspruch genommen. Spätere Autoren sind ihm darin gefolgt. Gerade an diesem Punkt machte sich die Unsicherheit und Mangelhaftigkeit unserer Kenntnisse von dem nutritiven Abhängigkeitsverhältnis zwischen Nervensystem und epidermalen Geweben am meisten bemerkbar; hier spiegeln sich alle die verschiedenen Anschauungen wieder, die da herrschen. Am leichtesten löst sich das Problem für die, die an das Vorhandensein isolierter trophischer Centren und Bahnen glauben; durch Ausbreitung auf die trophischen Centren von den benachbarten vasomotorischen her entstehen die trophischen Störungen. Dahin müssen wir wohl Hochsieggs Ansicht rechnen, wenn ihre Fassung auch etwas unbestimmt lautet: „In einer dritten Reihe von Fällen scheinen die nervösen Störungen direkt das Leben der Zellen unmöglich zu machen, da wir keine Symptome beobachten, die für einen Gefäßkrampf sprechen. Wir sind in diesen Fällen genötigt, einen Ausfall trophischer Impulse anzunehmen, der wieder durch Zerstörungen des kypothetischen trophischen Centrums oder aber durch Unterbrechung der Leitung von diesem zur Peripherie im Rückenmark oder in den peripheren Nerven bedingt sein kann.“ Als Anhänger einer Erkrankung eines besonderen trophischen Centrums bei der Raynaudschen Krankheit (wie auch bei der Sklerodermie) erklärt sich Fuchs. Diesen wenigen Autoren, die in neuerer Zeit keine Anhänger mehr gefunden haben, steht eine große Anzahl solcher gegenüber, die von einer Annahme spezieller trophischer Centren absehen und den supponierten trophoneurotischen Einfluß auf den bekannten Nervenbahnen sich abspielen lassen. (Trophonévrose névreuse Colson, grande névrose vasotrophique Lancereaux, der allerdings darunter alle neuropathischen Gangränformen versteht und die Raynaudsche nur als Unterform dieser auffassen will.) Als weitere Autoren, die sich zu einer solchen Auffassung des Krankheitsbildes bekennen, seien genannt

Verdelli, Dehio, Friedel, Santvoord, Vespa, Zerhus, Rossignot, Schulz.

Ich möchte ich also mich anschließen, indem ich die Raynandsche Krankheit als eine centrale vasomotorisch-trophische Neurose auffasse. Daß bisher weder experimentell, noch klinisch, noch anatomisch das Vorhandensein gesonderter trophischer Centren und Nerven nachgewiesen ist, haben wir im allgemeinen Teil des weiteren auseinander gesetzt. Dagegen erschien es andererseits nach klinischen Erfahrungen wahrscheinlich, daß die Ernährung der Haut und ihrer Anhangsgebilde ebenso wie der Knochen und Gefäße abhängig von einer sich auf den bekannten Bahnen verbreitenden Tätigkeit des Nervensystems zu denken ist. Auf dieser Grundlage aufbauend, die die der Pathologie der Raynandschen Krankheit zu entnehmenden Erfahrungen und Lehren nur zu befestigen imstande sind, kommen wir zu unserer Auffassung von dem Wesen des Leidens, insbesondere zu der Annahme, daß die trophischen Störungen einen selbständigen und wesentlichen Teil der Krankheit bilden. Die trophische Funktion ist nach unserer Auffassung keine automatische, sondern eine reflektorisch angeregte, derart, daß durch Veränderung der reflektorisch wirkenden Reize auch eine abnorme trophische Tätigkeit des Nervensystems zustande kommt. Wir haben auch oben bereits auseinander gesetzt, daß wir aus verschiedenen Gründen zu der Annahme gezwungen sind, daß die nutritive Funktion des Nervensystems nicht mit seinen übrigen Funktionen zusammenfällt. Wir wissen, wie wir sahen, nichts Sicheres darüber, an welchen Ort und an welche Nervenfaserung die die Trophik der Haut usw. regulierenden nervösen Impulse gebunden sind; wir müssen aber annehmen, daß alle Verbindungen der Haut mit dem Nervensystem durch Alteration ihrer Funktion an irgendeinem Ort zu einer veränderten Trophik der betreffenden Gewebe führen können; wir dürfen vor allem dabei auch der (motorischen und sensiblen) Bahnen der Gefäßinnervation nicht vergessen und müssen ihren pathologischen Verhältnissen ebenfalls eine Beteiligung an den trophischen Störungen in der Haut zugestehen.

Ich habe schon im allgemeinen Teil auseinander gesetzt, daß die normale Ernährung der Haut gewährleistet zu sein schließt durch die Integrität des Reflexes, der auf dem Wege von der sensiblen zur vasomotorischen Leitungsbahn läuft. Wenn wir bedenken, wie umfangreich dieser Reflexbogen ist — sensible resp. vasosensible Fasern in der der gewöhnlichen Funktion entgegengesetzten Richtung leitend — spinale oder medullare, resp. auch übergeordnete vasomotorische Centren — spinale vasomotorische Leitungsbahnen — Rami communicantes alii — Grenzstrang und periphere Abschnitte des Sympathi-

rus —, so ergibt sich daraus sofort, daß mit dieser Anschauung nicht eine bestimmte Lokalisation gegeben, sondern nur ein Versuch der Systematisierung gemacht ist. Der Sitz der Krankheit ist das vasomotorische System.

Ohne nähere Begründung hat man auch hier wieder zunächst allein an den Grenzstrang des Sympathicus gedacht. Simpson hat in ihm die Ursache der Krankheit verlegt, ebenso ist Schwimmer ein Anhänger dieser Theorie gewesen. Soweit unsere bisherigen Erfahrungen uns ein Urteil über eine genauere Lokalisation gestatten, sind sie schon im entsprechenden Abschnitte des vorigen Kapitels erörtert worden. Darauf verweise ich. Nur ein paar Bemerkungen seien hier noch angefügt.

Auf die spinalen vasomotorischen Centren konnten in gewissem Sinne die Erfahrungen bei der Syringomyelie hinweisen, bei der Raynaud-ähnliche vasomotorisch-trophische Symptome ja oft genug auftreten; die überhaupt, wie das schon wiederholt betont wurde, diejenige organisierte Affektion ist, deren Symptomatologie zu einem gewissen Teile die größte Ähnlichkeit mit der der vasomotorisch-trophischen Neurosen aufweist. Benders kommt für seinen mehrfach zitierten Fall zu der Annahme, daß infolge einer momentanen starken Hyperextension der Wirbelsäule, als Patient sich aus dem Bett schlenkerte, sich eine röhrenförmige Blutung in der rechten Hälfte des Rückenmarks entwickelt habe, die sich ungefähr von der Mitte des Lendenmarks bis weit in das Dorsalmark erstreckte und in unmittelbarer Nähe des Seitenhorns lag. Diese Blutung habe einen geringen Querschnitt gehabt, und sich nach oben zu fadenförmig verlaufen. Das ergossene Blut habe einen Reiz auf die nachliegenden vasomotorischen Centren ausgeübt und sei dadurch die Ursache der angiospastischen Gangrän geworden. Ich halte diese Annahme von Benders schon für seinen eigenen Fall für eine durchaus unbewiesene, mir nicht einmal sehr wahrscheinliche Vermutung, abgesehen davon, daß sein Fall mir auch in seiner ganzen Deutung als Raynandsche Krankheit nicht zweifellos ist. Jedenfalls verbietet sich eine Verallgemeinerung dieser Anschauungen unbedingt, in erster Linie in der Richtung, daß als Ursache der Erkrankung dauernde anatomische Veränderungen zu supponieren wären. An eine spinale Lokalisation denkt auch Techerbaek auf Grund seiner, wie es scheint, vollkommen vereinzelter Erfahrung, daß in seinem Falle zusammen mit den gangränösen Erscheinungen auch die Schenkelphänomene schwanden. Gerade das Fehlen regelmäßiger derartiger Symptome (neben Reflexstörungen wären namentlich entsprechende Störungen der Sensibilität zu erwarten) macht die Annahme einer spinalen Lokalisation etwas schwierig, schließt sie freilich gewiß nicht aus. Alles in allem, es muß vorläufig dabei bleiben, das Vaso-

motorensystem ist der Sitz der Krankheit; eine nähere Bestimmung ist noch unmöglich.

In den Fällen, in denen die Ausbreitung der vasomotorischen Symptome eine sehr große ist, in denen also vasomotorische Symptome sich neben den Akra auch am Rumpf finden, in denen Kontraktionszustände der im Innern des Körpers gelegenen Arterien nachgewiesen sind (Kontraktionen der Art. *centralis retinae*, der großen peripheren Körperarterien) oder wenigstens zu vermuten sind (Vorkommen von Hämoglobinurie, von passagerer Lähmung des Hals-sympathicus, von transitorischer Aphasie usw.), in diesen Fällen würde man am ehesten daran denken, daß ein alle diese Teile beherrschendes Centrum erkrankt sei. Als solches haben wir das große Vasomotoren-centrum der Medulla oblongata kennen gelernt. Aber dieser Schluß ist kein hindender; denn es kann die Möglichkeit nicht bestritten werden, daß, da es sich nicht um einen diffusen anatomischen Prozeß handeln kann, durch dieselbe Schädigung die zerstreut liegenden untergeordneten spinalen Centren gleichzeitig oder nacheinander affiziert werden und in den Fällen, in denen die Erscheinungen der Krankheit lokal sehr beschränkt sind, würde die Annahme, daß eine oder mehrere der spinalen Centren ergriffen sind, befriedigender sein, als die, daß nur ein kleiner Teil des Vasomotorencentrums erkrankt ist.

Die Krankheitsursache kann nicht in einer schweren dauernden Schädigung dieser Gebilde liegen. Dann wäre der charakteristisch intermittierende Verlauf nicht begrifflich. In Analogie mit den anderen vasomotorisch-trophischen Neurosen, wie in Anlehnung an die Migräne und ähnliche paroxysmal auftretende Nervenleiden müssen wir einen Krankheitsreiz voraussetzen, der aus unmerklichen Effekten heraus anwachsend in mehr oder minder plötzlichen Entladungen sich kund gibt, um sofort dann wieder in seiner Wirksamkeit abzusinken. Daß der intermittierende Charakter nicht immer in voller Schärfe gewahrt bleibt, wurde früher hervorgehoben; das deckt sich auch wieder mit allgemeinen Erfahrungen auf dem Gebiet der Migräne usw. Es kann nicht wundernehmen, daß ein solcher Reiz sich einem anatomischen Nachweis entzieht und wir daher vorläufig gezwungen sind, die Raynaudsche Krankheit den Neurosen zuzurechnen. Etwas weiteres vermögen wir über die Art der Krankheitsursache nicht auszusagen, wohl aber muß es uns gestattet sein, uns noch darüber zu unterrichten, unter welchen Umständen und von welcher Seite her die betreffenden Gewebe in einen solchen Reizzustand versetzt werden. Wir wissen aus dem physiologischen Teil her, daß die vasomotorischen Centren direkt oder reflektorisch in Erregung versetzt werden können, wobei hier nochmals daran erinnert sein mag, daß besonders die Reizung sensibler Abschnitte von größtem Einfluß auf diese Centren ist. Beide Arten von Ursachen scheinen nun in der Pathologie der Raynaudschen Krank-

heit vertreten zu sein. Um eine direkte Reizung scheint es sich in den Fällen zu handeln, wo im Körper abnorme Stoffwechselprodukte entstehen. Eine Vorstellung, die sich auf ähnliche Erwägungen stützt, hat zuerst Mourouon bezüglich der im Verlauf und nach Intermissionen vorkommenden Anfälle von *Asphyxie locale* geäußert. Er meinte, daß das Gift der Malaria so wirke, daß es zur Anhäufung melanämischer Produkte in den Gefäßen der Medulla und dadurch zur Reizwirkung auf die dort gelegenen vasomotorischen Centren komme.

Petit und Verneuil zählen die bei Malaria häufig vorkommende bekante als einfache Verlängerung oder Steigerung des gewöhnlichen Stadium *algidum* des malarischen Fieberanfalls an. Auch Moure macht darauf aufmerksam, daß die Fiebererscheinungen und die vasomotorischen Symptome der Malaria sehr wohl auf derselben Ursache beruhen könnten; dann kommt, daß die mit den Fieberanfällen verbundene Gefäßkontraktion reflektorisch die vasomotorischen Centren erregen und durch die gehäuften Reize allmählich deren Erregbarkeit steigern kann. Auch die bei der Raynaud'schen Krankheit beobachtete Verengung der Gefäße des Augenhintergrundes wurde bei der Malaria schon beobachtet und ist ein Grund mehr dafür, für das Entstehen der Symptome der beiden Krankheiten dort, wo sie zusammen vorkommen, eine gemeinsame Ursache anzunehmen.

Bei Haig finden wir einem anderen Stoffwechselprodukt eine ähnliche Rolle zugeschrieben, nämlich der Anhäufung von übermäßig viel Harnsäure im Blut (*Uricacidämie*). Haig glaubt seine Ansicht, durch die er auch die in seinem Fall beobachtete Hämoglobulinurie erklären zu können, auf die Erfolge seiner Therapie stützen zu können. Die Verallgemeinerung dieser Anschauung auf alle oder auch nur die Mehrzahl der Fälle ist unzulässig, im Einzelfall aber ist eine solche Autointoxikation als ursächliches Moment wohl denkbar und erscheint auch mir auf Grund eigener Erfahrungen plausibel. Gibert spricht mehr allgemein von einem Vasomotorengift als Ursache der Krankheit. Mir scheinen in diese Kategorie alle diejenigen Fälle zu gehören, wo im Verlauf einer Infektionskrankheit oder nach einer solchen die Raynaud'schen Erscheinungen auftreten; wir würden diese damit in eine Reihe mit manchen anderen postinfektösen Störungen des Nervensystems setzen. Auf ähnlicher Basis würde die Affektion in den Fällen entstehen, wo primär oder sekundär eine abnorme Blutbeschaffenheit (schwere primäre oder sekundäre Anämien nach erschöpfenden Krankheiten) vorhanden ist. Ihnen reihen sich die bei dem Diabetes und bei Albuminurie beobachteten Fälle an, soweit nicht die Albuminurie und Glykosurie nur als Symptome der Krankheit in Frage kommen.

Bei der großen Verbreitung, die die Lehre von der Auto-intoxikation gefunden hat, kann es nicht wundernehmen, daß sie

auch auf unser in vieler Beziehung noch so dunkles Gebiet übertragen werden ist. Die Drüsen mit innerer Sekretion werden auch hierzu in Anspruch genommen. Möbins hat in einer Besprechung der ersten Auflage dieses Werkes darauf hingewiesen. Salis-Cohen hat unter Hinweis auf die Beziehungen des Morbus Basedowii zu der vasomotorischen Ataxie ins speziellen eine Störung der Funktion der Thyreoidea angenommen (s. o.). Ganz ausdrücklich haben Léopold Lévi und de Rathschild auf eine Parafunktion der Thyreoidea (Hypo-Hyperthyroidismus) Bezug genommen. Voivenel et Fontain sprechen von einem *Hypothyroïdisme consécutif à une insuffisance ovarienne*.

Nach meiner Überzeugung scheitern, soweit es sich um detailliertere Angaben handelt, alle diese Dinge noch völlig in der Luft; von dem Nachweis einer einheitlichen Autointoxikation kann noch die Rede sein, aber es ist gewiß nicht zu bezweifeln, daß eine Reihe von exogenen oder endogenen toxischen Stoffen eine besondere Affinität zu dem in der Pathogenese des Raynaud eine wichtige Rolle spielenden nervösen Centren haben und unter Mitwirkung einer angeborenen oder erworbenen Labilität dieser Centren für die Entstehung der Krankheit von Bedeutung sind. Dabei kann das gegenwärtige Verhältnis dieser Labilität oder Instabilität und der Intoxikation ein sehr verschieden abgestuftes sein. Auf die Rolle dieser Toxine haben auch Dufour, Colonne, Savronal, Ingelrans et Dubiquet hingewiesen. Daß die modernen Bestrebungen, an die Stelle des rein descriptiven Begriffs der angeborenen oder erworbenen Labilität des Vasomotorensystems scharfer definierte Beziehungen, wie Sympathikotonie und Vagatonie zu setzen, durchaus Beachtung verdienen, habe ich schon betont, ebenso auch meiner Überzeugung Ausdruck gegeben, daß diesen Bestrebungen zur Zeit noch allzuwenig Tatsachenmaterial zur Verfügung steht.

Wir sahen, daß unter den die vasomotorischen Centren reflektorisch beeinflussenden Momenten die thermischen eine große Rolle spielen. Dementsprechend ist auch ihre Wirkung bei der Raynaudschen Krankheit eine erhebliche, und insbesondere gilt das von der Kälte: in einer Anzahl von Beobachtungen trite jedesmal ein Kältereiz einen Anfall aus, in anderen entstanden sie wenigstens zu Anfang nur bei solchen Gelegenheiten; mit geringen Ausnahmen ist der Winter die Leidenszeit für derartige Kranke.

Nicht minder lebhaft ist unter normalen wie unter pathologischen Verhältnissen der Einfluß von Vorgängen in den höheren subcorticalen und corticalen Centren auf die Vasomotoren, und so verstehen wir die große Rolle, die Affekte usw. für den Ablauf der Raynaudschen Krankheit spielen.

Als reflektorisch wirksam haben wir zum Teil auch diejenigen Affektionen aufgeführt, die in der Peripherie lokalisiert, so oft als die

eigentliche Ursache der Krankheit angeschlossen werden. Hierher sind zunächst die durch die allgemeine Arteriosklerose bedingten peripheren Veränderungen zu rechnen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen aber die Fälle, in denen sich eine Endarteriitis oder eine Neuritis peripherica fand. Bezüglich der Neuritis liegt die Sache insofern einfach, als in den wenigen Fällen von echter Raynandscher Erkrankung, in denen sie gefunden wurde (Dehio), sie als wahrscheinlich sekundär und durch die Gangrän bedingt aufgefaßt werden muß. In einigen anderen Fällen muß man annehmen, daß durch die Erkrankung sensibler Fasern ebenfalls ein reflektorischer Reiz auf das Vasomotorenzentrum ausgeübt wurde (vielleicht in den Fällen von Kornfeld und Affleck). Etwas anders liegt die Sache mit der Endarteriitis. Daß durch eine solche Gangrän bedingt werden kann, liegt ja auf der Hand, wir haben aber bereits gesehen, warum in unseren Fällen die Endarteriitis nicht als Ursache der Gangrän angeschlossen werden kann. Aber die Gefäßveränderung kann sehr wohl unterstützend und modifizierend in den Krankheitsverlauf eingreifen; einmal könnte auch sie durch Vermittlung der die Gefäßwand innervierenden sensiblen Fasern reflektorisch reizend auf das Vasomotorenzentrum wirken, aber vor allen Dingen wird durch sie ja zweifellos die Ernährung der Gewebe beeinträchtigt.

Die Einzelheiten dieses Verhältnisses wurden von mir schon früher besprochen.

Gelegentlich einmal können für die Gangrän, die ja ein äußerst komplexer Vorgang ist, besondere, vom gewöhnlichen Modus abweichende Bedingungen vorliegen.

Es gibt 2, 3 Fälle von Raynandscher Krankheit, wo bis zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur Asphyxieanfälle vorhanden waren. Dann aber trat eine andere pathologische Affektion ein, ein Diabetes in dem einen Fall, eine schwere kryptogenetische Pyämie in dem anderen (Goldstand), und beim nächsten Anfall endigte die Asphyxie lokal mit Gangrän. Gandel's ist geneigt, solchen akzidentellen Momenten (infektiösen oder toxischen Faktoren) stets eine bestimmende Rolle für deren Entstehung zuzuschreiben. Wäre das immer der Fall, gäbe es nur solche Beobachtungen, so genügte in der Tat die Auffassung der Raynandschen Krankheit als einer vasomotorischen Neurose; da aber eben auch Beobachtungen vorkommen, in denen es uns ganz unmöglich ist, sonstige Bedingungen für das Eintreten von Gangrän zu finden, müssen wir die Erklärung der Raynandschen Krankheit für diese wie auch die erstgenannten Fälle weiter lassen und von einer vasomotorisch-trophischen Neurose sprechen. Welcher Art im speziellen die Innervationsstörung sein muß, um mit oder ohne die genannten Hilfsmomente zur Gangrän oder auch zu einer anderen trophischen Störung zu führen, darüber wissen wir nichts, ja haben wir nicht einmal eine Vermutung. Nur soviel können wir sagen, daß auch hier die Erfahrung, die wir als

eine allgemeingültige These gelernt haben, sich bestätigt: nicht sowohl der Mangel an Innervation, als die pathologische Modifizierung derselben bedingen krankhafte Störungen der Ernährung.

Kreibich hat experimentell bei seiner angioneurotischen Entzündung, die einzelnen Phänomenen des Raynaud sehr nahe steht, die reflektorische Entstehung nachzuweisen gesucht und ist sogar zu dem Resultat gekommen, daß eine andere als eine reflektorische Entstehung nicht möglich ist. Das muß dahingestellt bleiben, aber die große Wirksamkeit peripherer und psychischer Reize geht auch aus seinen Versuchen zur Evidenz hervor.

Gegenüber dem Vorherrschenden irritativ-vasodilatatorischer Phänomene bei der Erythromelalgie nehmen beim Raynaud die irritativ-konstriktorischen die erste Stelle ein. Phlepos ist geneigt dazu mehr den Ausdruck einer schwereren Erkrankung als den einer anderen Erkrankungsform zu sehen. Im allgemeinen scheinen in der Tat in der Raynaudschen Erkrankung die trophischen Störungen im stärksten Maße entwickelt zu sein, für die vasomotorischen und besonders für die sensiblen Phänomene gilt das aber doch nicht; es ist mir demnach kaum zweifelhaft, daß wir mit der Annahme eines rein quantitativen Unterschiedes nicht auskommen. Sowohl die ursprüngliche kongenitale oder erworbene Diathese wie der auslösende Reiz dürften auch qualitativ von dem bei der Erythromelalgie wirkenden verschieden sein.

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, wodurch es kommt, daß gerade die Akra der Sitz der Raynaudschen Erscheinungen sind. Hier wie bei der Akroparästhesie und der Erythromelalgie spielen dieselben lokalen Eigentümlichkeiten ihre Rolle. Die Tatsache, daß gerade in diesen peripheren Bezirken die Gefäße vermöge ihres Baues und der äußeren Einwirkungen einem besonders lebhaften Wechsel ihrer Weite schon normalerweise unterworfen sind, die Tatsache ferner, daß in diesen Gebieten infolge der weiten Entfernung vom Centrum, infolge des Vorkommens von Endarterien die Ernährung am schwierigsten ist und bei irgendwelchen Störungen zuerst leiden muß, erklärt das übrigens ja nicht ausnahmslos Befallenwerden der Akra.

Aus unseren bisherigen Ausführungen geht hervor, daß wir in der Mehrzahl der Fälle der Raynaudschen Krankheit die Bedeutung einer selbständigen Affektion zuerkennen müssen. Es soll nicht gelugnet werden, daß die Raynaudschen Symptome gelegentlich nur einen Teil der Symptomatologie einer anderen Krankheit bilden. Es handelt sich da meistens um Erkrankungen des Nervensystems centraler oder peripherer Genese. Aber die Zahl dieser Fälle ist, wie wir schon wiederholt betont haben,

im ganzen keine sehr große. Wir fanden solche Symptome bei einigen Fällen von Rückenmarkstumor, bei der Syringomyelie, vielleicht auch bei einzelnen Neuritiden; und auch bei einer Anzahl von Neurosen und Psychosen treten die Raynaudschen Erscheinungen so weit zurück, daß wir ihnen nur noch symptomatischen Wert beimessen können. In den Fällen der ersten Kategorie, bei den organischen Krankheiten also, wird aber meist der weitere Verlauf uns über den symptomatischen Charakter der beobachteten Phänomene Aufschluß geben; denn meist werden in solchen Fällen allmählich doch an die Stelle intermittierender Reizerscheinungen dauernde Lähmungserscheinungen treten, den Schmerzen wird die Anästhesie, dem Wechsel der vasomotorischen Erscheinungen wird die dauernde Cyanose folgen, und andere hinzutretende Symptome werden das Krankheitsbild nach weiter dem der Raynaudschen Krankheit unähnlich machen. Es kann ja auch eine Interkostalneuralgie lange Zeit das einzige Symptom eines Rückenmarkstumors sein und sich in diesem Zeitraum in nichts von einer typischen Neuralgie unterscheiden. Auch hier gilt erst der weitere Verlauf die genügende Aufklärung. Die Beobachtung dieses Verlaufes ist eben notwendig, wenn man die Diagnose „Raynaudsche Krankheit“ stellen will. Auch bei gewissen Gefäßerkrankungen können Raynaudsche Symptome auftreten; daß hier oft eine falsche Diagnose gestellt wurde, haben wir erwähnt, und werden wir noch zu besprechen haben.

Hutchinson hat vorgeschlagen, in diesen Fällen nur von „Raynaudschen Symptomen“ zu sprechen, und Monroe ist ihm darin gefolgt, indem er eine Kategorie aufstellt, die er als „Raynauds phenomena“ bezeichnet, und die nach ihm vorkommen:

- a) Due to a morbid blood-state,
- b) Due to concussion or other lesion of the central nervous system,
- c) Due to inflammation or other lesion of nerves.

Es muß auch zugegeben werden, daß eine Entscheidung, ob der eigentliche Morbus Raynaud oder nur Raynaudsche Symptome vorliegen, nicht immer leicht, nicht einmal immer möglich ist. So kann ein vorübergehendes Auftreten von Asphyxieanfällen bei einem an Malaria leidenden Kranken oft nur symptomatischen Wert haben, während in anderen Fällen die stärkere Betonung des vasomotorischen Symptome im Krankheitsbild oder auch das stärkere in den Hintergrundtreten der eigentlichen Malaria-symptome die Annahme einer eigenen Krankheit vorziehen läßt. Wir können ja auch sonst in der Neuropathologie mit der rein ätiologischen Auffassung und Klassifizierung der Symptome nicht aus, und können z. B. eine Neuralgie nicht scharf von allen übrigen Neuralgien abtrennen und als rein symptomatisch

tische auffassen, wenn wir in der Anamnese des Kranken auch Malaria erwähnt finden. Besonders oft wird bei der Kombination von Neuriten und vasomotorisch-trophischen Symptomen die Entscheidung schwanken oder eine etwas willkürliche sein müssen. In seltenen Fällen wird man noch eine dritte Möglichkeit erwägen müssen, die nämlich, ob die beiden beobachteten Symptomenkomplexe nicht der Ausdruck einer für beide gemeinsamen Ursache sind; so wenn wir z. B. typhisch vasomotorische Anfälle mit einer Psychose abwechseln sehen. Es geht doch aus den verschiedensten Gründen nicht an, in solchen Fällen im Intervallum laedum der Psychose die fortbestehenden vasomotorischen Symptome einfach als solche der Psychose zu betrachten, sondern sie und die psychotischen Symptome sind dann offenbar auf einem Boden erwachsen, Folgen einer gemeinsamen Ursache.

Aber auf Grund einer umfangreichen eigenen Erfahrung und unter Berücksichtigung der vorliegenden Literatur halte ich entgegen den immer wieder auftauchenden Versuchen einer Reihe von Autoren unbedingt daran fest: es gibt eine durchaus selbständige Raynaudsche Krankheit.

Es ist aber zu erwägen, ob damit auch schon sichergestellt ist, daß diese Krankheit immer ganz die gleichen ursächlichen und örtlichen Grundlagen hat.

Wir sahen, daß sie von folgenden Bedingungen abhängt: Bestimmte Teile des Nervensystems (vasomotorisch-trophische Centren und Bahnen) und in erster Linie die vasokonstriktorischen, die das sympathische System im engeren Sinne zusammensetzen, sind in einen Zustand erhöhter Reizbarkeit versetzt, und zwar kann diese bedingt sein durch eine kongenitale abnorme Anlage, die in sonstiger nervöser Heredität oft angekündigt erscheint. Sie kann erworben sein durch lang anhaltende und wiederholt schädigende Einflüsse, wie häufige Kälteeinwirkungen, rheumatische Erkrankungen, durch somatische oder psychische Traumen. Die erhöhte Reizbarkeit kann ferner ohne vorhandene Anlage und besonders bei solcher direkt hervorgerufen werden durch Intoxikationen und Infektionen und reflektorisch durch Erkrankung peripherer Organe, meist der Gefäße und seltener der Nerven. Es ergeben sich daraus eine Anzahl von Untergruppen der Krankheit. Damit ist aber die Einheitlichkeit des Krankheitsbildes nicht in Frage gestellt. Die hier von mir versuchte Einteilung abweicht einer von Moiré angenommenen.

Es ist schließlich noch wichtig, festzustellen, daß die Raynaudschen Symptome bisweilen nur einen Teil der bei dem Kranken beobachteten Symptome darstellen.

während noch andere Krankheitszeichen, und zwar solche ähnlicher Art und Gattung vorhanden sind; dann sind diese Raynaudschen Symptome nur ein Teil der Erscheinungen einer noch allgemeineren Neurose, die ihrerseits ebenfalls im wesentlichen vasomotorisch-trophisch-sensible Symptome vom intermittierendem Charakter enthält. Die Übergänge nach dieser Richtung hin sind fließende, indem die spezifischen und besonders charakteristischen Symptome der Raynaudschen Krankheit, in erster Linie die Gangrän allmählich immer mehr zurücktreten, die allgemeinen Erscheinungen der nervösen Reizbarkeit und Erschöpfung mit vorzüglicher Betonung der auf dem Gebiet der Vasomotilität beziehungsweise der vegetativen Funktionen überhaupt sich abspielenden Krankheitszeichen in den Vordergrund rücken. Andererseits sind die engsten Beziehungen zu den verwandten Neurosen der Akroparästhesien, der Erythromelalgie, der Sklerodermie, des akuten angioneurotischen Ödems und der multiplen neurotischen Hautgangrän vorhanden. Diese Beziehungen sind keine äußerlichen, sondern im Wesen dieser Affektionen begründet, wie aus ihren pathologischen Bedingungen hervorgeht.

Diagnose, Differentialdiagnose.

Es ist unter Raynaudscher Krankheit eine auf einer anatomisch noch nicht erforschten Affektion bestimmter Teile des Centralnervensystems beruhende Krankheit zu verstehen, deren klinische Hauptmerkmale sind: unter mehr oder minder lebhaften, nicht an bestimmte Nervengebiete gebundenen Schmerzen erscheinen an den Akra des Körpers, selten an anderen Stellen, meist symmetrisch, anfallsweise Zeichen einer gestörten Innervation der Vasomotoren in Form von Synkope, Asphyxie oder Babor localis, deren nach einiger Zeit, bisweilen auch sehr rasch und an einzelnen Stellen auch ohne vorausgehende vasomotorische Erscheinungen, schwere trophische Störungen, meist in der Form der Gangrän, an eben denselben Stellen folgen. Der Verlauf ist stets ein intermittierender, bisweilen sind die Intervalle ganz frei, andere Male bestehen dauernd geringe Zeichen gestörter Vasomotilität. Die Krankheit erschöpft sich in einem Anfall, oder es können mehrere Anfälle hintereinander auftreten. Bestimmte ausgesprochene objektive Sensibilitätsstörungen fehlen meist, ebenso wie Lähmungen, dagegen kommen eine Reihe anderer wahrscheinlich durch vasomotorische Innervationsstörung bedingter Symptome gelegentlich vor (Aphasie, Hämoglobinurie, Arthropathien usw.). Die Krankheit betrifft

meist neuropathische Individuen; die in einzelnen Fällen beobachteten Zeichen von Gefäßveränderungen, ebenso wie von Veränderungen im Nervensystem haben meist keine direkte ursächliche Bedeutung, doch ist hervorzuheben, daß wir nicht berechtigt sind, bei ihrem Vorhandensein in Fällen, die sonst die klassischen Züge der Krankheit zeigen, allein deswegen schon die Diagnose Raynaudsche Krankheit fallen zu lassen; ebenso wenig berechtigt uns dazu das Vorkommen einer Infektionskrankheit, das Vorhandensein von Melliturie und Albuminurie; immer vorausgesetzt, daß sonst die Diagnose im klinischen Verhalten begründet ist.

Es scheint mir, daß, wenn man sich an diese Definition hält, das Krankheitsbild eine feste Gestalt annimmt, und nicht allzusehr andersartigen Affektionen gegenüber abzugrenzen ist. Aber es gibt hier, wie auch sonst so oft in der Neuropathologie, eine große Reihe abweichender oder wenig ausgeprägter Formen (*formes frustes*), in denen die Diagnose viel an Sicherheit einbüßt. Wir können in den Fällen, in denen nur das Phänomen des Totenfingers besteht, überhaupt nicht von einer selbständigen Krankheit sprechen; das haben wir schon begründet. Aber wir müssen, auch ohne ausgeprägte trophische Störungen, speziell ohne Gangrän, die Diagnose Raynaudsche Krankheit stellen; wir können anderenfalls zu ganz unhaltbaren Zuständen. Jahrelang können wir vasomotorische Erscheinungen vor; das wäre dann nicht Raynaudsche Krankheit; aber dann tritt einmal die Gangrän auf, ohne daß sonst das Krankheitsbild sich ändert; und nun muß es sich doch die ganze Zeit über um Raynaudsche Krankheit gehandelt haben. Eine gewisse Willkür liegt für manche Fälle in diesem Verfahren, aber sie ist nicht zu vermeiden, wenn wir auf diesem Gebiete nicht in ein großes Chaos geraten wollen. Andere Schwierigkeiten macht das Moment des paroxysmalen Auftretens. Dies Symptom ist für die Diagnose höchst wichtig. „Eine so absolute Regel scheint auf den ersten Blick in ihrer Anwendung sehr einfach. Aber wenn wir einen Kranken treffen, der an seinem zweiten Anfall leidet, während der erste vor mehreren Jahren dagewesen war, und wenn die einzelnen Stadien nicht deutlich markiert sind, da geraten wir doch in Bedrängnis.“ (Mouro.) Solche Möglichkeiten sind nicht theoretisch konstruiert, sondern treten uns oft genug in der Praxis entgegen. Man wird, fehlt das eine der charakteristischen Zeichen der Krankheit, nach den anderen um so eifriger suchen und auf ihren Nachweis um so größeren Wert legen müssen.

Sehr schwierig kann die Unterscheidung von anderen vasomotorisch-trophischen Neurosen sein. Es gibt auch bei der Raynaudschen Krankheit zu den „benachbarten“ Affektionen der (Notlageloken) Akroparästhesies, der Erythromelalgie und der Sklerodermie so zahlreiche und so allmähliche Übergänge, daß eine genaue Ab-

grenzung in einzelnen Fällen große, ja unüberwindliche Schwierigkeiten machen kann.

Ich gehe daher zuerst auf die Differentialdiagnose gegenüber diesen Affektionen ein.

Von der Schultzeschen Form der Akroparästhesien ohne vasomotorische Erscheinungen unterscheidet sich unsere Affektion eben durch das Vorhandensein vasomotorischer Symptome; bei der Nathwagelschen Form der Akroparästhesien finden sich die letzteren, allerdings meist unter dem Bilde der Synkope locale. Wir haben aber schon in früheren Auseinandersetzungen gesehen, wie wenig Wert auf die spezielle Form der vasomotorischen Störung zu legen ist, da deren verschiedene Modalitäten in klassischen Formen von Raynaud neben- und nacheinander in regelloser Reihe vorkommen. Die Abgrenzung dieser Form der Akroparästhesien plus Akroerythope vom Raynaud wird daher nicht nur schwierig, sondern nicht selten unmöglich sein, wenn man den Tatsachen nicht Gewalt antun will. Im Kapitel Akroparästhesien ist bereits ein derartiger Mittelfall beschrieben; hier soll ein zweiter folgen:

W. 35-jähriger Arbeiter. Klagt über zufälliges Absterben der Finger, teilweise auch der Zehen, das sogar im warmen Zimmer und im Sommer vorkommt. Neben dem Kriebeln kommt es zuerst zu einem lebhaften Bläue der Teile, gefolgt von einer Blässe, die sich in eine Bläue über. Beim Bücken Schwindel; ist intolerant gegen Alkohol, leicht erregt, wird dann häufig rot im Gesicht. Einmal bei Blasen übermüdet. Kopfschmerzen von Kneifen an. Tubera frontalia stark entwickelt, leicht hydrocephalischer Schädelbau. Herz in jeder Beziehung normal, auch keine Tachykardie. Sehnenphänomene an Armen und Beinen von normaler Stärke. Die Hände und die untersten Abschnitte beider Unterarme etwas cyanotisch, fühlen sich aber nicht kühl an. Keine motorischen, keine sensiblen, keine trophischen Störungen. Zehen nicht verkrüppelt.

Das Vorkommen seltener Anfälle von Asphyxie locale veranlaßt uns, den Fall der Raynaudschen Krankheit zuzurechnen. Dies Verhalten kann aber doch nicht genügen, um ihn scharf von den Zuständen abzugrenzen, in denen es immer bei der Synkope locale bleibt. Fälle von diesem Typus stellen durchaus keine Seltenheiten dar. Wir sehen daher, wenn wir Akroparästhesien und Raynaudsche Krankheit zusammen betrachten, wie eine kontinuierliche Kette von der rein sensiblen Neurose zur vasomotorisch-sensiblen Neurose und von da zur vasomotorisch-trophisch-sensiblen Neurose sich knüpft. Scharfe Abgrenzungen gibt es nicht, man wird nicht immer eine sichere Diagnose stellen können. Es könnte vielleicht richtiger erscheinen, die reinen Parästhesien als eine Gruppe, die vasomotorisch-sensible Neurose (Nathwagelsche Parästhesien, Raynaudsche Formen ohne trophische Störungen) als zweite Gruppe zu betrachten und in eine dritte die Fälle mit Gangrän zu nehmen; auch diese Scheidung ist

aber eine durchaus künstliche, weil man es dem Einzelfall nie ansehen kann, ob im weiteren Verlauf nicht noch Gangrän eintritt.

Es gibt auch Übergangsfälle zwischen Erythromelalgie und Raynaudscher Krankheit. Freilich haben die beiden Affektionen oft genug etwas Gegensätzliches. Castellino und Cardi haben in folgender Tabelle beide Affektionen einander gegenübergestellt:

Erythromelalgie und Raynaudsche Krankheit

(in der ersten Periode)

haben gemeinsam:

Ausgang günstig.

Symmetrie.

Lokalisation an den Akten.

sind voneinander in folgenden Punkten:

| | |
|---|---|
| Rötlichkeit. | Schwärzlichkeit. |
| Anfallsweise Schmerzen. | Anfallsweise Anästhesie. |
| Sensibilität erhalten, aber gesteigert. | Sensibilität vermindert oder geschwunden. |
| Reflexe normal oder gesteigert. | Reflexe vermindert oder geschwunden. |
| Geringe trophische Störungen. | Mehr weniger erhebliche trophische Störungen. |
| Erhöhung der Temperatur; Wärmeempfindung. | Erniedrigung der Temperatur; Kälteempfindung. |
| Motilität normal. | Paros (?). |
| Beim Erheben Verschwinden der Räte. | Beim Erheben kein Verschwinden der Symptome. |

Wir haben aber schon im Kapitel Erythromelalgie Fälle angeführt, bei denen das Symptomenbild dieser anscheinend so gegensätzlichen Affektionen so wenig sicher ausgeprägt war, daß man diagnostisch zweifeln mußte; ja wir haben uns auf Beobachtungen beziehen können, die uns lehrten, daß gelegentlich an ein und demselben Individuum Krankheits Symptome solcher Art sich zeigen, daß eine bestimmte Diagnose, ob Raynaudsche Krankheit oder Erythromelalgie vorliegt, völlig unmöglich erscheint; es stehen bald mehr die Symptome der Raynaudschen Krankheit (Rolleston, Moll), bald mehr die von Erythromelalgie (Elsner u. a.) im Vordergrund, aber daneben sind charakteristische Symptome jedes der beiden Krankheitsbilder vorhanden. Wir machten bei Besprechung der Symptomatologie bereits darauf aufmerksam, daß bei der Erythromelalgie nicht gar selten die Symptome der Synkope locale als reaktive oder primäre Erscheinung sich finden, ebenso stellen sich bei Raynaudscher Krankheit häufig als Reaktion nach der Synkope oder der Asphyxie locale die Erscheinungen der aktiven Hyperämie ein, verbunden mit heftigen ausstrahlenden Schmerzen; und uns begegnet hier noch die jedenfalls sehr ähnliche regionale Räte als selbständige Erscheinung. Daß trophische Störungen bei der Erythromelalgie nicht selten vorkommen, wurde genügend hervorgehoben, daß aber auch eine Gangrän ganz vom Typus der Ray-

anderer Krankheit eintreten kann, lehrt Elsner's schon mitgeteilter Fall; immerhin ist das offenbar recht selten. Mit der Angabe, daß die Symptome bei Raynaud'scher Krankheit meist die Hände, bei Erythromelalgie meist die Füße betreffen, ist nicht viel anzufangen, die Ausnahmen von dieser Regel sind zu häufig. Auch die ungünstige Einwirkung der Wärme bei Erythromelalgie, der Kälte bei Raynaud'scher Krankheit ließ sich nicht immer konstatieren; die in bezug auf Sensibilität und Reflexe oben angeführten Differenzen sind noch viel weniger entscheidend, nicht mehr hilft uns die Angabe Morras, daß bei der Erythromelalgie häufiger die Männer betroffen werden. Benoit hat in seiner Thèse über Erythromelalgie die Beziehungen zwischen ihr und der Raynaud'schen Krankheit besonders hervorgehoben. In zehn Fällen, sagt er, fanden sich bei der Erythromelalgie gangränöse Veränderungen, in 23 Fällen ausgesprochene Asphyxie locale, in den Fällen von Rolleston, Eulenburg, Weber, Case, Schütz, Gordon wirkte die Kälte ungünstig, in elf Fällen waren subjektive Empfindungen oder Verfärbungen vorhanden, wie sie mehr der Raynaud'schen Asphyxie zukommen, und in 15 Fällen nimmt der Autor geradezu eine Assoziation der beiden Symptomengruppen an. Es ist also kein Zweifel, daß die beiden „gegensätzlichen“ Krankheitsbilder oft genug recht erhebliche Ähnlichkeiten aufweisen. Eulenburg besprach im oestereologischen Jahresbericht (herausgegeben von Mendel) auch die beiden Krankheitsbilder zusammen, „weil die enge Beziehung zwischen ihnen bei steigender Zahl der Beobachtungen immer unverkennbarer hervortritt.“

Ausgeprägte Züge von Erythromelalgie zeigt z. B. folgende eigene Beobachtung:

85jährige Frau. Bis vor einem Jahr gesund. Darnach begann das Leiden mit Schmerzen im ganzen rechten Bein, besonders im rechten Fuß. Zum Schmerz kam allmählich Rote und Hitze. Die Kranke hatte das Gefühl, als ob sie mit dem Beinen, besonders dem rechten in Brennstoffe stünde. Daneben kam es andermal auch zu Kälte und Absterben des rechten Fußes. Aus kaltem Beis waren alle Erscheinungen, besonders die Schmerzen weniger ausgeprägt. Die Schmerzen waren stets brennend. Hitze steigerte die Beschwerden nicht, ebenso wenig Stichen. Die Arme blieben stets gesund. Bei der sonst keine Veränderung beobachtet hat, sind die Füße teils heiß, teils blau erythematösch gefärbt; namentlich an den Fußrändern, während die Planta und die Mitte des Dorsum eine mehr normale Farbe haben. Die Verfärbung erstreckt sich in einzelnen Fällen bis in die Mitte der Unterschenkel. Die Haut ist vielfach verkrüppelt, verkrüppelt, wie Pergamentpapier, ihre Temperatur ändert sich ungleichmäßig, im Bereich der Cyanose mal ist 28,5°, an einem dinsten liegenden roten Fleck 33° C. Die Störungen sind rechts stärker als links. Die Fußarterien pulsieren nicht. Die Stellung ist ohne Einfluß, der Wechsel zwischen Cyanose und Rötter scheint spontan eintreten. Vorübergehend kommt es auch zu Synkope locale. Im Gebiet der vasomotorischen Störungen besteht Hypalgäsie: keine akuten Schmerzen.

Die Erythromelalgie und die der Atroph. calc. propria ent-

sprechenden Veränderungen stehen hier im Vordergrund, die Raynaud'schen Phänomene treten zurück, sind aber deutlich ausgeprägt. Diesem Verhältnis entsprechend bezeichnen wir das Krankheitsbild als Erythromelalgie.

Ungeskolet liegt der folgende interessante Fall, den Lustig mitgeteilt hat.

55jährige Frau. Von jeher nervös, antriebslos, mit einem äußerst kalten Vasomotorenapparat ausgestattet. Nach starken Gemütsaffekten traten wiederholt äußerst heftige in die Beine ausstrahlende Schmerzen, begleitet von diffuser Rötung und Schwellung auf. Nach dem Tode eines erwachsenen Sohnes Steigerung der allgemeinen Nervosität und Auftreten lokaler Ischämie an Fingern, Ohren, Nase, Wangen, Zehen, mit vor sich Parästhesien, Kältegefühl, Abnahme der Turgor der Gewebe vorgezeichneten. Wiederholte neue psychische Traumen (ein Vergewaltigungsvorwurf) und der Eintritt des Klimakteriums wirkten weiter ungünstig. Demal nach einem Sturz Auftreten einer generalisierten Urticaria; nach einem dazwischen verstrichenen Schmerzbefall stellten sich multiple Blütungen in die Quaddeln ein und gleichzeitig damit Asphyxie locale an den früher von Synkope betroffenen Stellen, dabei waren enorme Schmerzen vorhanden. Morphium und Chloral in großen Dosen verschafften keine Ruhe. Allmählich rekrutierte ein großer Teil der asphyktischen Stellen, zum größten Teil auf dem Wege des trockenen Brandes. Die Gangrän war vielfach (Wange, Nasenspitze, Ohrenschale, Zehen, linker Zeigefinger) nur ganz oberflächlich, führte aber an den Händen zur Amputation der dritten und des größten Teils der zweiten Phalanx am fünften Finger der rechten Hand, und zur Nekrose der zwei letzten Phalangen des dritten bis fünften Fingers der linken Hand. Nekrotische Stellen etablierten sich auch noch an der Haut der großen und kleinen Labien und an symmetrischen Stellen der Vaginalschleimhaut. Es besteht außerdem leichte Arteriosklerose (Blutdruck 120 mm, Hypertrophie cordis, Polyurie und geringe Albuminurie).

Die selteneren Lokalisationen, die große Ausdehnung der Strömungen, die deutliche Abhängigkeit von psychischen Insulten, die ausgesprochen allgemeine vasomotorische Diathese (Urticaria, fluxionäre verhornte Hyperämien) zeichnen den Fall aus und, was uns hier besonders interessiert, das Vorkommen von Symptomen der Erythromelalgie, die früher offenbar im Vordergrund standen, jetzt nur noch in abgeschwächtem Maße sich einstellen.

Der enge Zusammenhang und die sich daraus ergebenden diagnostischen Schwierigkeiten können nicht klarer zutage treten als in diesem Fall, der sich den früheren im Kapitel der Erythromelalgie genannten anschließt (S. 256). Auch ein Fall Zingerles gehört hierher, bei dem Hitze, Rötungen, Hyperhidrosis und Schwellung neben Synkope und Asphyxie locale zur Beobachtung kamen.

Auch der folgende Fall Raynaud'scher Krankheit weist einzelne Züge von Erythromelalgie auf. Er ist auch in mancher anderen Beziehung noch bemerkenswert.

Es handelt sich um einen 45jährigen Mann, den ich im November 1910 zum erstenmal sah. Er stammt aus jener der Familie, aus der die Mutter und die Schwester des Pat. an Kopfschmerzen. Er selbst hat früher viel an Kopfschmerzen gelitten

die aber nie einen Mergereitypus hatte. Im Jahre 1900 ist er vollkommen gesund und hat keinerlei Kuren in Karlsbad gebraucht. Dann war er gesund bis in den Frühling des Jahres 1901. Es war nur bemerkenswert, daß er schon immer eine besondere Empfindlichkeit gegen Kälte hatte, leichtes Absterben der Finger bekam, wenn er sich kalt gewaschen hatte, gelegentlich auch ein taubes Gefühl in den Händen hatte. In fließendem Wasser konnte er schon seit der Kindheit nicht baden, weil es alsdann zum Auftreten roter, juckender, erhabener Flecke am ganzen Körper kam. Seit Beginn des Jahres 1900 hat er Schwindelanfälle. Diese kommen ganz plötzlich, er muß sich hinsetzen, es kommt dabei öfters auch zu einem Einsinken, der Anfall hat häufig mit Aushusten auf. Nach diesen Schwindelanfällen hatte der Kranke das Bedürfnis zum Schlaf. Sie leiteten sich gelegentlich mit Parästhesien ein, und zwar traten diese Parästhesien in der ganzen linken Gesichtshälfte, im linken Auge, der linken Nase, der linken Zungenhälfte, der linken Backe, dann kommt gelegentlich auch eine Schwere und ein taubes Gefühl im rechten Arm, manchmal auch im rechten Bein. Die Sprache ist bei diesen Anfällen nicht erschwert, nachher hat er nur ein, aber keineswegs immer Kopfschmerzen, kein Erbrechen. Eine objektive Unterscheidbarkeit soll in diesen Anfällen nicht vorhanden sein. Seit dem Frühling leidet er noch an Anfällen, die solange selten, jetzt häufig, sechs- bis siebenmal täglich auftreten. Sie bestehen in außerordentlich heftigen, nach der Schilderung geradezu unerträglichen Schmerzen, im zweiten und vierten, selten auch im zweiten Finger der linken Hand. Die Fingermittelfinger schwellen an, werden rot bis rötlich, dieser Zustand dauert 15–20 Minuten, ja in letzter Zeit drei bis vier Stunden, sie sind dann außerordentlich empfindlich gegen das Aufstecken, es ist gleichgültig, ob die Finger nach oben oder nach unten gehalten werden. Einmalige Wärme in dem Pat. zugebracht, wenn sie auch die Anfälle nicht zum Verschwinden bringt, dagegen ist Kälte stets sehr unangenehm. Der Anfall endet mit einem sehr starken Schwellen der betreffenden Finger. Der Schmerz ist schneidend, brennend, pulierend. Häufig kommt es zur Rötung von Armen, streckmuskelpfeifigen, weißen Bläschen und zu einer Abschuppung von ganz kleinen weißen Blättchen. Pat. meint, daß je intensiver die Anfälle sind, um so mehr diese Bläschen und Schuppelabblätterung in der Vorherrschaft tritt. Allmählich ist eine geringe Verblähung der Finger, wenigstens des zweiten bis vierten Fingers eingetreten, die ein wenig höher liegt als die anderen Finger. Zu einer eigentlichen Gangränabblätterung ist es nie gekommen.

Ich habe den Pat. einige Male während seiner Anfälle beobachtet. Der Schwindel setzt sich so ein, daß er plötzlich wie Schwanken fühlt, als ob der Stuhl, auf dem er sitzt, schwankt und als ob der Boden sich bewegt, dann bekommt er ein Hinneigen vor dem linken Auge, er kann nichts genau sehen, die Buchstaben tanzen, es ist ihm so, als ob raubentartig gelbe Kugeln vor dem linken Auge aufsteigen, dann kommt es zu den Parästhesien in der linken Gesichtshälfte, die er in außerordentlich charakteristischer Weise während des Anfalles schildert; während allerdings von Parästhesien am rechten Arm und rechten Bein während dieser Anfälle nicht die Rede ist. Der Augenhintergrund ist während eines solchen Anfalles normal. Gleichzeitig mit diesem Schwindelanfall kommt es ihm oft zu einem Anfall in dem zweiten, dritten und vierten Finger der linken Hand. Die Finger werden rötlich, erythematös, nicht heiß, es treten sehr heftige Schmerzen ein, die fünfte und vierte linke Finger sind erheblich wärmer als der zweite und dritte und schließlich wärmer als die rechte Hand. Nach ein paar Minuten tritt ein heftiges Schwellenbereich ein und damit endet der Anfall. Es ist bei dem Pat. Versuche versucht worden, nach Aufenthalt in Hohegebirge und kohlensaure Bäder hatten keinen Erfolg. Im weiteren Verlauf der Erkrankung wurden auch die äußeren Finger mit betroffen, wenn auch nicht mit derselben Heftigkeit. Inzwischen trat auch in den anderen Fingern beider Hände allmählich eine erythematöse Verblähung auf. Erst Pyrexien leiteten den

Pat. Besserung. Er mußte das Mittel aber zunächst in Dosen von 0,5 mehrmals täglich nehmen. Ich habe den Pat. ein Jahr später wieder gesehen. Er hatte damals Pyramiden genommen, aber jetzt nur noch in Dosen von 0,15 pro die, das macht ihn für den ganzen Tag schmerzfrei. Ohnmächten und Schwindelanfälle hat er nicht mehr gehabt und hat sich im ganzen viel wohler gefühlt. Stöhnen hat er nicht vertagen, danach bekam er Schmerzen im Magen, ein Versuch mit Laktophenin schlug ganz fehl, danach gab es eine starke Verstopfung. Er bekam heftige Schmerzen und am demselben Tage eine Ohnmacht, danach Erbrechen und einige tagelang wässrige schleimige Stühle. Seine jetzigen Beschwerden sind: er fühlt in der Mitte des linken Unterarms einen pulsierenden Schmerz, der in die mittleren Finger hineingeht, ein Brennen, Kribbeln und Stechen, die Fingerspitzen schwellen an, erscheinen kalt, blau, der Nagel ist intensiv blau gefärbt, beim Hineinstechen in kaltes Wasser wird er weiß, einmal hat er im Anschluß an eine Massage auch Auftreten von Nestsch an den markierten Partien gemerkt. Seit einigen Wochen sind geringe Spuren von Eiweiß im Urin nachweisbar. Er hat auch die mikroskopische Untersuchung einiger hyaliner Cylindri ergeben. Das Herz ist bei der heutigen wie bei den früheren Untersuchungen ebenso wie der Blutdruck vollkommen normal. Eine Erhöhung der vasomotorischen Erregbarkeit besteht nicht. Die Untersuchung des gesamten Nervensystems hat keine weiteren Abweichungen von der Norm ergeben.

Der Fall ist, wie man sieht, durch eine Reihe von Momenten ausgezeichnet. Er gehört ja zweifellos zur Raynaud'schen Krankheit, aber die vasomotorischen, ebenso wie die sekretorischen Erscheinungen, verrät auch die stark betonte Einseitigkeit der Beschwerden, auch die Art der Schmerzen, lassen an Erythromelalgie denken. In den früheren Stadien haben Synkopenanfälle jedenfalls ganz gefehlt, in letzter Zeit sind sie allerdings aufgetreten. Daneben ist das Vorkommen der Urticaria, die seit der Kindheit auf Kältereiz entsteht, bemerkenswert, und ferner sind bemerkenswert die Schwindelanfälle, die mit den eigentümlichen, oben näher geschilderten Parästhesien einhergehen, sie erinnern ganz an das Bild der bei der Migräne auftretenden Parästhesien und sind gewiß als pathogenetisch identisch mit den die Anfälle bei der Migräne begleitenden aufzufassen. Man wird nicht fehlgehen, wenn man ihre Grundlage in Vasokonstriktionen, die demgemäß in diesem Falle weit verbreitet sein müssen, sucht. Bemerkenswert ist auch die außerordentliche Wirkung des Pyramidons auf der einen Seite, die schädigenden Einflüsse, die andere Antineuralgica, wie das Lactophenin auf der anderen Seite gehabt haben. Wieweit das Auftreten einer geringfügigen Albuminurie, die jedenfalls vorläufig noch ohne irgendwelche cardialen Symptome einhergeht, zum Bilde der Krankheit gehört, läßt sich vorläufig nicht entscheiden.

Unsere Auffassung der Pathogenese der beiden Affektionen sucht der nahen Verwandtschaft der beiden Krankheitsbilder gerecht zu werden; immerhin werden wir verpflichtet sein, in allen nach einer oder der anderen Richtung ausgesprochenen Fällen eine bestimmte Diagnose zu stellen, und nur dort, wo beide Affektionen charakteristische Symptome für das Krankheitsbild liefern, von einer speziellen Diagnose abzusehen. Jedenfalls liegt kein Grund vor, aus diesen

Mittelformen, die wir an früherer Stelle in eine kontinuierliche Reihe gebracht haben, etwa eine neue Neurose zu konstruieren, dies um so weniger, als, wie wir sehen werden, mit den geschilderten Varietäten die Zahl der wirklich vorkommenden Unterformen noch nicht erschöpft ist. Im nächsten Kapitel werden wir uns mit einigen Beobachtungen bekannt machen, die obwohl zweifellos der Erhythromelgie und der Raynaudschen Krankheit sehr verwandt, doch so viele Abweichungen von beiden zeigen, daß man sie nicht ohne weiteres in eine der beiden Krankheitsbilder einreihen kann. Nicht geringere Schwierigkeiten macht auch die Abgrenzung der Raynaudschen Krankheit von der Sklerodermie; darüber soll später gelegentlich der ausführlicheren Besprechung der Sklerodermie selbst die Rede sein.

Bei den organischen Nervenkrankheiten kommt in Betracht, daß in ihrem Verlauf einige Male Raynaudsche Symptome beobachtet wurden, die nicht den Wert eines eigenen Krankheitsbildes beanspruchen können. Wir wiesen schon darauf hin, daß im Verlauf meist das beste Kriterium dafür gegeben ist, daß es sich um Erscheinungen von symptomatischem Wert handelt.

Somit ist unter diesen Krankheiten besonders die Syringomyelie als die zu erwähnen, deren Abgrenzung von der Raynaudschen Krankheit Schwierigkeiten macht; und zwar sind es besonders die trophischen Störungen, die hier die Ähnlichkeit hervorrufen.

Aber diese entwickeln sich bei der Syringomyelie meist etwas langsamer als bei Raynaud, die Symmetrie fehlt öfter, die Ausdehnung der überhaupt nicht häufigen circumscribten Gangrän ist eine größere, vor allem aber fehlen die charakteristischen, intermittierenden vasomotorischen Symptome, und ebenso fehlen meist die Schmerzen. Dagegen tritt die Anästhesie viel deutlicher hervor und ebenso die degenerativ-atrophische Muskellähmung. Die beiden letzten Erscheinungen wurden allerdings im Weißschen Fall gefunden, nur daß die Lähmung ohne Erb einklang, aber sie waren vorübergehend und es trat, was bei der Syringomyelie nie vorkommt, eine völlige Restitutio ad integrum ein. Beide Krankheitsbilder können noch nicht einander ähneln, wenn die Syringomyelie den Morvanschen Typus annimmt. Castellino und Cardi haben auch für diese beiden Affektionen die Hauptmerkmale zusammengestellt:

Morvansche Krankheit.

Beginn schleichend.
Verlauf sehr langsam, 10–15 Jahre.
Im Anfang selten Störungen an allen vier Extremitäten, Beginn meist an einer.
Innen muskelschwache, meist schmerzlos Parästhesien.

Raynaudsche Krankheit.

Beginn plötzlich.
Rascher Verlauf, 1–2 Monate.
Symmetrisches Auftreten mit geringen Unterschieden.
Trockene Gangrän.

Morvansche Krankheit.

Haut etwas cyanotisch und kalt.
 Diffusirte Empfindungsstörung.
 Muskelatrophie.
 Geschwulstbildung, Mal. perfor. numm.
 Abfall der Nägel, früherer Neubildung,
 Spaltung, undurchsichtig, dick, ge-
 krümmt.
 Nekrose und Abstoßung von Knochen.

Raynaudsche Krankheit.

Haut dunkelröthlich und kalt.
 Anästhesie.
 Muskelatrophie nur wenig angedeutet.
 Sehr selten Geschwulstbildung (?).
 Nagel schwarz.
 Knochenatrophie.

Das wären ja genug Unterscheidungsmerkmale, aber nur wenige sind wirklich brauchbar. Unter diesen steht an erster Stelle der Verlauf, der hier meist chronisch-exacerbierend-progressiv, dort akut-intermittirend ohne eigentliche Progression ist; außerdem sind es auch hier wieder die ausgesprochenen Zeichen gestörter Gefäßinnervation, die für Raynaudsche Krankheit sprechen. Es können bei der Raynaudschen Krankheit, wie wir sahen, auch Panaritien vorkommen, besonders in den mit Sklerodactylie kombinierten Fällen. Allerdings sind sie meist schmerzhaft; aber für lange Zeit können auch die Panaritien bei Morvan schmerzhaft sein. Castellino und Cardi selbst bringen einen Fall, in dem die Differentialdiagnose zwischen Raynaudscher und Morvanscher Krankheit äußerst schwierig ist.

24jährige Frau aus tuberkulöser Familie. Cautis tubercul. Vor vier Jahren an den Zehen nicht schmerzhaft Panaritien und Krackelgangrän. Seit einiger Zeit Husten, Anorexie. Finger seit langem, wenn sie der Kälte ausgesetzt sind, cyanotisch, geschwollen, kalt. Sehr häufige Eiterungen an den Fingern, todt an der Pulpa, müd um den Nagel herum, mit starken, subjektiven Beschwerden. Seit einiger Zeit Kriecheln, besonders am zweiten und dritten Finger. Seit 14 Tagen dann kalt und sehr schmerzhaft, zu gleicher Zeit an der Nagelgegend Abhebung der Haut, Blasenbildung, Entleerung von Eiter und Blut und Verschorfung. Darauf wurde die Haut der Finger cyanotisch, dann schwarz und kalt und völlig unempfindlich, nur Kältegefühl und Schmerzen bestehen noch etwas fort. Status praesens. Zarter Allgemeinzustand. Kypker. Herz, Gefäße bis auf Tachycardie normal. Leichtes Erregbarkeit der Urim. Haut des Gesichts besonders der Nase glänzend, weiß, ohne Runzeln, mit dem Knochen verwachsen. Haut an der verletzten Hand glatt, leuchtend weiß, dritte Phalanx des ersten und zweiten Fingers roth, der dritten Finger links (malig, schwarz, gangränös. Nagel ganz schwarz. Unempfindlichkeit der Haut an dieser Stelle. Zweite Phalanx mit heftiger Parästhesie, anaphytisches Ansehen, objektive Sensibilität intact. Beide kleinen Finger sehr klein, spitzköpfig. An den Fingern Haut ebenso pergamentartig wie an den Händen. Keine Pannulen während der Beobachtung. Sensit. Sensibilität und Motilität, ebenso wie das übrige Nervensystem völlig normal.

Castellino und Cardi meinen, daß die lange vorausgehenden Eiterungen zur Annahme eines anomalen Falles von Morvan führen müßten, wegen allerdings das Fehlen bestimmter Sensibilitäts- und Motilitätsstörungen wieder nicht zugunsten dieser Affektion spreche: Ihre Diagnose lautet schließlich: *Forma anomala di malattia di Morvan*.

(patterecchio nervoso di Quinquaud) sclerodartéria, maschera sclerodermatica, morbo di Raynaud.

Man wird in einem solchen Fall kaum zu einer bestimmten Diagnose kommen können, zumal da das Vorkommen von Panaritien bei Raynaud keine so große Ausnahme darstellt.

In dem Fall von Castellino und Cardì wird man die auch von den Autoren selbst gestellte Diagnose „Mervansche Krankheit“ wohl vorziehen und den Raynaudschen Symptomen keine Selbständigkeit zuschreiben dürfen. In einem von Joerdens mitgeteilten Fall schwankt die Diagnose zwischen Syringomyelie und Acroasphyxia chron. anaesthet. Ich komme auf ihn weiter unten noch zurück.

Eine Gruppe von Fällen, bei denen ein familiäres Auftreten schwerer trophischer, vasomotorischer und sensibler Störungen an den unteren Extremitäten zur Beobachtung kommt — die entsprechenden Publikationen stammen von Bramann, Bruns, Ohlfcker, Nekam, Stewart — ist von mir im Abschnitt Symptomatologie schon besprochen worden. Es scheint sich um progressive organische Veränderungen im untersten Rückenmarksabschnitt zu handeln; vieles erinnert an Raynaud, insbesondere das Vorneigen trophischer, das Zurücktreten anästhetischer und paralytischer Symptome. Eine völlige Aufklärung ist erst von einem Sektionsbefund zu erwarten.

Keine andere organische, centrale Nervenerkrankung weist auch nur entfernt so erhebliche Ähnlichkeiten mit der Raynaudschen Krankheit auf wie die Gliosis. Daß ein einzelnes von den die Raynaudschen Affektion konstituierenden Symptomen im Verlauf verschiedener oder fast aller Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten vorkommen kann, ist dabei unbedenklich zuzugestehen. Ganz gewöhnlich finden wir z. B. im Verlauf einer Hemiplegie auf der gelähmten Seite Störungen der Gefäßinnervation, Asphyxie der Finger und Zehen, wohl auch zusammen mit Parästhesien; und selbst, wenn gegenüber diesen Symptomen bei einem besonderen Sitz des Herdes die Symptome der Halbsseitenlähmung zurücktreten, genügt Beginn und Verlauf der Symptome doch immer, um eine sichere Unterscheidung zu ermöglichen.

Es wird wohl einmal eine Asphyxie locale oder die Erscheinung des Totenfingers oder selbst die einer Gangrän im Lauf einer organischen Nervenerkrankung vorkommen können, aber Entwicklung und Verlauf dieser Symptome werden doch meist bald eine richtige Auffassung gestatten.

Sehr selten kann auch umgekehrt einmal eine Erscheinung, die wir sonst als Ausdruck einer organischen Erkrankung des Centralnervensystems betrachten, nichts weiter als das Symptom der Raynaudschen Affektion sein. Auch hier wieder bietet uns der Weissche Fall ein Beispiel, in dem eine „ataktische“ Aphasia von 15–20 Minuten Dauer zweimal eintrat. Die damit einhergehende Blässe des Gesichts

und der Schleimhäute, der frequente gespannte Puls, der Krampf der Retinalarterien, alle diese gleichzeitig bestehenden Symptome lassen vermuten, daß in dem das motorische Sprachgebiet versorgenden Gefäßen ein passagerer Arterienkrampf vorgelegen hat.

Alle diese anscheinend so schweren aber doch ohne dauernde Schädigung vorübergehenden Symptome finden sich ja auch sonst gelegentlich ohne anatomische Schädigung des Centralnervensystems. Ich erinnere an die ähnlichen Erscheinungen bei der Hemiplegie, ferner an die rezidivierende Okulomotoriuslähmung, die überhaupt in mancher Beziehung interessante Vergleichspunkte mit der Raynandschen Krankheit liefert.

Ob in einigen anderen Fällen, in denen von vorübergehenden Hemiplegien die Rede ist, diese ebenfalls in ähnlicher Weise entstanden zu denken sind, läßt sich aus den betreffenden Krankengeschichten nicht sicher entnehmen. Denkbar ist das in Analogie mit der Aphasie schon; in solchen Fällen müßte das rasche Vorübergehen der Lähmung, ebenso wie an anderen Stellen sichtbar werdende Zeichen einer anfallsweise gestörten Innervation der Gefäße zur Stellung der Diagnose benutzt werden.

Daß aber schließlich doch unter bestimmten Umständen Schwierigkeiten der Unterscheidungen von Raynandscher Krankheit und organischer Nervenkrankheit sich ergeben können, beweist der folgende von mir beobachtete Fall.

Es handelt sich um einen 53jährigen Vergewerter, der viel mit Beute, mit Blattsilber und Blattsilber, aber nicht mit Giften zu tun hat. Er leidet seit ca. drei Monaten an heftigem Schmerz, der offenbar nicht luxationsartigen Charakter hat. Seit zwei Monaten liegt er über ein Absterben der Hände und Füße, die Finger und Zehen werden taub und reben aus wie tote Teile. Der Zustand dauert eine Viertelstunde, dann folgt eine cyanotische Verfärbung der Hände und Füße und endlich auch eine Wiederkehr zum Norm. Seit Jahren hat er regelmäßig solche Anfälle zu Wechsellagen gehabt, auch dormal sind die Anfälle zuerst wieder im November aufgetreten. Potus und Lues sind gelugnet, es liegt kein Anhaltspunkt für die Annahme einer Ergostervergiftung vor. Die Untersuchung ergibt: Beide Leilipalten eng, ebenso die Pupillen, die sehr träge aber doch deutlich auf Licht reagieren, die Augenbewegungen sind frei. Der linke Ventrikel ist nach links vergrößert, an allen Werten ist ein systolisches Geräusch vernehmbar. Der Patellarreflex ist rechts herabgesetzt, aber hier liegt ein also überdurchschnittlich vor, links normal. Keine Borsberg, kein Fußklonus, geringe Kyphoskoliose im oberen Brustteil. Die Hände sind im ganzen blaust gefärbt, doch ist die Färbung nicht sehr auffällig. An beiden Händen besteht eine deutliche Herabsetzung der Schmerz- und Berührungsempfindungen und auch der Empfindung für kalt und warm, namentlich im Unterarmgebiet, aber nicht auf diese beschränkt. Keine Ataxie in den Händen, im linken Handgelenk Hebräer Zuckungen, sonst keine Veränderungen der Motilität, auch elektrisch nichts Pathologisches. Die Arteriosklerose erstreckt sich an den Unterarmen bis zu deren Mitte hinauf. Die Arterien des Arms pulsieren deutlich, die Füße sind sehr kalt und auch etwas cyanotisch, die Sensibilität ist hier normal. Sichere Fingerschmerzen bestehen nicht, Fuß kann angeblich den Stein zufällig hege kalten, nichts mit gelegentlich etwas Infästionsvorkommen. Von einer Fraktur, die er vor sieben Jahren hatte,

kann man vermuten, daß es sich um eine spontankontrakte Paralyse, ohne doch darüber zur Klarheit zu kommen.

Es bestehen hier also typische vasomotorische Raynaudsche Symptome, daneben aber Symptome, die nur schwer in den Rahmen der Raynaudschen Krankheit einzuordnen sind. Erstmal die sehr fröhe Pupillenreaktion, dann die dauernden und ausgesprochenen objektiven Sensibilitätsstörungen und auch einige andere Symptome scheinen auf ein organisches Grundleiden zu deuten. Auf welches, ist nicht sicher. Am ehesten kommt wohl auch hier wieder die Gliosis spinalis in Betracht. Die über einige Monate fortgesetzte Beobachtung ergab keinen weiteren Aufschluß; mit Beginn der besseren Jahreszeit blieb der Kranke aus der Poliklinik fort.

In früheren Abschnitten sahen wir, daß wiederholt periphere Neuritiden als Ursache der Raynaudschen Krankheit angesehen wurden; wir haben bereits festgestellt, daß eine ausreichende Berechtigung dazu nie vorlag. Wir konnten aber noch weiter gehen und sagen, daß auch das gleichzeitige klinische Vorkommen von Neuritis und Raynaudscher Krankheit nur ganz ausnahmsweise festgestellt wurde. Nur ganz ausnahmsweise fand sich eine circumscribte Muskelatrophie (DeFrance), etwas häufiger eine mehr diffuse, das ganze erkrankte Glied betreffende (zwei Fälle von Englisch) oder eine individuelle Lähmung (Morgan). Aber selbst in diesen Fällen sind die gelieferten Angaben nicht ausreichend, um uns zur Diagnose Neuritis sicher zu autorisieren. Immerhin ist ja die Möglichkeit, daß doch einmal Neuritis plus Raynaudscher Krankheit koordiniert nebeneinander vorkommen, nicht von der Hand zu weisen; es muß dann aber zur Stellung der Diagnose hier wie immer ein typischer Ablauf der Symptome gefordert werden; auch hier genügt es wieder nicht, wenn man nur ein Raynaudsches Symptom vor sich hat; es geht z. B. nicht an, wenn in einem Falle von Neuritis gleichzeitig mit den anderen Symptomen (Lähmung und Anästhesie) sich Zeichen einer neurogen bedingten Gefäßlähmung einstellen (Cyanose und Kälte der Hand), und sich mit Schmerzen und Parästhesien, eventuell auch mit allmählich sich herausbildenden trophischen Störungen verbinden, von Raynaudscher Krankheit zu sprechen und daraus dann im Circulus vitiosus festzustellen, daß die Raynaudsche Affektion keine Krankheit sui generis ist.

Am meisten Ähnlichkeit scheinen noch diejenigen vasomotorischen Reiz- und Lähmungserscheinungen mit den Raynaudschen Phänomenen zu haben, die bei gewissen Formen der Polyneuritiden, besonders bei Beri-Beri vorkommen. Einen Fall von symmetrischer Gangrän bei Beri-Beri hat z. B. Monro beschrieben. Bei einem 46 jährigen Mann, der früher schon an Beri-Beri gelitten hatte, fanden sich bei der Aufnahme Ödeme über den Unterschenkeln, Verlust der Tastempfindung, Hyperästhesie der Wadenmuskulatur, Föhlen der Knie-

reflexe. Die Spitzen der Zehen an beiden Füßen wurden gangränös, die Gangrän nahm rasch an Ausdehnung zu, es trat Fieber ein; beide Beine mußten am Ort der Wahl amputiert werden. Das ist, wie man sieht, wohl symmetrische Gangrän bei peripherer Neuritis, aber gewiß keine Raynaudsche Gangrän, ebenso wie auch die vasomotorisch-sensiblen Symptome bei Beri-Beri gelegentlich dem Bild der Erythromelalgie ähneln. Auch einzelne Fälle von Lepra zeigen derartige Symptome. Die Symptome der Neuritis können sich auffallweise wohl erheblich steigern, es kann die Lage des erkrankten Gliedes, die Außentemperatur von großem Einfluß sein, aber ein typisch paroxysmales Auftreten der Symptome fehlt doch. Daher wird die Unterscheidung dieser Krankheitsformen dort die meisten Schwierigkeiten machen, wo der paroxysmale Typus der Raynaudschen Symptome nicht mehr scharf ausgeprägt ist. Es kann dazu kommen, daß im weiteren Verlauf der Raynaudschen Krankheit sich schließlich, wie wir sahen, neuritische (und arteritische) Veränderungen ausbilden, wodurch die Ähnlichkeit noch weiter gesteigert wird.

Viel mehr Schwierigkeiten macht die diagnostische Abgrenzung der Affektion gegenüber den Neurosen. Wir sahen, daß die Krankheit am häufigsten auf neuropathischem Boden erwächst. Wir finden daher in der Mehrzahl der Fälle bei den von ihr befallenen Personen die Zeichen dieser allgemeinen Neuropathie. Die Frage steht hier, wie bei der Erythromelalgie, wie bei den Akroparästhesien, aber auch bei der Neuralgie, bei den Beschäftigungsneurosen usw. Wir haben uns bereits darüber ausgesprochen, daß das unzweifelhaft häufige Vorhandensein der allgemeinen Neuropathie uns nicht berechtigt, auch die speziellen vasomotorisch-trophisch-sensiblen Erscheinungen einfach als Symptome der allgemeinen Neurose einzustufen; wir müssen diesen vielmehr eine relative Selbstständigkeit bewahren und können nur konzedieren, daß die allgemeine neuropathische Diathese den Boden geschaffen hat, auf dem die besonders geartete Neurose erwuchs. Wir müssen daher in Fällen, wo die allgemeinen nervösen Symptome scharf genug charakterisiert sind und stärker hervortreten, neben der Diagnose Raynaudsche Krankheit noch die Diagnose der allgemeinen Neurose, Neurasthenie oder Hysterie stellen.

Doch kommt noch etwas anderes vor. Die Hysterie läßt es sich nicht nehmen, gerade so wie alle anderen nervösen Affektionen, so auch die Raynaudsche Krankheit uns vorzuspiegeln — einen Pseudo-Raynaud zu produzieren, wie sie eine Pseudomeningitis u. a. m. hervorbringt.

Lévy hat einen solchen Fall beschrieben, wir haben ihn oben bereits ausführlich mitgeteilt.

Es gibt nun noch eine Anzahl anderer hysterischer Symptome,

die in bestimmten Fällen eine Ähnlichkeit mit den Raynaudschen Symptomen erlangen können. Da ist zunächst das Oedème bleu, das Charcot zuerst beschrieb, zu nennen. Gilles de la Tourette gibt folgende Unterscheidungsmerkmale an: „La maladie de Raynaud présente avec l'œdème bleu certaines relations et quelques analogies, telles que la coloration des téguments, l'anesthésie, l'abaissement de la température. Mais le siège de l'asphyxie des extrémités est au niveau du nez, des oreilles et des doigts, et toujours symétriquement, ce que nous avons jamais rencontré dans l'œdème bleu des hystériques. De plus, la maladie de Raynaud procède d'une façon progressive et non subite toujours la même. Les phénomènes de syncope locale surviennent d'abord, puis l'asphyxie locale symétrique et enfin la mortification des parties.“

Wir sehen freilich, daß die Raynaudsche Krankheit nicht immer so streng den beschriebenen Gang innehält, und daß auch die Symmetrie fehlen kann. Aber der paroxysmale Verlauf wird im Verein mit den übrigen Symptomen die Diagnose doch leicht stellen lassen. Auch die hysterische Gangrän wird meist schwerer zu unterscheiden sein, da ihr die typische Lokalisation, ebenso wie das Vorgehen vasomotorischer Phänomene meist fehlt. Pisarszewski hat übrigens einen Fall von hysterischem Ödem und symmetrischer Gangrän der unteren Extremitäten bei demselben Individuum beschrieben, doch scheint mir die Diagnose „Raynaudsche Gangrän“ hier nicht sicher zu sein. Die ganze Frage der „hysterischen“ Gangrän und ihrer Beziehungen zur Raynaudschen Krankheit wird uns an späterer Stelle im Kapitel multiple neurotische Gangrän noch einmal ausführlich zu beschäftigen haben.

Die Schmerzen bei der Raynaudschen Krankheit sind oft neuralgiform. Von der Neuralgie läßt sich aber die ganze Affektion leicht scheiden, wenn wir an das Hervortreten der vasomotorischen Symptome, an das Fehlen von Druckpunkten, an die nicht an bestimmte Nervenbahnen gebundene Lokalisation der Schmerzen denken.

Diagnostische Schwierigkeiten kann ferner die Abgrenzung der Raynaudschen Krankheit von Herz- und Gefäßkrankheiten haben.

In Betracht kommen sowohl Zustände von Cyanose, wie von Gangrän. Von der kongenitalen Cyanose hat schon Raynaud selbst die Krankheit zu unterscheiden versucht, auch Grassi hat sich darum bemüht, u. a. m. Raynaud legt darauf Wert, daß bei kongenitaler Cyanose die Finger ein kolbenförmiges Aussehen haben, während sie bei Raynaud im Gegenteil verschmälert sind. Dazu kommt die Cyanose des übrigen Körpers, die Atembeschwerden. Grassi fügt dem das wichtige Merkmal hinzu, daß der Zustand der Cyanose

bei den Herzaffektionen ein dauernder ist; Hochenegg findet, daß in solchen Fällen die Asphyxie nicht so scharf begrenzt sei; das letztere Kriterium ist sicher nicht ganz durchschlagend, besser sind die beiden ersten. Nur wird man auch hier nicht vergessen, daß wie klinische und anatomische Erfahrungen zeigen, auch einmal bei einem an einer Herz- oder Gefäßkrankheit leidenden Menschen die Erscheinungen von Raynaudscher Krankheit eintreten können: nicht in jedem Fall genügt also das Vorhandensein von Atembeschwerden, von Ödemen, von Eiweiß im Urin, um Raynaudsche Krankheit auszuschließen, immer wieder muß die Diagnose auf die positiven Symptome der Affektion gestützt werden, auf die Intermissionen der vasomotorischen Symptome und auch auf die Schmerzen. Daß in manchen Fällen, wo ein Herzfehler vorhanden ist, die Diagnose sehr schwer sein kann, lehrt z. B. der bereits mitgeteilte Fall von Colson, in dem erst der Verlauf die Diagnose ermöglichte.

Bei den Fällen, wo im Laufe einer Herz- und Gefäßkrankung Gangrän eintritt, sind es hauptsächlich zwei Kriterien, die die Diagnose Raynaudsche Krankheit ermöglichen: die Art der vorausgehenden vasomotorischen Erscheinungen und die Art und Verteilung der Gangrän. Die Differentialdiagnose wäre bedeutend einfacher, wenn, wie das früher oft behauptet wurde, eine Veränderung der Gefäße bei Raynaudscher Krankheit nie beobachtet worden wäre; das stimmt ja aber nicht.

Was die verschiedenen vasculären Gangränformen im einzelnen betrifft, so handelt es sich beim Greisenbrand immer um ein allmähliches Fortschreiten der Gangrän, die fast stets die Füße betrifft, sich nur selten mit einer oder mehreren Zehen begnügt, während im Gegensatz dazu die Raynaudsche Gangrän, in Attacken auftretend, nur Teile einer Phalange oder höchstens eine Phalange in ihrer Totalität befallt, oft multipel und meist symmetrisch ist. Im allgemeinen bevorzugt die Raynaudsche Krankheit auch junge Leute, trotzdem Ausnahmen vorkommen; der Puls fehlt beim Greisenbrand sehr oft, bei Raynaud ist er höchstens vorübergehend — durch spasmodische Kontraktion der Gefäße — schwächer und wird unter solchen Umständen allerdings gelegentlich unfindbar; schwere Erkrankungen und Veränderungen der Gefäßwand lassen natürlich immer zuerst an Greisenbrand denken. Diesem fehlen meist wieder die für Raynaud charakteristischen vasomotorischen Erscheinungen. Monroe führt als Beweis dafür, daß die Raynaudsche und die senile Gangrän einander doch sehr ähnlich können, folgenden instructiven Fall Hutchinsons an. Dieser Autor erzählt von einem 80 jährigen Mann, dessen zehn Finger alle zum Teil gangränös wurden, während die Zehen viel weniger betroffen waren. Die Gangrän war überall eine trockene und begann bei warmem Wetter, während Patient sich sonst in gutem Ernährungszustand befand. Später wurden auch die Füße stärker betroffen, ein Teil einer

Zehe war schon vor zwei Jahren gangränös geworden. Hutchinson hält den Fall für eine senile Gangrän, obwohl bei dieser die oberen Extremitäten selten befallen werden und noch seltener eine ausgesprochene Symmetrie verleiht.

Die Bilder, die die durch Endarteriitis obliterans hervorgerufene Gangrän darbietet, können der Raynaud'schen Gangrän einigermaßen ähnlich sehen. Diese Gangränform, die zuerst von Billroth und v. Winiwarter genauer studiert wurde, und die später in Zoega v. Manteuffel und dessen Schüler Edgar Weiß Bearbeitet gefunden hat, ist besonders von Weiß und Dehio von der Raynaud'schen Gangrän abgegrenzt worden. Manteuffel entwirft von ihr folgendes Bild. Sie betrifft relativ junge Individuen, ohne Zeichen von Marasmus oder Senium; Lues, Diabetes usw. lassen sich nicht nachweisen, ebenso wenig Veränderungen am Herzen, dagegen haben die palpablen Arterien im allgemeinen die Zeichen einer bestehenden Arteriosklerose dar, doch ohne sehr auffällige Veränderungen. Die A. poplitea war in der Regel, die Aa. tibiales und dorsales pedis waren stets pulslos. Auch in den Femorales fanden sich einige Male Pulsanomalien. Fast alle Kranken haben schon längere Zeit an rheumatischen Schmerzen gelitten, die sich allmählich zu furchtbarer Hitze steigern. Kälte, Blässe, auch Cyanose und Rote der Füße gehen oft lange Zeit, Monate, selbst Jahre voraus. Dann erscheint ein Bläschen am Nagelfalz der Zehe, es wird bald bläulich, hämorrhagisch, die schwarze Verfärbung schreitet langsam fort; Absterben einzelner Zehen usw. tun dieser Progression oft keinen Eintrag. Weiß versucht im Gegensatz zu Billroth und Winiwarter, die eine Endarteriitis obliterans anzunehmen, die Gangrän durch die Annahme einer besonderen Art von Arteriosklerosis zu erklären, indem zunächst einmal eine Wandveränderung der proximalen Gefäße, insbesondere der A. poplitea eintritt, die zu allmählich fortschreitenden und sich bindegewebig organisierenden Thromben führt, dadurch werde die Gangrän bedingt.

Zu einer anderen Auffassung kam auf Grund umfangreicher pathologisch-anatomischer Untersuchungen Buerger. Er fand in seinen Fällen die Mehrzahl der größeren Venen und Arterien in einem großen Abschnitt ihres Verlaufes obliteriert. Dieser obliterierende Prozeß konnte in allen seinen Stadien verfolgt werden. Der Verschuß geschieht durch rote obdurierende Thromben, die sich organisieren, vaskularisieren und kanalisieren. Der Thrombus ist nicht eine Folge der Gangrän, er findet sich auch da, wo gar keine Gangrän vorhanden ist. Gewisse Prozesse im perivascularären Gewebe in der Adventitia, Media und Intima begleiten den Prozeß regelmäßig. Die Verdeckung der Intima ist mäßig stark und genügt niemals, um die Gangrän zu erklären. Die Media und Adventitia lassen Zellinfiltration und Vaskularisation erkennen. Die Intimitas dieser Prozesse scheint der Organisation des Thrombus parallel

zu sehen. Buerger vertritt auf Grund seiner Untersuchungen die Anschauung, daß die Bildung der Thromben in Arterien und Venen und zwar im Gegensatz zu Weiß der peripheren Arterien und Venen ein primärer Vorgang ist, dessen Ursache allerdings noch nicht genügend erkannt ist, daß dieselben Bedingungen, die die Thromben hervorrufen, in einer Reihe von Fällen, auch die Veränderungen in der Media, Adventitia und dem perivaskulären Gewebe veranlassen, während sie in anderen abhängig von den für die Organisation des Thrombus in Betracht kommenden Prozessen sind, daß schließlich jedenfalls die Intimaveränderungen keine erhebliche Rolle spielen. Er gibt dem Prozeß deshalb den Namen *Thromboangitis obliterans*. Der thrombotische Verschuß eines Gefäßes bewirkt nach seiner Anschauung in der Nachbarschaft Erweiterung der Capillaren, die äußerlich als starke Rötung sichtbar wird. Das ist für uns von Wichtigkeit, weil auf diese Weise vasomotorische, die Gangrän begleitende Erscheinungen erklärt werden.

Die vorausgehende kurze Schilderung gibt uns die Gesichtspunkte an die Hand, nach denen diese Gangränformen von der Raynaudsehen zu unterscheiden ist. Die Schmerzen gehen Wochen, Monate, ja Jahre dem Eintritt der Gangrän voraus, während dort, wo es bei Raynaud überhaupt zu Gangrän kommt, sich die Schmerzen mehr als deren Vorläufer einige Wochen lang zeigen. Dies von M. Weiß angegebene Unterscheidungsmerkmal ist freilich deswegen nicht immer zuverlässig, weil auch bei Raynaud gelegentlich einmal erst nach jahrelangem Bestehen sensibler Erscheinungen Gangrän einzutreten braucht. Dohio legt darauf Wert, daß eine so ausgesprochene, bis ins kleinste Detail auf beiden Seiten gleich lokalisierte, fast bis auf die Stunde gleichzeitige Erkrankung aller Finger bei arteriosklerotischer Gangrän doch nicht vorkomme, wenn auch eine gewisse Symmetrie möglich sei. Doch ist oft auch bei echter Raynaud'scher Krankheit die Symmetrie nicht eben sehr vollkommen, und es gibt ja hier sogar auch vereinzelte gänzlich asymmetrische Gangränfälle. Die Pulslosigkeit spricht im Zweifelsfall mehr für die arteriosklerotische Gangrän, aber sie ist kein absolut ausschlaggebendes Moment. Den sichersten Unterschied sehen wir zunächst in der Art der Gangrän, die bei Raynaud selbst da, wo sie ausnahmsweise einmal etwas ausgebreiteter ist wie sonst, doch immer sehr bald sich beschränkt und demarkiert, und nicht die fatale progressive Tendenz der arteriosklerotischen Gangrän zeigt, und zweitens in dem „eigentümlichen Spiel einer lokalen Synkope und Aphyxie“ (Dohio). Der arteriosklerotischen Gangrän gehen allerdings vasomotorische Erscheinungen auch voraus, Cyanose insbesondere, die von Kälteempfindungen begleitet ist, und die freilich auch wohl in ihrer Intensität schwanken kann und durch mannigfache Umstände (Lagerung des Beins, Einwirkung äußerer Kälte usw.) beeinflusst wird. Es können daher in diesem Stadium doch auch noch diagnostische Zweifel bestehen, besonde-

da ja auch bei Raynaud nur eine der beiden vasomotorischen Anomalien vorzuliegen braucht. Der weitere Verlauf wird dann aber durch Art, Ausbreitung und Progression der Gangrän doch meist jeden Zweifel heben.

Dieselben Unterscheidungsmerkmale können wir im großen und ganzen auch gegenüber den Gangrändarmen anwenden, bei denen eine Endarteriitis den Anlaß zu Gangrän gab, die sich auf bestimmte toxische oder infektiöse Schädlichkeiten zurückführen läßt. (Endarteriitis syphilitica, bei Erkrankungen der Nieren usw.). Wir brauchen hier, zumal nach dem schon an früherer Stelle Gesagten, nicht weiter ins einzelne zu gehen.

Es sind im ganzen sehr häufig Verwechslungen der Raynaud'schen Gangrän mit den angiopathischen Formen der Gangrän vorgekommen. Die Schwierigkeiten sind ja auch oft groß genug, wie z. B. in folgendem Fall von Hodenpyel: Ein 45-jähriger Mann bekam in voller Gesundheit eine Gangrän der einen großen Zehe, die amputiert wurde. Im Verlauf der nächsten 20 Jahre kamen immer wieder neue gangränöse Stellen an den Zehen und später an den Unterschenkeln vor, so daß im ganzen 20 Amputationen notwendig wurden. Im Januar 1890 wurde das Ende des einen Mittelfingers gangränös und mußte amputiert werden, im Februar 1891 erkrankte der Patient mit Erbrechen und Schmerzen im Leib und starb nach wenigen Tagen. Bei der Sektion fand sich, daß das Abdomen mit Blut gefüllt war, das aus der Aorta über der Teilungsstelle stammte, die multiplen Nekrosen wurden auf Thrombenbildung in der Aorta bezogen. Hier war der etappenweise Verlauf und die geringe Ausdehnung der Gangrän sehr bemerkenswert, vasomotorische Phänomene scheinen freilich nicht hervorgetreten zu sein.

Wie schon oben erwähnt, hat sich Buerger in einer Reihe von Arbeiten bemüht, das Krankheitsbild der endarteriitischen Gangrän klinisch und anatomisch sicheres zu fundieren. Er entwirft folgendes Bild. Meistens treten die Beschwerden zuerst als unbestimmte Schmerzen in der Sohle eines Fußes, im Sprunggelenk oder in den Zehen auf. Bald entwickeln sich Gefühlsstörungen, die durch plötzlich auftretende Krampfzustände in den Waden oder an anderen Stellen des Beines bedingt sind. Diese Empfindungen zwingen die Kranken zu häufigem Stehenbleiben und veranlassen sie ihre Gliedmaßen zu untersuchen. In der Kälte und bei schlechtem Wetter werden die Füße kalt und blau. Nach Verlauf von Wochen, Monaten, selbst Jahren treten die ersten trophischen Störungen ein. Im Anschluß an das Schneiden der Nägel oder ohne andere Ursache zeigt sich eine wundte Stelle oder Euthlasie oder es bildet sich ein trockener abgestorbener Hautschorf an der Spitze einer Zehe oder unter den Sohlen. Um diese Zeit beginnen die überaus heftigen Schmerzen bei Tag und bei Nacht, so daß die Kranken lebent-

lich die Amputation des erkrankten Beines verlangen. Zur Zeit der ersten trophischen Störungen kann man gewöhnlich ein anderes wichtiges Kennzeichen beobachten, eine eigenartige Rötung der Zehen und des Vorderfußes bei herabhängendem Beine, die manchmal sich bis zum und über das Sprunggelenk erstreckt. In einzelnen Fällen leidet das oberflächliche Geschwür unter konservativer Behandlung, der Kranke wird vollständig gesund und die Erscheinungen nehmen einen chronischen Charakter an. An den Arterien *dorsalis pedis* und *tibialis postica* ist gewöhnlich kein Puls zu fühlen. Ischämie bei Hochlagerung, die Rötung am herabhängenden Bein ist regelmäßig zu erzeugen. Früher oder später beginnt sich in dem zuerst erkrankten Gliede oder in dem anderen, das bisher keine Krankheitserscheinungen bot, ein trockener Brand an der Stelle des Geschwürs zu entwickeln und die Amputation des Teiles wird nötig. Die gefundenen anatomischen Veränderungen sind die folgenden: Die meisten der großen Arterien und manchmal die Venen sind auf eine weite Strecke verstopft. Alle Stadien des Verschlusses können in den verschiedenen Gefäßen der Gliedmaßen oder an verschiedenen Stellen desselben Gefäßes auftreten. Die Verstopfung des Gefäßes ist bedingt durch rote Thromben, diese werden organisiert, vascularisiert und kanalisiert. Frühe rote Thromben, die nicht als Folge des gangränösen Processes anzusehen sind, können große Strecken der Venen und Arterien erfüllen, zeigen sich auch dort, wo keine Gangrän vorhanden ist. Wir haben es also mit Veränderungen von beträchtlicher Ausdehnung zu tun, die oft genug eingeleitet werden durch die Bildung von verschiedenen Thromben, die in den Arterien sitzen, aber nicht auf diese beschränkt sind. Häufig besteht eine Thrombosierung der oberflächlichen Venen und völlig unabhängig von irgendeiner trophischen Störung, Gangrän oder Entzündung, die demnach deutlich ihren primären Ursprung zeigt.

Buergers betont ausdrücklich: „obgleich die Thromboangiitis obliterans der Erythromelgie und der Raynaud'schen Krankheit in einer Anzahl von Erscheinungen gleicht, so ist ihr klinisches Bild so ausgesprochen und gut gekennzeichnet, daß man sie als eine Krankheit für sich ansehen muß.“ Und namentlich gegenüber einer Äußerung von Sachs, der die Buergerschen Untersuchungen für seine Ansicht von der Identität der endarteriitischen Gangrän, der Erythromelgie, der Raynaud'schen Krankheit und der Akrocyanose in Anspruch nahm, weist er mit Nachdruck auf die Differenzen der beiden Krankheitsbilder hin. Die Rote und Cyanose, die man in der Haut in den Fällen von endarteriitischer Gangrän findet, ist nach ihm nichts weiter als ein Kompensationsversuch für die in diesen Fällen vorhandenen Verhinderungen der Circulation auf dem Wege der Erweiterung der oberflächlichen Capillaren. Es ist dies aber ein Phänomen, das sich auch bei der gewöhnlichen arteriosklerotischen oder diabetischen

Gangrän findet, obwohl es in diesen Fällen weniger deutlich ausgesprochen zu sein pflegt.

Das sind Anschauungen, die ich immer vertreten habe. Es ist die Überschätzung des Einzelsymptoms ohne Rücksicht auf die Gesamtheit der Symptome und ohne Rücksicht auf den Verlauf, die in vielen Fällen die falsche Diagnose stellen läßt; die auf diese Weise die Krankheitsbilder und die Krankheitsgrenzen verwischt und es verhindert, das schwierige hier vorliegende Problem scharf und in seiner Reinheit zu erfassen. Damit ist aber keineswegs gesagt, daß es nicht eine ganze Reihe von Fällen gibt, in denen die Differentialdiagnose große Schwierigkeiten macht, ja in denen sie namentlich, wenn wir nur einen Ausschnitt des Krankheitsverlaufs übersehen, unmöglich wird.

Nach meiner Auffassung kann in einem Fall wie dem folgenden eigener Beobachtung — er ist anscheinend auch von Gunkel in der freien Vereinigung der Chirurgen Berlins demonstriert worden — ein diagnostischer Zweifel nicht bestehen.

Sechsjähriger Wäschereibesitzer. Vor einem halben Jahr Beginn des Leidens mit vasomotorischen Störungen in dem Fingern der rechten Hand. Sympkope und Asphyxie locale, die unter sehr heftigen Schmerzen anfallsweise auftraten. Um Wundheilungen entwickelten sich unter stetiger Verschlimmerung die ersten trophischen Störungen am Nagel des rechten Zeigefingers, der entfernt wird. Dann begannen nekrotische Prozesse erst am Kleinen, später an den übrigen Fingern der rechten Hand, mit Auslassung des Daumens. Ätiologisch war von irgend einer Ursache nichts festzustellen; kein über, spitz, oder akutes. Keine Lues, keine Beschäftigung mit Giftes, auch keine akuten Kälte- oder Hitzewirkungen, trotz reines Berufs. Es macht mir die Angabe, daß er immer an einer gewissen Überempfindlichkeit der Fingernerven gelitten habe und daß Schweiß und Mitter häufig Parosmiten haben.

Die Endphalangen des dritten bis fünften Fingers und die Mittel- und Endphalangen des zweiten Fingers sind völlig nekrotisch, schwarz; auch an der Spitze des Daumens besteht eine wenig umfangreiche Nekrose. Der übrige Teil der Hand und Finger gerötet. Starker Juckreiz, starker Schmerz, der durch Herabhängelassen gelindert werden. Keine selbständigen motorischen oder sensiblen Störungen. Der Puls in der A. radialis dextra ist seit einem Vierteljahr nicht zu fühlen. Links ist alles normal.

Hier spricht die Asymmetrie, das dauernde Fehlen des Radialpulses, auch wohl schon die Ausdehnung der ganz gleichmäßig und progredient entwickelten Gangrän durchaus gegen Raynaud und für endarterielle Gangrän, obwohl jegliche Ätiologie fehlt. Patient noch sehr jung ist und vasomotorische Erscheinungen vorausgingen. In dem ersten Stadium des Leidens hätte man wohl an Raynaudi'sche Gangrän denken können.

Derartige Fälle sind von anderer Seite aber vielfach als Raynaud beschrieben worden. Damit erfährt das Krankheitsbild meines Erachtens eine unzulässige Erweiterung. Ich bin darauf schon bei der Erythromelalgie eingegangen, und will das dort Gesagte hier nicht

nochmals wiederholen. In einer neueren Publikation von Sachs sind z. B. eine Reihe von Fällen angeführt, deren Zurechnung zum Raynaud (oder zu Erythromelalgie) nur bei einem (Fall 4) sicher ist, während einige andere zweifellos endarterielle Gangrän sind (z. B. Fall 1, 2, 3). Der folgende Fall scheint mir erwähnenswert.

43-jähriger Mann, der viel gearbeitet hat, sich überanstrengen mußte und der Kälte viel ausgesetzt war. Vor acht Jahren stechende Schmerzen in beiden Händen, die nach Gehen und Stehen schärfer werden. Vor fünf Jahren Kälte und Cyanose der Zehen; damals wurde die linke zweite Zehe amputiert; vor drei Jahren Gangrän der rechten fünften Zehe, vier sechs Monaten stehende Schmerzen in beiden Händen, cyanotische Verfärbung aller Fingerspitzen, am dritten rechten Finger wird ein kleiner Teil gangränös, Sensibilität und Motilität normal. Radialpuls gut. Nach längerem Hochhalten Fingerspitzen weiß, erst nach längerer Zeit kehrt die alte Färbung wieder. Spitze der rechten fünften Zehe gangränös, Herabhängenlassen steigert den Schmerz nicht. Puls in der Art. dorsal. und tibial. post. beiderseits nicht zu fühlen. Besserung unter tonisierender Behandlung.

Diesen Fall bezeichnet Sachs als typischen Raynaud. Davon ist er nun sicher weit entfernt, ich halte ihn ebenfalls für eine endarterielle Gangrän: Fehlen der Fußpulse, jahrelanges Hinziehen der rekrutischen Erscheinungen, geringe vasomotorische Erscheinungen, Ätiologie. Man könnte nur zugeben, daß der augenblickliche Zustand der Hände an Raynaud denken lassen könnte. Ein ähnliches Bild bot ein von Carotem beschriebener Fall, dem ich allerdings die Zugehörigkeit zum Raynaud nicht ohne weiteres abstreiten möchte. Die Gangrän am Fuß war sehr ausgedehnt, reichte bis zum Knöchel, über das Verhalten der Pulse hier ist nichts gesagt; die vasomotorisch-sensiblen Erscheinungen an den Händen und dem linken Fuß waren in charakteristischer Weise ausgeprägt, einmal scheint auch ein Anfall von Hämoglobämie dagewesen zu sein. Es trat Exitus vor Amputation des rechten Fußes ein, keine Autopsie.

Auch die Symmetrie der Nekrosierungen ist keineswegs immer ein Beweis für die Annahme einer Raynaudschen Gangrän.

Raymond et Gougerot beschreiben folgenden bemerkenswerten Fall. Es handelt sich um einen jetzt 48-jährigen Arzt, dessen Leiden vor sieben Jahren begann, und zwar mit heftigen anhaltenden Schmerzen in der rechten großen Zehe. Die Epidermis verdickte sich, und ohne Vorausgehen vasomotorischer Symptome entstand nach drei Monaten an einem Rand der großen Zehe ein kleines Geschwür; die Intensität der Schmerzen machte eine Amputation der zweiten Phalanx nötig. Die Heilung erfolgte anstandslos. Ähnliche Anfälle wiederholten sich an der linken großen Zehe, an der rechten kleinen Zehe — der rechte Unterschenkel wird im Verlauf dieses Anfalls 10 cm unter dem Knie amputiert — am rechten Zeige- und am rechten Mittelfinger — im Verlauf dieses Anfalls verschwand der Puls in den beiden Radiales, um nach einiger Zeit links wiederzukehren — dann auch an verschiedenen

Fingern der linken Hand. In der Mehrzahl der Fälle vernarbten die Geschwüre allmählich spontan, die Schmerzen waren stets sehr heftig, dauerten monatelang hintereinander. Synkope und Asphyxie traten niemals ein. Dieser Umstand, wie das dauernde oder passagere Verschwinden des Pulses in einzelnen Arterien veranlassen die Autoren mit Recht, den Fall nicht der Raynaud'schen Gangrän zuzurechnen, sondern auf eine Endarteritis zurückzuführen, deren Ätiologie unklar ist. Loes wurde regiert, antiseptische Behandlung versagte auch im wesentlichen; irgendein anderes ätiologisches Moment war nicht zu eruieren. Ähnliche Fälle sind auch sonst noch vielfach beschrieben worden, in denen trotz ausgeprägter vasomotorischer Phänomene die Diagnose Raynaud mit Recht nicht gestellt wurde (Fuchs, Spiegler u. A.).

Große diagnostische Schwierigkeiten bereiten andere Fälle wie z. B. ein von Necker beschriebener, dem dieser die Bezeichnung eines Falls von Raynaud'schem Sympptomenkomplex gibt. Bei einem 12-jährigen Knaben hatten sich hier im Lauf der letzten acht Jahre multiple Nekrosen an Zehen und Fingern entwickelt. Dann kam später eine Knochentuberkulose umschriebenen Umfangs. Necker zweifelte, ob eine (auf dem Boden der Tuberkulose) entwickelte Endarteritis oder eine angeborene Lage des Gefäßsystems ursächlich zu beschuldigen ist. Letztere allein könnte nach unseren Anschauungen ja nicht wirksam sein.

Auch die Abgrenzung von der postinfektiösen und kachektischen Gangrän kann Schwierigkeiten machen. Dafür mag als Beispiel der folgende Fall von Seidemann dienen.

Bei einer 29-jährigen Frau, die im Anschluß an eine Entzündung eine doppelseitige Pyrexiose durchgemacht, traten zehn Tage nach der Entleerung Meute Hämorrhagien in der Haut der Hände auf, die wieder verschwand. Das Woche später plötzlich Schmerzen, Kältegefühl, Kriebeln in den Fingerspitzen beider Hände, darauf Uraemie, die allmählich alle Finger ergreift, Schwellung der Hände, enorme Schmerzen, Fieber. Später nach Uraemie an beiden Ohrläppchen und den Zehen. Zehn Tage nach dem ersten Aussetzen der Uraemie beginnt die Gangrän an den Fingern, nach sechs Wochen ist die Mutilation, die die Endphalangen aller Zehen und die End- und zum Teil auch Mittelphalangen aller Finger betraf, beendet; an den Zehen keine Gangrän. Synkope war nur vorübergehend beobachtet worden. Im Verlauf des nächsten Monats allmähliche spontane Abstoßung der nekrotischen Partien und Heilung.

Der Autor selbst weist in zutreffender Weise auf die Schwierigkeiten der Diagnose hin. Das Auftreten im Anschluß an die Infektionskrankheit, der Verlauf in einem Zuge ohne eigentliche Attacken geht zu Bedenken Anlaß, die Diagnose Raynaud zu stellen, auf die die exakte Symmetrie, das Vorhandensein der vasomotorischen Störungen hinweist. Leider fehlt jede Angabe über das Verhalten des Pulses. Man muß die Diagnose demgemäß wohl in *suspense*

lassen; ich möchte es aber doch für wahrscheinlicher halten, daß nicht Raynaudsche Krankheit vorliegt, sondern nur durch abnorme Gerinnbarkeit des Blutes hervorgerufene postinfektiöse Gangrän. Auch Mattivolo berichtet einen Fall von Bronchopneumonie mit im Beginn der Krankheit auftretender Gangrän der Zehen, wo die Frage ob Raynaudsche oder postinfektiöse Gangrän Schwierigkeiten machte.

In vielen anderen Fällen ist die Diagnose unter Berücksichtigung aller wichtigen Momente nicht zu verfehlen, aber in der Literatur findet sich eine ganze große Reihe von Fällen, in denen an Stelle der Diagnose der postinfektiösen oder der angiopathischen Gangrän die Diagnose Raynaudsche Krankheit zu Unrecht gestellt wurde; ich nenne nur die Fälle von Hochenegg (Fall II, Aschenborn, Bellamy, Brenques, Czarda, DeFrance, Beader, Riggs, Hausner, Rendall, Durando-Durante, Wetzel, Holst, Souques et Vincent, Cummins, Haley, Lightfoot, Thompson, Evers. In einer Anzahl weiterer Fälle genügen die vorliegenden Angaben nicht, um eine sichere Entscheidung über die Art der Gangrän zu treffen; teilweise mußte ich mich da allerdings mit Bedenken begnügen, während in den Originalen vielleicht genügende, die Diagnose Raynaudsche Gangrän stützende Angaben mitgeteilt sind.

Viel weniger Schwierigkeiten machen natürlich die Fälle, bei denen es, sei es im Laufe schwerer Infektionskrankheiten, oder auf dem Boden anderer Kachexien, zu einer durch Embolie oder Thrombose größerer Gefäßstämme bedingten Gangränenmasse kommt. Hier genügen die Ausdehnung der Gangrän, ihre Einseitigkeit, die Pulslosigkeit, der plötzliche Eintritt ohne vorausgehende vasomotorische Erscheinungen ohne weiteres zur Stellung einer richtigen Diagnose. Außer diesen klinischen Kennzeichen wird die Zeit des Auftretens der Affektion (bald zu Anfang der Infektion oder längere Zeit nachher, immer also bei noch oder schon wieder guter Herzthätigkeit und Ernährung) bei der Diagnose zu berücksichtigen sein. Auch eine Anzahl hierher gehöriger Gangränformen sind als Raynaudsche Krankheit beschrieben worden (Grubert, Zengerle, Farland.)

Das intermittierende Hinken, das, weil es der Endarteriitis-Gangrän nahe verwandt ist, hier seine Stelle findet, zeigt ebenso wie mit der Erythromelalgie auch mit der Raynaudschen Krankheit mannigfache Berührungspunkte, die schon Erb hervorgehoben hat: „Die symmetrische Gangrän hat ja zweifellos durch die bei ihr vorhandenen Parästhesien und Schmerzen, die ausgesprochenen vasomotorischen Störungen, das Auftreten von lokaler Hautgangrän an Fingern und Zehen, gelegentlich auch von Mutilationen an denselben eine gewisse Ähnlichkeit mit unserem Krankheitsbild.“

Die Unterscheidungsmerkmale findet Erb in den die Raynaudsche

Affektion auszeichnenden, schweren, allgemein neuroasthenischen Zuständen resp. Psychopathien, in der Lokalisation vornehmlich an den Händen, in der Beschränkung der Gangrän auf die oberflächlichsten Hautschichten. Der Verlauf sei ein anderer, zwar paroxysmisch aber nicht so intermittierend, und der Gebrauch der Glieder sei nicht von solchem Einfluß; es fehlten objektiv nachweisbare schwere Gefäßveränderungen (Arteriosklerose, Pulsoigkrit), während bei dem intermittierenden Hinken wieder die sensiblen und trophischen Störungen in den Hintergrund treten. Die Unterscheidung sei in der Regel nicht schwierig; „doch bedarf es jedenfalls weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob nicht durch die von Dehio nachgewiesene Endarteritis und Endophlebitis vielleicht doch eine nähere Beziehung zwischen beiden Krankheitsformen besteht.“ Gerade diese von Dehio — und auch von anderen — nachgewiesene Gefäßalteration macht in der Tat als die differentielle Diagnose zu einer recht schwierigen. Was uns als die Hauptunterscheidungsmerkmale aus Erbs' geschichtvoller Schilderung des intermittierenden Hinkens selbst hervorzugehen scheinen, ist das lange Vorangehen sensibler Erscheinungen — ganz wie bei der Gangraena ex „endarteriitis“ — und die Abhängigkeit der Störungen vom Gebrauch der Beine: „völliges oder fast völliges Wohlbefinden in der Ruhe, Beginn des Gehens in ganz normaler Weise, nach wechselnder Zeit dann Auftreten der Störungen, die schließlich das Gehen verhindern; Verschwinden derselben nach kurzer Ruhe usw. . . .“ das ist ein Bild, wie wir es bei Raynaudscher Krankheit nicht beobachten. Doch lesen wir bei Erb an anderer Stelle wieder, daß gelegentlich auch in der Ruhe, im Bett, noch mehr beim einfachen Herabhängenlassen der Füße diese oft blau und kalt werden, ausgesprochen cyanotisch sind, oder daß die Zehen absterben, blaß, weiß, kochenähnlich sind; gewiß ist hier die Ähnlichkeit mit Raynaudscher Krankheit frappant, und ohne genaue Kenntnis der Anamnese und des Verlaufs ist in solchen Fällen eine ganz sichere Entscheidung kaum möglich, zermal da nach Erb's Feststellungen auch beim intermittierenden Hinken gelegentlich einmal der sonst meist fehlende Puls in allen vier Fußarterien erhalten bleiben kann. Diese Ähnlichkeit des intermittierenden Hinkens resp. gewisser seiner Symptome mit den bei Raynaudscher Krankheit beobachteten Erscheinungen wird uns aber sehr gut verständlich, wenn wir die Erb'sche Auffassung der Genese des intermittierenden Hinkens vor Augen führen. „Neben den durch die anatomischen Veränderungen der Gefäßwandung bedingten dauernden Störungen sind es die wechselnden, durch vasomotorische Einflüsse auf die Gefäßwandung bedingten, die die intermittierenden Störungen verursachen: es sind nicht umsonst nervöse, neuroasthenische, hysterische Personen, die man unter diesen Kranken besonders trifft . . . ; jedenfalls sind solche vasomotorische Störungen eine anscheinend unerlässliche Bedingung für

das Zustandekommen des Symptomenkomplexes bei vorhandener Arteriosklerose." Es wird bei dieser Sachlage zu erwägen sein, ob nicht einige der als Raynandsche Krankheit bezeichneten Fälle, in denen Gefäßveränderungen vorliegen, mehr in die hier von Erb geschilderte Krankheitsgruppe hineingeheilen; hier stehen dann in der Tat die anastomischen Gefäßveränderungen in erster Reihe, und die intermittierenden vasomotorischen Reizerscheinungen werden durch Erregung der Gefäßverengerer hervorgerufen, eine Erregung, die ihre Ursache in äußerer Einwirkung von Kälte, von Hautreizen, von Gemütsbewegungen, Giften usw., zum Teil auch in den Gefäßveränderungen selbst haben kann. Wie gesagt, kann uns nur subtile Beobachtung der Anamnese und des Verlaufs eine Unterscheidung zwischen diesen beiden, bisweilen offenbar sich sehr nahe stehenden Affektionen ermöglichen.

Im letzten Dezennium wurde die Lehre vom intermittierenden Hinken durch die Arbeiten zahlreicher Autoren, ich zenne neben Erb nur die Arbeiten von Oppenheim, Goldflam, Higier, Determann weiter gefördert. Besonders wichtig ist für uns die von Oppenheim vertretene Anschauung, daß es eine gutartige Form des intermittierenden Hinkens gibt. Ich habe das im Kapitel der Erythromyalgie bereits erwähnt, muß aber hier noch einmal darauf zurückkommen. Die große Rolle, die vasomotorische Phänomene in der Symptomatologie des Leidens spielen, ist auch von Erb nicht übersehen und auch von mir in der ersten Auflage dieses Buches gewürdigt worden. Oppenheim zeigte zuerst, daß die neuropathische Diathese eine in der Mehrzahl der Fälle wiederkehrende Erscheinung bildet und lenkte zugleich die Aufmerksamkeit auf die benigne Form des Leidens, die er als vasomotorische Neurose deuten zu dürfen glaubte, indem er anzahm, daß bei intakter Gefäßwand durch einen Spasmus der Gefäßmuskeln der Symptomenkomplex hervorgerufen werden könne. Wenn wir uns erinnern, eine wie große Rolle vorübergehende vasoconstriktorische Phänomene in der Pathologie der Raynandschen Krankheit spielen, werden wir es ohne weiteres begreifen können, daß auf diesem Wege Ähnlichkeiten zwischen der Raynandschen Krankheit und dem intermittierenden Hinken entstehen müssen. Oppenheim hat in einer Arbeit aus dem Jahre 1911 das ihm zur Verfügung stehende Material für die Begründung seiner Lehre von der benignen Form des intermittierenden Hinkens ausführlich veröffentlicht und hat diese Lehre insbesondere gegenüber Goldflams Angriffen verteidigt. Er berichtet zum Beispiel folgenden Fall:

Ein 30jähriger Mann mit mäßigem Nikotingenuß hat im Alter von 20—25 Jahren an asthmatischen Zuständen gelitten. Seit zwei Jahren hat er öfters schmerzhaft Empfindungen in den Füßen beim Gehen. Anfangs waren die Beschwerden gering und unbeständig,

auch jetzt kommt es vor, daß er manche Stunden gehen kann, ohne Schmerzen zu verspüren, während sich zu anderen Zeiten schon nach 50 Schritten Schmerzen, Krampf und Taubheit in beiden Füßen und Unterschenkeln besonders aber im linken einstellen; das hängt viel von seiner allgemeinen Disposition und Stimmung ab. Bei der Untersuchung war der Puls auch in den Fußarterien nachweisbar, nur an der linken Arterie *dorsalis pedis* nicht sicher; beim Gehen im Zimmer tritt nach etwa 200 Schritten ein schmerzhaftes Ermüdungsgefühl ein, die Haut wird kühl und blaß, die Zehen etwas bläulich; der Puls blöht an den Arteriae tibiales posteriorae fühlbar, während er an beiden *Dorsales pedis* nicht wahrzunehmen ist, wird aber schon nach einer halben bis einer Minute im Stehen an der rechten Arterie wieder deutlich. Bei einer einige Jahre später erfolgenden Konsultation stellte sich heraus, daß das Fußleiden seit zwei Jahren geheilt war, die Pulsation war an allen Arterien deutlich. Eine jetzt angenommene Röntgenphotographie zeigte normale Verhältnisse. Oppenheim betont selbst, daß er nur über eine kleine Zahl derartiger Beobachtungen verfügt. Er stützt sich dann weiter auf die Fälle von Westphal und Curschmann. Die Beobachtung von Westphal ist oben schon von uns mitgeteilt worden, ebenso haben wir darauf hingewiesen, daß es sich in diesem Falle nicht um intermittierendes Hinken handelt. Oppenheim folgert aus diesem Falle auch nur, daß es spastische Gefäßzustände gibt, die bei intakter Gefäßwand auftreten und Beschwerden bzw. Folgezustände verursachen, die denen des intermittierenden Hinkens ähnlich sind. Curschmann hat in seiner Arbeit über atypische Formen und Komplikationen der arteriosklerotischen, angiospastischen Dysbasie einen Fall beschrieben, in welchem sich bei einer 32-jährigen anämischen, fast infantilen Frau anfallsweise Schmerzen in den Beinen einstellten, die dabei ganz weiß und gefühllos wurden; ähnliche Erscheinungen kamen auch in den Händen zur Beobachtung. Derselbe Zustand entwickelte sich in den Beinen beim Gehen; die Beine werden dann steif und schmerzhaft, so daß sich die Kranke setzen und eine Weile ausruhen muß; hier sind alle Pulse deutlich.

Auch auf diesem Gebiete gibt es nun Mischformen, bei denen der materielle Prozeß in den Gefäßwandungen gegenüber dem vasomotorischen, angiospastischen Moment in den Hintergrund tritt. Oppenheim nimmt auch an, daß die angiospastische Neurose zuweilen nur das Vorstadium für die echte Dystasia angiosclerotica bildet. Die Unterscheidung gerade der benignen Form des intermittierenden Hinkens von der Raynoldschen Krankheit muß gewiß Schwierigkeiten machen, wenn sich die Symptome über das für gewöhnlich bei der *Claudicatio intermittens* hauptsächlich in Frage kommende Gebiet der Muskelarterien hinaus erstrecken und das Gebiet der Hautarterien intensiv in Mitleidenschaft ziehen, wie das in den angegebenen Beispielen zum

Teil der Fall ist. Ich vermute, daß es sich dabei nicht etwa nur um reaktive Erscheinungen handelt, sondern in der Tat um eine Ausbreitung des irritativen Processes auf ausgedehntere Gefäßgebiete der oberflächlichen Teile. Als Unterscheidungsmerkmale kommen, wie das zum Teil auch Erb und Higier ausgeführt haben, die folgenden in Betracht. In der Regel schließen sich die Störungen beim intermittierenden Hinken an die Tätigkeit an, und zwar stellt sich dabei nicht nur die eigentliche Funktionsstörung ein, sondern es treten auch in der Haut die vasomotorischen Reizerscheinungen, Bläue, Cyanose, ev. auch reaktive Hyperämie auf; die Raynaudschen Symptome dagegen treten sehr häufig ganz spontan und paroxysmal auf. Ob diese Differenz ganz allein darin ihre Begründung hat, daß bei dem intermittierenden Hinken der Spasmus eben in erster Linie die größeren, zum Teil für die Muskulatur bestimmten Arterien betrifft, und dadurch intimer an die Bewegung gebunden ist, ist wohl nicht ganz sicher. Im allgemeinen sind ferner beim intermittierenden Hinken die Arme viel seltener betroffen, aber die Erfahrung hat doch gelehrt, daß es auch ein intermittierendes Hinken der Arme nicht gar so selten gibt. Eine ausgesprochene Symmetrie ist bei der Raynaudschen Krankheit häufiger als beim intermittierenden Hinken, aber diese Differenz ist nach keiner Richtung hin von entscheidendem Werte. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist und bleibt das dauernde Fehlen der Pulse und der enge Zusammenhang zwischen Ausübung der Funktion des Gehens und Auftretens der pathologischen Erscheinungen wie er das intermittierende Hinken im Gegensatz zur Raynaudschen Krankheit auszeichnet.

Neben den bekannten für die Entstehung des intermittierenden Hinkens bisher verantwortlich gemachten chronischen Vergiftungen, namentlich dem Nicotinismus, nimmt Oppenheim, nachdem er, wie schon erwähnt, früher auf das Bestehen der nervösen Diathese einen großen Wert gelegt hatte, daneben noch eine minderwertige Anlage des Gefäßsystems an. Mag diese nun in einer abnormen Lage der Gefäße oder in einer besonderen Zartheit und Muskelschwäche der Gefäßwandung bestehen, mag sie eine allgemeine oder lokalisierte sein, dieser Gesichtspunkt verdient auch für die Pathologie der Raynaudschen Krankheit alle Berücksichtigung. Tatsächliche Unterlagen sind dafür freilich bisher nur in sehr vereinzelten Fällen gefunden worden, fehlen aber doch auch in der Pathologie der Raynaudschen Erkrankung nicht ganz. In einem eigenen Falle von schwerer Raynaudscher Erkrankung, bei dem ich kürzlich die Sektion machen konnte, fiel jedenfalls die Kleinheit des gesamten Gefäßsystems auf. Eine ausführlichere Untersuchung des Falles soll erst noch erfolgen.

Die oben genannten diagnostischen Erwägungen reichen meiner Erfahrung nach meist durchaus aus, um die beiden Affektionen von-

einander zu unterscheiden. Ich habe unter meinen Fällen keinen einzigen gefunden, bei dem die Differentialdiagnose erheblichere Schwierigkeiten machte, will aber gewiß nicht in Abrede stellen, daß solche Fälle vorkommen. Die im wesentlichen dabei in Frage kommenden diagnostischen Bedenken können sich nach zwei Richtungen geltend machen. Die Abgrenzung der gutartigen Form des intermittierenden Hinkens und der typischen Raynaudschen Erkrankung kann besonders da Schwierigkeiten machen, wo die letztere an den Füßen lokalisiert ist. Es ist ja daran festzuhalten, daß ein vorübergehendes Kleinerwerden oder selbst ein Verschwinden der Pulse der größeren Arterien auch bei der Raynaudschen Krankheit kein unerhörtes Vorkommnis ist, so daß dieses Unterscheidungsmerkmal keinen absoluten Wert besitzt. Andererseits darf man vermuten, daß bei der benignen Form des intermittierenden Hinkens die Abhängigkeit der Störungen von der Funktion des Gehirns nicht immer so ausgesprochen sein wird, wie in den klassischen Fällen. Jedenfalls kann man sich hier Fälle vorstellen, in denen eine exakte Abgrenzung der beiden Formen unmöglich ist und unmöglich bleiben muß, weil in der Natur der beiden Affektionen weitgehende pathogenetische Übereinstimmungen vorhanden zu sein scheinen und nicht viel mehr als nur eine lokalisatorische Differenz in Frage kommt, indem die vasoconstrictorischen Prozesse bei der Raynaudschen Krankheit sich eben vielmehr auf die Peripherie beschränken, während sie beim intermittierenden Hinken die größeren Gefäße befallen.

Schwierigkeiten kann ferner die Abgrenzung der zusammen mit allgemeiner oder unerschriebener Arteriosklerose vorkommenden Raynaudschen Symptome vom intermittierenden Hinken machen. In diesen Fällen haben die Raynaudschen Erscheinungen, wie ich das früher ausführte, oft keine selbständige Bedeutung. So gibt es auch Fälle von intermittierendem Hinken und solchen begleitenden Raynaudschen Symptomen, wo die beiden Erscheinungen sich symptomatisch auf dem Boden der Arteriosklerose entwickeln. In diesem Sinne deute ich folgenden Fall von Sarkis: Es ist ein 55jähriger Mann, der in den letzten vier Jahren beim Gehen Schmerzen in der rechten Wade bekam. Vor einem Jahr traten dieselben Schmerzen auch im linken Bein auf. Jetzt kann er nur 15 Minuten gehen. Beide Füße sind blau, besonders der linke. Die Zehennägel sind blau, es sind keine Pulspulse zu palpieren, und auch in der Poplitea ist der Puls nicht zu fühlen. An den Fingern tritt zeitweilig Taubheit und Synkope mit heftigen Schmerzen ein; auch Schmerzen in den Zehen sind vorhanden. Es besteht eine allgemeine Arteriosklerose.

Der Autor selbst bezeichnet diesen Fall als typische Raynaudsche Krankheit, während wir eben annehmen, daß es sich um eine auf dem Boden der Arteriosklerose entstandene Form des intermittie-

renden Hinken handelt, bei der wie auch bei der endarteriellischen Gangrän symptomatische Raynandsche Krankheitserscheinungen das Leiden begleiten.

Eine Gangriforma gibt es noch, die große Ähnlichkeit mit der Raynandschen Gangrän hat; das ist die durch Ergotismus bedingte Gangrän; über erstreckt sich die Ähnlichkeit sogar auch auf die Vorläufer- und Begleitsymptome. Beim (akuten) Ergotismus kommt es bekanntlich zu einer eigenartigen Erkrankung, zu deren Hauptsymptomen sensible und vasmotorisch-trophische Störungen gehören. Zuerst treten, oft neben Magen-Darmerkrankungen, Parästhesien, in lästigem Kriebeln über dem ganzen Körper bestehend, auf; dann kommen in manchen Fällen Kontrakturen in verschiedenen Muskelgruppen, besonders in den Fingern und Zehen (Ergotismus convulsivus). Die Extremitäten werden kühl, bläß oder cyanotisch, und schließlich kommt es an den verschiedenen Stellen der Haut zu Ernährungsstörungen, Blasenbildung und Auftreten von trockener Gangrän, die meist Finger und Zehen befällt, aber auch Ober- und Unterschenkel usw. betreffen kann (Ergotismus gangraenosus). Diese den Angaben von Jacksch¹⁾ entnommene Schilderung läßt die Ähnlichkeit des Ergotismus gangraenosus mit der Raynandschen Krankheit deutlich hervortreten. Schon Raynaud hat auf sie aufmerksam gemacht. Das Hauptgewicht wird naturgemäß darauf gelegt werden müssen, ob anatomisch eine Ergotinintoxikation nachweisbar ist. Der Standpunkt von Ehlers, der gestützt auf diese klinischen Ähnlichkeiten, Raynaud immer auf Mutterkomvergiftung zurückführen will, ist völlig unhaltbar. Mangow hat mit Rücksicht auf die Ehlersschen Anschauungen in einem von ihm beobachteten Fall von Raynaud sorgfältige Nachforschungen nach etwaiger Ergotinvergiftung angestellt, er konnte nur feststellen, daß einmal gelegentlich einer Entbindung acht Jahre vor Beginn der Raynandschen Krankheit Ergotin in kleinen Dosen genommen worden war. In zahlreichen weiteren Fällen ist auch selbst davon nie die Rede gewesen. Es liegt nahe, bei der großen Ähnlichkeit des klinischen Bildes beider Affektionen an eine ähnliche pathologische Grundlage zu denken und zu versuchen, ob aus der Pathologie der Ergotinintoxikation etwas für die der Raynandschen Krankheit zu entnehmen ist. Leider lassen uns aber auch unsere Kenntnisse bezüglich der Einzelheiten der Pathogenese des Ergotismus im Stich. Wir wissen nur, daß das Ergotin eine Kontraktion der glatten Muskulatur, also auch der der Gefäße bedingt, das erklärt die asphyktischen Erscheinungen; bezüglich der gangränösen vertragen die Beobachtungen an Tieren, es sind hier nur unsichere und bestrittene Befunde im Nervensystem erhoben worden. Inwieweit die von Viretek

¹⁾ Jacksch, Die Vergiftungen. Neurologie Handb. I, 1907.

in den Hintersträngen von an Ergotismus chron. gestorbenen Personen gefundenen „Ischöden“ Veränderungen mit der Gangrän in Zusammenhang zu bringen sind, ist ganz unsicher.

Es gibt noch ein zweites ätiologisches Moment, das den Raynaudschen Symptomen ähnliche Erscheinungen hervorzurufen vermag: das ist die Kälte; so ist einerseits bekanntlich imstande, bei stärkerer einmaliger Einwirkung eine Gangrän der peripheren Gliedabschnitte zu produzieren; hier wird außer der anamnestischen Feststellung intensiver Kälteeinwirkung das Fehlen charakteristischer vasomotorischer Symptome, oft auch die große Ausdehnung der Gangrän die Diagnose unschwer ermöglichen. Schwieriger ist die Unterscheidung der Raynaudschen Akroasphyxie von den Frostbeulen. Raynaud selbst macht schon darauf aufmerksam, daß in den Fällen, wo die Affektion mit lokaler Asphyxie beginnt, sie von den Kranken selbst meist mit Frostbeulen verwechselt wird; und er gibt zu, daß dieser Irrtum sehr verzeihlich ist; verdächtig als Vorläufer resp. Symptome symmetrischer Gangrän seien diese Erscheinungen vor allen dann, wenn die Akroasphyxie an beiden Händen oder Füßen zu gleicher Zeit auftritt, und wenn außerdem die Jahreszeit eine für das Auftreten von Frostbeulen ungewöhnliche ist. Das Hauptgewicht wird also auf eine genaue Anamnese gelegt, beide Affektionen hätten klinisch vieles Gemeinsame, neben der Asphyxie auch noch die Parästhesien. Diese ungleiche Ähnlichkeit hat einzelne Forscher zu der Annahme geführt, daß die Beziehungen zwischen der Raynaudschen Affektion und den Frostbeulen sehr enge seien. Legroux z. B. gibt der Ansicht Ausdruck, daß Frostbeulen, Asphyxie locale, und Gangrène symétrique Grade einer „dystrophie nécropathique“ seien, nachdem schon vorher Bouchez und Rossignol die enge Verwandtschaft der beiden Zustände betont hatten. Legroux zitiert Fälle von Raynaud, Johnston, Myers, Makins, Versalle, Maszy und Dominguez, in denen der Raynaudschen Gangrän jahrelang Frostbeulen vorausgegangen waren. Demgegenüber gibt es aber auch wieder zahlreiche Fälle, in denen niemals Frostbeulen aufgetreten sind. Man wird sich über das häufige Vorkommen von Per-nixen in diesen Fällen gar nicht wundern dürfen, wenn man bedenkt, daß die sie bedingenden ätiologischen Momente — Kälte und ungünstige lokale Blutversorgung — auch in der Ätiologie und Pathogenese des Raynaud eine große Rolle spielen; das ist aber keineswegs ein Grund, beide Affektionen völlig zusammenzuwerfen: die Frostbeulen sind viel häufiger als die Raynaudsche Akroasphyxie asymmetrisch, ihre Entwicklung ist eine allmähliche, ohne auffälligen Wechsel der Erscheinungen, und sie stehen viel mehr in direkter Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Jahreszeit, die zwar bei unserer Krankheit auch einigen, aber nicht so entscheidenden Einfluß hat wie bei den Frostbeulen.

Auch Monro hebt die klinische und pathogenetische Ähnlichkeit der beiden Affektionen hervor. „Wenn starke Abkühlung dem Anfall vorausgegangen ist, so nennen wir es Frostbeule, wenn eine solche Ätiologie nicht vorliegt und dennoch die Symptome auftreten, so sprechen wir von „Raynaud'scher Krankheit“, aber eine Kälteschädlichkeit kann bald vorübergehende Frostbeulen hervorbringen und im weiteren Verlauf eine Raynaud'sche Krankheit zur Folge haben. Der Hauptunterschied ist also der, daß bei der Raynaud'schen Krankheit ein störrischer, beim Frost ein normaler Grad von Empfindlichkeit gegen die Kälte vorliegt.“ Die letzte Behauptung ist ganz gewiß nicht richtig, da auch beim Frost sehr oft eine abnorme Empfindlichkeit des befallenen Individuums gegen Kälte nachweisbar ist, sonst müßten ja alle zu gleicher Zeit denselben thermischen Schädlichkeiten ausgesetzten Menschen erfrorene Glieder bekommen. Auch Unna hat auf die nahen Beziehungen zwischen Raynaud'scher Krankheit und Frost aufmerksam gemacht, er bezeichnet den Frost als eine Angioneurose, die eine Mittelstellung zwischen der Raynaud'schen Krankheit und dem angioneurotischen Ödem einnimmt. Es bestehe hier eine mittlere Kontraktur der Arterien und Venen, die eine Verlangsamung des Kreislaufs, Cyanose, subjektive und objektive Kälte und bei stärkerem lokalen Blutzufuß auch das Auftreten von sanguinolentem Ödem bewirke. In einem Fall, den Heller beschreibt und den der Autor mir zu zeigen die Freundlichkeit hatte, war das Bild der Raynaud'schen Krankheit recht ähnlich.

48jähriger Mann. Er saß am 28. Dezember 1900 bei 23° Kälte von sechs Uhr morgens bis neun Uhr abends auf dem Kutschbock. Dann trat allmählich Absterben und Weißwerden der Finger ein. Im Krankenzimmer, das er aufsuchte, bestanden Cyanose der Finger, Blasenbildung. Nach vier Wochen beginnende Heilung, die nach sieben Wochen beendet ist. Phagogen 1900 spontane Abstoßung der Nagelphalangen des zweiten und dritten rechten Fingers mit Nekrose von Nagel und Knochen. Im Januar 1901 Blasenbildung am rechten zweiten bis vierten, linken dritten bis vierten Finger, Geschwulstbildung, mit sehr fettigen Eitersekreten. Anfang April stieß sich der Nagel des rechten vierten Fingers ab. Jetzt ist die Haut atrophisch, vielfach gefaltet, zum Teil völlig glatt, die Knochen der dritten Phalangen sind atrophisch oder fehlen; es kommen Anfälle von Cyanose vor.

Es handelt sich hier um eine durch akute Kältewirkung hervorgerufene Erkrankung bestimmter Haut-, Unterhaut- und Knochenbezirke bei einem Menschen, dessen Gefäßsystem schon vorher durch Alkoholismus geschädigt war. Die Störungen beschränken sich ganz auf die ursprünglichen erfrorenen Gebiete. Gerade dies Moment sprach gegen Raynaud'sche Krankheit.

Es gibt schließlich noch eine Anzahl von Affektionen, bei denen die Ähnlichkeit mit der Raynaud'schen Affektion sich fast nur in der

Lokalisation an den Akra ausspricht, so eine Akroarthrititis, die Hutchinson beschrieben hat, und die hauptsächlich die kleinen Fingergelenke betrifft. Sie ist nach Hutchinson durch eine starke Neigung zu Raynaud'schen Phänomenen ausgezeichnet, ferner besteht meist eine starke Veranlagung zur Gicht. Die Schilderung von Hutchinson läßt nicht bestimmt erkennen, mit welcher Krankheit wir es da zu tun haben: Gelenkveränderungen zusammen mit Raynaud'schen Symptomen (Akrosynkope und Cyanose) sah ich einmal in einigen später genauer zu beschreibenden Fällen von Sklerodactylie; flüchtige Arthropathien beschrieb Weiß in seinem Fall; auch sonst sind Gelenkveränderungen dem Bild der Raynaud'schen Krankheit nicht ganz fremd, insbesondere wenn wir die Ergebnisse der Röntgenuntersuchungen berücksichtigen. Als Akrodermatitis bezeichnet Hutchinson Affektionen, die sich an Erfrierungen, Risse, chronische Ekzeme und andere Läsionen der Haut der Finger anschließen, und von lokalen Störungen der Circulation begleitet sind. Die Ätiologie wie der Verlauf werden leicht die Unterscheidung ermöglichen.

Prognose.

Die Krankheit als solche bedroht das Leben nicht. Es ist zwar nicht selten über Todesfälle bei Raynaud'scher Krankheit berichtet worden, doch war in keinem Fall, wo es sich um echte Raynaud'sche Krankheit handelte, diese direkt die Todesursache. Die gegenteiligen Angaben mancher Autoren beziehen sich auf Fälle, bei denen die Diagnose höchst zweifelhaft war (siehe oben das über den Verlauf Gesagte). Auch die Prognose quoad sanationem ist insofern günstig, als es oft bei einem oder bei einigen wenigen Anfällen bleibt, nach deren Schwinden die betreffenden Patienten dauernd gesund bleiben; wenn einmal Gangrän eingetreten war, so ist das natürlich immer eine Heilung mit Defekt, doch sind die Narben bei der oberflächlichen Art der Gangrän oft unscheinbar und wenig störend. Raynaud weist darauf hin, daß an den Narben oft noch jahrelang eine Krustenbildung stattfindet; das habe ich selbst auch beobachtet. Die Fälle, in denen es zur Gangrän kommt, pflegen, wie ebenfalls Raynaud bereits beobachtete und wie mannigfach bestätigt wurde, meist in kürzester Zeit abzuheilen; doch habe ich mehrfach gesehen, daß in diesen Fällen nach Ablauf der Gangrän ein chronischer Zustand von Asphyxie locale mit passagier Striktion der vasomotorischen Erscheinungen zurückbleibt. Wo Gangrän sich nicht einstellt, können Anfälle von Asphyxie locale sich oft jahre- und jahrzehntelang wiederholen, allerdings ohne die betreffenden Kranken allzu sehr zu belästigen, während in anderen Fällen namentlich die begleitenden und immer wieder rezidivierenden Schmerzen dem Kranken das Leben recht verbittern können. Die

Anfälle können aber auch, wie eigene Beobachtungen lehren, noch nach mehrjährigem Verlauf dauernd verschwinden.

Schwierig und oft unlosbar ist die Aufgabe, im Anfang die Prognose über die Art des Verlaufs des Einzelfalls zu stellen. Ein im Beginn harmlos erscheinender Fall kann zu schweren Symptomen multiplexer Gangrän führen; andererseits kann oft da, wo Gangrän schon unmittelbar zu drohen scheint, alles noch gut werden und die alarmierenden Erscheinungen können wieder verschwinden.

In vielen Fällen kommt es niemals oder nur ganz vorübergehend und vereinzelt zu Gangrän; aber auch nachdem schon jahrelang immer nur vasomotorische Erscheinungen aufgetreten sind, kann einmal, ohne daß wir wissen warum, Gangrän eintreten.

Therapie.

Die Behandlung der Raynaud'schen Krankheit bewegt sich in zwei Richtungen. Wir sehen, daß der Boden, auf dem die Krankheit meist entsteht, eine allgemeine neuropathische Diathese ist, zu der nicht selten eine Unterernährung des ganzen Individuums kommt, die durch vorangehende Infektionskrankheiten oder durch Anämie auf dem Boden chronischer allgemeiner oder Organerkrankungen bedingt ist. Die erste Sorge wird daher auf eine Hebung und Kräftigung des Allgemeinzustandes gerichtet sein, unter besonderer Berücksichtigung der durch die allgemeine neuropathische Diathese bedingten Punkte. Auf diesen Teil der Behandlung brauche ich hier nicht näher einzugehen, sie ist die der allgemeinen Neurosen überhaupt; wir sehen denn auch in den einzelnen Fällen von Raynaud'scher Krankheit alle die Mittel angewendet werden, seien sie diätetischer, chemischer, physikalischer Natur, die eifriges Bemühen besonders in neuerer Zeit erlirht und in mannigfaltiger Anwendung variirt hat.

In bezug auf die Prophylaxe der Krankheit lehrt uns vielfache Erfahrung, daß die Vermeidung thermischer Schädlichkeiten von großer Wichtigkeit ist. Die Leidenszeit für diese Kranken pflegt der Winter zu sein. Sie müssen sich vor Kälte, besonders vor feuchter Kälte sorgfältig hüten, ebenso vor schnellem Temperaturwechsel; den besten Schutz dagegen verdienen nicht zu eng anliegende wollene Handschuhe resp. Strümpfe. Piquet empfiehlt auch Einwickeln der bedrohten Teile mit irgendwelcher Salbe. In besonders gefährdeter Zeit wird eine längere Bettrruhe angeraten werden müssen. In anderen Fällen wird der Kranke, um einen neuen Anfall des Leidens zu vermeiden, wenn möglich stilles Klima aufzusuchen.

Unter den gegen die Krankheit selbst gerichteten Behandlungsmethoden ist die elektrische Behandlung ehemals mit den größten Hoffnungen aufgenommen worden. Raynaud hat sie im Jahre 1874

zuerst beschrieben. Er wendete konstante Ström an, und zwar absteigende längs der Wirbelsäule oder indem er eine Elektrode auf die erkrankte Extremität setzte. Er glaubte damit eine kausale Behandlung der Krankheit gefunden zu haben: „The action exercised by the current on the cord appears to consist in an enfeeblement of the excito-motor power, whence there results a corresponding relation of the reflex vascular contractions“. Durch diese Behandlung glaubte Raynaud instande zu sein, den schon drohenden Eintritt von Gangrän bei lokaler Asphyxie hintanzuhalten. Leider hat diese Methode in der Hand anderer Beobachter das nicht gehalten, was Raynaud sich von ihr versprach. Bernhardt sah freilich von ihr in einem seiner Fälle einen dauernden, in einem zweiten einen vorübergehenden Erfolg, auch Nash und Thomson wissen günstiges zu berichten, und Hochenegg, Favier, Hoeyen empfehlen sie wenigstens; aber diesen stehen andere, sehr genaue und gewissenhafte Beobachter gegenüber, die gar keinen Erfolg von dieser Behandlungsmethode sahen, vor allem Weiß und Höflin, dann auch Grassat, Affleck, Löwer usw. Wenn wir bedenken, wie schwer, ja unmöglich es im einzelnen Fall sein muß, eine Heilwirkung der Elektrizität in dem Sinn, daß sie das Auftreten der Gangrän hindert, festzustellen, werden wir diesen ungünstigen Erfahrungen einen entscheidenden Wert beimessen müssen! auch an diesem Punkt hat die Elektrotherapie nicht gehalten, was sie versprach: sie gibt uns nicht die Möglichkeit, die Raynaud'sche Krankheit an ihrer Wurzel erfolgreich anzugreifen. Wohl aber haben wir in ihr ein symptomatisches Mittel mehr für die Behandlung der Krankheit. In einer besonderen Form angewendet, in der des faradischen oder galvanischen Handbades, ist sie anscheinend instande, die vasomotorischen Erscheinungen an den Händen günstig zu beeinflussen, freilich versagt sie auch da manchmal (Höflin), und wir sind auch nicht instande, exakte Indikationen dafür zu geben, in welcher genauen Dosierung und wann sie anzuwenden ist, ob im Stadium der Synkope oder der lokalen Asphyxie, ob als faradisches oder galvanisches Handbad. Barlow empfiehlt sie in folgender Form: konstanter Strom, die ganze affizierte Extremität wird in ein Gefäß mit Salzwasser gesteckt, eine Elektrode an das obere Ende des Gliedes, eine zweite direkt in das Salzwasser hineingesetzt, der Strom muß es stark sein, daß der Patient ihn bequem erträgt. Dichi hat neuerdings faradische Handbäder mit nicht allen starken Strömen und häufigem Polwechsel empfohlen. Das Wasser soll ziemlich warm sein. Er hat in drei Fällen einen dauernden Erfolg erzielt. Short empfiehlt heiße faradische Bäder, durch Stunden hindurch, gegen die Schmerzen.

Mills hat schon vor mehr als 20 Jahren eine Kombination der verschiedenen Formen der elektrischen Behandlung angewendet. Er benutzte lokale Faradisation mit starken Strömen, eine kleine Elektrode an den Fingern, eine größere am Unterarm, daneben wendete

er lokale Galvanisation an, starke Ströme, negative Elektrode an den Fingern, positive am Unter- oder Oberarm und schließlich nach Galvanisation des Sympathicus 2–3 Minuten lang, die Elektroden hinter die Processus mastoidei; die letztere Methode hat er selbst wieder verlassen. Was meine eigenen zahlreichen Erfahrungen betrifft, so zweifle ich nicht an einem schätzbaren Einfluß der lokalen Anwendung der Elektrizität, ich habe meist galvanische Hand- oder Fußbäder benutzt, eine breite Elektrode als Kathode, auf den Nacken, die zweite Elektrode als Anode ins Wasser, in das die eine oder beide Hände oder Füße hineingesteckt werden; die Stärke der Ströme so, daß deutliches Prickeln empfunden wird. Dauer mindestens zehn Minuten. Das Wasser soll lauwarm sein. Auch in sehr schweren Fällen schien diese Behandlung auf die Schmerzen und die vasomotorischen Phänomene günstig zu wirken. Auch faradische Handbäder habe ich, namentlich in leichteren Fällen mit gutem Erfolg angewendet; einmal sah ich allerdings unmittelbar danach eine größere Reihe von Hantämorrhagien entstehen. Shop empfiehlt Sinusoidalströme.

Man hat von dem Amylnitrit als einem gefäßerweiternden Mittel viel erwartet; ein Erfolg scheint niemals konstatiert worden zu sein. Höllin sah, daß bei seinem Gebrauch sich zwar das Gesicht röthete, aber die Hände ganz unbeeinflusst blieben. Weiß vernimmt es als nutzlos und gefährlich. Mader sah keine Änderung der Anfälle, aber Besserung des Unbehagens. Ähnliches gilt von dem ihm in bezug auf seine physiologische Wirkung verwandten Nitroglycerin. Es ist besonders von englischen Autoren angewendet worden (Grant, Marsh, Mc Nabb, Nash, Thomson, Crocker, Monroe, Ewart, Porter, Shop). Einige von ihnen wollen sogar etwas wie einen Erfolg gesehen haben, doch sind ihre Angaben keineswegs überzeugend, und wir dürfen das Nitroglycerin bei seiner großen Gefährlichkeit mit gutem Gewissen aus der Reihe der bei Raynoldscher Krankheit in Betracht kommenden Mittel streichen. Das gleiche gilt aus denselben Gründen für das Atropin und das Chloralhydrat; das dem Nitroglycerin in seiner Wirkung ähnliche aber ungefährliche Trinitrin mag immerhin versucht werden. Mit dem Vasotonin wurden bei uns ziemlich umfangreiche Versuche angestellt; wir haben nur in einzelnen vorläufigen Fällen Erfolge gesehen, trotzdem wir bei einzelnen Kranken bis zu 50 Injektionen gegeben haben. Höllin sah von Pilocarpin 0,01 einen vorübergehenden Erfolg, die Anfälle wurden seltener (statt fünf täglich nur zwei), doch war nach dem Aussetzen des Mittels alles wieder beim alten.

Wie bei den verwandten Neurosen, insbesondere den Akroparästhesien, scheint mir auch bei der Raynoldschen Krankheit das Arsen das innere Mittel zu sein, das die meiste Beachtung verdient. Ich habe es theils innerlich in Pillenform oder in Fowlerscher Lösung gegeben, theils

in Injektionen, und habe mich dabei meist des Natrium cacodylicum bedient. Vielfach habe ich Strychnin oder Extract Chin. dem Arsen in Pillenform zugesetzt. Das Chinin empfiehlt Herz für seine vasomotorische Ataxie sehr dringend, in Lösung 2,0:180,0 dreimal täglich einen Eßlöffel.

Sainton kam im Jahre 1881 auf die Idee, Sauerstoffbäder anzuwenden, indem er das erkrankte Glied ganz in ein mit Sauerstoff angefülltes, hermetisch abgeschlossenes Kautschukgefäß eintauchen ließ; er sah einen guten Erfolg, aber die damals jedenfalls sehr unständliche Methode fand wenig Nachfolger und Castellino und Cardi berichten zudem von Mißerfolgen.

Sehr häufig sind hydriatische Prozeduren angewendet worden. Weiß stützt sich auf die Waller'sche Entdeckung, daß Lähmung der Vasomotoren (im Uterus) dadurch gelingt, daß der Ellbogen in eine Kältemischung eingetaucht wurde; in seinem Fall verschwand durch eine solche Prozedur der Gefäßkrampf stets für kurze Zeit in einigen Fingern, trat dafür aber in anderen ein. Günstig wirken warme Bäder, wenigstens in manchen Fällen, gelegentlich auch Dampfbäder. Möbius empfiehlt laue Hand- und Fußbäder, noch günstiger wirkt offenbar hohe trockene Wärme (Döhl's), so daß es wohl in einem passenden Fall lohnend wäre, einmal heiße Luft, deren Anwendung durch mannigfache Apparate ja jetzt erleichtert ist, zu probieren. Dieser Vorschlag (I. Aufl. d. Buches) ist dann ausgeführt worden. Leo sah guten Erfolg, ich selbst habe mich von der Wirksamkeit der Heißluftbehandlung (im Verein mit anderen Mitteln) in einem sehr schweren Fall von Sklerodactylie und Raynaud' überzeugen können. Natürlich ist sehr große Vorsicht in der Applikation wegen der geringen Widerstandsfähigkeit der betreffenden Teile am Platze. Auch Schwab rühmt das Verfahren, das er zur Heilung der Ulcerationen angewendete. Blaulichtbestrahlung empfiehlt Sloop. Merkwürdigerweise wirkt aber auch gelegentlich einmal nicht die Wärme, sondern die Kälte günstig; so sah Southey Besserung nach lokaler Eisapplikation. Häufig wird mit gutem Erfolg eine leichte Massage in Anwendung zu ziehen sein. Sie muß namentlich zu Anfang sehr vorsichtig gehandhabt werden, weil die Haut der erkrankten Teile sehr empfindlich und leicht verletzlich ist. Moore empfiehlt in Fällen, in denen die Überempfindlichkeit sehr groß ist, die Massage oberhalb der erkrankten Teile vorzunehmen. Wo die Klammerheit und Ungeschicklichkeit der Finger besonders hervortritt, wird passive Gymnastik am Platze sein.

Großer Vorsicht bedarf es bei Anwendung lokaler Derivantien. In einem Fall, in dem Raynaud ein lokales Senfbad angeraten hatte, kam es, nachdem Patient die asphyktischen Hände nur kurze Zeit in dies Bad gehalten hatte, zu einer Schwarzfärbung der Hände bis zum Unterarm.

Cushing empfahl als erster die Stauung durch Anwendung des Tourniquet. Er sah nach 1–2 Minuten stärkeren Blutzufluß, Erhöhung der Hauttemperatur, Vollerwerden des Pulses und erklärte diese Erscheinungen durch einen blocking effect auf die Vasomotoren. Er wendete das Verfahren täglich an und erhielt dauernde Besserungen. Arning sah in seinem sehr schweren Fall ebenfalls einen günstigen Einfluß, ebenso wie Rennert und Nonne; ich habe das Verfahren viel und, wie es schien, meist mit zufriedenstellendem Erfolg angewendet. Ich ließ eine Gasmanschette um den Oberarm so fest wirken, daß eine deutliche venöse Stauung eintrat, der arterielle Puls aber fühlbar blieb. Dauer des Verfahrens zehn Minuten bis eine halbe Stunde; häufige Wiederholung. In einem Fall sah ich aber nach wenigen Minuten eine sehr starke Erhöhung der Schmerzen und eine Anschwellung der ganzen Hand eintreten, die sich sehr langsam zurückbildete. Es ist also auch hier recht große Vorsicht nötig.

Die bisweilen enorm intensiven Schmerzen fordern oft zu energischem Handeln auf; wirken die obengeschilderten Prozeduren der warmen Bäder, Einwicklungen, Einreibungen mit sedativen Limenten nicht lindernd, wozu noch Ruhestellung oder Hochlagerung der Glieder kommen, so müssen wir zu den neueren Antineuralgica wie dem Antipyrin, Salipyrin, Phenacetin, Pyramiden usw., greifen; namentlich Pyramiden hat sich mehrfach als ein ganz ausgezeichnetes Mittel bewährt. In anderen Fällen werden wir die Narcotica nicht ganz entbehren können. Monro empfiehlt besonders das Opium, es scheint ihm vorzüglich bei Personen mittleren und höheren Alters mit täglichen Anfällen und drohender Gangrän verwendbar. Es soll da öfters in kleinen Dosen gegeben werden, etwa dreimal am Tage 0.02 Opium in Pillen. Auch die Kombination mit Belladonna-Extrakt erscheint ihm empfehlenswert; wo es aus irgendwelchen Gründen vermieden werden muß, empfiehlt er die Cannabis indica; schließlich bleibt uns auch noch das Morphium.

Für bestimmte Fälle ist noch eine besondere kausale Behandlung der Krankheit in Erwägung zu ziehen. So werden wir bei vorausgegangener oder noch bestehender Malaria zunächst an das Chinin denken; schon Raynaud empfahl es in den Fällen mit ausgesprochenem regelmäßig intermittierendem Charakter. Moursion, Calmette und Petit et Verneuil haben seine Wirksamkeit bei Personen, die an Malaria gelitten hatten und Raynaudsche Symptome zeigten, erprobt. In einem Fall, den Valpian beobachtet hat, bei dem Malaria nicht vorlag, wurde wiederholt die Erfahrung gemacht, daß die Symptome nach dem Einnehmen des Mittels schwanden und beim Aussetzen wiederkehrten. Es wirkt also auch in anderen als malarischen Fällen günstig, wie ich selbst auch beobachtet und oben erwähnt habe. Man gibt es lange Zeit hintereinander in Dosen von $\frac{1}{4}$ – $1\frac{1}{2}$ g. Liégeois

gab 6 Stunden vor dem Anfall $\frac{1}{2}$ g. das zweite halbe Gramm zur Zeit des Anfalls. Brocq gibt es in Kombination mit dem Ergotin nach folgendem Rezept:

Chinin sulfur.
Ergotin ana 0.05
Fol. Digital. pulv. 0.005
Extr. Bellad. 0.001
M. pulv. 2—4 Pillen vor der Mahlzeit.

Das Ergotin ist auch allein mehrmals angewendet worden (Féré und Johnston); trotzdem man doch eigentlich denken müßte, daß es hier kontraindiziert ist, ist doch von Erfolgen berichtet worden. Einige Male ist der Extrakt der Schilddrüse verwendet worden (Short, Lancereaux, Paulesco). Die letzteren haben das Jodothyrim benutzt, 0.025 g täglich. Möbins rät zu einem Versuch, wenn eine Struma vorhanden ist. Solis Cohen empfahl den Nebennierenextrakt für seine Fälle von vasomotorischer Ataxie. Theoretische Erwägungen müßten eigentlich zur Ablehnung des Mittels führen, ich habe keine eigenen Erfahrungen.

Mantle berichtet über gute Erfolge bei Anwendung dieses Präparates in seinen Fällen von Raynaud, in denen die Schilddrüse vergrößert und der Blutdruck meist abnorm niedrig war. Auf eine Beeinflussung des Blutdrucks führt Bonnefoy die guten Resultate, die er bei Anwendung der Hochfrequenzströme erzielte, zurück. Auch Moberg rühmt sie. Ich habe auch da keine eigenen Erfahrungen.

Bei bestehender Arteriosklerose werden wir Jodpräparate versuchen dürfen. Bei dem Nachweis oder dem Verdacht auf Lues wird immerhin eine antiluetische Behandlung indiziert sein.

Noesske empfahl das folgende Verfahren. In einem Falle von schwerer Raynaudscher Krankheit wurden die stark cyanotischen Finger in Lokalanästhesie inzidiert und darauf in der Saugglocke einem negativen Druck von 10 cm Quecksilber ausgesetzt. Unmittelbar nach der Incision entleerten sich einige Tropfen cyanotischen Blutes, dem später arterielles Blut in geringer Menge nachströmte. Die Saugung scheint nur unterstützend zu wirken und kann auch weggelassen. Der Erfolg war überraschend. Nach anderthalb Tagen war die Pat. völlig schmerzlos, die Cyanose war verschwunden; die weiteren im Ätherrausch vorgenommenen Incisionen führten zu denselben günstigen Resultaten an den anderen Fingern. In einem Fall eigener Beobachtung wurde mit dieser Methode (siehe die Krankengeschichte auf S. 321) ein Nachlaß der enormen Schmerzen erzielt, aber es kam später zu neuen Anfällen.

De Bovis erzählte in zwei Fällen Raynaudscher Gangrän, von denen wenigstens der eine recht schwer war und sich im Stadium der Gangrän

bestand, einen sehr guten Erfolg mit der Nervendehnung. Die nekrotischen Partien stießen sich ab, die Schmerzen besserten sich bald und die Heilung der Wunden schritt rasch vorwärts. Die vasomotorischen Erscheinungen blieben im abgeschwächten Maße bestehen; eine leichte durch die Dehnung hervorgerufene Radialislähmung ging bald zurück. Da Buck beschreibt ein ähnliches Verfahren, eine dissociation faciculaire des nerfs, durch das er bei milden Formen von Raynaud Besserung erzielte.

Ist die Gangrän einmal eingetreten, so ist nach den allgemein gültigen Regeln der Chirurgie zu verfahren, d. h. es ist die Demarkation der gangränösen Teile abzuwarten. Wir können das um so mehr ohne jede Sorge tun, weil die Gangrän hier vermoge ihrer geringen Ausdehnung kaum je solche Gefahren mit sich bringt, wie wir sie bei deren anderen Formen oft fürchten müssen. Im übrigen stoßen sich die nekrotischen Teile häufig spontan völlig ab oder lassen sich doch wenigstens so weit los, daß ihre Abtragung müh los gelingt.

Anhang.

Die Akroasphyxia chronica.

Es gibt eine Anzahl von Beobachtungen, in denen das hauptsächlichste Symptom eine allmählich sich entwickelnde Asphyxie der Extremitätenenden ist. Diese Asphyxie entspricht in ihrem äußeren Habitus und in ihrer Lokalisation dem Bilde der lokalen Asphyxie, wie wir es von der Raynaudschen Krankheit her kennen. Es besteht aber in der Entwicklung dieses Symptoms in den jetzt zu besprechenden Fällen insofern ein Unterschied von der Raynaudschen Asphyxie, als sie sich hier allmählich und ohne ausgesprochene Anfälle herausbildet. Die Asphyxie pflegt selten das einzige Krankheits-symptom zu sein, meist zeigen die Extremitätenenden noch andere Symptome, sei es auf dem Gebiet der Trophik, sei es auf dem der Sensibilität. In anderen Fällen wieder besteht ein mehr oder minder scharf abzugrenzendes Grundleiden, häufig von offenkundig neuropathischer Genese.

Die hierher gehörigen Krankheitsbilder sind zum ersten Male von mir (in der ersten Auflage dieses Werkes) in einer Gruppe vereinigt worden; nach dem sie hauptsächlich charakterisierenden Symptomen habe ich ihnen den Namen der chronischen Akroasphyxie gegeben. Diese Bezeichnung ist von den späteren Autoren allgemein angenommen worden. Inwieweit damit ein einheitliches neues Krankheitsbild geschaffen wurde, ist noch zweifelhaft. Wir werden sehen, daß wir jedenfalls noch einige Unterabteilungen aufzustellen Veranlassung haben. Das allen diesen Fällen gemeinsame Symptom, die chronische Akroasphyxie, weist auf die Beziehungen, die das Symptomenbild zur Raynaudschen Krankheit bietet, hin. Ich bezweifle nicht, daß die Verwandtschaft zwischen der Raynaudschen Krankheit und der Akroasphyxie eine nahe ist.

Von den hierher gehörigen Fällen stammt eine Reihe aus meinem eigenen Beobachtungskreise. Ich berichte zunächst folgenden Fall:

F., Fraulein, 31 Jahre alt, Schlichterinnswell, zum erstenmal in der Poliklinik am 21. Februar 1899 untersucht. Die Patientin teilt mit, daß sie schon seit vielen Jahren im Winter an Frost der Hände leidet. Die Hände schwellen in früheren Wintern sehr oft an, plätzen an einzelnen Stellen auf, und diese Blasen waren sehr schmerzhaft, besonders schmerzhaft waren in diesem Jahr die Beschwerden. 1880 und demal bildeten sich kleine Blasen an den Händen, die mit wasserhellen Inhalt gefüllt waren und dann aufgingen. Diese Blasen entstanden zuletzt Mitte Januar. Auch an den Füßen hat sie wiederholt an Frost gelitten. Seit 14 Tagen bemerkt sie auf, daß die Hände ihre Farbe verändern, dunkelblaurot werden, und kribzeln. Niemals trat, das versichert sie bestimmt, eine Blase der Hände und Füße ein, nur in den ersten Tagen war ein geringes Schwellen der Endphalangen zu konstatieren, während in letzter Zeit nur noch ganz progressiv eine Verstärkung der Verfärbung wahrnehmbar war. Es bestanden keine Schmerzen, nur ein stumpfes Gefühl in den Händen machte sich ihr unangenehm bemerkbar, außerdem das erwähnte Kribzeln und die Empfindung, als ob die Finger dick wären. Patientin fühlt sich in letzter Zeit im ganzen sehr matt, sie hat keinen Appetit und erbricht öfter nach dem Essen. Sie hat in den letzten zwei Wochen fast anhaltend Kopfschmerzen und häufig Schwinden, will auch schwerhörig geworden sein, ebenso ist sie schreckhaft und ängstlich erst in letzter Zeit geworden. Sonst war sie früher nicht krank. Die Untersuchung der kräftig gebauten und gut genährten Patientin ergibt folgendes: Beide Hände sind in distalwärts zunehmender Weise blaurot verfärbt, die Finger sind in ganzer Ausdehnung dunkelrot, auf dem Handrücken ist die Beimischung von blau stärker, diese Cyanose reicht zwar bis drei Finger breit über das Handgelenk hinaus, dann kommen einige hellrote Flecken und erst am Oberarm ist die Färbung ganz normal. Die Hände zeigen stellenweise kleine Risse, die nicht schmerzhaft sein sollen, außerdem finden sich an ihnen zahlreiche glatte, glänzende, kreisrunde oder strahlige Narben, offenbar von kleinen geschwüpigen Stellen herrührend. Die Hände schwellen stark und sind bei der Untersuchung stets mit Schweiß bedeckt, sie fühlen sich sehr kühl an; diese Kälte deckt sich in dieser Ausdehnung mit der Cyanose, sie schwindet aus Entfernung in deutlich scharfer, kreisrunder Linie ab. Die Nägel zeigen keine auffällige Veränderung, Patientin meint, daß sie jetzt sehr leicht abbrechen. Die Haut der Hände ist im ganzen etwas gelblich, ohne aber deutlich pathologisch verändert zu sein, nur finden sich an einzelnen Stellen kleine, etwa hirsekorngroße, bläuliche Infiltrationen. Auch beide Füße zeigen einen gewissen Grad von Cyanose, der aber bei weitem nicht so hochgradig ist wie an den Armen, sie fühlen sich kühl an und weisen an einzelnen Stellen ebenfalls eine Anzahl verheilter Geschwüre auf. Die Cyanose ist im ganzen an Armen und Beinen durchaus symmetrisch entwickelt, nur ist an der linken Hand und am rechten Fuß die Verfärbung etwas stärker betont. Sehr eigenartig ist das Verhalten der Sensibilität; es besteht nämlich an Händen und Füßen eine erhebliche Herabsetzung der Empfindlichkeit für alle Qualitäten, am stärksten ausgesprochen für die Wahrnehmung von Kälte. Es werden nicht nur Berührungen an beiden Händen nicht empfunden und Nadelstiche gar abgesehen nicht gefühlt. Die Hypalgie reicht bis etwa drei Finger breit über das Handgelenk; die taktile Hypästhesie etwas höher hinauf. Heiß wird an den Händen höher hinauf als im Unterschenkel empfunden, und auch am Unterschenkel bis fast zur Ellenbogenhöhe bemerkt eine progressivwärts abnehmende Hypästhesie für heiß; kalt wird an den Händen und bis zur Mitte der Unterschenkel gar nicht empfunden, von

hier bis zur Ellenbogen mit vermindelter Intensität. An den Fingerringen und Fäßen findet sich eine ganz ähnliche Sensibilitätsstörung. Berührungen werden bis etwa oberhalb des Fußgelenks mit abgeschwächter Intensität empfunden, in dem selben Gebiet besteht auch Hypalgesie, während heiß und kalt noch wieder auch fast in einem etwas größeren, etwa bis zur Mitte der Wade reichenden Gebiet noch unendlich heiß, gar nicht gespürt werden. Die Grenzen dieser Anästhesie sind überall ziemlich scharf und stehen überall senkrecht zur Achse des Gliedes. An den Fingern ist auch das Lagegefühl etwas gestört. Patientin beklagt sich außerdem, daß sie seinen Verletzungen an den Händen nicht verschonen kann, daß sie eine Nadelnadel, B. nicht festhalten kann, sie erzählt auch, daß sie sich bei ihrer Beschäftigung in den letzten Tagen öfter in die Finger geschnitten habe. Die Bewegungen der Finger sind in der Tat abgeschwächt, aber daß jedoch ein ausgesprochenes Grad von Ataxie bestünde. Die Motilität der Arme und Beine ist sonst eine völlig normale, auch die elektrische Untersuchung der kleinen Hand- und Fußmuskeln ergibt keinerlei Abweichung, der Lomagesensibilitätsgrad ist nicht vermindert. Die Sehphänomene an den Beinen sind etwas stark, aber es bestehen keine Spasmen. Kein Schwärzen bei Augenabkühl, keine Unbeschwerden, die Hirnnerven sind normal, der ophthalmoskopische Befund ist normal, die Pupillenreaktion ist prompt, der Puls beträgt 120 in der Minute. Blütenspanne wird beidseits in 2 m Entfernung gehört, beide Trommelfelle zeigen alte Trübungen. An der Schilddrüse ist nichts Besonderes zu fühlen.

Die weitere, mehrere Monate bis tief in die warme Jahreszeit hinein fortgesetzte Beobachtung hat keine wesentlichen Änderungen dieses Krankheitsbildes erkennen lassen; auch im warmen Zimmer blieb die Kälte und Cyanose der erkrankten Teile stets bestehen und äußerte sich einmal wesentlich ihre Intensität. Zeitweise gab die Patientin an, daß sie an der Grenze der cyanotischen Partien, dort, wo sich die roten Flecken befanden, ein Gefühl hatte, als ob sie mit kaltem Wasser übergossen würde, hier kahlte sich die Haut auch oft abnorm heiß an. Leider habe ich keine thermometrischen Messungen gemacht. In kaltes Wasser gesteckt, saßen die Hände und namentlich die Finger oft ein bis zwei schwaches Aneiseln an; im warmen resp. heißen Wasser stellte sich zuerst ein auffällig warmes Fühl her, in dem nächsten Stadium in dem cyanotischen Gebiet eine tiefschwarze Färbung bekommen. Niemals wurde Synkope locale beobachtet und nie auch ein spontanes Darkwerden der Finger. Die Klagen über Krabbeln in den Händen waren nicht erheblich, Schmerzen fehlten stets, ebenso war nie eine Druckschmerzhaftigkeit der Nervenstämme nachweisbar, die Sensibilitätsstörung war nicht zu beeinflussen, speziell absolut nicht auf suggestiven Wege. Die Behandlung bestand in lokalen Hand- und Fußbädern, in Massage und in allgemein tonisierender Therapie. Die Kranke blieb nach etwa einem halben Jahr ungebessert von der Behandlung weg. Ich habe sie seither nicht wieder auffinden können.

Überblicken wir das Krankheitsbild, so finden wir zunächst einmal eine Akrocyanose, die durch ein Allgemeinleiden, speziell durch eine Herz- oder Lungenkrankheit nicht zu erklären ist. Es waren übrigens auch die Lippen, deren Cyanose in solchen Fällen am ehesten auffällt, hier nicht betroffen. Die Cyanose hatte sich ziemlich rasch, kontinuierlich und progressiv im Laufe von zwei Wochen entwickelt. Das zweite Hauptsymptom ist eine eigentümlich gestaltete Hypästhesie; diese betrifft alle Empfindungsqualitäten, am stärksten warm und kalt, sie schneidet kreisförmig ab und ähnelt dann am meisten den bei der Hysterie beobachteten Sensibilitäts-

störungen. Ich glaube aber doch nicht, daß man sie als hysterisches Symptom auffassen kann. Zunächst einmal wäre die Ausdehnung dieser Störung auf alle vier Extremitätenenden bei der Hysterie etwas ganz Ungewöhnliches und ein bisher noch nicht beobachtetes Vorkommnis, wenigstens finde ich bei Gilles de la Tourette (*Traité de l'hystérie*) kein Beispiel dafür. Die Sensibilitätsstörung war ferner sehr konstant und suggestiv nicht beeinflussbar, es bestand eine Andeutung von dissoziierter Empfindungslähmung, und schließlich hatte die Kranke auch ein Bewußtsein von ihrer Anästhesie. Es fanden sich ferner bei der Untersuchung wenigstens keine ausgesprochenen Zeichen von Hysterie, keine sensorische Anästhesie, keine konzentrische Gesichtsfeldminderung, keine sonstigen anästhetischen oder hyporästhetischen Zonen. Gewisse Zeichen einer leichten allgemeinen Nervosität, wie Kopfschmerzen, Schreckhaftigkeit bestanden ja, waren aber nicht ausgesprochen und nach den Angaben der Patientin erst in den letzten Tagen aufgetreten. Wir haben daher guten Grund, einen Teil dieser Erscheinungen, u. a. den Schwindel, die Kopfschmerzen, das Erbrechen als vasomotorischen Ursprungs anzusehen. Sehr bemerkenswert ist dagegen eine andere Angabe der Kranken, daß sie nämlich seit der Jugend an Pernioxes gelitten habe. Wir finden deren Spuren noch jetzt nach an Händen und Füßen. Daß wir aber die ganze Affektion nicht als Frost auffassen dürfen, liegt klar auf der Hand; die dauernde und von der Außentemperatur unabhängige Cyanose wie die Sensibilitätsstörungen machen eine solche Auffassung unmöglich.

Wollen wir für die Affektion einen symptomatologischen Namen wählen, so können wir sie als *Akrocyanosis chronica anaesthetica* bezeichnen; mit dieser Namensgebung ist uns freilich wenig geholfen. Es handelt sich nunmehr um die Frage, in welche Krankheitsgruppe ein solcher Fall gehört. Bevor ich diese zu beantworten suche, müssen wir uns in der Literatur danach umsehen, ob ähnliche Fälle berichtet sind. Ich habe nur einen einzigen gefunden, der allerdings fast in jedem Punkte genau dem unsrigen entspricht. Er ist von Nothnagel in dessen Arbeit „über vasomotorische Neurosen“ aus dem Jahre 1867 mitgeteilt.

M., Dienstmädchen, 28 Jahre alt, kreis. Heredität. Pat. will sie krank gewesen sein, Menstr. regelmäßig. 22. März 1865 normale Geburt eines Kindes. Mitte April beobachtete sie zum erstenmal ein Kriebeln in den Fingerspitzen von nur vorübergehender Dauer, sie bemerkte ferner, daß sie in den Fingern schlechter fühle, daß diese wie abgestorben seien, und daß sie im Dunkeln schlechter sehe als bei Tage.

Status praesens vom 28. Mai 1865. Allgemeinzustand gut, Lippen und Wangen von frischerer Farbe. Circulations-Respirationsapparat in normalem Zustand, nirgends Schmerzen, in den Händen und Füßen ein Gefühl von Abgestorbenheit und eine kontinuierliche Kälteempfindung. Dieses Gefühl von Torpor ist beständig, stärker, wenn die Hände kalt sind, geringer, wenn sie erwärmt werden. Beide Hände erscheinen stark cyanotisch gelärbt und sind ganz kalt

tritz des warmen Wetters (wie best, so Wochen hindurch). An den Extremitäten ist die Empfindlichkeit für alle Qualitäten stark herabgesetzt, und zwar in zunehmender Intensität von den Oberarmen resp. Knieen bis zu den Händen resp. Füßen hinauf, soart, daß hier eine merklich dicke Hautfalte ohne die geringste Wahrnehmung durchbetastet werden kann, während an den Grenzen der Sensibilitätsstörung weiche Stöße nur stumpfer empfunden werden, als am übrigen Körper. Auch der Drucksinz ist herabgesetzt. Bei geschlossenen Augen macht Pat. kleine Bewegungen eigenhändig, vermag eine Stecknadel nicht vom Tisch zu nehmen usw. So kann man stricken, wenn man genau hinsieht, in Dunkelheit zu gehen ist ihr nur möglich, wenn sie sich anhalten kann, am Tage ist von Gange nichts Abnormes zu bemerken. Die Motilität selbst ist intakt, auch die elektrische Untersuchung ergibt keine Abweichung. Pat. gekrankte ungefähr sechs Wochen lang stürze innere Mittel, den innerlichen Sturz und warme Bäder, dazu bekam sie heiße Senfküßler, die Kationen wurden täglich gebadet und die Hände mit Spiritus eingewaschen. Ende August ist Pat. wieder ganz gesund.

Abgesehen von dem günstigen Ausgang stimmen beide Fälle gänzlich genau überein. Nothnagel erklärt die Affektion durch die Annahme eines weitverbreiteten Gefäßkrampfes; durch Überfüllung der venösen Gefäße bei weit verbreiteter und starker Verkleinerung der arteriellen Bluthähen komme es zur Cyanose. Diese sei die Ursache der Anästhesie.

Gilt es nun eine Krankheit, der wir diese beiden Fälle als weiteres zurechnen dürfen? Am ehesten kommt da offenbar die Raynaud'sche Krankheit in Betracht, aber auch hier sehen wir sehr wichtige Abweichungen. Um das Übereinstimmende zuerst hervorzuheben, so ist die Lokalisation und die Art der Cyanose dieselbe wie bei der Raynaud'schen Krankheit. Daß sowohl jede Andeutung von Synkope wie von Gangrän fehlt, würde die Diagnose „Raynaud'sche Krankheit“ nicht unmöglich machen. Wir haben solche Fälle kennen gelernt. Bedenklicher schon ist das absolute Fehlen von Schmerzen, wenn auch das namentlich bei Fällen, die nur Asphyxie zeigen, vorkommen kann. Aber es fehlen auch alle Paroxysmen und die Cyanose hat sich rasch progressiv entwickelt. Ich habe betont, daß auf das Vorkommen von Paroxysmen der größte Wert bei der Diagnose „Raynaud'sche Krankheit“ zu legen ist. Ich erwähnte einzelne Fälle (Humphrey, Monro), in denen Anfälle fehlten, aber schon bei ihnen schloß die Diagnose zweifelhaft. Für unsere Fälle kommt nun noch hinzu, daß eine sehr ausgesprochene Anästhesie besteht, und auch das ist bei der Raynaud'schen Krankheit sehr selten. Es gibt nur sehr wenig Fälle (darunter einer von Raynaud selbst s. v.), bei denen eine annähernd ähnlich intensive Anästhesie bestand. Wir sehen, wie erheblich und zahlreich die Differenzpunkte dieser Asphyxie und der Raynaud'schen Krankheit sind.

Von sonstigen Krankheiten kommt in erster Linie, wenn wir von der Hysterie aus den oben schon erwähnten Gründen absehen, die Syringomyelie in Betracht. Die Sensibilitätsstörung ähnelt in ihrem Typus

etwas der syringomyelitischen, ihre Lokalisation wäre freilich auch für eine Syringomyelie atypisch, wenn auch wenigstens nach den von Briessand¹⁾ vertretenen Anschauungen nicht unmöglich. Das völlige Fehlen motorischer und trophischer Ausfallserscheinungen spricht aber mit vollkommener Sicherheit gegen die Diagnose Syringomyelie.

Schließlich käme nur noch eine Polyneuritis in Betracht. Mit der Annahme einer solchen stimmt aber kaum etwas mehr als die symmetrische Lokalisation der Störungen an den distalen Teilen. Es fehlen alle sensiblen Reizerscheinungen, ebenso wie alle motorischen Reiz- und Ausfallserscheinungen und die Anästhesie zeigt keine peripärraunitische Anordnung. Also auch diese Diagnose kann nicht gestellt werden.

Wir müssen daher doch wieder auf den Morbus Raynaud zurückkommen. Mit ihm hat das Leiden die meisten Berührungspunkte, aber es bestehen doch soviel Abweichungen, daß wir es vorziehen, durch eine besondere Nomenklatur die Affektion von der Raynaud'schen Krankheit abzutrennen. Freilich ist die Zahl der bekannt gewordenen Fälle noch immer nicht erheblich, wenn auch, wie wir abtats sehen werden, einige wenige von anderer Seite beschrieben wurden. Auch mein eigenes Beobachtungsgebiet hat mir einige neue Erfahrungen gebracht. Daß zwischen diesem Typus und dem klassischen Bild der Raynaud'schen Krankheit Übergänge vorkommen, lehren uns eine ganze Anzahl in diesem Kapitel erwähneter Beobachtungen.

Ich will auf die Pathogenese der einzelnen Symptome dieser Affektion nicht weiter eingehen, sehr sehr kurz erscheint mir die Erklärung der Anästhesie, deren Abhängigkeit von der Cyanose keineswegs sichergestellt, ja mir kaum wahrscheinlich ist. Die Cyanose selbst werden wir uns ähnlich entstanden denken müssen, wie bei der Raynaud'schen Krankheit, nur daß die sie unterhaltende Reiz hier ein dauernder ist.

Seitdem ich in der ersten Auflage dieses Buches auf diese Fälle von sich allmählich und progressiv entwickelnder Asphyxia aufmerksam gemacht habe, sind auch in der Literatur eine Anzahl von häuhergehörigen Fällen berichtet worden. Am seltensten scheinen Fälle der Gruppe zur Beobachtung zu kommen, bei denen zur chronischen Asphyxie sich Sensibilitätsstörungen gesellen. Ich selbst habe keinen so ausgesprochenen Fall wie den vorstehend berichteten wieder gesehen (siehe jedoch weiter unten S. 516). In weniger ausgeprägter Form ist mir das Krankheitsbild noch zweimal begegnet.

¹⁾ Briessand, *Léçons sur les maladies du système nerveux* (Doiné-Editeur). Paris 1904.

Eine 54jährige Frau, die leidet an einer großen Reihe allgemeiner nervöser Beschwerden, zeigt eine diffuse cyanotische Verfärbung der Füße und Unterschenkel bis zur Mitte; die Färbung bläßt nach oben zu allmählich ab und verschwindet auf Druck. Die Haut ist dünn, an einzelnen Stellen wie zerkrüftet. Sie klagt über stechende Brennende, beim Herabhängenlassen stürze wunde Schmerzen. Diese Verfärbung hat sich in den letzten Monaten ganz allmählich entwickelt. Im Gebiete der cyanotischen Verfärbung findet sich eine deutliche Hypalgie für Nadelstiche und Wärmereize während das Gefühl für Berührungen nahezu intakt ist. Schließlich, elektrische Verhältnisse völlig normal. Die Hände sind normal. Keine kardialen Veränderungen, Urea frei von Eiweiß und Zucker. Nach ihrem Angeben leiden sie auch an flüchtigen Schwellungen im Gesicht und den Zehen.

Ich habe die Patientin nur einmal untersuchen können. Die Kombination der allmählich entstandenen Asphyxie mit der im Gebiet der vasomotorischen Störungen vorhandenen Sensibilitätsstörung ist auch hier charakteristisch. Daß nur die Füße betroffen sind, ist ohne wesentliche Bedeutung. Interessant ist die Kombination mit flüchtigen Ödemen. An einzelnen Stellen erinnert das Bild der Haut an die *Atrophia cutis propria*, und auch Erythromelalgiesymptome waren beigemischt.

Auch der folgende Fall, den ich kürzlich sk. gehört hierher.

Eine 25jährige junge Dame gibt an, daß sie seit vielen Jahren an Ovarialanomalien der Hände leidet. Die Hände sind fast immer klein und kalt, gelegentlich werden sie rot, Meistens dabei aber doch kalt, eine Synkope beide wurde sie beobachtet. Allmählich sind die Hände auch größer geworden, sie muß jetzt größtes Hantelohrer wie früher tragen. Sie ist zu den Händen wie zu der Nase und den Ohren äußerst kühlensensibel, bekommt unter Einwirkung der Kälte Schmerzen, und die Cyanose, die aber auch in der Wärme vorhanden ist, nimmt zu. Niemals sind Parästhesien eingetreten. Die Mutter der Patientin leidet an Diabetes, Geschwister sind gesund. Sie hat seit der Jugend Kopfschmerzen, die nach einem Sturz aus dem Schlitten für längere Zeit sehr eigensinnig hatten, es bestehen seit der Zeit auch allgemeine nervöse Beschwerden. Schon immer hat sie Rastlosigkeit nach dem Kopf gehabt. Einmal bekam sie nach Kriebelstuhl einen räuschartigen Zustand, hatte Hitze im Kopf, Klopfen in den Schläfen. Das Leiden der Hände hat sich ganz allmählich entwickelt aus Meistens Anlässen heraus. Die Kranke macht von selbst darauf aufmerksam, daß sich allmählich das Gefühl in ihren Händen abgestumpft habe, daß sie kleine Gegenstände nicht deutlich fühle, die Temperatur des Badewassers nicht erkennen könne. Die Hände sind bei der Untersuchung im warmen Zimmer dunkelblau, kalt, sehr plump, gelähmt, die Finger unregelmäßig wärmer, distal so dick wie am Ansatz. Es findet sich eine ausgesprochene Herabsetzung der Sensibilität für alle Qualitäten an beiden Händen, proximalwärts vom Handgelenk allmählich zur Norm übergehend, die Ohrmuschel und ebenfalls kalt und cyanotisch, an den Füßen ist nichts Besonderes. Keine Zeichen von Veränderungen der Trophik an der Haut, nur daß diese eigentümlich weich-elastisch und gelblich sich anfühlt und aussieht. In heißem Wasser wird die Farbe der Hände annähernd normal, aber nur vorübergehend. Die übrige Untersuchung hat ein negatives Resultat.

Hier hatte sich also bei einer von jeher neuropathischen Kranken — insbesondere ist offenbar stets eine vasomotorische Labilität vorhanden gewesen, wie der räuschartige Zustand nach Kriebelstuhl zeigt — ganz

allmählich eine Akroaephysie mit ausgesprochenen Sensibilitätsstörungen, die durchaus keinen hysterischen Charakter tragen, entwickelt; dazu war noch eine nicht sehr erhebliche aber ganz charakteristische, nur die Weichteile betreffende Größenzunahme der Finger gekommen, wie wir sie bei den Fällen der nächsten Gruppe alsbald noch näher kennen lernen werden.

Eine sehr wichtige hierhergehörige Beobachtung verdanken wir Barker und Staden.

Ein 41jähriger Mann, der niemals luetisch gewesen ist, aber Nerven- und Alkoholismus getrieben hatte, erkrankte vor 10 Jahren an einem jetzigen Leiden und trat in knirschplättigen Schmerzen in den Beinen, die kamen und gingen, es schied sich im wesentlichen zunächst um Umfang hin- und her, gekündigt zu haben. Diese Beschwerden verschärften sich fünf Jahren. Später kam es schließlicb auch zu Taubheit in den Fingern, ohne daß diese ihre Farbe änderten. Allmählich trat dann ein taubes Gefühl in den Zehen und Füßen ein. In den letzten Wochen vor der Aufnahme wurde die Farbe der Füße tief blauschwarz und es traten Ernährungsstörungen auf, indem teils die Haut, teils die Nagel und Knochen an einzelnen Stellen sich, ohne daß Schmerzen vorhanden waren, lösteten. Bei der Untersuchung waren beide Füße und Unterschenkel cyanotisch, zum Teil mehr rot und heiß, die Fußrücken pulsierten, wenn auch rechts etwas schwächer, an den ersten bis dritten Zehen des rechten Fußes bestanden Ulcerationen, auf dem Ballen der linken großen Zehe lag sich ein rundes, scharf umschriebenes Geschwür. Knie- und Achillessehnenreflexe vorhanden. Es bestand eine Sensibilitätsstörung, die sich von den Füßen bis zur Mitte des Unterschenkels ausdehnt und alle Qualitäten, am wenigsten ansehnend das Lagegefühl, betrifft. Nipergals Atrophien oder Lähmungen. Die Cyanose erstreckt sich später auch auf die Hände bis zum Handgelenk. Sechs Wochen nach Beginn der Beobachtung lautet der Status: Ausgesprochene Cyanose des rechten Fußes, weniger ausgesprochen der linken. Hände kalt und cyanotisch, keine Sympa- auch nicht bei Erwärmen in Eiswasser. Arterienpulse überall vorhanden; die trophischen Störungen im Rückgang begriffen, nachdem die Entzündungen der ersten und zweiten Zehe rechts entfernt waren. Histschmerz normal.

Die Autoren fassen die beobachteten Symptome in folgende Kategorien zusammen: Cyanose und Schwellung der Weichteile, Parästhesien und Anästhesien, die in ihrer Ausdehnung nicht irgendeinem Nerven entsprechen, keine Schmerzen, dystrophische Vorgänge an Haut und Knochen, z. T. unter dem Bild des *Malum perforans pedis*. Lokalisation: Finger, Zehen, Füße, Unterschenkel. Verlauf chronisch-progressiv, nicht paroxysmal.

Man wird ohne weiteres zugeben müssen, daß der Fall die größte Ähnlichkeit mit dem meinigen und dem von Nothnagel hat. So fassen ihn die Autoren selbst auch auf, indem sie andere in Frage kommenden Diagnosen erörtern und abweisen. Es kann sich weder um *Tabes* noch um *Syringomyelie* noch um eine diabetische oder senile Gangran handeln. Auch eine periphere Neuritis im gewöhnlichen Sinne liegt nicht vor, obwohl der Alkoholismus als ätiologischer Faktor vorhanden ist; es fehlen Atrophien, Lähmungen, Schmerzen, und die Ausbreitung

der Sensibilitätsstörung weist auch nicht auf die peripheren Nerven. Von meinem und Nothnagels Fall weicht der vorliegende durch die Gangrän ab; damit rückt er der Raynaudschen Krankheit noch näher. Barker und Sladen rechnen noch einen Fall von Legroux in diese Gruppe, bei dem nach Kälteeinwirkung permanente lokale Asphyxie und schließlich Gangrän eintrat. Ich habe diesen Fall schon früher erwähnt. Jedenfalls fehlt ihm das Symptom, das sich einer Erklärung am schwierigsten zugänglich erweist, die eigentümliche strumpf- oder handschuhartige, an allen vier Extremitäten nachweisbare Sensibilitätsstörung. Ich lenke dieser Form der Sensibilitätsstörung noch zweimal, erstens in einem gleich genauer zu beschreibenden Fall von Akro-asphyxia chronica hypertrophica und zweitens bei einem Fall begegnet, bei dem sie in ganz derselben Art und Ausdehnung wie bei den in Rede stehenden Fällen sich neben sklerodermatischen, alle Akro-lutreffenden Veränderungen fand. Auf diesen Fall komme ich im nächsten Kapitel zurück; hier bestand keine Cyanose; sie kann demnach in der Tat nicht die Ursache der Sensibilitätsstörung sein. Eine psychogene Grundlage muß ich für meine Fälle durchaus ablehnen, nichts ließ in ziemlich langer Beobachtungszeit daran denken. Wir begegnen einer derartigen Sensibilitätsstörung außer bei der Hysterie nur noch bei der Syringomyelie. Schlesinger¹⁾ faßt seine Auseinandersetzungen über das Vorkommen derartigen „centraler“ im Gegensatz zu den segmentalen Sensibilitätsstörungen dahin zusammen, daß er ihr Vorkommen, wie es besonders Brixaud verteidigt hat, zugibt, wenn es auch den gegenüber der radikulären Sensibilitätsstörung viel selteneren Typus darstellt.

Damit haben wir wieder einen Hinweis auf gewisse Ähnlichkeiten dieser Formen mit der Syringomyelie. Aber es ist doch andererseits völlig unmöglich die Krankheitsform in der Syringomyelie aufgehen zu lassen. Wir müssen uns demnach vorläufig immer noch begnügen, diese Fälle zu registrieren. In Rücksicht auf die Permanenz ihrer Symptome scheinen sie aber geeignet, die Lücke zwischen den vasomotorisch-trophischen Neurosen und der organischen, diesen am nächsten stehenden Syringomyelie anzufüllen. Die Differentialdiagnose gegenüber der Syringomyelie wird demgemäß auch Schwierigkeiten machen können. Einen Fall des Jourdons beschreibt, möchte ich in dieser Hinsicht noch zitieren. Es bestand neben einer kongenitalen Cutis laxa und Hyperflexibilität der Finger eine ausgesprochene chronische Cyanose der Hände, Unterarme und Ohren, und eigentümlich gliedris angeordnete Sensibilitätsstörungen an den Armen und am Kopf, sowie an den Beinen vom Knie abwärts, mit Ausnahme der Füße und eines ohnmalen Streifens an der Hinterseite der Unterschenkel.

¹⁾ Schlesinger, Die Syringomyelie, II. Aufl., S. 37.

Anscheinend keine Motilitätsstörungen. Ob hier die Diagnose Syngomyelie zu Recht besteht, erscheint mir zweifelhaft. Einen Fall, der vielleicht hierher gehört, der aber leider nicht genau genug beschrieben ist, teilt Mager mit. Es handelt sich da um ein 15-jähriges Mädchen, bei der an beiden Händen dauernd eine distalwärts zunehmende bläuliche Verfärbung besteht; ebenso ist die Haut vom Knie abwärts blauröt. Die Teile sind kühl; in den cyanotischen Partien entsteht bei Druck ein weißer Fleck, der nach 1–2 Minuten in der Mitte hellrot wird, nach 10–15 Minuten ist alles verschwunden. Es besteht ferner eine leichte Hypästhesie in den peripheren Gebieten der unteren Extremitäten. Vorübergehend soll Incontinentia urinae dagewesen sein und auch leichte motorische Störungen. Der Autor spricht von einer vasomotorischen Neurose ganz im allgemeinen, erwähnt auch in der Krankengeschichte einige hysterische Stigmata. Die Hauptzüge des Akroasph. chron. anaesth. sind vertreten, aber ich reibe den Fall hier doch nur mit einer gewissen Reserve ein.

Kartje beschreibt folgenden Fall:

Ein 12-jähriger Junge leidet seit 1½ Jahren an einer Cyanose der Hände, die in kalter Jahreszeit stärker wird, nie Schmerzen, aber ausgeprägtes Kältegefühl. Immer leicht erregbar, besonders aber in heißer Zeit, viel Kopfschwindel, manchmal verbunden mit Übelkeit oder auch mit Erbrechen. Status. Starke Cyanose der Hände, distalwärts zunehmend, die Cyanose reicht 2–3 cm über das Handgelenk hinaus. Druck ruft einen weißen Fleck hervor, der langsam verschwindet. Hände sehr kalt; Haut der Hände etwas ödematös, erhebliche Herabsetzung der Kapillarkleitfähigkeit für alle Qualitäten, die sich soweit erstreckt als die Cyanose. An den Fäßen viel geringeres Grad von Cyanose. Nur Synkope, in kaltem Wasser reichten die Hände ein fast schwarzes Aussehen an.

Kartje gibt an, noch drei ähnliche, weniger ausgeprägte Fälle bei Kindern beobachtet zu haben. Er glaubt in diesen Fällen noch nach zwei Richtungen hin besondere Beobachtungen gemacht zu haben. Er fand regelmäßig den Blutdruck im Stehen niedriger als im Liegen z. B. A. brachialis nach Riva Rocci im Stehen 105, im Liegen 110, nach Gärtner 75 im Stehen, im Liegen 90. Wie man sieht, sind die Differenzen aber recht unerheblich, ich glaube nicht, daß man bei den vielen Fehlerquellen auf vereinzelte derartige Untersuchungen Wert legen kann. Ebenso wenig überzeugend ist eine weitere Angabe Kartjes über Erhöhung der elektrischen Erregbarkeit, die er in diesen Fällen gefunden haben will: KSZ 1 Ma, ASZ 2,5 Ma, AOZ 2,6 Ma, KOZ 5 Ma, wobei besonders der niedrige Wert der KOZ auffällt, der an Tetanie erinnert; das bedarf jedenfalls weiterer Untersuchungen.

Eine chronisch sich entwickelnde Asphyxia findet sich ferner in einer zweiten Gruppe von Fällen, die das

Gemeinsam haben, daß neben dieser Asphyxie noch erhebliche trophische Störungen vorhanden sind; sie betreffen im wesentlichen die Weichteile und führen zu deren hypertrophischer Entwicklung. Damit wird ein Krankheitsbild geschaffen, das in vieler Beziehung sehr an die Akromegalie erinnert, und es sind auch offenbar hierfür gehörige Fälle als Akromegalie beschrieben worden.

In seiner Monographie, die Akromegalie, berichtet Sternberg über einen solchen Fall. Er sagt: „Eine sehr seltene Form von Pachydermie entsteht manchmal an allen Extremitäten und der Haut des Gesichts nach lokaler Asphyxie. Im Winter werden die Hände und Füße kalt, bläulichrot marmoriert, unterempfindlich und ungeschickt. Allmählich entwickelt sich eine Verdickung des Bindegewebes und mit ihr ein dem Myxödem ähnliches Bild, doch ohne die Allgemeinerscheinungen. Einen solchen Fall demonstrierte öfters Kaposi in der Person einer Wärterin, hier hatte die Krankheit zweifellos durch die Verdickung der Extremitäten und die Veränderung der Gesichtszüge — auch die Gesichtshaut nimmt an dem Prozesse teil —, eine gewisse Ähnlichkeit mit der Akromegalie, doch fehlen gänzlich Knochenveränderungen, Augenstörungen, Menopause und sämtliche Allgemeinveränderungen und ist andererseits die Färlung der Haut und die Zunahme der Störung im Winter höchst charakteristisch.“ Sternberg bemerkt noch, daß M. Hoffmann einen vollkommen analogen Fall als Akromegalie veröffentlichte. Auch schon vor Sternberg hatte Souza-Leite darauf aufmerksam gemacht, daß gewisse vasomotorisch-trophische Störungen an den Extremitäten, die er allerdings der Erythromelalgie zurechnete, eine Akromegalie vortäuschen können. Er berichtet von einem 44jährigen Fräulein, das eine ziemlich erhebliche Zunahme des Volumens der Hände und Finger aufwies. Diese Teile waren rot mit einigen fahlen Flecken, zeitweise bestanden Schmerzen und ein gewisser Grad von Taubheitsgefühl; außerdem war eine geringe dorsale Kyphose vorhanden. Aber es finden sich doch sehr wichtige Abweichungen vom Bilde der Akromegalie. Selon die Art der Vergrößerung der gipfbildenden Teile ist nicht die der letztgenannten Krankheit. Die Finger sind an den Spitzen schmaler als an ihrem Ansatz, die ganze Hand macht den Eindruck der Tatze. Es besteht ferner, was wir noch nicht erwähnten, eine ausgeprägte kutane Unempfindlichkeit der letzten Gliedabschnitte zugleich mit einer Störung der Larcempfindlichkeit. Des weiteren fehlen alle übrigen Erscheinungen der Akromegalie; der Unterkiefer ist nicht vergrößert, die Zunge ist nicht dick, die Lippen sind oben etwas schmal, die Nase ist nicht unförmig, auch sonst ist der Gesichtschädel normal gebildet. Die Kyphose ist sehr wenig ausgesprochen, die Knochen sind nicht verdickt oder verbreitert, es besteht kein dauernder erheblicher Kopfschmerz, und das

Selten ist normal. Wir wenden Souza-Leite gewiß Recht geben, daß dieser Fall keine Akromegalie darstellt. Freilich ist er auch keine Erythromelalgie.

Bemerkenswert und wichtig ist für uns besonders die Tatsache, daß sich hier wieder eine Anästhesie findet, die genau der entspricht, die wir bei der ersten Gruppe der Akroasphyxie beschrieben haben. Die Beobachtung Souza-Leites bildet in dieser Beziehung ein Mittelglied zwischen den Fällen der ersten und den in Rede stehenden der zweiten Gruppe.

Ganz identisch ist der folgende Fall eigener Beobachtung, den ich eben jetzt (Mai 1912) zum erstenmal gesehen habe.

Der jetzt 42-jährige Mann, der früher immer gesund gewesen sein will und aus gesunder Familie stammen soll, gibt an, daß er im Jahre 1881 durch einen Sturz sich eine Verletzung der rechten Hand zugezogen habe. Daran haben sich im Laufe der nächsten anderthalb Jahre zahlreiche an verschiedenen Stellen der Hand sich etablierende, mit hohem Fieber einhergehende Eiterungen angeschlossen, die als Osteomyelitis angesprochen wurden. Im Verlauf dieser Zeit verlor er außerordentlich an Gewicht. Ganz allmählich haben sich dann — einen gewissen Zeitpunkt vorang der Kranks nicht angegeben — die Veränderungen an den Händen und Füßen eingestellt, die jetzt der Gegenstand seiner Beschreibung sind. Die Farbe der Hände wurde ganz allmählich, und ohne daß je Anfälle von Weißwerden dazwischen traten, immer mehr blau. Die Hände wurden dabei kalt und ungeschickt; dazu gesellte sich eine Vergrößerung der Hände, so daß er jetzt keine passenden Handschuhe bekommt. Das ist der eigentliche Grund, weswegen er jetzt unsere Hilfe sucht. Wegen der Kälteempfindlichkeit der Hände trauert er Handschuhe, die er aber wegen der Deformität der Hände besonders anfertigen lassen muß; dazu bedarf er eines Ateliers für seine Beduile. Er glaubt ferner, daß die Empfindungslosigkeit der Hände abgenommen habe, hauptsächlich die Wärmeempfindung; er könne sehr heißes Wasser anfaßig gut vertragen. Schmerzen haben nie bestanden. In den Füßen haben sich nach und nach ganz ähnliche, aber viel weniger erhebliche Anomalien eingestellt. Das Gesicht soll sich gar nicht verändert haben, er hat jetzt wie schon seit der Jugend blaue und wieder Kaputtschmerzen, nie Erbrechen, nie Schüttelfröhen, jählt oft schlecht; bemerkenswert ist auch, daß er in Gegenwart anderer Leute seit über nicht Urin lassen kann; er ist also jedenfalls von jeher neuropathisch. Sehr kräftiger Mann, dessen innere Organe in jeder Beziehung normale Verhältnisse darbieten. Die Hände sind in beide dunkelblau verfärbt; an verschiedenen Stellen zeigen sich dazwischen retcyanotische Flecken. Die Verfärbung reicht vom Handgelenk aus in zunehmender Stärke bis zum Gans des unteren Drittels des Unterarms. Die Temperatur der Haut ist stark herabgesetzt, dabei recht ungleichmäßig; berührbare Stellen zeigen Differenzen von vielen Graden. Die Hände sind sehr stark vergrößert; plump und klug; Handrücken und Handfläche wie geölbert, die Haut dabei etwas spärlich verhärtet, aber weich, sekundär gelblich. Die Finger sind im Verhältnis zur Länge viel zu dick, wurstförmig; distalwärts fast so dick, wie am Ansatz, so beträgt z. B. die Länge des rechten Mittelfingers 90 mm, der Umfang des Mittelfingers 81, der Endphalanx 82 mm, während bei einem normalen Finger die Vergleichswerte 103, 68, 38 mm sind. Die Nägel sind zugewinkelt, aber nicht, dick, gelblich.

Die Abbildung auf Tafel XVI gibt, so hoffe ich, ein anschauliches Bild dieser Veränderungen, die an den Füßen ähnlich nur viel weniger ausgeprägt vorhanden sind; die Arterien an den Händen und Füßen pulsieren normal, der Blutdruck ist in der

Akrobathie normal. Der Motorik ist an keiner Stelle geschädigt, auch das elektrische Verhalten entspricht vollkommen der Norm. Dagegen findet sich wieder die eigentümliche strömpfartige, alle Qualitäten, aber besonders die Temperaturempfindung betreffende Sensibilitätsstörung. Ob der Kranke so vielleicht ein wenig stärker akzentuiert, als der realen Verhältnisse entspricht, wage ich nicht zu entscheiden, daß sie ganz und gar psychogenen Ursprungs ist, kann ich nicht ansehen. Das Röntgenbild läßt erkennen, daß die Knochen im wesentlichen intakt sind, die Vergrößerung ist so gut wie ganz allein auf Rechnung der Weichteilhypertrophie zu setzen. Der übrige Befund ist völlig negativ; insbesondere fehlt jedes Symptom einer Akromegalie.

Wir haben hier einen typischen Fall von Akroasphyxia chronica hyperthymophora von uns. In ätiologischer Beziehung möchte ich nicht unterlassen auf die vorausgegangene schwere Infektionskrankheit (Osteomyelitis), die zahlreiche im Status nicht erwähnte Narben (am Sternum und an anderen Stellen) produziert hat, aufmerksam zu machen. Das Bild der Hände und Füße erinnert auch in diesem Fall so an Akromegalie, daß von hervorragender klinischer Seite diese Diagnose in der Tat gestellt wurde. Ich glaube nach dem früher Gesagten, diese Diagnose nicht noch einmal durch ausführliche Darlegungen zurückweisen zu müssen. Auch daß Syringomyelie nicht vorliegt, halte ich für sicher: in dieser Beziehung ist es wieder die eigentümliche Sensibilitätsstörung, die unsere diagnostischen Erwägungen in diese Richtung leitet; nach das Bild der Hände erinnert gewiß an die Main succedente der Syringomyelie; aber alle anderen Symptome des spinalen Leidens fehlen. Es ist daher notwendig, in diesen Fällen ein besonderes Krankheitsbild zu sehen.

Sehr ähnlich ist ferner der schon erwähnte Fall von Hoffmann:

Ein 25-jähriges Mädchen bemerkt schon in ihrem sechsten Lebensjahre, daß ihre Hände im Winter vorübergehend dicker werden, während sie im Sommer abschwellen. Seit zehn Jahren bestehen dauernde Beschwerden, im Sommer 1885 zunächst traten an allen Fingerspitzen Geschwüre auf, auch Hände und Füße vergrößerten sich darauf, auch das Gesicht wurde dicker. In den Jahren 1886–1889 hatte sie mehrfach wiederholt Geschwüre am Handrücken durch Erfrieren, jetzt sind die Hände außerordentlich hart und fester, blauer verfarbt und sehr kühl, die Verhärtung erstreckt sich bis zur Form der Verdickung am Untersarm. Diese Teile sehen wie tüchtig durchgetrocknet aus; die Vergrößerung beruht zum großen Teil auf Weichteilhypertrophie, es besteht keine Verknöcherung, und die Finger lassen sich zu. Patientin klagt viel über Kälte in den Händen, es besteht kein Jucken. Ähnliche Veränderungen finden sich an den Füßen, auch hier Cyanose, Kälte, Hypertrophie der Weichteile, aber keine Verknöcherung und keine Beteiligung der Knochen an der Größenzunahme. Keine Vergrößerung des Unterkiefers, die Stirn niedrig, etwas Hohlback, Augenbühnenränder ziemlich stark. Von der unteren Stimmgegend aus deckt sich unter Freilegung der Nase und Mundgegend eine cyanotische Verfärbung und Verhärtung über die übrigen Teile des Gesichtes aus, die Nase ist gewöhnlich, die Zunge ist dick, keine deutliche Kypnose. Anfalls- und Pulsation auf Petrositis dagegen wenig, spüre nicht mehr, Menstr. regelmäßig.

Hoffmann setzt den Fall in Parallele mit dem eben zitierten von Souras-Lette, aber er hält die Abtrennung dieser Fälle von der

Akromegalie für unzulässig. Wir werden ihm darin nicht folgen können, dieselben Gründe, die in Souza-Leites und in meinem Fall gegen die Diagnose Akromegalie sprechen, liegen auch in Hoffmanns Fall vor.

Eine weitere Beobachtung dieser Art, ebenfalls wieder unter der Diagnose Akromegalie, ist von Böttiger mitgeteilt.

Ein 21-jähriger Mann klagt seit Herbst 1897 über Kriebeln, Kältegefühl und Absterben der Hände, weniger der Füße. Dabei werden diese Teile ganz dunkelblau bis schwarzblau, kalt und gegen Temperaturreize unempfindlich. Im Winter 1898/99 steigern sich diese Anfälle und die unangenehmen Empfindungen, ohne daß eigentliche Schmerzen auftreten. Kalte Witterung und Überdampfungslagen der Hände ist besonders ungünstig. Nach und nach wird die Verfärbung dauernd und jetzt erst nehmen die Hände an Volumen zu.

Status praesens: Patient klagt über Parästhesien an den Händen; keine Kopfschmerzen, Kopflänge 58,2, früher regelmäßig 56,5 cm. Deutliche Verwölbung des ganzen Nasen, die jetzt rund und klumpig ist. Die Kiefer sind normal, die Thyreoid ist nicht vergrößert. Die Finger und Hände sind bis drei Finger oberhalb des Handgelenks blau-schwarz, nur hier und da finden sich mangelhafte Flecken, die Grenze ist sehr unregelmäßig. Die Hände sind kalt und trockn, vergrößert, aber das Röntgenbild lehrt, daß die Knochen an der Zunahme nicht wesentlich beteiligt sind. Die Haut der Hände ist dick und stark verhornt, das Gefühl für Berührungen und thermische Reize ist gut erhalten, die Schmerzempfindung ist etwas abgestumpft. Die Füße sollen an Größe zugenommen haben, sicher ist das aber nicht. Die Haut ist auch hier kühl und etwas marmoriert. Böttiger wandte als Behandlung Jodwasser, vegetabilische Dampfbäder und Elektrisieren an. Es trat eine bedeutende Besserung ein, die Crurane ebenso wie die Parästhesien gingen zurück, der Kopfumfang wurde etwas geringer, die Nase dünner, ebenso die Hände, deren Haut nicht mehr so tiefe Falten aufwies. Auch die Stiesel düpi zu groß geworden.

Böttiger hält die Diagnose „Akromegalie“ für absolut sicher und stellt die Diagnose „Akromegalie kompliziert durch Erscheinungen der Raynaudschen Krankheit“. Ich möchte auch hier meinen behafteten Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose „Akromegalie“ aussprechen. Es fehlen auch hier wieder die allerwichtigsten Symptome: der Kopfschmerz, die Vergrößerung des Unterkiefers, die Kyphose, die Sehstörung, wie überhaupt die Allgemeinerscheinungen der Akromegalie. An der Hypertrophie sind die Knochen nicht wesentlich beteiligt, die vasomotorischen Störungen sind lange Zeit den trophischen vorausgegangen, die Füße sind offenbar überhaupt nur wenig deformiert gewesen; dazu kommt der auffällig günstige Verlauf; nach meiner Ansicht also ist die Diagnose Akromegalie keineswegs absolut sicher, sondern höchst zweifelhaft und der Fall ist mir aller Wahrscheinlichkeit als ein Beispiel der uns hier beschäftigenden Akroasphyxia hypertrophica anzusehen.

Objektive Sensibilitätsstörungen fehlten auch hier nicht ganz, es bestand eine geringe Hypalgesie, freilich ist deren Deutung sehr zweifelhaft, da die Haut der betreffenden Teile stark verhornt war. Daß aber abweisens Raynaudsche Symptome bei echter typischer Akro-

megale beobachtet wurden, zeigt eine Mitteilung Chvosteks, dessen Kranker, neben den sicheren Zeichen der Akromegalie, die Symptome der paroxysmalen Hämoglobinurie in Gemeinschaft mit Raynaudschen Phänomenen darbot.

Wenn wir an die Entwicklung der vasomotorischen Symptome in diesem Fall denken, so werden wir finden, daß hier wenigstens zu Anfang ein gewisses paroxysmales Auftreten dieser Symptome zu konstatieren gewesen ist. Das erinnert also ganz an die Fälle echter Raynaud'scher Krankheit, dazu stimmen auch die abnormen Empfindungen des Kranken, während allerdings Schmerzen fehlten. Wenn wir nun weiter noch bedenken, daß einige Male in den Fällen Raynaud'scher Krankheit auch eine Hypertrophie beobachtet worden ist (am stärksten wohl in dem allerdings auch nicht typischen Falle Rolleston's), so sehen wir, daß der Böttigersche Fall der Raynaud'schen Krankheit ziemlich nahe steht. Abweichend ist neben der Stärke der Hypertrophie besonders auch der Umstand, daß im weiteren Verlauf der Krankheit die vasomotorischen Symptome ganz stationär wurden, dazu kommt das Fehlen von Schmerzen, von Synkope, von Gangrän. Im ganzen stellt er wieder einen unserer Übergangsfälle dar. Er lehnt sich in vielen Zügen an den Raynaud'schen Typus an, während er in anderen stark abweicht und sich der hier abgehandelten Gruppe annähert.

Unter dem Titel „zwei bemerkenswerte Fälle symmetrischer, purpurfarbiger, öckiger Hauthyperämie und Induration“ hat Hutchinson wohl hierher gehörige Beobachtungen veröffentlicht. Er fand bei einem älteren Mann an den Fingern und Zehen ziemlich große, erhabene, höchst eigentümlich purpurfarbene, dauernde Flecke, diese dehnten sich allmählich aus, es bestand eine Verdickung der Haut an diesen Stellen, eine Neigung zur Geschwulstbildung lag nicht vor. Der Patient starb nach 5 Jahren, während dieser Zeit hatte sich die Hautaffektion immer weiter ausgedehnt. In zwei anderen Fällen hat er ähnliches ebenfalls bei älteren Männern gesehen. In keinem Fall handelte es sich um Frostheulen, es bestand kein Defekt im Kreislauf, die Färbung war offenbar durch einen Zustand dauernder Erweiterung und Schwächung der Venen bedingt, es war keine Pigmentfärbung, da sie auf Druck sofort abblähte.

Einen in dieser Beziehung hierher gehörigen Fall hat Meyer publiziert, ich habe ihn schon an anderer Stelle mitgeteilt und verweise hier nur noch einmal darauf, daß es sich auch da um eine Hypertrophie der gipfellosen Teile in Verbindung mit vasomotorischen Störungen handelt.

In diese Kategorie möchte ich nun auch den folgenden Fall eigener Beobachtung rechnen.

G., 34jährige Frau, leidet viel an Kopfschmerzen, meist im Hinterkopf, als paar Wehen hat sie intensive Kopfschmerzattacken, sie wacht dann mitten in der Nacht auf, hat vor dem Aufstehen eine bunte Visionen, die dauert eine halbe Stunde, dann ist der Kopfschmerz da; es sitzt mehr links, hält 24 Stunden an, löst sich mit Erbrechen. Diese Kopfschmerzen bestehen von Kälte her, auch das Mutter und eine Taube litten an typischer Migräne. Pat. ist im ganzen sehr nervös, leicht aufgereg, ängstlich, weint leicht, ist ängstlich, hat nachts Horripilationen, häufig Parästhesien, als ob ihr Wärmehäutchen über den Körper liefen. Als Kind hat sie eine Gehirnhautentzündung durchgemacht, im Alter von zehn Jahren einen Typhus. Seit anderthalb Jahren bemerkt sie eine Veränderung an den Fingern, solange hatte sie immer Krämpfe in den Fingerspitzen, dann wurden diese allmählich blaurot, kalt und vergrößerten sich. Allmählich sah auch die Größe der Hände augmentieren haben, sie mußte eine erheblich größere Handschuhschneider tragen. Als der Mann einmal nach mehrmonatlicher Abwesenheit nach Hause kam, fiel ihm die Größenzunahme der Hände besonders auf. Die Krämpfe hatte sie Schmerzen in den Fingern, auch das Krabbeln hat, nachdem es einige Monate ausgeblieben hatte, aufgehört. Niemals ist ein Bläuen der Hände beobachtet worden.

Status praesens: Beide Hände sind bis zur Handwurzel dunkelblau, cyanotisch verfärbt, die Färbung nimmt distalkwärts zu, sie ist eine permanente und auch im warmen Zimmer dauernd vorhanden. Die Hände sind kühl, Pat. hat in ihnen auch subjektiv immer ein Kältegefühl. Die Finger der Hände sind im Vergleich zur Handwurzel auffällig lang, dabei nicht besonders breit und auch nur in normaler Weise sich ausweitend. Die Haut ist über dem Handrücken und an den Grundphalangen stark gedünnt, wie intensiv mottig, weniger deutlich ist dies an den Endphalangen, die Haut ist dabei nicht verhärtet oder verdickt, die Volumensvermehrung ebenso wie die Verfärbung ist links etwas stärker ausgesprochen als rechts, die Nägel sind stark lang gestülpt, sonst normal. Nicht nur passiv zu, es ist die Färbung der Hände keine gleichmäßige, vielmehr weist die Haut zahlreiche weiß-weiße Narben erscheinende Streifen und Flecken auf. Die Sensibilität und Motilität ist vollkommen intakt, sämtliche Finger sind im ersten Interphalangealgelenk etwas deklariert, und die Finger sind im ganzen etwas etwas abnorm. Die Stellungnahme läßt sich leicht einnehmen, kehrt aber immer wieder zurück. Die Sensibilität ist an der rechten Hand herabgesetzt, aber ebenso an der ganzen rechten Körperhälfte, die Motilität ist intakt, die Füße sind kalt und etwas cyanotisch, aber nicht vergrößert, im übrigen ergibt die Untersuchung normale Verhältnisse, im speziellen ist das Gesicht nicht pathologisch getönt, das Sehen ist intakt, der Puls ist etwas langsamer, meist zwischen 61 und 68, die Schilddrüse ist nicht zu fühlen. Es besteht eine geringe Kyphose im Dorsalteil, die inneren Organe sind normal, keine Lungen-, Herz- oder Nierenerkrankung. Die ein halbes Jahr fortgesetzte Beobachtung ergibt keine wesentliche Veränderung, vielleicht eine geringe Besserung der Cyanose.

Wir haben es hier mit einer Kranken zu tun, bei der zunächst einmal sicher eine Hysterie und Hemiparesis vorliegt. Daneben bestehen an den Händen wieder die Zeichen einer vasmotoren-trophischen Veränderung, es hat sich hier allmählich unter geringen Parästhesien eine erhebliche Cyanose und eine deutliche Volumensvermehrung der Hände und Finger ausgebildet. Objektive Sensibilitätsstörungen fehlen ganz. Symptomatologisch haben wir hier also einen Zustand, der dem gleicht, den wir in den anderen Fällen dieser Gruppe kennen konnten. Es fragt sich nur, ob wir bei der sicher vorhandenen Hysterie diese Symptome ein-

isch als hysterische auffassen dürfen. Ich kann da nur die Erwägungen wiederholen, die ich schon mehrfach im Laufe meiner Untersuchungen angestellt habe, sie liegen darauf hinaus, daß eine Entscheidung dieser Frage zu den allerschwierigsten gehören kann, daß wir aber nur dann das Recht haben, von hysterischen Symptomen zu sprechen, wenn diese das hysterische Stigma deutlich an sich tragen. Auch im vorliegenden Fall glaube ich nicht berechtigt zu sein, diese Akroasphyxie als eine hysterische anzusprechen.

Zu derselben Auffassung bekennen sich Gagne et Souques in ihrem Fall. Es handelte sich da um einen Mann, der die ausgesprochenen Symptome der Hysterie aufwies: hysterische Anfälle, schwere sensorisch-sensible Störungen. Dieser zur Zeit der Untersuchung 25jährige Mensch hat außerordentlich große und breite Hände, die zwar für gewöhnlich eine nahezu normale Farbe haben, aber unter dem Einfluß der Kälte, des Herabhängenlassens, der Erregung tief cyanotisch werden; die Cyanose erstreckt sich bis drei Querfinger breit über das Handgelenk. Die Hände sind außerordentlich kalt, was auch thermometrisch festgestellt wird (Hauttemperatur 29,6° gegenüber der normalen von 33,5°). Es besteht Kriebeln, Brennen, Stechen in den Händen und ihre Kraft ist herabgesetzt. Auch die Füße sind sehr groß, geschwollen, cyanotisch; seine früheren Stiefel sind ihm zu klein geworden. Pat. hatte vor zwei Jahren eine einfache Pleuritis, jetzt besteht nur leichte Bronchitis. Allgemeinzustand gut. Gagne et Souques schließen eine Ostéopathie hypertrophique pneumique ebenso aus wie Akromegalie, Pagetische Krankheit, Erythromelalgie, betonen die nahen Beziehungen zum Raynaud und verweisen die Abhängigkeit der trophischen Störungen von der Hysterie ebenso wie sie auch die Annahme zurückweisen, daß die trophischen Störungen einfach die Folge der vasomotorischen sind.

Crocq hat zweimal ähnliche Erscheinungen beobachtet: „In zwei Fällen von Hysterie bestand Cyanose der Hände, die sich auf die Vola erstreckte, permanent war und keine erheblichen Schmerzen machte, außerdem war Hypothermie vorhanden, Gangrän, Ödem, Geschwürsbildung, Parosé, Sensibilitätsstörung, lokale Synkope fehlten. Der Zustand war permanent.“ Hier lagen also nur vasomotorische Phänomene, nicht auch trophische vor. Crocq faßt die Störungen als hysterische auf und differenziert sie vom *Oedème bleu* und von den Raynaudschen Symptomen.

Das Verhältnis, in dem in dieser Gruppe die vasomotorischen zu den trophischen Störungen stehen, ist wieder nicht sicher klarzustellen, es liegen zwar auch sonst Anhaltspunkte dafür vor, daß langsam sich entwickelnde und lange bestehende Asphyxien zu allmählichen und nicht sehr bedeutenden Veränderungen der Ernährung in den cyanotischen Teilen führen können. Eine erheblichere Volumens-

vermehrung, wie sie in den schweren Fällen dieser Gruppe vorkommt, wird man aber bestimmt nicht auf die vasomotorischen Störungen beziehen dürfen, und auch hier wieder besteht kein Parallelismus der Intensität der vasomotorischen und der trophischen Störungen.

Die letzteren föhnen, wie schon erwähnt, in den von Crocq mitgeteilten Fällen, trotzdem es sich auch da um eine permanente Asphyxie handelte. Sie waren auch in einigen Fällen meines Beobachtungskreises gar nicht vorhanden oder eben nur angedeutet. So sah ich bei einem Mann, der an einer schweren Hypochondrie litt, die an der Grenze der hypochondrischen Paranoia stand, eine sehr deutlich ausgebildete Asphyxie der Hände, während die Füße nur wenig beteiligt waren; die Finger erschienen wohl etwas unförmig, aber man war nicht berechtigt, von einem pathologischen Verhalten zu sprechen, zumal von dem unzuverlässigen Patienten eine Auskunft darüber, ob diese Deformität eine erworbene sei, nicht zu erhalten war. Ein weiterer Fall ist der folgende:

Frl. M., 31 Jahre alt, keine hereditäre Belastung; der Vater war 20 Jahr älter als die Mutter, starb an Magnekrebs. Pat. war stets ein verwes Kind, litt an Nichteinander, war leicht ängstlich, schreckhaft, sehr empfindlich, ein gütliches Gemüt kann ihn einen Weiskrautpflanz versetzen. Schwere körperliche Künste hat sie nicht durchgemacht. Seit drei Jahren leidet sie an häufig auftretenden Fingerkrämpfen, namentlich hat sie Frostbeulen gehabt, dagegen sind ihre Hände, schon seit sie sich erinnern kann, immer verfarbt, im Sommer mehr rot, im Winter mehr blau; sobald sie warm wurden, schwinde sie stets stark. Die Cyrcass soll in den letzten Jahren sehr zugunehmen haben, und die Hände sollen auffällig schmäler und ungeschickter geworden sein, so daß sie ihren Beruf als Klavierspielerin aufgeben mußte. Die Fußwunden blühen normal, in letzter Zeit hat sie öfter kalte und etwas blaue Füße. Sie hat niemals Geschwür an den Händen gehabt, ebenso wenig kam je ein Weißwerden der Finger vor. Die Nase wird beide ein und frei. In letzter Zeit hat sie viel Kopfschmerzen, aber kein Erbrechen, keinen Schwindel, keinen Blatauswurf aus Kopf. Seit zwei Jahren kommt gelegentlich eine nicht schmerzhafte Anschwellung der Oberlippe vor, Pat. erwacht damit, die Schwellung verschwindet im Lauf des Tages und entwickelt sich besonders nach Aufregungen.

Status praesens: Die Hände sind abnorm gestaltet, diese Deformität betrifft von Geburt an, in der Familie ist eine solche Eigentümlichkeit im Bau der Hände nicht beobachtet worden. Beide Hände weichen in toto abnormwärts ab, der dritte und vierte Finger sind beiderseits im ersten Interphalangealgelenk etwas beugt und in dieser Stellung fixiert. Der erste Interphalangeum ist beiderseits sehr deutlich eingesunken, die Finger sind beiderseits bis zur Handwurzel tief bläulich, während die Hände selbst wenig cyanotisch sind. Die Haut der Finger ist auffällig glatt und weich, eher etwas dicker als normal, sie ist gut verziehlich, so daß von einer Sklerodactylie nicht die Rede sein kann. In letzter Zeit soll eine geringe Götterannahme der Hände eingetreten sein, doch ist es nicht so erheblich, daß man sie als solcher pathologisch auffassen darf. Die Sensibilität ist intakt, die Nägel zeigen keine erheblichen Veränderungen, sie wachsen langsam etwas unregelmäßig. Die Motilität zeigt nur insofern Störungen, als die Bewegungen der Finger und Hände im allgemeinen etwas matt und kraftlos sind. Eine Lähmung eines einzelnen Muskels oder einer Muskelgruppe ist nicht nachweisbar. Besonders wirken alle Intentionen prompt, die elektrische Zitterbewegung tritt weder qualitativ noch quantitativ

Abweichungen. Das Fäde zeigen nicht Besonderes, ebenso wenig das Gesicht, nur ist die Nase ziemlich etwas rot gefärbt. Es bestehen keine hysterischen Stigmata.

Ich habe die Patientin, die der Privatpraxis des Herrn Prof. Oppenkeim entlassen ist, nur etwa drei Wochen lang gesehen, in dieser Zeit änderte sich der Befund nicht. Es lag, wie noch zur Vervollständigung hervorgehoben sein mag, kein Leiden innerer Organe vor, der Herz- und Lungenbefund war normal.

Hier war also die Ernährung der Haut der Hände nur sehr wenig verändert, trotz sicher sehr langen Bestehens einer permanenten Asphyxie; dagegen lag eine Störung in der Ernährung der Muskulatur auf, es scheinen die ersten Interossei beiderseits atrophisch zu sein. Funktionell und elektrisch war allerdings ein Defekt nicht nachweisbar. Auf das Vorkommen derartiger vasomotorischer Muskelatrophien und ihre Bedeutung ist schon an anderer Stelle eingegangen worden. In den letzten Wochen (Mai 1912) habe ich die Kranke wieder zu Gesicht bekommen. Der Zustand hat sich in keiner Weise geändert, die Cyanose ist ganz dieselbe geblieben, nur die Größe der Hände muß ein wenig zugenommen haben. Jedenfalls ist in dreizehn Jahren keine wesentliche Progression eingetreten; auch die Muskelatrophie hat keine Fortschritte gemacht.

Wie schon diese Aufstellung zeigt, sind Fälle der vorliegenden Art nicht gar so selten. Was meine eigenen seit dem Erscheinen der ersten Auflage gemachten Erfahrungen angeht, so muß ich sagen, daß ich in Fällen länger dauernder und intensiver Akroasphyxie noch gar so selten eine mäßige Größenzunahme der betroffenen Teile gesehen habe; die Knochen scheinen nicht betroffen, am meisten das subkutane Binde- und Fettgewebe. Ich zitiere nur folgenden Fall:

21-jähriger Student. Leidet seit der Jugend an blauen Händen, ebenso wie an Beinen. Klagt über ein ausgeprägtes Gefühl in die Herzgegend; objektiv nichts am Herzen und der Lunge; ist im ganzen nervös. Beide Hände sind bis zum Querfingerknopf über die Handgelenke hinaus aufgetrieben, außerordentlich kalt, und innen etwas bräunlich. Die Hände sind sehr groß, die Haut gedehnt, wie aufgebogen, weiß. Das durch Fingerdruck hervorgebrachte weiße Stöckchen schwindet auffällig rasch. An den Zehen ähnliche, geringere Veränderungen. Sensibilität, Motilität, Reflexe intact.

Ähnliche Fälle sind nicht selten; sie kommen oft genug genöth nicht zur Kenntnis des Arztes. Sie mögen zum Teil auf einer Hypofunktion der Thyreoidea beruhen (Myxoedème frustes von Hertoghe). Ich sah z. B. einen Fall dieser Art bei einer Kranken, deren Mutter ein typisches Myxoedem hatte, während sie selbst nur die Zeichen ungenügender Blutzirkulation in den peripheren Teilen (Hände, Füße, Nase, Ohren) darbot.

Gegenüber diesen wenig ausgeprägten Formen treten die schwereren Fälle genöth an Häufigkeit sehr zurück. Die Literatur des letzten

Dezernium enthält aber einige recht bemerkenswerte Beispiele dieser Form der Akroasphyxia chronica hypertrophica (Kollaritis, Péhu). Kollarits sah einen 65-jährigen Mann, der immer kälteempfindlich war: seine Füße lachten vor 10–12 Jahren, die Nase vor 2 Jahren, die Hände seit einem halben Jahr angefangen anzuschwellen, es bestanden in diesen Teilen Parästhesien und eine ausgesprochene Cyanose. 16 Knochen sind normal. Nervensystem und innere Organe zeigten keine Veränderungen auf.

Der von Péhu mitgeteilte Fall ist folgender:

25-jähriger Mann. Vater nervös, wahrscheinl. Trinker. Mutter litt an Migrän, Schizophrenie liied an Epilepsie. Pat. stets nervös, seit mehreren Jahren Alkoholist. Während des strengen Winters 1888/89 wurden eines Tages die Hände frierend und schwellen an. Seitdem kann er keine Arbeiten mehr verrichten. Die Hände sind etwas groß. Später schwellen auch die Füße in der Kälte an. Seit zwei Jahren verändert sich die Farbe der Hände und Füße, die Haut wird rot violett, zu gleicher Zeit treten dumpfe Schmerzen in Händen und Füßen auf; zeitweise schwarze Abdrückungen während des Sommers, erst im letzten Jahre haben sie auch dann bestanden. Stat. praes. 1. Oktober 1902. Geht etwas zurückgefallen, dabei leicht erregt. Reflexe überall gesteigert. Arme dünn, Handdruck beiderseits etwas matt, pochende Schmerzen in Händen und Füßen. Hände rotviolett, Verfärbung hat bis zur Mitte des Unterarms reichend. Kapillare ist nicht verengt. Bei Fahren der Hände ist rechts, rechts weniger so links. Besonders vergrößert sind die ersten zwei Phalangen. Erste Phalangen normal, so daß die Finger symmetrisch aussehen, das Volumen wechselt etwas. Die Erwärmung des Hautthermometers erfolgt bei der Messung langsamer als in der Norm. Sensibilität der Hände im wesentlichen intakt. Das Blutbild zeigt keine Veränderung. Die Verfärbung der Füße ist geringfügiger, ihr Volumen ist im Liegen nicht vermindert, nur beim Gehen erscheinen sie angeschwollen. Die Ohren sind ein wenig cyanotisch, die Nase ist normal. In der Haut der Hände findet sich namentlich in der Nachbarschaft der Gelenke kleine hirsekorngroße Knötchen, cyanotisch gefärbt, nicht druckempfindlich, die sich ganz allmählich entwickelt haben. Bei Druck auf die cyanotischen Stellen entstehen weiße Flecke, die sehr langsam verschwinden. Ophthalmoskopisch normaler Befund, nur rechts markhaltige Nervenfasern. Es besteht an beiden Lungenspitzen eine leichte Verletzung. Allgemeinbefindl. gut; kein Fieber. Die plethysmographische Fingermessung ließ das Fehlen fast jeglicher Oszillation erkennen. Nächst Synkope beob.

Dieser Fall zeigt alle Charakteristika des Symptomenkomplexes in völlig ausgeprägter Form. Bemerkenswert sind die thermometrischen und plethysmographischen Angaben und die Angaben über das langsame Wiederkehren der Cyanose nach Fingerdruk. Mir schien in meinen Fällen gerade das Umgekehrte die Regel zu sein; darüber bedarf es noch weiterer Untersuchungen.

Hirschfeld hat unter dem Titel: Über Vergrößerung der Hände und Füße auf neuritischer Grundlage drei Fälle berichtet. Es handelte sich um eine symmetrische Vergrößerung der Hände und Füße, in zweien von den drei Fällen bestand eine starke Cyanose, die Nägel waren krallenartig, die Endphalangen waren trommelschlägelartig deformiert, aber die Untersuchung mit Röntgenstrahlen

ergab ganz normale Knochenverhältnisse. Sensibilität bis auf Schmerzen intakt, ebenso Motilität. Zeitweilig traten unter Zunahme der Schmerzen Ödeme auf. In allen drei Fällen bestanden schwere Allgemeinerkrankungen, zweimal ein oberes Oesophaguscarcinom, einmal eine schwere Phthise. Die Sektion ergab in dem am meisten typischen dritten Fall Veränderungen an den peripheren Nerven; diese erwiesen sich als sehr stark verdickt, es bestand eine räumlich beträchtliche Kernvermehrung im Endoneurium und zahlreiche oft recht groß Rundzellenvermehrungen im Epineurium, besonders perivascular. Auch die Wände der kleinsten Arterien waren erkrankt. Die Nervenfasern selbst wiesen keine Veränderungen auf. Auf Grund dieses Befundes, der Druckschmerzhaftigkeit und der ausstrahlenden Schmerzen glaubt Hirschfeld sich berechtigt, von einer Neuritis interstitialis zu sprechen und in dieser die Grundlage für die vasomotorisch-trophischen Störungen zu sehen. Ich will hier auf diese mir durchaus nicht sicher erscheinende Auffassung im einzelnen nicht vorläufig eingehen, alle Bedenken, die ich gegen die neuritische Gangrän geäußert habe, müßte ich hier wiederholen. Aber wir müssen uns wenigstens mit der Frage auseinandersetzen, ob wir diese Fälle unserer Akroasph. chron. hypertroph. zurechnen dürfen. Hirschfeld selbst, dem mein Buch entgangen ist und der auch die sonstige Literatur des Gegenstandes nur sehr unvollständig kennen gelernt hat — er zitiert nur den Fall von Souques et Garne — glaubt, daß sein Krankheitsbild der Osteoarthropathie hypertrophique periphrasique Marie's sehr ähnlich ist. Die Nagelbedernität ist ganz dieselbe wie bei dieser Affektion, ebenso die trommel schlägelartige Auftreibung, letzter auch das ätiologische Moment — es handelte sich wie bei dieser um auf dem Boden eines mit gutturalen Zersetzungen einhergehenden Allgemeineleidens entstandene Veränderungen. Der Unterschied ist der, daß die Knochen nicht beteiligt sind, weswegen Hirschfeld den Namen Dermatohypertrophia vasomotoria vorschlägt. Er bezweifelt, wahrscheinlich mit Recht, daß in allen bisher beobachteten Fällen des Marie'schen Symptomenkomplexes wirklich Knochenveränderungen vorliegen, und glaubt, daß es auch Übergangsfälle gibt; sein zweiter Fall schien ein solcher zu sein. So groß die symptomatische Ähnlichkeit dieser Fälle von Hirschfeld mit den unsrigen ist, so meine ich doch auch, daß man sie in erster Linie in Rücksicht auf die differente Ätiologie abtrennen muß. Auch Péhu verfährt in diesem Sinne. Péhu glaubt für sich ein anderes ätiologisches Moment in Anspruch nehmen zu sollen, die Tuberkulose; für meine Fälle kann ich das jedoch nicht angeben. Übrigens ist auch in Péhu's eigenem Fall die neuropathisch-vasomotorische Disposition sehr ausgesprochen, und auf diese möchte ich in die Mehrzahl aller hieher zu rechnenden Fälle den größten Wert legen.

Ein abgeschlossenes Bild der hier behandelten Krankheitsformen zu entwerfen, geht meines Erachtens bei der geringen Zahl der zur Verfügung stehenden Beobachtungen nicht an. Die Hauptsymptome brauche ich nicht noch einmal aufzuzählen; der chronisch progressive Verlauf der Asphyxie ist neben der dauernden Volumenzunahme das ausschlaggebende Moment. Die erwähnten weniger ausgeprägten Fälle stellen den Übergang zu den gewöhnlichen Fällen der Raynaudschen Krankheit dar. Ein Fall mit Gangrän ist bisher nicht mitgeteilt worden. Die Schmerzen sind meist vorhanden, treten gegenüber den bei Raynaud sonst beobachteten für gewöhnlich allerdings sehr zurück. Die Synkope locale spielt in den ausgeprägten Fällen ebenfalls keine Rolle, kommt aber bei den Zwischenformen vor. Die Art der Cyanose wie die Volumensvermehrung sind recht charakteristisch: die Cyanose ist an den Händen meist stärker entwickelt, ebenso wie übrigens auch die Volumensvermehrung, ist permanent, meist im Anfang von wechselnder Intensität, später weniger Schwankungen unterworfen, reicht bis etwa zur Mitte des Unterarmes, die Palmarfläche der Hand ist weniger befallen. Die Temperatur der Hand ist auffällig niedrig. Häufig besteht Hyperhidrosis bzw. wenigstens eine dauernde Feuchtigkeits der Hände. Die Vergrößerung betrifft nicht die Knochen, sondern die Haut, die aufgedockert erscheint, und wahrscheinlich besonders das Unterhautgewebe. Darauf mag es beruhen, daß die Endphalangen wenig vergrößert erscheinen und das Bild von dem der Trommelschlägelfinger abweicht. Doch kommt auch eine deutliche Vergrößerung der Endphalangen vor, wie die Abbildung auf Tafel XVII zeigt, die überhaupt ein klassisches Bild der hier besprochenen Veränderungen gibt. Die Haut ist nirgends verhärtet, eher weicher als normal, nicht mit der Unterlage verlötet. Das Aussehen der Hände erinnert an die Main succulente bei der Syringomyelie. Die Nägel waren in den bisherigen Fällen normal. Objektive sensible Störungen fehlen mit Ausnahme einiger weniger oben erwähnter Fälle.

Wenn wir von der Differenzierung gegenüber der Raynaudschen Krankheit absehen, ebenso wie von der gegenüber der Akromegalie und der Osteopathie hypertrophante pneumique, alles Punkte, die schon besprochen sind, bleibt diagnostisch nicht viel zu sagen. Es gibt Fälle von chronischer Asphyxie, die sich nicht durch eine kardiale oder pulmonale Affektion erklären läßt, die sich langsam entwickelt, und bei der dauernd irgendwie erhebliche trophische Störungen fehlen. Diese einfache Akrosphyxia ist gewiß nicht sehr selten, aber der Arzt bekommt sie nur gelegentlich zu Gesicht, weil die Beobachtungen ja nur geringfügig sind. Sie leiten zu den Fällen mit geringer Hypertrophie der Hände über, von denen schon oben die Rede war. Wirschubski und Babkin beschreiben solche Fälle bei Kindern. Bei

einem 12jährigen Mädchen Wirschubskis bestand eine Cyanose der Hände seit den ersten Lebensjahren, die Haut war kalt und gedunsen. Sonstiger Befund völlig normal. Ein Bruder der Pat. litt an demselben Leiden. Auch in einem zweiten Fall des Verfassers war die Affektion familiär. In einem meiner Fälle waren bläuliche Ödeme vorhanden. Auch Towle beschreibt eine solche einfache chronische Asphyxie.

Unter der Bezeichnung Akroerythrose hat Bechterew eine Affektion beschrieben, die nach seiner Schilderung als Hauptsymptom eine konstante Rötung des Gesichts und der Extremitäten aufweist. Es handelt sich meist um jugendliche Individuen, die Verfärbung soll mit den Jahren zunehmen. Psychische Momente wirken steigend, ebenso Kälte, Wärme, Neigung des Kopfes. Nur zumeist besteht ein Gefühl der Hitze und der Anschwellung, sonst fehlen sensible Störungen. Oft findet man mehrere Fälle in einer Familie. Es scheint sich um eine angeborene Anlage zur Gefäßerweiterung zu handeln. Es liegt damit ein Gegenstück zur reinen Akrosphixia chronica vor. Stöltzner hat vor Bechterew einen vielleicht hierher zu zählenden Fall unter dem Titel „angeborene Akroangoneurose“ veröffentlicht. Bei dem zweijährigen Kind bestand seit Geburt eine dauernde Röté der Hände, Füße, Nasenspitze und Ohrrand mit erhöhter Temperatur und geringer Anschwellung der betreffenden Teile. Der Zustand besserte sich unverkennbar, es kam nur noch paroxysmal zu den geschilderten Zuständen, die dann 15 Minuten bis einige Stunden dauerten. Bei der Untersuchung bestand neben der beharrten Rötung auch eine mäßige Verdickung der Finger. Die Ausbreitung ist streng symmetrisch, beiderseits bis zu den Hand- beziehungsweise Fußgelenken. Keine Hyperhidrosis, vielleicht etwas Hyperästhesie. Plötzlich lassen die Teile während der Untersuchung ab, nach einigen Minuten kehrt die Rötung zurück. Allmählich soll nach Bericht der Mutter völlige Heilung eingetreten sein.

Die Beobachtung bietet nach verschiedenen Richtungen Interesse. Es scheint sich um einen Reizzustand der Vasodilatoren gehandelt zu haben, der anfänglich chronisch war, später nur noch paroxysmal auftrat. Auch das ist ein auf unserem Gebiet nicht ungewöhnliches Verhalten, daß erst ein Dauerzustand vorliegt, und dann Anfälle eintreten, die schließlich weichen. Eine geringe Schwellung der Weichteile bestand übrigens, also eine Art Akroerythrosis hypertrophica. Alle diese verschiedenen Formen werden gewiß nahe zueinander gehören. In der letztgenannten sehen wir auch wieder Beziehungen zur Erythromelalgie, und wir überzeugen uns immer mehr, daß alle theoretisch möglichen Kombinationen wirklich auch in der Natur in mehr oder weniger seltenen Vorkommnissen realisiert werden.

Die Abgrenzung der Akrosphixie gegenüber organischen

Nervenkrankheiten kann nur im Verhältnis zur Syringomyelie einige Schwierigkeiten machen. Hier fehlt ein sonst in dieser Richtung entscheidendes Moment, das paroxysmale Verhalten. Das Bild nähert sich wie erwähnt, sehr dem der *Main succulente*. Das Fehlen aller motorischen und sensiblen Ausfallsymptome unterscheidet es.

Eine chronische, die gipföden Teile bevorzogene Cyanose findet sich auch bei der *Polycythaemia megalosplenica*. Der charakteristische Blutbefund, die Mikroschwellung unterscheiden diese Form von der hier behandelten.

Hallopeau et Grandchamp sahen einen Fall, bei dem im Verlaufe einer Asphyxie locale sich ein elefantintisches Wachstum der Hände und Füße herausbildete, wie die Verfasser annehmen, unter Einwirkung von Mikroben, die auf dem durch die Asphyxie präparierten Boden wucherten. Ob diese Deutung richtig ist, vermag ich auf Grund der mir vorliegenden Notizen nicht zu entscheiden.

Es gibt nun auch einzelne Beobachtungen, in denen neben dauernden vasomotorischen Symptomen, namentlich neben permanenter Asphyxie, an der Haut Ernährungsstörungen sich finden, die nicht einem hypertrophischen, sondern einem atrophischen Typus entsprechen.

Ich habe einen sehr merkwürdigen Fall beobachtet, der schwer einzuordnen ist. Es ist vielleicht etwas willkürlich, wenn ich ihn hier einziehe.

Ein 17-jähriger Schlosserlehrling wurde uns wegen einer rechtswichtigen Posa von der Augenklinik überwiesen. Er stammte aus gesunder Familie, ist selbst nie ernstlich krank gewesen. Seit vielen Jahren soll sich allmählich eine Cyanose in den Händen entwickelt haben, die zwar Schwankungen unterliegt, aber nicht ganz verschwindet. Seit einem halben Jahr soll sich allmählich eine Posa auf dem rechten Auge entwickelt haben. Nie Kopfschmerzen, auch in den Händen weder Schmerzen, noch Taubheitsgefühl, noch Geschwulstbildung nach Symplo. Bei der Untersuchung besteht eine tiefblaue Verfärbung der Hände und Unterarme bis zu deren Mitte. Die Außentemperatur ist bei dieser Untersuchung über 18°C. Bei stärkerer Kälte sollen die Hände fast schwarz werden, um dann beim Übergang in die Wärme sich rot zu färben. Die Hände fühlen sich sehr kühl an. Die Nägel sind nicht vergrößert, es bestehen keine Narben. Die Haut der Hände ist im ganzen etwas hart und verdickt, aber nicht im eigentlichen ödermatischen Sinne. Es besteht nirgends eine Anlagerung an die Unterlage, die Haut ist nicht abnorm glatt oder glänzend. Die Verhärtung ist am stärksten in der Hohlhand. Auch die tiefen Teile der Hand fühlen sich etwas verhärtet an, noch mehr ist das am Unterarm der Fall, so die Muskeln besonders der Streckseite auffällig dehnbar zu sein scheinen. Kraft der Hände und Arme ungestört, keine Sensibilitätsstörungen.

Die Haut des Gesichts ist ein wenig cyanotisch, nirgends mit der Unterlage verachsen. Es besteht eine fast vollkommene Posa rechts; die Lipalطة ist nicht mehr wie 3–4 mm breit. Auch das passive Erheben des rechten oberen Augenlides macht eine gewisse Schwierigkeit, man fühlt eine Art Widerstand, ohne daß man von einer eigentlichen Verhärtung der Haut des Lides sprechen kann. Das Lid soll öfter anschwellen, wird dabei rotblau, nicht heiß, in der Mitte soll sich dann ein kleines stecknadelkopfgroßes Bläschen bilden, das später aufplatzt, und aus dem

eines Weibes bemerkt. Dann keilt es aus. Das dauert etwa anderthalb Wochen, macht keine Schmerzen, nur etwas Spannung. Hand und Nase schaud, sollen gegen früher nicht verändert sein. Ohren etwas cyanotisch, Zunge gerade, Facialis ohne Störung, auch im Orbicularis oculi kein Unterschied zwischen rechts und links. Die Kariesinfektur scheint besonders rechts derber und härter als normal. Haut nirgends mit den darunter liegenden Teilen verwachsen. Haut an den Füßen etwas cyanotisch, aber nicht so stark wie die der Hände, auch hier keine Motilitäts- oder Sensibilitätsstörungen. In der Zeit der Beobachtung, die sich auf einige Monate erstreckte, hat sich nichts geändert. Auch als ich den Pat. nach drei Jahren wiedersah, war der Zustand derselbe geblieben.

Es ist sehr schwer, hier eine exakte Diagnose zu stellen. Besonders die Auffassung der Ptois ist unsicher. Jedenfalls schien sie nicht neurogenen Charakter zu haben, sondern dürfte auf einer Affektion des Muskels und zum Teil der darüberliegenden Haut beruhen. Hier sowohl wie an den Händen, weniger den Ohren, dem Gesicht und den Füßen hatte sich eine Cyanose, die sich ganz allmählich entwickelte, und auch trophische Störungen eingestellt. Letztere schienen in einer Vermehrung des Bindegewebes in der Unterhaut und den Muskeln zu bestehen, während die Haut selbst eher ein wenig verdünnt zu sein schien. Das erinnert durchaus an das Bild der Sklerodermie, ohne mit diesem aber ganz übereinzustimmen. Als eine Kombination von chronischer Asphyxie mit atypischer, mehr die tieferen Teile befallender und abnorm lokalisierter Sklerodermie glaube ich den Fall auffassen zu sollen, im ganzen also jedenfalls als eine Kombination von chronischer Asphyxie mit trophischen, sich zu atrophischen Zuständen hin entwickelnden Prozessen. Als solcher steht er isoliert da, soweit es die spezielle Form betrifft. In einer anderen Kombination beschrieb Schütz das Zusammentreffen.

49-jährige Frau, von Jugend auf viel rheumkrank, seit 20 Jahren im Anschluß an akuten Gelenkheumatismus viel Gelenksentzündungen, seit langem sehr nervös; seit 3 1/2 Jahren wird der linke Unterarm und die linke Hand von einer roten Rote befallen, täglich treten oft Anfälle heftigsten brennenden Schmerzens auf, besonders nachts. Bewegungen und Wärme lindern, Ruhe und Kälte verschlimmern. Waschen mit kaltem Wasser viel zuweilen gewisser schwarze Verfärbung einzelner Stellen hervor. Es bestehen heftige Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen, zuweilen erhebliche Schwerhörigkeit. Das Allgemeinbefinden ist schlecht, der Ernährungszustand hat gelitten.

Status: praesens: blasse Verfärbung des Gesichts, namentlich der Wangen, die sich meist heiß anfühlen. Die Haut des linken Handrückens ist haarloslich, livide, die Verfärbung dehnt sich in großen Flecken auf den Unterarm aus, hier nimmt sie wieder zu, wird ganz diffus und ist sehr stark ausgeprägt. Die Haut des Handrückens ist ferner merklich dünn, verknittert, stark verdünnt und glänzend, als ob sie zu weiß wäre, fühlt sich kühl an; die Sensibilität ist normal.

Schütz bezeichnet den Fall als „Erythromelalgie und Hautatrophie“. Die Hautatrophie gehört nach dem Urteil Lasears in diesen Fall zu der Form der diffusen idiopathischen Hautatrophie. Bei dieser Dermatose besteht in der Tat eine cyanotische Ver-

färbung der Haut (s. u.), aber es fehlten sonst die Schmerzen; wegen der Schmerzen müßte man, so meint Schütz, neben der Hautatrophie hier noch eine Erythromelalgie diagnostizieren.

Wie schon einmal erwähnt wurde, hat der Schütz'sche Fall in der Tat Beziehungen zur Erythromelalgie, und es ist auch ganz richtig, was Schütz betont, daß bei der Erythromelalgie häufig tropische Störungen ähnlicher Art vorkommen. Aber die vasomotorischen Symptome weichen doch sehr erheblich von dem Typus der erythromelalgischen ab, es ist nicht von einer aktiven Hyperämie, die anfallsweise auftritt, die Rede, sondern von einer dauernden cyanotischen Verfärbung, und es geht daher trotz der paroxysmalen Schmerzen nicht gut an, diesen Fall zur Erythromelalgie zu rechnen, er steht eben wieder einmal in der Mitte zwischen zwei ausgeprägteren Krankheitsbildern. Er erinnert in sehr vieler Beziehung an das von mir oben (S. 511) mitgeteilte bei dem chronische Asphyxie, Atrophia cut. idiopath., Erythromelalgiesymptome und daneben auch noch objektive Sensibilitätsstörungen vorhanden waren.

Die idiopathische Hautatrophie ist anstehende Veränderungen an den Extremitäten hervorzuheben, deren Unterscheidung von den chronischen Asphyxiën gewisse Schwierigkeiten macht. Herzheimer und Hartmann haben dem Leiden den Namen der Akrodermatitis chronica atrophicans gegeben, und sie subsumieren darunter auch Fälle, die von Pick und Klingmüller als Erythromelie beschrieben wurden. Die Symptome bestehen in einer bläuroten Verfärbung, einer Fältelung und Zerküitterung („wie Zigarettentpapier“) der Haut; die Haut läßt sich leichter zu Falten erheben, die sich langsamer wieder ausgleichen. Die befallenen Teile sind arm an Haaren und schwitzen weniger. Die Extremitäten sind mit Vorliebe befallen, aber doch nicht die Extremitätenenden, sondern mehr Handrücken und Fingerücken, als die Fingerspitzen; die Streckseite ist bevorzugt, der Prozeß schreitet meist centralwärts fort, häufig streifenförmig. Stets fanden sich neben den atrophischen auch infizierte Stellen, die die früheren Stadien der Erkrankung darstellen und ihren entzündlichen Grundcharakter beweisen.

Sensibilitätsstörungen und Schmerzen fehlen. Diese kurzen Angaben — bei Herzheimer und Hartmann findet man eine ausführliche Schilderung der Symptome, der Histologie und auch der Literatur — genügen, um die Unterscheidung der unkomplizierten Fälle von der Erythromelalgie und der Raynaud'schen Krankheit vorzunehmen. Auch dort, wo die sensiblen Störungen in den Vordergrund treten und auch die Paroxysmen verschwinden, entscheidet schon die differente Lokalisation zugunsten der einen oder der anderen Affektion, wozu auch die Differenzen in den vasomotorischen und tropischen Störungen kommen. Viel schwerer kann die Unterscheidung der Akrodermatitis

chron. atroph. gegenüber der Sklerodermie werden. Darauf komme ich noch zurück.

Die in diesem Kapitel behandelten, untereinander vielfach differierenden Fälle haben trotz aller Differenzen sehr intime gegenseitige Beziehungen. Die im Mittelpunkt stehenden Symptome sind solche von seiten der Vasomotilität; und zwar liegt stets eine chronische und meist progrediente Cyanose der Extremitätenenden vor. Es ist bei allen, trotz der Chronizität der vasomotorischen Störungen, anzunehmen, daß sie nicht einer schweren organischen Veränderung des Nervensystems ihren Ursprung verdanken, sondern leichteren Veränderungen, die aber wohl als etwas anders geartete angesehen werden müssen, als die, die wir bei den sonst hier behandelten vasomotorisch-trophischen Neurosen supponiert haben, da sie eben dauernde, nicht paroxysmale Störungen verursachen. Sie lehnen sich klinisch mehr oder weniger eng an die schon beschriebenen Krankheitstypen der Raynaud'schen Krankheit und der Erythromelalgie an. In einzelnen Fällen finden sich auch noch andere Beziehungen, so ist in mehreren Fällen das Auftreten angioneurotischer Ödeme sehr bemerkenswert. Aus den mitgeteilten Krankengeschichten geht ferner noch mit Evidenz hervor, daß fast stets neuropathische Individuen befallen waren. Was die Nomenklatur in diesen Fällen anbelangt, so haben wir uns entschlossen, sie nach dem konstantesten Symptom der Akroasphyxie zu bezeichnen und in einem Beiwort die Symptome zum Ausdruck zu bringen, die sonst noch hervortreten. So können wir denn in den Fällen der ersten Gruppe von Akroasphyxia hypaesthetica, in den der zweiten Gruppe von einer Akroasphyxia hypertrophica oder in Anlehnung an Kaposi-Sternberg vielleicht von Pachydermia acroasphyctica sprechen. Einige Male (Schütz, eigene Beobachtung) bestand eine Kombination der chronischen Akroasphyxie mit dystrophischen beziehungsweise atrophischen Prozessen.

Wir sind in diesen Fällen zu der Annahme geneigt, daß materielle, wenn auch recht feine Veränderungen — etwa diffuse leichte Gliavermehrung in centralen Teilen des Vasomotorenapparates als Grundlage der dauernden Veränderungen der Vasomotilität und der Trophik anzusehen sind. Immer wieder schwebt uns da die Syringomyelie als der Krankheitstypus vor, dem wenigstens sozusagen lokalisierte diese Fälle sich annähern.

Es gibt nun auch Fälle von chronischer lokaler Asphyxie, bei denen wir mit größerer Sicherheit das Vorliegen ausgesprochener anatomischer Veränderungen des Nervensystems vermuten müssen.

Ich führe folgenden Fall an, der von Johannessen unter der Überschrift: „Lokale Asphyxie kombiniert mit Funktionsstörungen von seiten des Gehirns“ publiziert ist. Es handelt sich da um ein Kind von 16 Monaten, der Vater ist Alkoholist; das

Kind hat sich bisher normal entwickelt, jetzt wird es allmählich unruhig, verdrißlich, ein bis zwei Monate später sieht man, daß beide Füße anschwellen, kalt werden, jucken, sich stark bläulich-rot verfärben und mit Beulen bedecken. Einen Monat später tritt dasselbe in den Händen auf, auch diese werden stark erythematös, schwellen an, werden kühl und etwas später löst sich an der Innenseite der Hand und an den Fußsohlen die Haut in großen Fetzen ab, es fällt ein Nagel ab. Die Sensibilität scheint erhalten zu sein. Das Kind wird gleichnützig schlaff, kann den Kopf nicht halten, sich nicht auf die Beine stützen und verliert das Sprechen, es jammert sehr viel. Dieser Zustand hält etwa fünf Monate lang an, dann hört das Jucken auf, das Kind fängt wieder an zu sprechen, nach drei Monaten kommen die ersten Gehversuche, nach 10 Monaten fängt die bläulich-rötliche Färbung an zu verschwinden, die Anschwellung dauert noch längere Zeit fort, aber nach 14 Monaten war völlige Heilung eingetreten.

Nach Johannessen hat C. Boeck einen zweiten Fall dieser Art beobachtet; hier stellte sich bei einem 16 Monate alten Kinde eine bläulich-rote Färbung der Hände und Füße ein, außerdem schossen am Rumpf und beiden Knien symmetrisch Blasen auf, die nach einiger Zeit heilten. Aber die betreffenden Stellen sind fortdauernd bläulich und dick, hart und fest anzufühlen. Auch hier zeigten sich cerebrale Erscheinungen, das Sprachvermögen war gestört, und das Kind war sehr unruhig.

Nach Johannessen ist in diesen Fällen die zugrunde liegende Krankheit als eine besondere und bisher noch nicht beobachtete Form der vasomotorischen Störung aufzufassen, die ihren Ursprung in krankhaften cerebralen Veränderungen hat oder mit ihnen in Zusammenhang steht. Der oben mitgeteilte Fall von Stöltzner hat gewisse Ähnlichkeiten mit diesen Beobachtungen von Johannessen und Boeck.

Ich füge schließlich noch einen Fall an, der von Scheiber unter dem Titel „Ein Fall von symmetrischer Asphyxie“ berichtet und der Raynoldschen Krankheit zugerechnet ist.

56-jähriger Mann, keine nervöse Belastung, keine Lues, viel Gemütsaufregungen. 1882 werden die Füße cyanotisch, schwer, müde. Die Cyanose nahm zu, es stellte sich eine Anschwellung bis zu den Knien ein, die Füße waren eiskalt und der Sitz sehr starker Schmerzen, die nur bei Bismutierung etwas nachließen. Die Cyanose war erst links, dann auch rechts vorhanden, im Sommer 1883 ließ sie nach, im Herbst 1883 mit einer Perlestritis der linken fünften Zehe auf. Von hier aus dehnten sich die Schmerzen und das Kriebeln erst auf den linken, dann auch auf den ganzen rechten Fuß aus.

Status praesens vom Mai 1884: starke Abmagerung des Brutes, besonders des linken. Haut der Füße und Unterschenkel bläulich, dünn, atrophisch, glänzend, mit dichten, feinen, venösen Netzen durchzogen, keine Varizen, heftiges Kriebeln, Paraparesen beider Beine, stärkere des linken, dabei keine Spasmen. Außerdem besteht eine linksseitige Hemiparesis, auch der untere Facialis ist links paretisch, die Sensibilität ist links herabgesetzt, Geschmack und Geruch ist beiderseits gleich, während

das Blin und das Sehen auf der linken Seite vermindert ist. Die Atmung ist verändert, zwei kurzen folgt stets ein langer Atemzug, es besteht leichtes Emphysem und Pulsbeschleunigung.

Der Fall ist sehr schwierig zu beurteilen. Die Cyanose kann nicht durch ein körperliches Leiden bedingt sein, das Emphysem hätte höchstens einen leichten Grad einer allgemeinen Cyanose bewirken können. Scheiber nimmt an, daß anfänglich Krampf, später Lähmung der kleinen Venen dem Symptomenbild zugrunde lag. Die Paraparese ist eine Folge der hochgradigen, nicht degenerativen Muskelatrophie, diese ist reflektorisch wie bei Gelenkleiden bedingt. Die Hemiparese muß organischen Ursprungs sein und wird von Scheiber auf eine Blutung in die innere Kapsel zurückgeführt. Er erklärt das Krankheitsbild im ganzen in folgender Weise: Durch die stets erneuten Gemütsaufregungen und Kongestionen kommt es bei dem vorgeschrittenen Alter des Kranken trotz Mangels nachweisbarer Veränderungen in den Arterienstämmen zu Veränderungen der Gefäße, zu Ekstasen, zu Endarteritis der feinen Gefäße und Capillaren, bei gelegentlich stärkeren Aufregungen zu Capillarapoplexien im Gehirn (innere Kapsel) und bei erneuter Kongestion zu solchen leichteren Grades in der *Medulla oblongata* in der Gegend des Vagus- und Accessorickernes, die langsam und schubweise sich etablieren. Sie bewirken neben den bulbären Erscheinungen der Atmungsanomalien und Pulsbeschleunigung auch den lokalen symmetrischen Krampf und die nachträgliche Lähmung der kleinen Venen an den Füßen ohne ernsthafte Störungen im Respirations- und Circulationsapparat. „Da die symmetrische Asphyxie hier eine dauernde war, ist die Annahme einer dauernden organischen Veränderung einschneidender, als die einfache Hypertonie des Centrums, um so mehr als dadurch auch die anderen Symptome erklärbar sind.“ Die Erklärung von Scheiber ist ja eine durchaus hypothetische. Gerade wenn wir uns aber auf den Boden dieser Erklärung stellen, dürfen wir den Fall nicht als Raynaud'sche Krankheit auffassen, da diese ihrem Wesen nach eine funktionelle Nervenkrankheit ist. Es leuchtet ein, daß auf der Grundlage organischer Veränderungen der Vasomotorencentren, sei es nun des in der *Medulla oblongata* oder der anders gelegenen, dauernde Veränderungen in dem Blutgehalt der Körperteile sich einstellen können, und daß diese sich mit mannigfachen anderen, organisch bedingten Veränderungen des Nervensystems kombinieren können. Wir wissen nur leider bisher außerordentlich wenig über solche Erkrankungen, und wir können die hier zuletzt zitierten Fälle nur als Material für später zu erwerbende Kenntnisse betrachten. Dann tun wir aber erst recht gut, sie von besser bekannten Krankheitsbildern, von denen sie erheblich abweichen, abzusondern.

Ich habe in diesem Abschnitt schon eine ganze Anzahl disparater

Fälle vereinigt; es ist damit die Zahl der atypischen vasomotorisch-trophischen Neurosen keineswegs erschöpft, doch stehen die sonst beschriebenen Krankheitsbilder so vereinzelt da, daß vorläufig von ihrer Verwertung in irgendeinem Sinn Abstand genommen werden muß. Zudem entfernen sie sich auch nach ihrer Lokalisation und ihrem sonstigen klinischen Verhalten so weit von den von mir beschriebenen Typen, daß ich von ihrer Anführung absehen muß. Ich nenne nur noch einen Fall von Hallopeau und setze den Titel seiner Beschreibung hierher, aus dem das uns Interessierende ohne weiteres zu entnehmen ist: *Sur une variété d'angio-névrose donnant lieu à des plaques d'alopecie pseudo-peladique avec ischémie, anesthésie, xéromatose et taches pigmentées*. Hier haben wir wieder eine Kombination sensibler, vasomotorischer und trophischer Störungen vor uns, die sich in eigentümlicher Zusammenstellung zu einem sonst unbekannten Symptomenkomplex vereinigen. Wir sehen immer wieder, wie sehr einerseits die Übergangsfälle, die die Grenze zwischen den einzelnen Affektionen so oft zu verwischen geeignet sind, andererseits die atypischen Fälle, die einer selteneren und ungewöhnlicheren Kombination der vasomotorischen, sensiblen und trophischen Symptomentelemente ihr abweichendes Aussehen verdanken, eine sichere Namensgebung, eine ausreichende Abgrenzung und Klassifizierung und damit die Orientierung in unserem Gebiet erschweren.

Fünftes Kapitel.

Die Sklerodermie.

Einleitung.

Die Symptomatologie der Raynaudschen Krankheit hat uns, wenigstens flüchtig, mit gewissen Ernährungsstörungen an der Haut der gipfelnden Teile bekannt gemacht, die wir als sklerodermatische bezeichneten. Die sklerodermatische Veränderung der Haut ist, wie wir sahen, nicht ein regelmäßiges und sich immer wieder findendes Symptom dieser Krankheit, aber sie gehört auch nicht zu deren ganz seltenen Erscheinungsformen; es sind ziemlich viel Fälle der Art beschrieben worden. Sie vermitteln uns den Übergang zu derjenigen Krankheitsgruppe, der wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zuwenden, zur Sklerodermie, und sie zeigen uns auch an dieser Stelle wieder, wie sich von einem dieser Krankheitsbilder, die wir hier schildern, zum anderen immer wieder Beziehungen knüpfen, die eine scharfe Trennung schwierig, ja unmöglich machen. Auf der anderen Seite verlangt die symptomatologische Differenz der Krankheitsbilder, wenn wir uns nicht an die Mittelglieder der Reihe halten, sondern deren Enden ins Auge fassen, gebieterisch eine scharfe Trennung. Denn ein reiner Fall von Raynaudscher Erkrankung mit seiner typischen Aufeinanderfolge von Synkope und Asphyxie locale und Gangrän, mit seinen heftigen Schmerzen, unterscheidet sich himmelweit von einem Fall von Sklerodermie, wie wir sie bald kennen lernen werden, wo hier und dort am Körper, in einzelnen Flecken oder Streifen, oder in zusammenhängenden Partien die Haut ganz allmählich die charakteristisch verhärtete Beschaffenheit annimmt, erst leicht anschwillt, dann einsinkt, hart, glatt und unverschieblich wird, ein Prozeß, der ganz oder fast ganz schmerzlos verläuft.

Hätten wir es bei der Sklerodermie nur mit solchen Fällen zu tun, in denen die pathologische Hautveränderung in geringerem oder größerem Umfang das ganze Gebiet der äußeren Haut betrifft, so könnten wir hier, wo wir hauptsächlich die vasomotorisch-trophischen Symptome an den Akra behandeln, von einer Besprechung der Sklerodermie ganz absehen; aber gerade die der Raynaudschen Erkrankung nahestehenden Fälle mit ihrer die Akra bevorzugenden Lokalisation der Affektion zwingen uns, auch die Sklerodermie mit zu berücksichtigen.

Es ist aber nicht der Zweck der folgenden Seiten, eine monographische Darstellung der Sklerodermie in derselben Ausführlichkeit wie bei den bisher behandelten Krankheitsbildern zu geben; ausführlicher

soll hier nur die Symptomatologie der Form besprochen werden, die in ihren Krankheitsäußerungen besonders oder ausschließlich die Akra befällt, die sog. Sklerodaktylie, und letzter soll die Ätiologie und die Pathogenese der ganzen Krankheit erörtert werden, während ich mich über zahlreiche andere Punkte, insbesondere auch über die spezielle pathologische Anatomie der in der Haut gefundenen Veränderungen kürzer fassen werde: das sind Dinge, die mehr den Dermatologen als den Neurologen angehen, und für die mir nicht nur eigene Erfahrung, sondern auch ein ausreichend kritisches Urteil fehlt.

Dementsprechend habe ich für dieses Kapitel keine Vollständigkeit der Literaturangaben angestrebt. Ich konnte dies um so eher, als die gesamte Literatur bis zum Jahre 1895 in der Monographie von Lewin-Heller „die Sklerodermie“ zusammengestellt und verwertet ist; ich werde mich im folgenden in vielen Fragen auf diese Monographie zu berufen haben. Für einen Teil der einschlägigen Fragen besitzen wir bis Oktober 1898 eine weitere ausführliche Zusammenstellung und Verwertung der Literatur in der Arbeit von v. Nattkafft, die eingehend allerdings nur die Pathogenese und die pathologische Anatomie behandelt. Ältere kasuistische Beiträge zitiere ich meist nach diesen beiden Arbeiten, während alle größeren Arbeiten im Original gelesen wurden. Im Handbuch der Hautkrankheiten hat neuerdings Luithlen das Kapitel Sklerodermie ziemlich ausführlich dargestellt, eine eigentliche monographische Bearbeitung des Themas ist aber seit der Arbeit von Lewin-Heller nicht erfolgt.

Bezüglich der Geschichte der Krankheit verweise ich außer auf die genannten Arbeiten vor allem auf die von Walters, der ich nur entnehmen will, daß die erste genauere Beschreibung der Affektion von Thirlial herrührt und aus dem Jahre 1845 stammt. Weiter erwähne ich noch, daß Ball im Jahre 1872 zuerst ausführlich die Sklerodaktylie, i. e. die im wesentlichen auf die Finger beschränkte Sklerodermie beschrieb. Bis zum Jahre 1895 waren dann über die Sklerodermie ca. 500 Arbeiten erschienen, und die letzten Jahre haben eine weitere sehr erhebliche Anzahl von Arbeiten über unser Thema gebracht, so daß die Literatur jetzt schon eine gewaltige ist.

Ätiologie.

Alter, Geschlecht. Die Sklerodermie ist eine Erkrankung, die sich mit Vorliebe zur Zeit der höchsten körperlichen Reife entwickelt, aber doch sowohl das Kindesalter, als das Greisenalter keineswegs verschont. Kreuger und Kaposi sahen Sklerodermie sich bei einem 25 jährigen Mann entwickeln; die untere Altersgrenze ist deswegen schwierig zu bestimmen, weil hier leicht eine Verwechslung mit dem Sklerema neonatorum vorkommen kann, doch werden jedenfalls Fälle

berichtet, in denen Sklerodermie bei nur wenige Wochen alten Kindern entstand (Crusé, Herzheimer).

Haushalter und Spillmann beobachteten ein einmonatliches Kind, das seit der Geburt folgende Störung zeigte: Die ganze linke untere Extremität war atrophisch und um einen cm dünner und kürzer als die rechte. Es bestand am linken Bein eine violette Pigmentation, an der vorderen äußeren Fläche waren runde Flecken von braun-lila Farbe sichtbar, die Haut war hier sehr dünn, und es fehlte jegliches Fettgewebe; auf dem Knie fand sich ein violetter Fleck von Halbfranzö-Größe, in dessen Mitte sich eine gelbliche Einsenkung zeigte; ähnliche Flecken am rechten Trochanter major. Die Autoren stellen die Diagnose Sklerodermia congenita. Neumann beobachtete bei einem 13 Tage alten Kind eine Sklerodermie, die zur Heilung kam.

Das weibliche Geschlecht wird entschieden öfter von der Krankheit befallen: Lewin-Heller fanden 67% Frauen; auch spätere Autoren machen auf das Übergewicht der Frauen noch aufmerksam, wenn auch keine weitere Zusammenstellung mehr vorliegt; in letzter Zeit sollen die Verhältnisse sich aber zugunsten der Männer etwas verschieben. Grünfeld fand unter 60 Fällen aus der Zeit von 1892—1894 nur 32 Frauen. Doch gilt nach Kaposi in der neuesten Auflage seines Lehrbuches noch an, daß drei Viertel aller Erkrankten Frauen sind. Auch nach meiner Zusammenstellung haben die Frauen ein entschiedenes Übergewicht.

Nach Lewin-Heller soll die Sklerodermie bei den Franzosen viel häufiger sein, und es soll dies mit ihrer größeren Disposition zur Neuropathie zusammenhängen; es ist das sehr schwer mit einiger Sicherheit zu konstatieren. Jedenfalls ist die Krankheit auch bei uns nicht selten; es wird behauptet, sie habe in den letzten Jahren an Häufigkeit zugenommen (Lewin-Heller, Heller, Lassar). Nach Lewin-Heller kam auf 19000 Kranke und auf 1800 Hautkranke eine Sklerodermie. Morrow berechnet auf 3000 Hautkranke je einen Fall von Morphea und Sklerodermie, die er trennt, Blaine-Denver auf 3000 Hautkranke einen Fall. Ich habe in der Poliklinik von Prof. Oppenheim unter 27000 Fällen etwa 45 sichere Sklerodermien gesehen; es handelt sich demnach sicher um eine relativ häufige Krankheit; denn es ist zu bedenken, daß Sklerodermiekranken nur unter besonderen Bedingungen den Nervenarzt aufsuchen. Zu den einwandfreien Fällen kommen noch eine Reihe atypischer, von denen zum Teil noch ausführlicher die Rede sein wird.

Es waren im ganzen 30 Frauen und 15 Männer, die Frauen hatten also in meinem eigenen Beobachtungsmaterial ein erhebliches Übergewicht. Mein jüngster Patient war ein Kind von vier Jahren, bei dem das Leiden vor 1½ Jahren begonnen hatte; ein anderes Kind war 5½ Jahre alt. Die weiteren Zahlen sind:

| | |
|-----------|----|
| von 10—20 | 3 |
| 21—30 | 12 |
| 31—40 | 18 |
| 41—50 | 2 |
| 51—60 | 3 |
| über 60 | 2 |

Die große Mehrzahl der Fälle gehört also in das Alter zwischen 20 und 40 Jahren.

Stand und Beruf sind ohne Einfluß auf die Entstehung der Sklerodermie.

Heredität. In der Ascendenz oder Descendenz scheint nur einmal ebenfalls Sklerodermie beobachtet zu sein; Bailey berichtet von einer 28 jährigen Frau, deren Bruder und Mutter ebenfalls an derselben Krankheit gelitten haben sollen. Spadaro sah zwei Geschwister, die von blutsverwandten Eltern stammten und an *Sklerodermia circumscripta* litten.

Auch Haushalter und Spillmann haben Sklerodermie bei zwei Geschwistern beobachtet. Die Mutter der Kinder war nervös, das eine jetzt siebenjährige Kind erkrankte im Alter von fünf bis sechs Monaten und zeigt jetzt ausgeprägte Sklerodaktylie mit starken vasomotorischen Erscheinungen. Eine Schwester der Kranken, die zur Zeit zwei Jahre alt ist, erkrankte im Alter von sechs bis sieben Monaten und zeigt jetzt ähnliche Veränderungen.

Etwas häufiger findet man eine allgemeine „neuropathische“ Belastung. Lagrange berichtet, daß der Vater seiner Patientin an Hemiplegie starb, ein Bruder geisteskrank war, Patientin selbst in der Jugend an Krämpfen litt. Raymond schreibt: Vater der Patientin Alkoholist; endet durch Suicid, Bruder hat mit 16 Monaten Krämpfe, eine Tante ist melancholisch, ein Sohn beging Suicid, eine anderer, 20 Jahr alt, ist verkommen. Die Mutter einer meiner Kranken war tuberkulös, eine Schwester war geisteskrank, eine taubstumm, eine Schwester litt an Migräne; der Vater des Bruders hatte *Dementia paralytica*.

Ähnliche, wenn auch weniger schwere Belastung fanden auch andere (Hallopeau, Heller, Collin, Dinkler, Féréol, Schulz, Darier et Gaston, eigene Beobachtung u.s.w.). Bemerkenswert ist das wiederholt beobachtete Vorkommen von Migräne in der Ascendenz (Bonttier, Raymond, Thibierge, Bloch, eigene Beobachtung) und Schubigers Angabe, daß der Vater der Patientin an zahlreichen vasomotorischen Störungen, Hitze, Räte und Frost litt. Auch eine „*Diathèse arthritique*“ als Ergänzung der *Diathèse neuropathique* glauben einzelne französische Autoren (Raymond) nachgewiesen zu haben. Demgegenüber fand sich aber in einer ganzen Anzahl von Fällen

gar keine hereditäre Belastung (Mosler, Wolters, Uhlenhuth und viele andere). Ein procentuales Verhältnis läßt sich nicht angeben, doch scheint mir jedenfalls der hereditäre Faktor nicht so unbedeutend, daß man ihn ganz vernachlässigen dürfte.

In der Anamnese der an Sklerodermie leidenden Kranken findet sich eine Reihe von Affektionen, denen man eine Bedeutung für die Entstehung der Sklerodermie zugewiesen hat. Es kommen da in Betracht: vorausgegangene Infektionskrankheiten, wie Malaria, Pneumonie, Typhus, Erysipel, Tonsillitis, Scarlatina, Diphtherie, Influenza, Gelenkrheumatismus. Man sieht, die Reihe ist ziemlich vollständig. Rasmussen hat die Sklerodermie direkt als einen Folgezustand wiederholter Erysipele aufgefaßt, doch liegt in einem solchen Fall offenbar eine Verwechslung mit dem stabilen, indurativen Ödem, wie es nach mehrfachen Ödemen sich entwickeln kann, nahe. Ein Beweis oder auch nur eine Wahrscheinlichkeit, daß in vielen der berichteten Fälle die Infektionskrankheit von wesentlichem Einfluß war, ist nicht erbracht; meist wird auch nur der Reduktion des allgemeinen Ernährungszustandes eine gewisse Bedeutung zugeschrieben. Im selben Sinne sollen die chronischen Infektionskrankheiten wirken, vor allem die Tuberkulose der Lunge oder anderer Organe, die aber im ganzen gar nicht häufig gefunden wurde. (Brocq et Veillon, Westphal, v. Notthafft, Ehlers.) Reines fand in fünf Fällen von Sklerodermia diffusa eine ausgesprochene Pirquetsche Reaktion. Ich habe einen Fall beobachtet, wo seit 20 Jahren Lupus bestand, und in dem sich im Verlauf der letzten sechs Jahre eine typische Sklerodaktylie und Sklerodermie entwickelte. Sehr selten wird auch Laes in der Vorgeschichte erwähnt. Nikitin beschreibt einen Fall von Hemiatrophia faciei, der Vater der Patientin hatte Laes gehabt. Lewin-Heller fanden nur vier Fälle, Leredde-Thomas sahen einen weiteren und sie zögern auch nicht, sofort der Laes eine wichtige Rolle für die Entstehung der Krankheit zuzuschreiben. Man kann demgegenüber mit aller Entschiedenheit einen erheblichen Einfluß der chronischen Infektionen, insbesondere der Laes und Tuberkulose, auf die Entstehung der Sklerodermie ablehnen. Einfache Chlorose und Anämie fanden Lewin-Heller auch nur in zehn Fällen, und es kann daher auch ihnen kein bestimmender Einfluß zugestanden werden.

Ebenso sind die physiologischen Geschehnisse der Menstruation, der Gravidität, des Puerperium und der Menopause ohne Einfluß. Hier und da findet man wohl einmal die Angabe, die akuten Zeichen der Krankheit seien im Puerperium, in der Gravidität aufgetreten, aber alles das wird nur vereinzelt mitgeteilt; daß die Menopause nicht bestimmend wirkt, zeigen die oben gemachten Altersangaben.

Etwas häufiger sind die Angaben über vorausgegangene rheuma-

tische Erkrankungen und über Erkältungen. Bezüglich der ersteren, die nicht selten beobachtet wurden, (Thirial, Lasègue, Gillette, Fuchs, Graham, Besnier, Charcot, Schaper, Féréol, Morrow, Potain, Raymond, Schubiger, Brissaud, v. Notthafft, Osler) machen allerdings schon Lewin-Heller, neuerdings auch v. Notthafft darauf aufmerksam, daß hier leicht eine Verwechslung mit den Schmerzen, die durch den in den Gelenken lokalisierten sklerodermatischen Prozeß selbst bedingt werden, vorkommen kann.

So war es z. B. in einigen meiner Fälle, in denen Schmerzen in verschiedenen Gelenken sich fast gleichzeitig mit den sklerodermatischen Prozessen in der Haut entwickelten. Sehr eng sind die Beziehungen zwischen rheumatischer Erkrankung und einer später sich entwickelnden Sklerodermie auch in einem von Osler mitgeteilten Fall. Hier handelte es sich um eine 39jährige Frau, die hereditär nicht belastet war. Vor sieben Jahren erkrankte sie mit Steifheit und Schmerzen im linken Knie, die anfallsweise auftraten und einige Tage andauerten. Etwa ein Jahr später wurden Ellbogen und rechtes Knie heiß und empfindlich, zugleich traten am ganzen Körper runde, rasch verschwindende Flecke auf, die später ohne Zusammenhang mit dem Gelenkleiden kamen. Vor zwei Jahren Schwellung des rechten Ellbogen- und Handgelenks, dann allmähliche Steifigkeit in diesen und anderen Gelenken und zunehmende sklerodermatische Veränderung der Haut. Man kann in einem solchen Fall nicht umhin, zunächst den lange vorausgehenden arthritischen Beschwerden eine Sonderstellung einzuräumen. Wir werden später sehen, daß in anderen Fällen die Abgrenzung des Gelenkleidens und der Sklerodermie noch größere Schwierigkeiten macht und noch unsicherer wird.

Erkältungen werden oftmals beschuldigt, freilich wird man schon den Nachweis einer engen zeitlichen Aufeinanderfolge und einer das gewöhnliche Maß überschreitenden Durchkältung des Körpers verlangen müssen, ehe man an einen Zusammenhang denken wird. Lewin-Heller stellen eine Anzahl dieser Fälle zusammen: bald ist es eine feuchte Wohnung, bald Arbeiten in der Kasse, ein Fall im Wasser, ein kaltes Bad, Schlafen auf feuchter Wiese, Maripolosen mit kaltem Wasser usw. In einem Fall von Scholtz und Döbel kohlisierte sich die Einwirkung des kalten Wassers mit der von Cyankali, Schmelz- und Salpetersäure, indem der Patient mit diesen Stoffen berufsmäßig zu tun hatte. Ein Kranker Gentrass lag erkrankt am dem Bett, tauchte die Hände in kaltes Wasser, es stellte sich Erstarren und Schwerbeweglichkeit der oberen Extremitäten ein. Diakler berichtet, daß sein Patient in Sibirien mit dem Schloß sechs Monate lang im Eis eingefahren gewesen sei; in einem weiteren Fall sei drei Monate nach einem Sturz in kaltes Wasser die Sklerodermie eingetreten; hier kommt zur Erkältung noch der psychische Schreck. Peterson und Sternthal

melden von einer akuten Entwicklung im Anschluß an schwere Erkältung. Bei aller Skepsis wird man in solchen Fällen wohl annehmen dürfen, daß die Erkältung zur Entstehung der Krankheit beigetragen habe; wie, das ist eine andere Frage. Teske steht der Bedeutung der hier einwirkenden Schädlichkeiten sehr skeptisch gegenüber, während Laithlen an der Erkältung als einem wichtigen ätiologischen Moment für eine Reihe von Fällen festhält. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß einzelne der später an Sklerodermie erkrankenden Individuen schon früh eine gewisse Empfindlichkeit gegen Kälte zeigen. Dies dokumentiert sich manchmal durch das Auftreten von Frostbeulen. Unter den Fällen meiner eigenen Beobachtung finde ich wiederholt ein solches Vorkommnis. Osler hat dasselbe beobachtet.

Auch das Trauma ist als prädisponierendes Moment erwähnt worden. Ich selbst habe einen Fall gesehen, wo angeblich im Anschluß an einen schweren Unfall Sklerodermie entstanden sein soll. Patient wurde von einem Eisenbahnwagen, als er mit seinem Wagen über die Schienen fuhr, erfaßt, zu Boden geschleudert und überfahren. Die Beurteilung des Falles war schwierig, da Patient wegen einer eventuellen Entschädigung seine Krankheit auf diesen Unfall zurückführen wollte; es war nach der Ausdehnung des Krankheitsprozesses höchst wahrscheinlich, daß dieser schon vorher bestanden hatte. Die traumatische Entstehung ist noch in zahlreichen anderen Fällen in Erwägung gezogen worden (Coffin, Grünfeld, Tontou, Neumann, Roßbach). In allen diesen Fällen ist der Zusammenhang unsicher. Aber auch in anderen Fällen mit sicherer Anamnese ist ein Zusammenhang schwer beweisbar. Am ehesten vielleicht noch in einem Fall wie dem von Cruse, in dem sich eine bandartige Induration auf der Hinterbacke eines sechs Wochen alten Säugling zeigte, der asphyktisch geboren, durch Schläge auf die Nates bekehrt wurde. Leisring sah Sklerodermie bei einem Knaben ein Vierteljahr nach dem Stöße eines Kalbes an der Stelle des Traumas entstehen, nachdem Patient ein halbes Jahr vorher einen Hundebiß erlitten hatte. Frémy sah die von einer durch den Zangendruck bedingten Depressionsstelle ausgehen. Dubreuilhs Patient erlitt einen Schlag gegen die rechte Kopfsseite; die dadurch gebildete Narbe dehnte sich allmählich aus, wurde sklerodermatisch, dann trat eine ähnliche Veränderung an der symmetrischen Stelle der linken Stirn ein. In einzelnen Fällen traten die sklerodermatischen Partien mit Vorliebe an den Stellen auf, die dem dauernden Druck von gewissen Kleidungsstücken ausgesetzt waren. Solche Fälle haben Spiegler, Hutchinson und Ullmann berichtet (Druck des Kragens, der Handschuhe, der Jagdstiefeln, des Strumpfbandes usw.). Ich kann aus meinem eigenen Beobachtungskreis einen Beitrag liefern: bei einem jungen Mädchen traten im Laufe einer Reihe von Jahren sklerodermatische, mit starken Pigmentverschiebungen verbundene

Veränderungen mehrfach gerade an den Stellen auf, wo die Kleidungsstücke der Haut enger anlagen (Korsett, Strumpfband, Kragen der Bluse). Daneben bestanden aber auch andere Stellen, an denen von einem solchen Zusammenhange nicht die Rede sein konnte. Teske hat die Fälle angeblich traumatischer Genese zusammengestellt; er fand keinen mit einer die traumatische Genese zwingend erweisenden Vorgeschichte. Immerhin scheinen mir die genannten Fälle von lokaler traumatischer Einwirkung doch bemerkenswert; vielleicht handelt es sich um circulatorische durch den Druck bedingte oder auch um irritative Störungen, die allerdings nur in der Weise gewirkt haben könnten, daß sie das Erscheinen der Sklerodermie gerade an den genannten Partien begünstigten.

In dem Sinne sprechen auch vereinzelte andere Erfahrungen, die lehren, daß bei schon entwickelter Sklerodermie Narben, die aus irgendeinem anderen Grunde entstanden, sklerodermatisch entarteteten (Brocq et Veillon). Vielleicht ist etwas Ähnliches bei unseren oben erwähnten Patienten auch vorgekommen; wir kommen noch darauf zurück. Bei schweren Traumen ist neben der somatischen jedenfalls auch stets noch eine psychische Erschütterung vorhanden.

Das führt uns zu dem Einfluß, den Gemütsbewegungen und Erregungen jeglicher Art für die Entstehung der Sklerodermie besitzen, und zu der Frage, inwieweit nervöse Erkrankungen überhaupt von Wichtigkeit für die Entwicklung der Sklerodermie sind. Wieder haben wir hier eine Schwierigkeit zu überwinden, die uns schon in früheren Kapiteln entgegengetreten ist. Handelt es sich bei den zahlreichen nervösen Erkrankungsformen, denen wir hier begegnen, um selbständige, unabhängig von der Sklerodermie aufgetretene Leiden, oder sind die nervösen Symptome ganz oder wenigstens zum Teil schon ein Teil der Symptomatologie der Sklerodermie oder etwa deren Folge. Oft genug wird ja schon die zeitliche Aufeinanderfolge die Frage entscheiden, andermal aber läßt uns dieses Kriterium im Stich. Im folgenden sollen zunächst nur diejenigen Fälle erwähnt werden, in denen die nervöse Affektion der Sklerodermie voranging, resp. die Sklerodermie sich bei einem allgemein neuropathischen Individuum entwickelte. Ob diese einfache Koinzidenz auch einen ursächlichen Zusammenhang bedeutet, soll später erörtert werden.

Die Beobachtungen, in denen die von Sklerodermie betroffenen Individuen lange vorher an einer allgemeinen funktionellen Neurose litten — Hysterie, Neurasthenie, Hypochondrie — sind häufig. Ich erinnere an die Tatsache, daß öfter eine neuropathische Belastung bestand. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung Lallieux, dessen Patientin fünf Kinder hatte, die alle an Krämpfen litten. Horzog glaubte in seinem Fall eine Anzahl von Degenerationszeichen feststellen zu können: Differenz beider Gesichts- und Zungen-

kälften, Lippen, Kleinheit der Balbi, die Ohrmuscheln sind wenig modelliert, der Gaumen ist auffallend flach. Sehr häufig wird angegeben, daß das gesamte Nervensystem sich stets in sehr labilem Zustand befunden habe. Montesano fand das z. B. in fünf von seinen sechs Kranken; Raymonds eine Patientin war stets sehr eindrucksfähig, viele der Kranken klagten seit langem über Kopfschmerzen, Migräne, über Schwindel, Reizbarkeit, Stimmungswechsel und so fort.

Darier et Gastons Kranke, deren Vater ein sehr heftiger Mensch war, war immer verstimmt, traurig, nervös, furchtsam, sehr impressionabel. Sie sah oft einen Menschen mit einem Messer auf sich zukommen und litt nachts viel an schweren bedrückenden Träumen. Viel seltener sind im ganzen ausgesprochene hysterische Symptome. Vidal berichtet von hysterischen Kontrakturen, Graham und Collin von hysterischen Anfällen, von Lach- und Weinkrampf.

Neben der allgemeinen Neurose finden sich wiederholt Symptome bestimmter funktioneller Neurosen, so solche von Epilepsie (Frémy, Rauhier et Lacazeagne), Krampfanfälle (Hallopeau), Chorea (Roger), Paralysis agitans (Panegrossi). Auch ausgesprochene geistige Störungen sind in der Anamnese derartiger Kranker notiert (Bergson Melancholie, Lallier Halluzinationen, Ball, Rahl, Westphal, Raymond Imbezillität). Zwei meiner Kranken stotterten seit der Jugend, einer litt an einer schweren Infraorbitalneuralgie, eine hatte ausgesprochene Zwangsvorstellungen, die Mehrzahl der übrigen klagte über mehr oder minder stark hervortretende allgemeinnervöse Erscheinungen.

Es hat keinen Zweck hier weitere Einzelbeobachtungen aufzuführen; wichtiger wäre auch hier eine prozentuarische Berechnung, die sich aber bei der Art, wie die Krankengeschichten oft mitgeteilt sind, nicht gut gehen läßt. Diesen Fällen, die die überwiegende Mehrheit bilden, sind die gegenüberzustellen, in denen jedes Symptom einer Störung des Nervensystems fehlt; solche haben n. a. berichtet Kalischer, Plenski, Palm, Wolters, Grassot, Marianelli, Biro, Herzheimer, Ledermann, Bruns, Hanshalter et Spillmann, Vilcoq.

Recht selten entwickelte sich Sklerodermie bei Individuen, die an organischen Nervenerkrankungen litten. Schulze sah sie bei Myelitis an den gelähmten Teilen entstehen, Senator beobachtete sie bei Tabes, Frémy bei Tumor cerebri, Leprovost bei Hydrocephalus, wichtig und interessant sind die Angaben von Montesano, Verhogen, Fedoroff, Schlesinger, Morselli und Pospelow, die sie bei Syringomyelie auftreten sahen. Freilich scheint die Diagnose Gliosis nicht in allen diesen Fällen sicher. Einen Fall eigener Beobachtung, der hierher gehört, werde ich später genauer mitteilen. Einzelne Symptome einer organischen Läsion beobachteten Westphal und Paw-

Iowski (Facialislähmung), Herzog (Pupillendifferenz), Naunyn (reflektorische Pupillenspinne, wobei er ausdrücklich das Fehlen anderer nervöser Symptome hervorhebt), Raymond (Fehlen der Patellarreflexe und geringe Abschwächung der Sensibilität an den unteren Extremitäten). Marsh sah sie im Anschluß an diphtherische Paralyse, aber nicht auf das Gebiet derselben beschränkt. Ballet et Delhelim beobachteten einen Kranken mit einer seit der Jugend bestehenden *Dystrophia muscul. progressiva*, der außerdem geisteschwach war. Es sei in diesem Zusammenhang noch eine Beobachtung Uhlenhuths erwähnt, der bei seinem Kranken eine Dupuytren'sche Fascienkontraktur fand. Man hat ja auch diese bisweilen als eine nervöse Affektion aufgefaßt.

Der Wert dieser Beobachtungen ist ein ungleichartiger. Einige wenige könnten daran denken lassen, daß die Sklerodermie hier direkt als Folge der organischen Nervenerkrankung sich entwickelt habe; ich werde auf sie in anderem Zusammenhang noch zurückkommen. Die übrigen weisen, falls man nicht an eine rein zufällige Koinzidenz denken will, nur auf eine gesteigerte allgemeine Vulnerabilität des Nervensystems hin. Mit dieser ganz allgemeinen Formel werden wir uns auch begnügen müssen, wenn wir die Frage des Einflusses früherer funktioneller Nervenleiden auf die Entstehung der Sklerodermie zu beantworten haben. Es ist endlich nicht viel mehr als eine Umschreibung der Tatsache, daß die Sklerodermie sich am häufigsten, wenn auch nicht ausschließlich, bei Individuen entwickelt, bei denen Anzeichen dafür vorhanden sind, daß ihr Nervensystem nur eine geringe Widerstandsfähigkeit besitzt. Das ist aber wichtig, denn damit rückt die Sklerodermie in eine Reihe mit einer Anzahl anderer Affektionen, unter denen sich, wie wir sahen, auch die früher schon von uns geschilderten Krankheitsbilder finden. Es wird uns nach alledem nicht wundern, wenn wir feststellen können, daß auch schwere psychische Aufregungen in der Anamnese eine gewisse Rolle spielen. Lowin-Heller führen u. a. folgende Beispiele an: Ballis Patient beschuldigte Aufregung durch einen Prozeß, Marottes seelische Leiden während der Belagerung von Paris, Collins eheliche Zerrüttnisse, G. Lewin selbst sah Sklerodermie bei einer Kranken entstehen, unmittelbar nachdem innerhalb 14 Tagen sich ihr Mann im Zuchthaus erhängt hatte und der Sohn beim Baden ertrunken war. Raymonds zweiter Patient erkrankte, nachdem er bei einer Explosion eine heftige geistige und körperliche Erschütterung erlitten hatte; auch Kaposi beschuldigt einmal eine schwere gemüthliche Aufregung als veranlassendes Moment. Weitere Beobachtungen der Art bringen Beers, Dinkler, Grönfeld, Ohior, Sternberg, Friedländer, Darier et Gaston, Sterling, Schäffer.

In der Anamnese der Sklerodermie-Kranken finden wir bisweilen noch einige andere Krankheiten, die ich hierher absichtlich nicht re-

zählt hatte, Affektionen wie den Morbus Basedowii, den Morbus Addisonii, die Hemiatrophia facialis, die Raynaudsche Krankheit und die Erythromelalgie. Die Beziehungen, die diese Krankheiten zur Sklerodermie haben, sind so enge und komplizierte, daß ich erst an späterer Stelle auf ihr Verhältnis eingehen kann. Ebenso habe ich absichtlich die Fälle nicht erwähnt, in denen der Sklerodermie Parasiten, Pilgermauen, Abszesse vorausgegangen sein sollen, weil es auch meiner Ansicht nach hier der Mehrzahl nach schon um Symptome der bestehenden Krankheit gehandelt hat.

Resümieren wir, was als ätiologisch wichtig in Betracht kommt, so brauchen wir neben der nervösen Disposition kaum etwas Weiteres anzuführen, als wiederholte, intensive, rheumatische Schädlichkeiten, während die Infektionen und Intoxikationen (der Alkoholismus z. B.) kaum eine Rolle spielen. Der einmal von Sackur erwähnte intensive Kaffeegebruß kommt wohl ernstlich nicht in Frage. Im ganzen sind das dieselben ätiologischen Faktoren, die auch bei den Akroparkthesien, der Erythromelalgie und der Raynaudschen Krankheit in Wirksamkeit traten, nur daß bei letzterer den Infektionen und vielleicht auch gewissen Gefäßkrankheiten doch ein größerer Einfluß zukommt.

Symptomatologie.

Es ist vielfach auf Grund der Symptome der Sklerodermie versucht worden, diese Krankheit in eine Anzahl Unterabteilungen mit differenten Symptomatologie zu zerlegen. Seit Forget und Gillette die Sklerodermie von dem Sklerem der Neugeborenen getrennt haben, werden die beiden Affektionen in der Regel als vollkommen verschiedene Krankheiten aufgefaßt. In neuerer Zeit trat zur Wolters für die Identität der beiden Prozesse ein. Er meint, es handle sich wohl um denselben Vorgang, der bei den Neugeborenen akut zum Tode führe, bei Erwachsenen chronisch werde und nach Ablauf des akuten Stadiums zur Schrumpfung führe. Trennt man das Scleroma neonatorum, der Ansicht der überausen Mehrzahl der Autoren folgend ab, so bleibt noch die Frage der Einteilung der übrigen Sklerodermieformen. Namentlich französische und englische Autoren haben mannigfache Abgrenzungen und Einteilungen versucht. Besnier und Doyen, Marty, Raymond unterscheiden die Dermatosklerosen von der von Anfang an chronisch progressiven Sklerodermie, und teilen die erstere wieder in die lokalisierten Dermatosklerosen und die Skleremien, die letzteren diffus Prozesse, die mit Ödemen einhergehen. Die circumscripte Form ist als Morphemanelement vor englischen Autoren abgegrenzt und als Krankheit an sich beschrieben worden; das ist von französischen und deutschen Autoren mit Recht zurückgewiesen worden, und in neuerer

Zeit beschrieben auch Engländer und Amerikaner (vielfach Misch- und Übergangsformen von Morphea und Sklerodermie. Unna machte den Versuch, auf Grund seiner histologischen Untersuchungen die diffusen von den circumscribten Sklerodermien zu trennen und unterschied bei den letzteren die kartonblattähnliche, keloïdähnliche und die Morphea. In neuerer Zeit hat auch Zarnhin gewisse histologische Differenzen gefunden, die aber auch nach seiner Ansicht zur Trennung dieser Formen nicht genügen. Die zuerst im Jahr 1871 von Ball beschriebene Sklerodaktylie wird jetzt allgemein als Form der Sklerodermie betrachtet. Sehr häufig werden beide Prozesse an einem Individuum beobachtet, von 141 Fällen waren nur 35 isolierte Sklerodaktylie, 106 zeigten die Kombination mit Sklerodermie (Lüthlen). In einem Fall von Tenneson wurde gleichzeitig Sklerodermie en plaques, atrophisierende symmetrische diffuse Sklerodermie und Sklerodaktylie mit Knochen deformitäten beobachtet.

Man wird den bisher beschriebenen Differenzen demnach offenbar keine allzu große Bedeutung beilegen dürfen, und ich schließe mich denjenigen Autoren an, die einer einheitlichen Auffassung den Vorzug geben, wenn ich auch der Einteilung in weitere Unterabteilungen durchaus nicht jeden Wert abgesprochen will. Im allgemeinen sind die Einzelsymptome bei den verschiedenen Formen der Sklerodermie — bei der Scleroderma diffusa wie bei der en plaques und en bandes und bei der Sklerodaktylie dieselben, ihre Kombination, ihr Auftreten dagegen wechselt in mannigfacher Weise. Es erscheint daher am meisten angemessen, mit einer Analyse der Einzelsymptome zu beginnen.

Wenn wir einen Sklerodermiekranken vor uns haben, so ist das erste, was uns in die Augen fällt, und was uns oft genug prima vista die Diagnose erlaubt, die Veränderung der Haut. Ich beginne mit der Schilderung dieser Veränderungen.

Das erste Stadium der Hautveränderungen bildet das Stadium oedematosum. Es handelt sich hier nach allen Angaben um ein derbes Oedem, die Haut wird von einer fettteigigen Beschaffenheit, so daß Fingerdruck nicht bestehen bleibt; dabei sieht sie über der ödematös infiltrierten Stelle glatt, etwas glänzend und gelblich aus, oft ist sie alabasterartig weißglänzend. Die Dauer und die Ausdehnung des Oedems wechseln sehr. Es ist zunächst einmal sicher nicht in allen Fällen von Sklerodermie vorhanden; es mag ja, besonders wo es von kurzer Dauer und geringer Ausdehnung ist, oftmals der Beobachtung entgehen und daher häufiger sein, als den Beschreibungen zu entnehmen ist; aber daß es sicher fehlen kann, beweisen die zahlreichen Fälle, wo die Entwicklung immer neuer sklerotischer Flecke unter den Augen des Arztes vor sich ging und trotzdem das Stadium oedematosum niemals beobachtet wurde. Hirschfelder macht darauf aufmerksam, daß es besonders leicht da, wo gleichzeitig mit der ödematösen

Infiltration, sich die später zu schildernde Bindegewebshypertrophie entwickelt, übersehen werden kann. Da, wo es vorhanden ist, ist es allein für sich für die Sklerodermie noch nicht charakteristisch (Lewin-Heller). Es kann sich auf kleine Stellen beschränken, die zudem rasch wechseln; es kann vorübergehend sein, abends stark entwickelt sein, um nach der Nachtruhe morgens nicht mehr nachweisbar zu sein. Aber es kann auch recht stabil werden. Heusner sah es zweieinhalb Jahr bestehen, ehe Zeichen von Induration bemerkbar wurden. Es ist fleckweise oder diffus ausgebreitet, indem es im letzteren Falle z. B. die ganzen Unterextremitäten einnimmt. Bei fleckweiser Ausdehnung betrifft es die eine oder die andere Zehe oder symmetrische Stellen am Knie, an Beinen und Händen wie bei Chiari, oder die Augenlider, wie bei Gubiac und bei Sternthal; hier werden die Haut bläulich-rot glänzend und geschwollen. Eine große Bedeutung bekam es in einem Fall Legroux, wo durch das Ödem eine Gangrän einzelner Zehen bedingt worden sein soll.

Wegen seines inkonstanten Verhaltens ist das Ödem von einzelnen Autoren (Möller, Herxheimer) zu den Prodromalerscheinungen, d. h. zu den vor Beginn der eigentlichen Sklerodermie beobachteten Erscheinungen gerechnet worden; doch halte ich dies nicht für berechtigt, wie überhaupt das ganze Prodromalstadium bei der Sklerodermie etwas sehr wenig Charakteristisches und Faßbares hat.

Eine unvergleichlich größere Wichtigkeit beansprucht aber in jedem Falle das Stadium indurativum und das diesem sich anschließende Stadium atrophicum.

Im Stad. indurativum wird die Haut hart, fest, gespannt, gar nicht oder nur schwer in Falten aufhebbar, oft von einem spiegelnden Glanz, glasartig durchsichtig, wie lackiert. Dem Kranken macht sich die Veränderung meist durch ein Spannungsgefühl bemerkbar. Die Konsistenz der Haut wechselt, sie wird als derb, hart, knorpelhart, breithart, stein- und marmorhart geschildert. Ihre eigentümliche Beschaffenheit hat die Autoren zu mancherlei Vergleichen veranlaßt. Sie wird mit Leder, Holz, Alabaster, oft und treffend mit Pergament verglichen; oft hat man den Eindruck, als ob sie für die in ihr steckenden Teile zu kurz wäre, wie ein zu enger Handschuh; sie liegt dem Körper an wie ein Kiraß, wie ein Pappfutteral oder gar wie eine Zwangsjacke (Käposi). An anderer Stelle vergleicht sie Käposi mit der Haut eines gefrorenen Leichnams. In Fällen ausgebreiteter, hochgradiger Sklerodermie hat die ganze Gestalt etwas Mumienartiges (*homme momie* Grassett). Die kleinen Falten und Spaltlinien der Haut verschwinden; das Gesicht erhält durch die Unverschieblichkeit der Haut oft etwas eigentümlich Maskenartiges (sklerodermatische Maske); der Anblick eines solchen Kranken, mit den unbeweglichen aber doch leidenden Gesichtszügen, der schmalen und spitzen, weit aus dem Gesicht her-

vortretenden Nase, dem zusammengepressten Mund, den oft weit hervorstehenden und nur mühsam zu schließenden Augen, dem leuchtenden Glanz der Haut, besonders an der Stirn, ist ungemein charakteristisch und prägt sich sofort dem ein, der einen solchen Kranken einmal sah. Figur 9 bringt das Bild der sklerodermatischen Gesichtsmaske wohl gut zum Ausdruck; sie zeigt außerdem die Gangrän der Finger bei Sklerodaktylie mit Raynaudschen Symptomen, die auch auf Tabel IX dargestellt ist.



Fig. 9.

Sklerodermatische Maske. Sklerodaktylie mit Raynaudschen Symptomen.
Raynaudsche Gangrän.

Die beiden Stadien der Induration und der Atrophie unterscheiden sich dadurch, daß im ersten Falle eine Zunahme des Dickendurchmessers der Haut stattfindet, während bei der Atrophie die Haut dann so weit zusammensinkt, daß sie noch dünner wird, als sie im normalen Zustande ist. Ganz gewöhnlich hat man beide Stadien bei demselben Individuum vor sich: hier an der einen Stelle ragt die Haut über das Niveau der gesunden Haut heraus und dort an einer anderen ist sie tiefer

eingesunken. Das Verhältnis ist oft so, daß in der Mitte eines Fleckes die Haut gleichsam eine Delle bildet, die von dem später erkrankten wallartig aufgeworfenen Hautpartien umgeben ist.

Zu der Verdickung resp. Atrophie der Haut, der Zunahme der Konsistenz und der Glätte kommt als weiteres Charakteristikum ihre Unverschieblichkeit auf ihrer Grundlage; sie ist wie auf dieser angelötet, und besonders bei der Sklerodaktylie tritt das sehr stark hervor.

Im einzelnen bietet die Entwicklung der Veränderungen der Haut manche Verschiedenheiten; sie kann akut einsetzen, im Laufe weniger Tage und Wochen zu großer Intensität und Extensität anwachsen, sie kann in jahrelangem, allmählichem Wachstum sich immer weiter ausbreiten. Liebreich konnte phantastisch das Fortschreiten der Sklerodermie auch an Stellen, die dem Auge normal erscheinen, beobachten.

Die Veränderung breitet sich von vornherein eisigermassen diffus oder doch wenigstens in großen Plaques aus, oder sie beginnt mit ganz kleinen Flecken; so sah Sternthal eine Patientin, bei der die wachsartig glänzende Haut mit sommersporenartigen Flecken besät war, zwischen denen narbig aussehende, weiß glänzende Grübchen lagen.

Eine ähnliche Beschreibung finden wir bei Darier et Gaston. Hier entstanden einzelne Flecke als einfache Pigmentationen, die die Patientin nur durch Zufall entdeckte. Anfangs ist eine Verhärtung nicht vorhanden, die Sklerose stellt sich erst allmählich ein, die Farbe wechselt von einem heißen Braun bis zu Rosa und Kirschrot. Mit dem Eintritt der Sklerose werden die Flecken speckig oder fast narbig, sie sind mehr oder weniger deutlich begrenzt; wenn sie voll ausgebildet sind, tragen sie oft das folgende Gepräge: sie haben ein erythematöses Centrum, das mit kirschroten Flecken durchsetzt ist, und die Größe eines Fünf frank-Stücks hat. Um dasselbe herum findet sich ein 1 mm breiter, braunroter Ring. Der Fleck ist hart und springt etwas vor.

Besonders genau beobachteten Brocq et Veillon die Entwicklung dieser kleinen Flecke; erst ist es ein oberer Fleck von weiß-violetter Farbe, rund und überlinsengroß; die Hautalten sind dort etwas vermischt, aber nicht gänzlich verschwunden; keinerlei andere Veränderung, kein Ödem, keine Verhärtung, keine Infiltration, nur die Farbveränderung; etwas später wird der Fleck im Centrum etwas mehr weiß, rings herum etwas mehr violett; eine Anzahl dieser Flecke stehen auf einem gleichsam violetten Grunde; der Übergang zum gesunden Gewebe ist meist — nicht immer — ein allmählicher. Eine ganz ähnliche Schilderung entwirft Thibierge von seinen Plaques sclérodermiques périungués.

Bisweilen kommt es bei sehr starker Exsudation zur Blasenbildung; es entstehen entweder kleine Bläschen, die bald wieder eintrocknen

und mit Narbenbildung heilen (Bouttier, Roux), oder es kommt zu einer blässigen Eruption (Hardy) oder es treten auch noch später auf den narbigen Stellen rasch abheilende Blasen auf. In anderen Fällen entstanden bei Einwirkung der Sonnenhitze kleine weiße durchsichtige Papeln, die ein paar Tropfen farbloser Flüssigkeit entleerten.

Bei manchem der Fälle ist von einer Induration mit Verödung der Döcke der Haut eigentlich keine Rede; hier setzt sofort die Atrophie ein. Die Haut bietet dann sehr oft durchaus das Bild der Atrophia cutis propeia. Sie ist häufig dann gerade abnorm gefaltet, wie zerknüppelt oder zerdrückt, zigarettenpapierartig, dünn, man hat den Eindruck, als ob sie abnorm zerrißlich wäre. Kleine Falten, die man hoch hebt, bleiben übermäßig lange bestehen.

Sehr charakteristisch ist diese eigentümliche Hautbeschaffenheit in dem Fall ausgeprägt, den Figur 10 veranschaulicht. Die Beobachtung ist nach verschiedenen Richtungen hin interessant.



Fig. 10

Scleroderma mit partieller Atrophia cutis propeia; Akromiektie

Es handelt sich um ein zur Zeit der ersten Untersuchung von drei Jahren 26-jähriges Mädchen, die körperlich nicht belastet ist, nicht nervös war, ausserhalb innerer Zeichen von Vasculitis absolut heil (heiter Kopf, kalte Hände und Füße, Schwindel, Ohrensausen etc.). Seit 3—4 Jahren werden die Finger in der Kälte blau, schwellen an, fühlen sich sehr kalt an. Die Haut hat sich allmählich verdichtet, dabei sind die Finger an ihren Enden immer dünner und später gerundet. Die Hände zeigen jetzt das ausgeprägte Bild der Akromiektie, sind an den Enden insgesamt angeschwollen, an den Gelenkphalangen eher etwas geschwollen, ebenso macht die Mittelhand einen geschwollenen wie gepolsterten Eindruck. Die Haut der Finger

ist ungleichmäßig verästelt; manche Stellen sind verbleicht, verhärtet, mit der Unterlage verwachsen, darunter sind Partien, in denen die Haut verhäutet, rot, perkutiert aussieht; sie hat dabei ihre Elastizität ganz verloren, so daß dauernd kleine Falten, besonders am Dorssa der Finger stehen bleiben. An der Pulpa der Finger ist die Haut signifikant glatt, hart, auch hier ganz unelastisch, so daß sich diese Teile wie unterminiert anfühlen. Die Interphalangealgelenke sind geschwollen, und zum Teil in halbgebogener Stellung fixiert. Das Händerbild läßt die Verkleinerung der Endphalangen sehr deutlich erkennen; es haben die Knochen an der Basisierung in toto teilgenommen, so daß ein ähnliches Bild, wie es Tafel XXV darstellt, resultiert. An den Füssen nur geringe Veränderungen. Übriger Körper frei. In den folgenden drei Jahren hat der Prozeß langsam Fortschritte gemacht.

Hier gestattete das Vorhandensein verhärteter typisch-sklerotischer Hautpartien ebenso wie die Beteiligung der Knochen ohne weiteres die Diagnose.

Wo also diese Veränderungen nur partiell auftreten und an anderen Stellen die typische sklerodermatische Hautbeschaffenheit vorliegt, erheben sich kaum diagnostische Zweifel; anders ist es, wo sie das Bild überdeckt: hier kann die Abgrenzung von *Atrophia cutis propria* schwierig oder unmöglich werden, wie ich das beobachtet habe. Auf solche Fälle hat namentlich Ruzik besonders hingewiesen (s. u. S. 62). Meist treten die Farbveränderungen der Haut hier sehr hervor, die zweifellos bedingt sind, teils durch abnorme Gefäßfüllung, teils durch Pigmentierung; damit haben wir weitere Charakteristika der sklerodermatischen Haut genannt; es sind nämlich mit den tropischen Veränderungen noch Störungen der Pigmentation, der Sekretion und der Vasomotilität innig vergesellschaftet.

Das Verhalten der Sekretion ist ein wechselndes. Die Schweißsekretion kann während des ganzen Verlaufes der Krankheit ungestört bleiben. Einige Male wurde eine ganz allgemeine Hyperhidrosis beobachtet, häufiger schwitzten die sklerodermatisch betroffenen Hautpartien allein übermäßig stark; das wird z. B. von Handford, Eulenburg, Herzheimer, Osler, Vidal berichtet; am häufigsten aber war die Schweißsekretion an den betroffenen Stellen herabgesetzt oder ganz unterdrückt (Brault, Dinkler, Mosler, Morrow, Schubiger, Westphal, Bruns, Neumann, Scherber u. a.). Kapasi sah bei einer Kranken nach einer Injektion von 0,01 Pilocarpin bei sonst allgemeinem Schweißausbruch sowohl an den sklerotischen wie an den atrophischen Stellen nur mäßige Schweißsekretion. Walters führt diese Differenzen darauf zurück, daß das Stadium, in welchem sich der Prozeß befindet, für diese Dinge von der allergrößten Bedeutung ist; es wird im ersten Stadium die Sekretion normal oder gesteigert, im späteren meist herabgesetzt sein. Bei den großen Differenzen, die sich bei ein und derselben Person an den verschiedenen Stellen bezüglich des lokalen Hautprozesses bemerkbar machen, wird

es im Einzelfall immer davon abhängen, ob gerade an den an Schweißdrüsen reicheren Stellen die Atrophie schon weit genug um sich gegriffen hat, um die Schweißdrüsensekretion zum Versiegen zu bringen. Lewin-Heller sind der Meinung, daß speziell auf die Schweißbildung auch neurotische Einflüsse von Bedeutung sind. Das wird namentlich da Geltung haben, wo es sich um Hyperhidrosis diffusa handelt, während sonst eine lokale Hyperhidrosis durch lokalen Reiz recht wohl denkbar ist.

Wenig ist über Änderung der Talgsekretion bekannt. Jünger Male fiel die Trockenheit der Haut auf (Nielsen, Morrow), andere Autoren haben gerade das fettige Aussehen hervor; der eigentümlich spiegelnde Glanz, der uns z. B. an der sklerodermatisch veränderten Stirn oft auffällt, ist auch wohl ein Beweis dafür, daß die Talgsekretion ungestört oder gesteigert ist. Aber natürlich kann sie, wenn der lokale Prozeß die Talgdrüsen zerstört oder ihren Ausgang verlegt hat, auch versiegen; so konnte Lewin das Fehlen der Talgdrüsen in den sklerodermatischen Partien feststellen, während sie bei White und bei Köbner ihr Vorhandensein durch eine Akne dokumentierten.

Wichtiger als die Störungen der Sekretion und die der Vasomotilität: sie sind sehr früh vorhanden und oft sehr zahlreich und in die Augen springend. Hier treffen wir auf Symptome, die uns aus den früheren Schilderungen der Raynaudischen Krankheit und der Erythromelalgie schon geläufig sind.

Oft gehen jahrelang Symptome von lokaler Cyanose oder lokalem Absterben bestimmter Teile voraus. Besonders zeichnet sich eine Unterform der Sklerodermie, die Sklerodaktylie, dadurch aus, daß vasomotorische Symptome frühzeitig als „Prodromalerscheinungen“ auftreten und lange Zeit oder für immer dem Krankheitsbild treu bleiben. Das sind die Fälle, in denen das Krankheitsbild lange Zeit durchaus das der Raynaudischen Krankheit ist, und wo später ein Mischzustand resultiert, in dem es ganz unmöglich ist, die Differentialdiagnose zwischen einer der beiden Krankheiten zu stellen. Aber abgesehen von diesen Fällen, auf die wir noch zurückkommen, finden sich namentlich im Anfang, bevor sklerodermatische Veränderungen der Haut nachweisbar sind, anfallsweise oder längere Zeit anhaltend Asphyxie locale und Synkope locale, oft zusammen mit starker subjektiver Kälteempfindung. Solche Fälle wurden in letzter Zeit beschrieben von Dinkler, Hutchinson, „*venous turgescence (that is the most typical instance of true Raynaud) may go on for years without the slightest tendency to the sclerodermic condition*“, Hallopeau, Herringham, Jeanselme, bei dieser Krankheit häufig Schmerzen die Cyanoseanfälle begleiteten, Mathieu, Ohier, Potain, Raymond, der von einer *Ataxie vasomotrice* spricht und darin auch andere gleich

zu erwähnende Symptome gestörter Vasomotilität einbegreift. Rau, Rendu und viele andere, Thibierge beschreibt ausführlich, wie bei seiner Patientin seit sieben Jahren sich jeden Winter genau dieselben Zustände wiederholten, immer wieder eine bläulich-cyanotische Verfärbung und eine Anschwellung der Finger eintrat, die stark schwitzten und immer und besonders des Nachts kalt waren; die Unterarme waren marmoriert, die Füße kalt und schweißig. In einem Fall von Fuchs traten Anfälle von Cyanose und Schwitzen der Hand im ersten Stadium des Leidens immer wieder auf. Sehr merkwürdig ist ein Zustand, den Fränkel beschreibt: in einem Fall von generalisierter Sklerodermie trat auf der Zunge wiederholt ein weißer trockener Fleck auf; die Erscheinung, die als lokale Synkope der Zunge zu deuten ist, ist von einem heftigen Schmerz begleitet.

Auch ich konnte in einigen meiner Fälle ein Voraussgehen vasomotorischer Symptome den Angaben meiner Kranken entnehmen. Zweimal wurde betont, daß der Kranke schon seit der Jugend an großer Empfindlichkeit gegen Kälte gelitten hatte, ohne daß Erfrierungen oder die Beschäftigung in der Kälte oder mit Wasser dafür zu beschuldigen gewesen wären.

Nicht viel seltener wurden Symptome aktiver Hyperämie beobachtet.

Solche Fälle beschrieben Engelmann, Darier, et Gaston, Friedhelm, Hallspeau, Boutlier, Schaper, Osler, Savill. Wenn zu den vasomotorischen Symptomen noch sensible in Gestalt von Schmerzen und schmerzhaften Parästhesien treten, haben wir den Symptomenkomplex der Erythromyalgie vor uns, der ganz vereinzelt ebenfalls beobachtet wurde, so von Vlandi-Nicolich und von Walters, in dessen einem Fall Rote, Schwellung und Schmerzhaftigkeit etwa drei Jahre lang bestanden. Beron sah die Affektion mit roten, stark juckenden Flecken beginnen; in solchen Fällen kann naturgemäß die Abgrenzung der Sklerodermie von der Erythromyalgie schwierig werden. Dühring beschreibt einen Fall, in dem die Affektion unter den Erscheinungen einer rezidivierenden Erythromyalgie begann (*Sclerodactylia annularis ainhumoides*). Die Rötung kann ebenso, wie die Cyanose, eine mehr diffuse sein oder in isolierten Flecken auftreten, die dann nach Lewin-Heller mit einer grauen Vorläufe an der Haut um die Gelenke gefunden werden. Die Rote kann sich im weiteren Verlauf der Sklerodermie an den verschiedenen Stellen immer wiederholen, indem sie jedesmal, wenn ein neues Gebiet ergriffen wird, der sklerodermatischen Umwandlung der Haut vorausgeht. Vereinzelt ist der Befund von Erythemen der Augenlider bei Beginn der Sklerodermie (Barth). Es kommen übrigens aktive und passive Hyperämie auch gar nicht selten bei ein und demselben Kranken an verschiedenen Stellen gleichzeitig vor.

So erkrankte Bruns' Patient zunächst mit heftiger Schwellung des rechten Fußrückens und Brennen in diesen Teilen, so daß man an ein Erysipel dachte. Diese Störungen besitzten sich langsam aus, im späteren Verlauf fand sich eine diffuse blaurote Färbung. Hallopeau et Nazare Aga beobachteten abwechselnd auftretende Anfälle von Ikterus und Hyperämie, letztere von Hyperhidrosis und Temperaturzunahme begleitet. Die vasomotorischen Veränderungen beschränken sich auch nicht nur auf die sklerodermatisch erkrankten Teile, sondern finden sich auch außerhalb dieser, verhältnismäßig oft z. B. an den Füßen bei Sklerodaktylie oder auch als allgemeine Erytheme. So trat bei einem Kranken Osler's sofort eine starke Hauthyperämie am Körper auf, wenn der Kranke sich entblößte. In diesem Falle waren die vasomotorischen Störungen überhaupt besonders stark, weswegen ich ihn etwas ausführlicher mitteile.

49-jähriger Mann, keine Heredität, früher Malaria. Oktober 1895 Infektion, mehrere Monate lang rheumatische Schmerzen. November 1895 akute Entzündung des rechten Fußgelenks, die Heilung dauerte mehrere Wochen, Pat. kam sehr heiser, die Füße schwellen leicht an und röteten sich. Seit Januar gelegentlich Schmerzen und Parästhesien in den Händen, während die Schmerzen an den Füßen verschwinden. An der Stirn bildeten sich jetzt schmerzhafte Blasen. Knötchen, aber des Wangen wurde die Haut etwas fester; wenn die Brust oder der Nacken unbedeckt wurden, so entsteht hier sofort eine starke Hyperämie. Die Finger sind jetzt kalt, brennt sklerodermatisch, kongestioniert. Beim Sitzen und sich Aufheben tritt in der Haut der Füße sofort eine enorme Kongestion ein, sie sind von purpurner Farbe und kalt. Haut sonst hier ganz normal. Dauernd Tachykardie.

Osler bemerkt, daß er niemals so starke Cyanose der Beine sah, wie in diesem Falle.

Von einigen, namentlich englischen, Autoren wurde, wie ich früher schon erwähnte, versucht, die Morphoea als besondere Form der Skleroderma abzusondern, indem man sie aus einzelnen Flecken besteht läßt, die in der Mitte sklerodermatisch-atrophisch, jedesmal von einem violetten Ring (lilac ring) umgeben sind. Die Tatsache des Vorkommens dieses lilac ring ist unzweifelhaft, doch ordnet sich diese Erscheinung den anderen hier genannten vasomotorischen Störungen ohne jede Schwierigkeit ein.

Von sonstigen vasomotorischen Symptomen wurde von einigen Autoren Urticaria angegeben (Pepper, Helm, Uhlenhuth, Schultz und Dabiel und besonders intensiv und hartnäckig in einem Falle von Sternthal). Bettmann sah eine zufällig starke Urticaria heretica bei diffuser Skleroderma; ein mit einem Fingerringel über die Haut gezogener Strick war noch nach 20 Stunden deutlich. Ich möchte aber betonen, daß ich fast regelmäßig auf das Verhalten der vasomotorischen Hauterregbarkeit geachtet und nur selten eine Abweichung von der Norm gefunden habe. In diese Kategorie dürfen

wir wohl auch die Tachykardie in Osiers eben zitiertem Falle rechnen.

Gut nicht selten werden Teleangiectasien beobachtet. Hoppe-Seyler, Nielsen, Arnold schildern rote, polygonale, durch erweiterte Venen gebildete Figuren auf dem Handrücken. Wagner sah am ganzen Körper und namentlich in der Peripherie der erkrankten Stellen zahlreiche erweiterte Hautvenen. Ähnliches zeigt eine meiner Beobachtungen. Dercum sah teleangiectatische Stellen an den Augenlidern. Bivellen wird eine übermäßige Venenentwicklung wohl nur dadurch veranlaßt, daß durch die dünne Haut die Venen stärker durchschimmern.

Im engen Zusammenhang mit den eben besprochenen Veränderungen der Blutfüllung steht auch die der Temperatur der betroffenen Teile. Wir sagten schon, daß subjektiv oft Kälteempfindungen geklagt werden, doch kommt bei Hyperämie natürlich auch das Gegenteil vor. Über die objektive Temperatur der affizierten Teile liegen noch wenig Untersuchungen vor. In späteren Stadien, in denen die Atrophie das Krankheitsbild beherrscht, ist meist Temperaturherabsetzung festzustellen. Neumann beobachtete im Anfang der Krankheit Steigerung, später Herabsetzung der Temperatur. Kaposi fand die der erkrankten Teile bis um 1,5° herabgesetzt, seltener normal, noch seltener erhöht. Maers konstatierte an der erkrankten linken Hand 27,2°, an der rechten 26,3°, während 28 bis 29° normal sein sollen. Bei ungleichmäßigem Fortschreiten der Sklerodermie können auch Differenzen zwischen einzelnen Körperteilen sich bemerkbar machen, wie das Armaingowid beschreibt. Was den Einfluß der atmosphärischen Kälte auf die Krankheitserscheinungen anlangt, so war dieser entsprechend den Erfahrungen bei Raynaud meist ein ungünstiger; doch kamen auch hier Ausnahmen vor.

Wenn sich also vasomotorische Symptome auch sehr häufig bei Sklerodermie finden, so soll doch am Ende nicht vergessen werden, daß auch bei gut beobachteten Kranken solche Veränderungen im Verlauf der Krankheit ganz fehlen können; am seltensten ist das wohl bei der Sklerodaktylie der Fall, aber auch da kommt es vor, wie von Naunyn und Dercum mitgeteilte Fälle zeigen.

Ebenfalls sehr häufig sind Veränderungen der Pigmentierung der äußeren Decke. Nach den Zählungen Lewin-Hellers war die am häufigsten beobachtete Farbe braun oder gelbweiß, aber da bei demselben Kranken alle möglichen Farben vorkommen, so ist mit solchen Zahlen wenig gewonnen. Neben braun und gelb und ihren Nuancen findet sich öfter auch eine graue Verfärbung. Das wichtigste ist, daß nach allgemeiner Auffassung die Stärke der Pigmentation zu der Stärke der sonstigen Krankheitserscheinungen in keinem Verhältnis steht.

Die Pigmentierung ist teils streifenförmig, teils fleckig, teils diffus angeordnet; sie findet sich auch an nicht sklerodermatischen Stellen und kann dort wohl auch der Vorläufer einer später sich entwickelnden Sklerodermie sein; ja, gelegentlich einmal ist sie überhaupt das erste Zeichen einer solchen (Biro). Ich sah eine Patientin, ein junges Mädchen, bei der im Verlauf einer über viele Jahre hinaus sich erstreckenden Beobachtung wiederholt das Auftreten einer unregelmäßig fleckweisen, ausgesprochen schmutzig braunen Pigmentierung an verschiedenen Stellen zur Beobachtung kam, ohne daß später immer gerade diese Stellen sklerotisch wurden. Auch in dem erwähnten Fall Darier et Gastons war das erste Zeichen eine lokale fleckweise Pigmentvermehrung. Einige Autoren beschreiben bestimmte Stellen als erste Ablagerungsstellen des Pigments. Wagner sah eine sehr starke Pigmentierung „sehr früh, vielleicht zuerst“ die Austrittsstellen der Haare einnehmen, es fanden sich hier überall gelblich-bräunliche Punkte. Schmidt sah Hand- und Fußrücken von kleinen Pigmentinseln bedeckt, deren Mittelpunkt immer ein Haarfollikel bildete. Reinhardt meint, daß die Pigmentierung den Hautvenen folgt. Sie kann sehr hochgradig sein, den größten Teil der Körperoberfläche einnehmen und selbst, wenn auch selten und in nicht sehr ausgedehnter Weise die Schleimhäute befallen; so sah Naunyn die Schleimhaut der Lippen unregelmäßig schwach grau gefärbt. Kren hat der Frage der Pigmentierung der Schleimhäute besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Daß sie vorkommt, ist gewiß, sie besteht aus kleinen, sehr selten aus größeren, unscharf begrenzten Fleckchen, und es folgt stets eine Depigmentierung später nach. Touchard betont auch die unscharfe Begrenzung der violett-graubraunen Fleckchen. Es leuchtet ein, daß wir, wenn wir einen Kranken mit dieser diffusen allgemeinen Pigmentierung vor uns haben, sofort die Diagnose Addisonische Krankheit in Erwägung ziehen werden. Solche Fälle wurden von Féréol, Roßbach, Willich, Mendel, Naunyn, Schulze, Briesaud, Uhlenhuth, Oslar, Charvet et Carle, Touchard, Tsuchida, Haenel, Lichtwitz beschrieben und zum Teil als Sklerodermie plus Morbus Addisonii bezeichnet, eine Diagnose, die Lewin-Heller auch als vollkommen berechtigt ansehen, während neuere Autoren darüber doch recht zweifelhaft geworden sind (weiteres siehe im Abschnitt Diagnose).

Im Gegensatz zur Pigmenthypertrophie kommt auch eine Pigmentatrophie vor; Lewin-Heller meinen, daß es sich in solchen Fällen mehr um Nerven, denn um idiopathischen Pigmentschwund gehandelt habe, doch kann das kaum für alle Fälle Geltung haben, — z. B. nicht für einen von Friedlheim, wo neben einer auffälligen, dunklen Färbung gewisser Teile der Brust die Brustwarzen und der Nabel ganz hell waren. — Es gibt schließlich auch sicher Fälle, in denen jede abnorme Pigmentierung fehlt.

Levyer teilt die Pigmentanomalien bei der Sklerodermie in folgende drei Gruppen ein: In der ersten fehlt das Pigment fast vollständig, die Haut ist weiß gefärbt und nimmt oft die Farbe des Alabasters oder des Marmors an. In der zweiten Gruppe erscheint das Pigment wie an einzelnen Stellen zusammengeklüfft, es wechseln gleichmäßig weiße und braune Stellen ab, so daß die Haut eine scheckige Beschaffenheit annimmt. In einer dritten Gruppe fehlt eine Atrophie des Pigments völlig oder ist nur an vereinzelten Stellen vorhanden, während am ganzen übrigen Körper eine übermäßige Pigmentierung hervortritt.

Ich selbst kenne einen Fall beobachten, der ein höchst eigenartiges und hutes Bild darbot.

L. 47 Jahre alt. Katholik.

Es sei im voraus bezüglich der Anamnese bemerkt, daß diese nur von dem Kranken stammt, der ein großes Interesse daran hatte, seine Krankheit auf den geschilderten Unfall zurückzuführen, während ein solches Zusammenhang aus nach Lage der Sache sehr unwahrscheinlich erschien (s. übrigens die oben oben darüber gemachten Bemerkungen). Vor einem Jahr wurde Pat., als er mit seinem Wagen über ein Eisbahngeleis fuhr, von einem Eisbahnwagen erfaßt, er fiel von seinem Wagen herunter zwischen seine Pferde, wurde berußt und hatte zahlreiche Wunden am Kopf und am ganzen Körper, die aber alle vollkommen geheilt sind. Kein Fieber, kein Erbrechen, keine Hämaturie mit Nase, Ohr oder Mund. Seit dieser Zeit Kopfschmerzen, Schmerzen in Armen und Beinen und die gleich zu beschreibenden Veränderungen in der Haut. Außerdem ist Pat. im ganzen sehr ängstlich, depressiv, zerstreut, hat schlechten Schlaf, isst allenthalben wenig.

Die Hauterscheinung eine besondere Störung, geringes Zittern der Zunge, Hyperämie der behaarten Kopfhaut, an der linken Kopf- und Gesichtseite eine Anzahl von Narben von eigentümlich magrassem Aussehen, etwas unter dem Niveau der normalen Haut liegend. Die unteren Extremitäten sind in eigentümlicher Weise verändert und bieten ein höchst merkwürdiges und hutes Bild. Das Grundfarb ist ein dunkles Rot, darüberlag eine große Anzahl stark geschlängelter, tiefblau-schwarz durchscheinender Venen, dazwischen liegt die Haut eine gelbliche Verfärbung, dazu kommen am rechten Bein ausgebleichte Narben von der im Gesicht schon geschilderten magrassem Farbe. Die Unterschenkel sind namentlich in ihrem unteren Drittel und an den Füßen deutlich geschwollen, die Haut ist füllig prall gespannt, hart wie Leder, auf der Unterlage schwer verschieblich, nur mit Mühe in Falten abhebbar, Fingertest nicht zu bestehen. Die Veränderungen sind beiderseits ziemlich symmetrisch entwickelt, reichen nur rechts etwas höher hinauf, und zwar hinten bis in die Glutalgegend, vorn bis zur Mitte der Oberschenkel mit proximalwärts abnehmender Intensität. An der Tibia fühlt man rechts deutlich eine Anzahl von Knötchen. Die Reflexe in der Haut auf den Schmerz des unteren Extremitäten sind normal, nur links ist das Knötchen schwer hervorzufinden, weil die Haut über die Patellarsehne stark gespannt und verklebt ist. Die Temperatur ist an den Beinen nicht verändert. An der Rückseite beider Ellenbogen finden sich ganz ähnlich veränderte Stellen, auch hier ist die Haut tiefrot gefärbt und von schwarzblauen, erweiterten Blutvenen durchzogen, dabei hat der Unterlage aufliegend und verklebt. Die Sensibilität ist isoliert gestört, als eine allgemeine Analgesie betr. die also sicher eine funktionelle ist. (S. fre).

Sehr merkwürdig ist in diesem Fall, daß die offenbar von der Ver-

letztgenannten Narben die geschilderte abnorme Beschaffenheit sklerodermatischen Gewebes und die abnorme Pigmentierung angenommen haben; doch ist das immerhin kein vereinzelltes Vorkommen, wie ich früher schon erwähnt habe; ähnliches haben Brocq et Veillon beschrieben, während in anderen Fällen Wunden bei derartigen Kranken in der gewöhnlichen Weise heilten. In einem Fall wie dem eben geschilderten springen die Pigmentveränderungen naturgemäß sehr in die Augen. Eine klinische Wichtigkeit besitzen sie aber hier wie auch sonst nicht, dazu sind sie zu regellos verteilt, in ihrem Auftreten zeitlich wie örtlich zu unbestimmt, wenn sie im ganzen auch mehr die Endstadien des Processes auszeichnen.

In jeder Hinsicht von hystoragendem Interesse sind dagegen die trophischen Störungen.

Neben den geschilderten indurativ-atrophischen Veränderungen der Haut begegnen wir recht häufig einer Geschwürsbildung. Lewin-Heller fanden unter ihren Fällen solche im ganzen 48mal angegeben; sie betonen, daß ihre Prädispositionsstelle die Knochenvorsprünge sind, an denen auch die normale Haut am leichtesten verletzt ist. In den Fällen, in denen diese Geschwürsbildung erst im späteren Verlauf auftritt, dann, wenn die Haut mit den Knochen fest verwachsen und allen möglichen traumatisch-infektiösen Schädigungen ausgesetzt ist, sind Ulcerationen und Panaritien ja gewiß nicht schwer zu erklären, und haben nur sekundäre Bedeutung. Anders liegt die Sache für die nicht seltenen Fälle, in denen die Geschwüre schon verhältnismäßig früh auftreten und an Stellen, wo die Haut wenigstens noch nicht sklerodermatisch verändert ist. Beschrieben wurde das von Schubiger, Wolters, Morrow, Raymond, Alpar, Dreschfeld, Eichenhoff, Friedhelm, Maëre, Osler, Supino. Letzterer berichtet über einen Fall, in dem im Alter von 18 Jahren Geschwüre auftraten, die aufküllten und wieder aufbrachen; erst mit 41 Jahren trat Sklerodermie ein, und zwar zuerst an den Stellen, an denen die Eiterungen mit Verließe gewessen hatten. Raymond bemerkt für seinen zweiten Fall ausdrücklich, daß die Panaritien schon in der vasomotorischen Periode vorhanden waren. Alpar sah sie im hypertrophischen Stadium. Schubiger berichtet über einen Fall, in dem die Krankheit mit symmetrischer Entzündung der Fingernägel begann; nach ein paar Jahren Panaritien des linken zweiten Fingers und Exartikulation der letzten Phalange; während die Operationswunde rasch heilte, brachen an allen übrigen Fingern die Nagelglieder auf; die Panaritien heilten stets spontan, aber traten immer wieder auf; inzwischen hatte sich die Haut nun auch sklerodermatisch verändert.

Die Entstehung der Ulcerationen schildert Hardy so, daß sich kleine Pusteln und Blasen bilden, die platzen und Gelegenheit zu Ulcerationen oberflächlicher Art geben, deren Resultat eine oberfläch-

liche Narbe ist, aber nie eine positive Zerstörung der Haut. In einer meiner Beobachtungen waren zu einer Zeit, wo neben vasomotorischen Symptomen nur eine nicht erhebliche Dünheit der Haut bestand, ebenfalls sehr häufig kleine Bläschen und Geschwüre entstanden, die zu ganz oberflächlichen Narben Veranlassung gaben. Das letztere gilt aber nur für die leichteren Fälle. Es kann im Gegensatz dazu zu tief fressenden Geschwüren kommen, die die Haut und auch tiefer gelegene Gewebe zerstören, sogar zur Gangrän kleiner Gliedabschnitte führen können. In einem von Faulerton berichteten Fall traten z. B. bei einer seit 19 Monaten bestehenden diffusen Sklerodermie zwei gangränöse Stellen, eine auf dem Fußrücken, eine andere am Condylus intern. des rechten Beines auf, so daß eine Amputation im mittleren Drittel des Oberschenkels nötig wurde; die Heilung erfolgte per primam. Ähnliche, wenn auch nicht ganz so schwere Fälle sahen Eichhoff, Vissl, Friedheim, Savill, dessen Fall Züge von Sklerodermie, von Raynaudscher Krankheit und Erythremelalie trägt, u. a. Bei einer meiner Kranken entwickelte sich aus einer verhoarten Stelle am rechten Mittelfinger ein Geschwür, das bis auf den Knochen ging, es mußte ein kleines Stückchen Knochen entfernt werden. Dabei bestanden viele Wochen die heftigsten Schmerzen. Bei derselben Kranken entstanden wiederholt an den Fingerspitzen kleine Risse und Schnitte, die sich leicht entzündeten und lange Zeit zur Heilung brauchten. Einmal entstand hier auch ein Panaritium am Unterschenkel. — Nicht immer gehen die Geschwüre aus später ulcerierenden Bläschen hervor, sie können auch direkt sich bilden, indem Flecke auftreten, die mit einer Kruste bedeckt sind, unter der eine geringe Eiterung sich etablirt. Die Heilung der Geschwüre erfolgt in verschieden langer Zeit; das eine Mal zeichnen sie sich durch eine sehr geringe Heilungstendenz aus, eine anderes Mal schreitet dagegen die Heilung rasch und anstandslos vor, wie in gesundem Gewebe. Die Geschwürbildung ist fast stets, was sehr wichtig ist, mit Schmerzen verbunden; nur in sehr seltenen Fällen, die im ganzen kompliziert sind, wie in dem von Mendel, waren es analgetische Panaritien. Einzelne Beobachtungen sind wegen des Sitzes der Geschwüre bemerkenswert. Levin-Heller erwähnen, daß mehrere Male die Geschwüre symmetrisch saßen. Morrow beschreibt folgendes Verhalten:

65jähriger Mann; seit 26 Jahren Rheumatik, 10 Jahr später Gelenk-rheumatismus. Seitdem nie frei von rheumatischen Beschwerden, vor einem Jahr Symptome von Stiffheit des rechten Oberschenkels, er bemerkte, daß die Haut hier hart, trocken und starrteigig wurde, und zwar fleckweise. Nach einigen Monaten brach eine solche Stelle auf; der geschwürige Prozeß überschreitet aber nicht den den Fleck umgebenden Haarring. Bei der Untersuchung fanden sich Flecke von mannigfacher Gestalt, einzelne von oedematöser Beschaffenheit, sie waren völlig haarlos, die Schweiß- und Talgsekretion war an ihnen gänzlich aufgehoben; geschwürige Prozesse, die zum Teil hypertrophische Narben hinterließen, bestanden an beiden Unterschenkeln. Außerdem bildeten sich hier und da, von Tag zu Tag wechselnd, kleine Blasen, über ein

halbes Dystand an einem Tage, erbsengroß, von blauer Farbe, mit einer klaren, etwas gelatinösen Flüssigkeit gefüllt; wenn sie aufbrachen, ließen sie eine exkorierte Oberfläche zurück und heilten in wenig Tagen; die Geschwüre überschritten auch jetzt niemals die umgebende violette Ringzone.

Kren erwähnt, daß in einigen seltenen Fällen auch Geschwüre in der Schleimhaut zur Beobachtung kamen; bei einem meiner Kranken, den allerdings das Bild der Sklerodaktylie mit Raynaud'schen Symptomen darbot, traten am Ohrtrand Geschwüre auf.

Die Zahl der Geschwüre kann bisweilen eine sehr große sein (Leredde et Thomas, Deha).

In den spätesten Stadien kann es bei entsprechend lokalisierter und sehr hochgradiger Hautveränderung auch zum Decubitus kommen (Gintrae, Walter, Day, Mader, Chiari, Collins).

Von weiteren Ernährungsstörungen an der Haut erwähnen wir starke Desquamation, die z. B. Herzheimer in einem sehr charakteristischen Fall beschreibt; bald saßen die Schuppen fest und konnten nur mit einiger Mühe abgelöst werden, um dann eine nässende Fläche zurückzulassen, bald stießen sie sich von selbst los. Selten sind Blutungen in die Haut beobachtet worden. (Spiegler, Bestnier, Oulmont.) Villecq beobachtete bei diffuser Sklerodermie, die Finger und Gesicht freigelassen hatte, hartnäckige Blutungen in die gesamte Haut und die Schleimhaut der Mundhöhle. Unter Gelbsucht und Benommenheit erfolgte der Tod nach mehrmonatlichem Krankenlager. Die Erscheinung gehört hier wohl in das Gebiet der Allgemeinerscheinungen der Sklerodermie.

Ernährungsstörungen der Anhangsgebilde der Haut kommen häufig vor. Lewin-Heller fanden in ihren Fällen 21mal Störungen des Haarwachstums, im einzelnen treten die Veränderungen aber oft recht wenig hervor. Die Haare sind auf den sklerodermatischen Partien trocken, brüchig, dünner; sie stehen wie Borsten aufgerichtet (Brück). Mehr Bedeutung hat die Tatsache, daß einige Male ein totaler Haarverlust am ganzen Körper mit der Sklerodermie einherging (Grünfeld, Herringham, Rille, Neumann); hier erschien die Alopezie vor der Sklerodermie. Sternthal fand eine halbseitige Alopezie, die durch die Hautveränderung bedingt war und mit deren Verschwinden ebenfalls verschwand. Gibney beobachtete eine Kombination von Hemitrophia facialis progr., Alopezia areata und Sklerodermie im Gebiet des N. ophthalmicus. Eldowne beobachtete ebenfalls Sklerodermie und Alopezia areata; er erklärt ausdrücklich dies Zusammenkommen als kein zufälliges. Morrow sah, wie erwähnt, völlige Haarlosigkeit auf den sklerodermatischen Flecken; ebenso Siebert und Wagner. Einige Male wurde partieller oder totaler Pigmentverlust der Haare beobachtet (Rosenthal, Frémy).

Häufiger sind die Veränderungen an den Nägeln; Lewin-Heller

berechnen sie auf 11%. Die Nägel werden längs- oder quergestriift, bürstig, dabei oft dicker als normal, deformiert, bucklig oder hakenförmig gekrümmt, sie bekommen ein verdicktes Oberhäutchen, das so fest verwachsen ist, daß es nicht zurückgeschoben, sondern abgeschnitten werden muß. Bruns erwähnt, daß die Nägel an den erkrankten Füßen häufig abgestoßen wurden. Am häufigsten sind atrophische Zustände. Die Nägel schrumpfen zu kleinen Hornplättchen zusammen, sind nur linsegroß, oder können sogar vollkommen verschwinden. Quinquand hebt hervor, daß der Ausfall der Nägel ohne jede Eiterung erfolgt. Thibierge beschrieb kleine sklerotische Flecke um den Nagel herum. In einem Fall Eiehhoffs war die Nagelverdickung das erste Symptom und die Nagelveränderungen standen auch weiterhin im Vordergrund des klinischen Interesses; hier ergab die Untersuchung aber die Anwesenheit des Achorion Schönleini. Die Fußnägel sind fast niemals wesentlich geschädigt.

Ahangweise sei erwähnt, daß einige Male Spontanausfall der Zähne beobachtet wurde (Herringham, Crocker, Bonttier). Im Falle von Herringham unter Rückbildung des Zahnfleisches. Lewin sah ebenfalls hochgradige Atrophie des Zahnfleisches, wodurch die Zähne außerordentlich verlängert erschienen.

Sensibilitätsstörungen. Die sensiblen Störungen zeigen bei der Sklerodermie in vieler Beziehung Ähnlichkeit mit den gleichen Störungen bei der Raynaudschen Krankheit, wenn auch in anderer Beziehung Abweichungen vorkommen. So treten, um mit den letzteren zu beginnen, die subjektiven Störungen der Sensibilität bei der Sklerodermie außerordentlich stark zurück, so daß diese Krankheit, was bei der Raynaudschen Krankheit sicher sehr ungewöhnlich ist, gar nicht selten ohne jede subjektive Sensibilitätsstörung, besonders ohne alle Schmerzen verläuft.

In nicht weniger als 76 Fällen war nach Lewin-Heller ausdrücklich das Fehlen jeglicher sensibler Störung angegeben. Immerhin sind in der Mehrzahl der Fälle doch irgendwelche subjektiven Störungen vorhanden, die ich auch in meinen eigenen Fällen mehrmals konstatieren konnte. Sie treten sehr oft frühzeitig, im „Prodromastadium“ auf und manifestieren sich zumeist als Parästhesien, rheumatoide Schmerzen, als Brennen, Jucken, als Taubheitsgefühl, Gefühl von Eingeschlafensein. Bei einem meiner Kranken begann das Leiden vor 10 Jahren mit Gefühlosigkeit, zuerst im 4. Finger der linken Hand, diese dehnte sich allmählich auf alle Finger beider Hände aus, die Parästhesien traten mehr und mehr zurück und die Hautverhärtung bildete sich aus. Jetzt sind objektive Störungen der Sensibilität in geringem Maße insofern vorhanden, als das Lagegefühl ein wenig beeinträchtigt ist, die Patientin sagt selbst, daß

sie über die Lage ihrer Finger im Dunkeln nicht orientiert ist. Meist nur von mäßiger Intensität können diese Parästhesien zuweilen doch auch recht quälend werden.

Einige Male fanden sie sich auch in Form der Akroparästhesien (Osler, eigene Beobachtung). Über sehr heftige Kausalgien klagte einer meiner Kranken. Mit den Parästhesien zusammen oder auch allein kommen auch Schmerzen vor, die meist reißend und stechend, bisweilen bohrend, brennend, ziehend sind und auch überreizt in Ausnahmefällen intensiv werden können (Eichhoff, Walters). Neumann spricht von rasenden Schmerzen. Sehr oft wird über ein unangenehmes, spannendes Gefühl geklagt, das, wie schon erwähnt, oft den Kranken zuerst auf die Hautveränderung aufmerksam machte; es kann jahrelang anhalten. Die Schmerzen sitzen meist, aber nicht immer in dem von der Sklerodermie befallenen Gebiet und sind fast stets diffus, nicht auf ein Xerxengebiet beschränkt; auch davon gibt es seltene Ausnahmen, indem z. B. in einem Fall Osiers, in dem es sich aber offenbar um *Hemiatrophia facialis plus Sklerodermie* handelte, eine Quintaneuralgie vorlag. In einem Fall von *Morphea tuberosa*, den Jacquett und Guelliot beschrieben, bestanden sehr heftige Schmerzen in den Zähnen, die reflektorisch von Trigenimus ausgelöst wurden. In vielen Fällen ist der klinischen Beobachtung direkt zu entnehmen, daß die Schmerzen durch die Verhärtung und Verdichtung der Haut und der darunter liegenden Teile und den dadurch ausgeübten Druck bedingt sind, indem sie nur an den Stellen auftreten, wo die zu kurz gewordene Haut übermäßig angespannt wird. Welcher Natur sie in den seltenen Fällen sind, in denen diese Ursachen nicht wirksam sein können — Schmerzen in den nicht sklerodermatisch veränderten Teilen — ist später zu erörtern. Daß die Geschwürsbildung bei der Sklerodermie fast ausnahmslos unter Schmerzen verläuft, haben wir bereits hervorgehoben.

Nicht selten besteht auch eine gewisse Überempfindlichkeit gegen sensible Reize, namentlich gegen Kälte, worauf wir ebenso wie auf die subjektiven Kälteempfindungen schon hinarbeiten. Singer berichtet von seiner Kranken, daß sie ihre Hände deswegen öfter in warmes Wasser stecken mußte; Schubigers eine Kranke war gegen Kälte so empfindlich, daß sie metallene Gegenstände, die Türklinke z. B. nicht ohne eine Schürze anfassen wollte. Demgegenüber sind sowohl objektive Hyperästhesien wie Anästhesien ein recht seltener Befund. Die Empfindung kann selbst bei hochgradigster Sklerodermie noch immer völlig intakt sein, so daß Dinklers Kranke mit ihren völlig sklerodermatischen Fingern noch ohne Schwierigkeit Geld zählen konnte. Aber doch wurde eine leichte Unterempfindlichkeit gegen sensible Reize (Schmerz, Berührung, warm und kalt) einige Male gesehen, ohne daß man etwa berechtigt wäre, einen

Parallelismus zwischen diesen Störungen und den Veränderungen der Haut anzunehmen, wie Lewin-Heller mit Recht Walters gegenüber betont. Fälle mit stärkerer objektiver Sensibilitätsstörung wurden u. a. beobachtet von Higgins-Neddleshipp, Zambaco, Grünfeld, Hallopeau, Wertheimer, Mendel (atypischer Fall), Jeanmelme, Lépine, Mosler, in dessen Fall die Anästhesie die Schwankungen des Krankheitsbildes mitmachte, Mathieu, der im Centrum der weißen Punkte Anästhesie konstatieren konnte, während im Niveau der pigmentierten Randzone Hyperästhesie bestand, Savill, wo es sich nur um eine vorübergehende, zugleich mit den vasomotorischen Erscheinungen der Cyanose eintretende Anästhesie handelte. In allen meinen Fällen war die objektive Sensibilität normal. Eine auf ein Nervengebiet, und zwar das des N. brachial. intern. beschränkte Anästhesie finde ich noch im Fall Hallopeaus angegeben, wo auch die Sklerodermie so lokalisiert war. Eine Verteilung der Anästhesie nach spinalen Metameren konnte ich niemals feststellen.

Alles in allem sind die Sensibilitätsstörungen inkonstant und können ganz fehlen; subjektive Sensibilitätsstörungen sind häufig, objektive selten und wenig ausgeprägt; in der überwiegenden Mehrzahl der Beobachtungen erklären die lokalen Vorgänge diese Störungen zur Genüge. Druckempfindlichkeit der Nervenstämmen scheint nicht beobachtet zu sein.

Die folgende Beobachtung, die ich nicht genau zu klassifizieren vermag, will ich an dieser Stelle anführen. Die trophischen Veränderungen an den Händen und Füßen zeigen einen sklerodermatisch-gangränösen Charakter, wenn sie auch nicht ganz klassisch ausgebildet sind. Dazu kommen aber schwere und ausgedehnte Sensibilitätsstörungen in einer Form, wie ich sie gerade bei den vasomotorisch-trophischen Neurosen sonst noch einige Male beobachtet habe.

Es handelt sich um einen 60jährigen Klempnermeister, der von mir zuerst am 4. Juni 1904 untersucht wurde. Er klagte über Beschwerden, die seit einem Jahre in den Füßen begonnen hätten und zwar war zu Anfang ein taubes Gefühl in beiden Füßen und Unterschenkeln. Die Füße wollten nicht mehr so wie er wollte, wie er treffend bemerkte. Er hatte ein kaltes kriebelndes Gefühl, ein Gefühl, als wenn die Füße eingepakt wären, als ob alles tot wäre. Dieses taube Gefühl hat sich allmählich bis zu den Knien ausgedehnt, teilweise hatte er auch schmerzhaftes Bewusstsein in den bezeichneten Gebieten, als ob Nadeln in den Zehen wären, als ob die Haut platzen würde. Die Wadenmuskulatur schien druckhochsensibel zu sein, neben dem Schmerz trat auch eine gewisse Schwäche in die Erscheinung. Seit drei bis vier Jahren traten auch in den Händen prickelnde schmerzhaft empfindende auf. Es war ihm, als ob er die Finger nicht ordentlich bewegen konnte und er gibt auch an, daß er jetzt kleine Gegenstände nicht mehr festhalten und nicht mehr aufheben könne, z. B. Nadel, Federhalter, er hat das Gefühl, als ob die Finger übermäßig glatt und wie poliert wären, die Hände seien immer eiskalt, teilweise sterben die letzten Finger ab. Asphyxie locale oder Gangrän ist dagegen niemals eingetreten. In der rechten Handfläche soll sich eine Verdickung gebildet haben. Die Schmerzen

strahlen gelegentlich auch bis zum Ellenbogen aus. Es hat dann dauernd viel Kälte in Händen und Füßen empfunden, auch im Sommer über kaltes Gefühl in den Händen und den Füßen zu klagen gehabt. Die Untersuchung ergab folgendes: Die Haut ist an den Füßen und dem Unterschenkel auffällig glatt, talerlos, mit der Unterlage stellenweise verwachsen. An einzelnen Stellen sieht sie wie zerklüftet aus, weißlich ist sie hier verfilmt. Auch die tieferen Teile sind verkärtet, so besonders die Muskeln an den Unterschenkeln, in erster Linie die Wadenmuskulatur, etwas auch die Streckmuskulatur. Die Bewegungen der Füße und Zehen sind in geringem Maße behindert. Es fällt keine Bewegung vollkommen aus, aber der Patient hat gewisse Schwierigkeiten Einstellbewegungen auszuführen, dementsprechend ist auch der Gang etwas unsicher, leichtwiegend, als ob der Patient nicht insstande wäre, genau den Boden zu fühlen. In der Tat ergibt die Untersuchung der Sensibilität denn auch schwere Störungen. Es findet sich eine Aufhebung der Berührung, Schmerz- und Temperaturempfindung an den distalen Partien der Zehen, der Füße und der Unterschenkel bis zu den Knien in der Verteilung, daß proximalwärts die Störung weniger intensiv wird. Über dem rechten Fußgelenk findet sich eine braun pigmentierte Narbe von einer alten früheren Verletzung herrührend. Die Kniephänomene sind erhalten, die Achillesphänomene sind nicht auslösbar. Die elektrische Erregbarkeit ist vollkommen intakt. Die Hypothese erstreckt sich auch auf die elektroneurotische Empfindung. Ein ganz ähnliches Bild bieten die Arme dar. Auch hier sind die Hautveränderungen distalwärts am stärksten ausgeprägt, die Haut über den Fingern ist glatt, talerlos, zum Teil verdünnt, zum Teil mit der Unterlage verwachsen. An der rechten Hand besteht eine ausgesprochene Dupuytrensche Fascienkontraktur. Die Sensibilität zeigt ungefähr dieselben Veränderungen wie an den Beinen d. h. es ist auch hier das Schmerzgefühl, die Temperaturempfindung und auch die Berührungsempfindung, letztere weniger stark herabgesetzt und diese Störung erstreckt sich bis ungefähr in die Mitte des Unterarms, hier scharf abschließend. Auch hier besteht eine Behinderung der Bewegungen, welche sich im wesentlichen als eine Ungeschicklichkeit charakterisieren läßt. Es ist übrigens auch die Tiefensensibilität hier nicht intakt. Die Untersuchung des übrigen Körpers ergibt ein negatives Resultat. Nur ist noch anzuführen, daß antweder im Urin geringe Mengen von Zucker vorhanden sind. In den weiteren Beobachtungen, die sich über Jahre hinaus erstreckten, blieb der Zustand in den Hauptzügen unverändert. Nur kam es gelegentlich zu anderweitigen trophischen Störungen an Händen und Füßen. Es traten nämlich Bläschen an den Händen und Füßen auf, die dann im weiteren Verlauf aufbrachen, es Geschwürchen wurden, diese letzteren heilten sehr langsam unter Zurücklassung von festen strahligen mit der Unterlage verwachsenen Narben. Weiterhin kam es häufiger zu subcutanen Erythemen. Eine solche subcutane Erythematose trat einmal in auffälliger Weise bei Anwendung eines fettsäuerlichen Handbades an beiden Händen auf; sie bedauerte längerer Zeit, um zur Resorption zu kommen. Daß die Sensibilitätsstörung eine reelle war, geht daraus hervor, daß der Patient sich $\frac{1}{2}$ Jahre lang der Untersuchung infolge seiner Ungeschicklichkeit und Empfindungslosigkeit eine Verwundung am rechten Handgelenk zuzog, durch die eine Läsion des Charis hervorgerufen wurde, die die charakteristischen Ausfallerscheinungen der Charisläsion darbot.

Die Deutung dieses Falles macht gewiß die allergrößten Schwierigkeiten. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß die Hauptsymptome der Sklerodermie resp. der Raynaudschen Erkrankung hier in sehr charakteristischer Form vorhanden sind. Wir fanden die an den Extremitäten lokalisierten sklerodermatischen Veränderungen, zu denen gelegentlich Anfälle von Synkope lokale und im weiteren Ver-

lauf auch Ulcerationen und gangränisierende Prozesse kamen. Diese letzteren waren, wie ich noch nachträglich betonen will, von intensiven Schmerzen begleitet. Dazu kamen die geschilderten Sensibilitätsstörungen, die sich von den uns sonst bekannten Sensibilitätsstörungen durch ihre Abgrenzung unterscheiden. Es war sowohl an Armen wie an Beinen eine circuläre Grenze vorhanden so, wie wir es sonst bei hysterischen Sensibilitätsstörungen zu sehen gewohnt sind. Daß letztere nicht vorlagen, geht aus der ganzen Schilderung und aus der ganzen Persönlichkeit des Kranken mit voller Sicherheit hervor. Aber über die näheren Bedingungen der Entstehung, über die Grundlage dieser Sensibilitätsstörung bin ich mir nicht klar geworden, und der Fall muß in dieser Beziehung also als nicht aufgeklärt bezeichnet werden. An eine Syringomyelie mit trophischen Störungen besonderer Art habe ich auch gedacht, aber auch dieser Annahme stellen sich die größten Schwierigkeiten entgegen. Identisch ist die Art und Abgrenzung der Sensibilitätsstörungen mit den bei der *Acroasphyxia chronica anaesthetica* beobachteten, deren Deutung uns ja auch zweifelhaft geblieben ist.

Die Motilitätsstörungen bei der Sklerodermie sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Einmal leuchtet es ohne weiteres ein, daß eine so hochgradige Spannung und Verhärtung der Haut von ungünstigem Einfluß auf die Beweglichkeit der befallenen Glieder sein muß, wobei natürlich der Sitz der Sklerodermie sehr ins Gewicht fällt. Am ehesten wird die Hautveränderung im Gesicht und an den Händen Bewegungsstörungen hervorrufen. Wir sehen das klinisch auch bestätigt: im Gesicht bedingt schon ein nicht hoher Grad von Sklerodermie eigentümliche und charakteristische Störungen, eine Immobilität der Gesichtszüge, die den Untersucher sogleich aufs höchste frappiert und ihm in Verein mit der Hautveränderung sofort die Diagnose an die Hand gibt. Außer der mimischen Fixiertheit, der sklerodermatischen Maske, können durch Störungen der Beweglichkeit gewisser Teile des Gesichts auch ernsthafte Zufälle hervorgerufen werden. Es kann sich die Unmöglichkeit ergeben, den Mund zu öffnen. In leichteren Graden ist das recht häufig; selten wird es so stark, daß dadurch die Nahrungsaufnahme beeinträchtigt ist; aber es kommt auch das vor; so mußten z. B. einer Kranken Paulickis mehrere Vorderzähne extrahiert werden, um durch die Zahnlücken hindurch eine Ernährung zu ermöglichen. Fagge schildert einen Fall, in welchem eine 63-jährige Frau die Kinnbacken überhaupt nicht mehr bewegen konnte und langsam verhungerte. Auch in einem von Heller beobachteten Fall hat die Behinderung der Mundöffnung, des Kauens und des Schluckens eine erhebliche Abnahme der Nahrungsaufnahme zur Folge gehabt. Heller schreibt die Empfindung, die die Kranken

in manchen dieser Fälle haben, daß der Bogen ihnen im Halbe stecken bleiben werde, weniger auf eine Erkrankung der Oculoglossschleimhaut, als auf die mangelnde Beweglichkeit der Haut des Halses. — Die Sprache ist öfter behindert. So fand Dinkler, daß sein Patient Einzellaute z. B. das R schlecht herausbrachte, während ihm Wortverbindungen besser gelangen. In vieler Beziehung bemerkenswert und von großer Wichtigkeit für das Befinden des Kranken sind auch die durch die Spannung der Haut des Stammes und der Extremitäten bedingten Störungen. Dinklers Kranker mußte, wenn er sich setzen wollte, eine komplizierte Prozedur vornehmen. Er stützte sich mit gestreckten Beinen auf eine Tischkante und ließ sich dann niederfallen, ohne die Streckstellung aufzugeben. Noch bedenklichere Folgen kann die Sklerodermie des Kopfes haben, wenn sie zu einer Behinderung der Atmung führt, wie das ebenfalls beobachtet wurde.

Das zweite, Bewegungsstörungen bedingende Moment, die Myosklerose, tritt in vielen Fällen als die Beweglichkeit hindernd davor auf, wo die Hautspannung allein die Störung nicht erklären kann, oder wo diese überhaupt fehlt. Thibierge hat zuerst eingehender die Ursachen der Beteiligung der Muskulatur bei der Sklerodermie studiert. Es fehlt nach ihm ein gewisser Grad von Muskelatrophie nur in leichten Fällen, und in höherem Alter. Den Grund dieser Atrophie sieht er in der durch die Feststellung der Glieder bedingten Inaktivität, in der Kompression der zu den mit der sklerodermatischen Haut gelegenen Muskeln führenden Gefäße und Nerven, vielleicht auch in einer Unterdrückung der Hautfunktion.

Aber es ist sicher, daß der sklerosierende Prozeß sich auch auf die Muskeln ausdehnen kann, wodurch die von Méry zuerst beschriebene *Plaque myoscléreuse* resp. *périmyoscléreuse* zustande kommt. Außerdem gibt es dann schließlich noch Fälle, in denen die Muskelatrophie an Stellen eintritt, über denen die Haut überhaupt nicht verändert ist.

Einen solchen Fall beschreibt Thibierge genau:

François V. leidet an Migräne, Mutter etwas nervös, ebenso Pat. selbst. Vor sieben Jahren nun erstmalig bläuliche Anschwellung und Verfallung der Finger; das wiederholt sich in den folgenden Wintern. Seit einigen Monaten Hautverhärtung am unteren Teil des Unterarms und im Gesicht. Jetzt Cyanose und Hypochromie der Finger, an diesen kleine sklerodermatische Flecke. Auf dem rechten Arm ein großer silberer Fleck, links ein ähnlicher, nur weniger ausgedehnt. Die Verhärtung betrifft die Innen- und Rückseite des Arms und reicht bis zum Aufwachen des Biceps. Im Gesicht, Hals und Nacken ebenfalls Sklerodermie. Der Biceps ist in einem harten Strang verwandelt, der Haut nicht adhärent, diese ist in seinem Gebiet nicht atrophisch; völlige Streckung gelingt infolge der fibrösen Retraction des Biceps nicht. Trieps atrophisch, aber nicht retrahiert; auch Supinator longus und Bicepsbrachii-muscl. fibres entartet. Angeblich bestand an M. supinator long., extensor digit. communis, Biceps und deltoides Eak, was allerdings auf eine neurogene Ursache der

Muskelatrophie schließen lassen müßte, wogegen aber wieder die angeblich streose Entartung der Muskeln spricht.

Schon vordem hatte Schulz einen Fall mit hochgradiger Atrophie des Deltoids unter unveränderter Haut und eine qualitative Änderung der elektrischen Erregbarkeit beschrieben, und ebenso Westphal, der eine hochgradige und zu der Hautveränderung in keinem Verhältnis stehende Muskelatrophie am Schultergürtel nachweisen konnte; auch Goldschmidt hatte schon eine derartige Beobachtung gemacht. Von weiteren Fällen nenne ich den von Brocq, in dem am Unterschenkel eine hochgradige Muskelatrophie bestand, trotzdem sich hier nur ein bandförmiger, sklerodermatischer Streifen vorfand; Sternthal sah in seinem dritten Fall ein Befallenwerden des Sternocleidomastoideus unter normaler Haut. Radcliffe Crocker beobachtete bei einer atrophischen Form von Sklerodermie auf der Brust deutliche Verhärtung des M. Deltoid. und Triceps, namentlich links. Sehr interessant ist ein von Pelizaeus berichteter Fall, bei dem die Affektion der Muskeln und überhaupt der tieferen Teile die der Haut überwiegt. Hier waren die Muskeln am Arm und der Hand derb und hart, die Muskeln am Unterschenkel der Masse nach vermindert, ebenfalls derb und hart. Haut, Muskeln und Fascie fest miteinander verbunden. Am Arm war die Haut nur in sehr geringem Maße verändert, etwas verdickt, aber nicht mit der Unterlage verwachsen, dagegen am Bein hart, verdickt, fixiert, auch am Oberschenkel waren die Muskeln übrigens etwas hart. Elektrisch bestand nur quantitative Herabsetzung der Reaktion, die auch von Wolters, für den faradischen Strom wenigstens, gefunden wurde, während die galvanische eher gesteigert gewesen sein soll; jedenfalls bestand keine Entartungsreaktion. Erhebliche Muskelveränderungen beschrieben Guth und Rosenfeld. Die Muskulatur ist an einigen Stellen derb, straff, verkürzt. Es findet sich eine qualitative Störung der elektrischen Erregbarkeit. Der rechte Oberschenkel hat einen Umfang von 37 cm, der linke von 34 cm, die Atrophie ist durch partiellen Muskelerhwand herbeigeführt. Auch an der rechten Schulter und der rechten oberen Extremität ist eine auffallende Volumenveränderung auf diesem Wege eingetreten. Am Bein decken sich Muskel und Hautveränderungen nicht. Kaposi erwähnt in seinem Lehrbuch einen Fall, in dem eine allgemeine Myositis fast aller Stamm- und Extremitätenmuskeln mit Kontrakturen und schmerzhafter Starre bestand, als am Thorax und an den Nates ausgebreitete Sklerodermie entdeckt wurde. Aber vielleicht, so meint Kaposi, war der Prozeß an Haut und Muskeln gleichzeitig eingetreten, da auch an der Haut schon ein atrophisches Stadium vorlag.

Im ganzen ist es immerhin ein seltener Befund, die Muskeln bei nicht erkrankter Haut erkrankt zu finden, während ein Übergang des Krankheitsprozesses in continuo von der Haut auf die Muskulatur

wohl erheblich häufiger ist. Freilich hat Kaposi auch dies letztere Vorkommen nie beobachtet. Es wird ja oft genug schwierig sein, das sträße nachzuweisen, da eine Palpation der Muskeln durch die verdickte Haut hindurch oft unausführbar ist und dann die Entscheidung, ob Inaktivitätsatrophie, Atrophie infolge gestörter Ernährung oder Myosklerose vorliegt, nicht immer möglich ist. Ball konnte in einem Fall den Nachweis dadurch erbringen, daß er die Bangeschnen der Finger bei einem an Sklerodaktylie leidenden Mädchen durchschneitt und dann nach der Operation freie passive Beweglichkeit konstatieren konnte; da mußte es die Retraktion der Muskeln resp. ihrer Sehnen gewesen sein, die die Fixation in Beugestellung bewirkt hatte. Im übrigen wird gerade bei der Sklerodaktylie, die sich oft durch einen hohen Grad der Bewegungsstörung auszeichnet, eine Analyse der Bewegungsbehinderung oft unausführbar sein, wenn wir bedenken, daß zu der die Bewegung störenden Affektion der Haut, der Muskeln und der Sehnen auch eine solche der Gelenke und der Knochen kommen kann.

Nach meinen neueren Erfahrungen sind aber bei der Sklerodaktylie Veränderungen der Muskeln (und Sehnen) recht häufig. Ich habe sie in einer ganzen Reihe von Fällen gesehen. Ich habe auch einige Fälle beobachtet, in denen die Veränderungen in den Muskeln des Unterarms und der Hand gegenüber den Hautveränderungen sich ganz in den Vordergrund schoben, wie z. B. im folgenden Fall.

34-jähriger Arbeiter. Klagt seit 4 Jahren über Schmerzen in beiden Armen und Gefühl von Hitze und Kriebeln in beiden Händen. Nach längerem Liegen oder Sitzen Gefühl von Steifigkeit in den Beinen. Gibt ferner an, seit vielen Jahren an Anfällen zu leiden, die früher häufiger waren; jetzt seltener geworden sind; es soll sich dabei um Ohnmachtsfälle handeln, im Verlauf deren er zusammenbricht, niemals Krämpfe. Erstreckt von Jugend auf. Die Finger stehen im ersten Interphalangealgelenk in Beugestellung; die Deformität nimmt von 5. bis 2. Finger an Intensität ab. Es besteht eine Verdickung und Verhärtung aller unter der Haut gelegenen Gebilde der Hohlhand, ferner eine Verhärtung aller Muskeln am Unterarm. Die bestehende Beugestellung der Finger ist nur willkürlich und unter Schmerzen und auch dann nur partiell ausgleichbar. Auch der Muscul. deltoideus ist etwas verhärtet unter unveränderter Haut. Die Haut ist überhaupt nur an der Rückseite der Finger ein wenig glatt und dünn und schlecht verschieblich, ebenso an der Nase und den Schläfen. Sensibilität, elektrische Nervenbarkeit intact. Keine auffälligen vasomotorischen Störungen, nur etwas Rötte und Cyanose der Finger.

Sehr ähnlich ist der folgende Fall.

Ein 48-jähriger Mann klagt über eine seit drei bis vier Monaten bestehende Schwäche und Steifigkeit in den Fingern und Vorderarmen. Die Steifung soll am rechten Arm stärker ausgeprägt sein, als am linken. Diesen Erscheinungen soll ein häufigeres Einschlafen der Hände und Fäße einige Monate vorangegangen sein, was jetzt nicht mehr vorkommt. Die Untersuchung ergibt: Die Finger beider Hände können passiv nicht in dem normalen Maße gestreckt werden. Die Muskulatur der Beuge- und Streckseite der Unterarme ist ganz erheblich verhärtet, die Beuger sind stärker befallen als die Strecken, der rechte Arm mehr als der linke. Soweit die Bewegungen mechanisch nicht behindert sind, sind die aktiv bei Ausdehnungsphase

gelegenen Gebilde der Hohlhand (Furca, Aponeurose, Sehnen) sind verhärtet und verkürzt. Inzogen weist die Haut an keiner Stelle irgendwelche Veränderungen auf. Die elektrische Erregbarkeit ist normal. Irgendwelche andere Störungen von seiten des Nervensystems bestehen nicht. Eine Behandlung mit Phosphorin brachte nur vorübergehend einen Erfolg. Der Zustand des Kranken ist jetzt nach dreijähriger Beobachtung im wesentlichen unverändert.

Ich habe aber solche Myosklerosen bei allen Formen der Sklerodermie gesehen. Ich beobachtete z. B. ein Kind mit einer typischen streifenförmigen Sklerodermie; daneben fand sich eine recht ausgesprochene ziemlich isolierte Myosklerose des Muscul. deltoidei, dessen an und für sich schon grobe und in Bündeln zusammengefaßte Muskelfasern sich da besonders dick, fest und strangförmig anfühlten. Auch andere neuere Autoren betonen die Häufigkeit myosklerotischer Veränderungen (Nixon) oder berichten einzelne Fälle (Lücke, Herringham, Fuchs). Kren macht darauf aufmerksam, daß auch Veränderungen der Zungenmuskeln vorkommen, die dann Kau- und Schlundbeschwerden hervorrufen. Sie sind nach seiner ausdrücklichen Angabe oft nicht die Fortsetzung der Schleimhauterkrankung, sondern häufig nur allein vorhanden. Eine aktive und passive Bewegungsbeschränkung kommt auch durch Affektion der Gebilde am Boden der Mundhöhle vor (Kohler, Ebstein). Einige Male ist die Zungenmuskulatur auch mehr einseitig ergriffen gewesen (Westphal, Chauffard, Herzog, Lücke, Kohler, Ebstein). Sehr merkwürdige Veränderungen bot ein Fall signierter Beobachtung, den ich oben schon mitgeteilt hatte (S. 528), wegen der Asphyxie der Hände, die sich chronisch entwickelt und sich mit atrophischen Prozessen an den Muskeln der Hände und in geringem Maße auch an der Haut und den Knochen vergesellschaftet hatte; dazu kamen noch kleine Panaritien an den Händen. Besonders bemerkenswert war aber die Ausdehnung der muskulären Veränderungen auf die Muskeln der Unterarme, dann aber auch, und das ist das ganz Ungewöhnliche, auf die Kammuskulatur, und außerdem eine merkwürdige „Ptosis“, die ja recht schwer zu deuten ist, aber doch zweifellos nicht eine echte Ptosis darstellt, sondern auf dem Boden der Sklerodermie durch Veränderungen der Haut und der tieferen Teile des Augenlides entstanden zu sein scheint; darauf weist neben der Art ihres Entstehens, dem Fehlen aller sonstigen okulären oder cerebralen Symptome auch das Auftreten verblühender Erscheinungen am oberen Augenlid hin. Über Sklerodermie der Augenlider berichten auch Mühsam und Adam.

Was es mit einem von Losetschnikow beschriebenen Symptomte, einer völligen Unfähigkeit die Augen zu bewegen, die nach 14 Monaten wieder verschwand, auf sich hat, vermag ich nicht zu sagen. Der Autor nimmt eine Affektion der Muskeln als Ursache dieser Unfähigkeit an. Augenmuskelerkrankungen hat früher schon Krauch berichtet. Wulff stellt einen Fall von Sklerodermie mit myositischen Verände-

rungen vor. Hier hatten sich alle Veränderungen aus einer typischen Dermatomyositis subcutanea entwickelt und ich glaube, daß man ihn nicht ohne weiteres der eigentlichen Sklerodermie zurechnen darf. Wir kommen auf ihn noch später zurück.

In sehr seltenen Fällen kommt auch eine Kombination der Sklerodermie mit neuropathischem Muskelschwund vor; genaueres darüber siehe später.

Die Sklerodermie erstreckt sich aber, nicht nur auf die Haut und die Muskeln, sondern auch auf andere Gewebe und Organe, man könnte nach den neueren Erfahrungen wohl sagen, auf alle anderen Organe des Körpers. Die Erkenntnis von dieser Generalisierung des sklerotischen Prozesses ist im ganzen neueren Datum, wenn sich auch hierhergehörige Einzelbeobachtungen schon bei älteren Autoren finden. Am ehesten wendete sich die Aufmerksamkeit den Knochenaffektionen zu, die namentlich bei der Sklerodaktylie häufig sind. Es sind das meist atrophische Prozesse mit Verkürzung und Verdünnung des Knochens; Lewin-Heller fanden sie in 20 Fällen von Sklerodaktylie notiert. Es kann ohne Geschwulstbildung zu einer ganz allmählichen und totalen Resorption einer Phalanx kommen, wie das z. B. von Dufour, Hallopeau, Ball, Lépine, Dereum, Charcot, Stoltzing, Hassover, Roux beschrieben wird; oder, wenn der Prozeß nicht so weit geht, werden die einzelnen Phalangen verkürzt (Wolters) und verschmälert. Dereum hat zuerst Röntgenbilder so veränderter Phalangen mitgeteilt. Ich habe selbst, ebenso wie andere später vielfach solche Bilder gesehen (s. u.). Auch auf die langen Röhrenknochen kann der atrophische Prozeß ausgedehnt sein; Pelizaeus beschreibt, daß der erkrankte Arm zarter und kürzer ist, Adler fand das Bein der erkrankten Seite um einen cm kürzer. Masse macht auf eine Druckschmerzhaftigkeit der langen Röhrenknochen in einem Fall von Sklerodaktylie und Sklerodermie aufmerksam. Eine weit fortgeschrittene Verkleinerung der gipfelförmigen Teile in einem Fall seiner Beobachtung hat Steinbo zu der Aufstellung eines eigenen Krankheitsbildes, „der Akromikrie“ geführt, obwohl es sich hier zweifellos um einen echten Fall von Sklerodermie, allerdings in Verbindung mit Raynaudsehen Symptomen, handelt.

Eine Frau litt seit 20 Jahren an Geschwüren der Finger, die zuerst Crustos und Blasenbildung sich in der Nähe der Nägel etablierten. Die Blasen platzen, und es bleiben schmerzhaft brennende Geschwüre zurück, die weißliche Narben hinterlassen. Allmählich wurde die Haut des Finger glänzend, dünn, schwer verschleißlich, der Nagel mit Ausbreitung eines ringförmigen Defekts ab, und die Finger wurden allmählich immer kürzer. Später wurde auch Nase und Kinn atrophischer, und das Gesicht starb und ansehenslos. Die Untersuchung ergibt, daß alle Knochen klein und hart sind wie bei einem 12-jährigen Mädchen, die Finger sind kürzer, zugespitzt, und fast die ganze dritte Phalanx fehlt. Die Haut ist mit der Unterlage verwachsen und dünn, es finden sich kleine Scharte als Reste kürzlich abgefallener Ulcerationen, auch die

Zehen sind etwas kürzer und dünner als normal, die Nägel sind an beiden großen Zehen hornartig, ihre Länge beträgt 90 mm. Das Gesicht zeigt die typisch-sklerodermatische Maske, von der Schilddrüse sind nur Risse zu fühlen, die Wirbelsäule ist in der Gegend der oberen Brustwirbel gekrümmt.

Ich habe oben einen Fall von „Akromikrie“ erwähnt und durch eine Abbildung (Figur 10) illustriert. Ein entsprechendes Röntgenbild, bei dem allerdings die Verkürzung der Phalangen nicht deutlich ist, sondern nur eine allgemeine Verdünnung und Verschmälernng, besetzt Tafel XXIII.

Eine Verkürzung der Finger durch Resorption des Knochengewebes (Osteoporose) bei allgemeiner Sklerodermie beschreiben auch Raymond et Alquier.

In seltenen Fällen ist das Knochengestüt einer Seite im Wachstum zurückgeblieben (Steven); bei Grassett ist sogar das ganze Knochensystem des Körpers, zugleich mit allen übrigen Körpergeweben im Wachstum ganz erheblich zurückgeblieben. Die halbseitige Knochenatrophie bei der Sklerodermie leitet zu den Fällen von Kombination der Sklerodermie mit Hemiatrophia corporis und Hemiatrophia faciei über, die später gesondert besprochen werden sollen.

Sehr merkwürdige Veränderungen an verschiedenen Stellen des Knochengestüts bietet eine Patientin, die ich jetzt seit etwa 8 Jahren in Beobachtung habe.

Es handelt sich um ein 26-jähriges Mädchen, dessen Vater Trinker ist und aus einer Trinkerfamilie stammt. Sie selbst war stets und ist auch jetzt noch nervös, ängstlich, aufgereggt, empfindlich gegen Gerüche, schreckhaft. Bis zu ihrem 12. Lebensjahre war sie sonst gesund. Um diese Zeit zeigte sich zuerst an der linken Halsseite eine Schwellung, die wieder verging; dann traten an der rechten Halsseite braune Flecken auf, gleichzeitig wurde hier die Haut hart und verlor ihre Elastizität. Bald darauf traten ähnliche schmutzig graubraune Flecken, in denen Gelbte die Haut hart wurde, am Nacken, der linken Seite des Halses, an der Brust und an verschiedenen Stellen des Rückens auf, wobei es den Anschein hatte, daß die von einem dauernden Druck getroffenen Stellen (Druck des Korsetts, des Kragenknots, des Strumpfbandes) bevorzugt wurden. Es wurde von Lassar die Diagnose Sklerodermie gestellt und eine entsprechende Behandlung eingeleitet; zunächst trat eine Besserung ein, im späteren Verlauf erkrankten aber immer wieder neue Stellen in derselben Weise (Fig. 11). Inzwischen waren aber auch andersartige Veränderungen eingetreten: im 13. Lebensjahre bildete sich ganz allmählich eine Krümmung der Zehen aus; namentlich die zweite linke, in geringeren Grade auch die zweite rechte Zehe war davon betroffen; die Zehe geriet in eine starke Überstreckung, so daß sie hakenförmig über das Niveau der anderen Zehen dorsalwärts hinaustrat, und sie wurde dünner und zierlicher als die anderen Zehen. Im 14. Lebensjahre bemerkte die Mutter ein Zurückbleiben der ganzen linken Schulter im Wachstum; während nach den bestimmten Angaben der Mutter wie der Pat. selbst bis dahin eine Differenz nicht vorhanden gewesen war. Und schließlich bildete sich um dieselbe Zeit eine Veränderung in der rechten Schließensattelgegend aus, in dem auch hier die Haut dünn und braun gefärbt erschien, außerdem aber der Knochen unter der Haut gleichsam einmuck, so daß eine Art Hülse entstand. An den letztgenannten drei Stellen waren also allmählich atrophische Prozesse im Knochen entstanden, die

In den späteren Jahren der Beobachtung bis jetzt unverändert bleiben bzw. sich noch stärker ausprägen; auf den Röntgenbildern Tafel XVII, XVIII u. XIX sind diese Veränderungen deutlich zu verfolgen. Die Veränderungen am Schädel entsprechen durchaus denjenigen, die man sonst bei der *Histioplasia larva* progressiva findet.



Fig. 11.

Pigmentverfärbungen bei Sclerodermis en plaques.

Das linke Schulterblatt läßt sich zurückheben in allen Dimensionen erkennen (Fig. 12), die Haut über dieser Partie ist nicht verändert. An den Zehen ist die Defektivität nicht allein durch die Knochenveränderungen bedingt, hier sind auch die Sehnen der Streckor der Zehen betroffen (Fig. 13). Außerdem bestand wie geschildert eine Sclerodermis en plaques mit starken Pigmentverfärbungen. Auch in den letzten Monaten sind wieder neue östartige Flecke entstanden. Meine Beobachtung umspukt sich nunmehr über acht Jahre, und noch immer

geht die Progression weiter, und zwar sowohl nach der Richtung des Pigmentverhältnisses hin, wobei es übrigens neben Pigmenthypertrophie auch in Pigmentatrophie kommt, wie nach der Richtung der Bildung neuer sklerodermatischer Plaques, endlich auch im Sinne der Bildung neuer Knochenveränderungen. In den letzten Monaten zeigt die rechte Hand ähnliche Knochenveränderungen wie die Fäße, das Handgelenk sinkt ein, die Wölbung gleicht sich aus, die Knochen werden auch hier dünner und tieferher; in der Veränderung scheint auch der Handapparat nicht unbeteiligt zu sein.



Fig. 12.

Zurückbleiben des linken Schlüsselbogens bei Sklerodermie (Osteosklerose disseminata).



Fig. 13.

Veränderungen des Fußgelenkes, Retraction der Sehnen der Strecken bei Sklerodermie.

Wie man von einer fleckweise auftretenden Dermatosklerose spricht, kann man hier in diesem Fall von einer Osteosklerose en plaques (Osteosklerose disseminata) sprechen; einem sonst anscheinend in diesem Umfang nicht beobachtetes Vorkommen.

Auch Schüller berichtet von einer diffusen hochgradigen Knochenatrophie und zwar auch der Knochen, die unter unveränderter Haut liegen. Daß die beiden Prozesse voneinander unabhängig sind, zeigt unser Fall zur Evidenz.

Über die genauere Art der Veränderungen ist dem, was oben bei der Raynaudischen Krankheit über diesen Punkt gesagt wurde, nicht

viel hinzuzufügen. Es handelt sich überall um eine besonders die Spongiosa treffende Rarefaktion, wodurch die Struktur der Knochen eine abnorme Weitmäschigkeit erhält, die sich auf den Röntgenbildern durch eine übermäßig scharfe Zeichnung der Knochenhällchen ausprägt. Dazu kommen totale Zerstörungen der Knochen, die zum Verschwinden ganzer Phalangen oder deren Teile führen; oft in weiter Entfernung von dem Prozesse an der Haut sieht man umschriebene atrophische Prozesse, wirkliche Lücken durch fleckweise Resorption der Knochen, z. B. am Handgelenk am distalen Ende der Ulna auf Tafel XXIII. Die Abstoßung ganzer Phalangen oder erheblicher Teile derselben veranschaulicht Tafel XX, XXI u. XXII, die auch die zum Teil durch die Gelenkprozesse hervorgerufenen Verschielungen und Deformitäten des ganzen Handgerüsts deutlich machen.

Neben atrophischen finden sich auch hypertrophische Prozesse an den Knochen. Ich konnte bei keinem oben mitgeteilten Fall an der Tibia deutlich eine Anzahl Bausigkeiten und Unebenheiten palpieren, Nikutin sah bei beginnender Sklerodermie eine Verdickung der Knochen, Schwimmer, Nicolich, Spadaro sahen saltos Auftreibung der Endphalangen. Höchst merkwürdig ist ein von Ullmann erhobener Befund. Er stellte einen Mann vor, der seit 29 Jahren an Sklerodermie des Nackens, der Nase, Wangen und Stirn litt. An beiden Seiten des Gesichts sieht man symmetrisch, durch kleine Geschwüre hindurchschimmernd je einen harten, schwarzen, bei Berührung mit der Sonde nicht schmerzhaften Knochen, der gegen die Umgebung leicht verschieblich ist, von breiter, flacher Form; es handelt sich da nach Ullmanns Ansicht um eine symmetrische Nekrose eines durch eine ossifizierende Periostitis oder vielleicht auch durch Myositis ossificans (vom Masseter) neugebildeten Knochen. Kaposi meinte, daß eine Knochenneubildung in der Cutis, wie eine solche schon bei Rhiniosklerom beobachtet sei, vorliege.

Ein regelmäßiges Vorkommen ist die Affektion der Knochen bei der Sklerodermie übrigens nicht, wie die Röntgenuntersuchung bei einem Kranken Uhlenhuths lehrte.

Die Beteiligung der Gelenke an der Sklerodermie ist ebenfalls nichts Seltenes. Es scheint mir sogar wahrscheinlich, daß die prodromalen Schmerzen, über die in einem Teil der Fälle geklagt wird, nicht allzuoft als Ausdruck einer Gelenkaffektion anzusehen sind, werauf auch v. Notthafft aufmerksam macht. Ich habe auch bereits erwähnt, daß in einigen Fällen der Sklerodermie jahrelang Gelenkheumatismus vorangegangen ist. Ein Fall, den Dercum mitgeteilt hat, läßt den Gedanken aufkommen, daß in einer Anzahl dieser Beobachtungen sehr enge Beziehungen zwischen der Gelenkaffektion und der Sklerodermie bestehen mögen. Der Fall hatte klinisch ganz so eingesetzt

wie ein chronischer Gelenkrheumatismus, mit exazerbierenden Schmerzen im rechten Kniegelenk; in der weiteren Entwicklung hatte er aber dann später neben anderen Gelenkaffektionen noch typische Züge der Sklerodermie dargeboten, so daß Dercum sich zu der Meinung veranlaßt sieht, es gäbe vielleicht überhaupt eine Form des Gelenkrheumatismus, die durch sklerotische, den cutanen ähnliche Prozesse in den Gelenken bedingt wird. Dercum hat einen zweiten Fall mit erheblicher Beteiligung der Gelenke (Gelenke der Wirbelsäule und einer Schulter) beschrieben. Osler sah bei einem 49-jährigen Kranken eine mehrere Wochen anhaltende Entzündung des rechten Fußgelenkes, diese besserte sich langsam, aber der Fuß schwell immer leicht an und wurde heiß. Allmählich trat eine Sklerodermie ein, die aber nicht die unteren Extremitäten, sondern die Hände betraf, während in den Füßen nur beim Stehen rasch Kongestionen, eine purpurne Verfärbung und Kälte eintrat. Brummond beobachtete einen Kranken, bei dem seit drei Jahren rheumatische Schmerzen in den Gelenken vorhanden waren und in letzter Zeit sich Sklerodermie einstellte. Happe-Seyler beschreibt einen Fall, wo die Fingergelenke dieselbe Beschaffenheit wie bei Arthritis deformans zeigten, ebenso White und Rapin. Hirtz stellte bei einer diffusen Sklerodermie eine Periarthritis rosofemoralis fest. Apert, Brace et Rousseau fanden ankylosierende Gelenkverwachsungen bei einem 12-jährigen an Sklerodermie leidenden Kinde. Pelissaeus sah in seinem mehrfach erwähnten Fall eine fast völlige Fixierung des Fußgelenkes, auch Adler erwähnt Ähnliches. Verneuil und Mirault beobachteten fibröse Verbindungen zwischen benachbarten Gelenkflächen, Lagrange Verlust des Gelenkknorpels und Kalkablagerung im umgebende Bindegewebe. Auch Metschewski beobachtete eine Kalkimpregnation und zwar in den Sehenscheiden, die auch nach meinen Erfahrungen zweifellos öfter von sklerosierenden Prozessen befallen werden. In einem schweren Fall von Sklerodaktylie waren alle Fingergelenke ankylosiert, auch die Handgelenke in ihrer Beweglichkeit beschränkt, geschwollen, schmerzhaft, dasselbe Bild boten die außerhalb der Hautveränderungen liegenden Ellbogen und das rechte Hüftgelenk. Hier war auch deutliches Schmerzallknochen vorhanden.

Ich sah folgenden Fall:

W., 61 Jahre alt, Handelsmann, untersucht am 25. Mai 1895. Pat. ist sehr viel gereizt und hat viel bei schlechtem Wetter im Freien sich aufhalten müssen, hat aber niemals Frostbeulen, nie erfrorene Füße oder Hände gehabt. Bis September 1893 war er ganz gesund. Damals bemerkte er zum erstenmal am linken Ellbogen eine kleine, brennende, schmerzlose Anschwellung. Wenig später bekam er eine Anschwellung des Dornans der linken Hand, die mäßig schmerzte; keine Fackel- oder Knochensprossveränderung der Haut. Nach 14 Tagen ähnliche Anschwellung am linken Ellbogen, nur kleiner wie am rechten, auch wieder schmerzlos; dann schwellen das Dornans der rechten Hand und die Finger beider Hände an. Gegen Abend, wenn er ins Bett kam, waren ihm die Hände und Füße wie das „rote Feuer“, kochend

heiß, ohne daß die Teile erst wurden. Allmählich entwickelte sich nun eine Steifigkeit, besonders in der rechten Hand, und zu gleicher Zeit kamen auch Schwellern in mehreren Gelenken, namentlich im linken Hüft- und Kniegelenk. Seit etwa drei bis vier Monaten bemerkt er ein anfallsweises Auftreten von Cyanose und Kälte sämtlicher Finger beider Hände, die unter Krämpfen und Gefühl von Abgestochensein dunkelblau werden. Nie Tetaninger. Auch plagt ihn jetzt allabendlich das furchtbare Brennen, so daß er die Füße und Hände aus dem Bett her austrecken muß. Hände immer kalt, auch wenn er an der Sonne sitzt. Die Asphyxiationsfälle werden durch jeden Kältereiz ausgelöst, kommen aber auch spontan. Status praesens. Varietätiger Gang, tritt behutsam mit den Hacken auf, weil die Fußsohlen ihn schmerzen. Die Finger beider Hände sind im Metatarsophalangeal- und in den Interphalangealgelenken leicht gebeugt, die ersten sind verdickt, druckkugelhaut und knirschen bei Bewegungen. Die Haut an Handrücken ist gespannt, verdünnt, schwer auf die Unterlage beweglich; an den Fingern, namentlich an der Palpe zahlreiche kleine, strichförmige Narben, die mit der Unterlage nicht verwaachsen sind; die Haut der linken Hand ist weniger stark affiniert wie die der rechten. Die Finger und Hände sind im ganzen livide-cyanotisch verfärbt, am meisten in der Vola manus. Auch im Unimans-Handgelenk entstehen bei Bewegungen Schmerzen, und man fühlt hier deutliches Krepitieren. Die Mobilität ist nur durch die Haut- und Gelenkveränderungen gestört, völlige Streckung der Finger ist unmöglich, Händedruck wohl etwas matt, aber keine Lähmungssymptome. Sensibilität völlig normal. Über dem linken Ellbogengelenk an der Rückseite des Oberarms eine schwindelartige, etwa kleinfußkerngroße, harte Erhebung, mit der Umgebung nicht verwachsen. In diesem Bezirk fühlt man kleine, etwas unebene, aneinander sich verschärfende Körperchen, die beim leichten Druck ein eigentümliches Gefühl von Knirschen, wie etwa von hartgebohrtem Sehnur, geben. Bewegungen im Ellbogengelenk in geringem Grade schmerzhaft, aber vollkommen frei. Eine ganz ähnliche, nur wenig größere Anschwellung am rechten Ellbogen. Auch die Füße sind cyanotisch verfärbt; doch ist eine Veränderung der Haut hier nicht nachweisbar, bis auf das Dorsum pedis, wo die Haut etwas hart und schwer verschieblich ist. Im Fußgelenk kein Knirschen; auch Hüft- und Kniegelenk jetzt im wesentlichen frei. Sensibilität und Mobilität beiderseits an den Beinen völlig normal. Kniegelenkernisse stark. Gesicht frei.

Auch hier finden sich neben sicheren sklerodermatischen Symptomen deutliche Zeichen einer subakuten Gelenkaffektion, die zeitlich sogar zuerst und vor allen übrigen Symptomen auftrat. Die Gelenkaffektion dürfen wir mit vollem Recht auf einen dem Prozeß in der Haut gleichenden Prozeß in den Gelenken beziehen. Die Affektion am Ellbogen ist nicht ganz sicher zu deuten; am ehesten denke ich an eine Schleimbeutelkrankung, die ebenfalls auf Rechnung der Sklerodermie zu setzen ist.

Ich habe noch einen, dem mitgeteilten sehr ähnlichen Fall beobachten können, in dem nur die sklerodermatischen Veränderungen weniger vorgeschritten und weniger typisch waren.

S., 35-jähriger Arbeiter, untersucht am 21. April 1900.

Pat. hat sich im Winter 1882/1883 bei ziemlich starker Kälte beide Ohren verlost. Am Mittelfinger der linken Hand hat er in späterer Zeit ebenfalls einmal Frost gebissen, davon führt aber noch jetzt an dieser Stelle sichere, weiß, hypertrophische Narbe hin. Pat. ist seit langer Zeit in einer Fabrikarbeit beschäftigt und soll da dem Dampf mit Schwefelsäure ausgesetzt sein. Seine eigentliche Beschäftigung besteht in dem Einsparken fertigen Pulvers. Er sucht die Feldlinik wegen

großer Hystereschwund auf, er bekommt leicht Herzklappen, das allmähliche kommt, auch wenn er sich ganz ruhig verhält, z. B. nachts im Bett, und mit großer Angst verbunden ist; bei Anstrengungen, Treppengängen, hat er über Luftmangel zu klagen. Erst auf Befehlen gibt er über die Entzündung der an seinen Händen sichtbaren Veränderungen Auskunft. Er hat zuerst vor vier bis fünf Jahren bemerkt, daß seine Hände im warmen Sommer von rot und dick wurden, ohne daß ausgesprochenes Juckgefühl oder Schmerzen dabei auftraten. Wenig später kamen Anfälle von Aphasie locale, sobald er seine Hände einen einigermaßen niedrigen Außentemperatur aussetzte; die Hände wurden dann tief dunkelblau, fast schwarz, aber er empfand dabei keine Schmerzen, sondern hatte nur ein klemmes Gefühl an den Händen; neben den dunklen Stellen fanden sich auch schneeweiße Flecke, als ob dort alles tot und abgestorben wäre. Erst später machte sich ihm eine allmählich zunehmende Verblähung der Hände bemerkbar. In den nächsten Jahren traten oft, namentlich auch bei etwas kühlerer Witterung kleine wasserhelle Bläschen an verschiedenen Stellen des Hands und Finger auf, die platzen, eintrocknen und zu kleinen Narben führten, die an Handrücken und Fingern noch jetzt sichtbar sind. Dabei empfand er ziemlich heftige Schmerzen. In letzter Zeit ist die dunkle Verfärbung der Hände fast dauernd vorhanden; wenn er aus dem Zimmer herauskommt, werden sie oft, selbst bei ziemlich hoher Außentemperatur, ganz schwarz. Die Untersuchung ergibt: Linke Hand: Die Haut ist an der Dorsalfäche der Finger und des Handrückens verhärtet, zwischen tief dunkelblauen, cyanotischen Stellen finden sich hellere rötliche. Die Innenfläche der Hand und der Finger ist im ganzen stark gerötet und schreitet etwas. Läßt man den Kranken die Finger in mäßig kaltes Wasser ecken, so wird die Färbung des Handrückens im allgemeinen dunkler, aber dauernd bleibt sie fleckig; einige Flecke sind auch abnorm weiß. Noch stärker wird die Cyanose nach kurzem Aufenthalt im Freien. Die Haut und die Unterhaut sind überall am Dorsum der Hand und der Finger verhärtet, deutlich atrophisch, dabei stellenweise glatt und glänzend, nirgends aber verhärtet und mit der Unterlage verwachsen; nur an wenigen Stellen der Endphalangen, besonders am vierten Finger, weniger verhärtet. Alle Interphalangealgelenke sind etwas geschwollen; ebenso sind auch die Gelenke des Daumens etwas verhärtet; die Schwellung dokumentiert sich überall in der Form zweier seitlich von der Mittellinie liegender, kleiner, fingerhoher Wülste. Bei Bewegungen fühlt man in diesen Gelenken oft ein leichtes Knirschen wie von fettschmierendem Schmier. Die Schwellung ist völlig schmerzlos, wie Pat. überhaupt nicht über Schmerzen klagt. Auch alle Metacarpophalangealgelenke sind etwas aufgetrieben. Das Handgelenk ist frei. Die rechte Hand weist ähnliche nur etwas geringere Veränderungen auf. Am linken Ellenbogengelenk fühlt man ebenfalls ein leichtes Knirschen, außerdem ist das obere Endgelenk hier abnorm verhärtet. Das soll von einer Luxation, die Pat. im Jahre 1886 erlitten hat, herrühren. Auch im linken Schultergelenk leichtes Knirschen, aber keine Beweglichkeitsbeschränkung. Die Mundul. interossei, namentlich die interossei primi erscheinen beklemmt atrophisch, aber es besteht kein Funktionsmangel und keine Störung der elektrischen Erregbarkeit. Die einzigen Klagen des Pat. in bezug auf die Hände erstrecken sich darauf, daß diese sehr leicht kalt und klemm werden, und daß er dadurch oft in seiner Arbeit gestört wird. Die Sensibilität ist vollkommen normal. An den unteren Extremitäten nichts Besonderes. Pat. meint, daß seine Füße auch oft kalt werden, doch ist das heute und bei den nächsten Untersuchungen nicht der Fall.

Die obige Untersuchung des Nervensystems ergibt normalen Befund. Die Herztätigkeit ist beschleunigt, hält sich dauernd während der Untersuchungen über 100; es ist kräftig, nur vorübergehend ganz leicht unregelmäßig; die Herztöne sind rein und laut, die Herzgrenzen sind normal. Einigermassen steht mit der kräftigen

Hernaktion die geringe Kraft des Pulses in Widerspruch. Die Ohren sind deformiert. Die Lippen sind nicht cyanotisch. Der Urin ist frei von Eiweiß und Zucker.

Auch hier finden sich also Gelenkveränderungen, die hier ganz schmerzlos entstanden sind. Die Veränderungen der Haut sind teils vasomotorische, teils trophische. Die ersteren erinnern etwas an die Raynaud'schen Symptome; auch die kleinen aufplatzen und mit Hinterlassung von Narben heilenden Bläschen kommen bei dieser Krankheit vor. Die Hautveränderungen sind denen bei der Sklerodermie sehr ähnlich, nur nicht vollkommen ausgebildet. Im ganzen stellt dieser Fall ein Stadium weniger vorgeschrittener Entwicklung als der erst mitgeteilte dar. Bemerkenswert ist die anamnästisch festgestellte Empfindlichkeit gegen Kalte.

Die Ähnlichkeit zwischen den chronischen und subakuten Gelenkerkrankungen und der Sklerodermie kann in einzelnen Fällen noch erheblicher werden, so daß eine sichere Diagnose nicht immer möglich erscheint. In manchen Fällen dieser Art handelt es sich anscheinend um den gewöhnlichen chronischen oder subakuten Gelenkrheumatismus zuzurechnende Erkrankungsformen, bei denen in der Umgebung der erkrankten Gelenke auch die Haut affiziert erscheint. Solche Fälle habe ich selbst namentlich unter den Insassen eines Strehthauses gesehen. Weinberger beschreibt einen Fall dieser Art, wo neben einer lange bestehenden ankylisierenden Arthritis durch Lymphstauung sekundäre sklerotische Veränderungen in der Haut hervorgehoben wurden, die mit der Besserung der Gelenkerkrankung verschwanden. Näheres darüber ist noch im Abschnitt Diagnose zu sagen.

In letzter Zeit wurden einige Fälle von Sklerodermie beobachtet, bei denen eine Kyphoskoliose vorhanden war (Schubiger, Stembo, Raymond, Machton, Bronq et Veillon, Hallopeau, Jeanselme). Die Tatsache gewinnt Interesse in Rücksicht auf das häufige Vorkommen der Kyphoskoliose bei der Syringomyelie, wenn auch vorläufig die Beobachtungen für eine weitere Verwertung des Befundes zu wenig zahlreich sind.

Nur spärliche Angaben fanden sich bis vor kurzem über die Beteiligung der Schleimhäute. Am häufigsten wurde noch eine Affektion der Zunge berichtet, hier muß man allerdings auch an ein Ergriffenwerden der Zungenmuskulatur denken. Hoppe-Seyler fand die Zunge seines Patienten kurz und schmal. Herringham's Kranker konnte die Zunge wegen der Rigidität der Schleimhaut nicht hervorstrecken, Hallopeau fand die ganze Mundschleimhaut atrophisch, bei Westphal war die rechte Zungenhälfte kleiner als die linke. Dercum fand die Zunge ebenso wie den Gaumen und Schlund entschieden blässer als normal, Wollers die Zungenbewegungen schwerfällig; eine Beteiligung der Rachenschleimhaut notierte auch Hoppe-Seyler, eine solche der ganzen Mundschleimhaut Hallopeau, des Zahnefleisches Brixaud.

Ihr Beteiligung der Schleimhaut an der Sklerodermie hat dann Kren seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Er hat auf Grund eigener zahlreicher Beobachtungen feststellen können, daß das Vorkommen von Schleimhauterkrankung viel häufiger ist, als man früher annahm. Er stellte fest, daß in den späteren Stadien der diffusen Sklerodermie die Mundgebilde häufig ergriffen werden und besonders in jenen Fällen, in denen der Prozeß im Gesicht das Stadium atrophicum erreicht hatte, schien die Sklerodermie der Mundhöhle fast die Regel zu sein. Immerhin kann eine ausgedehnte Sklerodermie gelegentlich doch einmal die Zunge und die übrigen Gebilde der Mundhöhle frei lassen (Sternthal und Faidel). Sehr selten scheint es zu sein, daß die ersten sklerodermatischen Veränderungen die Zunge betreffen. Die häufigste Art ist ein diffuses Auftreten der Schleimhauterkrankung, seltener sind scharf abgegrenzte Flecke. Es kommt vor, daß sich eine scharf umschriebene Zungen-Plaques kontinuierlich von der Lippe her ausbreitet (Schild, Thibierge). Danlos sah in zwei Monaten Entwicklung einer isolierten plaque en bande linéaire auf der Zunge, es erschien ein 2—3 mm breiter rot glänzender Streifen, in dessen Bereich die Papillen fehlten. Dieser durchzog die vorderen zwei Drittel der Zunge. Die Oberfläche war hart. Das erste Stadium der Veränderungen konnte Kren nur sehr selten beobachten, erst das Stadium indurativum et atrophicum konnte genauer studiert werden; die Oberfläche wird glatt, spiegelnd, weißgelblich, narbentüchlich, die Papillen verschwinden mehr oder weniger vollständig. Bei größerer Ausdehnung der Veränderungen und Mitbeteiligung der Muskulatur, die aber sehr oft selbständig, nicht von der Schleimhaut her befallen wird, verwandelt sich die Zunge zu einem kleinen, schmalen, wenig beweglichen Klumpen; alle Bewegungen sind gestört, nach oben, nach unten, nach vorn, in sich kann die Zunge nur unvollkommen bewegt werden. In einem Falle wurde auch Geschwürbildung der Schleimhaut beobachtet. Auf die Pigmentierung der Schleimhaut habe ich schon früher hingewiesen. Mehrfach waren die Veränderungen fast ausschließlich auf eine Zungenhälfte beschränkt, wie in dem schon angeführten Falle Westphals. Außer Kren haben später verschiedene andere z. B. Ehrmann, Schild, Weiß über Zungenveränderungen berichtet. Aber auch die anderen Gebilde der Mundhöhle werden befallen. Es kommt zu einer Verkürzung des Frenulum, der Mundboden kann hochgradig verändert werden (Köhler, Walff, Ebslein). Auch der weiche Gaumen, Uvula, Gaumenbogen werden ergriffen. In der Schleimhaut des Gaumens kann es dabei zu mehr oder weniger deutlich umschriebenen Plaques kommen. Die Uvula kann gelegentlich zu einem kleinen, schmalen oder plumpen Zapfen umgewandelt werden. Die Gaumenbögen werden zu dünnen, schmalen Falten und fast weißen Rändern. Besser bekannt als diese in der Literatur gar nicht erwähnten Veränderungen (Kren) sind die der Zahn- und Lippen Schleimhaut,

sowie die des Vestibulum oris. Eine Retraktion des Zahnfleisches und der dadurch bedingte Zahnausfall wurden nicht selten beobachtet, die Erkrankung ist am Unterkiefer meist viel weiter vorgeschritten als am Oberkiefer. Die Schleimhaut der Lippen ist sehr oft befallen, ebenso die der Wangen fast stets bei den Veränderungen im Munde mitbeteiligt.

Auf die Beteiligung der Zungenmuskulatur, die meist nicht von der Schleimhaut aus ausgeht, wurde oben schon hingewiesen.

Weiters bemerkt einmal, daß die Stimme unbeholfen und kreischend war (Affektion der Larynxschleimhaut oder der Kehlkopfmuskeln?). Hoppe-Seyler beobachtete eine Verengung des Kehlkopfinganges durch Verkürzung der aryepiglottischen Falten. Sottas fand die Schleimhaut des Kehlkopfes hochgradig blaß, die Plica aryepiglottica stark geschrumpft, bei der Phonation schloß die Stimmritze nicht normal. Auch Kren fand in drei Fällen eine Veränderung der Larynxschleimhaut, die sich durch Störungen der Funktion nicht kenntlich gemacht hatte. In einem Fall waren die Stimmländer glänzend weiß, und schlossen sich nicht immer vollständig. Ähnliche Beobachtungen teilen auch Nielsen und Hamus mit. Veränderungen an der Schleimhaut des Oesophagus wurden von Ehrmann beobachtet. Kren sah solche an der Conjunctiva, Hektoen, Heller, Kren und Krömer an der Vagina. Isolierte Piquets sind an den Schleimhäuten sehr selten, außer dem Fall von Danlos, der schon erwähnt wurde, sind noch solche von Schild und Thibierge beschrieben worden.

Besondere Aufmerksamkeit hat man dem Leitungswiderstand der Haut gegen den elektrischen Strom gewidmet. Erb fand ihn an den affizierten Stellen geringer als an normalen, doch wurde die Konstanz dieses Befundes bestritten und von der wechselnden Polarisation abhängig gemacht. Schäffer fand aber auch bei genauer Untersuchung mit unpolisierbaren Elektroden sichere Herabsetzung des galvanischen Leitungswiderstandes auf der sklerodermatischen Partie im Vergleich zu der symmetrischen normalen; weitere genaue Untersuchungen liegen von Eslenburg, Herrzog, Sternthal, Friedheim, Grünfeld, Kalischer, Thibierge u. a. vor; sie ergeben kein einheitliches Resultat, bald war er herabgesetzt — bald auch nur das relative Widerstandminimum vermindert — bald erhöht, bald normal, so daß dem Einzelbefunden keine Bedeutung zukommt.

Unsere bisherige Beschreibung ließ uns erkennen, daß die Krankheit zu Unrecht den Namen Sklerodermie trägt, da sie nicht nur die Haut, sondern auch die Schleimhaut, Fascien, Muskeln, Bänder, Gelenke, Knochen in ihr Bereich zieht. Weniger genau sind wir darüber orientiert, inwieweit auch die inneren Organe dem Einfluß der Krankheit unterliegen; immerhin besteht aber nach einigen pathologisch-anatomischen

Befunden, auf die wir später zu sprechen kommen, darüber kein Zweifel, daß auch in den inneren Organen ein sklerotischer und atrophisierender, der Hautaffektion ähnlicher Prozeß zur Ausbildung kommen kann. Klinisch wird es nicht immer leicht, oft auch ganz unmöglich sein, diese Symptome von denen zu unterscheiden, die mehr sekundär durch die Krankheit bedingt sind. So kann es natürlich, wenn durch lokale Prozesse die Öffnung des Mundes, das Kauen und Schlucken behindert ist, allein dadurch schon zu einer Schädigung des Digestionsapparates und damit auch zu einer Beeinträchtigung des allgemeinen Ernährungszustandes kommen, aber auch ohne solche komplizierenden Vorgänge tritt in späteren Stadien der Krankheit oft eine Kachexie auf, die wir als direkte Folge des Krankheitsprozesses selbst ansehen müssen. Die Sklerodermie dokumentiert sich damit eben als eine Allgemeinerkrankung, deren am stärksten zutage tretendes Symptom die Sklerodermie sensu strictiori ist, die aber eben so wenig das Wesen der Krankheit ausmacht, wie etwa die Bronzefärbung beim Morbus Addisoni.

Was im einzelnen die Störungen des Allgemeinbefindens und die der inneren Organe angeht, so ist darüber folgendes bekannt geworden:

Die Sklerodermie ist im größten Teil ihres Verlaufes sicher eine fieberlose Affektion; es sind oft genug exakte Temperaturmessungen vorgenommen worden, die immer eine normale Temperatur ergaben; nur wo komplizierende Erkrankungen vorlagen, wurde eine Temperatursteigerung beobachtet. Einige Beobachtungen aber scheinen darauf hinzuweisen, daß namentlich da, wo die Krankheit akut oder subakut einsetzt, anfangs leichte Fieberbewegungen vorhanden sein können. Lewin-Heller rechnen aus, daß höchstens in einem Prozent der Fälle solche Fieberbewegungen als Prodromalerscheinungen vorgekommen sind. Dem Fieber analog können in solchen Fällen auch andere Prodrome sich einfinden, wie allgemeines Unwohlsein, schlechter Schlaf, Appetitlosigkeit, diffuse Schmerzen, Unlust zur Arbeit usw. Ikterus bei Auftreten der Sklerodermie wurde von Dinkler beobachtet. Vereinzelt steht eine Beobachtung von Bouvier da, wo der Beginn ein schlaganfallähnlicher Zustand war. Gelegentlich wurde eine Lymphdrüsenanschwellung festgestellt. Auch das Ende der Krankheit kann wieder Temperatursteigerungen bringen, die dann aber wohl ausnahmslos ihre Erklärung in einem komplizierenden Erkrankungsprozeß eines inneren Organs, in erster Linie der Lunge, finden.

Die die späteren Stadien der Krankheit auszeichnende Kachexie wurde bereits erwähnt; ich selbst habe einen später noch genauer zu erwähnenden Fall gesehen, bei dem jetzt die Kachexie so groß ist, daß Patient fast dauernd ans Bett gefesselt ist. Eulenburg beschreibt eine Gewichtsabnahme von 25 kg; auch Brissaud betont das mannfalt-

same, bis ad exitum fortschreitende Anwachsen des Kräfteverfalls, ebenso viele andere.

Blutuntersuchungen liegen noch nicht zahlreich vor. Dinkler fand etwa drei Millionen rote Blutkörperchen pro Kubikmillimeter, das Verhältnis zu den weißen war normal. Auch Friedheim und Derrum fanden keine wesentliche Abweichung vom normalen Verhalten. Die Befunde, die Constantin et Leorat erhoben, werden von den Autoren selbst als wechselnd und unbedeutend angesehen. Histologisch fand Oro eine starke Vermehrung der eosinophilen Zellen, Franke eine geringe, Heller gar keine Vermehrung dieser Zellen, Warol und Corning stellten weder eine Eosinophilie fest.

Damit ist also noch nicht viel anzufangen.

In letzter Zeit sind auch einige Male sorgfältige Stoffwechseluntersuchungen angestellt worden (Bloch und Reitmann, Jastrowitz, Tedeschi). Sie haben nichts Charakteristisches ergeben. In einem Fall von Bloch und Reitmann war der Eiweiß- und Purinkörperstoffwechsel normal; es fand sich sogar noch ein Eiweißansatz, und auch im Darm bestand keine erhöhte Eiweißfäulnis. Jastrowitz konstatierte eine erhebliche Verschlechterung der Ausnutzung der eiweißhaltigen Nahrungsmittel, aber auch keine Abweichung der Stickstoffbilanz von der Norm; dasselbe Resultat hatten die Untersuchungen von Tedeschi.

Störungen im Bereich des Digestionsapparates sind häufig; sie sind meist leichter Natur, gelegentliches Erbrechen, Übelkeit, Obstipation, Diarrhoe, Magenschmerzen wurden beobachtet, ohne daß diese Symptome jedoch gewöhnlich stark hervortreten. Immerhin sind sie wichtig, weil sie mitwirken, den Ernährungszustand der Kranken zu verschlechtern.

Auch Störungen am Respirationsapparat sind nicht selten; sie beruhen zum Teil, wie geschildert, auf mechanischer Behinderung der Atmung. Durch die mangelhafte Bewegungsfähigkeit der Lungen etablieren sich in dieser leicht destruirende, namentlich tuberkulöse Prozesse, die das Ende herbeiführen. Rendu führte die in seinem Falle nachweisbare Bronchitis und Bronchiektasie auf sklerotische Prozesse in der Lunge zurück. Auch sonst wurden Bronchitiden, Pleuritiden, Emphysem etc. beobachtet.

Albuminurie wurde mehrfach gesehen (Finlay, Sternberg, Herringham, Brissaud, Keller). Aschitz beschreibt Nephritis, ebenso Kaposi u. a. Glykosurie fanden Dickinson und Keller, ebenso Uhlenhuth, der es für möglich hält, daß es sich um nervöse Glykosurie handelte, Phosphaturie stellte Graham fest. Ehrmann fand sogar in vier von fünf untersuchten Fällen alimentäre Glykosurie.

Einige Male litten die Patienten neben der Sklerodermie zugleich an einem Herzfehler (Mendel, Wadstein, Neumann, Legroux,

Fuchs u. a.) Auch über eine Perikarditis (Pasinelli, Crocker, Kaposi, Chiari, Mader) wird berichtet. Ob mehr als eine zufällige Kombination vorliegt, ist nicht sicher zu entscheiden. Wiederholt wurde festgestellt, daß das Vitium schon vor dem Einsetzen der Sklerodermie vorhanden war. Hoppe-Seyler erklärt die Verstärkung des zweiten Pulmonaltones in seinem Falle durch die Behinderung des Lungenkreislaufs. Funktionelle Störungen des Herzens sind häufiger: Irregularität des Pulses (Harley), dauernde Erhöhung der Pulsfrequenz selbst Unregelmäßigkeit (Schulz, Osler, Potain). Auch Kleinheit des Pulses wurde mehrmals beobachtet. Sie ist teilweise vielleicht auf die Schwierigkeit, den Puls durch die veränderte Haut hindurch zu fühlen, zu beziehen. Eine vorübergehende Erhöhung des Blutdruckes stellte Klinger in seinem später genauer zu berichtenden Falle fest. Sternthal sah Ascites entstehen und führt ihn auf Störungen im Pfortaderkreislauf oder auf Erkrankung der Lymphgefäße zurück. Wichtig ist die Tatsache, daß klinisch die Erscheinungen der Arteriosklerose keineswegs zum Bilde der Sklerodermie gehören.

Über Mitheteiligung der inneren Organe berichten die Autoren noch mancherlei einzelnes, worüber wir hier als prinzipiell nicht wichtigen Befunden hinweggehen können. Nur eines Organes müssen wir noch gedenken, der Thyreoidea, wegen der Beziehungen, in die man die Sklerodermie zu Affektionen dieser Drüse gebracht hat.

Es wurde wiederholt bei Sklerodermie Struma beobachtet (Raymond, Schubiger, Meyer, Panegrossi, Arcangeli, Jonas, Klippel). Hierbei sehen wir noch von den Fällen ab, wo die Struma zum Morb. Basedow gehörte. Es wurde auch Atrophie der Schilddrüse gesehen, so von Schäffer, der eine Struma mit Beginn der Sklerodermie verschwinden sah, ferner von Raymond, Sternthal, Uhlenhuth, Grasset, Beer (erst Schilddrüsenanschwellung, dann Schilddrüsenmangel) James. Uhlenhuth weist ausdrücklich darauf hin, daß in seinem Fall der Schilddrüsenchwund deswegen nicht eine sekundäre Erscheinung sein konnte, weil er vor den Hautveränderungen eintrat. In einer Reihe von Beobachtungen wurde schließlich das Organ auch ganz normal gefunden. Ich registriere diese Befunde hier nur; eine Deutung derselben bleibt vorbehalten.

Im vorübergehenden sind die klinischen Symptome der Sklerodermie im wesentlichen vollständig geschildert worden, wenn auch manche Einzelheiten entsprechend dem Plane des Kapitels unberücksichtigt blieben. Wie setzt sich nun aus diesen Einzelsymptomen das gesamte Krankheitsbild zusammen?

Die äußerliche Anordnung der sklerodermatischen Veränderungen hat, wie schon erwähnt, zur Aufstellung gewisser Unterabteilungen

der Sklerodermie geführt. Man unterscheidet danach eine Scleroderma diffusa und eine Scleroderma circumscripta und läßt die letztere wieder in eine streifenförmige (Sklerodermie en bandes) und eine fleckförmige (Sklerodermie en plaques) zerfallen. Dehnt sich die diffuse Sklerodermie über den ganzen Körper aus, so sprechen wir von der generalisierten Form der diffusen Sklerodermie; von der diffusen Sklerodermie hat man in Rücksicht auf ihre besondere Lokalisation noch die Sklerodaktylie, die sich vorzugsweise an den Händen (und seltener an den Füßen) lokalisiert, abgetrennt. (Akroskleriasis oder Akrosklerodermie nach Hutchinson.) Man sieht auf den ersten Blick, daß für die genannten Einteilungen zwei Gesichtspunkte maßgebend gewesen sind, die Begrenzung und die Lokalisation der sklerodermatischen Veränderungen, aber innerthin erhalten wir auf diese Weise bequeme Bezeichnungen für die am häufigsten vorkommenden Formen der Sklerodermien. Und mehr als ein gewisser deskriptiver Wert ist der Einteilung schon am dessentwillen nicht zugestehen, weil, wie erwähnt, zahlreiche Übergangsstadien zwischen allen Formen vorhanden sind. Es sind noch andere Einteilungen versucht worden, darüber ist an früheren Stellen (S. 546) schon einiges mitgeteilt worden. Ich führe hier zunächst noch einmal eine in Frankreich viel gebrauchte Einteilung (nach Bessier et Doyen) an.

1. Die Skleremien, Sklerem der Erwachsenen, sclérodémie oedémateuse (Hardy), massiv, von Anfang an mit Ödemen sich entwickelnd, akute oder subakute Sklerose der Haut.

2. Die lokalisierten Dermatosklerosen, partiell, systematisiert oder nicht, die Morphoea, die Dermatosklerosen en plaques, in Streifen. Eins oder zwei gehören zusammen unter die gemeinsame Rubrik der Dermatosklerosen, diesen steht gegenüber

3. die von Anfang an chronische, progressive Sklerodermie, Allgemeinkrankheit, affiziert Muskeln, Knochen, Eingeweide und Haut, letztere in mehr oder weniger ausgebreiteten Bezirken symmetrisch. Befällt sie die Finger oder Zehen, so kommt es zur Sklerodaktylie.

In mancher Beziehung ähnlich ist die Einteilung von Hutchinson. Er spricht von Morphoea, nicht von Sklerodermie, weil mit letzterer eine pathologisch präjudizierende Bezeichnung gegeben sei, während Morphoea nichts über die Art des Krankheitsprozesses aussagt. Das ist wohl berechtigt, um so mehr, wenn wir uns zu der Auffassung gedrängt sehen, daß die Sklerodermie eine Allgemeinerkrankung und nicht nur eine solche der Haut ist, aber bei uns in Deutschland hat der Name Sklerodermie wohl schon zu sehr Bürgerrecht erworben, als daß es aussichtsvoll wäre, ihn durch einen anderen zu ersetzen.

Hutchinson teilt so ein:

1. Morphoea herpetiformis. Die Flecke sind nach Art eines

Zoster in Bändern und Streifen angeordnet, häufig bilateral, selten oder nie symmetrisch.

2. *Morphoea acroterica*. Beginn und stärkste Entwicklung des Prozesses an den Extremitäten. Immer symmetrisch, häufig verbunden mit Raynaud'schen Symptomen; häufig bei erwachsenen Frauen, ohne Tendenz zur Spontanheilung. Die *Morphoea acroterica* entspricht, wie man sieht, durchaus der Sklerodactylia. An anderer Stelle spricht Hutchinson im selben Sinne auch von Akroskleriasis oder Akrosklerodermie.

3. *Hide-bound conditions of the skin* (Verwachsensein der Haut) d. h. Fälle, wo vor allem das Unterhautbindegewebe mitbeteiligt ist. Keine Flecken, Extremitäten nicht bevorzugt.

Auch dieser Einteilung fehlt es an einem einheitlichen Prinzip, es geht zudem nach meiner Ansicht nicht an, die Fälle, die sich auf die Haut beschränken, von den tiefer greifenden abzugrenzen, da in allen Formen ein solches Übergreifen vorkommen kann, und im Einzelfall selbst dort, wo es noch nicht vorhanden ist, im weiteren Verlauf immer noch eintreten kann.

Eine Sklerodermie des ganzen Körpers ist ziemlich selten. Lewin-Heller fanden sie in 16% ihrer Fälle, wobei sie auch die Fälle höher rechneten, wo sich circumscribte Plaques über den ganzen Körper ausbreiteten. Auch bei dieser generalisierten Sklerodermie blieben übrigens oft genug einzelne Stellen frei, aber der Prozeß kann in der Tat die ganze Oberfläche der Haut einnehmen und nicht diese allein, auch Knochen, Gelenke, Muskeln, kurz, der ganze Körper kann von dem atrophischen Prozesse ergriffen werden: das Resultat ist der „*Homme momie*“, den uns Grasset in Wort und Bild anschaulich geschildert hat, ein zwerghaftes, verkrüppeltes Wesen, das geeignet ist, uns tiefstes Mitleid einzufloßen. Ergreifend und mit frappanter Naturtreue schildert uns Turgenjow in einer seiner wunderbaren „Erzählungen aus dem Tagebuch eines Jägers“, eine solche Kranke und die allmählichen Fortschritte der Krankheit: „eine lebendige Reliquie“ nennt sie der deutsche Übersetzer. Auch Bombarda beschreibt einen solchen sklerodermatischen Zwerg. Einen ähnlichen Fall wie Grasset hat auch Marinaccio publiziert. Von dieser Sklerodermia diffusa universalis gibt es aber Übergänge zu der Sklerodermia diffusa partialis und von da wieder zur Sklerodermie en bandes und en plaques.

Die oberen Extremitäten werden in allen partiellen Fällen am häufigsten ergriffen. Lewin-Heller haben sich bemüht, für die Verbreitungsweise der Sklerodermie bestimmte Zahlen zu gewinnen; Zahlen, die freilich nur einen gewissen relativen Wert haben. In 420 Fällen registrierten sie 809 Angaben. Davon betrafen die oberen Extremitäten 287, den Stamm 203, den Kopf 110, die unteren Extremitäten 122 Angaben; 29 mal fand sich eine allgemeine Bemerkung, links

oder rechte, obere oder untere Körperhälfte; 66 mal war der ganze Körper befallen. Bemerkenswert ist die (relative) Häufigkeit, mit der im Gegensatz zu früheren Angaben die untere Körperhälfte betroffen ist. Abgesehen von den durch die mitgeteilten Zahlen illustrierten Lokalisationsverhältnissen ist eine bestimmte Vorliebe des sklerodermatischen Prozesses für bestimmte Gegenden, etwa für die Bogen- oder Streckseite der Extremitäten nicht nachweisbar; es ist höchstens noch anzuführen, daß einzelne Stellen, insbesondere die Palma manus et pedis sehr selten betroffen werden und auch bei der Scleroderma universalis frei zu bleiben pflegen; doch sahen Moore und Schubiger den sklerodermatischen Prozeß auch hier.

Von besonderen Lokalisationen der diffusen Sklerodermie ist die wichtig, wo nur eine Körperhälfte von dem Prozeß betroffen ist. Solche Beobachtungen sind nicht häufig. Bergeson konnte durch 14 Jahre hindurch eine Beschränkung des Prozesses auf die linke Körperhälfte beobachten, eben dasselbe fanden auch Anitschkoff und von neuem Beobachtern Pelizaews in seinem interessanten und atypischen Fall und Steven, der bei der Sektion seiner Patientin einen bemerkenswerten, später noch zu erörternden Befund erzielte. Eine strenge Halbseitigkeit bestand auch in dem interessanten Falle von Kalb, in dem nicht nur die sklerodermatischen Veränderungen, sondern auch die Pigmentverschiebungen sich auf die eine Seite beschränkten. Streng halbseitige Ulcerationen und Alopecie beobachtete Sternthal, bei Richl war hauptsächlich die linke Körperseite befallen, bei Biro lange Zeit nur die eine Körperhälfte, während der Prozeß später auf die andere übergreifen hat. Darier et Gaston fanden die meisten Flecke links, nur einen einzigen rechts.

Die Möglichkeit eines späteren Ueberschreitens der Körpermitte ist natürlich für alle Fälle, die nicht schon seit sehr langer Zeit Gegenstand der Beobachtung sind, immer im Auge zu behalten; die Zahl der dauernd streng einseitig gebliebenen Fälle ist jedenfalls eine minimale.

Etwas häufiger findet sich ein symmetrisches Auftreten des sklerodermatischen Prozesses; am häufigsten bei der Sklerodaktylie, wo eine mehr oder minder ausgesprochene Symmetrie wohl die Regel ist. frappierender sind die Fälle, wo auch die sklerodermatischen Flecke streng symmetrisch sitzen (Osler, Morrow, Brocq et Veillon, Leredde et Thomas, Cavafy, Stowers, Raymond, Schubiger, Møller, Crocker u. a.). Aber auch hier werden wir vorsichtige Schlüsse unterlassen, wenn wir uns erinnern, daß auch hier im weiteren Verlauf an die Stelle der Symmetrie ein ganz unregelmäßiges Verhalten treten kann.

Die Sklerodermie en plaques wurde früher vielfach, namentlich von englischen und amerikanischen Autoren von der übrigen Sklerodermie abgesondert und als eigene Krankheitsform meist unter dem

Namen Morphoea beschrieben. Jetzt geschieht das nur noch vereinzelt, auch die englischen Autoren haben die Differenzierung meist aufgegeben. Die Scheidung ist in der Tat eine ungerechtfertigte, wenn auch in einzelnen Zügen geringe Unterschiede gegen andere Sklerodermieformen vorhanden sein mögen. Raymond schildert als besonders charakteristisch den lilac ring, der die einzelnen Flecke umgibt; die Affektion beginnt mit einem kongestiven Fleck, der sich allmählich verbreitert, während dabei das Centrum sich entfärbt und verhärtet. Sie soll fast stets schmerzlos verlaufen, die Erscheinungen sollen häufig regressiv sein und eine Heilung ohne Narbenbildung eintreten können. Alles dies, was ja bei anderen Sklerodermieformen oft genug auch vorkommt, genügt sicher nicht, um daraus eine besondere Krankheitsform abzuleiten, was übrigens Raymond selbst auch nicht tut.

Die Sklerodermie en bandes erweckt dadurch besonderes Interesse, daß ihre Streifen öfter, sei es scheinbar, sei es in Wirklichkeit, dem Zuge von Nerven oder auch von Gefäßen folgen; aus dieser Tatsache wurden häufig Schlüsse auf die Entstehung der sklerodermatischen Veränderung gezogen.

Lewin-Heller haben 21 Fälle zusammengestellt, in denen die Streifen dem Verlauf bestimmter peripherer Nerven folgten; am häufigsten fand man sie im Ausbreitungsgebiet eines Trigemini oder eines oder mehrerer seiner Äste (Fälle von Kaposi, Fournier, Payne, Hutchinson, Higgers and Nettleship, Herzfeld, Gibney, Friedheim); von neueren füge ich hinzu Fälle von Anderson, Jamieson (II. und III. Ast des Quintus), Spillmann, zwei Streifen entsprechend dem N. frontalis externus und internus, Haushalter et Spillmann, Fournier et Loeper, Guth und Rosenfeld, Thibierge, Crocker. Auch Kaposi erwähnt in seinem Lehrbuch eine ganze Anzahl hierher gehöriger Fälle.

Die Fälle, in denen sich die Affektion in dieser Weise auf das Gebiet des Trigemini beschränkt, weisen natürlich die größte Ähnlichkeit mit der Hemiastrophia facialis auf. Einen solchen Fall, in dem die Affektion freilich erst im Beginn ist, habe ich beobachtet. Das erste war das Auftreten einer etwa einen Zentimeter breiten, weißen Narbe an der rechten Stirngegend, etwa dem Verlauf des N. frontalis folgend; später nach einigen Monaten machte sich schon ein geringes Einsinken am rechten Mundwinkel geltend. Hier die näheren Angaben über den Fall.

P., 32 Jähr. Schatzmann. Pat. bemerkte mit 1½–2 Jahren eine Entzückung des Stirnhaut, Anfangs ohne jeden Schmerz einhergehend, während jetzt zeitweise Schmerzen, die aber nie sehr schmerzhaft sind, auftreten. Seit einem halben Jahr besteht Schläfrigkeit. Pat. ist außerlich leicht aufgeregt, ängstlich, schreckhaft, fühlt sich matt, hat zeitweise Heißhunger. Viel Aufregungen mit der Pflege einer kranken Frau seit einigen Jahren. Stammt aus gesunder Familie und war bisher immer gesund. Vor 12–13 Jahren Sturz mit dem Pferde ohne irgendwelche dauernden

Folges. Stat. *gravis*. (Dezember 1898). Von der Grenze des Haarwuchses bis fast zur Glabella zieht sich rechts von der Mittellinie eine solche, rinnenartige Narbe hin, die Haut ist hier verhärtet und scheint fast unmittelbar dem Knochen anzuliegen, mit dem sie aber nicht verwachsen ist. Außerdem tritt die ganze rechte Unterkiefer- Wangengegend hinter der entsprechenden Gegend links in ihrer Ausbildung etwas zurück. Die Sensibilität in dem Sklerodermiegebiete ist völlig intakt. Die weitere Untersuchung ergibt keinerlei Abnormalitäten. Eine drei Monate später vorgenommene Untersuchung ergibt: Die nervösen Allgemeinsymptome haben sich zugenommen, sehr schlechter Schlaf, große Ängstlichkeit, viel Kopfschmerzen. Die Narbe an der Stirn erscheint nicht verändert. Dagegen ist die rechte Unterlippe jetzt ganz deutlich verschmälert, unterhalb des Lippenrands ist die Haut hier auch deutlich etwas verhärtet, und das Zurückbleiben der ganzen Gegend im Wachstum ist stärker ausgesprochen wie voridem. Die sklerodermatischen Partien haben sich in den nächsten 1½ Jahren nur wenig ausgedehnt, so daß sie jetzt (April 1900) nur um ein geringes größer sind als zur Zeit der ersten Untersuchung. Die neurotheatischen Beschwerden stehen dauernd im Vordergrund der Erscheinungen.

Ich habe den Fall hier angeführt, obwohl ich ohne weiteres zugeben will, daß die Konfiguration der sklerodermatischen Stellen uns hier keineswegs nötigt, an eine Ausbreitung im Gebiet des ersten und zweiten Trigeminusastes (in ihren Endigungen) zu denken, sondern eine andere Auffassung (Fleckweise oder beginnende diffuse Sklerodermie) sehr wohl diskutabel ist. Das ist ein Einwand, der nicht unseren Fall allein, sondern auch zahlreiche andere, ihm ähnliche trifft.

Von bandförmiger Ausbreitung der Sklerodermie, wo die Streifen den spinalen Nerven parallel laufen, erwähne ich folgende Fälle:

Kaposi berichtet einen Fall mit Streifen im Gebiet des unteren Teiles des Plexus cervicalis und des ersten und zweiten Dorsalnerven. Einen gleichen Fall sah Bernier, Dinkler einen solchen entsprechend dem Verlauf der Nervi intercostales, Mendes da Costa einen im Bereich des zweiten und dritten Nervus intercostalis, einen zweiten im Bereich des fünften bis seibentes Cervicalnerven. Neumann sah Ausbreitung der Sklerodermie im Gebiete des Nervus radialis, ebenso Dove und Biro, Kohn im Gebiete des Medianus, Richa und André in dem des Ulnaris. Dem Nervus ischiadicus entsprach sie in der Beobachtung Gibneys, dem Nervus cutaneus femoris externus in der von Leisrinks und Addisons, dem Nervus saphenus internus in denen von Kaposi, Colecott Fox und Raymond, dem Nervus cutaneus brachii internus in der Hallopeaus, dem Nervus cutaneus pedis dorsalis lateralis in einer Hutchinsons, der auch noch einige andere hierher zu rechnende Fälle sah, in denen die Bänder auf beiden Seiten symmetrisch dem Verlauf bestimmter Nerven folgten.

Demgegenüber ist aber auch eine ganze Anzahl von Beobachtungen bekannt geworden, in denen der Verlauf der Streifen einem peripheren Nerven nicht entsprach. Lewin-Heller stellen ihren 21 Fällen, die oben schon mitgeteilt wurden, wo die Streifen dem Gebiet eines Nerven folgten, 20 andere gegenüber, in denen sich eine solche Beziehung

nicht feststellen ließ. Einige Male schienen sie sich eher an Gefäße anzuschließen, so in Hoffas Fall, wo ein 5 cm breiter, 2 cm langer Streifen dem Verlauf der Vena saphena entsprach, und ähnlich bei Ehrmann und bei Richl, wo an eine Beziehung zur A. brachialis zu denken war.

Oftmals aber erschien der sklerodermatische Streifen auch ganz selbständig ohne jede Beziehung zum Nerven- oder Gefäßapparat sich zu entwickeln, und wir finden eine ganze Anzahl von Fällen, in denen dieses Verhalten ausdrücklich hervorgehoben wurde.

Neuere Forschungen machen aber wenigstens für einen Teil dieser Fälle eine Revision einer solchen Auffassung nötig.

Brissaud hebt nämlich mit Nachdruck hervor, daß bei der Sklerodermie, ebenso übrigens wie beim Herpes zoster, nicht allein das Ausbreitungsgebiet des peripheren Nerven, sondern ein andermal auch ein Wurzelterritorium befallen sein kann, was West zuerst in einem Fall beschrieben hat, in dem der sklerotische Streifen genau dem Territorium der dritten Lumbalwurzel entsprach. Einen solchen Fall haben auch Brocq et Veillon mitgeteilt. Galwell sah einen Fall, in dem das Ausbreitungsgebiet der rechten siebenten Cervicalwurzel befallen war, Lillenthal einen mit Ausbreitung im dritten Lumbalsegment, Kalb mit Ausbreitung im ersten Lumbal- und zweiten und siebenten Dorsalsegment einer Seite, Huot und Sicard im ersten Dorsalsegment und achten Cervicalsegment, Guth und Rosenfeld im Trigeminas (zweiter und dritter Ast), am Arm im Gebiet von C VI und VII, an anderen Stellen war aber die Verbreitung eine diffuse. Ich selbst habe einen Fall gesehen, in dem die Ausbreitung in der Haut ziemlich genau dem fünften und sechsten Cervicalsegment entsprach, dabei war noch eine sehr deutliche sklerotische Affektion des Deltoides bemerkenswert. Blaschko erwähnt zwei besonders interessante Fälle von Touton, in denen eine streifenförmige Sklerodermie sich örtlich und zeitlich an einen vorhergegangenen Zoster anschloß, er gibt ferner noch Abbildungen von hierhergehörigen Fällen von Herxheimer, Neißer, Pincus, Isaac.

Brissaud geht aber noch weiter und behauptet, daß es in anderen Fällen die Ausbreitungsbezirke der spinalen, medullären Metanerven sind, mit denen sich die sklerodermatischen Bezirke decken. Diese dehnen sich an den Extremitäten nicht parallel deren Längsachse, sondern in transversaler Richtung aus; in diese Klasse sind danach die Fälle zu rechnen, in denen quere Streifen eines Hautgebietes oder bestimmte Abschnitte einer Extremität wie die Hand, der Unterarm usw. von der Sklerodermie befallen sind. Drouin hat die Lehren Brissauds in extenso in seiner These vertreten. Er beschreibt einen Fall, in dem die sklerotischen Bänder dem siebenten und achten Cervicalsegment rechts, dem ersten und zweiten Brust-

segment links und dem fünften Lumbal- und ersten Sacralsegment verläuft ganz genau entsprechen, wie ein Vergleich mit den Head'schen Schematen deutlich lehrt. Er stellt aus der Literatur eine Anzahl von Fällen zusammen, die geeignet seien, diese Anschauungsweise zu stützen und gibt an, daß auch Marinesco, Achard, Ballet und Hallopeau jetzt dieser Brissaud'schen Ansicht zustimmen. Einen Fall mit segmentärer Abgrenzung berichtet auch Bruns. Ich habe ihn schon mehrmals erwähnt und gebe ihn hier etwas ausführlicher.

Ein Bahnwärter erkrankte vor sieben Jahren plötzlich mit heftigster Schwächung des Fußrückens und mündlich lebhaften Brennen. Die Schwächung dehnte sich allmählich über den ganzen rechten Fuß und das untere Drittel des Unterschenkels aus, dann kam ein Stillstand von zwei Jahren, dem eine neue kontinuierlich über das ganze rechte Bein und dann von oben nach unten über das linke Bein sich erstreckende Ausbreitung folgte. Niemals waren Zeichen einer anderen nervösen Affektion vorhanden. Die Veränderung der Haut reicht jetzt hinten bis zum Dornfortsatz des zweiten Sacralfortsatzes und von hier aus 12 cm weit nach unten, dabei zieht die obere Begrenzungslinie in leichtem, etwa 4 cm hohem Bogen hin, von dann steht auch vorn abzufallen und dem Verlauf der Leistenfalte parallel etwa 2 cm distalwärts von ihr zu geben. Die Affektion ist absolut symmetrisch, in diesem ganzen Gebiet und nur gewisse Teile des linken Fußes, und zwar besonders der Fußsohle normal; wenig verändert ist die Haut über der linken Wade, die Genitalien sind ganz frei. Im übrigen finden sich die verschiedenen Stadien der Sklerose, es finden sich Pigmentanomalien, teils alabasterweiße Flecken, teils gelblich-rotliche, gelbbraune oder auch bläulich verfärbte Stellen. Die Zehen des rechten Fußes sind deutlich dünn, die Finger werden leicht weiß und anphyktisch, während die Haut hier sonst ganz unverändert ist.

Im vorliegenden Fall stimmt namentlich die obere Grenze ziemlich genau mit der Grenze des ersten Lumbalsegmentes nach Head. Ein ähnlicher Fall wurde auch von Jacobsohn mitgeteilt.

Einen Fall mit spinal-segmentärem Typus (drittes Lumbalsegment) beschreibt auch West. Freilich finden sich hier auch noch einzelne, z. T. symmetrisch angeordnete Flecken.

Es ist zurzeit noch recht schwierig, dieser Lehre gegenüber eine bestimmte Stellung einzunehmen. Für einzelne Fälle scheint in der Tat eine Übereinstimmung der sklerotischen Partien mit den radikalen Territorien vorzuliegen. So ist z. B. in dem von Brissaud und Blaschko abgebildeten Fall von Thibierge et Drouin eine solche Übereinstimmung wohl vorhanden, wenn ich auch nicht zugeben kann, „que la superposition est absolument parfaite des bandes sclérosées aux territoires de certaines racines“, wie Brissaud das will. Immerhin liegt ein ziemlicher Grad von Übereinstimmung vor, aber jedenfalls muß jeder hierhergerechnete Einzelfall einer sehr genauen Prüfung unterzogen werden. Es ist zu bedenken, daß, wenn wir einmal eine Ausbreitung im Verlauf eines peripheren Nerven, ein andermal im Verlauf eines Wurzelsegmentes zulassen, und wenn wir dann noch konzedieren, daß die Ausbreitungsgebiete einander nicht absolut konform sein müssen,

weil vielleicht noch eine Progression zu erwarten steht, oder weil ein Übergreifen auf ein benachbartes Segment möglich erscheint, daß unter solchen Umständen an den Extremitäten unschwer für jede Art der streifenartigen Ausbreitung in der Längsachse der Extremität ein entsprechendes Wurzel- oder Nerventerritorium als Grundlage herangezogen werden kann. Noch unsicherer ist es mit den spinalen Metameren bestellt; die ganze Lehre ist nicht genügend gefestigt, und auch hier gilt wieder der Einwand, daß es gar zu leicht ist, um jeden transversalen Streifen auf ein medulläres Metamer zu beziehen.

Berücksichtigung verdient ferner die neuere Lehre von der Ausbreitung der lineären Naevi, deren Verlauf häufig an eine spinale metamerale Abgrenzung denken ließ. Nach den Forschungen, wie sie besonders von Blaschko angestellt wurden, verfolgen die „Naevi“ an der Körperoberfläche ein regelmäßiges Liniensystem, welches wahrscheinlich mit dem Liniensystem übereinstimmt, das die Leisten des Rete Malpighi bzw. die Cutispapillen inne halten. Sie stellen metamerale, den einzelnen Dermatomen oder wahrscheinlicher Dermatommargenen entsprechende Ausschnitte aus diesem Liniensystem dar. Sie sind die Folge von Entwicklungsstörungen, für deren Zustandekommen eine vorausgegangene Erkrankung des Nervensystems bzw. einzelner Metameren desselben nicht mit Notwendigkeit anzunehmen ist. Die Übertragung derartiger Anschauungen auf die Sklerodermie zu handeln würde uns abhold zur Erörterung pathogenetischer Fragen führen, die wir noch verschieben müssen. Hier haben wir nur den Schluß zu ziehen, daß die streifenförmige Anordnung auch auf gewisse kongenitale Anlagen oder Defekte von Anlagen bezogen werden kann (Akordnung im Bereich der einzelnen Dermatome resp. Myo- und Sklerotome). So sagt Blaschko ganz allgemein, was aber zum Teil auch für die Sklerodermie Geltung haben könnte: Bei strich- und bandförmig angeordneten Hautaffektionen ist ebenso wie bei den linearen Naevi die Möglichkeit eines Zusammenhanges mit nervösen Störungen zwar nicht zu leugnen, doch lassen sich dieselben zum größten Teil durch die Prädisposition gewisser metameraler Linien auf der Haut für einzelne Dermatosen ausreichend erklären. E. Lewandowsky ist in einem kritischen Referat auf Grund der späteren Erfahrungen durchaus für eine solche Auffassung eingetreten und stützt sich dabei wohl auf die Mehrzahl der dies Gebiet bearbeitenden Forscher. Ablehnend verhält sich Blaschko wohl mit Recht der Brissaudschen Lehre von der Unterscheidung der spinalen Metameren von den radikulären; es gibt zwar zu, daß kleine Unterschiede zu der Ausbreitung zwischen spinalen und radikulären Metameren bestehen, doch sind diese nicht groß genug, um die Brissaudsche Lehre zu stützen; daß an den Extremitäten infolge einer sekundären Metamerie im Cervical- und Lumbalmark medulläre Erkrankungen quere (arti-

kulär oder ähnlich) begrenzte Ausfallserscheinungen zur Folge hätten, ist eine weder klinisch, noch anatomisch noch entwicklungsgeschichtlich begründete Hypothese.

Ich bin geneigt, mich dieser Ablehnung der Brissaudschen Lehre, trotzdem ihr Marinesco, Achard, Ballet, Hallopeau ihre Unterstützung geliehen haben, anzuschließen.

Es wird von allen Seiten übrigens zugegeben werden müssen, daß die Anordnung der Bänder und Streifen oft eine ganz regellose und willkürliche, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit bestimmten Nerven und lebenswichtigen größeren Gefäßterritorien stehende ist (Kaposi, Hoffa, Ehrmann, Bloch, Straßmann, Neumann, Cröcker, Friedheim und viele andere).

Als eine weitere Unterabteilung der Sklerodermie wird allgemein die Sklerodaktylie angesehen. Sie hat von allen Formen der Sklerodermie für uns das größte Interesse, weil wir bei ihr die engsten Beziehungen zu den übrigen, von uns behandelten Affektionen auffinden.

Der Art ihrer Ausbreitung nach gehört sie zur Scleroderma diffusa partialis, d. h. in diffuser Weise wird ein Teil des Körpers von der Affektion befallen.

Sie ist keine eigene Krankheit, die etwa von der Sklerodermie völlig abzutrennen wäre; waram, das habe ich schon erörtert. Es gibt von ihr aus zahlreiche Übergänge, insbesondere zur Scleroderma diffusa mit allgemeiner Ausbreitung, und der histologische Prozeß in den affizierten Teilen ist kein anderer als sonst bei der Sklerodermie (s. u.), aber andererseits weist sie doch oft Züge auf, die uns veranlassen, sie in gewissem Sinne als eigene Unterabteilung der Sklerodermie aufzulassen. Als solche Eigenzüge möchte ich folgende besonders nennen: erstens die Lokalisation, dann das häufige Ergriffenwerden der tiefer liegenden Gewebsteile, der Sehnen, Fascien, Muskeln, Gelenke und Knochen, die sehr häufigen begleitenden erheblichen vasomotorischen, sensiblen und trophischen Störungen mit einem vom sklerodermatischen abweichenden Typus.

Ehe ich weiter gehe, will ich zunächst einen selbst beobachteten klassischen Fall der Art berichten:

V. — 35jährige Frau.

Stamm aus gesunder Familie; Vater an Wasserkopf gestorben. Pat. hat keine schweren Krankheiten durchgemacht. Seit ihrem 18. Jahre ist sie schwermütig, leicht aufgeregt, ängstlich, leidet oft an anfallsförmiger Hitze, war zeitweise chlorotisch. Seit vier Jahren verheiratet, hatte eine Kind, das an Zahnkrämpfen gestorben ist. Kein Abort. Mann soll gesund sein. Hat immer nur in der Wirtschaft gearbeitet, sie besonders viel mit kaltem Wasser zu tun gehabt. Niemals Euthyraxen. Im Winter 1894 traten die ersten Krankheitserscheinungen auf; sie bekam Schmerzen

und Kriebeln in den Fingern, namentlich wenn diese warm wurden; die Hände wurden dabei gewöhnlich rot, im stärksten an den Fingerspitzen. Der Mittelfinger beider Hände wurde zeitweise ganz weiß; allmählich dehnten sich diese Erscheinungen aus, die Hände wurden anfallsweise leblosbleich, auf diese Blässe folgte eine tiefe Blaufärbung, hienächst auch eine fleckige Rose, so daß die Hände ein recht buntes Bild darboten. Vor einem Jahr bemerkte sie zuerst ein allmählich zunehmendes Gefühl von Spannung, Steifheit und Schwebereiglichkeit der Hände, so daß es ihr unmöglich wurde, die Bewegungen des Hände in derselben Weise wie früher auszuführen. Anfangs erschienen der Pat. die Hände im ganzen dabei geschwollen, während sie dann immer dünner und schmäler wurden. Im Sommer 1896 entstanden ohne erkennbare Ursache Paronychien an allen Fingern; dieselben waren sehr schmerzhaft. — In der letzten Zeit schwitzten die Hände ausfällig stark. Die Schmerzen sind jetzt (Sommer 1897) von mäßiger Intensität, häufig und besonders des Nachts vorhanden. Sowie die Hände in kaltes Wasser getaucht werden, sterben sie vollkommen ab.

Zur selben Zeit wie die geschillerten Erscheinungen an den Händen, machten sich auch am übrigen Körper einige Krankheitserscheinungen geltend; an der Haut des Halses und der Arme fiel eine abnorme Pigmentierung auf, indem sie dunkelbraun wurde, und außerdem machte sich im Gesicht eine Rötung und Spannung geltend.

Die Untersuchung ergibt: Allgemeiner Ernährungszustand ziemlich schlecht, die Pat. im ganzen abgemagert. Das Gesicht ist auffällig dunkel gelblich, die Nase spitz und schmal, die Lippen wie eingeschnitten, die Stirnhaut spiegelflatt, labornist, glänzend. Die Haut ist an den genannten Teilen und über dem Jochbein für das Gefühl härter als normal, stark gespannt. An Hals und Armen diffuse Bräunfärbung. Die Finger beider Hände in halb gebeugter Stellung. Die Farbe an Händen und Fingern ist einem fortwährenden Wechsel unterworfen; die Grundfarbe ist ein Gemisch von Rot und Weiß, ein eigentümliches, hellbräunlichrotes Graublau. Aber dann tritt einmal an diesem, einmal an jenem Finger der Hand oder auch an mehreren zugleich eine Farbänderung auf; entweder wird der betreffende Teil weiß, indem er dabei eine wirklich kadaveröse Färbung annimmt und diese Farbe einige Minuten beibehält, oder das Rot accentuiert sich stärker, aus dem Graublau wird ein immer intensiveres Dunkelblaurot, wie es den höheren Grades der Cyanose entspricht. Dieser Farbwechsel geht bei gewöhnlicher Zimmertemperatur vor sich. Ein kaltes Roc wird dabei nie beobachtet. Die Haut an den Fingern, am Handrücken und an Daumenballen ist stark gespannt, hart, glänzend und auf der Unterlage nicht verschieblich. Die pathologische Beschaffenheit der Haut setzt sich bis zum Ellbogengelenk hinauf fort und reicht in einzelnen Flecken auch noch weiter hinauf. Es ist mit Leichtigkeit zu fühlen, daß die Verdichtung und Verhärtung sich an den Extremitäten nicht auf die Haut beschränkt, sondern sich auch auf die tieferen Teile erstreckt. Die Endphalangen der Finger sind im ganzen etwas aufgehoben, an den Fingerspitzen finden sich überall kleine, weiße, etwas eingezogene Narben, von Paronychien herrührend. Die Finger lassen sich passiv weder vollkommen beugen noch strecken. Pat. kann nach hellem Pausen ruhen. Die Bewegungsbehinderung ist teils durch die Verhärtung der Haut bedingt, teils scheinen auch andere mechanische Momente mit Schuld zu haben (Schmerzverkrüppelung und Verwachsung, Gelenkveränderungen), die im einzelnen nicht genau zu erörtern sind. Alle Bewegungen sind übrigens so weit frei, als sie mechanisch nicht behindert sind. Das Gefühl für Pinselberührungen und Nadelstiche ist normal, ebenso die Temperaturempfindlichkeit. Die elektrische Erregbarkeit der Muskeln ist normal. An den Füßen ist keinerlei Abnormität nachweisbar. Die Patellarreflexe sind etwas erhöht. Am Gefäßsystem ist nichts Pathologisches zu finden, der Puls an der Radialis ist normal. Über den weiteren Verlauf kann ich nur wenig sagen, daß nach vielfachen Nachrichten das Leiden unaufhaltsam progressiv ist. Pat. soll jetzt durch hochgradige Schwäche vollkommen im Zimmer gettaucht sein und es seit vielen Monaten nicht mehr ver-

lassen haben. Wir selbst hatten einige Wochen lang Thyreoidin ohne Erfolg angewendet.

Der Fall zeigt in großer Vollständigkeit das gewöhnliche klinische Bild der Sklerodaktylie.

Von der Veränderung der Haut sind, wie meist, die distalen Teile der oberen Extremitäten am stärksten betroffen, die Veränderungen erstrecken sich ziemlich weit, bis über das Ellenbogengelenk nach oben, die Füße sind ganz frei, aber das Gesicht ist affiziert, und wir sehen das von der Sklerodermie her bekannte Bild der sklerodermatischen Maske.

Im ganzen ist nach einer Zusammenstellung Lewin-Hellers eine isolierte Sklerodaktylie viel seltener als eine mit Sklerodermie kombinierte; sie fanden nur 35 Fälle isolierter Sklerodaktylie und 103 kombinierter. Lewin-Heller betonen auch, daß trotz sehr ausgebreiteter Sklerodermie doch die Hände völlig frei bleiben können. Eine Seltenheit stellt eine von Lannois beschriebene Kombination dar, bei der Hemiatrophia faciei, Sklerodermie an den Händen und Sklerodaktylie bestand. Jedenfalls bezeugen alle diese Tatsachen zur Genüge, daß gar keine Rede davon sein kann, die Sklerodaktylie zu einem eigenen Krankheitsbild zu stempeln. In unserem Fall scheint das Gesicht sogar ziemlich gleichzeitig mit den Händen befallen worden zu sein; für die Mehrzahl der Fälle muß allerdings gelten, was schon Hutchinson sagt, daß der Beginn und die größte Intensität des Prozesses an den Extremitäten ist, während später auch die ganze übrige Haut befallen werden kann.

Die unteren Extremitäten sind, wie auch in unserem Fall, sehr oft frei, manchmal werden sie später noch in geringerem Grade befallen, nicht selten aber nur so, daß auch hier vasomotorische Symptome sich zeigen, während die sklerodermatische Hautveränderung dauernd ausbleibt. Doch hat Walters einen Fall von Sklerodaktylie an den Füßen beschrieben. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sind bei der Sklerodaktylie die Veränderungen symmetrisch verteilt; viel häufiger als sonst bei der Sklerodermie, wo aber, wie wir sahen, Symmetrie auch bei den übrigen Formen beobachtet wird.

Auch in unserem Fall waren neben der Haut die tiefen Gewebe betroffen, dafür spricht sowohl die Gestaltsveränderung der Phalangen, die dick und aufgetrieben waren, als die sehr beträchtliche Bewegungsbehinderung, die sich allein aus der starken Spannung der Haut nicht hinreichend ableiten ließ. Diese Beteiligung der tiefen Teile, der Knochen, der Gelenke, der Sehnen führt zu tiefgreifenden Gestaltsveränderungen und Verkrümmungen, Verstümmelungen, die an die von der Lepra gesetzten erinnern, und die deshalb auch verständlich machen, wieso einzelne Forscher die Sklerodermie der Lepra zurechnen konnten. Wenn wir uns z. B. unsere Abbildung Fig. 14 ansehen, so haben wir da

in der Tat Verstümmelungen vor uns, wie sie die *Legra* herbeizuführen pflegt. Die Hände sind gekrümmt, die Fingerringen sind klobig verdickt, die Endteile der Phalangen fehlen. Die Röntgenbilder (Tafel XXII bis XXIV) lassen besonders deutlich die schweren Knochenveränderungen, die Deformitäten der Nägel, die klauenartig gebogen sind, der Gelenke hervortreten. Auch die ebenfalls in unserem oben beschriebenen ersten Fall vorhanden gewesenen Panaritien führen zu



FIG. 14.

Schwere Sklerodaktylie. Verstümmelung aller Endphalangen.

mancherlei Destruktionen. Aber wir wissen von unserer früheren Beschreibung her, daß das Übergreifen des sklerotischen Prozesses auf die tiefen Gewebe auch in anderen Formen der Sklerodermie vorkommt, und nach neuerer Erkenntnis nichts besonders Seltenes ist. Auch hierin unterscheidet sich also die Sklerodaktylie nicht fundamental von anderen Sklerodermieformen.

Die Sklerodaktylie ist ferner durch die Häufigkeit und Intensität der vasomotorischen Symptome ausgezeichnet, und zwar hat man sowohl lokale Cyanose, wie lokale Anämie, wie lokale Hyperämie beobachtet. Unser Fall demonstriert das Auftreten der Synkope und As-

physie sehr prägnant. Die Störungen treten anfallsweise auf, in stetem Wechsel und steter Aufeinanderfolge, ohne daß mit Sicherheit zu sagen gewesen wäre, daß die Synkope immer vorausging. Diese Symptome waren schon sehr früh vorhanden, vielleicht schon bevor die Haut die sklerodermatische Beschaffenheit angenommen hatte, vielleicht erschienen sie gleichzeitig damit. Das wechselt im einzelnen Fall, die vasomotorischen Symptome können für lange Zeit vorausgehen, es scheint das das häufigere zu sein und wurde mir auch von einer Reihe von Kranken, die ich beobachtete, angegeben; es können aber auch die Hautveränderung und die vasomotorischen Symptome synchron einsetzen.

Eines aber ist wichtig, nicht ausnahmslos sind die sklerodermatischen Veränderungen der Finger vom vasomotorischen Symptomen begleitet. Dafür kann ein von Dereum mitgeteilter Fall als Beispiel gelten.

Wenn wir uns nun erinnern, daß die eben erwähnten vasomotorischen Symptome einen sehr wesentlichen Bestandteil des Krankheitsbildes der Raynaudschen Krankheit ausmachen, so wird es uns nicht wundern, daß Sklerodaktylie und Raynaudsche Krankheit zwei einander sehr ähnliche Krankheitsbilder darbieten können. Die Beziehungen beider Krankheiten zueinander sind schon seit langem der Gegenstand eifriger Forschungen gewesen; es mag gestattet sein, diese Frage, die uns um deswillen besonders interessiert, weil wir es hier wieder mit der Tatsache des Auftretens von Übergangs- und Zwischenformen zu tun haben, etwas genauer zu besprechen.

Wir haben bereits im Kapitel „Raynaudsche Krankheit“ gesehen, daß im Verlauf dieser Affektion gelegentlich, namentlich an den distalen Körperteilen, neben den typischen trophischen Störungen der Gangrän, sich mehr chronisch-dystrophische Prozesse abspielen, die im weiteren Verlauf zu einer Verhärtung und Verdickung der Haut in den tieferen Teilen führen. Nach dem Grundsatz „a potiore fit denominatio“ werden wir diese Fälle als Raynaudsche Krankheit bezeichnen dürfen. Aber sie stellen doch immerhin die ersten Glieder einer Kette dar, die die beiden Affektionen nahe zusammenschließt. Wenn wir nämlich die bisher in der Literatur beobachteten, hierher gehörigen Fälle sichten, so können wir folgende Gruppen unterscheiden.

1. Fälle typischer Raynaudscher Krankheit; in späteren Stadien tritt neben der symmetrischen Gangrän eine weitere dystrophische Veränderung an den distalen Teilen auf, indem die Haut sich verdickt, die Sehnen scheiden, die Gelenke ankylosieren usw. Die Haut hat dabei zunächst nicht die typische Gestaltung wie bei der Sklerodermie, oft erinnern die Veränderungen mehr an die Gley's skin, aber es gibt doch auch Fälle mit der typischen, glatten, gespannten, unnachgiebigen und unbeweglichen Hautbeschaffenheit. Bemerkenswert ist,

daß die Veränderungen sich auf die Stellen beschränken, in denen die vasomotorischen und trophischen Symptome der Raynaudischen Krankheit ihre größte Intensität entfaltet haben; die übrigen Körperteile zeigen keine sklerodermatische Beschaffenheit. Das sind die oben erwähnten, von mir bereits oben beschriebenen Fälle, von denen Raynaud selbst schon einen angeführt hat.

In einer zweiten Gruppe können wir diejenigen Fälle zusammenfassen, in denen die vasomotorischen Symptome der Asphyxie locale und der Sympkope locale die Saeae eröffnen, in denen lange Zeit diese Symptome allein vorhanden sind, ganz in der typischen Weise, in paroxysmalem Auftreten und miteinander abwechselnd. Wir wissen, daß es Fälle gibt, in denen die Krankheit über diese Symptome überhaupt nicht hinausschreitet, wo dauernd also nur Akroasphyxie vorhanden ist; im ausgelebten Raynaudischen Typus kommt es dagegen bekanntlich zur symmetrischen Gangrän; in den Fällen, die wir jetzt besprechen, tritt nun an die Stelle der akuten trophischen Störung die chronische: oft unter Abschwächung der vasomotorischen Symptome, namentlich unter Verwischung der Anfälle und unter Rückgang der sensiblen Erscheinungen, besonders der Schmerzen, bildet sich eine typische Sklerodermie aus. Diese Sklerodermie braucht sich nicht auf die distalen Körperteile zu beschränken, neben den Händen sind sehr oft das Gesicht, nicht selten auch andere Körperteile, Brust, Arme usw. beteiligt.

Der folgende Fall ist ein klassisches Beispiel der Sklerodaktylie mit Raynaudischen Symptomen.

M., 33 Jahr, Fräulein.

Mutter nervös, verständig aufgezogen, hat Kopfschmerzen, zwölf Kinder, von denen drei leben.

Das Leiden begann vor drei Jahren mit Blau- und Gefäßknoten der Hände; sie wurden an der Spitze nach weiß, wie abgestorben; besonders in der Kälte. Dabei traten auch Parästhesien, aber zuerst keine wirklichen Schmerzen auf, die sich erst allmählich einstellten; sie strahlten in beide Arme aus, es kam zu Schwellungen in den Hand- und Fingergelenken, die allmählich nachließen. Seit zwei Jahren wurde die Haut der Finger fester und die Finger verknöcherten sich; um dieselbe Zeit trat auch eine Schwellung und Spannung im Gesicht ein. Die Schwellung ließ auch hier nach, die Nase verknöcherte sich, in der Nasenspitze, den Ohren traten apoplektische Anfälle auf, zum Teil von Schmerzen begleitet. Auch um den Mund herum stellte sich eine erhebliche Spannung ein. Die Gesichtsfarbe, die Farbe der Haut des Halses wurde dunkler. Später trat auch eine Schwellung am rechten Knie ein, die namentlich nachts sehr heftige Schmerzen hervorrief. Vor einem halben Jahr stellten sich Schmerzen im rechten Hüftgelenk ein, so stark, daß sie gar nicht gehen konnte. Pat. ist sehr erregt, schlaflos, schreckhaft; das soll sich in den letzten Jahren sehr gesteigert haben.

Die Augen traten schon immer stark hervor, kein Glauk., keine Tachykardie, kein Tremor, keine Strab., keine Abnahme des Körpergewichts. Eingeknickter Mund, schmale Lippen, dünne Nase. Haut über der Nase und an den Schläfen dünn, glänzend. Graublaue Cyanose der Finger, an einzelnen

Stellen weiß, dann wieder belfrete Flecken. Die vasomotorische Innervation ist überall großen Schwankungen unterworfen. Rindruck, nach Gärtner gemessen, überall herabgesetzt 45–55, an einzelnen Fingern wechselnd, beiseiten schließt sich an den durch die Messung bedingten temperären Abschluß des arteriellen Blutzuflusses eine die Messung überdauernde Synkope locale an, so daß der Rindruck null heißt. Die Finger sind stark angeschwollen, insbesondere die beiden Zeigefinger. Die Haut der Finger ist mit der Unterlage verachsen, an den Pulps der Finger finden sich kleine strahlige Narben, die zum Teil noch mit kleinen, schmerzlos, fest haftenden Scherben bedeckt sind; das sind die Reste zahlreicher, kleiner ulnariert-kalter Störungen an den Fingerbeeren. Die Nägel sind stark längenverf. Das Schmelzen der Nägel ist schmerzhaft. In der rechten Hand sind die Interphalangealgelenke an den ersten drei Fingern ankylosiert, in der linken Hand an allen Fingern. Die Handgelenke sind in ihrer Beweglichkeit beschränkt, geschwollen, druckempfindlich. Die Haut am Handrücken ist abnorm heiß, glänzend. An beiden Unterarmen Stadium elevatum der Sklerodermie. Beide Ellenbogengelenke in der passiven Beweglichkeit beschränkt, nur bis 135° zu strecken; dabei fühlt man eine Art Schweißkugeln; die Gelenke sind druckempfindlich. Auch in der linken Schulter, im rechten Hüftgelenk und rechten Kniegelenk Beschränkung der passiven Beweglichkeit und Schmerzhaftigkeit. Die Fäße sind diffus oedematisch, Haut verbleicht, geschwollen, aber keine vasomotorischen Attacken an den Zehen. Auch über der Brust ist die Haut verbleicht, geschwollen und fester als normal.

Das Röntgenbild (Tafel XXIII) der Hand zeigt die schwere Affektion der Knochen und Gelenke, allgemeine Atrophie der distalen Teile, die Bindefibrosen der Substantia spongiosa, die Deformation der Gelenkenden selbst im Handgelenk. Auch im Ellenbogengelenk waren ähnliche Veränderungen bei der Durchleuchtung nachweisbar.

Hier sind offenbar die vasomotorischen Erscheinungen kurze Zeit vorausgegangen. Dazu gesellten sich alsbald diffuse sklerodermatitische Veränderungen, erst im Gesicht, dann in den Händen, der Brust, den Füßen. Daneben traten unter Fortbestehen der Asphyxia, Synkope und Hyperaemia localis Panaritien und Nekrosen auf. Der Prozeß ging auf die tieferen Teile über, und betraf neben den Knochen in besonders schwerer und ungewöhnlicher Form die Gelenke.

Es gibt auch Fälle mit viel längerem Vorangehen der vasomotorischen Symptome. So beschreibt Sackur einen 40jährigen Kranken, bei dem vor 24 Jahren Anfälle von Asphyxie locale nach angeblicher Erfrierung eingetreten waren. Die Hände waren blaurot geschwollen, schmerzhaft, im Sommer stets besser. Die vasomotorischen Störungen breiteten sich allmählich über alle Finger aus bis zum Handgelenk. Seit 5 Jahren erhebliche Verschlimmerung, keine Erleichterung mehr in der Wärme, ab und zu Panaritien. Jetzt sind die Finger weder aktiv noch passiv noch zu strecken; es kommt zu Synkopetanfällen, neben roten und geschwollenen Stellen finden sich weiße, die Haut ist lederartig, auch nekrotische Herde treten auf. Sackur berichtet noch einen zweiten derartigen Fall. Auch in einem Fall von Stanishev ging das Bild der echten Raynaudschen Erkrankung lange Zeit voraus. Einzelne solcher Fälle habe ich auch selbst beobachten können.

Gelegentlich läßt sich aus der Schilderung einmal auch eine relative

Unabhängigkeit der einzelnen Symptomenreihen festnehmen, wie in einem Fall von Lücke.

Das poetische Verhältnis der vasomotorischen und der trophischen Symptome kann hier insofern noch ein anderes sein, als nicht immer die vasomotorischen Symptome vorangehen, sondern gleichzeitig mit ihnen die trophischen Symptome auftreten, ganz im Einklang mit den Verhältnissen bei Raynaud, wo ja die Gangrän auch nicht immer strikte an das Vorgehen vasomotorischer Symptome gebunden ist.

Die hierhergehörigen Fälle sind recht zahlreich, sie sind oft als Beispiele der Kombination von Raynaud'scher Krankheit und Sklerodermie beschrieben worden, während andere Forscher aus ihnen die Identität der beiden Krankheiten ableiten wollten.

Der folgende Fall, der, nach sonst manche interessanten Einzelheiten bietet, mag als Beispiel gelten.

G., 33-jähriges Fräulein. Das Leiden begann vor fünf Jahren mit Blau- und Kaltwerden der Finger beider Hände. Die Erscheinungen traten plötzlich nach einer schweren Erregung auf, durch die angeblich bei einer Schwester eine Psychose ausgelöst wurde. Eine Schwester ist taubstumm, eine Schwester leidet an Migräne, der Bruder des Vaters ist an Dement. paralyt. gestorben. Mutter an Tuberc. pulm. gestorben. Pat. war stets poetisch gewiegt, zum Teil wohl mit dem Charakter der Zwangsvorstellungen, sonst bis vor fünf Jahren immer gesund. Bei den Anfällen von Asphyxie treten keine Schmerzen auf, die Asphyxie entreckte sich bis an die Handwurzel, wurde durch Kälte und Aufregungen hervorgerufen, löste sich dann in Rüte und Hitze. Von vornherein bestand nach der Schilderung eine Tendenz der Haut zur Sklerosierung und Verwachsung mit der Unterlage. Abtuhl schlossen sich auch schmerzhafte perimarguale Eiterungen an, zuerst am rechten kleinen Finger. Zum Teil auf diesem Boden bildeten sich Dekubierstagen aus, zum Teil entstanden diese nach den bestimmten Angaben der Patientin auch langsam, durch allmählichen Knochenschwund und entsprechende Gelenkveränderungen. Später trat eine Erstarrung der Gesichtshaut und eine Verhärtung der Haut des Gesichts ein; die Nase wurde dünner, der Mund zog sich zusammen und verkleinerte sich. Auch an den Ohren kam es zu Anfällen von Asphyxie und zur Bildung von Geschwüren. Das Leiden schritt stetig vor.

Bei der Untersuchung bestand eine starke Abmagerung, die Haut des Gesichts ist dünn, spiegelgl., und mit der Unterlage stellenweise (Stirn, Nase) verwachsen. Die Farbe ist schmutzig braun, zeigt an vielen Stellen zahlreiche kleine Vaskelationen. Am Hals und an der Brust ist sie ebenfalls verdünnt und pigmentiert, dasselbe gilt von der Haut der Arme. Die Muskulatur der Ober- und Unterarme ist sicher zum Teil verhärtet, besonders der Biceps und die Extensoren der Hand fählen sich strangartig fest an. In den Ellbogengelenken und im linken Handgelenk bestehen deutliche Veränderungen: Schwellung, Druckschmerzhaftigkeit, Beschränkung der passiven Beweglichkeit. Die Hände sind auf das schwerste verändert. Alle Nagelglieder sind deformiert, verkümmert, zugespitzt, die Nägel sind schnabelförmig, lassen sich schwer schneiden. Es bestehen feste spitzenförmige Ankylosen in den letzten Interphalangealgelenken; an der Palpa. der Finger fanden sich zahlreiche unregelmäßige weiße, feste Narben; die Haut ist überall fest, glatt, dünn, so daß sie zum Teil aufspringt. Die Färbung ist einem fortwährenden Wechsel unterworfen, meist blau in allen Schattierungen zwischen grau und rot violett; vorübergehend kommt es an einzelnen Stellen zu einer schwarzen Verfärbung; aber auch

Synkopanfälle kommen vor (vergleiche dazu die Abbildungen auf Tafel V). Auf dem Hautgebilde zeigt sich die Beteiligung der Nerven sehr deutlich. Sensibilität völlig intakt. An den Beinen bestehen kaum irgendwelche Veränderungen, nur ein leichtes Ödem. Die Thyroidea ist etwas geschwellen. Blutdruckmessungen mit dem Gärtnerschen Apparat ergeben an den Flagen sehr niedrige Werte, 29–10 mm Hg.

Bemerkenswert sind hier in ätiologischer Beziehung die schwere Belastung, die Entstehung im Anschluß an ein schweres psychisches Trauma. In symptomatologischer Hinsicht finden wir alle vasomotorischen und trophischen Störungen der schweren Sklerodaktylie in gleichzeitiger, paralleler Entwicklung, mit Beteiligung der Muskeln, Gelenke, Knochen; daneben eine typische schwere Scleroderma diffusa des Gesichts und der ganzen oberen Rumpfhälfte.

Die Ausdehnung der Krankheitsprozesse auf alle Gewebe ist, wie schon betont, für viele dieser Fälle recht bezeichnend; dabei geschieht die Ausbreitung auch hier sicher keineswegs immer in continuo, sondern sprunghaft; so habe ich mehrfach ein frühzeitiges Befallensein der subcutanen Gebilde, z. B. der Palmarfascie, die kaotig verdickt war, in der Art der Dupuytren'schen Fascienkontraktur, gesehen.

In eine dritte Gruppe fasse ich die im ganzen recht seltenen Fälle zusammen, in denen die typischen vasomotorischen Symptome erst nach völliger Ausbildung der Sklerodermae auftreten. Hierher gehört aus der neueren Zeit eine Beobachtung von James. In diesem Fall war durch eine Verletzung, die 20 Jahre zurücklag, der rechte Zeigefinger steif geblieben. Vor drei Jahren entstand eine Härte und Spannung der Haut der Hände, bald breitete sich diese über große Teile des übrigen Körpers aus, war aber immer an den Händen am meisten ausgeprägt. An dem versteiften Finger traten dann Anfälle von Asphyxie locale ein, die später auch die übrigen Finger, Nase und Ohren befielen. Außerdem bestand eine Atrophie der Schilddrüse.

Schließlich blieben uns immerhin noch einige Fälle übrig — auch ihre Zahl ist freilich nicht groß — die bei denselben Individuen sowohl, symmetrische Gangrän als Sklerodermae neben den vasomotorischen Symptomen zeigen, sei es, daß die beiden Arten der trophischen Störungen an denselben, sei es, daß sie an verschiedenen Stellen auftreten. Ich verweise auf den Fall eigener Beobachtung, der durch Figur 9 und die Abbildung auf Tafel VIII illustriert wird.

Bei dieser Einteilung habe ich stillschweigend die Voraussetzung gemacht, daß sich auch immer ein sicherer Unterschied zwischen der Gangrän und den sklerodermatischen Veränderungen statuieren läßt, und daß andere dystrophische Prozesse als diese beiden nicht vorkommen. Beides ist nicht ohne weiteres zutreffend. Schon an der Haut finden sich trophische Störungen, die nicht immer sicher zu klassifizieren sind. Es entstehen, besonders an der Pulpa der Finger, kleine Geschwüre,

die hartnäckig sind, langsam heilen und in eine dichte, sklerotische Narbe ausgehen. Noch schwieriger wird die Beurteilung der trophischen Störungen sein, die die tieferen Teile betreffen. Sicher gibt es da Veränderungen, die weder als gangränöse noch als sklerodermatische anzusprechen sind, und die sowohl bei der Raynaudschen Krankheit wie bei der Sklerodaktylie vorkommen.

Ich habe bereits Fälle von Sklerodermie erwähnt, in denen es zum einfachen Schwund ganzer Phalangen gekommen ist, dasselbe Verhalten haben wir bei Raynaudscher Krankheit kennen gelernt; hier haben wir dann Erscheinungen, die von dem typischen Verhalten früher Krankheiten abweichen und solche Fälle mehrten die Schwierigkeiten der Klassifizierung, die ja schon nicht gering sind, immer noch weiter.

Gehen wir nun auf die Fälle der zweiten Gruppe zunächst näher ein. Da wir in historischer Hinsicht bemerkt, daß wohl der erste, der die Beziehungen zwischen Raynaudscher Krankheit und Sklerodermie ins Auge faßte, Grassot im Jahre 1878 war. Nicht als ob er den ersten derartigen Fall beobachtet hätte, vor ihm haben schon Ball, Coliox, Dufour, Hardy solche Beobachtungen publiziert, ohne jedoch ihre Bedeutung ausreichend zu würdigen; bald nach Grassot berichtete Vidal und Potain über Ähnliches und 1880 machte Favier das Thema zum Gegenstand seiner These: „quelques considérations sur les rapports entre la sclérodémie spontanée et la gangrène symétrique“. Er stellte die bisher erschienenen Fälle zusammen, fügte einige selbst beobachtete hinzu und kam auf Grund dieses Materials zu dem Schluß, daß zwischen Sklerodermie und Raynaudscher Krankheit enge Beziehungen bestehen, daß die Asphyxie locale oft die eine oder die andere Krankheit einleitet, und daß so unter Umständen recht komplexe Krankheitsbilder zustande kommen können. Demgegenüber hatte Grassot behauptet, daß die beiden Affektionen überhaupt nicht zwei getrennte Krankheitsbilder seien. Über diesen Punkt differierten auch später die Ansichten der Forscher; die meisten sind geneigt, sich einer völligen Identifizierung beider Krankheiten zu widersetzen, indem sie sorgfältig die Differenzpunkte zusammenstellen (Hutchinson, Simpson, Castellina und Card). Deutsche Autoren haben sich der Frage auffällig wenig angenommen, in der Monographie Lewin-Hellers wird sie kaum berührt; dagegen hat sich Fuchs mit ihr in einer sehr sorgsam Arbeit eifrig beschäftigt; er stellt die beiden Krankheiten nahe zusammen, ohne sie aber miteinander zu identifizieren.

Wenn wir in dieser Frage zu einem Resultat kommen wollen, dürfen wir uns natürlich nicht auf die Vergleichung der vasomotorischen und trophischen Krankheitserscheinungen beschränken, sondern müssen die Ätiologie, die übrige Symptomatologie, den Verlauf der beiden Krankheiten ebenfalls in Rechnung ziehen.

Castellino und Cardi fanden folgende übereinstimmende und differente Züge.

| Skleroaktylie. | Raynaudsche Krankheit. |
|---|--|
| Symmetrische Affektion der Hände. | Symmetrische Affektion der Hände. |
| Progressiver Verlauf. | Verlauf mit Unterbrechungen. |
| Farbe Anfangs meist lebhaft rot, weniger bläulich. | Anfangs ganz weiß, dann bläulich. |
| Haut kalt, hart, geschwollen, kongestioniert. | Haut kalt, kongestioniert, geschwollen, nicht sehr hart. |
| Keine Störung der Sensibilität, Gefühl intakt. | Anästhesie. |
| Keine Schmerzen oder Parästhesien. | Häufige Schmerzen und Parästhesien. |
| Sehr häufig sklerodermatöse Maske. | Keine sklerodermatöse Maske, wie sie besteht, Überlagerung beider Krank- heiten. |
| Häufiger bei Kindern. | Häufiger bei Erwachsenen. |

Wenn diese Aufstellung auch im großen und ganzen richtig ist, so gibt sie doch im einzelnen zu Ansetzungen, Abänderungen und Ergänzungen Anlaß.

Ätiologisch stimmen beide Affektionen in wesentlichen Zügen überein; doch gilt das, was wir gerade gelegentlich der Besprechung der Ätiologie der Sklerodermie schon hervorgehoben haben, für allerlei besprochenen Krankheitsbilder mehr oder minder, jedenfalls aber in ganz analoger Weise für die anderen Formen der Sklerodermie; es besteht ein geringes Übergewicht von Frauen gegen Männer, eine nervöse Prädisposition fehlt selten, Kälte, Aufregungen, psychische Traumen aller Art kommen oft als auslösende Ursache in Frage, und auch das Alter der befallenen Personen ist, wie ich mit Parrier im Gegensatz zu Castellino und Cardi behaupten möchte, ungefähr das gleiche, indem das Alter der Lebenshöhe am häufigsten betroffen erscheint; jedenfalls ist man nicht berechtigt zu sagen, daß die Raynaudsche Krankheit so viel seltener bei Kindern vorkomme als Sklerodaktylie. Ätiologisch besteht dagegen vielleicht insofern ein gewisser Unterschied, als die Symptome der Sklerodaktylie sich seltener im Anschluß oder im Verlauf von Infektionskrankheiten entwickeln als die der Raynaudschen Krankheit. So scheint z. B. die Malaria, der wir in der Entstehungsgeschichte der Raynaudschen Krankheit einige Bedeutung beilegen mußten, für die Sklerodaktylie irrelevant zu sein. Ebenso spielen hier die akuten Infektionskrankheiten keine Rolle, wie überhaupt das Krankheitsbild der Sklerodermie ärmer an Kombinationen und Komplikationen ist als das der Raynaudschen Krankheit. Symptomatologisch kommen neben den schon erwähnten trophischen und vasomotorischen Symptomen vor allem die sensiblen in Betracht. Hier finden Castellino und Cardi Unterschiede, die am ehesten noch anzuerkennen sind, indem ganz allgemein die sensiblen Symptome

bei der Raynandschen Krankheit mehr in den Vordergrund treten als bei der Sklerodermie. Aber freilich dürfen wir auch hier nicht weiter gehen als bis zur Aufstellung dieser doch recht allgemein gehaltenen Formel. Denn es gibt einerseits Fälle von Sklerodaktylie und auch anderer Arten von Sklerodermie mit zeitweise sehr heftigen Schmerzparoxysmen, wenn auch nur recht selten solche, wo wir dann im übrigen Krankheitsbild keinerlei Beimischung Raynandscher Symptome haben. Und es gibt — und auch dafür habe ich schon Belege erbracht — auch Fälle Raynandscher Krankheit, reine, typische Fälle der Art, ohne Züge von Sklerodermie, bei denen die subjektiven Sensibilitätsstörungen stark in den Hintergrund treten. Die Unterschiede bezüglich der objektiven Sensibilitätsstörungen sind noch geringer, indem die letzteren für gewöhnlich auch bei Raynaud nicht sehr hochgradig sind und nur in den Anfällen von Synkope stärker hervortreten; bei der Sklerodermie spielen sie allerdings wohl eine noch unbedeutendere Rolle.

Recht erheblich waren die sensiblen Reizerscheinungen im folgenden Fall, in dem auch objektive sensible Störungen nicht fehlten.

25jährige Verkäuferin. Das Leiden begann vor zehn Jahren mit Gefühlslosigkeit zuerst im linken vierten Finger, dann breitete sich allmählich auf alle Finger von der linken dann der rechten Hand aus. Allmählich traten die Parästhesien in den Hintergrund, aber ein stumpfes Gefühl blieb, und Pat. betont, daß sie auch jetzt noch über die Stellung ihrer Finger im Finstern nicht sicher orientiert ist. Nach und nach begann die Haut der Finger sich zu verhärtet und später traten Farbenveränderungen auf, indem die Haut bald weiß, bald blau, bald rot wurde. Im vorigen Jahr entwickelte sich aus einer verhornten Stelle am rechten Mittelfinger ein Geschwür, das bis auf den Knochen ging; ein kleines Stückchen Knochen mußte entfernt werden; es bestanden dabei viele Wochen heftigste Schmerzen. Kleine Schnitte und Risse entstanden sich leicht, und brauchen allmählich lange Zeit zur Heilung; sie hat dauernd viel Schmerzen in den Fingernägeln. — Seit einem Vierteljahr haben die Menstr. cessiert.

Färbung der Haut der Finger und der Hand verhorrt, die Fingerringe sind glatt, glänzend, porzellanartig weiß, die proximalen Partien der Finger sind zum größten Teil cyanotisch, unterseits mit hellroten und weißen Flecken. Finger im ersten Interphalangealgelenk in flektierter Stellung fixiert. Haut der Finger mit der Unterlage unverschieblich verwachsen; zum Teil dünn; zum Teil verdickt, zum Teil nachlig verändert. Auch die Unterhautgewebe verhärtet, auch an den Unterarmen mit der Haut verwachsen. An beiden Unterschenkeln sklerodermatische Partien.

An einem der nächsten Tage ist die ganze linke Hand tief cyanotisch, die rechte Hand neigrot, und sicher um einige Grade wärmer als die linke. Nach kurzer Zeit werden die Spitzen der Finger beider Hände intensiv weiß. Die Empfindung für heiß und kalt ist an den Händen abgestumpft.

Langsame Progression im weiteren Verlauf.

Sind demnach selbst auch in bezug auf die sensiblen Symptome die Differenzen zwischen Raynaud und Sklerodaktylie gering, beziehungs-

weise werden sie durch intermediäre Fälle überbrückt, so können einige andere, von Castellino und Cardì aufgestellte Unterscheidungsmerkmale noch viel weniger Geltung beanspruchen, so die bezüglich der vasomotorisch-trophischen Symptome. In vielen Fällen sind die vasomotorischen Symptome, wie schon hervorgehoben wurde, bei der Sklerodermie ganz dieselben wie bei Raynaud; da finden sich typische Anfälle von Asphyxie und Synkope locale (unsere zweite Gruppe); in vielen Fällen, die sonst dem Bilde der Raynandschen Krankheit entsprechen, besteht neben Sklerodaktylie auch Sklerodermie anderer Körperstellen, speziell auch die sklerodermatische Maske, und wenn wir dann von einer Supraposition beider Krankheiten sprechen sollen, d. h. doch wohl von dem Bestehen zweier differenten Krankheiten bei einem Kranken, so entspricht dies bei der Einheitlichkeit des ganzen Krankheitsbildes eben keineswegs den tatsächlichen Verhältnissen.

Erinnern wir uns nur unserer oben mitgeteilten Fälle, wo anamnestisch die paroxysmalen vasomotorischen mit den übrigen Symptomen sich so durcheinanderflechten, daß eine Trennung unmöglich scheint. Ähnliche Fälle sind gar nicht selten, mit der einen oder anderen Modifikation im Verlauf. Am häufigsten ist, wie erwähnt, ein längeres Vorkommen vasomotorischer Erscheinungen mit späterem Übergang in Sklerodermie, so in Chauffards Fall.

35-jährige Frau, hysterisch, leidet auch an Migräne. 26-mal Erysipelas faciei, immer zugleich mit der Regel, zuletzt vor 15 Jahren (Angienotrotisches Ödem?). Rheumatism artic. acut. vor 34 Jahren. November 1881 erster Anfall von lokaler Synkope in den Händen und Füßen. Seitdem immer bei Kälteeinwirkung Synkope und zwar immer an den dreifingrigen Fingern, an den Füßen sind alle Zehen betroffen. Drei Monate später traten an den Händen Anfälle von Clonus auf. In den letzten acht Monaten Abmagerung der Anfälle, niemals Gangrän. Aber der vasomotorischen Phase folgt jetzt eine zweite, durch eine rapide Entwicklung einer Sklerodermie ausgezeichnete, die zuerst in mannigfachen Nagelveränderungen sich äußert. Dann kommt in den letzten zwei Monaten eine typische, sklerodermatische Veränderung der Haut des Gesichts und schließlich eine offenkundige progressive Hemiatrophie der rechten Zungenhälfte (ob auch sklerodermatischer Natur?).

Ähnlich verlief der von Mendel beobachtete Fall:

40-jährige Frau. Vor vier Jahren in der letzten Schwangerschaft erste Krankheitssymptome. Kalt- und Blauwerden der Finger und Zehen und Kaltwerden der Nasenspitze, im Winter exzessiv. Vor einem Jahr verschwanden die Erscheinungen des Blauwerdens, es traten Panaritien an verschiedenen Fingern auf, und Empfindungslosigkeit an den Nagelgliedern. Gleichzeitig kam es zu einer allgemeinen Verfärbung der Haut, diese wurde dick, unelastisch, schmerzhaft. Status praesens: Nase klein, Mund eng, Haut im Gesicht zwar, unverkürzbar. Dunkle, braunartige Hautverfärbung; auch an der Zunge sklerotische Stellen. Ferner Sklerodermie an Vorderarmen und Händen. Sensibilität überall intact.

Die hier beschriebenen Panaritien kommen, wie wir sahen, sowohl bei Raynandscher Krankheit, wie bei Sklerodermie, wie bei den Zwischenformen vor. Ein dem Mendelschen ähnlicher, recht komplizierter

Fall, der auch durch Panaritien ausgezeichnet ist, ist auch der zweite von Castellini und Cardi mitgeteilt.

Es kommen außerdem Krankheitsbilder vor, in denen die Symptome von Raynaudscher Krankheit und Sklerodermie sich in anderer Kombination durcheinander gemischt sind; so beschreibt Pospelow einen Fall, wo erst Asphyxie locale bestand, dann sich Sklerodermie entwickelte, schließlich aber interkurrent auch Anfälle von symmetrischer Gangrän vorkamen, Raymond einen Fall, wo an den Händen Raynaudsche Symptome und Sklerodermie, an den Füßen nur die ersteren bestanden, was auch sonst noch öfter beobachtet wurde, Hutchinson einen solchen, wo anfangs Akrosphyxie an beiden Füßen bestand, später Gangrän einiger Finger eintrat und nach fünf Jahren sich eine Sklerodermie entwickelte; White bringt eine Beobachtung, wo neben zahlreichen sklerodermatischen Stellen im Gesicht, an den Vorderarmen und auch noch an zahlreichen anderen Körperstellen sehr häufig Anfälle von Synkope locale eintraten, Rolleston und Pearson sahen neben diffuser Sklerodermie Raynaudsche Symptome, ebenso beschreibt Rendu Anfälle von Asphyxie locale bei allgemeiner Sklerodermie. Bei Bruns dehnen sich die vasomotorischen Störungen weit über das Gebiet der sklerodermatischen Veränderungen aus. Interessant ist die von Maere beobachtete Asphyxie der Zunge. Es handelte sich da um einen 30-jährigen Mann, der im Alter von 11 Jahren zuerst an Kälte und Cyanose der Hände litt, danach zahlreiche, sehr schmerzhaft eiterungen um die Nägel fast aller Finger herum bekam. Die Nägel wurden deformiert, die letzte Phalanx verkleinerte sich, die Haut wurde fest, taubend und verwachs mit dem Knochen. Die Füße waren kalt und cyanotisch, aber nicht sklerodermatisch. Im Gesicht sklerodermatische Maske, die linke Gesichtshälfte ist etwas stärker als die rechte, auch die Zunge zeigt einen leichten Grad von Hemiatrophie und wird anfallsweise steif und cyanotisch.

Die Zahl der hierhergehörigen Fälle ließe sich noch viel weiter vermehren, ich glaube aber, daß die von mir oben etwas ausführlicher mitgeteilten Beispiele aus dem eigenen Erfahrungskreise die hier vorkommenden Typen ausreichend illustrieren und gebe nur am Ende des Abschnittes noch eine Zusammenstellung der betreffenden Literatur. Das Gesagte genügt, um uns die Überzeugung zu verschaffen, daß eine Abgrenzung beider Krankheitsformen in vielen Fällen nicht möglich ist, zumal auch, wie wir noch hinzufügen wollen, der Verlauf uns nicht immer diagnostische Kriterien liefert.

Im allgemeinen ist ja der Beginn bei der Sklerodaktylie ein mehr allmählicher, während ein wesentliches Charakteristikum der Raynaudschen Krankheit gerade das akute Einsetzen und der paroxysmale Verlauf darstellt, aber in den späteren Stadien der Krankheit vermischt

sich auch bei Raynaud'scher Krankheit oft das Auftreten in Anfällen, um einem mehr chronisch-progressiven oder stationären Verhalten Platz zu machen, und ferner finden wir andererseits die chronische Progression bei der Sklerodermie nur in bezug auf die trophischen Symptome ausgesprochen, während die vasomotorischen ganz wie bei Raynaud'scher Krankheit anfallsweise auftreten können und oft genug auch auftreten. So vermischt sich auch dieser Unterschied für viele Fälle so sehr, daß wir auf ihn eine Unterscheidung nicht stützen können, wenn wir dabei auch ganz von den Fällen absehen, wo neben den akuten trophischen Störungen (symmetrische Gangrän) die chronischen sich entwickeln.

Über die pathologische Anatomie wissen wir bei beiden Krankheiten so wenig Sicheres, daß wir von vornherein darauf verzichten werden, auf sie den Versuch einer Unterscheidung zu begründen. In der Literatur finden wir jedoch trotz alledem einen solchen Versuch bei Castellino und Cardi, indem diese Autoren als Grundlage der Raynaud'schen Krankheit einen endarteriitischen Prozeß in den kleinen Gefäßen der Nerven (s. o.), als solche der Sklerodermie einen gleichartigen in denen der Haut annehmen. Ich habe mich schon oben zu der Ansicht bekannt, daß für die Raynaud'sche Krankheit diese Veränderungen nur von sekundärer Bedeutung sein können, ich glaube, was ich später auseinandersetzen werde, auch für die Sklerodermie etwas Ähnliches annehmen zu sollen, und den Gefäßveränderungen auch hier keine primäre Bedeutung zuschreiben zu dürfen.

Ich kam das hier noch nicht in extenso erörtern, und führe diese Dinge nur an, um zu zeigen, daß uns bei der Abgrenzung der Sklerodermie von Raynaud'scher Krankheit auch die pathologische Anatomie im Stich läßt. Alle unsere Überlegungen führen uns also dahin, daß es Fälle gibt, in denen eine sichere Diagnose, ob Raynaud'sche Krankheit oder Sklerodermie vorliegt, sich nicht stellen läßt. Aber vielleicht lautet die Diagnose in diesen Fällen Raynaud'sche Krankheit plus Sklerodermie. Auch diese Ansicht glaube ich zurückweisen zu sollen; dagegen spricht die klinische Erfahrung. Ich habe schon mehrmals darauf aufmerksam gemacht, daß die Symptome beider Krankheiten sich in so wechselvoller Kombination und in so engem Zusammenhang vorfinden, daß eine Zerlegung des offenbar einheitlichen Krankheitsbildes nur eine gekünstelte sein könnte. Es bleibt demnach keine andere Annahme, als daß es ein Krankheitsbild gibt, das seine Symptome teils der Sklerodermie, teils der Raynaud'schen Krankheit entnimmt. Aber dies Resultat dürfen wir nun nicht etwa in dem Sinn auffassen, daß es drei verschiedene Arten von Krankheiten gibt, Sklerodermie, Raynaud'sche Krankheit und die zwischen

beiden liegende Krankheitsform; auch dagegen spricht mit aller Entschiedenheit die klinische Erfahrung, die uns lehrt, daß alle drei Krankheitsformen durch zahllose Zwischenglieder ganz unmerklich ineinander übergehen. Es fällt gewiß von vornherein schwer, zwischen zwei äußerlich so verschiedenen Krankheitsbildern wie es z. B. eine Sklerodermie en bandes oder en plaques ist, wo sich ohne erhebliche vasomotorische und sensible Erscheinungen ganz allmählich eine Sklerosierung bestimmter Gebiete der Haut usw. entwickelt, und einem typischen Fall Raynaudscher Krankheit, wo stürmisch unter schweren vasomotorischen und sensiblen Erscheinungen eine umschriebene Nekrose eintritt, einen nahen Zusammenhang anzunehmen. Aber ich sehe keinen Ausweg aus der Zwangslage, in die uns hier die Übergangsformen versetzen; wo sollen wir haltmachen und sagen, hier beginnt die Raynaudsche Krankheit, hier hört die Sklerodermie auf; zumal wir ja auch schon zu der Überzeugung gelangt sind, daß die verschiedenen Formen der Sklerodermie nichts fundamental Verschiedenes darstellen. Ich glaube, daß unsere Anschauungen über die Pathogenese der Sklerodermie aus diese Schwierigkeit etwas erleichtert werden, indem wir sehen werden, daß bei gleichem innerlichem Wesen die Ausdehnung und der Verbreitungsmodus des supponierten krankhaften Prozesses aus diese Differenzen eher begreifen läßt; und das um so mehr, als wir ja schon wiederholt sahen, daß intime Verbindungen zwischen allen den Krankheitsbildern bestehen, die wir hier behandeln, so daß die durch die Nomenklatur gezogenen Grenzen immer wieder als einigermaßen willkürliche erscheinen müssen.

Wir haben ja bereits gesehen, daß im Verlauf der Sklerodermie auch erythromelalgische Symptome vorkommen. Eine Kombination aller drei Symptomgruppen ist ebenfalls beschrieben worden, so in dem Fall von Brens, und ferner in einem von Savill, in dem neben Anfällen von Asphyxie lokale und einer teils fleckweisen, teils diffusen Sklerodermie an Händen und Füßen sowohl eine Gangrän einer Zehe unter sehr heftigen Schmerzen eintrat, als auch anfallsweise von Schmerzen begleitete Kongestionen in den Händen zu beobachten waren. Savill berichtet über das Auftreten eines Falles typischer Sklerodaktylie in einer Familie, wo blächtige Ödeme häufig waren, und die Patientin selbst an solchen Anschwellungen litt. Das bedeutet ein Übergreifen auf noch etwas weiter entfernt liegende Krankheitsgebiete, aber gewiß keine zufällige Koinzidenz. Ich habe Fälle gesehen, wo dieselben Patienten die früher an ausgesprochenen Akroparästhesien gelitten hatten, in späterer Zeit an typischer Sklerodermie resp. Hemiatrophia faciei erkrankten. Ohne Zweifel wollen und können wir gewisse Unterabteilungen in diesem Riesengebiet nicht entbehren. Für die Erörterung pathogenetischer Fragen aber dürfen wir die Erkenntnis dieser mannigfachen und zum Teil recht engen klinischen Zusammen-

hänge und Übergänge unter keiner Bedingung aus dem Auge lassen. Irgendeine Gemeinsamkeit des pathologischen Geschehens muß zwischen Raynaud'scher Krankheit und Sklerodermie vorhanden sein, das ist namentlich von dermatologischer Seite oft übersehen worden. Ich komme auf diesen Punkt noch zurück. Ich habe ohnedies die Grenzen dieses der Symptomatologie gewidmeten Kapitels schon allzusehr überschritten; doch wollte ich gerade bei der Sklerodaktylie, die symptomatologisch die engsten Beziehungen zur Raynaud'schen Krankheit bietet, diese für uns wichtige Frage etwas im Zusammenhang behandeln.

Ich will am Schluß dieses dem Zusammenhang zwischen Sklerodermie und Raynaud'scher Krankheit gewidmeten Abschnittes nur noch die Namen derjenigen Autoren anführen, die symptomatologisch etwa in der Mitte zwischen den beiden Affektionen stehende Fälle beschrieben haben. Ich zitiere hier nicht die Fälle, die durch das Überwiegen der einen oder anderen Symptomengruppe ihre Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Krankheitsbild mit einiger Sicherheit dokumentierten. Es sind das Boenier, Bernhardt, Blumenthal, du Bois-Havenith, Chaffard, Colucci, Herillon, Fuchs, Favier, Finlaysan, Grasset, Grasset et Appolinario, Grancher, Eichhoff, Griffith, Hutchinson, James, Jeansolme, Little, Maere, Mendel, Osler, Ohier, Parkinson, Pringle, Potain, Pospelov, Raymond, Rau, Sésheyron, Senator, Vidal, Vidal et Blachez, Vespa, White, Westphal, Zambaco, Ewart, Guth and Rosenfeld, Hoffmann, Harbinson, Hahn, Rille, Sackur, Sachs, Stanitschew, Lesser, Gaucher et Fleurin, Nicolas et Favier, Rolleston and Pearson, Goebel, Cohn, Odda et Chaesy, Zingerle, Harrison, Lücke.

Die Abgrenzung dieser Fälle von den sehr nahe stehenden anderen mit stärkerer Betonung der Raynaud'schen oder der sklerodermatischen Symptome ist natürlich mehr oder weniger willkürlich. Schon die Zahl der angeführten Namen zeigt, besonders wenn wir berücksichtigen, daß ein Autor oft mehrere Fälle beschrieb, daß es sich nicht um ein seltenes und außergewöhnliches Vorkommnis handelt. Auch meine eigene Erfahrung zeigt die relative Häufigkeit dieser Fälle. Ich habe in den letzten zehn Jahren mehr als ein Dutzend höherzählender Beobachtungen machen können.

Verlauf.

Man hat häufig versucht, die Sklerodermie in ihren Verlauf in Stadien einzuteilen und hat danach unterschieden: ein Stadium nervosum, das auch als Prodromalstadium bezeichnet wurde, ein Stadium oedematosum und ein Stadium indurativum et atrophicum (Vidal et Blachez, Leroy zitiert nach Herx-

heimer); andere haben die Stadien etwas anders abgegrenzt, indem sie auf die Prodrome das Ödem, dann die Induration, dann die Atrophie folgen ließen (Lewin-Heller u. a.). Man nahm für die letzteren Stadien also die Beschaffenheit der Haut als maßgebend an und rechnete zu den Prodromen resp. zu dem ersten Stadium die Zeit, in der noch keine trophischen, sondern nur vasomotorische und sensible Symptome vorhanden waren. Im ganzen ist die Einteilung in Stadien schon um dessentwillen nicht sehr wertvoll, weil an den verschiedenen Stellen des Körpers die Hautveränderungen sehr verschieden weit vorgeschritten zu sein pflegen. Wenn man als Prodromalstadium die Zeit rechnet, wo noch keine sklerodermatische Veränderung vorhanden ist, so kann es sich auf Jahrzehnte hinaus erstrecken; das sind gerade die Fälle, von denen eben die Rede war, wo Jahre lang vasomotorische Erscheinungen vorauszogen, mit und ohne sensible Symptome, wie Kriecheln, Schmerzen usw.; in einem Fall von Berillon et Zambaco bestanden sie 15 Jahre vor Eintritt der Sklerodermie. Auch rein sensible Erscheinungen wurden in diesem Stadium öfters beobachtet, Lewin-Heller fanden sie 23 mal angegeben. Ein Teil der dem Prodromalstadium zugeschriebenen nervösen Symptome gehört aber nicht der Sklerodermie als solcher an, sondern ist durch die allgemeine neuropathische Verfassung des von der Sklerodermie befallenen Individuums bedingt. Endlich wurden auch Störungen des Allgemeinbefindens, leichte Fieberbewegungen (nach Lewin-Heller höchstens 1% der Fälle s. u.), Abmagerung, Mattigkeit, Schwächegefühl usw. notiert. Die sog. Prodromalerscheinungen können aber auch ganz fehlen.

Die weitere Einteilung in ein Stadium oedematosum, elevatum und atrophicum berücksichtigt nur die lokalen, trophischen Erscheinungen und scheint, wie schon gesagt, daran, daß diese an den verschiedenen Körperstellen meist verschieden weit entwickelt sind.

Wir können weiter zwischen akuten und chronischen Fällen unterscheiden, indem wir uns natürlich dabei dessen bewußt bleiben, daß es auch hier zahlreiche Übergänge gibt. In der Mehrzahl der Fälle ist jedenfalls die Sklerodermie eine chronische Affektion, die Jahre und Jahrzehnte lang sich hinzieht. Lewin-Heller haben über die Dauer der Erkrankung ein bestimmtes Zahlenmaterial zu gewinnen gesucht. Sie haben 10 Fälle gefunden, in denen die Krankheit über 15 Jahre lang gedauert hat, darunter je einen mit einer Dauer von 48 Jahren (Haslund), von 31 Jahren (Straßmann) und zwei von 30 Jahren (Santvoord und Froriep). Brissaud beschrieb einen Fall, der zur Zeit der Publikation über zwei Dezennien dauerte, Raymond et Alquier teilen einen Fall mit, bei dem der Patient mit 21 Jahren erkrankte und nach 37jähriger Krankheitsdauer starb. Ledermann einen mit 30jähriger, Han einen mit 14jähriger, Schubiger mit 15jähriger Dauer. Senator hat eine Kranke beobachtet, die im 11.

Lebensjahr erkrankte und mit 37 Jahren starb. Lewin-Heller bemerkt, daß unter ihren 10 Fällen mit über 15 Jahre langem Bestehen kein solcher von Sklerodermie zu bandes war, vielmal handelte es sich um eine Sklerodaktylie, sechsmal um diffuse andersartige Sklerodermie; doch wird man auf diesen Unterschied wohl nicht viel gehen dürfen, weil eben oft bei langer Dauer der Affektion aus einer Sklerodermie ein *plagues* eine diffuse wird. Wenn in diesen chronischen Fällen im allgemeinen der Typus der Krankheit auch ein progressiver ist, so ist damit nicht gesagt, daß diese Progression eine durchaus stetige ist. Es können sich lange Pausen von Stillstand des Prozesses einschließen, es können, während an anderen Stellen der Prozeß fortschreitet, hier und da Rückgänge eintreten. Heller sah einen Fall, den Senator 1884 beschrieben hatte, 10 Jahre später und fand eine Rückkehr der typisch sklerosierten Haut bis fast zur Norm. Derartige ist oft beobachtet worden (Schwimmer, Crocker, Kapoxi, Schuhtiger). Es kann, wie solche Fälle lehren, eine Besserung auch dann noch kommen, wenn schon das dritte Stadium, das der Induration eingetreten ist; ja in einem Fall Auberts trat sogar eine völlige Heilung noch nach mehrjähriger Dauer ein. Freilich ist das nicht die Regel; vielmehr ist eine Besserung am ehesten bei akutem Verlauf und dann zu erwarten, wenn die lokale Affektion das Stadium oedematous noch nicht überschritten hat. Es sind auch andere Symptome noch besserungs- und rückbildungsfähig. Dinkler beobachtete ein Nachwachsen von Haaren an den alterierten Stellen, Colliez sah nach Schwund der übermäßigen Pigmentation wieder normale Hautfärbung eintreten, Lewin sah in vier Wochen die Haut eines Kranken sich völlig aufhellen, Aubert sah Wiedereintritt der geschwundenen Schweißsekretion. Bisweilen findet bei der Rückkehr der vorher sklerosierten Haut zur Norm eine abnorme Pigmentablagerung an dieser statt. Für die manchmal auftretenden akuten Verschlimmerungen hat man mancherlei Umstände verantwortlich gemacht: Traumen (Dinkler), Erschöpfung nach Krankheiten (Dinkler, Colliez). Viele Kranke beschuldigen selbst schlechte Witterung, kaltes und nasses Wetter.

Den chronischen Fällen stehen die mit akutem Verlauf gegenüber. Nach Angaben von Herxheimer soll der Verlauf bisweilen ein direkt hyperakuter sein können, indem in wenigen Tagen bei Neugeborenen eine universelle Sklerodermie sich herausgebildet haben soll. Das sind aber sicher extreme Seltenheiten, auch bei akuten Fällen dauert es doch meist Wochen und Monate, ehe das vollständige Krankheitsbild vorliegt. Einen Fall mit sehr raschem (günstigem) Verlauf schildert March.

Zwei Jahre altes Kind. 31. Oktober Diphtherie, danach ganz gesund, bis nach einer Woche eine Lähmung der Beine auftrat, die nach zehn Tagen verschwand. Eine Woche später, am 1. Dezember 1894 begann die Entwicklung der Skle-

dermie, indem die Haut an den Händen und im Gesicht kalt und steif wurde; unter Zunahme dieser Veränderungen wurden auch Nacken, Schalter, Rücken, Kopfhaut befallen, bis innerhalb zweier Wochen die Krankheit ihren Höhepunkt erreicht hat. Allgemeinzustand normal, geringe Reizbarkeit des Kindes. Keine Pigmentation, die Haut an den betroffenen Stellen ist fest, unverschiebbar und kalt, am wenigsten affigiert sind die unteren Extremitäten. Anhidrosis. Behandlung mit Thyroidealextrakt, nach sechs Wochen ist eine sehr erhebliche Besserung erzielt.

Akute Fälle wurden unter den neueren Autoren auch von Sternthal, Schulz und Ebstein beschrieben. Bei dem 8jährigen Knaben, den Ebstein beobachtete, hatte die Sklerodermie ganz plötzlich begonnen, als das Kind an einem leuchten Nachmittage auf einer Wiese geschlafen hatte; im Anschluß daran entwickelte sich ein rasch vorübergehender tieferhafter Allgemeinzustand, an den sich die Ausbildung der Sklerodermie unmittelbar anschloß; und zwar handelte es sich um eine in eigenartigen Streifen den rechten Arm befallende Veränderung. In einem von Gauscher, Gaston et Chiray mitgetheilten Falle entwickelte sich im Verlauf von drei Monaten eine diffuse Sklerodermie in den oberen Partien des Rumpfes, den Armen, Ober- und Unterschenkeln, während Hände und Füße frei blieben.

Die akuten Fälle scheinen am ehesten bei Kindern vorzukommen, wie auch Marsch's Fall ein junges Kind betraf. Mehr will aber bei einem 21jährigen Mädchen eine in drei Tagen vom Gesicht bis zur Taille sich ausdehnende diffuse Sklerodermie gesehen haben.

Eine sichere Unterscheidung der Fälle mit akutem Verlauf von denen mit chronischem ist aber deswegen nicht durchzuführen, weil die Affektion oft ihren Charakter in der Art ändert, daß auf ein akutes Anfangsstadium eine chronischere Entwicklung folgt. Kaposi gibt sogar an, daß der Beginn verhältnismäßig oft ein akuter zu sein pflegt. Es kann aber auch umgekehrt sein. Im Anfang entwickeln sich dann die Symptome langsam und mit großen, zeitlichen Intermissionen, und dann folgt eine raschere Progression. So können Jahre leidlichen Wohlbefindens und geringer Krankheitsfortschritte ziemlich plötzlich von einem akuten Schub der Symptome abgelöst werden.

Prognose.

Es können bei allen Arten von Sklerodermie Besserungen und Heilungen vorkommen. Am wenigsten scheint, wie von vielen Seiten betont wird, die Sklerodaktylie eine Tendenz zum Rückgang anzuweisen (Potain, Schubiger, Vidal, Brissaud). Aber Lewin-Heller zitieren doch einige Fälle, in denen auch die Sklerodaktylie einer Rückbildung teilhaftig wurde (Möller, Hillaviel, Aubert, Lamarche, Fuchs). Die Zahl der Heilungen geben Lewin-Heller im ganzen auf 16%, Herxheimer nur auf 8% an; in keinem der von mir selbst beobachteten Fälle, die allerdings z. T. nicht sehr lange in

Behandlung standen, konnte ich eine Heilung und auch nur selten eine erhebliche Besserung konstatieren. Am weitesten ging diese in einem Falle, in dem die Muskeln am stärksten affiziert gewesen waren; auch in einem recht schweren Fall von Sklerodaktylie wurde doch eine erhebliche Besserung erzielt. Die Heilung tritt am ehesten dann ein, wenn der Fall zu den akuten zu zählen ist, und weiterhin ist noch bemerkenswert, daß im allgemeinen die Prognose bei Kindern eine etwas bessere ist, indem die Zahl der Heilungen hier auf 30% steigt; beide Tatsachen stimmen insofern überein, als die Zahl der akuten Fälle bei Kindern größer zu sein pflegt. Nach Luithlen kann man für die Sklerodermie im Säuglingsalter auf vollständige Ausheilung rechnen, da alle bisher bekannt gewordenen Fälle nach einigen Monaten mit vollständiger Genesung endigten. Auch über die Schnelligkeit der Heilung liegen einige Angaben vor. Daß sie sehr rasch erfolgen kann, erweist der oben zitierte Fall von Marsh, sowie einige andere (Barth, Wolff); meist dauert es aber einige Monate (Mosler, Carstens, Dickinson); noch längere, über ein Jahr sich erstreckende Dauer ist wieder sehr selten (siehe den oben zitierten Fall Auberts).

Viel häufiger als Heilung wurde mehr oder minder weitgehende Besserung berichtet; Lowin-Heller rechnet etwa 30% erheblicherer Besserung heraus.

Durch die Sklerodermie allein wird wohl nur selten der Exitus letalis herbeigeführt. Immerhin scheint ein solcher Ausgang doch recht wohl denkbar, wenn wir uns erinnern, daß schwere Fälle von Sklerodermie von einer sehr erheblichen Kachexie begleitet zu sein pflegen, und daß andererseits der sklerotische Prozeß vielleicht auch auf lebenswichtige Organe (Gefäße, Herz, Lunge, Nieren usw.) übergreift und so zur unmittelbaren Todesursache werden kann. Osler macht die Angabe, daß bei Sklerodermie öfters ein plötzlicher Tod vorkommt; vielleicht hängt dies mit Veränderungen am Herzmuskel zusammen (Luithlen). Einige Male war es die besondere Lokalisation des Prozesses in der Haut, die den unglücklichen Ausgang herbeiführen half, so wenn die Nahrungsaufnahme durch die Unmöglichkeit, den Kiefer zu öffnen, eine ungenügende wurde (Fagge). Ein weiteres beachtenswertes Symptom ist die Behinderung der Atmung durch die Verwundlung des Thorax in einen festen Panzer, die besonders dann bedenklich werden kann, wenn eine bestehende Lungenkomplikation eine ergiebige Expektoration erfordert. Oft aber tritt der Exitus ein, ohne daß die Sklerodermie selbst als Ursache anzusprechen wäre, wenn auch ihr Vorhandensein, falls es sich um eine einigermaßen ausgebildete Form handelt, die Prognose der interkurrenten Krankheit zu trüben geeignet erscheint. In einem meiner Fälle von Sklerodermie und spinaler Muskeldystrophie mit Beteiligung der bulbären Kerne war der Exitus durch eine Bronchitis diffusa bedingt, die ihrerseits durch die bulbäre

Lähmung hervorzurufen war. Die Sklerodermie war nicht sehr ausgedehnt, und ich kann nicht sagen, daß ihr ein wesentlicher Anteil an dem unglücklichen Ausgang zuzuschreiben gewesen wäre. Die circumscripten Formen der Sklerodermie, Sklerodermie en bandes und en plaques können als solche niemals Todesursache werden.

Die Bedeutung der Sklerodermie für den Kranken ist je nach Lokalisation, Ausbreitung, Progression sehr verschieden. Die Sklerodermie en plaques oder en bandes, die sich auf nicht übermäßig zahlreiche und große Hautgebiete erstreckt, ist ein verhältnismäßig gleichgültiges und leicht zu ertragendes Leiden. Aber eine ausgebreitete, diffuse, progrediente Sklerodermie kann durch die tausend Unbequemlichkeiten, die sie mit sich führt, durch die Veränderung des Aussehens, die Unbeweglichkeit, die häufigen geschwürigen Prozesse, die Behinderung der Nahrungsaufnahme und vieles andere das Leben dem Kranken zur Qual machen. „In its more aggravated forms diffuse sclerodermia is one of the most terrible of all human ills“ sagt Osler mit Recht.

Pathologische Anatomie.

Die Zahl der Beobachtungen von Sklerodermie, in denen die Sektion gemacht werden konnte, betrug zur Zeit der Lewin-Hellerschen Publikation bereits 28; früher ist noch eine ganze Reihe weiterer derartiger Beobachtungen hinzugekommen, und da für die pathologische Anatomie der Hauterkrankung auch Untersuchungen, die an Haut, die Lebenden exstirpiert wurde, vorgenommen wurden, vorliegen, so verfügen wir über ein ziemlich reichliches Material in bezug auf die pathologische Anatomie der Sklerodermie.

Trotzdem freilich ist diese nichts weniger als klar. Allerdings sind wir über die Veränderungen der Haut sowohl als der tieferen Organe, die wir als lokale Veränderungen bezeichnen können, genügend orientiert, aber die weitere wichtige Frage, ob damit die pathologische Anatomie der Sklerodermie erschöpft ist, ist noch keineswegs erledigt und wird noch ganz verschieden beantwortet, mit anderen Worten: wir wissen bisher nicht mit Sicherheit, ob die lokalen Veränderungen primäre sind, oder ob sie in Abhängigkeit von pathologischen Veränderungen übergeordneter Organe, speziell des Nervensystems stehen.

Ich bespreche zuerst die Veränderungen der Haut. Ich will mich da möglichst kurz fassen; diese Verhältnisse interessieren im allgemeinen den Dermatologen mehr und sind, wenigstens in allen ihren Einzelheiten, für unser Thema nicht so wichtig, zudem ist letzter Zeit oft und erschöpfend zusammengestellt worden. (Lewin-Heller, Walters, Dinkler, v. Netthafft, Krystalowicz, Alquier et Touchard, Raymond et Alquier, Weber, Luthlen).

Das Stratum corneum der Haut ist in vielen Fällen normal (Lewin-Heller, Dinkler, Dreyzel und Oppler, Kraecht, Darier et Gaston); seine Zellen nehmen den Farbstoff diffus auf (Lewin-Heller, v. Notthafft). Mangelhafte Verhornung, die sich durch die Färhbarkeit der Kerne einzelner Zellen der Hornschicht kenntlich macht, haben Lewin-Heller nicht beobachtet, dagegen beschreibt v. Notthafft ausdrücklich ein solches Vorkommnis. Die lamellöse Abhebung der Zellen, die Wolters, Otto und Schadowaldt beschreiben, halten Lewin-Heller, die sie auch sahen, für durch die Präparation bedingtes Kunstprodukt. Mehrfach wurde eine Verdünnung des Stratum corneum gesehen, so von Dinkler, Carstens, Förster, Wolters, Hektoën, Wadstein, v. Notthafft; letzterer fand es sehr dünn, aus vier, meist nur aus zwei bis drei Zellagen bestehend. Der Eiweißgehalt ist auch bei hochgradiger Atrophie normal (Dreyzel und Oppel). Viel seltener scheint eine Verdickung zu sein, über die Unna bei seiner kartentblattähnlichen Sklerodermie, ferner auch Darier et Gaston, Neumann, Fagge, Roßbach berichten.

Das Stratum granulosum und mucosum scheint meist auch nicht wesentlich alteriert zu sein. Lewin-Heller fanden beide normal; das von Dinkler (auch von Wolters) beschriebene Phänomen, daß die Fortsätze der Stachelzellen weniger scharf kontouriert sind, führen sie auf Präparationsfehler zurück; sie selbst sahen sie völlig normal; ebenso v. Notthafft; diese Autoren fanden auch die basale Schicht des Stratum mucosum, in der Wolters auffällig große, leicht granulirte Zellen gefunden hatte, normal. Im Protoplasma der Zellen lag oft Pigment und zwar am dichtesten um die Kerne herum; dasselbe gibt keine Eisenreaktion, kann mit Osmium ganz schwarz gefärbt sein. Die Zapfen des Rete Malpighi sind oft flacher als normal, entsprechend der Abflachung der Papillen. Das Gewebe der Papillen ist entweder locker wie in der Norm, oder nimmt am sklerotischen Prozesse teil. Hektoën und Leredde et Thomas fanden eine Verdünnung des Stratum mucosum; Darier et Gaston fanden auch diesen Teil der Epidermis von unveränderter Beschaffenheit.

Die Hauptveränderungen betreffen das Corium. Wie oben erwähnt, sind ganz allgemein die Papillen, deren Zahl normal ist, stark abgeflacht. Bei Leredde et Thomas waren sie fast völlig verschwunden, die erhaltenen enthielten keine Gefäße mehr. Durch diese Abflachung ist das Rete von einer flach wellenförmigen Linie begrenzt. „Das Corium besteht aus breiten, eigentümlich homogen erscheinenden, fest verflochten Zügen, deren einzelne Fibrillen nicht mehr differenzierbar sind. Die Zellen des Bindegewebes sind verkleinert; meist ist keine Spur von Protoplasma mehr sichtbar. Auch ihre Zahl ist verringert; an manchen Stellen jedoch sieht man ganze Nester von Zellen angesammelt Der Rückgang der spindelförmigen Bindegewebszellen ist nur ein scheinbarer,

Die Zellen werden durch Zunahme der kollagenen Substanz aneinander gedrängt." Diese Schilderung Lewin-Hellers entspricht der Mehrzahl der Angaben der anderen Autoren. Das hyaline Aussehen der breiten Bindegewebsbalken wird mehrfach hervorgehoben, v. Notthafft bestreitet allerdings, daß es durch Aufnahme einer albuminoiden, gerinnungsfähigen Substanz zustande komme, wie Lewin-Heller wollen. Leredde et Thomas fanden keine Verdickung der einzelnen Bindegewebsbündel, trotz einer allgemeinen Zunahme des Bindegewebes; in einem solchen Fall besteht also doch eine wirkliche Vermehrung des Bindegewebes, die Lewin-Heller bezweifelten. Auch Darier et Gaston sprechen von einer einfachen bindegewebigen Hyperplasie in der Cutis und Subcutis. Auch daß die Verminderung der Bindegewebszellen immer nur eine scheinbare ist, erscheint zweifelhaft; mehrfach bestätigt ist dagegen das Vorkommen von Zellaufhäufungen, insbesondere um die Gefäße herum, oder um die Drüsen, aber wie v. Notthafft betont, doch ohne Beziehung zu den Gefäßen.

Sehr strittig ist das Verhalten der elastischen Fasern; die einen plädieren für Vermehrung, andere für Verminderung, wieder andere für normales Verhalten. Wahrscheinlich kommt alles vor. Lewin-Heller geben nur an, daß ihre Zahl scheinbar vermehrt oder vermindert ist, je nachdem sie durch das Bindegewebe aneinander- oder zusammengedrängt werden; mit Entschiedenheit sprechen sie sich jedenfalls gegen eine Vermehrung dieser Fasern aus, auch Dinkler, du Mesnil, Otto sahen diese nicht, eher eine Verminderung, ebenso Wadstein, während Cræcker, Spieler, Chiari, Wolters eine solche feststellten. Auch von Notthafft sah sie überall in vermehrter Zahl, zum Teil allerdings herab auf einer Volumenvergrößerung der einzelnen Fasern, und v. Notthafft gibt auch an, daß man manchmal im Unklaren sei, ob die Vermehrung nicht doch nur eine scheinbare, durch Hautatrophie bedingte sei, was auch Wolters schon in Betracht gezogen hat. Auch Ehrenberg kommt bei der Untersuchung eines aus dem Labium majus exstirpierten Stückchen zu keinem sicheren Resultat. Auch der Verlauf der Fasern soll unregelmäßiger geworden sein; sie sollen oft mehr gestreckt verlaufen. Hektoen schildert Bruch und Untergang der elastischen Fasern. Vom Corium aus setzen sich die Bindegewebsveränderungen auch in das Unterhautzellgewebe fort, indem durch die Zunahme des Bindegewebes die subcutane Fettschicht in ihrer Ausdehnung erheblich beeinträchtigt wird. Das Stratum subcutaneum ist so meist im ganzen verschmälert und durch Eindringen der Bindegewebszüge in die tiefer liegenden Teile kommt es zu einer festen, unverschiebbaren Verbindung dieser mit der Haut.

Das Pigment ist im Corium nach den meisten Angaben vermehrt. Darier et Gaston fanden das in ihrem Fall nicht, Neumann konstatierte eine große Variabilität, was ja durchaus den klinischen Ver-

hältnissen entspricht. Es fand sich, wie schon erwähnt, in der Basalschicht des Stratum mucosum, außerdem in den Papillen (v. Nottkafft) und am meisten subpapillär, in Form kleinster Körnchen oder größerer Schollen; einmal sahen Lewin-Heller es in parallelen Linien (wahrscheinlich innerhalb feinsten Saftspalten). Unna fand auf der Grenze zwischen einem älteren Morphoeaknoten und seiner Umgebung in den Lymphspalten des Papillarkörpers und auch der basalen Stachelzellenschichte besonders reichlich Pigment. Charvot et Carle haben genaue anatomische Untersuchungen in zwei Fällen von Sklerodermie mit Melanodermie angestellt.

Ein sehr großes Interesse haben die Veränderungen in und an den Gefäßen, wegen der Rolle, die man ihnen für das Zustandekommen des Processes zugeschrieben hat. Rasmussen und Neumann haben sie (nach Lewin-Heller) zuerst beschrieben, weitere genaue Schilderungen verdanken wir Dinkler, Wolters, Hoffa, Leredde et Thomas, v. Nottkafft, Alquier et Touchard, Krystalowicz, Raymond et Alquier, Scholtz und Döbel, Weber u. a. Die Veränderungen erstrecken sich auf alle drei Häute; Hoffa bezeichnet sie als Peri-, Mes- und Endarteritis. Schon in der nächsten Umgebung der Gefäße pflegen die Veränderungen des Gewebes besonders stark akzentuiert zu sein, es findet sich da massenhafte, kleinzellige Infiltration, die auch auf die Gefäßwand übergehen kann; an anderen Stellen ist ein älteres, kernarmes Bindegewebe vorhanden. „Die Adventitia besteht aus Bindegewebsbündeln, zwischen deren Maschen vielfach Rundzellen eingebettet sind. Aus der Adventitia ziehen Spindelzellenzüge, mitunter auch einzelne Bindegewebsfibrillen in die Media, hier die einzelnen Muskellagen auseinander drängend. Die konzentrische Anordnung ist dabei vollkommen erhalten; die Muscularis hat an Dicke zugenommen, und zwar scheint dies besonders auf Rechnung einer Vermehrung der Muskulelemente zu setzen zu sein. Rundförmige Infiltration tritt hier und in der Intima gegenüber der Adventitia sehr bedeutend in den Hintergrund. Dagegen zeigt die Intima massenhafte Zunahme des fixen Bindegewebes. Dasselbe ist aber kernarm. Die Endothelien bilden einen dicken Saum um das Lumen der Gefäße, mit vorspringenden Kernen. Das Lumen ist oft nur mehr punktförmig, meist präzentriert es sich noch als Schlitz; doch scheint diese Plattendrückung weniger eine Folge der Bindegewebskompression als vielmehr der Gefäßwandwucherung, speziell der Intima selbst, zu sein. Die Lamina elastica interna fehlt an vielen Stellen ganz (Dinkler). An anderen Stellen finden sich die von Wolters beschriebenen Verhältnisse: aus der Media kommende, wuchernde Zellmassen haben die Elastica eingestülpt und treiben sie huckelbärmig gegen das Lumen vor; endlich hat diese nachgegeben und liegt nun zerrissen in einzelnen, nicht mehr konzentrisch zum Gefäßlumen liegenden Stückchen da, während durch die Spalten

sich polypenb6rmig die Bindegewebswucherung vorschiebt. Manchmal aber sind Tr6mmer der Elastica mit dem wuchernden Intimagewebe weit nach dem Lumen zu fortgewandert und liegen nun hier so unregelm66ig wie in der Adventitia Dagegen sieht man aber auch in der Adventitia ganz kleine, feine und wenig gew6llte elastische Fasern ausgespannt, so da6 man sich des Eindruckes, als habe man es hier mit Neubildungen zu tun, nicht erwehren kann.“ Diese Schilderung v. Nattk6ffts la66t erkennen, da6 alle drei H6ute gleichm66ig erkrankt sein k6nnen, und man hat danach wohl auch den Eindruck, da6 die Gef666ver6nderungen von der Adventitia her nach innen vordringen, unter haupts6chlicher Proliferation der bindegewebigen Teile der Gef666wand; allerdings tendieren auch die Muskelemente und die Endothelien zur Proliferation. Im weiteren Verlauf kann diesem hypertrophierenden Proce66 dann aber auch ein atrophierender folgen, dann „ist das adventiti6le Gewebe ganz oder teilweise geschwunden, so da6 die Muscularis ganz an das umliegende Gewebe angrenzt“ (Wolters). Die Lamina elastica kann auch hyalin entarten (Dinkler). Es werden aber auch F6lle beschrieben, wo wenigstens stellenweise die Intima am st6rksten betroffen ist (durch Endothelwucherung und Bindegewebshyperplasie), w6hrend die 6u6eren H6ute weniger affiziert sind und eine Periarteriitis nicht besteht (Leredde et Thomas). Neuere Autoren haben mit Recht besonderen Wert auf die Untersuchung relativ frisch erkrankter Partien gelegt, und dabei konstatiert, da6 Ver6nderungen der Blutgef666e und ihrer n6chsten Umgebung selbst da vorhanden sind, wo das 6brige Gewebe noch keine deutlichen L6sionen zeigt (Raymond et Alquier, Alquier et Touchard, Touchard). So sagt Touchard: Dans les cas r6cents la premi6re l66sion que l'on puisse observer est caract6ris6e par la pr6sence d'6l6ments embryonnaires diss6min6s dans le tissu, qui entoure imm6diatement les petits vaisseaux sanguins en particulier les art6rielles. Die die Gef666e umgebenden Randzellen, die in geringerer Menge zwischen den Gef666en liegen, und die Gef666e selbst oft scheidenartig angeben, sind meist spindelf6rmig, mit l6nglichem Kern und fadenf6rmigem Fortsatz; einige n6hern sich in ihrem Aussehen und ihrem f6rberischen Verhalten den Plasmazellen. Je weiter die Sklerodermie vorschreitet, desto geringer wird die Zahl dieser Zellen, gegen6ber der Hyperplasie der bindegewebigen und elastischen Fasern. Es unterliegt keinem Zweifel, da6 sehr h6ufig eine Verkleinerung der Gef666lumina vorhanden ist, die durch die verschiedenen Prozesse an den Gef666h6uten bedingt ist, aber eine r66lige Obliteration ist offenbar nicht die Regel, ja es kommen auch stellenweise geradezu Erweiterungen der Gef666lumina vor (Leredde et Thomas). Nach Krystalewicz betreffen die Ver6nderungen am intensivsten die gro66en an der Grenze zwischen Cutis und Subcutis gelegenen Gef666st6mme.

Auch Venen (Leredde und Thomas) und Capillaren sind erkrankt, letztere oft ganz verödet, die Wände der ersteren verdickt und in ähnlicher Weise alteriert wie die der Arterien.

Was nun die Ausbreitung der Gefäßveränderungen angeht, so kann diese nach allen Angaben sehr wechseln, es zwar, daß während in einem Teil des Gebietes der Sklerodermie ausgesprochene Veränderungen vorliegen, sie in anderen Teilen fehlen. Der Prozeß ist also sicher kein allgemeiner, d. h. nicht überall, wo Sklerodermie besteht, finden sich auch genau entsprechende Gefäßveränderungen. Leredde und Thomas konstatieren ganz ausdrücklich, daß an einen völligen Parallelismus zwischen beiden pathologischen Zuständen nicht zu denken sei, keineswegs fanden sich dort, wo die stärksten Hautveränderungen vorhanden waren, auch die stärksten Gefäßerkrankungen, und andererseits fanden sich in dem Fall, den Goldschmidt mitteilt, diese Gefäßveränderungen auch da, wo die Haut, wie z. B. an den Zehen gar nicht sklerotisch war. Es scheint aber überhaupt, auch nach den Untersuchungen, in denen die Nachforschung ausdrücklich auf diesen Punkt gerichtet war, nicht zweifelhaft zu sein, daß Sklerodermie ohne Hautgefäßerkrankung vorkommt. Darier hat einen, Marianelli drei solcher Fälle beschrieben.

Auch bei Luithlen finden wir die Angabe, daß kein Parallelismus zwischen Haut- und Gefäßerkrankung zu bestehen braucht. Die meisten Untersucher scheinen allerdings meist eine Gefäßerkrankung konstatiert zu haben, und sie sind geneigt, dieser eine große Regelmäßigkeit zuschreiben. Aber auch Touchard, der eingehende Untersuchungen angestellt hat, bekämpft die Auffassung, als ob die vasculären Veränderungen die Sklerose der umgebenden Partien herbeiführen, diese letztere also durch ungenügende Ernährung zu erklären sei. Auf diesen pathogenetisch sehr wichtigen Punkt kommen wir noch zu sprechen.

Auf die Lymphbahnen hat besonders Unna geachtet, er fand sie bei der diffusen Sklerodermie allesamt verengt; v. Nottthafft konnte diese Angaben für seinen Fall nur zum Teil bestätigen.

Die Veränderungen an den Schweißdrüsen sollen nach der Auffassung vieler Autoren (Lewin-Haller, v. Nottthafft) nur passiv-mechanisch bedingt sein, indem die Drüsen durch Kompression plattgedrückt werden, ihr Ausführungsgang verengt, und verschlossen wird usw. Es wurde doch aber auch eine Zunahme des eigentlichen Zellparenchyms gefunden (Neumann). Auch eine kleinzellige Infiltration um diese Drüsen, wie um die Haarbalg- und Talgdrüsen, die sonst meist normal waren, ließ sich hinwelen feststellen.

Ein sehr regelmäßiger Befund scheint die Hypertrophie der glatten Muskelfasern der Haut (*Mus. arrectores pilorum*) zu sein, sie wurde zuerst von Kolbach gesehen, von Lewin-Haller, Neumann, Schulz, Otto, Darier, Dinkler, v. Nottthafft u. a.

bestätigt. Sie wird als Arbeitshypertrophie aufgefaßt, wofür auch das Fehlen der Erweichung in einem nach zur Heilung gekommenen Fall (Cassions) sprechen soll. Das bedarf noch sehr der Bestätigung.

Die Nerven erwiesen sich meist als normal. Wolters fand auffallend wenig Nervenfasern in den untersuchten Hautstücken, Meyer fand eine Segmentation des Marks, auch sonst vielfach Zeichen von Degeneration, Arnozan Neuritis parenchymatosa, Lagrange Ansammlung von Lymphzellen in den Nervenschäufen. Eine Verdickung des Perineurium wurde von vielen Autoren gesehen (Dinkler, Wolters, Spieler), eine Erkrankung der Gefäße der Nerven beschreiben Castellino und Cardi. Sehr oft aber werden an den Nerven keinerlei Veränderungen gefunden. Lewin-Heller machen aber mit Recht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß wir über die Gefäßnerven auch schon für die physiologischen Verhältnisse nur wenig Sicheres wissen. Hier bedarf es sicher noch viel genauerer Untersuchungen mit den neueren Methoden (Fibrillenfärbungen, Untersuchungen mit der Methylenblaumethode Ehrlichs am überlebenden exzidierten Gewebe). Als Beispiel für die Methodik könnten die im allgemeinen Teil erwähnten Lapinskyschen Untersuchungen gelten. Die Frage, inwieweit die von Castellino und Cardi konstatierten Veränderungen der Gefäßnerven einen regelmäßigen Befund darstellen, ist von größter Wichtigkeit. Die sonst gefundenen Alterationen der Nerven haben zweifellos keine wesentliche Bedeutung, sind entweder rein sekundär oder höchstens den übrigen Befunden an der Haut und den Gefäßen koordiniert.

Wir haben im klinischen Teil gesehen, daß die Sklerodermie keineswegs nur eine Erkrankung der Haut und der Schleimhaut, deren Veränderungen denen der Haut entsprechen, ist, sondern auch die tiefer liegenden Teile und die inneren Organe in Mitleidenschaft zieht; wir finden demgemäß Veränderungen an den großen Gefäßen, an Sehnen, Gelenken, Muskeln, und Knochen, an den inneren Organen (Leber, Lunge, Herz, Milz, Thyreoiden) und am Nervensystem.

Ich gehe zunächst auf die Verhältnisse an den größeren Gefäßen ein. Diese waren meist intakt, speziell fand sich das Bild der allgemeinen Arteriosklerose sehr selten; vereinzelt wurden allerdings auch hier pathologische Befunde erhoben, so einmal Hypoplasie der Aorta (Béginneul et Mounizier), einige Male Atherom der Aorta (Fagge, Bouffier, Lerédde et Thomas). Letztere erwähnen auch, daß die Gefäße der Extremitäten in ihrer ganzen Ausdehnung verkalkt waren; mikroskopisch fanden sich hier wechselnde Veränderungen. In der Femoralis war die Adventitia verdickt und verdichtet, die Intima unregelmäßig verdickt, an einzelnen Stellen in Form von Papillen sich erhebend; auch die Elastica war verdickt. Die Muscularis war normal, nur hier

und da zeigten sich in ihr und auch in den anderen Hauten homogene, glasige Flecke, an anderen größeren Arterien der Extremitäten waren die Veränderungen noch hochgradiger. Arnozan sah Endarteriitis im Hohlhandbogen. Wo die inneren Organe verändert waren, fanden sich auch in deren Gefäßen Veränderungen (s. u.).

Die Veränderungen an den Muskeln bieten meist das Bild der Myositis interstitialis, wie der Prozeß von Leredde et Thomas auch direkt bezeichnet wird. Untersuchungen über Muskelveränderungen finden wir außer bei diesen Autoren bei Dinkler, Méry, Goldschmidt, Jonas, Schulz, Arning, Thibierge, Wolters, Robert, Meyer und v. Notthafft. Je nach den verschiedenen Stadien, in denen die Untersuchung vorgenommen wurde, ist mehr der aktive Prozeß der Bindegewebs- und Zellwucherung unter Beteiligung der Gefäße oder die atrophische Schrumpfung des Muskels mit Annäherung an die Muskelschwiele oder -Narbe (Arning) geschildert. Bei früheren Prozessen ist demgemäß das intramuskuläre Zwischengewebe durch größeren Kernreichtum ausgezeichnet, es zeigt zum Teil sogar bei Fibrinfärbung ein feines Fasernetz; später wird es kernarm, dichter und wuchert zwischen die einzelnen größeren und feineren Muskelbündel hinein. Die Muskelgefäße sind schwer erkrankt, in ganz ähnlicher Weise wie die Gefäße der Haut; man findet an den Arterien Endothelwucherung, dadurch und durch fibröse Entartung wird zum Teil ein völliger Verschluß der Gefäße hervorgerufen. Die anderen Gefäßhäute Intima, Media, Adventitia sind ebenfalls in der früher geschilderten Art erkrankt, ihre Wand und Umgebung stellenweise durch kleinzellige Invasoren infiltriert. Auch die Capillaren sind betroffen; doch fand Hektoen, was wiederum sehr wichtig ist, ganz normale Gefäße inmitten von Bindegewebswucherungen und der Zungenmuskulatur. Die Venen zeigen oft nur Endothelwucherung (v. Notthafft). Die Muskelfasern selbst scheinen immer mehr sekundär betroffen zu sein, wenn auch, wie bekannt, eine Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Erkrankung des Muskels nicht leicht ist. Im einzelnen fand sich Verschmälerung mit partieller variabler Auftreibung, mit erhaltener oder verwachsener Querstreifung, mit partieller Vermehrung der Muskelfaser! Schulz sah neben atrophischen auch hypertrophische Nervenfasern, aber der Hauptprozeß spielte sich im interstitiellen Gewebe ab; v. Notthafft sah auch Regenerationsprozesse. Ob es sich um eine primäre Myoklerose oder um eine sekundäre, von der Haut auf den Muskel in *continuitate* fortgepflanzte handelt, macht im anatomischen Befund keinen Unterschied aus.

Rasmussen beschrieb die Verlötung der Interkostalmuskeln mit dem Periost der Rippen und weiter mit der Pleura. Die Verdichtung und Verdickung der Sehnen und Fascien, sowie überhaupt des zwischen

Haut, Muskeln und Knochen gelegenen Bindegewebes wurde ebenfalls festgestellt (Fagge, Walters).

Über Veränderungen der Knochen liegen noch wenig Untersuchungen vor. Die Röntgenuntersuchungen, deren Resultate eben mitgeteilt wurden, haben die häufige Mitbeteiligung der Knochen an den krankhaften Vorgängen besonders deutlich erkennen lassen. Es kann danach von vornherein keinem Zweifel unterliegen, daß die Knochen auch direkt am Prozeß beteiligt, nicht nur sekundär atrophisch oder durch von den oberflächlichen Teilen her fortschreitende Entzündungen geschädigt sind. Lagrange fand Atrophie der eigentlichen Knochensubstanz, das Knochengewebe war von unregelmäßigen Ballen gebildet, die große, mit Fettzellen gefüllte Hohlräume in sich schlossen. Die Gefäße in den erweiterten Haversischen Kanälen waren von Fettzellen und wucherndem Bindegewebe umgeben. Walters fand an einer exaktälierten Zehe, daß das Periostr von starrem Bindegewebe mannigfach durchwuchert war, und letzteres zum größten Teil ersetzt hatte. Er fand weiter, ganz wie Lagrange, Einschmelzung der Compacta, die Knochenbälkchen waren durch eindringendes Bindegewebe beziehungsweise die massenhaften Osteoplasten überall wie angezogen. Das Markgewebe war größtenteils nicht mehr zu erkennen, durch Bindegewebe und Zellinfiltration ersetzt; Mastzellen fanden sich spärlich, nur in der Nähe der Gefäße. Die Gefäße des Marks und der Compacta waren in der gewöhnlichen Weise verändert, wiesen eine Wucherung des umgebenden Gewebes auf, neben adventitiellen Bestandteilen auch Media- und Intimaveränderungen. Chemische Untersuchungen des Knochen scheiterten noch ganz zu fehlen. Die feineren Einzelheiten der auf den Röntgenbildern zur Darstellung kommenden Osteoporose und Atrophie, die ja bis zum völligen Knochenschwund gehen kann, bedürfen durchaus noch weiterer histologischer und chemischer Untersuchung. Walters gibt auch an, daß Gelenkveränderungen anatomisch nachgewiesen sind, in seinem Fall fanden sie sich nicht.

Über Erkrankungen der inneren Organe, die den an der Haut gefundenen gleichzusetzen wären, finden wir Angaben bei Schallz, Goldschmidt, Westphal, Dinkler, Walters, Joppich, v. Notthafft, Hix, Brissaud, Lerodde et Thomas. Es scheint, als ob kein Organ von dem Prozeß verschont bliebe; überall finden wir dasselbe, uns schon genugsam bekannte Bild: in chronischem Verlauf kommt es erst zu einer ödematösen Durchtränkung und Proliferation des Bindegewebes, wie sich dasselbe auch immer finden mag, zwischen den Alveolen der Lungen, zwischen den Acini der Leber, den Glomeruli der Niere, den Muskeltrabekeln des Herzens, der Pulpa der Milz, überall also im inter-, aber auch im intraparenchymatösen Bindegewebe; der Proliferation, die oft mit einer Zellinfiltration gemeinsam auftritt, folgt die Atrophie, und Kompressionen, Abschnürungen und

dergleichen mehr schädigen sekundär das Parenchym. Überall sind die Gefäße beteiligt, und auch diese immer in derselben Form, mit Affektion aller dreier Hülle oder auch nur einzelner derselben, mit Endothelwucherung, Zellinfiltration und Bindegewebshyperplasie. Es scheinen auch hier immer die terminalen Gefäße an dem pathologischen Prozeß am meisten beteiligt zu sein: Arterien, Venen und Capillaren werden ziemlich gleichmäßig befallen. Das Lumen kann völlig verschlossen werden, sei es durch Wucherung oder auch durch sekundäre Thrombose und bindegewebige Organisation. Auch hier besteht aber zwischen Organ- und Gefäßveränderung nicht immer ein strenger Parallelismus. v. Notthafft fand eine interstitielle Myokarditis ohne Veränderung der Herzgefäße, Walters und Notthafft sahen in der Leber neben stark affizierten auch normale Gefäße. Im einzelnen wurde beschrieben Beteiligung des Herzens an dem Krankheitsprozeß in Form von Endo- und Pericarditis (Meyer, Goldschmidt, Notthafft u. a.), Infiltrationen und Schwellen im Herzmuskel (Notthafft), interstitielle Myokarditis (Hektoen); Affektion der Lungen (Walters, Goldschmidt, Notthafft) in Form diffuser Bindegewebsvermehrung, dasselbe an der Leber (Heller, Joppich, Notthafft, Méry) an den Nieren (Meyer, Méry, Goldschmidt, Heller, Joppich, Walters, Notthafft, hier fand Goldschmidt auch amyloide Degeneration), an der Milz. In den erkrankten Organen fanden sich auch Blutungen. Als Kuriosum mag schließlich noch eine Beobachtung von Leusble erwähnt werden, die Touchard zitiert. Eine Frau, die seit 6 Jahren an einer generalisierten Sklerodermie litt, die mit Raynaud'schen Symptomen eingesetzt hatte, hat eine Fehlgeburt von 7½ Monaten; die histologische Untersuchung ergibt sklerotische Veränderungen der Placenta, ferner der Leber und der Nieren des Kindes.

In einem älteren, von Rasmussen mitgeteilten Falle wurde Knotenbildung längs der Lymphgefäße beobachtet, einmal konstatierte Heller einen Verschuß des Ductus lymphaticus.

Eine besondere Bedeutung ist von einigen Autoren der Schilddrüsen-erkrankung bei der Sklerodermie zugeschrieben worden; wir nehmen deshalb hier ausdrücklich auf sie Bezug. Anatomisch nachgewiesene Veränderungen der Schilddrüse finden wir bei Scott, Singer, Leredde et Thomas, Hektoen, Uhlenhuth, v. Notthafft. Souroullon hat eine These über Zusammenverkommen von Sklerodermie- und Thyreoidenveränderungen publiziert. Sie war mir nicht zugänglich. Singer sah Verkleinerung des rechten Schilddrüsenlappens, starke Vermehrung des Bindegewebes überall in der Schilddrüse und besonders in der rechten Hälfte schwellige Verödung. Leredde et Thomas und v. Notthafft fanden im wesentlichen nur die bekannten Veränderungen im interstitiellen Gewebe und in den Gefäßen. Hek-

taum, der auf seinen Befund sehr viel Wert legt, fand Verminderung des Gesamtgewichts der Drüse (14 g statt der normalen 22 g) Ersatz der Follikel durch fibröses Gewebe in Verbindung mit cystischer Erweiterung und Anhäufung von kolloidem Material. Die chemische Untersuchung ergab eine Verminderung des Thyreoideingehaltes. Die Hypophysis schien nur kompensatorische Hypertrophie erfahren zu haben. Auch diese Veränderungen weichen also von den in den anderen Organen gefundenen in keiner Beziehung ab.

In einem Fall, den Roux beschreibt, fanden sich Veränderungen der Hypophyse; es bestand ein abnormer Blutreichtum des Organs, es waren Zeichen früherer und späterer Hämorrhagien vorhanden; daneben waren noch weitergehende Alterationen nachweisbar; die normalen epithelialen Zellen waren durch Ansammlungen von runden, mit körnigem Protoplasma und einem kleinen Kern ausgestatteten Zellen zum Teil verdrängt. Es schien sich nicht um eine entzündliche Infiltration zu handeln, sondern um Umwandlung der normalen Zellen in diese geschilderten Rundzellen; eine weitere mikroskopische Untersuchung der inneren Organe liegt nicht vor.

Es bleiben nur noch die Veränderungen im Nervensystem zu besprechen. Wir müssen über diese, da ihnen eine große Bedeutung für die Pathogenese zugeschrieben ist, ausführlich berichten. Über die Veränderungen der Hautnerven haben wir das Nötige schon mitgeteilt. Lagrange will, wie ebenfalls schon erwähnt, nach Angaben von Lewin-Heller und v. Nottkafft, eine periphere Neuritis gesehen haben. Meyer beobachtete zwei Fälle: in beiden waren die Hautnerven schwer degeneriert, in einem aber auch Peroneus, Medianus und Musculocutaneus. Day fand an den peripheren Nerven mehr Bindegewebe als normal, dunkler eine mäßige Bindegewebsvermehrung, sowohl im Peri- als Endoneurium. Leredde et Thomas sahen hier und da einige leere Scheiden und eine Verdickung des perineuralen Gewebes. v. Nottkafft fand eine Vermehrung des Bindegewebes im rechten N. ischiadicus, hier bestand auch beträchtlicher Faserausfall, „es war offenbar ein alterer Prozeß, der sich hier abgespielt hatte“. Der N. radialis sin. und ischiad. sin. waren unverändert. Letulle soll nach Wultere Hypertrophie und Atrophie der Nerven beobachtet haben. In einem Fall von Schulz waren die vorderen Wurzeln nur $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ so dick als die hinteren, und mikroskopisch ergab sich eine deutliche Degeneration; auch die hinteren Wurzeln waren vielleicht etwas atrophisch, und ein gewisser Grad von Degeneration bestand auch in den untersuchten peripheren Nerven. Gehirn und Rückenmark waren normal.

Gehirn und Rückenmark sind auch sonst noch mehrfach, selbst bei genauer Untersuchung, normal gefunden worden. Die älteste derartige Untersuchung stammt wohl von Day aus dem Jahre 1870.

Hier enthielt die weiße Substanz nur etwas mehr Bindegewebe als normal, während die nervösen Teile gesund waren. Am erheblichsten war die Veränderung noch im unteren Teil des Marks; die graue Substanz war normal. Dinkler fand in einem Fall die Medulla oblongata, das Rückenmark, die Spinalganglien, einen Teil des rechten Hals-sympathicus und eine ganze Anzahl peripherer Nerven gesund. Im Großhirn fanden sich an der Basis des linken Stirnhirns und an der Kuppe des linken Schläfenlappens gelbe Erweichungsherde, die aber offenbar mit einer alten Schädelfraktur im Zusammenhang standen, während sie sicher nichts mit der Sklerodermie zu tun hatten. Chiari untersuchte das Rückenmark und zahlreiche Spinalganglien, ohne Veränderungen zu finden, ebenso war der Befund negativ in den Fällen von van der Velde und Welters. Den meisten Wert haben natürlich die in der letzten Zeit angestellten Untersuchungen, die von Leredde und Thomas und v. Nottthaft stammen. Leredde und Thomas untersuchten Gehirn, Medulla oblongata und Rückenmark mikroskopisch, ohne allerdings die Marchi- oder Nisslmethode anzuwenden. Sie fanden keine Veränderungen, nur die Gefäße waren etwas verdickt, bei weitem aber nicht so stark wie in der Haut. Auch v. Nottthaft kam bei sehr sorgfältiger Untersuchung — die Medulla oblongata wurde sogar auf Serienschnitten durchmustert — zu einem negativen Resultat. Die Nisslfärbung wurde auch hier nicht angewendet.

Diesen negativen Befunden stehen einige positive gegenüber. Von einigen älteren können wir ohne weiteres absehen, es sind Befunde, die sicher nichts zu bedeuten haben, wie insbesondere die Verdickung der Hirnhäute, die ja bei allen möglichen Zuständen immer wieder gefunden wird. Die Dinklerschen Befunde am Großhirn wurden ebenfalls schon als für uns bedeutungslos gekennzeichnet.

Recht interessant ist eine von Westphal nachgewiesene Veränderung; er fand an verschiedenen Stellen der Gehirnoberfläche knötchenartige Verdickung und Verhärtung der Windungen; auf dem Durchschnitt erscheint an diesen Stellen die Rinde weißgrau, wachsartig, die Grenze zwischen Mark und Rinde vermischt. Auch in der Marksubstanz fanden sich zum Teil ganz in der Mitte ähnliche Herde; mikroskopisch fand sich Vermehrung des Bindegewebes, die Ganglienzellen waren normal. Westphal erklärt selbst, daß es sich hier um eine Lokalisierung des sklerotischen Prozesses im Gehirn handle. Ebenso wird man die Befunde von Raymond et Aliquier auffassen müssen, die zeigen einer im ganzen Körper vorhandenen Vermehrung des Bindegewebes eine mäßige Sklerose im Rückenmark feststellen konnten.

Chalvet et Lavyz sollen in einem schon vor langer Zeit publizierten und von Garnier 1862 zitierten Fall Veränderungen an den motorischen Zellen der Medulla oblongata und spinalis nachgewiesen haben; die Angaben liegen sehr weit zurück und sind auf ihre Bedeutung für uns

nicht kontrollierbar. In einem in diesem Zusammenhang meist zitierten Fall Frémey's fand sich eine Geschwulst, die auf der rechten mittleren Stirnwindung auflag. Intra vitam waren sichere Symptome eines Gehirntumors dagesessen, während ich der Schilderung des Falles bei Lewin-Heller bestimmte Angaben über eine Sklerodermie nicht entnehmen kann.

Jacques et de St. Germain fanden im Rückenmark einer Kranken, die fünf Jahre lang an einer allgemeinen ritiliginösen Sklerodermie litt, wenig zahlreiche, aber sehr deutliche Veränderungen, bestehend in kleinen Höhlen der grauen Achse, zum größten Teil im unteren Teil der Halsanschwellung, und ferner Zellveränderungen (Atrophie graubio-pigmentäre), in den Clarkeschen Säulen, aber auch sonst in den Zellen des Rückenmarks. Die Neuroglia erschien mehr granulär, weniger fibrillär als normal; es handelte sich um Folgen einer Myelitis — Myelitis cavitaire — nicht um Syringomyelie. Ein Zusammenhang zwischen diesen Veränderungen und der Sklerodermie schien den Verfassern denkbar.

Steven beobachtete folgenden Fall. Die Sklerodermie begann bei der Patientin im Alter von ca. 12 Jahren mit einem Fleck in der rechten Hand; allmählich breitete sie sich auf die ganze rechte Körperhälfte, rechten Arm, rechtes Bein, rechte Gesichtshälfte aus, es waren nicht nur die Haut, sondern auch die tiefer liegenden Gewebe befallen, so daß am Schluß eine vollkommene Hemiatrophie faciei et corporis dextra bestand; die linke Körperhälfte war nur unwesentlich betroffen. Der Tod erfolgte nach der Operation eines cystischen Ovarialtumors. Die Sektion ergab Fehlen des Pericard; an den Lungenspitzen alte, verästelte, käsigtuberkulöse Herde. Nephritis interstit. et parenchymat. Gehirn normal, nur vielleicht Cortex der linken motorischen Zone etwas dünner als der der rechten. Mikroskopische Untersuchung des Rückenmarks ergibt im ganzen Rückenmark eine geringe, wenn auch unzweifelhafte Verminderung der Größe des rechten Vorderhorns; die Zellen sind geringer an Zahl und weisen die Zeichen beginnender Degeneration auf; der Kern ist im Vergleich zu den Zellen der anderen Seite unscharf begrenzt. Die Neuroglia scheint nicht verdichtet zu sein. Medulla oblongata und Pons normal. Um die Gefäße herum im Rückenmark überall auffällig weite Räume, ob Lymphspalten oder perivaskuläre Erweichungen zweifelhaft. An einzelnen Stellen sind auch die Arterienwände dicker als normal. Nervenfasern der Anschwellungen zeigen parenchymatöse Degeneration und zwar frische Veränderungen, die der Verl. als durch das Fieber nach der Operation bedingt ansieht.

Im übrigen ist Steven der Ansicht, daß die Rückenmarksveränderungen die Sklerodermie hervorgerufen haben. Weiteres darüber zu sagen, erspare ich mir auf den nächsten Abschnitt. Zum Schluß dieses Kapitels erwähne ich nur noch, daß auch der Sympathicus

mehrfach untersucht wurde (Harley, Dinkler, v. Notthafft, Leredde et Thomas). Harley fand ihn in festes Gewebe eingewirkt (keine mikroskopische Untersuchung); die übrigen fanden ihn normal, auch bei mikroskopischer Untersuchung.

Ich erwähne noch die Angaben von Méry, der Tabes, von Hallion, der infantile Lähmung fand; aus den mir darüber zu Gebote stehenden Angaben von Notthafft geht nicht hervor, ob es sich um anatomisch nachgewiesene Läsionen handelt.

Pathogenese.

Die Zahl der über die Entstehung der Sklerodermie aufgestellten Hypothesen ist sehr groß, was freilich bei den Schwierigkeiten, die sich einer einheitlichen und für alle Fälle zutreffenden Auffassung der Krankheit entgegenstellen, nicht zu verwundern ist. Wie groß diese Schwierigkeit ist, wird man einer Äußerung Kaposi entnehmen können, der über 200 Fälle der Krankheit sah, um am Ende gestehen zu müssen, er kenne die Ursache der Sklerodermie nicht. Es erscheint einem solchen Urteil gegenüber gewagt, wenn auch hier wieder der Versuch unternommen wird, über die Pathogenese dieser rätselhaften Affektion eine Vorstellung zu gewinnen.

Die bisher publizierten Theorien über Sklerodermie sind von v. Notthafft in vier Gruppen geteilt worden, die als Schilddrüsentheorien, infektiöse Theorien, vasculäre und neurastische Theorien bezeichnet werden können.

Begnnen wir mit den Schilddrüsentheorien, d. h. mit denjenigen, die annehmen, daß durch eine primäre Erkrankung der Schilddrüse ein Gift produziert werde, durch das unmittelbar die für die Sklerodermie charakteristische Gewebeveränderung hervorgerufen wird. Ich habe zum Teil schon auf die klinischen und anatomischen Befunde hingewiesen, auf die sich diese Theorie stützt, als ich über das Vorkommen von Struma und von Schilddrüsenchwund zusammen mit Sklerodermie berichtete. Dann kommen die in letzter Zeit öfter beschriebenen Fälle von Sklerodermie und Morbus Basedowii. Klinisch ist das Verhältnis der beiden Krankheiten zueinander meist so, daß zu einem bestehenden Basedow allmählich die Erscheinungen der Sklerodermie sich hinzugesellen. v. Leube hat zuerst auf das Zusammenkommen beider Krankheiten hingewiesen, weitere Fälle wurden beschrieben von Kahler, Janselme, Sainte Marie, Grünfeld, Raymond, Beer, Singer, Morselli, Booth, Eichhorst, Fox, Osler, Dupré et Guillaïn, Stahelin, Kornfeld, Krieger, Leven, Touchard, Nöhl, Sterling, Freund, Sittmann, Peterson. Eine fast vollständige Übersicht der beobachteten Fälle gibt Sattler in seiner Monographie über die Basedowische Krankheit.

Als Typus kann folgender von Gräffeld mitgeteilter Fall gelten:

55-jährige Frau. Keine nervöse Belastung. Vor acht Jahren große psychische Aufregung, danach verschiedenes Hunger- und Durstgefühl. Exophthalmos, Struma und Durchfälle. Nach zwei Jahren spontane langsame Besserung, der nach 2½ Jahren neue Verschärfung folgt. Jetzt bemerkt Pat. die ersten Zeichen von Sklerodermie, einzelne Hautstellen an Brust und Nacken sind braunlich verfärbt, die Hautveränderungen nehmen nun zu, die Basedow-Symptome gehen zurück. Status praesens: Exophthalmos, Struma, Puls 84, zahlreiche sklerodermatische Stellen, an denen die Haut trocken, dünn, wenig verformbar und schmerzhaft gerötet gefühlt ist. Talg- und Schweißsekretion herabgesetzt, Sensibilität im allgemeinen etwas abgestumpft; von Sklerodermie betroffen sind Hals, Abdomen, Schulterblätter, Oberarme und Oberschenkel. Unter Thyreoideabehandlung trat eine deutliche Besserung der Symptome des Meck. Basedow ein und zugleich ein Jackson und Kriebeln in den sklerodermatischen Plaques, die sich allmählich auflösten, bis schließlich nur noch einige abnorm gefühlte oder ganz verhärtete Stellen zurückblieben.

Die in diesem Fall konstatierte und auch sonst einige Male beobachtete Heilwirkung des Thyreocidin (s. u.) wurde als weitere Unterstützung der Theorie angesehen, über die wir hier sprechen. Freilich versagte die Behandlung auch oft genug.

Etwas anders war die Entwicklung in einem von Krieger mitgeteilten Fall.

Eine jetzt 50-jährige Frau gab an, daß sie schon seit mehr als 15 Jahren an Anfällen von Asphyxie leide, die mit Schmerzen verbunden sei, beide. Zwei Jahre später erkrankte sie an einer überhöhen Pleuritis; dann trat Schwäche, Herzklappen-Abmagerung, Durchfälle ein; nach vorübergehender Besserung kam Exophthalmos hinzu und Struma, damit war das Bild des Basedow vollständig. Als vor zwölf Jahre später zu erneuter Aufnahme kam, waren die Zeichen der Basedowischen Krankheit noch in mäßigen Grade vorhanden (mäßige Struma, Herzvergrößerung, kein Exophthalmos); darüber hatte sich allmählich eine typische Sklerodermie entwickelt.

Ich selbst habe auch gerade in zwei Fällen von schwerer Sklerodermie Basedow-Symptome gesehen: beide Male war ein ziemlich erheblicher Exophthalmos und eine leichte Schilddrüsenvergrößerung vorhanden; auch das Herz war überregbar. Doch möchte ich nicht behaupten, daß es sich in meinen Fällen wirklich um einen abgeschlossenen und für sich bestehenden Symptomenkomplex gehandelt habe. Diese Bedenken habe ich übrigens auch gegenüber einigen Fällen der Literatur: Abmagerung, Pigmentverschiebungen, Schilddrüsenveränderung, Irritabilität des Herzens konnten auch der Sklerodermie als solcher zu, der Eindruck eines Exophthalmos entsteht bei ausgeprägter „sklerodermatischer Mäke“ sehr leicht. Vielleicht kommt auch der Sklerodermie als solcher ein gewisser geringer Grad von wirklichem Exophthalmos zu. Wie bei der Kombination von Sklerodermie und Addisonischen Krankheit muß man also auf eine scharfe Bewertung der Symptome achten, ehe man die Diagnose einer Kombination beider Erkrankungen stellen darf. Eine Kombination von Basedow, Sklerodermie und Tetanie beschreiben Dupré et Guillaumin in folgendem

Fall. Mit 13 Jahren Morbus Basedowii, mit 24 Jahren Sklerodermie, mit 29 Jahren Tetanie. Jetzt weist der 34-jährige Patient einen ausgebildeten Basedow, sklerodermatische Veränderungen an Nase, Stirn, Fingern und typische tetanische Anfälle auf.

Die Annahme der Anhänger der Schilddrüsentheorie, als deren Vertreter wir hier Jeanselme, Singer, Hektoen, Hascovec, Kornfeld, Krömer, in gewissem Sinne auch Raymond und Panegrossi nennen, geht nun dahin, daß durch die Schilddrüsenaffektion eine Dysthyreoidie herbeigeführt werde, die die Hautveränderungen bedinge. Die ganze Theorie ist recht schwach fundiert, wie auch von Netthafft hervorhebt. Die Schilddrüsenveränderungen, soweit sie nicht Symptome der Basedowschen Krankheit sind, sind nicht häufig, und in keinem Fall ist der Beweis erbracht oder ist es auch nur wahrscheinlich gemacht, daß sie primär und nicht der Ausdruck resp. eine Folge der in der Thyreoidea lokalisierten sklerodermatischen Prozesse sind. Das ist ja auch für Fälle wie den von Uhlénhuth wohl denkbar, in denen die Schilddrüsenatrophie den Hautveränderungen vorausgeht. Die Kombination von Sklerodermie und Basedowscher Krankheit stellt nach den Erfahrungen der letzten zehn Jahre nicht gerade eine Seltenheit dar, ist aber doch weit davon entfernt ein gewöhnliches Ereignis zu sein. Wenn Dittscheim behauptet, daß in 47% der von ihm beobachteten Basedowfälle Sklerodermie bestanden habe, so muß da unbedingt ein Beobachtungsfehler vorliegen, und wenn andererseits A. Kocher bei 9 unter 80 Fällen Zuspitzung der Endphalangen bei Basedowscher Krankheit fand, so ist das zwar eine an Sklerodaktylie erinnernde Erscheinung, aber bei weitem noch kein Symptom von Sklerodermie.

Das Material, das auf gemeinsame Beziehungen zwischen Thyreoideaerkrankung und Sklerodermie hinweist, scheint mir also auch jetzt noch immer keineswegs ein erdrückendes zu sein. Die Annahme, daß die Basedowsche Krankheit die Folge einer Dysthyreoidisation sei, darf als die verbreitetste und wahrscheinlichste Theorie der Entstehung dieser Krankheit angesehen werden. Die Ursache dieser abnormen Schilddrüsenwirkung ist damit aber noch immer nicht sichergestellt. Für mich bleibt aus vielen Gründen die Annahme die plausibelste, daß eine zentrale Interventionsstörung des vegetativen Systems diese Funktionsanomalie der Drüse bedingt, eine Hypothese, die ich schon in meiner Dissertation aufgestellt und verteidigt habe. Erst in allerletzter Zeit ist ein deutlicher Beweis für die Tatsache einer wirklichen inneren Sekretion von seiten der Schilddrüse geliefert worden. Asher und Flack haben eine Reihe von Versuchen ausgeführt, die in der Tat einen Beweis dafür zu liefern scheinen, daß es nicht nur eine Sekretion aus der Schilddrüse gibt, sondern daß diese Sekretion auch unter dem Einfluß bestimmter Nerven steht. Die von ihnen auf Grund

einer hier nicht näher zu beschreibenden Methodik erhaltenen Resultate waren folgende: Die Schilddrüse liefert ein inneres Sekret, welches die Erregbarkeit des Nervus depressor steigert und die Wirksamkeit des Adrenalins auf den Blutdruck erhöht. Die Schilddrüse bildet dieses Sekret unter dem Einfluß von Nerven. Die sekretorischen Nerven sind in den Nervi laryngei superiores enthalten, teilweise auch in den Nervi laryngei inferiores. Diese Tatsachen ließen sich dadurch demonstrieren, daß unter sonst genau gleichen Versuchsbedingungen eine Reizung des Nervus depressor oder eine intravenöse Adrenalininjektion während der Reizung der Schilddrüsenerven wirksamer war, als kurz vorher ohne dieselbe. Vincent deutet diese Beobachtung dahin, daß sie dafür sprechen, daß der Morbus Basedow, insofern derselbe auf einer Hypersekretion der Schilddrüse beruht, durch das Nervensystem beeinflusst werden kann, und er sieht in diesen Versuchen auch einen Beweis dafür, daß eine nahe Beziehung zwischen der Schilddrüse und der Nebenniere besteht.

Asher hat durch andere Versuche ferner den ersten bestimmten Beweis für eine wirkliche innere Sekretion auch von seiten des Nebennierenmarks gegeben. Er hat gezeigt, daß eine Reizung der Nervi splanchnici eine Drucksteigerung ergibt, die nach einer Latenz von etwa 30 Sekunden eintritt und noch einige Zeit nach Aufhören einer 90 Sekunden währenden Reizung anhält. Es gelingt durch kontinuierliche Reizung mit regelmäßig eingeschobenen Reizpausen den Blutdruck dauernd in der Höhe zu halten. Man kann also das, was sonst durch kontinuierliche Adrenalininjektionen erzielt wurde, auch durch geeignete Nervenreizung erreichen. Es wurde auch festgestellt, daß es sich um eine echte Sekretion und nicht etwa nur um die Folgen von Ausschwenkung von Adrenalin durch Gefäßerweiterung in die Nebennieren handelte; man kann die durch Nervenreizung gelieferte und an den Körper abgegebene Adrenalinnmenge dadurch bestimmen, daß man ermittelt, welche Adrenalinnmenge intravenös gegeben bei dem gleichen Tierpräparate gleiche Blutdrucksteigerung verursacht.

Der exakte Nachweis der Abhängigkeit der inneren Sekretion von Veränderungen des Nervensystems ist naturgemäß für die gesamte Pathologie des Morbus Basedowii und auch für die Pathologie der Sklerodermie von größter Bedeutung und geeignet, das Zusammenkommen von Symptomen von Basedow und Sklerodermie, ebenso auch von Morbus Addisonii und Sklerodermie verständlich zu machen. Es unterliegt ja zunächst keinem Zweifel, daß das auf dem Wege des Dysthyreoidismus gelieferte Toxin in erster Linie die nervösen Organe angreift, und so erscheint nun die Schilddrüsenkrankung bei der Basedowschen Krankheit nur ein Glied in der Kette des pathologischen Geschehens, ihrerseits entstanden auf dem Boden einer Erkrankung des vegetativen Systems.

Daß eine Assoziation Basedowscher Symptome mit Sklerodermie vorkommt, wird um besonders dann am wenigsten wundernehmen, wenn wir auf Grund späterer Erwägungen für die Sklerodermie ebenfalls die Hypothese einer Affektion des vegetativen Systems als die plausibelste erkennen werden. Es gäbe dann eine ganze Reihe von Erklärungsmöglichkeiten für die gegenseitigen Berührungspunkte. Beide Krankheiten könnten unabhängig voneinander bei denselben (neuropathischen) Individuum sich entwickeln und höchstens im Verlaufe sich gegenseitig beeinflussen. Aber auch die Möglichkeit eines etwa stützten Zusammenhangs müßte nach der Richtung hin erwogen werden, daß auch bei der Sklerodermie durch Übergreifen des Processes auf die Thyreoiden, wie das oben schon angedeutet wurde, eine der Basedowschen ähnliche oder identische Dysthyreoidisation hervorgerufen werden könnte; es liegt also keine Schwierigkeit vor, die Basedowsche Dysthyreoidisation als gelegentliches Symptom der Sklerodermie anzusehen. Dadurch würde auch die Tatsache erklärt werden, auf die Sattler besonderen Wert legt, daß in einigen Fällen mit dem Rückgang der Basedow-Symptome eine Besserung der sklerodermatischen Erscheinungen erfolgte.

Daß die Verhältnisse hier übrigens keineswegs immer so einfach liegen, daß es auch abweichende oder entgegengesetzte Erfahrungen gibt, lehrt der folgende Fall von Pauchot. Eine 49-jährige Frau hat seit 2 Jahren die Symptome des Exophthalmus, der Tachykardie, es bestanden Odeme, Schlaflosigkeit, Abmagerung. Sie wurde operiert, es trat eine rasche Besserung ein, aber nach zwei Monaten bildete sich eine typische Sklerodermie heraus. Wenn das nicht ein merkwürdiger Zufall ist — bisher scheint die Beobachtung isoliert zu sein — so weist uns eine solche Erfahrung jedenfalls darauf hin, daß hier mit recht komplizierten Möglichkeiten zu rechnen ist.

Die oft angeführte günstige Wirkung des Thyreoidin ist durchaus keine konstante Erscheinung, wir hat es sogar stets versagt; wo sie eintritt, ist mit der Möglichkeit einer spontanen Besserung zu rechnen, der günstige Erfolg ist eventuell auch durch die Veränderung des allgemeinen Stoffwechsels, den die Thyreoidindarreichung hervorruft, zu erklären.

So kommen wir zu dem Schluß, daß die Annahme einer Schilddrüsenerkrankung als primärer Ursache der Sklerodermie in keinem Fall gerechtfertigt erscheint, und daß in den nicht gerade zahlreichen Fällen, in denen gewisse Beziehungen einer Erkrankung dieses Organs zur Sklerodermie vorhanden zu sein scheinen, mit der Möglichkeit einer auf gleichem Boden entwickelten, koordinierten oder einer einfachen sekundären Schädigung gerechnet werden muß. Wenn Singer auch das Myxödem in den Kreis seiner pathogenetischen Erwägungen zieht, so muß man doch sagen, daß

dazu zu den klinischen Tatsachen recht wenig Veranlassung gegeben ist. Hier und da ist einmal ein Fall beschrieben worden, der diagnostische Erwägungen, ob Sklerodermie oder Myxödem vorlag, erforderlich gemacht zu haben scheint (s. u.) für irgendwelche inneren Beziehungen der beiden Krankheiten scheint mir wenigstens kaum ein Anhaltspunkt vorzuliegen; das habe ich später noch weiter auszuführen.

Es sind noch andere Drüsen mit innerer Sekretion in Beziehung zur Sklerodermie gesetzt worden.

Strümpell macht auf den eigentümlichen Gegensatz aufmerksam, in dem bei anderweitig vorhandenen Ähnlichkeiten Sklerodermie und Akromegalie stehen. Bei beiden werden die Hände und der untere Teil des Gesichts befallen; während aber bei der Akromegalie die Haut hyperplastisch wird und die darunter liegenden Knochen mehr oder weniger dick und massig erscheinen, schrumpfen diese Teile bei der Sklerodermie. Während es sich also bei der Akromegalie um progressive Wachstumsstörungen handelt, handelt es sich bei der Sklerodermie um gleichfalls scheinbar endogen entstandene, regressive Ernährungsstörungen in denselben Teilen. „Ich behaupte noch keineswegs, daß diese eigentümlichen Beziehungen der beiden Krankheiten miteinander auf irgendeiner innerlichen Verwandtschaft derselben (etwa wie beim Myxödem und dem Morbus Basedowii) beruhen, wollte doch aber wenigstens die Aufmerksamkeit auf diese Möglichkeit lenken, vielleicht lehnte es sich auch, gegebenenfalls bei der Autopsie einer Sklerodermie auf das Verhalten der Hypophysis cerebri zu achten.“ Strümpell denkt also jedenfalls auch an eine Autointoxikation als Ursache der Sklerodermie. Dieser Anregung Strümpells folgend hat Roux in seinem Falle die Hypophyse genauer untersucht und sein Schüler Lafond hat in seiner These „Sclérodémie et corps pituitaire“ das Thema ausführlich behandelt. Die Ergebnisse der anatomischen Untersuchung von Roux wurden früher bereits mitgeteilt. Daß dieser eine Befund nicht ausreicht, der Annahme engerer Beziehungen zwischen einer Störung der Funktion der Hypophyse und der Sklerodermie eine sichere Stütze zu verleihen, liegt auf der Hand.

Einige Male wurde ein Zusammenkommen von Paralysis agitata mit Sklerodermie beschrieben; Luzzato, Palmieri, Lundberg, Panegrossi haben derartige Fälle beobachtet. Luzzato hält das nicht für ein zufälliges Zusammentreffen, zumal die beiden Krankheiten sich in gleichem Maße entwickelten, sondern nimmt eine gemeinsame Ursache und zwar wiederum offenbar eine Alteration einer Blutgefäßdrüse an. Lundberg hat ja an eine ähnliche Ätiologie schon bei der Paralysis agitata gedacht und in Rücksicht auf deren Kombination mit der Myoklonusepilepsie, für die er²⁾ eine Funktions-

²⁾ Lundberg, Progressive Myoklonus-Epilepsie, Upsala 1903, S. 155.

störung der Glandulae parathyreoideae zu vermuten geneigt ist, wäre damit auch für die Glandulae parathyreoideae die Möglichkeit der Berücksichtigung gegeben. Der Fall von Dupré et Guillaïn in dem Sklerodermie, Basedow und Tetanie zusammentrafen, könnte auch auf diese Spuren weisen.

Daß Sklerodermie und Morbus Addisonii äußere Ähnlichkeiten miteinander haben können, ja daß die Unterscheidung und Abgrenzung in einzelnen Fällen recht erhebliche Schwierigkeiten machen können, ist schon betont worden und wird in dem der Diagnose gewidmeten Kapitel auch noch weiter erörtert werden. Wenn man auch die exakteren Beziehungen zwischen der Addisonischen Krankheit und den Nebennieren einschließlich des Intrarenalsystems noch nicht sicher gestellt sind, so kann an einer Korrelation zwischen Störung der Nebennierenfunktion und der Addisonischen Krankheit nicht gezweifelt werden. Diese Anschauung auf die Pathologie der Sklerodermie zu übertragen, scheint eine Anzahl von Forschern geneigt zu sein. Touchard hat in seiner These den Pigmentverschiebungen seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt und sie sehr genau studiert. Er weist ausdrücklich darauf hin, daß bei allen Erkrankungen der Blutgefäßdrüsen recht häufig generalisierte Pigmentverschiebungen gefunden werden, daß sie bei der Sklerodermie sehr frühzeitig auftreten und sehr konstant sind und er spricht, wenn auch in durchaus vorsichtiger, hypothetischer Weise von der Möglichkeit, daß eine intermittierende Sekretion des Adrenalins für die Symptomatologie der Sklerodermie von Bedeutung sein könnte. Er kommt allerdings zu dem Schluß, daß die Sklerodermie nicht auf die Affektion einer einzigen Blutgefäßdrüse zu beziehen sei.

Auch Lichtwitz, in dessen Fall die Diagnose Addisonische Krankheit, die neben der Sklerodermie bestanden haben soll, recht zweifelhaft ist, nimmt eine Beziehung zwischen der Erkrankung des chromaffinen Systems und der dadurch bedingten Alteration der Adrenalinabsonderung und der Sklerodermie an. Er übersieht die Schwierigkeit nicht, daß er zur Erklärung der Sklerodermie der Überproduktion der chromaffinen Substanz bedarf, während für den Morbus Addisonii der entgegengesetzte Zustand vorausgesetzt werden muß, eine Erklärung dafür vermag er nicht recht zu geben. Er nimmt enge Beziehungen zwischen Sympathicus und chromaffinem System an, sie gehören entwicklungsgerichtlich, anatomisch und funktionell eng zusammen, und spricht sich dafür aus, daß mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Sympathicus selbst der Träger der tonisierenden Substanz ist, und daß die Leitung dieser Substanz im Sympathicus, nicht in den Blut- oder Lymphgefäßen erfolgt. Wenn die Leitung des Adrenalins ungleichmäßig erfolgt, etwa dadurch, daß der Nerv auf die normalen Reize, die ihm zur Abgabe oder zum „Aufhalten“ des Adrenalins veranlassen sollen, falsch reagiert, so könnte einmal zu viel, das andere Mal zu wenig von

der toxisierenden Mautie z. B. an die Gefäße der Hand kommen. Diese Auffassung der Sklerodermie würde gestatten die Nerven- und die Gefäßtheorie dieser Krankheit zu verringern, die Fälle zu erklären, in denen die sklerodermatischen Veränderungen halbseitig oder dem Lauf eines Nerven folgend angeordnet sind.

Ganz abgesehen von den künstlichen und unwahrscheinlichen speziellen Auffassungen von Lichtwitz kann ich nur sagen, daß für die Erwägung der Beziehungen zwischen Sklerodermie und Addison offenbar prinzipiell ähnliche Gesichtspunkte obwalten müssen, wie wir es oben schon für die von Sklerodermie und Meib. Basedowii geltend gemacht haben.

Das Vorhandensein gewisser klinischer Beziehungen soll für einige, nicht sehr zahlreiche Fälle nicht geleugnet werden; wenn man vorsichtig diagnostiziert, ist die Zahl der wirklichen Kombinationen keineswegs erheblich (s. u.); eine klare Einsicht in die obwaltenden Relationen ist auch für diese spärlichen Fälle zurzeit nicht zu erhalten.

Sowas Tauchard, so sehen eine Reihe von Autoren nicht sowohl in der Affektion einer Blutdrüse als in einer sog. „Insuffisance pluriglandulaire“ die Ursache der Sklerodermie. Die Annahme einer Störung der inneren Sekretion wird auf diese Weise nicht eindeutiger und nicht sicherer.

Die ganze Lehre von der Autointoxikation ruht für die Sklerodermie noch auf sehr schwachen Füßen. Wenn wir bei dem Myxödem, dem Addison, der Akromegalie, vielleicht selbst auch beim Basedow, der Tetanie auf Grund pathologischer und experimenteller Erfahrungen bereits zu einer gewissen Sicherheit gekommen zu sein scheinen, die freilich von einer wirklichen Einsicht in die Bedingungen des pathologischen Geschehens noch weit entfernt ist, stehen uns für die Sklerodermie bisher nur recht vage Anhaltspunkte zur Verfügung, die meines Erachtens ein Fundament für eine wissenschaftliche Lehre nicht bilden können. Vielleicht werden aber die Forschungen der nächsten Jahre diese Lücke ausfüllen. Ein kleiner Anlauf ist auf dem Gebiete der verwandten Neurosen (Raynandsche Krankheit) schon gemacht worden, wovon oben berichtet wurde; dies ist die Einführung des Begriffes des Sympathicotonus und der pharmakologische Nachweis seines Vorhandenseins in einzelnen Fällen von vasomotorisch-trophischen Neurosen. Klinger beobachtete nun auch einen Fall von Sklerodermie, in dem die Erscheinungen des erhöhten Sympathicotonus dem Ausbruch der eigentlichen Sklerodermie vorausgegangen sind, in dem sie während der Höhe der Erkrankung deutlich vorhanden waren, mit der Abheilung der Sklerodermie auch zurückbildeten. Klinger ist geneigt, nicht nur daraus auf Störungen der inneren Sekretion zu schließen, sondern auch diesen eine ursächliche Rolle bei der Entstehung der Sklerodermie zuzuschreiben, unter Hinweis auf die in ähnlichem Sinne zu verwertenden Beobachtungen, die oben er-

wählten Kombinationen von Sklerodermie und Morb. Addisonii, Bandowii und Akromegalie. Der Fall Klingers ist interessant und wichtig genug, um ihn etwas ausführlicher wiederzugeben.

Es handelte sich um einen 45-jährigen Mann, der erblich nicht belastet war. April 1911 erkrankte er ganz plötzlich mit allgemeinen nervösen Erscheinungen, Zittern in den Händen, Ohnmachtsanfällen, Betäubung vom Kopf, Angstgefühlen; dieser Zustand hielt etwa sieben Wochen an. Mitte Mai stellten sich dann ganz plötzlich über Nacht ein allgemeines Ödem des Körpers ein. Beine, Arme, Brust, Bauch, Penis und Skrotum waren geschwollen. Nach drei Tagen begann die Schwellung allmählich wieder abzuklingen. Zur selben Zeit bemerkte der Patient, daß sich sein Gesicht braun verfärbte und daß die Unterschenkel zu jucken begannen. Außerdem hatte er ein Gefühl von Kälte und Taubheit in beiden Füßen. Bei der klinischen Untersuchung (23. Juni 1911) fand sich ein mäßiges Ödem der Unterarme, des Unterschenkels, des Beins und der Kreuzbeingegend. Außerdem war an der Rückseite beider Unterschenkel die Haut glänzend, sie fühlte sich hart an, war straff gespannt und ließ sich von der Unterlage nicht in Falten abheben. Diese Stellen waren außerdem braun pigmentiert. Braune Pigmentation fand sich ferner im Gesicht, an beiden Schulterblättern, am linken Unterarm und in der rechten Flanke. Die rechte Pupille war bedeutend weiter als die linke. Irgendwelche Zeichen einer Herzaffektion fanden sich nicht. Der Blutdruck war erhöht und betrug 165 mm. Quecksilber, der Urin war frei von Eiweiß. Nach dem Befund handelte es sich um eine diffuse Sklerodermie.

Wie bei der kurzen Dauer der Krankheit nicht anders zu erwarten war, war noch an keiner Stelle das atrophische Stadium eingetreten. Unter der Behandlung (Durchreibung von Chinin und Injektionen von Ubiolysin bzw. Einspritzung der betroffenen Hautstellen mit 10% iger Fibrinlösung) trat ein Rückgang der Erscheinungen ein, die Ödeme verschwanden bis auf geringe Reste, die Pigmentationen blühten ab, sie bildeten sich an einigen Stellen ganz zurück, auch die Verhärtungen der Rückseite der beiden Unterschenkel gingen nahezu vollständig zurück. Die allgemeinen nervösen Erscheinungen waren bereits beim Eintritt des Patienten in die Klinik verschwunden. Im weiteren Verlauf der Behandlung verschwand auch das Gefühl des Taubseins und der Kälte in den unteren Extremitäten, dagegen stellte sich in den oberen Extremitäten, vor allen Dingen am rechten Arm und der rechten Hand derselbe Sensitivsever ein, der der Kranke vorher an den Füßen hatte.

Außer den charakteristischen Merkmalen der Sklerodermie zeigte der Kranke eine Reihe interessanter Symptome. Zunächst die allgemeinen nervösen Erscheinungen bei Beginn der Erkrankung, die wenigstens zum größten Teil auf vasomotorische Störungen im Bereich des Zentralnervensystems zurückzuführen sein dürften. Er zeigte weiter eine Pupillendifferenz, die am Anfang deutlich war, später jedoch nicht mehr ausgesprochen vorhanden war. Schließlich war das Verhalten des Blutdrucks bemerkenswert. Derselbe betrug am 27. Juni 165 mm, am 29. Juli 180 mm Quecksilber, am 8. August, also etwa zu der Zeit, da die Heilung der Hautveränderungen einsetzte, war er auf 145 mm Quecksilber gesunken und dieses Sinken setzte sich allmählich fort. Jetzt beträgt der Blutdruck (Anfang November 1911) nur noch 120 mm Quecksilber. Die genannten Erscheinungen, die vasomotorischen Störungen, die Pupillendifferenz und die Erhöhung des Blutdrucks beruht Klinger mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine gemeinsame Ursache, auf einen übermäßigen Reizzustand des sympathischen Nervensystems. Diese seine Annahme konnte er experimentell noch bestätigen. Auf die Injektion von einem mgm Adrenalin reagierte der Kranke zwar nicht mit einer auffälligen Beschleunigung des Pulses, wohl aber mit einer deutlichen Zuckerauscheidung im Urin während der nächsten Stunden.

Auf die Injektion von einem Zentigramm Pilocarpin hat er dagegen nicht in stärkerer Weise reagiert.

Klinger nimmt also eine Erhöhung des Sympathicustonus an. Es ist sicher, daß dieser symptomatologische Befund ein besonderes Interesse bietet und daß er dringend zu Ähnlichen Untersuchungen auffodert, die zunächst entscheiden müßten, ob diese Erhöhung des Tonus im Sympathicus in der Tat ein regelmäßiges Symptom bei der Sklerodermie ist. Dabei darf nicht vergessen werden, daß es, worauf wir schon früher aufmerksam machten, mit der Sicherheit der Abgrenzung des Begriffes „Sympathicustonus“ vorerst noch eine recht müßliche und unsichere Sache ist. Dazu kommt ein weiteres: selbst mit dem regelmäßigen Nachweis der Erhöhung des Sympathicustonus ist noch nichts in dem Sinne entschieden, daß dieser eine maßgebende Rolle in der Pathogenese der Sklerodermie spielt. Er könnte sehr wohl nur ein Symptom des Leidens sein und brauchte als solches doch nicht unbedingt von einer Anomalie der inneren Sekretion hervorgerufen zu sein. Etwas anderes ist schließlich sehr wohl möglich. Der erhöhte Tonus könnte eine konstitutionelle Eigenschaft der betreffenden Individuen darstellen und auf dem Boden dieser angeborenen oder im früheren Leben erworbenen Sympathicotonie könnte die Sklerodermie sich entwickeln, hervorgerufen durch mannigfache andere toxische Einwirkungen, von denen auch sonst vielfach in der Literatur die Rede ist. Es würde die Sympathicotonie, die dann eine dauernde sein müßte, wenn auch ihre Intensität mannigfachen Wechsel unterworfen sein könnte, als Disposition, als Diathese zur Krankheit aufgefaßt werden können, zu deren Auslösung es dann anderer Ursachen bedürfte. Wir sind in unseren früheren pathogenetischen Erörterungen schon mehrfach auf diese Punkte eingegangen. Diese „Krankheitsbereitschaft“ würde sich dann ungefähr mit dem Begriff decken, der sonst als Ineffizienz oder Labilität des Vasomotorensystems bezeichnet wurde, der offenbar allen hierher gehörigen Krankheitsgruppen gemeinsam ist und aus dessen Vorhandensein sich die vielen gemeinsamen Züge dieser unserer Gruppe ergeben. Wir kommen auf diesen Punkt nochmals zurück.

Über Ähnliche Erfahrungen wie Klinger berichtet Reines, der zweimal bei Sklerodermie neben Zuckerausscheidung eine mydriatische Substanz im Serum konstatieren konnte — die Exaktheit des Nachweises ist freilich in letzter Zeit wieder bezweifelt worden — und Hess und Königstein. Bei einer diffusen Sklerodermie kamen in Attacken gegensätzliche Zustände vasomotorischer Störungen vor: Cyanose der distalen Partien der Extremitäten, mit Kälte, Hyperästhesie und übermäßiger Trockenheit, wobei auch Pilocarpininjektionen versagten, auf der anderen Seite hellrote Verfärbung und Schweißausbruch. Im Zustand des Gefäßspasmus waltete ein depressiver

Gemütsaffekt vor, nach Lösung des Krampfes griff eine mehr euphorische Stimmung Platz. Im ersten Stadium bestand neben der Unempfindlichkeit gegen Pilocarpin eine erhöhte Empfindlichkeit gegen Adrenalin und zu dieser Zeit war im Serum eine Substanz nachweisbar, die die Froschlängpupille erweiterte. Die Herztätigkeit war erregt. Im zweiten Stadium wirkte Pilocarpin prompt und die mydriatische Substanz ließ sich nicht nachweisen.

Hier ist also in der Tat durch pharmakologische Feststellungen das verifiziert, was als Insuffizienz des vegetativen Systems zu bezeichnen wäre; immer bleibt noch zu entscheiden, ob die Krankheit sich auf einem demartig vorbereiteten Boden entwickelt, oder ob sie selbst diese Symptome erst schafft.

Unter Annahme einer solchen Deposition oder auch ohne solche haben manche Autoren noch andere z. T. auch exogene Intoxikationen als direkte Ursache der Sklerodermie annehmen zu dürfen geglaubt.

Goldschmidt glaubte, daß die amyloide Degeneration der Nieren ein Gift geföhrt habe, das für die Entstehung der Sklerodermie von Bedeutung sei. In mehrfachen Publikationen hat Eßmann seine Anschauung verteidigt, daß die Sklerodermie auto-toxischen, vom Darm ausgehenden Prozessen ihre Entstehung verdanke. Er macht auf die von ihm häufig beobachteten Beziehungen zwischen toxischem, dem Antipyrinexanthem ähnlichen Erythemem und der Sklerodermie aufmerksam, die Erytheme gehen der Sklerodermie entweder voraus, oder auf ihrem Boden entwickelt sich direkt das Leiden. Eine gesteigerte Darmfäulnis wurde in einigen Fällen nachgewiesen. Die Natur der Erytheme als toxischer sei sicher gestellt, damit auch der Charakter der Sklerodermie. Ich nenne weiter *Leredde et Thomas*, die für ihren Fall an eine Vergiftung durch syphilitisches Virus denken, während sie für andere Fälle dem typhösen oder dysphtheritischen Gift usw. diese Rolle zuschreiben. Für solche Annahmen sind die klinischen Daten noch viel spärlicher vorhanden, als für die Blutgefäßdrüsentheorie, es fehlt so und so oft jeder Anhaltspunkt für eine Intoxikation, ganz abgesehen von zahllosen anderen Schwierigkeiten, die sich der Theorie entgegenstellen. Es ist mit der Ablehnung dieser Theorie ja auch keineswegs gesagt, daß das häufig beobachtete Vorkommen einer Infektionskrankheit ganz gleichgültig für die Entwicklung einer Sklerodermie ist, es kann sie begünstigen, indem es auf die beiden Gewebe, die nach unserer Ansicht für die Entstehung der Sklerodermie in Betracht kommen, auf das Gefäß- und das Nervensystem schädigend und schwächend einwirkt. Völlig unberechtigt scheint mir eine von Happe-Seyler aufgestellte Theorie zu sein. Dieser Autor konnte zwei Patienten, die aus einem kleinen Dorf stammten und viel miteinander in Berührung gekommen waren, und die beide an Sklerodermie erkrankten, beobachten, und er stellt auf Grund dieser ganz vereinzelten Beobachtung die Theorie

auf, daß die Sklerodermie eine Infektionskrankheit sei, wofür nach Entstehung und Entwicklung und ihre häufige Kombination mit Gelenkleiden spreche. Er hat vergeblich versucht, Bazillen zu züchten, denselben Mißerfolg hatten Dinkler, Wolters u. a. Hierher darf man wohl auch die Ansichten der Autoren rechnen, die die Sklerodermie den rheumatischen Affektionen gleichstellen, und ferner die, die in der Sklerodermie eine besondere Form der Lepra sehen. Als Hauptvertreter der letzteren Ansicht gelten Graesset und Zambaco, die beide nicht nur die Sklerodermie, sondern auch die Raynandsche Krankheit und die Morvanische Krankheit als eine etwas modifizierte Form der Lepra auffassen. Nur für gewisse Fälle von Morvanscher Krankheit hat diese Ansicht Berechtigung, und es kann weiterhin auch vorkommen, daß die Differentialdiagnose zwischen Morvanscher Krankheit, Sklerodermie und Raynandscher Krankheit und damit auch zwischen den letztgenannten Krankheiten und der Lepra schwierig wird, aber für eine Einreihung der Sklerodermie unter die Lepra scheint mir jede Grundlage zu fehlen. Bacillen fanden sich niemals, und die überwiegende Mehrzahl der in der Leprafrage kompetenten Beobachter (Dühring, Kallindero, Hansen, Jeanselme) sprachen sich gegen die erwähnte Hypothese aus.

Auf besserer Grundlage ruht die Annahme, daß es sich bei der Sklerodermie um eine Gefäßerkrankung handle, und zwar um eine Erkrankung der terminalen Arterien. Es braucht kaum gesagt zu werden, daß diese Theorie ihre Hauptstütze in den anatomisch nachgewiesenen Gefäßveränderungen hat. Als Hauptvertreter dieser Ansicht nenne ich Dinkler, Hoffa, Wolters, Herxheimer, v. Sotthoff, Neumann, Sternthal, Babes, Török, Friedheim, Kaposi, Hahn, Jessner, Garrigues, Vidal; im einzelnen ergeben sich nicht wenige Abweichungen, und von den genannten Autoren gehören einige eigentlich schon zu denen, die auch dem Nervensystem — neben dem Gefäßsystem — eine Rolle bei der Pathogenese der Sklerodermie zuweisen. Wir gehen Dinkler, der umfassende eigene Untersuchungen gemacht hat, zuerst das Wort. Der Erkrankung liegt eine Affektion der Arterien zugrunde, die sich als eine Peri-, Mes- und Endarteritis chronica fibrosa erweise, hauptsächlich die Arterien der Haut befallend, aber nicht in toto, sondern mehr stellenweise. Welche der drei Hauto die zuerst befallene sei, sei nicht sicher zu bestimmen, aber auch nicht von Wichtigkeit. Dinkler glaubt, daß die Adventitia primär erkranke. Auch das Vorkommen von Pigment und das einer ödematösen Vorstufe spreche für die Annahme einer primären Circulationsstörung. — Gegen die Hypothese einer primären Entzündung sei anzuführen, daß die Zeichen einer solchen, insbesondere pralle Füllung der Gefäße und Quellung der Endothelzellen fehlen. Eine solche verwirft übrigens auch Kaposi auf Grund der anatomischen

Befunde mit Entschiedenheit. Zudem hätten sich Gefäßveränderungen auch schon da gefunden, wo die Haut noch normales Aussehen gezeigt habe. — Mit der Bezeichnung der Krankheit als Trophoneurose sei nur eine neue unbekannte Größe eingeführt; die Veränderungen am Centralnervensystem seien von untergeordneter Bedeutung. Den Dinklerschen Anschauungen schließt sich Haffa in allen wesentlichen Punkten an.

Walters rechnet dagegen die Sklerodermie zu den interstitiellen Entzündungen. Dafür ist ihm maßgebend „die Wucherung der jugendlichen Zellen um die Drüsen und Gefäße, hier und da an den Nervencheiden; das Auftreten embryonaler Elemente in Zügen und Flecken, weiterhin die erhebliche Zunahme des Bindegewebes und die für interstitielle Vorgänge so charakteristischen Gefäßveränderungen. Hierzu kommt noch, daß die gleichen interstitiellen Prozesse in der Muskulatur, der Lunge, der Leber, den Nieren, den Lymphdrüsen, dem Uterus und dem Gehirn nachgewiesen worden sind . . . Ob bei dem ganzen Prozeß die Entwicklung der Gewebsentzündung das Primäre ist, oder die Veränderung der Gefäße, ist ebenso schwer zu entscheiden wie das ursächliche Verhältnis beider zueinander. Doch scheint die Alteration der Gefäße das erste zu sein, die dann wiederum vielleicht als Reiz auf das Bindegewebe wirkt“. Dabei gibt Walters zu, daß die Basis der Gefäßveränderungen eine nervöse sein könne.

Török glaubt, daß wir es bei der Sklerodermie mit einem hämatogenen entzündlichen Prozeß zu tun haben, welcher zuerst die Durchtränkung und Schwellung, später die Atrophie des Hautbindegewebes verursacht. Er versucht diese Anschauung durch den Hinweis auf die initialen Veränderungen zu stützen. Diese tragen einen deutlich entzündlichen Charakter, da sie in seröser Durchtränkung und Hyperämie bestehen; auch die Veränderungen des nächsten, indurativen Stadiums sind seines Erachtens als entzündliche anzusehen: das bis dahin inter-fibrilläre Ödem wird intrafibrillär, die Atrophie kommt sekundär durch Blatgefäßveränderungen zustande. Ein Fall eigener Beobachtung wird zur Stütze dieser Ansichten herangezogen. Der Kranke litt an Gesicht, Brust, Armen an typischer Sklerodermie, an den Unterschenkeln hatten sich embolische Herde entwickelt, von denen zwei in sklerodermatische Veränderungen ausgingen.

v. Kotttrafft steht den Anschauungen von Walters sehr nahe. Daß den ganzen Körper befallenden Prozesse sind solche einer chronischen, erst infiltrierenden und edematisierenden, zuletzt aber immer indurierenden Entzündung. Ob die Gefäßveränderungen bei der Sklerosierung eine ursächliche Rolle spielen, oder ob beide Vorgänge mehr koordiniert und beide von einer dritten, gemeinsamen Quelle abhängig sind, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Selbst in dem Fall aber, daß die Gefäße die Ursache der Sklerosierung sind, ist es sehr wohl denkbar, und auf Grund der Ätiologie und der klinischen Tatsachen

sogar wahrscheinlich, daß die Gefäßveränderungen noch auf eine weiter zurückliegende *Causa movens* zurückzuführen wären, auf Veränderungen im Nervensystem. Auch Walters hat schon ähnlichen Gedanken Raum gegeben, ebenso wie andere Anhänger der Gefäßtheorie (Herxheimer, Stornthal, Thibierge, Schuhiger). Einige Beobachter haben, meist auf Grund nur eines Falles, auch der Venenerkrankung eine bestimmende Rolle in der Pathogenese der Erkrankung zugewiesen (Arning, Ehrmann).

Heller hat vor einer Reihe von Jahren behauptet, daß der Sklerodermie eine Lymphstauung zugrunde liege, und zwar auf Grund einer Beobachtung, bei der er den Ductus thoracicus in einen Endgewebsstrang umgewandelt fand und auch im peripheren Lymphgefäßapparat Veränderungen konstatierte. Der Befund am Ductus thoracicus ist vereinzelt geblieben und kann daher nicht zur Basis einer Hypothese über das Wesen der Sklerodermie gemacht werden. An eine Lymphstauung als Ursache der Sklerodermie wurde, wie Lewin-Heller berichtet, noch von anderer Seite gedacht, und das ganze Bild der Sklerodermie als ähnlich dem der Elephantiasis aufgefaßt (Rasmussen). Die anatomischen Befunde lassen uns solche Ansicht ohne Schwierigkeit als unhaltbar erkennen.

Einige Autoren sehen sich überhaupt außerstande, sich über die Pathogenese der Sklerodermie eine bestimmte Meinung zu bilden. So sagt Vilecq: die Entstehung dieser Krankheit ist unbekannt, nichts deutet auf ein Nerven- oder Gefäßleiden, ebenso spricht nichts für eine Infektion oder Intoxikation. Auch Kaposi gelangt trotz seiner außerordentlich großen persönlichen Erfahrung zu keiner sicheren Entscheidung. Man ist geneigt, sagt er, eine vom Centralnervensystem beeinflusste trophische Störung als Ursache anzunehmen, anatomische Beweise fehlen. Manches spricht für eine solche Hypothese, doch fehlt es an einem Nachweis, und die Lokalisation bei der Sklerodermie an hantet ist wohl eher auf die Gefäße zu beziehen.

Eine große Zahl von Autoren steht auf dem Standpunkt, daß die Sklerodermie eine Nervenkrankheit ist.

Wir sahen schon, daß von denjenigen, die den Gefäßveränderungen eine große Rolle zuschreiben, einige diese Gefäßveränderungen wieder mit größerer oder geringerer Bestimmtheit auf das Nervensystem zurückführen. Diese Autoren hätten wir zunächst höher zu zählen. Dazu kommt dann eine große Reihe anderer Autoren, die das Nervensystem in erster Reihe verantwortlich machen; freilich ergeben sich da die allergrößten Differenzen im einzelnen, indem bald das zentrale Nervensystem, bald das periphere, bald das sympathische im Anspruch genommen werden, und der eine grob anatomische, palpable, der andere nur funktionelle Veränderungen als Ursache voraussetzt. Es würde

viel zu weit führen, wenn wir alle Vertreter der nervösen Theorie hier zu Worte kommen lassen wollten, ich führe eine große Anzahl von ihnen namentlich an und gebe auf einige der vorgebrachten Theorien dann etwas näher ein: Lewin-Heller, Marianelli, Birn, Stephan, Otto, Lépine, Pelizaeus, Alpár, Tschierback, Mader, Vorleitt, Jacoby, Eichhoff, Eiber, Mendel, Hutchinson, Musler, Raymond, Machten, Sécheyron, Schulz, Vidal, Boustier, Brummand, Uhlenhuth, Lesser, Bruns, Brissaud, Drouin, Hallopeau, Harley, Sciamura, Schwimmer, Stackelberg, Huismans, die letzten recht als Vertreter der Anschauung, daß die Sklerodermie auf eine Erkrankung des Sympathicus zurückzuführen ist.

Lewin und Heller fassen die Symptome der Sklerodermie als durch eine Erkrankung der vasomotorischen und trophischen Centren und Bahnen bedingt auf, und da sie den bisher gefundenen anatomischen Veränderungen keinen entscheidenden Wert beimessen, wird man zweckmäßig ihre Auffassung dahin präzisieren, daß sie in der Sklerodermie eine vasomotorisch-trophische Neurrose, eine Angiotrophoneurrose sehen. Diese kann centraler Natur sein, sehr wohl aber auch peripherer, da es für die Symptome gleichgültig ist, ob der krankmachende Prozeß peripher oder central sitzt, immer ergeben sich dabei dieselben Erscheinungen; nur die Verbreitung der lokalen Veränderungen ist eine differente, je nach lokalem oder centralem Sitz der Erkrankung; schließlich ist auch eine Wechselwirkung in der Weise denkbar, daß durch periphere Läsion von den trophischen Nerven aus reflektorisch auch ein Krankheitsreiz auf die Centren ausgeübt wird. Lewin-Heller stellen alle die Tatsachen zusammen, die zugunsten der nervösen Theorie sprechen, und sie versuchen es auch, für die einzelnen Symptome auf dem Boden ihrer Theorie eine Erklärung zu finden, ein Beginnen, das wir bei der Mehrzahl der übrigen Autoren vermissen. Als Symptome von seiten des vasomotorischen Centrums sehen sie an: die der Entwicklung der Sklerodermie vorausgehende Rötung und Gefäßerweiterung; der Gefäßerweiterung folgt eine Verlangsamung des Blutstroms, eine Schädigung und Veränderung der Gefäßwände, durch Transudation eine Kompression des Gewebes, eine Feherversorgung des Bindegewebes der Haut, auf die Induration folgt durch stets mangelhafter werdende Ernährung die Atrophie. Dort, wo die Intensität der Einwirkung der Vasomotoren am stärksten ist, finden sich auch oft die stärksten Veränderungen, also an den peripheren Körperteilen. Auch die übermäßige Pigmentierung ist eine Folge der venösen Veränderungen: das Pigment stammt aus dem ausgetretenen Blut, wie übrigens auch andere Forscher schon angenommen haben, während für andere Fälle auch an eine direkte Pigmentvermehrung gedacht werden kann, die Lewin-Heller ebenfalls zulassen. Sekundär durch die Erkrankung der Gefäße sind ein

Teil der trophischen Störungen zu erklären. Nagelerkrankungen, Ulcerationen, Desquamation. Aber diese Erklärung reicht nicht für alle trophischen Veränderungen aus, und wo die Gefäßveränderungen in gar keinem Verhältnis zu den trophischen stehen, wird man eine direkte trophoneurotische Erkrankung annehmen müssen: hochgradige Atrophien, partieller Haarausfall, symmetrische Ulcerationen, akuter Decubitus usw. gehören hierher ebenso wie die einige Male beobachtete Hemiatrophia facialis. Die sensiblen Symptome sind wohl meist peripher bedingt, die motorischen sind rein mechanisch hervorgerufen. Die symmetrische Anordnung der Veränderungen erklärt sich bei der Annahme einer centralen Störung in den ja auch symmetrisch gelegenen vasomotorischen Centren der Medulla oblongata leicht. Im selben Sinn spricht das Vorkommen einer halbseitigen Sklerodermie, das auch Pelixaens in seinem Fall in gleicher Weise vermutet hat. Die Ätiologie und die häufig beobachteten begleitenden Symptome von seiten des Centralnervensystems weisen deutlich auf dieses hin. Den anatomischen Befunden beim Nervensystem schreiben Lewin-Heller keine große Bedeutung zu, aber da nur ganz grobe Veränderungen für uns erkennbar sind und Reizungszustände, die nicht zur Destruktion führen, unserer Kenntnis sich entziehen, so hat das nichts Wunderbares und spricht nicht gegen die Theorie.

Wir finden in diesen Erörterungen Lewin-Hellers im wesentlichen alle Punkte zusammengefaßt, die für eine nervöse Grundlage der Sklerodermie sprechen, und die als solche auch von den anderen Autoren angeführt werden sind. Als eifriger Verteidiger der nervösen Theorie ist Raymond aufgetreten. Für diese sprechen nach ihm die zahlreichen nervösen Begleiterscheinungen, die vasomotorischen und sekretorischen Störungen, die abnormen Pigmentierungen, die Parästhesien, die denen bei Neuronen ähnlich sind, die Muskelatrophien, die teilweise sicher neurastische seien, die Heredität, die Symmetrie, die Ausbreitung in der Bahn eines Nerven, die Verbindung mit der Hemiatrophie, die sicher nervös ist. Gegen die nervöse Theorie hat man das Fehlen der Sensibilitätsstörungen und das Fehlen anatomischer Veränderungen angeführt, aber dagegen ist einzuwenden, daß erstere wohl vorkommen, wenn sie dann auch bisweilen hysterischer Natur sind, und daß den anatomischen Veränderungen des Nervensystems, soweit solche bisher gefunden wurden, eine Bedeutung doch nicht abgesprechen ist. Raymond macht auf die in letzter Zeit häufiger gefundene und an Syringomyelie erinnernde Kyphoskoliose (s. o.) aufmerksam. Den Sitz der Läsionen sucht er im Centralnervensystem, namentlich in Rücksicht auf die Kombination mit anderen centralen Nervenkrankheiten. Auch Lesser betont, daß am nächsten noch die nervöse Theorie annehmbar ist. An eine Infektion soll kaum zu denken, die Gelenkerkrankungen müßten ähnlich wie die bei der Tabes ausgefallen werden. Brunx stellt

sich ebenfalls auf den Boden der nervösen Theorie, er faßt, wie wir erwähnt haben, die Lokalisation in seinem Fall als eine spinal-segmentäre auf, und er meint, daß dieser Fall kaum eine andere Deutung zuläßt als die, daß die Affektion des betreffenden Blutgefäßbezirks unter dem Einfluß spinaler Reizungs- oder Lähmungsvergänge entstanden ist. Er nimmt dabei an, daß die nervöse Versorgung der einzelnen Gefäßbezirke der Haut in naher Beziehung zu denjenigen spinalen Centren steht, die an den betreffenden Körperregionen die Haut mit sensiblen und die Muskeln mit motorischen Fasern versorgen (Schlesinger). Außer der Lokalisation sprechen auch ihm für eine nervöse Genese die vasomotorischen Anomalien, die psychischen Veränderungen, der allgemeine Kräfteverfall, die Kombination mit der Addison'schen Krankheit. Es handelt sich also wohl sicher um eine Angioneurose. Es scheinen aber daneben auch noch neurotrophische Störungen vorzukommen; als solche kommen weniger die Geschwüre, als die hochgradige Verdünnung der Knochen und die muskulären Erkrankungen in Betracht. Gerade diese sind nun wieder ein schwerwiegender Beweis zugunsten der nervösen Theorie der Sklerodermie.

Eine Reihe von Autoren ist dagegen mehr geneigt, den Sitz der Krankheit im peripheren Nervensystem zu suchen, im wesentlichen wohl mit Rücksicht auf die Fälle, wo die Sklerodermie sich im Gebiet eines peripheren Nerven ausbreitete (Babes, v. d. Velde, Mendel, Hutchinson). Daß auch Lewin-Heller für einzelne Fälle dieser Annahme zuneigen, wurde schon betont.

Einige Autoren haben sich für eine Affektion des Sympathicus ausgesprochen. Hallopeau gibt als Grund dafür an: das Fehlen sensibler und motorischer Störungen beweist das Freibleiben der peripheren Nerven und der weißen Substanz des Rückenmarks. Eine Myelitis centralis macht, obwohl wegen der Hautatrophie an sie gedacht werden könnte, nicht die sonstigen Erscheinungen der Sklerodermie, daher müsse man auf den Sympathicus zurückkommen.

Der Sympathicustheorie hat dann Brissaud seine Unterstützung gegeben, freilich nicht in dem Sinne, in dem sie von den früheren Autoren meist verteidigt wurde, daß nur der Grenzstrang und seine Ganglien der Locus morbi sein könne, vielmehr so, daß auch seine spinalen und cerebralen Ursprungsstätten und deren Verbindungen mit dem Grenzstrang in Betracht zu ziehen seien. „Il y a de fortes probabilités pour que l'affection soit le fait d'une lésion des racines ou des origines spinales du grand sympathique“. Für den cerebralen Ursprung der Krankheit sprechen die Fälle, in denen sie sich im Anschluß an ein Schädeltrauma entwickelt, für den spinalen ihr Vorkommen im Verlauf spinaler Erkrankungen wie der Syringomyelie. Sogar nach anatomische Befunde wie die von Arnozan, der peripendymäre Veränderungen fand — wir haben diesen Befund oben nicht erwähnt — und die von Jaquet

et de Saint Germain; aber auch die *Ramæ communicantes* und der Grenzstrang können der Sitz der Krankheit sein, die auch atologisch verschieden bedingt ist. Zugunsten der Sympathicustheorie führt er noch einige weitere, gelegentlich beobachtete Symptome an, so z. B. Muskeltrophien, die nicht das Resultat einer Myosklerose sein können, wie die von Chauffard beobachtete halbseitige Zungenatrophie, die auf einem ungenügenden Blutzufluß beruhe; Ähnliches gelte vielleicht auch für die gelegentlich mit der Sklerodermie kombinierte Hemiatrophia faciei und die Schilddrüsendegeneration; auch diese beruht er auf Circulationsstörungen, deren Ursache er in einer organischen oder funktionellen Alteration des dritten Cervicalganglions des Sympathicus sucht.

Es gibt schließlich noch Forscher, die die Sklerodermie auf verschiedenem Wege entstehen lassen; ich nenne von solchen Méry und Gaucher. Méry (zitiert nach Brissaud) denkt daran, daß die diffuse Sklerodermie auf eine Gefäßerkrankung zurückzuführen ist, auf eine Endoperiarteriitis, während die Sklerodermie en bandes und en plaques trophonervösen Ursprungs ist, und ähnlich hat auch Gaucher, der sich freilich nicht ganz entschieden ausspricht, für die diffuse generalisierte Sklerodermie eine arterielle, für die Sklerodermie en bandes und en plaques eine nervöse Genese angenommen.

Es erscheint mir sehr schwierig, die Annahme zuzulassen, daß die verschiedenen Formen der Sklerodermie auf verschiedenartiger Grundlage beruhen. Die Beziehungen der einzelnen Formen zueinander sind so eng, die Übergänge so zahlreich, so mannigfaltig, daß jeder Versuch einer Einteilung in Unterformen, wie wir das früher gesehen haben, immer wieder ge scheitert ist. Wenigstens in einer Beziehung muß meines Erachtens eine Gemeinsamkeit bestehen, in den Grundlagen des für die Entstehung des Leidens pathognomonischen Vorganges. Die Anregung zu diesen Vorgängen mag von verschiedenen Seiten her kommen: wenn wir eine Neuritis diagnostizieren, so nehmen wir einen im wesentlichen identischen Prozeß an, der seine besonderen individuellen Züge durch die spezielle Ätiologie bekommt (alkoholische, diphtherische, diabetische, idiosyncratische-infektiöse Formen). In diesem Sinne könnte für die Sklerodermie eine Vielgestaltigkeit zugelassen werden. Der Angriffspunkt dieser, die Erkrankung hervorrufenden Ursachen muß aber in dem Sinne als einheitlich gedacht werden, daß es sich entweder um einen bestimmten Abschnitt des Nerven- oder des Gefäßsystems handelt. Ich möchte mich für die erstere Annahme entscheiden und will im folgenden die Gründe für und gegen jede der beiden Theorien zusammenstellen.

Als bewiesen muß gelten, daß in der Mehrzahl der Fälle in den erkrankten Partien sich Gefäßveränderungen von dem oben beschriebenen Charakter finden. Aber wie

erwähnt wurde, sind erstens diese Veränderungen nicht ganz konstant. Ferner wurde selbst da, wo sie vorhanden sind, niemals der Nachweis geführt, daß Gefäß- und Hautveränderungen in ihrer Ex- und Intensität einander parallel gehen; es fehlt auch der strikte Nachweis, daß die Gefäßveränderungen immer vor den übrigen Gewebeveränderungen nachweisbar sind, wenn sie auch bisweilen sicher sehr frühzeitig vorhanden waren. Es fehlt auch weiterhin selbst jeder ernsthafte Versuch des Nachweises, wiewo gerade diese Gefäßveränderungen wieder gerade die sklerodermatischen Veränderungen hervorbringen sollen. Es gibt ganz ähnliche, ebenso vorbereitete Gefäßveränderungen, Brissaud weist auf die Arterio-capillary-fibrosis von Guil und Sutton hin, andere (Lewin-Heller usw.) haben an die diffuse Arteriosklerose erinnert: keine von diesen ist im entferntesten in der Lage, sklerodermatische Veränderungen zu produzieren. Wenn wir uns die Verhältnisse an den Gefäßen ansehen, so verstehen wir, wie es da zu Stenosen, zu Blutaustritten, zu Pigmentbildung, zu Oedematöserung der Gewebe, auch wohl zur Nekrose kommt, aber für das Charakteristische des teils proliferierenden, teils regressiven sklerodermatischen Prozesses mit seinem typischen Ausgang in bindegewebige Induration und Atrophie finden wir doch in der Gefäßalteration keinen zureichenden Grund. Ganz abgesehen davon, daß wir durch eine solche Annahme organischer Läsionen gewisse intermittierende Zustände, wie insbesondere die so häufigen vasomotorischen Symptome, gar nicht erklären können, daß auch die allerdings nicht gerade häufigen initialen Schmerzanfälle so keine Erklärung finden, daß das frühzeitige Auftreten von Paronikia und ähnlichen trophischen Störungen zu einer Zeit, wo sonst lokale sklerodermatische Veränderungen nicht oder nur in geringem Maße vorhanden sind, ein Rätsel bliebe.

Wir werden ferner auch für die häufige Verteilung der sklerodermatischen Ränder entsprechend bestimmten peripheren Nerven resp. radioulnarischen Segmenten keinen Grund anzugeben wissen. Denn daß Gefäße und Nerven gemeinsam verlaufen, ist, wie schon von verschiedenen Seiten betont wurde, doch nur für einige Territorien richtig, am ehesten noch für die großen Extremitätengefäße, aber nicht für die kleineren Verzweigungen und überhaupt nicht für das Gesicht. Brissaud wendet sich mit Recht energisch gegen dieses Argument: „Rien de commun entre les districts artériels et les districts nerveux de la face, des doigts. Voilà donc un très mauvais argument, qui compromettrait déjà la chose de la théorie artérielle.“ Eine symmetrische Verteilung ließe sich mit der Gefäßtheorie schon eher vereinigen: eine periphere, symmetrische Gefäßerkrankung hätte nichts besonders Auffälliges, recht schwierig wäre aber wieder die Erklärung bei den allerdings sehr seltenen halbseitigen Sklerodermiefällen.

Einige der gemachten Einwände fielen weg, wenn wir die in den Gefäßen und in den Geweben sich abspielenden Prozesse als gleichge-

schärfte betrachteten, beide als Ausdruck einer primären Ernährungsstörung anzusehen; die Inkongruenz der Gefäß- und Gewebsveränderungen und die Inkonsistenz der ersteren wäre so verständlich; wir besuchten uns ferner keine Sorgen darüber zu machen, wie aus der Gefäß- die Gewebskrankung wird. In diesem Sinne haben sich zum Teil auch neuere Autoren ausgesprochen, und nur in diesem Sinne kann die vasculäre Theorie ernsthaft diskutiert werden. Dann aber müßte man, um eine einigermaßen befriedigende Erklärung zu haben, die die Einseitlichkeit des Krankheitsbildes verstehen lehrt, eine Einseitlichkeit der Ursachen voraussetzen; diese findet in den bisher bekannt gewordenen Tatsachen keine Stütze. Damit sind die Schwierigkeiten dieser Auffassung aber nicht erledigt, die streifenförmige Anordnung wäre nur unter Zuhilfenahme einer kongenitalen Unterwertigkeit gewisser unbeschriebener Dermatoeme (in Anlehnung an die Anschauungen von Blaschko) zu erklären, die seltenen halbseitigen Sklerodermien würden der Auffassung ebenfalls die größten Schwierigkeiten machen. Zwei Punkte aber sind es, die meines Erachtens die vasculäre Theorie umstoßen, die so häufigen und oft initialen vasomotorischen Symptome oder was damit gleichbedeutend ist, die engen und auflöselichen Beziehungen der Sklerodermie mit dem Raynaud und weiter das Auftreten primär atrophischer Prozesse in den Knochen, wie in dem Fall, auf den ich oben besonders eingegangen bin, mit der Verkleinerung des Schulterblattes. Diese Fälle führen uns ja zur Hemiatrophia faciei und die enge Verbindung, in der Hemiatrophie und Sklerodermie zueinander stehen, ist ein weiterer Grund gegen die vasculäre Genese der Sklerodermie, da für die Hemiatrophie eine vasculäre Genese nicht angenommen werden kann.

Es bedarf keines weiteren Hinweises, daß alle diese letztgenannten Momente sehr gut zur Annahme einer neurotischen Grundlage passen. Haben wir nun nicht in den zahlreichen anatomischen Daten über Veränderungen des Nervensystems eine sichere Grundlage zugunsten der Annahme der neurotischen Theorie? Ich meine, man wird diese Frage rundweg verneinen müssen; keine der mitgeteilten Veränderungen des Nervensystems scheint mir eine ursächliche Bedeutung für das Zustandekommen der Sklerodermie gehabt zu haben. Dabei ist noch hervorzuheben, daß das gesamte Nervensystem in einer Anzahl neuerer Fälle in ganzem Umlange gut untersucht und normal gefunden worden ist. Wenn wir eine für alle Fälle gültige Pathogenese der Sklerodermie, wenn auch mit lokal wechselndem Sitz annehmen wollen, so spricht der Nachweis der Integrität des Nervensystems in typischen Sklerodermiefällen an und für sich schon sehr gegen die Bedeutung der in anderen Fällen gefundenen Alterationen. Diese selbst aber sind dann wieder untereinander so verschiedenartig, zum Teil auch so unbedeutend, daß man ihnen irgendwelches Gewicht nicht beilegen kann; man muß sie teils als durch den

sklerodermatischen Prozeß selbst bedingt (Fall Westphal, ein Teil der Veränderungen der peripheren Nerven) auffassen, man muß auch daran denken, daß bei kachektischen Individuen periphere Nerven degenerieren sehr häufig ist; die Veränderungen am Sympathicus sind so unsicherer Art, daß wir von ihnen ganz absehen müssen; die von Schulz an den runderen Wurzeln beschriebene Degeneration, die mit einer Degeneration zahlreicher peripherer Nerven sich verband, ist nicht sicher zu erklären; der Befund ist zu vereinzelte, die sonstigen Folgen solcher Degenerationen sind uns andererseits aus tausendfältiger Erfahrung zu gut bekannt, als daß wir sie als Ursache der Sklerodermie auffassen dürften. Am meisten verfährt zur Annahme eines Verhältnisses von Ursache und Wirkung zwischen den Veränderungen des Nervensystems und der Sklerodermie wohl ein Fall von Steven. Die Tatsachen sind oben schon mitgeteilt; in einem Fall von halbseitiger Atrophie des Körpers und Sklerodermie fand sich eine geringe, wenn auch merckliche Verminderung der Zellen des rechten Vorderhorns im ganzen Rückenmark. Steven zweifelt nicht an dem ursächlichen Zusammenhang: „*Sklerodermia with hemiatrophy, as regards its essential pathology, is a trophic atrophy due to changes occurring in the trophic cells of the central nervous system; certainly in those of the spinal cord, and probably also in those of the brain. As the result of this change in the nerve cells the blood vessels — both of the cord and of the periphery controlled by the diseased nerve cells are first of all affected. Following upon the derangement of the blood supply by the central nervous disease the atrophical changes in the skin and adjacent tissues are slowly developed*“.

Der Fall läßt aber doch eine andere Deutung zu, die nämlich, daß die Veränderungen in den Vorderhornzellen ebenfalls sekundäre sind, also gleichgeordnet den übrigen Erscheinungen der Hemiatrophie, und mit dieser vielleicht abhängig von einer Alteration übergeordneter Centren. Diese zweite Annahme ist nach meiner Ansicht die durchaus wahrscheinlichere; denn einmal ist in einer ganzen Anzahl von Fällen trotz vorhandener Hemiatrophie corporis und besonders bei der pathogenetisch offenbar gleichen, unkomplizierten Hemiatrophia faciei eine Veränderung der betreffenden Zellen nicht gefunden worden, und wir wissen doch ferner aus den allgemeinen Erfahrungen der Neuropathologie herans, daß eine Degeneration der Vorderhornzellen, wenn sie auch sehr langsam fortschreitet, zu ganz anderen Störungen führt und stets degenerative Muskelatrophie und Lähmung bedingt. Warum eine solche im Fall Stevens ausblieb, ist nicht zu entscheiden, vielleicht war sie auch nur durch die sklerodermatische Hautbeschaffenheit maskiert. Dabei ist es immerhin, auch wenn wir der Auffassung der Zellatrophie als eines Symptoms der Hemiatrophie Raum geben, möglich, daß sie sekundär etwas zur Atrophie der ganzen Körperhälfte beigetragen hat,

indem durch sie das Muskelgewebe, vielleicht auch das Knochengewebe atrophierte.

Jaquet und Saint Germain haben, wie erwähnt, eine *Myélite cavitaire* in einem Fall von Sklerodermie gefunden. Wir werden die mögliche Bedeutung dieses Befundes besser würdigen können, wenn wir zuerst die Fälle besprochen haben, in denen klinisch eine Kombination von spinalen Krankheiten mit der Sklerodermie beobachtet wurde. Ich habe die Fälle schon einmal kurz erwähnt. Schultze hat Sklerodermie bei Myelitis beschrieben. Es handelte sich um eine sicher hysterische Frau; zur Zeit der stärksten Lähmung fand sich einmal Ödem in der Nähe der Gelenke, jetzt ist keine Spur von Ödem mehr vorhanden, aber an den abhängigen Partien der unteren Extremitäten, am stärksten in der Gegend der Achillessehne, der Wade und des Knies ist die Haut glatt, glänzend, pigmentlos, gar nicht verschiebbar, aber nicht dünner als normal und ziemlich fettreich. Die Hautveränderung beschränkt sich durchaus auf die gelähmten Teile, deswegen schließt Schultze auch eine etwaige, zufällige Kombination mit Recht aus. Er macht hauptsächlich das Ödem für die Entstehung der Krankheit verantwortlich und denkt daran, daß vielleicht eine durch die Lues bedingte stärkere Beteiligung der Hautgefäße zu der Entstehung der Krankheit beigetragen hat, die er aber als echte Sklerodermie auffaßt. Das völlige Fehlen von Atrophie konnte in dieser Annahme doch wohl stutzig machen, zumal die Verhärtung der Haut schon eine recht ausgedehnte war. Eine direkte Folge der Myelitis kann die Affektion, wenn man sie trotzdem als echte Sklerodermie auffaßt, nicht sein, dazu ist ein solches Vorkommen bei der Myelitis doch zu singular. Es ist aber denkbar, daß von den organisch erkrankten Teilen aus reflektorisch eine pathologische Tätigkeit der vasomotorisch-trophischen Centren angeregt wurde. Eine ähnliche Genese habe ich auch für die seltenen Fälle der Kombination von Erythromelalgie und Raynaud'scher Krankheit mit Myelitis angenommen.

Etwas häufiger und für uns bedeutsamer ist die Tatsache, daß unzweifelhaft sklerodermatische Veränderungen im Verlauf der Syringomyelie vorkommen. Schlesinger erwähnt bereits in seiner Monographie einige derartige Fälle. In den von Mendel und Pick mitgeteilten Beobachtungen hält er die Diagnose Syringomyelie für sehr zweifelhaft. Er zitiert ferner einen Fall von Fedoroff; hier bestand ausgebreitete Sklerodermie, ferner Panaritien und Muskelatrophien, aber es fehlten Sensibilitätsstörungen und Steigerung der Patellarseflexe, so daß Schlesinger zwar Syringomyelie nicht ausschließen, aber keineswegs *intra vitam* sicher diagnostizieren will. Im ersten Fall von Kanasugi hingegen dürfte wohl Syringomyelie (neben der Sklerodermie) vorliegen haben. Schlesinger selbst sah einen Fall, in dem neben typischen, der Syringomyelie zuzuschreibenden Veränderungen noch

ausgesprochene Sklerodermie an der Haut der beiden oberen Extremitäten und der Streckseite der unteren sich fand. Es sind dann von anderer Seite noch weitere sichere Fälle der Kombination beider Krankheiten mitgeteilt worden. Sehr wichtig ist der von Pospelow publizierte und von uns schon mehrfach erwähnte Fall, in dem neben typischer Syringomyelie antallweise Symptome der Raynandschen Krankheit und der Erythromelalgie vorkamen. Hier bestand an der rechten Hand eine ausgesprochene Sklerodaktylie. In einem von mir ebenfalls schon erwähnten Fall von Castellino und Cardi handelte es sich um die Morvan'sche Krankheit, an den Händen fand sich ausgebreitete Sklerodaktylie. Morselli hat einen ähnlichen Fall beschrieben; die Hände, Arme und das Gesicht eines 31-jährigen Mädchen waren sklerodermatisch verändert, die Induration trat zuerst an den Händen auf, nachdem sich Schwäche der oberen Extremitäten, Brennen der Handteller und vasomotorische Störungen in den Vorderarmen eingestellt hatten. Es war außerdem Verminderung des Orts- und Temperatursinns bei erhaltener Schmerzleitung nachweisbar. Es bestand ferner Anhidrosis an den Händen und Muskelatrophie am Daumen und kleinen Fingerhaken. Montesano hat zwei Fälle beschrieben, die er ebenfalls als Kombination von Sklerodermie und Syringomyelie auffaßt, doch ist auch Notthafft in keinem der beiden Fälle die Diagnose Syringomyelie richtig. In einem Fall von Morselli erhebt neben Hemiatrophia faciei ein mit recidivierenden Ulcerationen der Hornhaut und Sklerodaktylie der linken Hand eine Syringomyelie mit Arthropathien bestanden zu haben.

Bei den Beziehungen, die die Sklerodermie zu der Hemiatrophie des Gesichts hat, ist die Tatsache bemerkenswert, daß auch sonst noch einige Male eine Kombination von Syringomyelie mit Hemiatrophie beschrieben wurde. Am bekanntesten ist der von Dejerine und Mirallié mitgeteilte Fall, weitere derartige Beobachtungen verdanken wir Graf, Lemaug, Schlesinger, Chavanne, Queyrat et Chrétiens (nach Brissaud). In allen diesen Fällen ist allerdings die Hemiatrophie nicht so stark ausgesprochen, wie bei manchen reinen Fällen von Hemiatrophie. Die Pathogenese des Symptoms ist zweifelhaft. Dejerine und Mirallié glauben, daß es eine Folge der Lähmung der sympathischen Fasern im Halsmark ist. Schlesinger betont, daß die bisherigen Befunde keine einseitliche befriedigende Erklärung gestatten; es gibt Syringomyelien mit schweren Lähmungserscheinungen des Sympathicus ohne Hemiatrophie, andererseits Höhlenbildung im Rückenmark und dem in Rede stehenden Symptom aber ohne Sympathicuslähmung.

Schließlich möchte ich noch erwähnen, daß eine weitere Beziehung zwischen Gliosis und Sklerodermie in der bei der letzteren ebenfalls wiederholt beobachteten Kyphoskoliose (siehe oben) gesehen werden kann.

Es ist zweifelhaft, wie in diesen Fällen von Gliosis und Sklerodermie das Verhältnis der beiden Affektionen aufzufassen ist, insbesondere ob man von einer Kombination beider Krankheiten, oder von einem symptomatischen Vorkommen der Sklerodermie bei der Syringomyelie sprechen muß. Jedenfalls werden wir auf Grund der mitgeteilten Beobachtungen ein Recht zu der Annahme haben, daß ähnliche Veränderungen wie die bei der Syringomyelie uns bekannten eine Rolle in der Pathogenese gewisser Fälle der Sklerodermie spielen. Brissaud nimmt im Verfolg seiner allgemeinen Anschauungen über die Entstehung der Sklerodermie an, daß in solchen Fällen durch ein Zusammentreffen zufälliger Umstände bei der Gliosis die spinalen Wurzeln des Sympathicus getroffen werden. Freilich finden wir oft Zeichen von Sympathicuslähmung oder Reizung bei der Syringomyelie ohne eine Spur von Sklerodermie oder Hemistrophie.

Wir bemerken also auch bei der Sklerodermie wieder, wie schon bei der Raynoldschen Krankheit und der Erythromelalgie, nahe Beziehungen zur Syringomyelie, die uns besonders wichtig sind, weil sie bei der gut bekannten topischen Diagnose der Gliosis auch für die Lokalisation der vasomotorisch-trophischen Neurosen einen Fingerzeig abgeben.

Die Klinik gibt uns noch weiter wertvolle Andeutungen dafür, daß das Nervensystem den Ausgangspunkt der Sklerodermie bildet. Ich verweise auf die häufige nervöse Belastung, auf die zahlreichen, allgemein nervösen Erscheinungen, die wir bei Sklerodermatikern finden, auf die Kombination mit bestimmten funktionellen Neurosen, mit der Neurasthenie und Hysterie, mit Psychosen usw. Ich erinnere daran, daß in einzelnen Fällen seelische Erschütterungen den unmittelbaren Anstoß zur Entwicklung des Leidens gegeben haben, und ich erinnere schließlich auch hier noch einmal an den Fall Klüngers mit seinem erhöhten Sympathicotonus wie an die Beobachtungen von Reines und Hess und Königstein. Es widerspricht dabei unserer Auffassung durchaus nicht, wenn in einer Minderzahl von Fällen gar kein anderes neuropathisches Symptom sich findet, da es ja in Analogie mit anderen Krankheitsbildern sehr wohl zu verstehen ist, daß gelegentlich die Sklerodermie der einzige Ausdruck eines pathologischen Zustandes im Nervensystem ist. Die oben erwähnten, gegen die vasculäre Genese der Sklerodermie sprechenden Punkte sind ebensoviel Fürsprecher zugunsten der nervösen Theorie. Das wird man für die Halbseitigkeit der Symptome zugeben, ebenso auch für die Symmetrie, wenn diese auch, wie erwähnt, mit der vasculären Theorie vereinbar wäre, ferner für die heftigen Schmerzattacken. Auch ein Teil der trophischen Störungen scheint mir, ganz im Einklang mit den Anschauungen Lewis-Hollers, nur dann genügend erklärt, wenn wir in ihnen eine direkte neurotrophische Störung sehen. Für die Fälle frühzeitiger Parastisien möchte das zunächst gelten, ferner

für die Fälle, wo es zu allmählicher, spontaner Abstoßung oder Resorption ganzer Knochen kommt. Ich erinnere in dieser Beziehung vornehmlich ausdrücklich an den einen von mir beschriebenen Fall mit seiner Verkleinerung des ganzen Schulterblattes, des einen Arms, eines Teils des Skeletts beider Füße. Die Haut und zum Teil auch die Muskulatur an und über diesen Knochen war unverändert, sekundär durch Fortschreiten von anderen Geweben her hatte sich der Prozeß nicht ausgebreitet, so eine Inaktivität konnte nicht gedacht werden, die Annahme einer vasculären Genese der Knochenatrophie ist bei der Gleichmäßigkeit des Prozesses höchst unwahrscheinlich, die Analogie mit anderen Knochenatrophien gleicher Genese, auf die wir mehrfach zu sprechen gekommen sind, springt in die Augen, besonders auch die Analogie mit den entsprechenden Veränderungen bei der Hemiatrophie, auf die wir alsbald zurückkommen. Die Beobachtungen der Sklerodermie ex bandis, in denen die Streifen sich wirklich aus der Verzweigung eines peripheren Nerven ausschließen, oder sich mit einem radiculospinalen oder rein spinalen Innervationsbezirk decken, lassen auch kaum eine andere als eine neurotische Genese zu; daß die Gefäße ebenso wie die Nerven verlaufen — eine oft wiederholte Behauptung der Anhänger der Gefäßtheorie — ist, wie erwähnt, für viele Fälle ganz unrichtig. Andererseits spricht die Tatsache, daß in anderen Fällen die Ausbreitung des Nerven nicht folgt, nicht gegen unsere Auffassung, da man sich den krankmachenden Reiz ja in mannigfach disseminierter Weise über die betreffenden Teile des Nervensystems ausgebreitet denken kann.

Mit einer Auffassung haben wir uns noch etwas eingehender zu beschäftigen. Wie schon erwähnt ist die bandförmige Anordnung der Sklerodermie von einer Reihe von Autoren nicht auf einen Zusammenhang mit dem Nervensystem bezogen worden, sondern als Ausdruck einer Erkrankung gewisser embryonaler Abschnitte angesehen worden; man nahm auf diese Weise eine Erkrankung einzelner Dermatome, Myotome und Sklerotome an. Es waren besonders die von Blaschko durchgeführten Forschungen über den *Suerus*, die zu dieser Auffassung Veranlassung gaben. Diese Analogisierung gibt nun aber zu schweren Bedenken Anlaß, auf die ich alsbald eingehen will, nachdem ich eine interessante Beobachtung von Kalb, einem Schüler Bettmanns, der sich in der Deutung seines Falles als überzeugter Vertreter dieser Auffassung erweist, kurz mitgeteilt habe.

Gähriges Kind, Mutter sehr nervös. Im 2. Lebensjahr spontane Entstehung eines Geschwürs an der Außenseite der rechten Tibiakante; es wurde rasch handtellergroß, sehr schmerzhaft, mit geringer Eiterung. Drei Wochen später wurden Veränderungen am rechten Unterschenkel, rechten Fuß und zum Teil auch Oberschenkel bemerkt, das Haar, grau, gelbe, rote Verfärbung zeigte. Der rechte Unterschenkel wurde allmählich immer dünner, das rechte Bein kürzer. Das Kind lag so zu hinken, es traten verschiedene Geschwüre auf. Bei der Untersuchung fand ich nur ein ungewöhnlich starkes Zurückbleiben des Wachstums des rechten Beins. Die

Längendifferenz betrug für das ganze Bein 2 cm, die Differenz des Umfangs des Oberschenkels 4–7, ebensoviel die der Waden. Die Haut ist namentlich im Bereich eines Bandes, das dem fünften Lumbalsegment entspricht, verengt, dick, trocken, glatt, glänzend, gespannt, abnorm pigmentiert resp. depigmentiert. Die Muskulatur ist stark atrophisch, fällt sich zum Teil etwas darüber an; die Knochen des Ober- und Unterschenkels zeigen im Röntgenbild eine ausgesprochene Verschmälzung, doch ist der Knochenstoff nicht abnorm hell. Außerdem findet sich bei der Pat. noch eine Pigmentierung und zwar im Bereich des seiten Lumbalsegmentes mit leichter sklerodermatischer Veränderung an einem Teil des Segments über dem Ansatz der Adduktorensehnen; weiter finden sich noch Pigmentierungen im Bereich des sechsten und siebenten Dorsalsegmentes; und zwar genau von der Axillarlinie bis zur Mittellinie sich erstreckend, d. h. dem ventralen Dermatom entsprechend; schließlich ist noch eine leichte Pigmentierung im ventralen Teil des sechsten bis elften Dorsalsegmentes nachweisbar. Alle Veränderungen sitzen streng halbsitzig, die linke Körperhälfte ist bei vor jeder Schädigung.

Kalb nimmt nun zur Erklärung eine Herabsetzung der histogenetischen Energie im Bereich der angegebenen Metameren an. „An den energiegelochwächten Metameren kam es zur Auslösung eines pathologischen Prozesses und zugleich unter der Einwirkung unvermeidlicher an den normalen Körperstellen nicht einwirkender Reize zur Herabsetzung der Wachstumspotenz. Warum bei dem schwachen Widerstand dieser Metameren gegen Reize von den vielen pathologischen Prozessen hier gerade Sklerodermie entstand, wissen wir nicht.“ Kalb ist geneigt, anzunehmen, daß es sich um eine primäre Gefäßerkrankung handelt, deren letzte Ursache wir nicht kennen. So erfährt, wie man sieht, das Problem eigentlich nur eine Verschiebung. Denn daß die „Herabsetzung der histogenetischen Energie“ die Entstehung der Sklerodermie nicht erklärt, muß auch Kalb, so wie die anderen Autoren, die ähnlichen Anschauungen heidigen, zugeben. Es handelt sich, wenn wir uns den sklerodermatischen Prozeß näher ansehen, auch gar nicht um eine Herabsetzung der histogenetischen Energie, es handelt sich um einen durchaus scharf umschriebenen und histologisch sicher charakterisierten, sehr aktiven Krankheitsprozeß, der offenbar einen ganz bestimmten Reizzustand zur Voraussetzung haben muß. Der Hinweis auf die bestimmten embryonalen Anlagen entsprechende Lokalisation würde also überhaupt nur den Wert haben können, für die Fälle von Sklerodermie en bande die besondere Abgrenzung zu erklären und die aus der supponierten Übereinstimmung zwischen spinalen und radikulären Segmenten und den sklerodermatischen Bändern entnommene Stütze der neurotischen Theorie der Sklerodermie zu entkräften. Damit steht und fällt aber nicht etwa diese neurotische Theorie, wie aus meinen bisherigen und den nachfolgenden Auseinandersetzungen zur Genüge hervorgeht. Zu alledem kommt, daß diese Auffassung einer nach der embryonalen Gliederung sich richtenden Lokalisation der Sklerodermie en bande durchaus nach der weiteren Begründung bedarf.

Die Beschränkung der Veränderungen auf eine Körperhälfte, die

der Fall von Kallb mit einer geringen Anzahl von anderen (Pelizaens, Steven, Lewin-Heller, Bergson, Sternthal, Riehl, Kapori, Tontou, Adrian, Napp, Anitschkow) gemeinsam hat, kann naturgemäß auch auf eine gewisse kongenitale Inferiorität bezogen werden. Interessant sind in dieser Beziehung Ausführungen von Stier, die er über den Sitz der Hemiatrophia faciei bei Rechts- beziehungsweise Linkshändern gemacht hat, und die ebenfalls im Sinne einer angeborenen Disposition verwendet werden können, freilich noch der Bestätigung bedürfen. Diese einseitig lokalisierten Sklerodermien finden ihre Ergänzung in den seltenen Fällen von einseitiger totaler erworbener Atrophie resp. Hypertrophie, über die noch zu sprechen sein wird. Aber alles das überlebt uns nicht der Notwendigkeit nach den spezielleren Bedingungen der Entstehung der also lokalisierten Veränderungen zu forschen — und da werden wir meines Erachtens immer wieder auf das Nervensystem geführt.

Ein letzter sehr wichtiger Faktor, der zugunsten des Nervensystems spricht, ist die von uns mehrfach hervorgehobene Tatsache der engen Verwandtschaft der Sklerodermie mit der Raynaudsehen Krankheit (und anderen vasomotorisch-trophischen Neurosen). Wir sahen ja klinisch die Symptome der Asphyxie und Synkope locale in der Symptomatologie der Sklerodermie eine große Rolle spielen. Oft waren Jahre und selbst Jahrzehnte diese Erscheinungen der Sklerodermie vorausgegangen, und auch die trophischen Symptome der beiden Krankheiten können einander außerordentlich ähnlich werden. Wir mußten so auf Grund zahlreicher Übergangsfälle eine enge Verwandtschaft beider Affektionen annehmen, eine Verwandtschaft, die so eng ist, daß, wenn wir der Raynaudsehen Krankheit eine neuropathische Genese zugeschrieben haben, wir gar nicht anders können, als dasselbe auch für die Sklerodermie anzunehmen. Und da nach unserer Auffassung die Sklerodermie im großen und ganzen eine einheitliche Affektion ist, müssen wir die Annahme einer neuropathischen Genese dieser Krankheit auf alle ihre Erscheinungsformen ausdehnen. Es ist nicht schwer zu verstehen, daß bei modifizierter Einwirkung der Krankheitsursache, z. B. durch einen chronisch-progressiven, nicht intermittierenden und dabei lokal beschränkten Reiz statt der gewohnten Mannigfaltigkeit der Symptome einmal nur eine einformig-progressiv Ernährungstörung in Erscheinung tritt. Auch die enge Verbin dung mit der Hemiatrophia faciei, die meist und, wie ich glaube, mit Recht als nervösen Ursprungs angesehen wird, weist für die Sklerodermie auf das Nervensystem.

Halten wir an der Annahme fest, daß die Sklerodermie eine nervöse Affektion ist, so fragt es sich, wo greift die krankmachende Ursache im Nervensystem an und welcher Art ist sie? Darüber haben wir nur Vermutungen. Ich verweise zum Teil auf die

Ausführungen in dem entsprechenden Abschnitt des vorigen Kapitels. Es ist zweifelhaft, ob in dieser Beziehung die Sklerodermie einheitlich bedingt ist. Es wäre wohl denkbar, daß einmal mehr periphere, ein anderes Mal mehr centrale Gebiete befallen sind, aber doch offenbar immer Gebiete desselben Systems. Das erstere würde insbesondere für die Fälle mit einer einem bestimmten Nerven entsprechenden Ausbreitung gelten. Doch könnten wir sehr wohl verstehen, daß durch irgendeine Affektion der Nerven leichtester Art, die sonst nicht zu motorischen und sensiblen Ausfalls- oder Reizerscheinungen führt — höchstens daß Schmerzen entstehen — daß durch eine solche Affektion reflektorisch die nervösen Centren beeinflusst werden und auf diese Weise eine Störung der Trophik und ebenso auch der Vasomotilität zustande kommt.

Besnier et Doyon betonen mit Nachdruck, daß die Beschränkung einer Hautveränderung auf ein Nervengebiet nur anzeigt, daß das nervöse Element bei der Krankheit eine wichtige Rolle spielt, aber daß damit nicht bewiesen ist, daß die Hautaffektion eine Trophoneurose ist. „Elle (la localisation) établit seulement que l'élément pathologique essentiel de la maladie lequel peut être très variable a été dominé sur un territoire nerveux.“ Für die Fälle mit ausgesprochener Symmetrie und besonders mit ausgesprochener Halbseitigkeit der Symptome werden wir von vornherein am ehesten an die zentralen Gebiete zu denken haben. Bei der wichtigen Rolle, die vasomotorische Störungen im Krankheitsbild spielen, und bei den engen Beziehungen zur Raynaud'schen Krankheit werden wir bei einem Lokalisationsversuch natürlich wieder zuerst an die vasomotorischen Bahnen und Centren denken. Es ist auch hier wieder zu berücksichtigen, daß keineswegs sicher ist, daß alle Fälle von Sklerodermie dieselbe Lokalisation haben, wenn wir auch geneigt sein werden, für alle Fälle dieselben Abschnitte des Nervensystems als hauptsächlichsten Sitz der Krankheit in Anspruch zu nehmen. In Übereinstimmung mit den von mir im vorigen Kapitel gemachten Ausführungen und konform den besonders von Lewin und Heller und von Brissaud ausgesprochenen Ansichten werden wir die krankmachende Ursache der Sklerodermie an den verschiedenen Stellen im Nervensystem zu suchen haben, an denen das sympathische System im engeren Sinne vertreten ist. Für unsere Lokalisationsversuche werden uns einmal die Lokalisation der sklerodermatischen Veränderungen, dann aber auch die Begleitsymptome maßgebend sein. Da gerade bei der Sklerodermie mehr noch als bei den anderen vasomotorisch-trophischen Neurosen sensible Ausfallssymptome ganz in den Hintergrund treten, und auch Schmerzen und Parästhesien keine große Rolle spielen, wird man daran denken können, Gebiete ins Auge zu fassen, in denen das Vasomotoren-system ohne reichliche Bei-

mischung sensibler Elemente und ohne Nachbarschaftsbeziehungen zu solchen vertreten ist. Das wäre der Grenzstrang des Sympathicus und seiner Ganglien. Jedenfalls wird die weitere pathologisch-anatomische Forschung Grund haben, diese Gebiete mit allen modernen histologischen Methoden zu durchforschen, was bisher noch nicht geschehen konnte. Irgendein besonderer Schluß kann aber gewißlich nicht aus dem Fehlen der sensiblen Erscheinungen gezogen werden, das braucht ja durchaus nicht nur auf den Ort der Reizung zurückzuführen zu sein, sondern kann in enger Verbindung zur Art der Läsion stehen. Es muß also in der Tat das ganze Vasomotoriensystem berücksichtigt werden. Daß wir aber mit der Annahme einer reinen Angioneurose nicht auskommen, sondern die Krankheit als Angiotrophoneurose auffassen müssen, ist schon mehrfach betont worden und geht auch aus unseren allgemeinen Anschauungen ohne weiteres hervor.

Die Sklerodermie ist nicht durch grobe Veränderungen im Nervensystem hervorgerufen. Das haben wir aus den anatomischen Befunden bereits festgestellt. Es entspricht dies auch sonst allen Erfahrungen. Eine Zerstörung der supponierten vasomotorischen Centren resp. der Teile, die mit der Aufrechterhaltung der Trophik der Gewebe betraut sind, ruft die Erscheinungen der Sklerodermie nicht hervor. Das sehen wir in den zahlreichen Fällen, wo diese sicher ausgeschaltet sind, z. B. bei Querschnittsläsionen des Rückenmarks. Die schwersten trophischen Veränderungen bei organischen spinalen Erkrankungen sehen wir noch bei der Gliose, wo jedenfalls ein sehr langdauernder Reiz (durch die Wucherung des gliösen Gewebes) die Ursache ist. Noch weniger palpabel, noch leiser wird nach unserer Annahme der Reiz sein müssen, der die nervösen Organe bei der Sklerodermie trifft, und so zu pathologischen Wirkungen veranlaßt. Dem Reiz, der von den supraindinierten Centren ausgeht, können sich die untergeordneten Centren nicht entziehen, während diese dort, wo die höheren Centren zerstört sind, mit gutem Erfolge deren Funktion wieder übernehmen können (s. die physiologische Einleitung).

Wir wissen natürlich nichts Näheres über die Art dieses Reizes bei der Sklerodermie. Er kann vielleicht auf mannigfache Weise produziert werden, durch Infektionen, durch exogene oder endogene Intoxikationen und reflektorisch. Für alle diese verschiedenen Modalitäten würden sich klinische Belege erbringen lassen. Er kann akut oder chronisch einwirken, und seine Wirksamkeit ist eine örtlich offenbar oder wechselnde. Als Kern der Krankheit darf man gleichsam den Zustand betrachten, in dem durch ihn nur die Trophik der Gewebe — welcher Art auch immer — gestört wird. Darum gruppieren sich die Fälle, in denen die Gefäßinnervation alteriert ist, in denen durch Reizung der sensiblen Bahnen Schmerz ausgelöst

wird, und in denen damit der Übergang zu den anderen vasomotorisch-trophischen Neurosen, namentlich zur Raynandschen Krankheit gegangen ist.

Grasset legt ganz besonderen Wert darauf, zu betonen, daß die nervöse und die toxische Theorie einander nicht ausschließen, daß es sehr wohl anging, diese beiden miteinander zu vereinigen, wenn angenommen wird, wie er das tat, daß irgendein Toxin, Syphilis, Tuberkulose, Rheumatismus, exogene oder endogene Gifte und Stoffwechselstörungen, die Ursache für die Schädigung des Nervensystems abgibt. Er reißt damit offene Türen ein. Wie schon in den vorhergehenden Zeilen betont ist, wissen wir über die Art der das Nervensystem treffenden Schädlichkeiten nichts Bestimmtes, müssen aber gewillt zugeben, daß diese variieren können und daß jedenfalls die klinischen Erscheinungen von Intoxikationen, Infektionen, Stoffwechselanomalien, die die betreffenden Kranken aufweisen, Beachtung verdienen. Für diese Fälle mußten wir mit der Möglichkeit rechnen, daß das ätiologische Moment der Krankheit durch eines dieser Toxine bestimmt ist; aber der Sitz der Krankheit bleibt damit doch das Nervensystem, in der früher geschöbten Abgrenzung; und ferner, da bei der Mannigfaltigkeit und der Banalität vieler der genannten Schädlichkeiten eine spezifische Einwirkung so gut wie ausgeschlossen ist, ist das Wesen der Erkrankung eben doch in dem Zusammenwirken von neuropathischer Disposition bestimmter Art und Giftwirkung zu sehen. Dazu kommt noch, daß unzweifelhaft eine ganz große Zahl von Fällen zur Beobachtung kommt, in denen auch klinisch durchaus jeder Anhaltspunkt für eine Intoxikation fehlt und das ganze Symptomenbild streng auf die allmähliche Entwicklung der trophischen Störungen sich beschränkt. Hier erscheint es mir viel besser, unsere Unkenntnis einzugestehen, als um jeden Preis eine Autointoxikation zu postulieren, die sich durch kein Symptom verrät und auf keine uns bekannte Weise nachweisbar ist.

Ein paar Worte seien hier noch über die Pathogenese der einzelnen Symptome und ihr Verhältnis zueinander angefügt.

Am wenigsten Schwierigkeiten machen uns die Störungen der Vasomotilität beziehungsweise die ödematösen initialen Erscheinungen. Über die ersteren ist im Kapitel Raynandsche Krankheit das Nötige gesagt; was das Ödem angeht, so werden wir uns im nächsten Abschnitt damit noch ausführlich zu befassen haben, ich möchte hier nur betonen, daß nach meiner Auffassung eine rein vasomotorische Genese des Ödems nicht möglich erscheint. Die die pathologische Anatomie der Sklerodermie beherrschenden Veränderungen der Gefäße sind im Lichte unserer Auffassung gesehen den Gewebsveränderungen nur koordiniert, nicht als Ursache der Gewebsveränderungen anzusehen. Bei dieser Gelegenheit verweise ich wieder auf die schon mehrfach herangezogenen Untersuchungen und Experimente von Lapinsky,

von denen ich eine erhebliche weitere Förderung der uns hier beschäftigenden Fragen erhoffe. Die Möglichkeit einer Erkrankung der Blutgefäßdrüsen sei es der einen oder der anderen, ist, wie schon früher erwähnt, mit der nervösen Theorie in dem Sinne vereinbar, daß das Vasomotoriensystem für diese Drüsen ja zweifellos von fundamentaler Bedeutung sowohl in nutritiver wie in funktioneller Beziehung ist. Manche Symptome (Permentierungen, Schädigungen des Allgemeinzustandes) und Kombinationen (Beziehungen zur Basedowischen und Addisonischen Krankheit), selbst gewisse therapeutische Erfolge würden auf diesem Wege einer Erklärung zugänglich werden. Die Auffassung, daß eine Erkrankung einer der Blutgefäßdrüsen ein notwendiges Zwischenglied für die Genese der Sklerodermie bilde, wird von Huismans vertreten. „Da der Sympathicus mit seinen Ganglien sich für Blutdrüsen und Gefäße wie ein nutritives Centrum verhält, so wird durch eine Unterbrechung seiner Leitung, welcher Art sie auch sei, eine Ernährungsstörung in diesen Organen hervorgerufen und so der Weg für eine sekundäre Infektion derselben geebnet. Die Sklerodermie ist also nicht in allen Stadien eine reine Neurose. Eine Neurose des Sympathicus bahnt wohl den Weg zum Ausbruch der Krankheit, sie ist aber nicht imstande allein eine Sklerodermie hervorzurufen. Dazu bedarf es einer sekundären Infektion von Blutdrüsen und Gefäßen.“ Wenn ich von dem unglücklich gewählten Ausdruck Infektion abstehe, könnte ich mich wohl mit einer solchen Auffassung, die der meinigen ja sehr nahe steht, befreunden — unter der Voraussetzung, daß klinische Erscheinungen, die eine Affektion der Blutdrüsen wahrscheinlich machen, in einiger Regelmäßigkeit vorhanden wären. Daran fehlt es noch, aber vielleicht bringen zukünftige Forschungen hier neue Tatsachen ans Licht.

Diagnose.

Die Diagnose der Sklerodermie wird in der Mehrzahl der Fälle nicht schwierig zu stellen sein. We rimal die charakteristische Veränderung der Haut ausgebildet ist und diese ihre harte, pergamentartige, glatte, unverschiebbliche und faltenlose Beschaffenheit angenommen hat, und wo nebenbei noch abnorme Pigmentierung, Haarausfall, Asphyxie und Synkope locale das Bild vervollständigen, wird die Diagnose rasch und ohne Zaudern gestellt werden können. Selbst dann, wenn noch nirgends das atrophische Stadium erreicht ist, wird die Diagnose meist leicht sein. Neben den genannten positiven Kennzeichen kommen als negative das Fehlen motorischer Ausfallserscheinungen ebenso wie von Anästhesien scharf umschriebenen Charakters in Betracht. Auch Schmerzen fehlen oft, und wenn sie vorhanden sind, zeichnen sie sich jedenfalls durch ihre unbestimmte, unsichere, diffuse Verbreitung aus.

Große Schwierigkeiten kann das Anfangstadium der Affektion bieten, ferner eine allgemeine Lokalisation der Veränderungen, wenn nicht mehr zuerst die Haut, sondern die tiefer liegenden Teile, die Schleimhäute, das Unterhautgewebe, die Knochen, Muskeln und Gelenke befallen werden.

Im Anfang kann die Diagnose völlig unmöglich sein. Der Beginn kann an die Akroparästhesien erinnern, wenn nur, wie bei einer Kranken Hellers, vermehrtes Kältegefühl und Schwerbeweglichkeit der Finger vorhanden ist. Überhaupt sind es gerade die verwandten vaskulär-trophischen Neurosen, von denen anfangs bisweilen eine Abgrenzung unmöglich ist. Daß Asphyxie locale und Synkope locale lange vorausgehen können, habe ich erwähnt, und ich habe bereits eingehend erörtert, wie die Raynaudsche Krankheit und die Sklerodermie zueinander stehen.

Gelegentlich können sich einmal Anfälle von aktiver Hyperämie mit Rötung und Schmerzen die Scene einleiten (Viand, Nicolich, du Casal, Savill, Bruns), dann ist eine Unterscheidung von der Erythromelalgie schwierig oder unmöglich. Auch diese beiden Affektionen sind eben nahe verwandt. Wir sahen bei Beschreibung der Erythromelalgie, daß es bei längerem Verlauf des Leidens, oftmals unter Verwischung der Anfälle, zu trophischen Veränderungen an den Akra kommt. In solchem Fall wird selbst für die späteren Stadien die Differenzierung beider Krankheiten unmöglich und nach unserer Ansicht auch unzweckmäßig; nach hier berühren sich die Endglieder der Kette, und eine scharfe Grenze hier zu ziehen, wäre unerlaubter Schematismus, so unbecquem unserem Ordnungsbedürfnis diese Tatsachen sein mögen. Immerhin sind aber die Beziehungen zwischen Sklerodermie und Erythromelalgie nicht so eng, wie die zwischen Sklerodermie und Raynaud-scher Krankheit.

Sehr eng sind sie dagegen zwischen Sklerodermie und einer Affektion, die wir schon mehrfach erwähnt haben, der Hemiatrophia faciei progressiva, Möbius, dem wir die letzte ausführliche Beschreibung der Hemiatrophie verdanken, sagt über diesen Punkt folgendes: „Am schwierigsten kann die Unterscheidung zwischen Sklerodermie und umschriebenem Gesichtschwind werden. Freilich die allgemeine Sklerodermie, wie sie gewöhnlich vorkommt, ist so charakteristisch, daß sie niemand verwechseln kann, aber die seltenen Fälle umschriebener Sklerodermie sind schwerer zu beurteilen. Eulenburg hat darauf aufmerksam gemacht, daß offenbar nahe Beziehungen zwischen Sklerodermie und umschriebenem Gesichtschwind bestehen. Auch ich glaube, daß beide Krankheiten sehr nahe verwandt sind,

und daß eine prinzipielle Scheidung überhaupt nicht angebracht sei. Sollte circumscripte Sklerodermie sich im Gesicht zeigen, so wird oft die stärkere Infiltration der Haut, die sie hart und einer Speckschwarte ähnlich macht, für Sklerodermie und gegen umschriebenen Gesichtsschwund entscheiden. Es kann aber wahrscheinlich die Infiltration auch weniger ausgeprägt sein und dann wird das Resultat dem umschriebenen Gesichtsschwund sehr ähnlich sein. Umgekehrt scheint bei diesem zuweilen im Anfang eine Schwellung der Haut zu bestehen.“ Eulenburg hat über diesen Gegenstand in seiner von Möbius zitierten Arbeit — aus dem Jahre 1882 — folgendes ausgeführt. Er findet eine große Übereinstimmung sowohl der anatomischen als der klinischen Hautveränderungen: die Spannung, Trockenheit, das Eingesenkenwerden der Haut, ihre helle, glänzende, stellenweise bräunliche Verfärbung, der Anfall der Haare, das Schwinden des Unterhautfettgewebes, die Atrophie der Muskeln und Knochen, die Anomalien der Circulation und der Temperatur und dem gegenüber die Integrität der Sensibilität und Motilität, abgesehen von sekundärer Beeinträchtigung derselben, sind beiden Affektionen gemeinsam. Unterschiede sucht Eulenburg darin, daß die Hemiatrophie meist einseitig, die Sklerodermie meist doppelseitig vorkommt, aber er gibt selbst zu, daß diese Regel für beide Teile Ausnahmen hat, ferner gehe bei der Sklerodermie dem atrophischen Stadium ein hypertrophisches voraus. Aber er wendet selbst ein, daß es auch Fälle krankhafter Hypertrophie einer Gesichtshälfte gibt, und daß außerdem z. B. bei den verschiedenen Formen der Dystrophie der Muskeln auch atrophische und hypertrophische Zustände nebeneinander vorkommen. Dem wäre noch hinzuzufügen, daß auch bei der Sklerodermie das hypertrophische Stadium nicht immer vorhanden oder scharf ausgeprägt ist. Also bleibt wohl nichts anderes übrig als zuzugestehen, daß eine prinzipielle Trennung zwischen Sklerodermie und Hemiatrophie nicht möglich ist.

Diesen von mir in der ersten Auflage dieses Buches vertretenen Standpunkt muß ich auf Grund des seitdem in der Literatur niedergelegten Materials und auf Grund meiner eigenen Erfahrung durchaus festhalten.

Trotzdem ich also die Wesenseinheit von Sklerodermie und Hemiatrophie vertrete, habe ich im vorhergehenden auf eine eingehendere Berücksichtigung der hierher zu rechnenden Fälle von Hemiatrophie verzichtet. Die Krankheit hat wiederholt eine ausführliche Schilderung erfahren, zuletzt von Möbius, und ich verweise in bezug auf zahlreiche klinische und ätiologische Einzelheiten auf dessen Beschreibung, ebenso wie auf die Darstellung in Oppenheim's Lehrbuch. Ich will an dieser Stelle nur ein paar Punkte, die mir für die allgemeine Auffassung meines Themas von Wichtigkeit zu sein scheinen, hervorheben, insbesondere diejenigen ätiologischen, kli-

nischen und anatomischen Tatsachen berücksichtigen, die für die Auffassung der Pathogenese des Leidens von Wichtigkeit sind. Ich folge damit gleichsam einem Gebot historischer Gerechtigkeit, denn die Hemiatrophie ist diejenige Erkrankung, von der die Lehre von den Trophaneurosen ausgegangen ist. Im Anschluß daran sollen auch die Fälle von Hemiatrophia totalis und ferner die von Hemihypertrophia faciei und Hemihypertrophia totalis besprochen werden.

Die Hemiatrophia faciei ist wohl im ganzen kein so gar seltenes Leiden; mir wenigstens ist sie, auch in ganz ausgeprägter Form, erheblich häufiger als die Erythromelalgie begegnet. Ich sah in der Poliklinik im Laufe der letzten 10 Jahre mehr als ein halbes Dutzend Fälle; auch eine Reihe anderer Autoren haben eine Reihe von Fällen aus eigener Erfahrung beschrieben. Korn fand 1910 in der Literatur 189 Fälle, von denen aber eine Anzahl als nicht echt ausfallen dürfte.

Das Leiden tritt im jugendlichen Alter auf.

Nach Klingmann befanden sich unter 83 davon betroffenen Kranken

| | |
|----|---------------------------|
| 29 | unter 10 Jahren |
| 37 | zwischen 10 und 20 Jahren |
| 17 | zwischen 20 und 30 Jahren |

Zwei Drittel der von dem Leiden Betroffenen sind Frauen. Mit erheblicher Bevorzugung wurde die linke Seite befallen, 61 mal unter 83 nach der Statistik von Klingmann. Eine besondere Berücksichtigung und eine interessante Deutung hat diese Bevorzugung der linken Seite letzthin in verschiedenen Vorträgen von Stier gefunden. Dieser fand alle hypoplastischen Bildungen auf der linken Seite viel häufiger z. B. die Syndaktylie; dazu gehört nach seiner Auffassung auch die Hemiatrophie, die er in Bestätigung seiner Anschauung bei einem 11-jährigen linkshändigen Kinde rechts — also auch hier auf der „inferioren“ Seite fand. Demgegenüber stellte er fest, daß die hypertrophischen Bildungen die „superiore“, bei Rechtshändern also die rechte Seite bevorzugen, wie mehrfache Mamillen in 39 von 43 Fällen rechts saßen, ebenso wie die Hemihypertrophien.

Von ätiologischen Momenten hebe ich das mehrfach angeführte Trauma hervor. Wenn der Zusammenhang zwischen Unfall und Krankheit zähhch und örtlich ein enger ist, wird man es im Sinne eines disponierenden Momentes wohl verwerten müssen; so in einem Fall von Hoffmann: 10-jähriger Knabe, im 6. Lebensjahr fiel er mit der rechten Wange auf die Kante des Trottoirs und erhielt eine Wunde unter der rechten Orbitalwand. An dieser Stelle bildete sich einige Monate später eine blasse Stelle und allmählich blieb die rechte Gesichtshälfte in der Entwicklung zurück.

Natürlich ist oft das Vorzeichen einer Infektionskrankheit

notiert; bei einem häufig im Kindesalter auftretenden Leiden ist das nicht zu verwundern; eine Beziehung zwischen der Infektionskrankheit und dem Leiden war niemals deutlich.

In Rücksicht auf die allgemeinen in unserem Gebiet gemachten Erfahrungen scheint mir eine Angabe von Bannester bemerkenswert, der das Auftreten von Frostbeulen erzählt, ebenso wie ein Fall von Klingmann und Heilmann, bei dem erst eine Frostbeule in der rechten Supraorbitalregion entstand, dann sich dort eine Neuralgie einstellte und einige Monate später die Atrophie begann.

Sehr bemerkenswert ist die Angabe Oppenheims, daß in zwei seiner Fälle eine schwere neuropathische Belastung vorhanden war; in einem dritten waren die Eltern blutsverwandt und eine Schwester litt an kompensatorischer Hüftgelenkdislocation.

Zwei meiner Patienten waren geistig zurückgeblieben, eine wiederholt nach sonst konstatierte Tatsache, einer stellterte in erheblichem Maße seit der Jugend. Komplikationen mit anderen Erkrankungen des Nervensystems sind bei diesem Leiden überhaupt nicht selten. Es wurde zusammen mit Epilepsie und Psychose, mit Chorea, Spasmen der Gesichts-, Kiefer-, Zungenmuskeln, mit Zwangsvorstellungen und psychasthenischen Krämpfen (Oppenheim), mit angeborener Augenmuskellähmung (Oppenheim) auch einige Male in Verbindung mit Tabes und multipler Sklerose gesehen. Auf das Vorkommen von Hemiatrophie bei Syringomyelie komme ich noch zu sprechen.

Die Krankheit entwickelt sich stets allmählich.

Von großem Interesse ist die Ausdehnung des Leidens. Die so häufig beobachtete strenge Halbseitigkeit und Beschränkung auf ein Nervengebiet mußte von vornherein die Idee einer neurogenen Einwirkung hervorrufen. Eine Gesichtshälfte wird befallen. Der Prozeß setzt an irgendeiner Stelle, anscheinend meist in den medialen Partien ein, am inneren Orbitalrand, am Nasenflügel, am Mundwinkel beziehungsweise Ober- und Unterkiefer, und breitet sich dann ganz allmählich aus. In Fällen von Oppenheim und O. Fischer war die unterste Kinngegend und das obere Halbdreieck zuerst affiziert. Die Atrophie kann sehr hochgradig sein, wie die S. 662 gegebene Abbildung des 9-jährigen Knaben zeigt, bei dem namentlich die medialen Partien am Auge und der Nase sehr stark betroffen sind. Von da aus gibt es alle Übergänge bis zu einem Zurückbleiben in der Entwicklung einer Gesichtshälfte, das nicht mehr als pathologisch aufgefaßt werden kann.

Einige Male dehnte sich der Prozeß auf die andere Seite aus (Hiller, Gaudère, Oppenheim, Wasservogel, Störmann, Rütten, Wolff, Schlexinger); die andere Seite war meist nur in geringem Maße betroffen. Ein Fortschreiten über die Grenzen des Gesichts beziehungsweise des Trigemini wurde auch beobachtet. Der Schädel

wurde anscheinend allerdings stets nur in seinem vorderen Abschnitt, soweit das Innervationsgebiet des Trigemini reicht, betroffen; in dem Fall, von dem die Photographie Fig. 15 stammt, reicht die Atrophie allerdings recht weit nach hinten. Daß das vordere Halsdrüeck sogar schon im Beginn befallen werden kann, wurde schon erwähnt. Darüber hinaus wurden vereinzelt Veränderungen auch am Arm der gleichen Seite gefunden (Collins, Benveniste), und in einzelnen Fällen eine wirkliche Hemiatrophia totalis homolateralis oder cruciata beobachtet. Diese Fälle bespreche ich noch gesondert.



Fig. 15

Hemiatrophia faciei bei einem 9-jährigen Knaben.



Fig. 16

Hemiatrophia faciei, mit sehr starken Pigmentverschiebungen.

Die Veränderungen betreffen mit einer ganz auffälligen Regelmäßigkeit neben den oberflächlichen Partien (Haut und Unterhautfettgewebe) auch die tiefer gelegenen Teile, insbesondere die Knochen. Die Regelmäßigkeit, mit der der Knochen mit befallen wird, ist gewiß bemerkenswert, bedingt aber aus den oben erwähnten Gründen doch keinen fundamentalen Unterschied gegenüber anderen Formen der Sklerodermie, bei der ganz gleiche Knochenveränderungen eben doch, wenn auch seltener auftreten.

Die Schilderung der Veränderungen im einzelnen kann hier unterbleiben. Wir finden alles das wieder, was wir bei der Sklerodermie ausführlich beschrieben haben: die Verdünnung der Haut, stellenweise aber im ganzen selten auch eine Infiltration, den Schwund des Unterhautgewebes, die festere Verwachsung der Haut mit den tiefer liegenden Gehäuten insbesondere mit dem Knochen, die Veränderungen des Pigments im Sinne der Pigmenthypertrophie und Atrophie (siehe Fig. 16).

die Anomalien des Haarwachstums, die insbesondere auch auf der beigegebenen Abbildung Fig. 15 sehr deutlich zum Ausdruck kommen, ebenso wie das Hervortreten von erweiterten venösen Hautgefäßen, schließlich die weitgehenden Knochenveränderungen, die bald mehr eine allgemeine gleichmäßige Atrophie, bald mehr eine unregelmäßige Rinnen- und Deffenbildung darstellen, alles das vereinigt sich zu einem charakteristischen Gesamtbilde. Der Prozeß schreitet nur sehr allmählich fort; doch kommt es anscheinend in späteren Stadien immer zu einem Stillstand.

In einer Anzahl von Fällen sind, wie auch bei der Sklerodermie die Muskeln befallen (Gesichts-, Kau-, Zungenmuskeln); darüber berichten Calmette et Pages, Mailhouse, Heinemann u. a. Eine Beteiligung des Stimmbandes wird von Schlessinger und Körner erwähnt. Höflmayer, Williamsen, Heinemann sahen eine Atrophie des harten Gaumens. Gowers glaubt, daß derartige Veränderungen in seinen Fällen sekundär dadurch entstanden seien, daß durch die Knochenatrophie die entsprechenden Kanäle und Foramina verkleinert seien, und auf diese Weise ein Druck auf die durch diese ziehenden Nerven (N. facialis, acusticus, vagus, accessorius) ausgeübt würde.

Von besonderer Bedeutung für die Auffassung der Entstehung des Leidens sind die Symptome, die auf eine Affektion des Trigeminus und Sympathicus hinweisen. Über den Trigeminus ist nicht viel bekannt geworden, nur neuralgische Beschwerden in seinem Gebiet sind häufig, meist aber sind die Schmerzen nicht von der vehementen Heftigkeit, wie die der eigentlichen Neuralgie. In einem bemerkenswerten Fall von Hoffmann gingen sehr heftige neuralgische Schmerzen 17 Jahre dem Eintritt der Hemiatrophie voraus. Oppenheim hat zweimal eine Anästhesie nachgewiesen, die die erkrankte Gesichtshälfte betraf, ohne sich streng an die Ausbreitung des Trigeminus zu binden.

Häufiger sind Sympathicussymptome. In einem Fall, dessen Mitteilung und Photographie ich Herrn Kollegen Schönfeld-Riga verdanke, waren ausgesprochene oculopupilläre Symptome (Verengung der Pupillen und Lidspalte auf der kranken Seite) vorhanden (siehe Fig. 2 auf S. 135). Über gleiche Erscheinungen sowie über andersseitige bei Erkrankung des Halsympathicus beziehungsweise seiner spinalen Centren beobachtete Symptome berichten auch andere Autoren. Bouveryon beschreibt folgende Fälle. Neben einer tuberkulösen Spitzenaffektion besteht eine Hemiatrophia faciocervicalis; es findet sich ferner eine Verengung der Lidspalte, Erhöhung der Schweißsekretion, Differenz im Kaliber der beiderseitigen Arterien (Carotis, Temporalis). In einem zweiten Fall war die Haut der erkrankten Seite heiß und rot, das Auge trübte, dabei starke Pulsbeschleunigung, alles das anfallsweise zusammen mit heftigen neuralgiformen Schmerzen im Gesicht und Hals auftretend. Ähnliche Sympathicussymptome wurden be-

erhoben von Seeligmüller, Jacquet, Jendrassik, Leskowski (rechte Papille enger als linke, rechter Augapfel eingesunken), Mailhouse (geringeres Schwitzen der kranken Seite), Ziegenweidt (linke Lidspalte weiter als rechte, Haarwachstum, Schweißsekretion links vermindert) Söderberger, Williamxon, Schlesinger, Paparkane. Daß das Ganglion cervicale supremum oft druckschmerzhaft ist, erwähnt Oppenheim. Von großem Interesse ist eine andere Beobachtung desselben Autors. In einem typischen Fall von Hemiatrophia faciei fand er außer einer erheblichen Druckempfindlichkeit des entsprechenden Sympathicus eine geschwollene Drüse in der Gegend des Ganglion cervicale supremum. Bei deren Exstirpation fand sich keine Verwachsung mit dem Nerven, aber es trat zunächst eine Besserung ein, die aber nach 5—6 Wochen halt machte. Das erinnert an die Fälle, in denen sich direkt Veränderungen am Halsympathicus fanden und neben Reizerscheinungen und Ausfallserscheinungen dieses Nerven Andeutungen von Hemiatrophia faciei; hierher gehört vielleicht schon ein Teil der oben genannten Fälle von Seeligmüller, Jacquet, dann solche von Barret, Souques, Möbius. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die schon erwähnte Tatsache hingewiesen, daß auch bei der Syringomyelie Symptomenkomplexe sich ausbilden können, die sehr an die Hemiatrophia faciei gemähen.

Anatomische Untersuchungen in reinen Fällen von Hemiatrophia faciei progressiva konnten bisher zweimal angestellt werden von Mendel und Loebl und Wiesel. Bei Mendel lag neben einer typischen linksseitigen Hemiatrophia faciei auch eine Atrophie vor, die an der Mittellinie des Rückens zwischen 4. und 7. Dorsalwirbel beginnend über die Fossa infrascapula unter Beteiligung des Muscul. infrascapularis bis zur Achselhöhle reichte und von hier aus auf die Volarseite der linken oberen Extremität übergreifend sich bis auf die Hand erstreckte. Es fand sich in sämtlichen Ästen des linken Trigemini von seiner Ursprung bis zur Peripherie eine Neuritis interstitialis proliferans (Virchow), dasselbe im linken Radialis, dagegen keine Veränderungen im Facialis.

Loebl und Wiesel beobachteten folgenden Fall:

Bei einer 30jährigen Frau finden im Alter von etwa 22 Jahren die ersten Erscheinungen des Leidens auf. Im Beginn bestanden Schmerzen im ganzen Kopf. Später trat dann eine Abmagerung der ganzen linken Gesichtshälfte ein, die allmählich im Verlaufe von zehn Monaten bis zu dem jetzt vorhandenen Zustand fortschritt. Die Schmerzen haben aufgehört. Es findet sich jetzt folgendes: Die linke Gesichtshälfte tritt gegenüber der rechten sehr stark zurück, die Haut ist dünner aber ebenso gefärbt wie rechts, keine Pigmentflecke. Der Übergang der normalen in veränderte Haut ist allmählich, die Hautveränderung überreitet nach unten die Kieferlinie um etwa einen Querfinger. Nigrosis überdermatide Verdickung. Die Sensibilität der Haut ist intakt, beide Gesichtshälften fühlen sich gleich warm

an, es besteht keine vasomotorische Störung. Die Arterien sind links vielleicht etwas stärker geschlängelt. Die Kopfskams sind beiderseits gleich, die Augenbäume sind links spärlicher als rechts. Die Muskulatur fehlt bis auf kleine Reste. Der Masseter ist durch Palpation eben nachweisbar, Lippe und Wange sind links äußerst dünn und flach. Der Unterkiefer ist links verschmälert. Ähnliches Verhalten zeigen die übrigen Anteile des linken Gesichtsskulls. Die linke Lählgasse istenger als die rechte, der linke Bulbus ist etwas zurückgezogen, die Augenbewegungen sind frei, die Pupillen reagieren weder auf Licht noch auf Akkommodation. Es bestehen Veränderungen am Ohr, die nicht näher beschrieben zu werden brauchen. Der linke harte Gaumen ist kahl so breit wie der rechte, der linke weiche Gaumen ist ebenfalls atrophisch, die linke Zungenhälfte ist kleiner und dünner als die rechte, links ist die Oberfläche auch etwas rauher, die Beweglichkeit ist ohne Störung. Schweißsekretion ist nicht verändert. Es besteht außerdem eine vorgeschrittene Lungenemphyse, der die Patientin in einigen Monaten erliegt.

Der anatomische Befund, der sehr genau erhoben wurde, ist folgender: Die Haut der Erkrankten zeigt das Bild einer Atrophie, welche sich nicht nur auf das Corium allein erstreckt — wenn auch dieser Abschnitt am stärksten geschädigt ist —, sondern auch in den tiefer liegenden Schichten der Haut Platz greift. Der epitheliale Hautanteil ist kaum am Prozesse beteiligt. Sehr stark atrophiert ist das elastische Gewebe. An der Zunge ist die Bindegewebsstruktur durchaus normal, es besteht aber eine augenfällige Atrophie der Schleimhaut sowie der Papillen. An den vom Trigeminas versorgten Muskeln findet sich das Bild schwerer atrophischer Vorgänge des Faserbündels. Verschiebung der Fasern, Verschwinden der Querstreifung, so daß die Fasern ein gleichmässiges Aussehen bekommen, Wucherung des intermuskulären Bindegewebes. An den Kauehen zeigt sich eine Atrophie aller Bestandteile. Im Trigeminal der erkrankten Seite finden sich ausgeprägte Veränderungen und zwar vom Ganglion Gasser ab bis in die peripheren Äste des Nerven. Diese bestehen in starker Kernvermehrung im Ganglion Gasser und den übrigen Ganglien des Trigeminas, weniger im Ganglion cilios mit Randierung des nervösen Faser- und Zellapparates. An den peripheren Ästen besteht eine Neuritis interstitialis pediculi wie in dem von Meinel beschriebenen Fall. Am Krankheitsgeschehen beteiligen sich somit die sensiblen Äste als der motorische Ast des Quintus. Die anatomische Untersuchung ergab ferner, daß alle vom Ganglion Gasser versorgt gelegenen, dem Trigeminal angehörigen Faser- und Kerngebiete völlig intakt waren, ebenso wie das übrige Zentralnervensystem. Das sympathische Nervensystem wurde in allen seinen Bestandteilen, Fasern, Ganglien und chemischen Systemen genau untersucht. Es ließ sich nirgends irgend etwas Pathologisches nachweisen.

Die Beobachtung von Löhl und Wiesel ist gewiß von großer Bedeutung. Aber ich habe gegen die bisherige Auffassung des Falles doch erhebliche Bedenken in der Richtung, daß es mir nicht sicher zu sein scheint, daß es sich um einen unkomplizierten Fall von Hemiatrophia faciei progressiva gehandelt hat. Das Leiden hat sich bei dieser Patientin angeblich im Laufe von zehn Monaten entwickelt und ist dann für den Rest der Lebenszeit, das heißt für 18 Jahre zum Stillstand gekommen. In der Krankengeschichte findet sich eine bisher nicht genügend gewürdigte Angabe, nämlich die Tatsache, daß eine reflektorische beiderseitige Pupillenstarre besteht. Im anatomischen Befunde ist die außerordentlich hochgradige und schwere Affektion der Kaumuskulatur von Bedeutung, und ich möchte die Vermutung aussprechen, daß es sich bei der Patientin um eine echte Neuritis des

Nervus trigeminus gelandelt hat vielleicht auf dem Boden der Laes, die im 22. Lebensjahre sich entwickelte, darauf naturgemäß in erster Linie die reflektorische Pupillenstarre hindeutet. Damit würde der Fall dann aus der Reihe der unkomplizierten Fälle von Hemiatrophia faciei progressiva auscheiden und würde seine Bedeutung für die pathologische Anatomie des Leidens naturgemäß verlieren. Er wäre dann in eine Reihe zu stellen mit denjenigen Fällen von Hemiatrophie, die sich im Verlaufe eines organischen Nervenleidens entwickeln. Von derartigen Fällen ist, wie schon erwähnt wurde, eine Anzahl bekannt geworden und einige von ihnen sind auch anatomisch untersucht worden. Es sind das die Fälle von Pöbling (Tumor der Dura), Jelly (multiple Sklerose), Mouratoff (Echinococcus der hinteren Schädelgrube), Hamén (Tumor der Dura der mittleren Schädelgrube mit Übergang auf das Ganglion Gasser), Schlesinger (Syringomyelie mit Spaltbildung in der Medulla oblongata). Da auch der pathologisch-anatomische Befund in dem Meinel'schen Falle keine eindeutige Auffassung zulässt, so müssen wir sagen, daß die pathologische Anatomie bisher ebenso wie bei der Sklerodermie auch bei der Hemiatrophia faciei progressiva uns keine sichere Grundlage für die Auffassung des Krankheitsbildes liefert.

Von den früheren Autoren ist eine ganze Reihe von Ansichten über die Pathogenese der Hemiatrophie vertreten worden. Für die eine Gruppe stellt sie das Prototyp einer Trophäurose dar (Reinberg, Samuel), für andere steht sie in direkter Abhängigkeit vom Trigeminus und wird durch eine Neuritis interstitialis prolifera hervorgerufen. Wieder andere sehen in ihr eine rein lokale Affektion, hervorgerufen durch einfachen primären Bindegewebszustand mit erhalten bleibenden elastischen Fasern und mit sekundärer Schädigung des unterliegenden Gewebes (Lande, Bitot). Von neueren Autoren vertritt Möbius eine ähnliche Auffassung. Der umschriebene Gesichtsschwund ist nach ihm die Wirkung einer örtlichen Schädlichkeit; durch die Schleimhaut oder die Haut dringt ein Gift ein, das vielleicht an Bakterien gebunden ist, vielleicht auch nicht, das die Haut langsam zum Schwund bringt und allmählich auch das Fett, die Muskeln und die Knochen beteiligt. Hier wie bei der Sklerodermie ist die Hautveränderung eine primäre. Daß der Schwund sich in vielen Fällen innerhalb einer Kopfhälfte hält, ja zuweilen geradem vor der Mittellinie Respekt zeigt, sei richtig, der Autor erklärt das so, daß die Mittellinie auch für nicht nervöse Krankheitsvorgänge eine Grenze bilden kann, da doch der Körper erst aus zwei Hälften entstanden ist und auch beim fertigen Menschen rechts und links getrennte Ernährungsgebiete sind. „Auf jeden Fall ist es mehr als gewagt, auf Grund der häufigen Halbseitigkeit des umschriebenen

Gesichtsschwundes eine neue Klasse von Krankheit, die Trophozentren aus der Erde zu stampfen."

Mir scheint die Möbius'sche Theorie aber doch an der Halbsseitigkeit des Gesichtsschwundes zu scheitern. Niemals bindet sich sonst ein örtlich hervorgerufener Prozeß an die eine Körperhälfte, weder bei den Geschwülsten noch bei den Infektionen. Ich möchte also trotz Möbius' Spott und Hohn an der Theorie von der neurotischen Genese der Hemiatrophie festhalten; ganz in Übereinstimmung mit meiner Auffassung von der Pathogenese der Sklerodermie. Für diese Auffassung sprechen eine ganze Reihe von Tatsachen, unter denen ich diejenigen hervorhebe, die auf eine allgemeine Inferiorität beziehungsweise Labilität des vasomotorischen und gesamten Nervensystems bei denjenigen Kranken, die an Hemiatrophia faciei leiden, hinweisen, ferner die Halbsseitigkeit, die begleitenden nervösen Symptome von seiten des Trigemini und Sympathicus. Auch die Annahme von Fischer, der die Lokalisation der Hemiatrophie in Beziehung zu den embryonalen Verschlußspalten zu bringen sucht, scheint mir nicht genügend gestützt zu sein.

Wenn wir nun zunächst ganz im allgemeinen das Nervensystem als den Ort der Erkrankung bei der Hemiatrophie ansehen, so bleibt weiter zu entscheiden, welche Teile des Nervensystems dafür in Frage kommen können. Ich sagte schon, daß die anatomische Untersuchung uns dafür keinen genügenden Anhaltspunkt gibt. Die klinische Betrachtung erweist sich in dieser Beziehung als etwas ergiebiger. In einer Anzahl von Fällen werden wir auf den Trigeminus selbst hingewiesen. Das sind besonders diejenigen, in denen die Trigeminusneuralgien lange vorausgehen und in denen sich dann allmählich erst die Hemiatrophie entwickelt. Andersartige Erscheinungen von seiten des Trigemini sind in diesen Fällen allerdings fast niemals nachweisbar. Häufiger sind die Symptome, die uns auch bei diesem Leiden auf den Sympathicus führen. Ich habe oben schon die klinischen Erscheinungen, die vom Sympathicus abhängig zu sein scheinen, zusammengestellt und brauche darauf nur oben noch hinzuweisen. Auch in diesem Zusammenhang möchte ich übrigens, wenn ich vom Sympathicus spreche, dies im möglichst weiten Sinne gedeutet wissen und das gesamte vegetative, im speziellen vasomotorische System dafür in Anspruch nehmen. Es wäre also sehr wohl denkbar, daß nicht sowohl die im Sympathicus selbst verlaufenden Fasern wie die an anderer Stelle vorhandenen vasomotorischen Fasern bei diesem Leiden in irgendeiner, offenbar nicht sehr groben Weise affiziert werden. Ich näherte mich mit dieser Auffassung besonders denjenigen, die Jendrassik früher vertreten hat. Er hält die Hemiatrophia faciei für eine primäre Störung jener Stelle, wo Trigeminus und Kopf-sympathicus sich in nächster Nähe befinden. Eine Erkrankung an der Schädelbasis kann nach diesem Autor zu einer Läsion der sympathischen

Kopfganglien oder der mit denselben verbundenen Retikuloen Fasern führen, eine Läsion, die ihrerseits für das Auftreten von Hemiatrophie verantwortlich zu machen sei.

Jendrassik stellt sich ferner vor, daß bei der von ihm supponierten Neuritis der Retikulären Fasern und der Sympathicusganglien irrepensible Atrophien dieser Nerven und der hingeweblichen Elemente auftreten. Greift aber das pathologische Agens auch auf andere cerebrospinale Fasern über, so kommt es zu einer peripheren ausheilungsfähigen Neuritis. Marie und Marinesco sind ebenfalls geneigt dem sympathischen Nervensystem eine Rolle in der Pathogenese der Hemiatrophie zuzurechnen, ebenso wie eine ganze Reihe von anderen Autoren, die sich dabei auf ihre klinischen Befunde, die auf eine Sympathicusaffektion hindeuten, stützen.

Daß eine enge Beziehung zwischen Hemiatrophie und Sklerodermie besteht, ist seit langem bekannt. Die darauf zu beziehenden Ausführungen von Eulenburg und Möbius habe ich oben bereits wiedergegeben. In der Folgezeit ist dann noch eine ganze Reihe von Beobachtungen veröffentlicht worden, die die enge Relation zwischen den beiden Krankheiten zu illustrieren geeignet sind. Sehr bekannt ist ein Fall von Rosenthal geworden, der bei seiner Kranken eine sklerodermatische Hemiatrophie deswegen diagnostizieren zu sollen glaubte, weil nach mehrjähriger Dauer die am Halse zuerst entstandenen Flecken noch nicht eingesunken sind, und weil man auch im Gesicht noch nichts von groben Vertiefungen sieht, außerdem sei der Prozeß im Gesicht erst später eingetreten, und müßte jetzt nach vier Jahren bereits größere Fortschritte gemacht haben. Es gibt in der Literatur noch eine ganze Reihe weiterer Fälle, die dem Rosenthalschen ähnlich sind d. h. also Fälle von Sklerodermie plus Hemiatrophie. Ich nenne die von Emminghaus, Lépine, Gibney, Newmark, Hallopeau, Nekam, Hoffmann, Nixon, Schütte, Dana, Afzelius, einen von Frommhold-Treu aus der russischen Literatur. Auch ich selbst habe einige Fälle dieser Art beobachtet d. h. also Fälle von typischer Hemiatrophia faciei gesehen, bei denen außerdem am übrigen Körper sklerodermatische Veränderungen vorhanden waren. So beobachtete ich einen 40-jährigen Mann mit einer linksseitigen Hemiatrophie typischer Entwicklung, Ausfall der Schnurbartaare, der Wimpern und Cilien. Außerdem bestanden sklerodermatische Flecke in der Höhe der 6. und 7. Rippe und am Oberschenkel. Alle diese Veränderungen saßen auf der linken Seite. Auch die linke Brustwarze war pigmentlos und haarlos. Ich verweise ferner auf meinen schon mehrfach zitierten Fall, bei dem im Gesicht resp. am Schädel atrophische Partien des Knochens vorhanden waren, während ähnliche atrophische Veränderungen am Knochen und an der Haut auch an anderen Stellen des Körpers nachweisbar waren. Ich erinnere an meinen oben mitgeteilten Fall, an den Kranken,

bei dem an der Stirn und etwas später am Mund kleine eingesunkene Stellen erschienen mit vielleicht etwas indurierten Rändern, zugleich aber auch mit einem, wenn auch ganz geringfügigen Zurücktreten der gesamten Mundpartie der betreffenden Seite. Es ist hier und in ähnlichen Fällen ganz unmöglich einen sicheren Anhaltspunkt dafür zu finden, wie man zwischen beginnender Sklerodermie und Hemiatrophie zu entscheiden hätte. Auch das Alter der Kranken gibt keine Sicherheit. Mein soeben erwähnter Patient steht noch in den 30er Jahren, also in einem für die Annahme einer Hemiatrophie, die vor dem 30. Lebensjahr beginnen soll, noch zu jungen Alter. Es ist aber wohl kaum zweifelhaft, daß die Altersgrenze überhaupt nicht mit Recht festgehalten werden kann. Es ist leicht erklärlich, daß ein vor Beendigung des Knochenwachstums einsetzender Prozeß eher und intensiver zu einer Knochenatrophie führt als ein später beginnender, und daß daraus sich notwendig starke Unterschiede ergeben.

Ingetwische sicheren Unterscheidungsmerkmale zwischen den beiden Krankheiten gibt es demnach nicht, es bleibt also wohl nichts anderes übrig als zuzugestehen, daß eine Trennung zwischen den beiden Krankheiten nicht angebracht ist. So sehen auch Hallopeau und Hutchinson die Hemiatrophie einfach als eine im Gebiet des Trigenimus lokalisierte Sklerodermie an. Sie gehört dem letzten Autor zufolge der Form an, die durch feste Verwachsung mit der Unterlage (*fixed bound condition of the skin*) ausgezeichnet ist.

Zwei einander so nahe stehende Affektionen müssen naturgemäß auch nach denselben pathogenetischen Prinzipien aufgefaßt werden. Wenn ich das darüber früher Gesagte hier noch einmal zusammenfassen darf, so scheint mir sowohl für die Sklerodermie wie für die Hemiatrophie die Wahrscheinlichkeit zu bestehen, daß sie durch Veränderungen im Vasomotorensystem bedingt sind, und daß auch die Erfahrung bei der Hemiatrophie alle diejenigen Erwägungen zu stützen geeignet erscheint, die uns bei der Erörterung der Pathogenese der Sklerodermie dazu geführt haben, diese in Abhängigkeit von dem Nervensystem und im speziellen in der oben näher geschilderten Weise in Abhängigkeit von dem Vasomotorensystem zu bringen.

Korn hat versucht Anhaltspunkte für eine exaktere Lokalisation des Krankheitsprozesses bei der Hemiatrophie larvae und bei den anderen hierher gehörigen Affektionen aufzufinden. Er ist dabei von einer Erwägung ausgegangen, die ich auch schon früher mehrfach anstellte, über die ich auch schon berichtet habe. In denjenigen Fällen nämlich, in denen allein trophische Störungen vorhanden sind, eventuell unter Beifügung von vasomotorischen Störungen, wogegen motorische und sensible völlig fehlen, ist man am ehesten geneigt an eine Affektion des Sympathicus selbst zu denken, der ja keine motorischen und sensiblen Fasern enthält. Korn hat nun angenommen,

daß in denjenigen Fällen von *Hemiatrophia faciei progressiva*, in denen gar keine Störung der Motilität und Sensibilität vorhanden ist, wegen Störungen von seiten des *Halsympathicus* nachweisbar sind, daß in diesen Fällen eine Affektion des *Sympathicus* selbst vorliegt. Sind jedoch motorische und sensible Symptome nachweisbar, so dürfte man wohl annehmen, daß die krankmachende Ursache an einer peripher gelegenen Stelle eingewirkt hat, an welcher die trophischen mit anderen funktionell verschiedenen Nervenfasern gemeinschaftlich in der Bahn des *Trigeminus* verlaufen, und daß sie zu isolierter Degeneration der trophischen Fasern geführt hat oder eine aufsteigende Neuritis zur Folge hatte, die schließlich ein sympathisches Ganglion erreichte und von dort aus die Atrophie induzierte. Er versucht auf diese Weise zu unterscheiden zwischen *Hemiatrophien* peripheren und solchen mehr centralen Ursprungs. Bei ersteren wirke die krankmachende Ursache auf die vasomotorischen Nervenfasern während ihres Verlaufes im *Trigeminus* oder *Facialis*, bei letzteren während ihres Verlaufs im *Sympathicus*. Korn geht von der Erwägung aus, daß wenn diese Überlegungen zutreffend sind, sich dann bei Fällen mit *oculopupillären* Symptomen keinerlei Schmerzen und Motilitätsstörungen im *Trigeminus* vorfinden dürfen. Er hat die Literatur hierauf eingehend eingesehen und fand dies durchweg bestätigt. In keinem der Fälle, in denen *oculopupilläre* Symptome vorhanden waren, fanden sich Schmerzen vor oder während der Entstehung der *Hemiatrophie* und umgekehrt fanden sich auch niemals die *oculopupillären* Symptome, wo die *Hemiatrophie* mit Motilitäts- und Sensibilitätsstörungen des *Trigeminus* verbunden war. Dies spricht nach seiner Anschauung deutlich für die isolierte Degeneration dieser Fasern von dem Centrum nach der Peripherie zu. Die Ausbreitung der *Hemiatrophie* entspricht in diesen Fällen der Verzweigung derjenigen Nerven, an welche die vasomotorisch-trophischen Fasern herantreten, also dem Verastelungsgebiet des *Trigeminus*, *Auricularis magnus* und wahrscheinlich auch dem des *Facialis*. Sind dagegen im Anfang sensible Störungen vorhanden, so müssen wir einen peripheren Ursprung annehmen. In diesen Fällen ist die Atrophie meist auf ein bis zwei *Trigeminusäste* beschränkt, nimmt nur einen Teil des Gesichts ein und ist keine so gleichmäßige wie beim Centralursprung der Krankheit. Nie finden sich dabei Lähmung oder Reizung der *oculopupillären* Fasern. Korn zieht auch noch die Möglichkeit in Erwägung, daß die krankmachende Ursache auf die vasomotorisch-trophischen Fasern während ihres Verlaufs im Gehirn und Rückenmark einwirkt. Es ist dann möglich, daß dadurch ein Krankheitsbild hervorgerufen wird, das der *Hemiatrophie* entspricht, und bei dem dann außerdem noch Erkrankungen des Gehirns und Rückenmarks organischen Charakters vorliegen. So sind dann die Fälle erklärt, bei denen die *Hemiatrophie* bei *Syringomyelie* und *multipler Sklerose* usw. vorkommt.

Ich glaube nicht, daß diese Auffassung von Korn ohne weiteres akzeptiert werden kann, daß man also auf diese Weise mit Bestimmtheit in der Lage ist zu entscheiden, an welcher Stelle des vasomotorischen resp. des vegetativen Nervensystems der Reiz einwirkt, der die Hemiatrophie hervorruft. Ich habe über diesen Punkt schon früher gesprochen und will das, was ich damals dort erwähnt habe, nicht noch einmal ausführlich diskutieren. Es ist sehr wahrscheinlich, daß wenigstens unter pathologischen Bedingungen sensible Reizerscheinungen vom Sympathicus selbst im engeren Sinne ausgelöst werden können, es ist deswegen auch nicht sicher, daß überall da, wo sensible Störungen die vasomotorisch-trophischen Störungen begleiten, auch der Sympathicus selbst affiziert sein muß. Aber immerhin ist anzugeben, daß diese Erwägung insofern ist uns die Möglichkeiten, die in lokalisationstheoretischer Beziehung in Frage kommen, vor Augen zu führen und daß sie geeignet ist, uns gewisse Anhaltspunkte für die Möglichkeit der differentiellen Lokalisation dieser Affektion ebenso wie der anderen vasomotorischen Neurosen zu liefern.

Was zum Schluß die Ursache dieses supponierten chronischen Reizzustandes betrifft, so ist darüber etwas Sicheres hier wie bei den anderen Neurosen nicht auszusagen. Wir haben gesehen, daß in der Ätiologie der Hemiatrophie häufig eine infektiöse Krankheit irgendwelcher Art erwähnt wird. Es ist das Auftreten des Leidens im Anschluß an Angina, an Masern, an Diphtherie, an Erysipel erwähnt worden. Es muß dann supponiert werden, daß diese Gifte eventuell insofern sind in irgendeiner effektiven Form die hierfür in Frage kommenden Fasern zu reizen. Auch das Vorkommen von traumatischen Schädigungen ist mehrfach erwähnt worden; diese Schädigungen haben zum Teil direkt in der Nähe des Sympathicus selbst gewessen. Dafür sind oben Beispiele angeführt worden. Man kann sich also vorstellen, daß von diesen traumatischen Schädigungen aus in irgendeiner Weise eine Reizung ausgegangen ist, die sich dann in eine Entzündung umsetzend zur Ursache der Hemiatrophie wurde. Auch die Oppenheimsche Erfahrung, daß durch die Entfernung einer in der Nähe des Sympathicus sitzenden Drüse eine Besserung erzielt wurde, ist auf diese Weise einem Verständnis näher gerückt.

Daß die Hemiatrophie über die Grenzen des Gesichts hinausgehen kann, wurde bereits erwähnt. Raymond und Sieard unterscheiden vier Typen: Den Typus *hemiatrophia facialis*, die eigentliche Hemiatrophie, den Typus *hemifacio-scapulo-humero-thoracicus*, der im ganzen ziemlich selten vorkommt, für den es aber einige Beispiele gibt, die von mir zum Teil auch schon erwähnt wurden. Weiter den alternierenden Typus, der im wesentlichen durch eine Beobachtung von Luntz dargestellt ist, der über eine *Hemiatrophia cruciata* berichten konnte. Vollhard hat eine hierher gehörige Beobachtung

pahliziert, in der auf der einen Seite die Hemiatrophie faciei, auf der anderen gekreuzten eine Pigmentanomalie in weitem Umfange bestand. Der vierte Typus wird durch eine totale Hemiatrophie einer Körperhälfte dargestellt, für die Raymond und Sicard ein klassisches Beispiel bringen.

Es handelt sich da um eine 50jährige Frau, die bis zum Alter von 30 Jahren gesund war. Um diese Zeit merkte sie eine zufällige Abmagerung des linken Beins, besonders des äußeren Teils des Unterschenkels. In fünf Jahren erstreckte sich diese Abmagerung auf den Oberschenkel, ein Jahr später hatte sie ungewöhnliche Empfindungen in der Schulter: es scheint ihr, daß in dieser Gegend die Haut wie geschwellen wäre. Allmählich stellte sich eine Atrophie am Leih, an der Brust und im Arm ein, später traten auch Parästhesien im Gesicht auf. Normal wirkliche Schmerzen. Es handelte sich um eine allgemeine Atrophie. Im mittleren Unterschenkel betrug die Differenz 8 cm, im mittleren Oberschenkel 4 cm. In der Länge war eine Differenz von $1\frac{1}{2}$ cm vorhanden. Am Arm war die Differenz am stärksten in der Schultergegend, der linke vierte Finger war auffällig dünn; eine sehr ausgesprochene Abflachung der Schultergegend bestand. Die Zunge war normal, das Gesicht war etwas atrophisch. Besonders bemerkt war das Unterhautgewebe und das Muskelgewebe. Aber auch die Knochen, die Tibia und die Fibula waren, wenn auch in geringem Grade, affiziert. Die Haut war nicht verdickt. Die Nägel waren eine Besonderheit. Nur über dem Ellenbogen bestand ein sklerodermatischer Fleck, die vasomotorische Blutregbarkeit war links erhöht. Die Kraft des Muscels war normal, die Sensibilität und die Reflexe waren überall normal, die Schilddrüse war etwas vergrößert. Der 20jährige Bruder der Patientin hatte seit 17 Jahren eine Atrophie des linken Beins, besonders des Unterschenkels, die in den letzten Jahren nicht progressiv war. An der linken Brust- und Brustseite bestand Dermographie.

Ich selbst habe folgenden interessanten Fall beobachtet:

Es handelt sich um eine 50jährige Frau, die über eine allmählich zunehmende Schwäche in der linken Seite klagt. Diese Schwäche soll sich seit 1½ Jahren eingestellt haben, und es soll sich dabei allmählich eine Volumensabnahme des linken Armes und Beins ausgebildet haben. Die Abmagerung sei ihr auch an ihrem Kleidungsstücke deutlich geworden, so daß der linke Armel, die Taille und die Handstücke der linken Hand ihr zu groß geworden sind, ebenso die Schuhe des linken Fußes. Es soll nirgendwo zu Anfällen kommen, in denen die linke Hand blaß und kühler wird, ein andermal sich auch wärmer wohl fühle. Dabei soll sich die Schwäche in der Hand akzentuieren. Keine Schmerzen, keine Parästhesien in der Hand. Seit drei Jahren hat die Patientin zeitweiliges Gefühl von Aussetzen des Herzens, dabei Angst, ist überhaupt leicht erregt, schreckhaft, hat viel Aufregungen durchgemacht. Klagt gelegentlich auch über Schwindelanfälle; an Krampfen will sie nicht leiden haben, seit zwei Jahren ist die Menopause eingetreten. Es findet sich eine sehr erhebliche Volumendifferenz der ganzen linken Seite gegenüber der rechten. Die Differenz ist am ausgesprochensten am linken Ober- und am linken Unterschenkel. Die dazugehörigen Maße sind folgende: Der Umfang des Oberschenkels, 11 cm oberhalb der Ellenbogenbeuge rechts 33½ cm, links 27½ cm. Der Unterschenkel mißt rechts 8 cm unterhalb der Ellenbeuge 27,5 cm, links 24 cm. Eine ähnliche Differenz findet sich am Bein. Der rechte Oberschenkel, 12 cm oberhalb der Kniekehle mißt 55 cm, links 52 cm. Der größte Wadenumfang ist rechts 34 cm, links 32 cm. Die Atrophie ist also im ganzen am linken Bein erheblich geringer wie am linken Arm. Aber auch am Rumpf besteht eine ähnliche Differenz, wie sich aus den folgenden Zahlen ergibt. Die Entfernung vom Mastoideum dorsal bis zum

Armenien beträgt rechts 18, links 16½ cm. Auch die linke Gesichtshälfte ist in toto etwas zurückgefallen, besonders die Mundpartie, an der linken Seite findet sich eine eingestülpte Stelle, wo die Haut etwas verhärtet ist, ebenso über der linken Augenbraue, die linke Lidspalte ist etwas enger. Färbung und Temperatur sind am ganzen Körper zwischen rechts und links ohne Unterschied. Der linke Arm soll immer mehr frieren wie die anderen Teile des Körpers.

Die Motilität, die elektrische Erregbarkeit und die Sensibilität sind an allen Teilen des Körpers vollkommen gut und ohne Differenz. Die Zunge wird gerade hervorgestreckt und ist ohne Differenz in ihrer Entwicklung, zittert etwas fibrillär. Die linke Zungenhälfte ist dem Zittern wohl noch etwas stärker unterworfen als die rechte.

Die inneren Organe sind normal. Im Urin findet sich weder Eiweiß noch Zucker. Die Patientin wurde eine Reihe von Monaten von mir beobachtet. Besonders in der späteren Zeit waren Anfälle von Erblösen der linken Körperhälfte, besonders des linken Arms, etwas häufiger geworden. Zugleich mit dem Erblösen stellte sich auch ein stärkeres Frieren der linken Seite ein. Patientin behauptete, daß zeitweilig die linke Körperhälfte auch mehr schüttelte. Ich selbst habe das nicht beobachtet und Versuche mit Injektion von Blausäure sind von mir nicht gemacht worden. Mehr war die Motilität und Sensibilität auch bei den späteren Untersuchungen intakt. Insbesondere ließ sich nichts nachweisen, was auf die Entwicklung einer Syringomyelie hätte bezogen werden können.

In diesem Fall hatte sich also bei einer 50-jährigen Frau in den letzten Jahren etwa seit Beginn der Menopause ganz allmählich eine Hemiatrophia corporis eingestellt, die am stärksten im linken Arm ausgeprägt war, aber auch die linke Gesichtshälfte, den linken Rumpf, das linke Bein betraf. Es handelte sich um eine Atrophie aller, die betreffende Körperhälfte zusammensetzenden Teile. Über die Knochen können wir allerdings keine bestimmte Angabe machen, da eine Röntgenuntersuchung leider nicht vorgenommen wurde. Nur an wenigen Stellen fanden sich sklerodermatische oder abnorm pigmentierte Partien. Im übrigen betraf die Atrophie, wie schon erwähnt, anscheinend gleichmäßig alle Teile. Besonders bemerkenswert ist das Auftreten vasomotorischer Störungen, das objektiv in dem Erscheinen von Erblößen und Blauwerden der linken Körperhälfte zutage trat, und das auch mit subjektiven Erscheinungen ähnlicher Art, mit Kaltwerden der linken Körperhälfte, besonders des linken Armes verbunden war. Man wird keinen Zweifel tragen können, diesen Fall in die hier beschriebene Gruppe einzuordnen. Auch hier wieder deuten die allerdings geringen sklerodermatischen Veränderungen auf die Zusammengehörigkeit mit der Sklerodermie im allgemeinen, und auch hier wieder weisen die vasomotorischen Störungen, die das Leiden zeitweilig begleitet haben, auf den Vasomotorienapparat als Sitz der Krankheit hin.

Debray beschreibt einen Fall von Hemiatrophia des Gesichts, der Schultern und teilweise des Armes, der im 17. Jahre begonnen hat. Dieser Fall gehört also zu den partiellen Hemiatrophien des Körpers von denen oben schon die Rede gewesen ist. Knapp beschrieb einen Fall von Hemiatrophia totalis auf dem Boden der Sklerodermie. Or-

hison hat einen Fall totaler Hemiatrophie veröffentlicht, den er ebenfalls als Tropheneurose bezeichnet. Hier hatte die allgemeine Abmagerung mit 19 Jahren bei dem jetzt 36-jährigen neuropathisch veranlagten Patienten begonnen, dabei fand sich gleichzeitig Hypertrophie des linken Trapezius, es bestand eine Skoliose, der Handedruck war aber gleich, Bewegungen links wie rechts gut ausgeführt. Der Orthissche Fall gestattet aber wegen seiner Begleiterscheinungen nicht die Diagnose einer unkomplizierten Hemiatrophie. Schließlich hat dann Meyer unter dem Titel totale Hemiatrophie einen Fall veröffentlicht, der in mancher Beziehung Ähnlichkeit mit der hier besprochenen hat, der auf der anderen Seite aber doch so viel Differenzen aufweist, daß ich ihn hier nur mit großer Reserve anführe. Es bestand bei diesem Manne in der Tat zwar eine ausgesprochene linksseitige Hemiatrophie, die ganz besonders stark die Muskulatur betraf. Sie war am stärksten am Oberschenkel und Oberarm, wo 7 bzw. 6½ cm Differenz gegenüber der gesunden Seite gemessen wurden, geringer ist sie am Unterarm und am Unterschenkel. Auch Gesicht, Bauch und Brust sind deutlich betroffen. Eine Herabsetzung der elektrischen Reaktion in den atrophischen Muskeln war nicht nachweisbar, eher schien eine gewisse Steigerung für beide Stromesarten vorzuliegen. Außerdem bestand aber eine linksseitige spastische Hemiparese. Fernerhin auch eine Herabsetzung der Schmerzempfindung auf der linken Seite. Auch vasomotorische Störungen auf der linken Seite waren deutlich nachweisbar, die linke Seite froh stärker wie die rechte und sie war nicht zum Schwitzen zu bringen. Schließlich bestand dann eine Zone völliger Empfindungslosigkeit für alle Qualitäten am Hals, Nacken und Kopf, entsprechend der linken ersten bis vierten Cervicalwurzel. Nach der Auffassung von Meyer steht dieser Fall zwischen den hemiplegischen cerebralen Muskelatrophien und den sogenannten hemistrophischen Tropheneurosen in der Mitte. Von ersteren unterscheidet ihn vor allem die ganz allmähliche Entwicklung, von letzteren die spastische Paresis der atrophischen Seite. Ich glaube nicht, daß diese Auffassung dem Falle ganz gerecht wird. Insbesondere berücksichtigt sie, wie mir scheint, nicht die diagnostisch außerordentlich wichtige radikale Sensibilitätsstörung. Letztere scheint mir mit aller Entschiedenheit auf einen Prozeß im obersten Halsmark hinzuweisen, vielleicht eine Tumorbildung, ein Gliom oder eine Gliomatose. Jedenfalls glaube ich, daß die hier beschriebene Muskelatrophie im wesentlichen in direkten Zusammenhang zu bringen ist mit der ganz langsam eingetretenen und langsam vorgeschrittenen spastischen Paresis. Derartige Atrophien findet man bei so langsam sich entwickelnder spastischer Paresis nicht allzu selten; ganz besonders ausgeprägt habe ich sie in einem Falle von Spillierscher ascendierender Paralyse gesehen.

Im Anschluß an diese Fälle von Hemiatrophie des ganzen

Körpers sei noch an diejenigen Fälle erinnert, bei denen die Atrophie sich nicht auf eine Seite erstreckte, sondern die obere Hälfte des Körpers einnahm. Barraquer hat einen solchen Fall beschrieben. Es handelte sich da um ein 25-jähriges Mädchen; mit 13 Jahren begann das Gesicht und der obere Teil der Brust abzumagern. Jetzt ist das Gesicht und der obere Teil der Brust hochgradig abgemagert, das Übrige ist normal. Die Haut ist dabei nicht verändert, die Haare sind normal, das Skelett des Gesichts ist nicht verändert. Die Hirnnerven sind frei, die Thyroidea ist normal. Es handelt sich nur um eine Unterhautzellgewebstatrophie; nichts von Sklerodermie nachweisbar. Der Autor spricht von einer Erkrankung des Sympathicus. Einen zweiten Fall beschreiben Pic und Gardère. Es handelte sich um eine mit 15 Jahren menstruierte Frau. Vor vier Jahren bei Beginn der Erkrankung sechs Monate lang keine Menstruation. Das Leiden begann mit einer starken Abmagerung, Appetitlosigkeit, allgemeinem Kräfteverfall, Verdauungsstörung, Beschwerden, die bei der geringsten Anstrengung auftraten. Daneben depressive Stimmung, grundloses Weinen. Durch eine Mastkur trat eine Besserung ein. Aber es blieb eine ganz erhebliche Abmagerung des Gesichts; die Haut ist hier mit dem Knochengestüt verklebt, die Stirn ist glatt, die Wangen sind eingefallen, die Lippen sind dünn, der Hals ist zärlisch, der Pectoralis sehr stark atrophisch, der ganze Brustkorb abgemagert. Die Haut ist mit den Rippen verklebt. Das Fettgewebe ist vollkommen verschwunden, die Mammillen sind normal. Der Rücken ist weniger abgemagert, dagegen sehr stark wiederum der Schultergürtel und die Oberarme, weniger die Unterarme. Das Fettgewebe ist in der Becken- und Glutaaufgegend vermehrt. Das Nervensystem weist keinen besonderen Befund auf, nur bestehen lebhafte Reflexe. Es ist außerdem ein rechtsseitiger Spitzenkatarrh vorhanden. Schließlich hat Simons einen Fall dieser Art unter dem Namen *Lipodystrophia progressiva* beschrieben, den auch ich selbst zu sehen Gelegenheit hatte (siehe Fig. 17, die ich der Freundlichkeit des Herrn Kollegen Simons verdanke).

21-jährige Patientin. Als Kind nicht besonders nervös, eher ruhig. Vom sechsten Jahre ab hat sie etwa zwei Jahre lang große Teile des Kopfhaars sich ausreissen und gezogen. Vor vier Jahren, nach dem Tode des Vaters, traten zum ersten Male wechselnde Stimmungen auf, es kam zu Schreckkrämpfen; der Stimmungswechsel besteht auch heute noch. Im elften Jahre, als ein stärkeres Wachstum begann, fiel zuerst die doppelseitige Abmagerung im Gesicht auf, die zunächst sich langsam und gleichmäßig über den ganzen Körper und die Arme verbreitete. Seitdem fühlt sich die Patientin oft schwach und trübt sich im warmen Zimmer. Der Fettschwund wurde so hochgradig und dadurch die Ähnlichkeit mit einem „Totenkopf“ so groß, daß die Kranke die Stellung verlor und auch heute noch in der Tätigkeit sehr beeinträchtigt ist. Vor 3 Jahren fiel der Mutter auf, daß das Gesicht der Kranken dünner wurde. Das Fett nahm dort so ab, daß man sie beim Ansehen fragte, ob sie sich hinten anstopfte.

Verstandes- und Gefühlsentwicklung vollkommen normal. Sprache und Wesen immer ruhig.

Völliger Fettschwund im Gesicht, am Rumpf und an den Armen: auffallende Fettvermehrung am Gesäß. Das Gesicht gleicht durchaus einem Totenkopf. Die Haut ist nicht zufällig trocken, überall elastisch, leicht verföhlbar, im Gesicht meist von eigentümlich grauer, etwas schmutziger Farbe, aber nirgends pigmentiert. Die Backhaut ist leicht braun. An keiner Stelle ist die Haut atrophisch oder in ihren oberflächlichen Schichten in anderer Weise verändert.



Fig. 27.

Fall von Lipodystrophia progressiva.

worden ist. Die genannten Fälle scheinen ebenfalls als Trophoneurosen aufzufaßt werden zu können.

In keinem Muskel besteht der geringste Funktionsmangel, die elektrische Prüfung aller erreichbaren Muskeln und Nerven ergibt vollkommen normale Verhältnisse, die Sensibilität ist intakt, die Sehnen- und Hautreflexe sind lebhaft, die Hirnnerven frei. Es besteht Nyctagnus rotatorius auch in der Ruhe. Herz, Gefäße, Puls, Blutdruck, Gefäßreflexe (plethysmographisch geprüft), die Menge des vasoconstrictorischen Stoffes im Blut sind normal; die Thyreoidea ist zu fühlen.

Die Röntgenbeschleunigung des Schädels, der Arme und Beine ergibt keinen Knochenschwund.

Es besteht keine alimentäre Glykose (200 g Traubenzucker), auch nicht nach mehrfachen Adrenalininjektionen (1 mg), nach wiederholten Pilocarpininjektionen (1 mg) nur geringer Schweißausbruch.

Es handelt sich auch hier, wie in den Fällen von Barraquer und Pic und Gardère um den Schwund des Fettgewebes, der gleichzeitig in beiden Gesichtshälften beginnt und in dieser Weise sich dann über Rumpf und Beine verbreitet hatte. Die neurogene Grundlage des Leidens ist nur zu vermuten. Im Falle von Simons schlug der Versuch, irgendwelche Zeichen einer Störung der inneren Sekretion oder von Vago- oder Sympathicotomie zu finden, negativ aus.

Auf die Pathogenese dieser Störungen noch näher einzugehen, erübrigt sich wohl, es wäre dann nichts anderes zu sagen, als was bei der Hemiatrophia totalis bereits erörtert

Der *Hemiatrophia faciei* respektive der *Hemiatrophia totalis* steht die *Hemihypertrophia faciei* und *totalis* als Gegenstück gegenüber. Die Zahl der hierher gehörigen Beobachtungen ist nicht so ganz klein. Obwohl Mackay gewiß recht hat, wenn er eine scharfe Scheidung zwischen den kongenitalen und den erworbenen Formen dieses Leidens nicht durchführen zu können glaubt, will ich hier im wesentlichen doch nur die Fälle von erworbener *Hemihypertrophia faciei* respektive *totalis* berücksichtigen. Die Literatur dieser Affektionen ist außer bei Mackay zu finden bei Hoffmann, der die *Hemihypertrophia faciei* progressiva und bei Piazza, der die erworbenen totalen *Hemihypertrophien* des Körpers behandelt. Ich darf an die Spitze dieser Erörterungen vielleicht einen selbst beobachteten Fall setzen.

Eine 28-jährige Lehrerin, die bis dahin gesund war, erkrankte im Jahre 1899 mit heftigen Schmerzen im ganzen Rücken, besonders in den Schulterblättern. Es bestand kein Fieber, sie litt drei Wochen das Bett. Dann hörten die Schmerzen auf. Aber es traten nun ziehende, nicht gerade schmerzvolle Empfindungen im rechten Arm ein und dieser Arm nahm nun ganz allmählich an Umfang zu. Der Patientin kam das besonders dadurch zum Bewußtsein, daß sie die rechte Armel ihrer Kleider weiter machen lassen mußte als die der linken Seite, und daß sie auch für die rechte Hand einen um zwei Nummern größeren Handschuh nehmen mußte wie für die linke. Wenn sie den Arm bewegte, soll die Schwellung etwas weniger erheblich gewesen sein. Irgendwelche Größenzunahme des rechten Beins will sie nicht bemerkt haben. Es handelt sich um ein leicht erregbares, ängstliches und schreckhaftes Individuum, das seit langem schon an Kopfschmerzen leidet, leicht Hysterikern hat, sie hat keine schwere Erkrankung durchgemacht, ist niemals syphilitisch gewesen. Der Befund ist der folgende: Der rechte Ober- und Unterarm ist ganz erheblich dicker als der linke. Die Maße sind die folgenden: Girthumfang des rechten Oberarms 34 cm, des linken 29 cm, Umfang 12 cm oberhalb des Oberarmes rechts 27,5, links 25 cm, über dem Supinator longus rechts 28, links 25 cm Umfang, der rechten Hand über den Köpfen der Metacarpä rechts 23, links 18,4 cm Umfang, des Daumens über dem Interphalangealgelenk rechts 6,3, links 5,9 cm. Auch im Längenschnitt ist eine erhebliche Differenz zugunsten der rechten Seite. Die Makulatur des rechten Schalles ist stärker entwickelt. Die Volumenvergrößerung ist offenbar sowohl in einer Zunahme der Makulatur wie in einer Zunahme des Unterhautfettgewebes begründet. Auch die Knochen scheinen dabei beteiligt zu sein, so weit man es wenigstens aus der stärkeren Entwicklung des rechten Oberarmes schließen kann. Eine Röntgenaufnahme ist leider nicht gemacht worden. Am rechten Bein sind irgendwelche Verunstaltungen nicht nachweisbar. Sensibilität und Motilität des rechten Arms ist völlig intakt, auch die Hauttemperatur, das Kröschen des Arms zeigt keinerlei Abweichung von der Norm auf. Der Puls ist rechts wie links, das Herz zeigt keine Abweichung von dem normalen Verhalten. Auch die übrige Untersuchung des Nervensystems ergibt an keiner Stelle irgendwelchen pathologischen Befund. Bemerkenswert wäre vielleicht noch, daß bei der Patientin nach ihren Angaben, die auch der Augenschein bestätigt, am rechten Arm recht häufig ohne eine greifbare Ursache kleine Flecke entstehen, die offenbar Suggillationen sind, und die durch die gewöhnlichen und unvermeidbaren mechanischen Insulte des gewöhnlichen Lebens hervorgerufen werden. Es scheint also hier eine leichtere Läsierbarkeit der Hautvenen vorhanden zu sein.

Nichts spricht in diesem Falle für eine Elephantiasis. Irgendeine Verlegung der Gefäßwege, der Lymphwege ließ sich nicht nachweisen. Auch eine Halbrippe war nicht vorhanden. Das Leiden hatte sich ganz allmählich, bei einer schon von jeher nervösen Person entwickelt, nachdem ein neuralgisches Vorstadium vorausgegangen war. Es hatte etwa sechs Jahre zu seiner Entwicklung gebraucht und ist dann nach den Nachrichten, die ich von der Patientin erhalten habe — ich habe es leider nicht wieder selbst untersuchen können — ganz allmählich, ohne Veränderung seines Wesens weiter vorgeschritten.

Fälle dieser Art, bei denen die Vergrößerung entweder die ganze eine Körperhälfte — und zwar ist es hier im Gegensatz zur Hemiatrophie oft die rechte Körperhälfte (siehe oben) — oder Teile einer Körperhälfte, insbesondere also das Gesicht betraf, sind, wenn wir von den angeborenen absehen, in geringer Zahl auch sonst noch beschrieben worden. Hoffmann berichtete im Jahre 1903 über einen eigenen Fall von erworbener Hemihypertrophia faciei progressiva. Beobachtungen dieser Art waren bis dahin von Stilling, Berger, Schlieck, Montgomery und Dana publiziert worden. Hoffmann selbst beschreibt folgenden Fall: Bei dem jetzt 14 jährigen Kinde wurde im zweiten Lebensjahr angeblich im Anschluß an das Zahnen die rechte Seite des Gesichts etwas dicker. Erst in den letzten zwei bis drei Jahren hat diese Zunahme stärkere Fortschritte gemacht. Seit zwei Jahren besteht auf der rechten Oberlippe ein starkes Haarwachstum. Schmerzen sind niemals dagewesen. Die rechte Backe ist geschwollen, die rechte Nasenseite ist vergrößert, die Vergrößerung erstreckt sich bis zum unteren Augrenwinkel und bis zum Kim. Die rechte Hälfte der Oberlippe ist zu einem Wulst verunstaltet. Auf der rechten Oberlippe finden sich starke Haare, auch einige Warzen und kleine Höcker. Die Stirn ist ganz normal. Die Zunge und der harte Gaumen zeigen eine stark vergröberte Schleimhaut, diese ist schwammig und verdickt, ebenso wie das Unterhautzellgewebe. Die rechte Wange ist weicher und schlaffer. Die Hypertrophie betrifft Haut und Unterhaut, ob sie auch die Muskeln betrifft, ist zweifelhaft, aber sicher sind die Knochen frei. Sensibilität, Geschmacksvermögen usw. intakt. Hoffmann erwähnt, daß in drei Fällen dem Ausbruch des Leidens eine Verletzung oder Erkrankung der betroffenen Seite vorausging. Im Falle von Stilling ein Trauma, bei Berger eine alte Neuralgie des Trigemini und bei Montgomery ein Abscess der Wange. Bei Dana bestand Akromegalie, der Fall scheidet als selbständiger und reiner wohl damit aus. In dem Falle von Schlieck und in dem eigenen von Hoffmann ist eine Ursache nicht sichergestellt.

Hoffmann meint, daß die bisher beobachteten Fälle alle doch mehr oder weniger auf nervöse Störungen hindeuten. In seinem eigenen Falle scheint ihm das Fehlen jeglicher Gefäßveränderung, das Fehlen

der Rôte, die Beteiligung der Haare, die strenge Halbseitigkeit entschieden für das Wirken eines nervösen trophischen Einflusses zu sprechen. Dabei fällt ins Gewicht, daß sich hier die Hypertrophie geradezu auf das Gebiet beschränkt, welches von dem zweiten Trigeminusast versorgt wird, während die Gegend des Stirn- und Unterkieferastes offenbar nicht betroffen worden ist. Die Lokalisation des Prozesses spricht also auch entschieden für eine nervöse Entstehung dieser Affektion.

Aus der späteren Literatur erwähne ich noch einen Fall von Minor. Hier begann bei dem 30jährigen Fräulein die Gesichtshälfte sich zu vergrößern, als ihr im Jahr zuvor ein auf der rechten Halboseite befindlicher Drüsenabsceß eröffnet wurde. Hauptsächlich betrifft die Vergrößerung den Unterkiefer. Ähnlich wie in dem Falle von Dana war hier zunächst der Eindruck vorhanden, als ob es sich um eine linksseitige Atrophie und nicht um eine rechtsseitige Hypertrophie handelte. Minor glaubt die Ursache des Leidens vielleicht in einer Verletzung eines Asthens eines Ganglion des Sympathicus während der Operation sehen zu sollen. Über einen Fall von Tscherbäck finde ich leider nur eine ganz kurze Angabe. Es handelte sich da angeblich um eine Hemihypertrophia faciei, die kompliziert war durch eine Sklerodermie. Für unsere Auffassung ist natürlich diese Kombination der beiden Leiden von größter Bedeutung; sie erinnert uns an das Zusammenvorkommen von Hemiatrophia faciei und Sklerodermie, das oben mehrfach besprochen wurde. Mackay beschreibt folgenden Fall. Ein zehnjähriges Kind war bis zum Alter von fünf Jahren gesund, wie eine Photographie ergibt. Im Alter von sechs Jahren wurde zuerst eine Vergrößerung des Knochens der linken Seite des Gesichts bemerkt und allmählich nahm dann die ganze linke Gesicht- und Schädelhälfte an Umfang zu. Das Knochengestüt ist am ganzen linken Schädel und Gesicht jetzt erheblich vergrößert. An einzelnen Stellen sind hirsutartige Vorsprünge vorhanden, an anderen wie an der Stirn besteht mehr eine diffuse Auftreibung. Die Vergrößerung betrifft aber auch die Weichteile der linken Gesichtshälfte, besonders die linke Wange, die linke Nase die linke Oberlippe und das linke Kinn. Abgesehen von einer Schwellung des linken Schläfenvenenstrangs sind irgendwelche Störungen von seiten des Nervensystems nicht vorhanden. Insbesondere ist die Sensibilität und die Motilität im Gesicht völlig ungestört. In einem von Piazza beschriebenen Falle betrifft die Volumenzunahme insbesondere das Bein. Es handelt sich da um einen achtjährigen Knaben, der im Alter von vier Jahren einen Typhus durchgemacht hat. Als er nach dieser Krankheit aus dem Bett aufstand, bemerkte man ein Hinken und einen Monat später fiel es auf, daß der rechte Oberschenkel dicker war. Die allmähliche Zunahme war dann weiterhin auch deutlich zahlenmäßig feststellbar. Sie erstreckte sich auf die ganze rechte Körperhälfte,

war aber im Bein dauernd erheblich größer als in den anderen Partien. Der rechte Oberschenkel war 4 cm länger als der linke, das ganze rechte Bein war 6 cm länger als das linke. Der größte Umfang des Oberschenkels betrug rechts 386 mm, links 358 mm. Das rechte Ohr ist 62, das linke 52 mm lang, der halbe Brustumfang rechts 320, links 308 mm. Die Kraft in den rechten Extremitäten blieb dabei zurück und es bestand auch eine leichte Innervationschwäche im Facialis. An der inneren Fläche des rechten Knies fand sich ein Naevus, es war fernerhin auch eine Veränderung von seiten des Herzens, die als Mitralfunktionsstörung aufzufassen war, nachweisbar. Piazza nennt dann weiterhin noch die Fälle von Schultes, Mac Gregor und Tilanus als solche von totaler erworbenener Hypertrophie.

Die genannten Fälle sind gewiß nicht alle eindeutig, insbesondere ist der Sitz der Hypertrophie keineswegs in allen Fällen der gleiche, das heißt es werden nicht die gleichen Gewebearten in sämtlichen Fällen betroffen. So scheint in einer Reihe von Fällen nur die Haut und das Unterhautgewebe stärker befallen zu sein, während in anderen auch die Knochen von der Affektion mitbetroffen sind. Über die Hypertrophie der Muskeln erfahren wir wenig, aber in einigen Fällen ist auch davon die Rede; auch in unserem eigenen Fall schien an der Schulter wenigstens eine deutliche Muskelhypertrophie im Trapezius vorhanden zu sein.

Über die Pathogenese dieser Erkrankung werden wir uns kurz fassen können. Wir würden hier im wesentlichen dieselben Erörterungen anzustellen haben wie in den früheren Kapiteln der Sklerodermie und der Hemiatrophie. Lewis scheint der erste gewesen zu sein, der mit einiger Bestimmtheit die trophoneurotische Natur dieser Affektion behauptete, während andere diese Auffassung auf das energischste bekämpft haben und auch unter den neueren Autoren finden sich noch eine ganze Reihe von solchen, die die trophoneurotische Entstehung dieser Erkrankungen nicht anerkennen wollen. Die Mehrzahl der Autoren hat sich aber auch hier für eine solche Auffassung ausgesprochen. Ich habe hier schon vorhin die Ansicht von Hoffmann darüber angeführt und auch Macay kommt zu derselben Anschauung, wenn er sagt, daß Klinik und Pathologie ohne die Annahme trophischer Centren und trophischer Einflüsse hier nicht auskommt. Er weist insbesondere auch wiederum auf das Vorkommen derartiger hypertrophischer Störungen bei gewissen organischen Erkrankungen des Nervensystems, insbesondere bei der Syringomyelie und auch bei der Akromegalie hin, und nimmt eine Störung der hypothetischen trophischen Centren als Ursache dieser Veränderungen an. Wenn er freilich, indem er eine Affektion der periependymären grauen Substanz des Gehirns als Ursache dieses Leidens supponiert, hier noch weiter spezialisieren will, so geht er nach meinem Ermessen in dieser Auffassung viel zu weit. Ich glaube, daß man

auch hier sich mit der Annahme bescheiden muß, daß diese Störungen des Wachstums und der Nutrition auf einer Veränderung des vasomotorischen Systems beruht, daß es aber nicht möglich ist, eine bestimmte Stelle dafür in Anspruch zu nehmen.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch für einen Teil der angeborenen Fälle von Hemihypertrophie dieselben Entstehungsbedingungen vorliegen. Ich führe dafür folgenden Fall von Ziehen als Beispiel an. Es handelt sich um ein Mädchen, dessen Vater seit seinem sechsten Jahre an multiplen Fibromata molliora leidet. Es ist schwer geboren, sofort nach der Geburt soll das Gesicht schief, das linke Auge weit vorgerückt gewesen sein und offen gestanden haben. Die Gesichtsbildung nahm mit den Jahren zu. Es fand sich eine Schädelveränderung links. Die linke Orbita ist größer, die Gesichtsteile sind links dicker, die Haut ist ungleichmäßig verdickt, über der Schläfe pigmentiert. Die linke Braue und das linke Ohr sind länger. Die Lider sind links verdickt, mikroskopisch mit perineuritischen Wucherungen bedeckt. Das Haupthaar ist links etwas schwächer. Der linke Bulbus ist atrophisch. Es besteht links Strabismus convergens concomitans, die Tränenabsonderung ist links schwächer. Der linke Facialis ist galvanisch und faradisch schwerer erregbar. Es besteht nebenbei leichter Schwachsinn, sonst wurden keine abweichenden Befunde erhoben. Die Begrenzung dieser Hemihypertrophie faciei deckt sich mit dem Innervationsgebiet des Trigemini. Ziehen nimmt als ihre Ursache eine in utero erfolgte Verletzung der großen Trigeminusäste am Ganglion Gasseri mit Schädigung wesentlich nur der zutretenden vasomotorischen Fasern an. In anderen Fällen von kongenitaler Hypertrophie liegen dagegen offenbar anders geartete Entstehungsbedingungen vor. Cagliati beschreibt ein Kind von 11 Monaten mit halbseitiger Hypertrophie. Es findet sich hier eine Zunahme der Dicke der Haut und der ganzen linken Körperseite, bedingt durch Infiltration des Bindegewebes. Das Fettgewebe ist ebenfalls reichlicher entwickelt, an einzelnen Stellen direkt in der Art von Lipomen. Auch das Skelett ist links stärker entwickelt. Es besteht eine Hypertrophie der linken Herzspitze, Hypertrophie sämtlicher Blutgefäße links, besonders die Media und Intima sind verdickt. Eine größere Entwicklung der entsprechenden inneren Organe links, eine Hypertrophie und Hyperplasie des Stützgewebes zwischen den Muskelbündeln und an den peripheren Nerven, ebenso wie in den Ganglien des Sympathicus, Nerven- und Muskelgewebe selbst sind ohne Veränderung. Das centrale Nervensystem ist normal. Hier wird mit Recht wohl eine Störung des Mesenchyms in der ersten embryonalen Periode des intrauterinen Lebens angenommen, eine Störung deren Abhängigkeit vom Nervensystem weder erweislich noch überhaupt auch wahrscheinlich ist. Derartige Fälle sind in größerer Anzahl beschrieben worden, wie denn überhaupt die Zahl der angeborenen Fälle

von Hypertrophie erheblich größer ist, wie die Zahl der erworbenen. In einer Statistik von Macay finde ich die Angabe, daß unter 29 Fällen von Hypertrophie 23 angeboren und nur 6 erworben sind.

Es war nicht meine Absicht auf den vorhergehenden Seiten eine ausführliche Schilderung aller Fälle von Hemiatrophia faciei und totalis und von Hemihypertrophia faciei und totalis zu geben, sondern ich wollte nur die für die pathogenetische Auffassung dieser Leiden wichtigsten Punkte hervorheben, weil ich glaube, daß hier ganz ähnliche Bedingungen vorliegen, wie wir sie zunächst einmal bei der Sklerodermie, dann aber auch bei der dieser so nahe verwandten Affektion der Raynaudischen Krankheit und damit auch bei allen den von uns hier behandelten Krankheitsbildern vorfinden.

Gerisse Fälle von Sklerodermie zeigen große Ähnlichkeit mit den trophischen Störungen bei der Syringomyelie und besonders bei deren Unterart, der Morvanschen Krankheit. Als sichere Unterscheidungsmerkmale gelten ausgesprochene Symptome von individualisierter, degenerativer, atrophischer Lähmung und auf bestimmte Nerven- oder Wurzelgebiete beschränkte, totale oder dissoziierte Anästhesien, daneben die spastischen Erscheinungen an den Beinen, die Urinbeschwerden, die oculopupillären Symptome. Wo diese Kennzeichen fehlen, wird eine Abgrenzung der beiden Krankheitsbilder gelegentlich wenigstens nach dem gerade vorliegenden Zustandsbild völlig unmöglich sein, während meist auch dann noch der weitere Verlauf Aufschluß geben wird. Derartige Fälle sind z. B. von Castellino und Cardì und von Mendel beschrieben worden. Daß die Unterscheidung Schwierigkeiten machen kann, lehrt folgender Fall:

54jährige Frau. Vor einem halben Jahre Stoß an den linken Ellbogen, der mit einer Hautabschürfung im Gefolge hatte. Seitdem sollen sich aber in diesem Arm Schwäche, Parästhesien, Hitze und Kälte und eine blasse Verfärbung der Haut eingestellt haben. Außerdem gibt Pat. an, daß sie beim Urinieren etwas drücken muß. Status. Die linke Pupille ist ein wenig weiter als die rechte, ebenso wie die Liliapupille. Am linken Unterarm bestehen ausgeprägte Hautveränderungen, die Haut ist in typisch sklerodermatischer Weise verdickt; an anderen Stellen hat sie mehr das Aussehen, wie bei der Atrophia cutis progressiva, ist verknürrt, dünn. Die Hand ist hei. Bei genauer Prüfung ergibt sich, daß Schmerz- und Temperaturreiz links nicht so deutlich gefühlt werden wie rechts; die Kraft des linken Arms ist im ganzen etwas geringer, wie die des rechten, ohne daß ein Muskel oder eine Muskelgruppe besonders geschädigt wäre. Keine Störung der elektrischen Erregbarkeit; das Respirationsphänomen ist links schwächer als rechts, das Trochepphänomen ist beiderseits gleich. An den Beinen besteht keine Störung.

Der Hautprozeß trägt hier stellenweise durchaus den typisch sklerodermatischen Charakter, aber die oculopupillären sowie die sensiblen Symptome, die allerdings im Laufe von zwei Jahren nicht pro-

gradient waren, weisen doch mit Bestimmtheit auf eine umschriebene Syringomyelie.

Diesen Fällen steht ferner das von Quinquaud beschriebene *Panaritium nervosum* gleich. Quinquaud erkennt diese Ähnlichkeit nicht, will aber doch eine gewisse Selbständigkeit des Krankheitsbildes festgehalten wissen und befürwortet deshalb einen eigenen Namen für die Affektion. Ich kann das nicht für gerechtfertigt halten und setze, um eine bessere Beurteilung zu ermöglichen, Quinquauds Krankheitsbeobachtung hierher.

45jährige Frau. Vor 20 Jahren heftiger akuter Gelenkrheumatismus, seitdem nie mehr. 1874, nachdem schon im Winter vorher häufige Schläge vertragen worden war, in den Fingern lästigende Schmerzen, der Daumen schwellt an, wurde erst, die Arterien klapften und es stellten sich anfallsweise heftigste Schmerzen ein; dann wurde die Haut hart, die Epidermis spaltete sich. Das wiederholte sich einige Male, keine Spur von Eiter wurde produziert. Im folgenden Jahre wieder solche Anfälle an verschiedenen Fingern der rechten Hand unter Abfallen des Nagels; auch links spontane Nagelverlust. Immer wieder heftige Schmerzen und vorübergehend auch Anästhesie; stellenweise tritt Verformung ohne Schmerzen allmählich ein. Alle Finger sind jetzt teilweise kalt und cyanotisch. Die Haut ist dünnlich, an das Periostr angeklebt, auch die Knochen sind atrophisch, ohne daß jemals Eiterung eingetreten wäre. Die Nerven waren zeitweise auch außerhalb der Anfälle druckempfindlich.

Hier spricht die große und anhaltende Schmerzhaftigkeit der Panarition gegen Morvansche Krankheit und für Sklerodaktylie, obwohl zu bedenken ist, daß für eine gewisse Zeit dies Verhalten auch bei Morvanscher Krankheit vorkommt, aber doch wohl nicht in jahrelang dauerndem Verlauf, ebenso wie dann auch eine dauernde Abstumpfung der Sensibilität kaum je fehlt. In einem Fall Castellinos und Cardis waren wenigstens zeitweise die Panaritionen schmerzlos, aber auch dort scheint mir wegen des Fehlens sensibler Störungen bei jahrelangem Verlauf die Diagnose Morvansche Krankheit nicht berechtigt. Daß übrigens auch die Kyphoskoliose in Fällen von Sklerodermie, die sonst unkompliziert waren, beobachtet wurde, ist bereits mitgeteilt. Auch dies Symptom kann daher differentialdiagnostisch nicht benutzt werden.

Auch Charcot hat sich um die Differentialdiagnose zwischen der Morvanschen Krankheit und der Sklerodermie bekümmert, und er hat betont, daß charakteristisch für die Sklerodermie das Fehlen von Sensibilitätsstörungen und andererseits das Vorhandensein sklerodermatischer Veränderungen an anderen Körperstellen ist. Wir müssen aber auch daran denken, daß es eine Kombination beider Krankheiten gibt, bezw. daß die Sklerodermie in seltenen Fällen ein Symptom der Glieosis sein kann, wie das u. a. mein oben mitgeteilter Fall zu demonstrieren scheint.

In die Unterscheidung zwischen Syringomyelie und *Lepra* oft eine sehr schwierige sein kann, ist es nicht zu verwundern, daß bis-

weisen auch die Differentialdiagnose zwischen Sklerodermie und *Lepra* Schwierigkeiten macht.

Zur Unterscheidung werden neben der Herkunft des Kranken aus Lepra-gegenden, dem Nachweis der Bazillen, der allerdings bei der *Lepra anaesthetica* sehr schwer sein kann, den typischen Verdickungen der Nerven usw., auch wieder die Sensibilitätsverhältnisse sehr wesentlich beitragen können, indem eine fleckweise, eventuell sogar dissoziierte Empfindungslähmung die Diagnose *Lepra* sicher stellt. In frühen Stadien des sklerodermatischen Prozesses handelt es sich bisweilen um reine Pigmentflecken, ohne ausgesprochene Verhärtung oder Atrophie. Auch da gehen, wie z. B. in einem Fall von Darier et Gaston und von Osler, die Sensibilitätsverhältnisse die Entscheidung.

Für die übrigen organischen Nervenkrankheiten wird ein Zweifel wohl niemals entstehen können, eine Affektion vielleicht ausgenommen, das ist die Erscheinung der Glossy skin nach peripheren Nervenverletzungen. Hier kommt natürlich nur die Verwechslung mit Sklerodermien in Frage. Kallischer ist auf die Differentialdiagnose zwischen beiden Affektionen eingegangen und führt an, daß bei der glossy skin sich meist noch Zeichen bestimmter Nervenverletzung in Gestalt von individuellen Anästhesien und Parosen finden, daß der Hautatrophie keine Schwellung vorausgeht, daß die Haut dünn, glänzend, rot und gegen äußere Läsionen sehr empfindlich ist. Diese Gesichtspunkte sind im allgemeinen richtig. Freilich kann die Lähmung und Anästhesie sehr zurücktreten, so daß fast allein noch die trophischen Störungen übrig bleiben, und die Hautbeschaffenheit kann der bei Sklerodermie einigermaßen ähnlich sein, namentlich da Schwellung auch bei Sklerodermie nicht immer zu beobachten ist. Doch erstreckt sich die trophische Störung bei der Glossy skin nur selten so weit in die Tiefe, wie bei der Sklerodermie; und es kommt dabei auch nicht zu dieser festen Verlötung von Haut und Knochen, und auch die Zeichen der Bindegewebsvermehrung, die der Haut der Sklerodermie ihre pergamentartige Beschaffenheit gibt, fehlen. Schließlich werden wir auch aus der Genese der Affektion unsere Schlüsse ziehen können.

In einem Fall von Tedeschi scheint es sich einfach um die Kombination von Polyneuritis senilis (bei einem 75-jährigen Mann) mit Sklerodermie gehandelt zu haben.

Die starke Pigmentierung der Haut hat wiederholt zu der Frage geführt, ob neben der Sklerodermie noch ein Morbus Addisonii besteht. Es sind derartige Fälle von Roßbach, Willrich, Férrol, Schulz, Brissaud, Naunyn, Mendel, Nothnagel, Osler, Lépine, Ukenbath, Charvet et Carle, Haenel, Touchard, Tsuchida, Winfield, Lichtwitz beschrieben worden, die Frage aber, ob eine Kombination beider Krankheiten oder eine Sklerodermie mit abnorm starker Pigmentierung anzunehmen ist, ist von den betreffen-

den Autoren verschiedenartig beantwortet worden. Kollbach, Haemel, Touchard, Lichtwitz, Schulz und Willrich haben ein Nebeneinanderbestehen beider Krankheiten angenommen. Naunyn, Nothnagel, Féréol, Lépine, Lesser haben sich strikte dagegen ausgesprochen, die übrigen haben die Frage in der Schwebe gelassen.

Sehen wir uns nach diagnostischen Unterscheidungsmerkmalen um, so finden wir, daß die Pigmentierung bei Addison eine tief dunkle, rauchgraue ist, daß sie gewisse Stellen, wie Brustwarzen, Genitalien bevorzugt, daß sie die Schleimhäute mitbetrifft, und daß zum Krankheitsbild des Addison außer der Pigmentierung eine schwere, allgemeine Asthenie gehört. Was den anatomischen Befund angeht, so trifft auch nach den neuesten Anschauungen (siehe darüber z. B. Biedl, Innere Sekretion S. 155) die von Addison vertretene Auffassung zu, daß dem Krankheitsbilde eine anatomische Erkrankung der Nebennieren zugrunde liegt, und daß nur in Ausnahmefällen eine im anatomischen Befunde nicht begründete Funktionsstörung dieses Organs (durch Affektion der seine Funktion regelnden sekretorischen Nerven) zu postulieren ist. Seht man sich nach diesen Gesichtspunkten die mitgeteilten Fälle von Sklerodermie mit starker Pigmentierung an, so kommt man zu folgendem Resultat. Die Pigmentierung der äußeren Haut, selbst auch in ihrer besondern Lokalisation, hat in einzelnen Fällen durchaus das Bild, das wir bei Addison sehen; die Schleimhautpigmentierung fehlt auch nicht immer; schon Naunyn und Nothnagel fanden eine schwach rauchgraue Verfärbung der Mundschleimhaut; doch kommen gerade hier und besonders auf den Lippen nach Nothnagel solche Flecken auch bei ganz gesunden Menschen vor. Nach Eichhorst finden wir auch an den inneren Schleimhäuten des Mundes physiologische Pigmentierungen, und ebenso sah Senator Schleimhautpigmentierung ohne jedes andere Symptom Addisonischer Krankheit. Nothnagel beschrieb ferner einen Fall von Herzhypertrophie mit ausgeprägten, grau-bräunlichen Flecken auf der Schleimhaut der Lippen, der Wangen und selbst der Zunge und leichter Pigmentierung der Haut, ohne andere Zeichen von Addison. Neuere Untersuchungen haben dann weiterhin ergeben, daß auch bei sicher nicht mit Addison kombinierter Sklerodermie Schleimhautpigmentierung vorkommt. Darauf hat besonders Kren, wie oben bereits berichtet wurde, hingewiesen. Diese Pigmentierung ist nach der Schilderung von Kren nicht scharf abgrenzbar, sie besteht aus kleinen, sehr selten größeren Flecken, und es sah der Pigmentation stets eine Depigmentation folgen. Schon vorher hatte Touchard auf das Vorkommen der Schleimhautpigmentierung bei Sklerodermie hingewiesen; er betonte ihre gegenüber der Addisonischen geringere Intensität und die unscharfe Abgrenzung. Alles in allem genügen also auch die vereinzelten Schleimhaut-

pigmentierungen noch nicht zur Diagnose der Addison'schen Krankheit. Die allgemeine Asthenie mit ihren Nebensymptomen Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen in der Lumbalgegend wurde bei mehreren oben erwähnten Beobachtungen konstatiert, aber sie kann ebensogut ein Zeichen von Sklerodermie sein, in deren späteren Stadien sie, wie wir sahen, oft gefunden wird, was auch Lesser in dem Fall Uhlenhuths hervorhob, wo die Entscheidung, ob Addison vorliege, zweifelhaft war. Entscheidend wird für uns sein müssen, daß in keinem der bisher beschriebenen und sezierten Fälle sich bedeutendere Veränderungen an Nebennieren, Sympathicus oder Plexus solaris fanden. Schulz sah nur eine sehr geringfügige einseitige Nebennierenerkrankung, Roßbach und Willeich fanden gar keine Veränderung. In einem Fall von Charvet et Carle, in dem klinisch neben typischer Sklerodermie mit schwerer und ausgedehnter Pigmentation der Haut später und plötzlich eine sehr ausgesprochene Asthenie auftrat, fand sich bei der Sektion an den Nebennieren folgendes: „La périphérie est dure et sclérosée. Elles ont une consistance pâteuse au centre.“ Nach Tanchard genügt diese Angabe, um von einer großen Läsion der Nebennieren sprechen zu können und damit die für die Diagnose des Addison notwendige anatomische Grundlage zu liefern. In einem zweiten klinisch ähnlichen Fall — nur waren hier die asthenischen Symptome vorausgegangen — fand sich bei der Sektion nichts an den Nebennieren. Ganz eindeutig ist wohl auch der erste Fall von Charvet et Carle nicht, da eine genauere mikroskopische Untersuchung fehlt. Es muß natürlich mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß der sklerosierende Prozeß auch auf die Nebennieren übergreift und auf diese Weise Addison-ähnliche Symptome hervorrufen werden. So läßt sich vielleicht der erste Fall von Charvet et Carle auflösen. Der Fall von Lichtwitz ist ganz ohne Beweiskraft, der anatomische Befund an den Nebennieren ist negativ. Wir werden jedenfalls in Übereinstimmung mit Neuffer sagen müssen, daß Fälle, die sicher als Kombinationen von Sklerodermie und Morb. Addisonii anzusprechen sind, anatomisch bisher nicht beobachtet wurden. Das muß natürlich auch auf unsere klinische Diagnose von Einfluß sein, wenn auch nicht verkannt werden darf, daß rein vom klinischen Gesichtspunkt aus in einzelnen der mitgeteilten Fälle die Diagnose Morb. Addisonii sehr in Frage kommen könnte.

Einige Male ist die Abgrenzung der Sklerodermie von dem Myxödem in Erwägung gezogen worden (Grasset, Besnier, Lussana, Osler, Déhu). Besnier fand bei demselben Menschen Veränderungen, die an Myxödem erinnerten, und außerdem sklerodermatische Stellen am Thorax, Asphyxie locale und gangränöse Veränderungen an den Endphalangen. Magnus Levy sah einen Fall von Myxödem, in dem die Nasen- und Fingerspitzen in demselben atrophischen Zustand sich fanden, wie bei der Sklerodermie. Lussana und Grasset scheinen

eine engere Verbindung zwischen den beiden Krankheiten anschauen zu wollen, nach Grasset stellt die ödematöse Sklerodermie ein Bindeglied zwischen der gewöhnlichen Sklerodermie und dem Myxödem dar. Auch Ouler findet, daß die Schwellung der Gesichtsnäse und der Arme, ferner der Zustand der Thyreoidea und gelegentlich der Behandlungserfolg mit dem Thyroidin an Myxödem erinnern können. Die Nekrosen, die Unbeweglichkeit der Haut und vieles andere sicherten aber bald die Diagnose Sklerodermie. Ich glaube nicht, daß häufig Anlaß zu Verwechslungen zwischen den beiden Krankheiten sein wird; abgesehen von den Hautveränderungen wird der typische Geisteszustand des an Myxödem Erkrankten und die zahlreichen wichtigen Begleitsymptome, die Störungen der genitalen Funktionen, der Schweißsekretion usw. für die Diagnose bestimmend sein. Eine Möglichkeit ist auch hier wieder zu erwähnen: es könnte sekundär durch sklerodermatische Atrophie der Schilddrüse, die, wie wir wissen, beobachtet wurde, zum Myxödem kommen; vielleicht sind einige der erwähnten Fälle so zu deuten.

Von den persistierenden Ödemen (nach Erysipel usw.) wird die Unterscheidung nicht schwierig sein; hier geht trotz einer Vernekerung des Bindegewebes die Induration der Haut nie so weit wie bei der Sklerodermie, es fehlt weiter vor allem die Atrophie. Dieselben Momente dienen auch zur Unterscheidung des bei spinalen Krankheiten beobachteten und mit Verhärtung einhergehenden Ödems; Weir-Mitchell hat einen solchen Fall von Myelitis und indurirtem Ödem mitgeteilt. Der Fall Schultzes, in dem die Diagnose Sklerodermie gestellt wurde, gehört möglicherweise, wie schon einmal betont, doch hierher. — Während des ersten Stadiums der Sklerodermie könnte auch an Elephantiasis gedacht werden, falls die Sklerodermie nur ein Glied befaßt. „Während jedoch die Sklerodermie sehr bald Neigung zur Atrophie zeigt, wird die Elephantiasis weiteres Wachstum zur Folge haben“ (Lewin-Heller). Für andere Fälle von Ödem wird die veranlassende Ursache sich immer finden lassen, abgesehen von allen anderen Unterscheidungsmerkmalen.

Das angioneurastische Ödem ist meist durch seine große Flüchtigkeit ausgezeichnet; wenn es einmal längeren Bestand haben sollte, wird die Diagnose Sklerodermie (I. Stadium) fallen gelassen werden müssen, wenn auch im Verlauf von Wochen und Monaten keine Induration resp. Atrophie eintritt.

In früheren Stadien der Sklerodermie können freilich symptomatisch flüchtige Anschwellungen vorkommen, die dann stets von sehr geringer räumlicher Ausdehnung sind. Auf die Unterscheidung von Sklerodermie und Trophödem komme ich im nächsten Kapitel noch zu sprechen.

Lewin-Heller machen darauf aufmerksam, daß die Sklerodermie

längere Zeit unter dem Bilde eines chronischen squamösen Ekzems (Fälle von Schudewaldt und Lassar) oder dem des Lupus erythematosus (Pringle) verlaufen kann.

Das Rhinoklerom unterscheidet sich durch seinen typischen Sitz von der Sklerodermie, ebenso auch durch die Anwesenheit der charakteristischen Bazillen.

Gelegentlich kann eine Schwierigkeit in der Abgrenzung vom Carcinoid entstehen; auch dafür führen Lewin-Heller Beispiele an. In einem Fall Heitzmanns ergab erst die mikroskopische Untersuchung die Diagnose Krebs. Doch sind das sicher sehr seltene und ungewöhnliche Fälle.

Besweilen macht die Unterscheidung der Sklerodermie von den idiopathischen Hautatrophien Schwierigkeiten. Unter dieser Bezeichnung faßt man neuerdings Symptomenbilder zusammen, die früher in der Literatur eine mannigfach wechselnde Bezeichnung erfahren haben. Sie sind, wie ich schon gelegentlich erwähnt habe, von Pick als Erythromelie, von Buchwald als idiopathische diffuse Hautatrophie, später dann als Akrodermatitis atrophicans chronica progressiva von Herxheimer und Hartmann, auch als Dermatitis atrophicans maculosa beschrieben worden. Finger und Oppenheim haben neuerdings auf Grund der Literaturbetrachtung und auf Grund eigener Beobachtungen das ganze Kapitel monographisch dargestellt und ich verweise bezüglich aller Einzelheiten auf diese Schrift. Die Erkrankung beginnt meist mit der Bildung von Flecken, die alle Abstufungen vom hellsten Rot bis zum Dunkel-Blaurot zeigen können. Die Flecke machen entweder den Eindruck eines leicht entzündlichen Erythems oder den einer Blutstauung, einer passiven Hyperämie. Sie vergrößern sich, fließen zusammen, nehmen so immer größere Hautpartien ein, während in der Nachbarschaft oder an anderen Hautstellen neue Flecke auftreten. Als bald gesellt sich dann ein weiteres bemerkenswertes Kennzeichen der Affektion, eine abnorme Schläffheit der Haut. Es entsteht eine feine Fältelung der oberflächlichsten Schichten und die Haut erhält ein Aussehen, das man nach einer Bezeichnung von Pospelow mit zerknittertem Zigarettenpapier vergleichen kann. Wo normalerweise die Haut wegen ihrer Lokalisation locker und leicht faltbar ist wie am Handrücken, an den Knieen und Ellbogen, ist die Fältelung und Runzelung besonders ausgesprochen. Ferner auch dort, wo reichliches subcutanes Fettgewebe vorhanden ist. Die Oberfläche der Haut ist trocken, fettlos, ebenso fehlt die Schweißbildung, und die feinen Wollhärchen sind sehr gering entwickelt. Unter der verdünnten Haut treten die tiefer gelegenen Bestandteile, insbesondere die Blutgefäße deutlich hervor, sie bilden ein Netz, das wie bei einem Injektionspräparat die Verästelung der Unterhautvenen sehr deutlich erkennen läßt. Die Affektion lokalisiert sich meist symmetrisch an den Extremitäten.

täten, an den unteren wie an den oberen, befällt die Streckseiten der Extremitäten regelmäßig viel intensiver als die Beugeseiten und geht nur selten auf den Rumpf über. Die Sensibilität ist nicht gestört. Höchstens klagen die Patienten über unangenehme Empfindungen oder leichte stechende Schmerzen. Objektive Störungen der Sensibilität finden sich nicht.

Die Ähnlichkeit mit der Sklerodermie kann insbesondere in zwei Stadien des Prozesses in die Erscheinung treten. Bei der von Herxheimer und Hartmann beschriebenen Unterform der idiopathischen Hautatrophie, wie sie als *Akrodermatitis chronica atrophicans* bezeichnet wird, beginnt die Erkrankung mit dem Auftreten teigig-weicher Infiltrate, die flächenhaft ausgebreitet sind, und deren Ähnlichkeit mit Sklerodermie vielfach betont wird. In diesem Stadium findet sich eine Erscheinung mit großer Konstanz. Es ist dies der von Herxheimer und Hartmann sogenannte Uhrentreifen. Man findet nämlich in der Mehrzahl der Fälle einen vom Ellbogen abwärts gegen das Handgelenk ziehenden, bald schärfer, bald weniger scharf abgegrenzten Streifen von verschiedener Breite und Länge. Eine solche Veränderung zeigte sich auch in der folgenden eigenen Beobachtung.

Eine jetzt 55jährige Frau gibt an, daß vor etwa 17 Jahren zunächst in der linken Ellbogengegend ein roter Fleck entstanden sei. Allmählich hat sich diese Veränderung über den ganzen Unterarm an der Streckseite ausgebreitet und ist schließlich in den letzten Jahren auch auf den Oberarm herübergegangen. Es bestehen in dieser Gegend keine Nerven, die in der Tiefe zu sitzen scheinen und die wesentlich unter dem Einfluß der Kälte etwas zunehmen. Der linke Arm wird etwas leichter müde, er ist ein wenig empfindlich gegen Kälte, irgendwelche wechselnden stärkeren vasomotorischen Erscheinungen im Sinne einer Symploge oder Asphyxie sind niemals aufgetreten. Das Centrum der Veränderungen reicht um das Oberarm herum. Die Haut ist hier bläulich verfarbt, an anderen Stellen mehr hell-bleigraut. Diese Färbung geht in einzelnen mehr begrenzten Flecken über den ganzen Arm bis zum Dorsum hinaus auf der einen und bis zur Achselhöhle auf der anderen Seite. An vielen Stellen ist die Haut stark verdickt, verknittert und sieht aus wie Zigarettenpapier. An anderen sind die tieferen Partien der Haut infiltriert und verdickt, dabei besteht aber keine eigentliche sklerodermatische Beschaffenheit der Haut. Die infiltrierten Partien sind zum Teil etwas druckschmerzhaft, die Venen der Haut schimmern vielfach übermäßig deutlich durch. An verschiedenen Stellen finden sich vitiligohäutige Flecke. Die aufgehobenen Falten bleiben an vielen Stellen abnorm lange bestehen.

Wir sehen hier das Stadium der Infiltration und das Stadium der Atrophie nebeneinander bestehen, wie das in der Mehrzahl dieser Fälle, wenn sie eine Zeilung sich entwickelt haben, zu beobachten ist.

Einen diesem sehr ähnlichen Fall hatte ich schon in der ersten Auflage dieses Buches angeführt, und als idiopathische Hautatrophie beziehungsweise Pielische Erythromelie bezeichnet.

N., 34jährige alte Handelsfrau. Pat. bemerkt seit 8—9 Jahren Veränderungen am rechten Arm, die darin bestehen, daß sich die Farbe der Arme geändert hat. Zunächst wurde die Haut um den Ellbogen herum rot, diese Rote breitete sich

über den ganzen Unter- dann auch Oberarm aus, verschont dagegen blieb die Hand; anfangs bestanden keine Schmerzen, jetzt tritt hin und wieder Bissen im Arm besonders im Ellbogengelenk auf und Pat. hat immer Kältegefühl. Die Zunahme der Rötterfolgte schubweise, besonders stark zu Zeiten der Gravidität. In letzter Zeit soll der Arm stark schwächer geworden sein, Taubheitsgefühl besteht nicht. Gleichzeitig mit der Rötterfärbung soll eine Verdünnung der betreffenden Hautpartien sich eingestellt und sich allmählich ausgebreitet haben. Man sieht am rechten Unterarm und den letzten zwei Dritteln des rechten Oberarms eine fleckige Verfärbung, ein Gemisch von Cyanose und Röte, die sich durch Fingerdruck auch momentan nicht vollständig beseitigen läßt. Die Haut in diesen Partien ist außerordentlich dünn, so dünn, daß man sie beim Aufheben zu zerreißen fürchtet, außerdem sehr gefaltet; am stärksten sind die Veränderungen am Oberarm. Die Hand läßt sich bequem in Falten hochheben, ist nirgends angefüllt, nirgends verdickt. Sensibilität und Sensibilität völlig intakt. Hautbeschaffenheit am übrigen Körper völlig normal.

Die Schilderung ist, wie man sieht, charakteristisch für die *Atrophia cutis propria*.

Ein Fall von Gräwitz, der durch angeblich akuten Beginn und Ausdehnung auf eine ganze untere Extremität abweichend ist, zeigt im übrigen doch so deutlich die Symptome der *Atrophia cutis propria*, daß man ihn wohl mit großer Wahrscheinlichkeit hierher rechnen kann.

Eine Hautveränderung, die Finger und Oppenheim genau beschreiben, gibt zuweilen zu Verwechslung mit der Sklerodermie Anlaß. Namentlich am Unterschenkel und Fußrücken erscheint die Haut im Gegensatz zu ihrem Verhalten in der Nachbarschaft, wo sie rot und blau und vielfach verknittert ist, ziemlich straff gespannt, nur schwer faltbar und von auffallend gelb-weißer Farbe. Die Grenzen ihrer Umgebung sind hier meistens unscharf. Die Oberfläche der Haut ist glatt, speckig, wachsartig, manchmal durch braune Pigmentierung gesprenkelt. Die Venen, zum Teil erweitert, sind deutlich sichtbar und prominent. Auch ich habe einige derartige Fälle beobachtet, in denen die Annahme einer sklerodermatischen Veränderung der Haut nahelag, wenn man nicht auf die charakteristische Veränderung der Umgebung dieser Sklerodermie-ähnlichen Flecke achtete. Am häufigsten wurden nach Finger und Oppenheim Fälle von fleckweiser Sklerodermie als *Atrophia cutis propria* publiziert und zwar als Beispiele derjenigen Unterform, die als *Atrophia cutis maculosa* bezeichnet wird. Die circumscribte Sklerodermie hat mit dieser Erkrankungsform das Auftreten in vereinzelten asymmetrischen, matten oder violettten Flecken gemeinsam, welche in dem Maß, als sie sich ausdehnen, in ihrer Mitte abblässen und eine matt oder gelblich-weiße Farbe annehmen. Die Konsistenz jedoch ist gänzlich verschieden. „Während man bei der *Atrophia maculosa* im Beginn in den centralen Partien ein flammig-weißes Gefühl, später das Gefühl des Defekts, des Substanzverlustes hat, erscheint die centrale Partie bei der Morphoea hart, trocken, unelastisch und sehr resistent, die Oberfläche ist dabei glatt, manchmal leicht schülfernd im Gegensatz zur Oberfläche der atrophischen Haut.

Beiden Affektionen gemeinsam ist die häufigere Lokalisation im Gesicht und an den Extremitäten gegenüber der am Stamm und die oft asymmetrische Anordnung. Verschieden ist jedoch der Ausgang. Die circumscripte Sklerodermie heilt in der Regel spurlos aus, die echte makulöse Atrophie scheint keiner Ausheilung zugänglich zu sein. Der „Lilae ring“, der violette oder bläulich rote Saum, der den pigmentlosen weißen Fleck gegen die normale Haut abgrenzt, kann bei beiden Affektionen vorkommen, ist jedoch häufiger und länger bestehend also charakteristischer für die Morphoea.“

Diese hier angegebenen Unterscheidungsmerkmale sind nicht alle beweiskräftig. Am auffälligsten ist die Angabe des Ausheilens der Morphoea, die doch keineswegs der Regel entspricht. Wichtig dagegen sind die Angaben über die Differenzen in der Konsistenz. Es wird zweifellos, auch nach der Schilderung von Finger und Oppenheim Fälle geben, in denen die Differenzierung dieser beiden Affektionen die größten Schwierigkeiten hat. Es wurden auch Fälle publiziert, in denen eine Kombination von Sklerodermie und Hautatrophie vorliegen sollte. Nohl, Metscherski, Busch haben derartige Fälle mitgeteilt. Finger und Oppenheim stehen derartigen Kombinationen skeptisch gegenüber und behaupten, daß bis jetzt eine wirkliche Kombination beider Formen nicht bekannt geworden ist.

Eine Abgrenzung von der Sklerodermie verlangt noch das *Sclerema neonatorum*. Wir sahen, daß echte Sklerodermie auch bei Säuglingen vorkommt (Fälle von Herzheimer, Cruse, Boldoni, Goodell, Neumann, Haushalter et Spillmann). Die beiden Affektionen sind auch für identisch gehalten worden (Thirial u. a.). Neuendings trennt man sie meist. Herzheimer gibt als Merkmale an, daß das Ödem bei dem *Sclerema neonatorum* ziemlich konstant zu sein scheint, daß ferner die inneren Organe sofort mitbetroffen werden, daß der Verlauf ein rapider ist. Aber auch bei der Sklerodermie namentlich der Säuglinge kommt das letztere vor. Herzheimer entscheidet sich dahin, die Krankheiten mindestens klinisch zu trennen. Nach v. Nottmann ist das häufige Befallenwerden der Genitalien charakteristisch für *Sclerema neonatorum*, im Gegensatz zu Sklerodermie. Senator betont, daß beide Affektionen absolut zu trennen sind.

Diese Trennung wird wohl jetzt überall durchgeführt.

Luithlen unterscheidet zwei Formen des Sclerem, das *Sclerema edematosum* und das *Sclerema adiposum*. Er schildert die erste Form in folgender Weise: Oft ohne deutliche ausgesprochene Prodrome, als welche man manchmal Ursache, Verweigerung der Nahrung, Schwächerwerden der Herzaktion und Respiration beobachtet, tritt ödematöse Anschwellung der Füße, des Fußrückens, der Wade sowie besonders bei den Füßen, wo keine Grundkrankheit besteht und wo die Affektion

kurz nach der Geburt beginnt, auch der Augenlider und der oberen Extremitäten auf. Die Farbe der Haut ist entweder nicht verändert oder cyanotisch, wird später meist ödematös, der Fingerdruck bleibt stehen oder gleicht sich langsam aus. Es kommt zu bedeutender Volumenzunahme und Formveränderung durch das besonders in den Partien mit lockerem Zellgewebe stärker entwickelte Ödem. Die Temperatur der Haut ist herabgesetzt. Die Kinder liegen apathisch da, verweigern die Nahrungsaufnahme, so daß die Ernährung mit dem Löffel vorgenommen werden muß. Die Körpertemperatur ist oft herabgesetzt. Unter stetem Schwächerwerden der Respiration und der Herzthätigkeit, unter stetem Temperaturabfall tritt, nachdem in manchen Fällen nervöse Erscheinungen (Zuckungen, Konvulsionen) vorausgegangen sind, der Exitus ein. Der Verlauf der Affektion kann sehr rapid sein, meist dauert die Krankheit aber doch vier bis fünf Tage, kann sich aber auch über ein bis zwei Wochen erstrecken. Die Prognose ist ungünstig, aber doch nicht absolut infam. Die Differenzen gegenüber der Sklerodermie liegen auf der Hand. Die letztere kommt, wenn auch sehr selten, bei Neugeborenen vor. Es fehlen aber hier durchaus die allgemeinen Störungen, Puls, Atmung und Temperatur sind normal. Daß gerade die in diesem frühen Alter auftretende Sklerodermie eine günstige Prognose gibt, wurde früher bereits erwähnt.

Das Sclerema adiposum schildert Luithlen in folgender Weise: An den erkrankten Partien tritt zuerst ohne Veränderung der oberflächlichen Beschaffenheit der Haut Vermehrung der Konsistenz der Haut ein, im weiteren wird die Haut glatt, straff gespannt, hart, so daß kein Fingerdruck möglich ist, sie ist dann unverschieblich, wie mit der Unterlage verwachsen. Die Färbung ist meist blaß, seltener cyanotisch, die Temperatur ist herabgesetzt. In schweren Fällen ist die Haut ganz kalt, wie gefroren, wie bei einer Leiche anzufühlen. Die aktiven und passiven Bewegungen sind sehr eingeschränkt, die Kinder liegen apathisch, unbeweglich da, die Respiration ist erschwert, mühsam und langsam, die Pulsfrequenz angeblich ebenfalls verlangsamt, die Temperatur objektiv stark herabgesetzt. In den schwereren Fällen kommt es bei allgemeiner Ausbreitung unter stetem Sinken der Körpertemperatur, Verlangsamung der Respiration und der Circulation bei vollständiger Bewußtlosigkeit zum Exitus. Der Verlauf ist ein rapider. Die Prognose ist im allgemeinen als günstig anzusehen, hängt aber von der Grundkrankheit, die meistens vorhanden ist, ab. Es findet sich eine eigentümlich harte, feste, trockene Beschaffenheit des Fettgewebes und eine Austrocknung der Haut. Die Unterscheidung der pathogenetisch ganz unklaren Affektion von der Sklerodermie läßt sich auf Grund der kurzen Schilderung, wie ich sie eben gegeben habe, meines Erachtens unschwer durchführen.

Fälle von Sklerödem der Erwachsenen sind bisher nur ganz vereinzelt

beschrieben worden von Buschke, Pinkus, Rissam, Bamberger. Der letztgenannte Autor beobachtete eine 26-jährige Kranke, die zwei Attacken einer derartigen über Gesicht und Brust sich ausbreitenden Schwellung erlebte. In kurzem kam es dabei zu einer Gewichtszunahme von 20 Pfd. und auch wieder zu einer entsprechenden Abnahme. Die Schwellung war hart, man hatte das Gefühl, als ob in der Tiefe ein ödematöses Infiltrat liege. Die Unterscheidung gegenüber der Sklerodermie muß nach den oben entwickelten Gesichtspunkten erfolgen.

Sehr schwierig kann schließlich noch die Unterscheidung zwischen chronischem Gelenkrheumatismus und Sklerodermie sein. Es ist früher wenig darauf gewichtet worden, Hallopeau hat diesen Punkt behandelt und hat als Unterscheidung angeführt, daß die Arthritis niemals so destruktive Tendenzen zeigt und nie so rasch zur Atrophie von Haut und Knochen führt. Dann ist Dercum genauer auf das Verhältnis beider Krankheiten eingegangen und hat die große Ähnlichkeit, die sich zwischen den beiden Affektionen ergeben kann, hervorgehoben.

Wie schwierig die Unterscheidung werden kann, lehrt außer den beiden von mir schon oben mitgeteilten Fällen noch die folgende eigene Beobachtung.

Frau N., 55 Jahre. Näheres. Pat. hat früher an typischen Migräneschüben mit Kopfschmerzen und Augenflimmern gelitten. Dieser der Anfälle zwei bis drei Tage, kein Erbrechen. In den letzten Jahren sind diese Anfälle sehr selten. Ihre jetzige Krankheit begann Weihnachten 1898. Sie spürte zunächst ein Brennen im vierten und fünften Finger der linken Hand, anfangs schienen die Finger äußerlich nicht verändert, erst später bekamen sie oft ein komprimiertes Aussehen; nicht lange darauf traten Schmerzen auch in der linken Schulter ein, die Schmerzen waren dauernd nicht eigentlich reißend, sondern brennend, ein unangenehmes, heißes Gefühl, das Schlaf war dadurch gestört. Allmählich fingen die Finger an, krumm und steif zu werden. Mitte Juni 1899 trat auch in den Fingern der rechten Hand Brennen, Schwellung und Steifigkeit ein. Der linke Handrücken zeigte dauernd eine Farbveränderung, er wurde dunkelbraun. Pat. hob das auf die angewendete Jodtinktur, mußte aber diesen Gedanken aufgeben, als auch die rechte Hand dieselbe Verfarbung zeigte, obwohl sie hier das genannte Mittel nie angewendet hatte. Erste Untersuchung am 2. Juli 1899: Die Finger stehen beiderseits in den Interphalangealgelenken in Beugestellung. Die Stellung ist in den ersten Interphalangealgelenken fast völlig fixiert, es ist hier nur eine geringe Biegung, gar keine Streckung möglich, auch die Bewegungen in den zweiten Interphalangealgelenken sind stark beschränkt, am stärksten im Daumen. Die Metacarpophalangealgelenke sind im wesentlichen frei. Die Haut ist, namentlich über dem Handrücken beiderseits entzündet verlästet, stellenweise papulös, wie rissig und hin gefüllt, aber auf der Unterlage überall deutlich verschiebbar, dabei ziemlich dunkelbraun gefärbt. An den Fingern ist die Haut auffällig gerötet, straffer gespannt, glatt, stellenweise etwas mit der Unterlage verwachsen, am stärksten an beiden Daumen. Die Endphalanx des linken kleinen Fingers ist deutlich verkümmert und zugespitzt, an der Innenfläche der Hand und der Finger ist die Haut ebenfalls abnorm rot. Die Nagelstümpfe sind stark abgenagelt, ebenso die Muskeln des Kleinfingerballens. Das Handgelenk ist links fast völlig fixiert. Die Ellenbogengelenke sind beiderseits frei, das Schultergelenk ist links ankylosiert, rechts frei.

beiderseits ist die Muskulatur der Finger am Intermen atrophisch, während die der Extensoren eher etwas verhärtet erscheint. Die elektrischen Untersuchungen ergäben überall nur qualitative Abnahme der Erregbarkeit. Die Sensibilität ist für alle Qualitäten intakt. Pat. klagt über ein untragbares Brennen, als ob sie sich die Hand verbrannt hätte. Die Farbveränderungen an der Hand schwanken nur wenig an Intensität, namentlich Synkope. Die Motilität ist wegen der zahlreichen, mechanisch bedingten Störungen schwer zu beurteilen, doch scheint keine eigentliche Lähmung zu bestehen. An den unteren Extremitäten und dem Gesicht keine Veränderungen, die von Wichtigkeit sind. Im weiteren Verlauf schwankt die Intensität der Krankheitserscheinungen. Im September 1909 hatte Pat. Schmerzen in der rechten Schulter, die linke Hand wurde im allgemeinen besser, dafür aber die rechte schlechter; in letzter Zeit sind die Schmerzen im ganzen geringer geworden. Die starke Färbung der Hände besteht fort, in der Kälte nehmen sie eine graublaue Farbe an. Die Finger sind auch jetzt noch (Mai 1909) rot, die Enden der beiden fünften Finger und des linken zweiten Fingers zugespitzt, die Nägel längs geriffelt, einzelne der kleinen Gelenke der Finger entschieden geschwollen und druckempfindlich, die übrigen eher Teil nekrotisch. Die Haut ist gegen früher nicht wesentlich verändert, glatt, rot, dünn, aber nur an wenigen Stellen der letzten Phalangen etwas fixiert. Die Haut am Handrücken ganz wie früher, an der rechten Hand sind die Störungen jetzt im allgemeinen stärker als links. Die Finger liegen hier dachziegelförmig, in halbgebogener Stellung fixiert, übereinander. In letzter Zeit hat Pat. am linken Fuß über Schmerzen; das Metatarsophalangealgelenk der ersten und fünften Zehe ist geschwollen, etwas rot und druckempfindlich.

In vieler Beziehung erinnert das vorstehend mitgeteilte Krankheitsbild an einen Gelenkrheumatismus mit subakutem resp. chronischem Verlauf. Es kann auch keinem Zweifel unterliegen, daß der Krankheitsprozeß zum großen Teil in den Gelenken seinen Sitz hat; zahlreiche Gelenke an den Händen und einige andere sind zeitweise schmerzhaft, druckempfindlich und bisweilen ist die Haut über ihnen auch etwas heiß. Neben den sicher vorhandenen artikulären Veränderungen weist aber auch die Haut in größerer Ausdehnung um die Gelenke herum Veränderungen auf. Sie ist abnorm gefärbt, teils durch abgelagerten Pigmentfarbstoff dunkelbraun, teils durch abnorme Gefäßfüllung rot, mit einer Beimischung von Cyanose, wie an den Fingern, oder ohne solche, wie an der Vola manus; die Haut ist ferner an allen diesen Stellen atrophisch, dünn, sieht wie zerknittert aus; aber an keiner Stelle findet sich eine deutliche Verhärtung, und mit der Unterlage ist sie auch nur in geringer Ausdehnung verwachsen.

Diese Veränderungen weichen also von dem Typus der sklerodermatischen entschieden etwas ab, sie gehen aber weit über das hinaus, was man sonst wohl beim Gelenkrheumatismus an Veränderungen der periartikulären Gewebe, durch ödematöse Infiltration usw. sieht. Unser Fall gleicht in vieler Beziehung einer von Dercum in seiner schon zitierten Arbeit publizierten Beobachtung. Auch dort fanden sich ausgeführte trophische Veränderungen der Haut, die da allerdings mehr infiziert und mit der Unterlage verwachsen war. Und auch die mus-

kulären Veränderungen gingen dort, ganz wie in unserem Fall, über das Maß der gewöhnlich beobachteten arthropathischen hinaus, wenn sie auch sonst deren Charakter trugen. Neben den Extensoren waren dort wie hier die Flexoren deutlich atrophisch. In beiden Fällen waren einzelne Gelenke betroffen, ohne daß die umgebende Haut verändert war, bei Derrum die Schultergelenke, in unserem Fall daneben in jüngster Zeit auch zwei Metatarsophalangealgelenke. Aber auch das kommt gelegentlich bei Sklerodermie vor, obwohl es in so ausgedehntem Maße bis jetzt noch nicht beobachtet wurde. Derrum kommt zu dem Schluß, daß unter dem Namen chronische, rheumatoide Arthritis zwei, wenn nicht mehr klinische Krankheitsbilder verstanden werden, eins, in dem ein sklerosierender Prozeß, ähnlich, wie bei der Sklerodermie, vorliegt, und ein anderes, in dem Absorption von Gelenkknorpel, Osteophytenbildung, Eburnation der Knochen die Hauptsache ist. Derrums wie unser Fall gehörte dann in die erste Kategorie, die sehr nahe Beziehungen zur Sklerodermie hat, bzw. nur eine besondere Lokalisation dieser Krankheit darstellt.

Wir müssen abwarten, inwieweit spätere Erfahrungen diese Auffassung stützen werden.

Ähnliche Beziehungen und differential-diagnostische Schwierigkeiten können sich gelegentlich zwischen der Sklerodermie und der Polymyositis subcutanea ergeben. Dafür kann als Beweis besonders ein von Oppenheim beobachteter Fall gelten, den auch ich lange Zeit zu sehen Gelegenheit hatte. Es handelte sich da um einen 8 jährigen Knaben, der im September 1898 an Schmerzen im Rücken und an den Gliedmaßen erkrankt war. Diese nahmen zu und führten zu einer Erschwerung der Beweglichkeit. Dazu gesellte sich eine Rötung in der Lidwangenengegend sowie an den Händen und Schwellungszustände in denselben Gebieten, außerdem Brennen und Schmerzen im Munde und Rachen. Einige Male kam es zu einer beträchtlichen Temperatursteigerung; auch Hyperhidrosis bestand. Die objektive Untersuchung ergab schwere Veränderungen an der Muskulatur, der Haut, dem Unterhautgewebe und den Schleimhäuten. Zunächst fiel die steife Haltung und Bewegungslosigkeit auf, die zum Teil auf der Schmerzhaftigkeit der Bewegungen beruhte. Insbesondere waren die Bewegungen des Kopfes, das Erheben der Arme und die Bewegungen des Rumpfes stark behindert. Aber außer der Schmerzhaftigkeit lag noch eine wirkliche Parese und Atrophie vor sowie andererseits abnorme Spannungszustände und Kontrakturen einzelner Muskeln. An den Musc. deltoidei, biceps, brachialis und der Oberschenkelmuskulatur fühlte man statt des normalen Muskelgewebes dichte, straffe, söhnige Gefilde. Diese Teile waren ganz besonders schmerzhaft bei Druck und Palpation. Dazu kamen die Veränderungen der Haut, das Erythem und die Rötung des Gesichts, das Ödem der Lidwangenengegend, die Rötung und Schwellung am Handrücken, bläuliche Ver-

färbung an der Rückseite der Finger und an den Ohren, schließlich die Entzündung der Mund-, Gaumen- und Zungenschleimhaut. Allmählich verwandelte sich dieses Bild, so daß nach 4 Jahren das Aussehen des Patienten ein ganz anderes war. Das Gesicht hatte ein buntscheckiges Aussehen, rote Flecke und kleine Erhabenheiten wechselten ab mit atrophischen, blassen, pigmentlosen Hautpartien. Die Haut ist besonders in der Gegend der Nase, des Kims, der Ohren verdünnt, straff gespannt und sieht wie lackiert aus. An den Händen erscheint die Haut wie marmoriert, in dem blass pigmentlose verdünnte Stellen mit rötlichen und bläulich-rötlichen abwechseln. Am Rücken der Finger hat die Haut eine narbige Beschaffenheit. Die Arme sind in den Ellenbogengelenken spitzwinklig gebeugt, die Hände in den Handgelenken gestreckt, die Finger gebeugt. Diese Stellung ist eine fixierte, teils durch Muskelspannung und Verkürzung teils durch Gelenkveränderungen. Besonders auffällig ist die erhebliche Verdünnung und Verschrumpfung dieser Gliedmassen, die sowohl auf Schwund der Weichteile wie der Knochen zurückzuführen ist. Die Weichteile scheinen dem Knochen fest anzuliegen, sie haben eine dichte, stellenweise z. B. an den Pectorales breitbarte Beschaffenheit. Dabei sind die Muskeln überall sehr druckempfindlich. Die Schleimhaut des Mundes und des Gaumens zeigt starke Schwellung, Wulstung, Rötung und kleine Ulcerationen. An den unteren Extremitäten beschränken sich die Krankheitserscheinungen auf die Muskeln und zwar nur auf einige wie die Adductoren. Auch sind die Veränderungen hier weniger intensiv. Während in den ersten Stadien in der Diagnose der Dermato-polymyositis, die sich auch auf die Schleimhäute ausgedehnt hatte, kein Zweifel sein konnte, ist jetzt die Beschaffenheit der Haut und der Muskeln eine derartige, daß man wohl an die Diagnose einer Sklerodermie resp. einer Myosklerose denken könnte. Als Sklerodermie wurde der Patient in der Tat auch von verschiedenen Autoren aufgefaßt und zum Teil auch demonstriert. Derjenige Punkt, der auch jetzt noch in der Symptomatologie hauptsächlich abweichend ist, ist die starke Schmerzhaftigkeit der Muskulatur, und auf dieses differentialdiagnostische Moment wird wohl auch in Zukunft der größte Wert zu legen sein. Aber es liegt auf der Hand, daß dort, wo eine genaue Beobachtung der Entwicklung nicht möglich ist, wo wir nur das Endstadium des Prozesses vor uns haben, daß dort gelegentlich eine Verwechslung der Polymyositis resp. ihrer Ausgänge mit der Sklerodermie statthaben kann. Die akute feberhafte Entstehung, die intensiven Schmerzen, die starke Beteiligung der Schleimhäute an dem Prozeß, die dauernde Schmerzhaftigkeit, die Unregelmäßigkeit der Verteilung und der Intensität der Hautveränderung werden in der Mehrzahl der Fälle allerdings eine Differentialdiagnose wohl ermöglichen.

Therapie.

Die Behandlung der Sklerodermie steht auch heute noch auf dem von Lewin-Heller präzisirten Standpunkt: wir sind nicht im Besitz eines Mittels, mit dem wir die Krankheit wirksam zu beeinflussen vermögen. Gewiß sind Heilungen berichtet worden, aber wir wissen, daß die Sklerodermie auch spontan heilt, und nichts berechtigt uns in den mitgetheilten Fällen, die Heilung der angewandten Behandlung gut zu schreiben. Unter genau der gleichen Therapie sah Sternthal einen Fall heilen, den anderen völlig unbeeinflusst bleiben.

Von den Heilmitteln, die in neuerer Zeit angewendet wurden, ist dem Thyreoidin am meisten Aufmerksamkeit geschenkt worden. Es wurde mit großer Zuversicht empfohlen, zumal es auch zu der von einigen Seiten aufgestellten Schilddrüsentheorie der Krankheit recht gut paßte; es wurden glänzende Resultate berichtet, zuerst wohl von Singer, der das Glück hatte, in seinem Fall von Sklerodermie kombiniert mit Basedow'scher Krankheit beide Krankheiten unter dem Gebrauch dieses Mittels sich sehr wesentlich bessern zu sehen. Ähnliche Erfolge berichteten Grünfeld, Stieglitz, Weber, Morrow, Sachs, Wagner, Pison, Morselli, Jakimoff, Kornfeld, Marsh, Ménétier und Bloch, Roques, Schüller. Aber es kamen dann Fälle, in denen es versagte, in denen es auch nicht vertragen wurde und bald abgesetzt werden mußte. (Lassar, Biss, Dreschfeld, Friedheim, Schäffer, Herzheimer, Heller, Gebert, Uhlenhuth, Touchard, Constantin et Leyrat, Becker, Noorden, Schulz und Döhle). Osler hat ziemlich ausgedehnte Erfahrungen über den Thyreoidingebrauch bei Sklerodermie gesammelt. Er hat es in sechs Fällen gegeben, einmal nur kurze Zeit mit dem Erfolge leichter Besserung, einmal einige Monate, ebenfalls mit günstigem Erfolg, aber Osler selbst schiebt diesen auf die Regelung der Diät und der gesamten Lebensweise. Einmal war nach 1½ jähriger Darreichung des Präparates wenigstens kein Fortschritt der Krankheit zu konstatiren, in den zwei anderen Fällen war trotz vielmönatlicher Behandlung ein Erfolg nicht nachweisbar; eine Schädigung durch die lange Thyreoidinbehandlung wurde in keinem Fall gesehen. Im ganzen scheinen dem Autor seine Erfahrungen nicht zugunsten des Mittels zu sprechen. Noorden sah nach seiner Anwendung eine mehrmonatliche Glykoserie. Auch ich habe es in zwei meiner Fälle versucht, habe es monatelang brauchen lassen, aber auch nicht die Spur einer Einwirkung gesehen. Wir werden v. Nott-hafft Recht geben müssen, daß wenn man die erzählten Erfolge dem Thyreoidin überhaupt zugute halten will, das nur insofern berechtigt ist, als das Thyreoidin den allgemeinen Stoffwechsel stark beeinflußt und in dem einen oder dem anderen Fall dadurch auch eine günstige Wirkung auf die sklerodermatischen Hautpartien ausübt. Ein spezi-

isches Heilmittel ist es nicht, und es bedarf sehr sorgfältiger Überwachung bei seiner Applikation, zumal wenn es sich wie oft um heruntergekommenen, widerstandsunfähigen Individuen handelt. Neuerdings ist Roques wieder energisch für die Verwendung des Mittels eingetreten. Er sah unter 80 Fällen in mehr als der Hälfte der Fälle Erfolg und rät es in kleinen Dosen für Monate und Jahre weiterzugeben.

Von anderen Organpräparaten ist von Uhlenhuth der Nebennierenextrakt versucht worden, ebenfalls ohne Erfolg. Winfield sah dagegen Besserung durch dessen Darreichung, ebenso Millard durch Injektionen von Arrhénal in einem Fall von diffuser Sklerodermie, die bis dahin jeder Behandlung getrotzt hatte. Monnet empfiehlt allgemein für die kutanen Trophoneurosen die Einspritzung Brown-Séquard'scher Flüssigkeit. Franke versuchte sie in einem Fall von Sklerodermie ohne jeden Erfolg. — Schwerdt empfahl eine Behandlung mit Extrakt von Mesenterialdrüsen vom Schaf (*Coeliacin*) 0,3 I—2 × tgl., und will dadurch Besserungen erzielt haben.

Mit großem Enthusiasmus wurde vor nicht langer Zeit ein anderes Mittel empfohlen oder besser gesagt wieder empfohlen, das Salol resp. die Salicylpräparate, von denen Philippson außerordentliche Erfolge sah. Er fand nach Anwendung von Salol in Dosen von 2—3 g., daß die Hautverhärtung allmählich verschwand, und daß die Parästhesien aufhörten. Im ersten Fall beobachtete er schon nach achtstägiger Anwendung Besserung, im kranken Gewebe entwickelten sich gesunde Partien, und mit der Besserung der lokalen Erscheinungen ging auch eine deutliche Besserung des Allgemeinbefindens einher. Rulau hatte ebenfalls mit Salicylpräparaten gute Erfolge, ebenso Morrow; einigen, wenn auch nicht durchschlagenden Erfolg berichten auch Schäffer, Uhlenhuth, Keller, Sternthal, Oster, Schubinger, Weber, Becker und Delbanco fanden es dagegen vollkommen nutzlos.

In allen möglichen Formen wurde der elektrische Strom angewendet. Brocq erzielte glänzende Erfolge mit der Elektrolyse; er hat neun Fälle behandelt und zwei davon völlig geheilt, fast alle anderen gebessert. Man braucht nicht jeden einzelnen Flecken zu behandeln, die Erfahrung zeigt, daß die Plaques auch verschwinden, wenn nur die größeren von ihnen in Angriff genommen werden. Die Stromstärke richtet sich nach der Empfindlichkeit des Kranken und der Infiltration des Gewebes. Wenn um die Stelle des Polansatzes ein heiklicher Hof entstanden ist, hört man auf. Der Zweck ist nicht, krankes Gewebe zu zerstören, sondern den Strom auf eine möglichst große Hautfläche einwirken zu lassen. Alle acht Tage soll man die Prozedur vornehmen. Nachher Waschen mit Sublimatalkohol und Auflegen eines Quecksilberpflasters; schon nach drei Sitzungen ist das Fortschreiten der Krankheit gehemmt. Brocq's Fälle hatten bis dahin jeder Behandlung getrotzt und zeigten keine Zeichen einer Spontanheilung gezeigt. Auch

Hallopeau hat die Elektrolyse angewendet, ebenso Acchioti, Durrer et Gaston, Loewenheim, andere haben sich des einfachen galvanischen Stromes bedient, wieder andere die Franklinsation benutzt (Boisjean, Kallischer, Brissaud, White, Adler). Hier und da wurde ein Erfolg gesehen. Meist war auch diese Behandlung nutzlos. Leredde et Thomas wandten elektrische Bäder an, mußten diese aber aufgeben, denn es bildeten sich am Unterarm und an der Schulter Schorfe, die nur langsam verheilten. Diese und ähnliche Erfahrungen werden uns große Vorsicht in der Anwendung der Elektrizität auf sklerodermatische Partien lehren. Namentlich dort, wo spontan Sympkope locale eintritt, werden wir sie nur sehr behutsam in Anwendung ziehen dürfen. Wir sahen übrigens auch schon bei der Raynaudschen Krankheit, daß in ähnlichen Fällen die Elektrotherapie nicht ganz gefahrlos ist. In einem Fall von Sklerodermie an handes wollen Huet und Sicard durch Anwendung von Hochfrequenzströmen einen großen Erfolg erzielt haben.

Die Massage ist vielfach verwendet worden. Sie leistet ungewiss, indessen sie eine gewisse Geschmeidigkeit der Haut, wenigstens für einige Zeit, aufrecht erhält und außerdem die Muskulatur stärkt und vor der Inaktivitätsatrophie bewahrt. Lewin-Heller machen andererseits darauf aufmerksam, daß sie durch Reizung der an und für sich entzündeten Gefäße wohl auch schaden könnte. Jedenfalls wurde auch sie einige Male schlecht vertragen. Die Substanz, mit der massiert wird, trägt jedenfalls nichts zur Einwirkung bei. Heller und Franke fanden Salicyl-Vaseline und Resorbin wirkungslos. Mosler empfiehlt Einreibungen mit Ichthyl-Vaseline, dazu Vollbäder mit 60 g Ichthyl und innerlich 0,1 Calcium sulfo-ichthyl und sah davon einigen Erfolg. Auch Ulenhuth sah von dieser Behandlung köstlich Gutes. Vorsichtige Gymnastik vermag wohl in passenden Fällen einiges zu nützen. Natürlich ist auch das Radium versucht worden, v. Benizen sah eine Besserung nach einer Radiumtrinkkur.

Hydratische Prozeduren wurden vielfach angewendet. Es wurden Dampfbäder und warme Douchen benutzt (Vidal, Mosler), es sind die verschiedenen natürlichen Bäder versucht worden, wie Franzensbad, Kreuznach, ferner Schwefel- und alkalische Bäder. Lewin-Heller warnen vor Salzbadern, die in einem Fall heftiges Brennen verursachten, und empfehlen bei starken Reizzuständen Kiehlbäder.

Heißluftbehandlung wurde zuerst von Neumann angewendet, indem er sich dabei des Taubermannschen Apparates bediente. In den letzten Jahren hat uns die Technik eine Reihe von für diesen Zweck sehr brauchbaren Apparaten geliefert, deren versuchsweise Anwendung dringend zu empfehlen ist. Ich habe einige Male namentlich in den Fällen von Sklerodaktylie recht gute Erfolge gesehen, während sonst gerade die Sklerodaktylie eine sehr ungünstige Prognose gibt. Ich habe dabei gewöhnlich mit diesem Verfahren eine Bierische Saugung und Stauung kombiniert.

Von den inneren Mitteln sind neben den oben genannten vor allem die Tanina in Anwendung gezogen worden: Eisen, Arsen, Chinin, und sie haben da, wo der allgemeine Ernährungszustand darunter liegt, in Verbindung mit kräftiger, roborisierender Diät natürlich ihre volle Berechtigung. Fast stets erfolglos waren antisypilitische Maßnahmen. Auch Diaphoretica erscheinen zwecklos (Lewin-Heller). Liebreich sah in einem Fall Erfolg von seiner Cantharidinmedikation, und Lewin-Heller bestätigen das. Ewart hat Trinitrin empfohlen.

Hebra hat zuerst Injektionen von Thiosinamin versucht. Er benutzte eine 15% alkoholische Lösung und injizierte davon ein bis zweimal wöchentlich bis zu einer halben Pravazischen Spritze voll in die Interapularregion, aber nicht subkutan, da dabei Nekrosen vorkommen können. Er sah in drei Fällen günstige Erfolge, die er auf die lymphtreibende Wirkung des Mittels bezieht. Auch Scholtz sah nach 120 Einspritzungen von 0,1 g pro Dose eine Heilung. Ebenso empfiehlt Kaposi das Mittel, an dessen Stelle jetzt meist das Fibrolysin angewendet wird. Franke, Pusinelli, Delbanco, Spiegel, Galewski, Seherber, Schild, Perlz u. a. haben damit Versuche angestellt, mit wechselnden Ergebnissen. Meine eigenen Erfahrungen lauten durchaus nicht durchweg günstig, aber ich rate doch auch zu Versuchen in dieser Richtung, da ich in einigen Fällen, namentlich in einem schweren Fall von Sklerodaktylie Besserung eintreten sah.

Lindemann hat an Stelle des innerlichen Gebrauchs von Arsen bezw. neben diesem eine sorgfältig neutralisierte Lösung von Natrium arseniosum angewendet und damit dem Körper große Arsendosen bis zur beginnenden Vergiftung eingespritzt. Er hat damit einen Erfolg erzielt.

Sogar chirurgische Eingriffe sind gemacht worden. Hoffa excidierte eine streifenförmige sklerodermatische Stelle, angeblich weil aus der lokalisierten oft eine diffuse Sklerodermie wird. Das ist richtig; wieso aber die Exzision das verhindern soll, ist mir nicht klar. Ich schließe mich Lewin-Heller an, die diesen Eingriff als durchaus zwecklos bezeichnen. Auch der Versuch, durch chirurgische Maßnahmen wie Gelenkresektion, Knochenoperationen usw. eine bessere Beweglichkeit herzustellen, ist in einem Fall Senators mißglückt. Natürlich sind chirurgische Eingriffe bei Panaritien und Nekrosen nötig.

Alles in allem: wir können dem Kranken nicht viel nützen, die Hauptsache wird bei diffuser Sklerodermie sein, ihn möglichst lange bei gutem Ernährungszustand zu erhalten; wir können wohl auch das eine oder das andere Symptom bekämpfen und dem Kranken so manche Erleichterung bringen, deren er bei dieser langwierigen und traurigen Krankheit oft gar sehr bedarf. Und je weniger wir ihm durch unsere Mittel unmittelbar nützen können, desto mehr müssen wir uns hüten, ihm zu schaden.

Sechstes Kapitel

Das akute umschriebene Odem.

(Die Quinckesche Krankheit).

Im Jahre 1882 beschrieb Quincke ein Krankheitsbild, das er folgendermaßen charakterisierte: „In der Haut und im Unterhautzellgewebe treten an umschriebenen Stellen ödematöse Schwellungen von 2–10 cm Durchmesser auf; am häufigsten werden die Extremitäten befallen, besonders in der Umgebung der Gelenke, aber auch Rumpf und Gesicht sind beteiligt; die Schwellungen scheinen nicht scharf abgegrenzt zu sein, die normale Hautfarbe ist nicht wesentlich verändert, bisweilen etwas blässer, andermal etwas rötter als normal. Es besteht etwas Spannung und Jucken. Auch die Schleimhäute können gleichzeitig befallen sein, die Lippen, das Gaumensegel, der Pharynx und Larynx, die Darms- und Magenschleimhaut. Die Schwellungen entstehen und vergehen rasch, im Verlauf von Stunden, höchstens Tagen, aber rezidivieren sehr oft. Das Allgemeinbefinden pflegt wenig oder gar nicht gestört zu sein. Das Leiden zeigt nahe Beziehungen und Übergänge zur Urticaria.“

Ein Schüler Quinckes, Dinkelacker, behandelte in seiner Dissertation — ebenfalls aus dem Jahre 1882 — die Affektion ausführlicher. Er brachte eine Anzahl Krankengeschichten und sammelte eine Reihe von Fällen, die, unter verschiedenen Namen schon früher beschrieben, der Quinckeschen Krankheit zuzurechnen sind (Cuntz, Goltz, Laudon, Levin). Die ältesten sind die von Levin und Cuntz aus dem Jahre 1874.

Die Geschichte der Affektion vor Quinckes Publikation ist aber mit diesen wenigen Namen nicht erschöpft. Die wichtigste Arbeit aus der Zeit vor 1882 ist unbedingt die von Milton. Sie wurde wohl anfangs nicht genügend beachtet, weil sie, betitelt „on giant urticaria“, nur eine Unterform der gewöhnlichen Urticaria zu behandeln schien. Milton hat aber nicht nur ganz typische Fälle des umschriebenen Odems sicher und genau beobachtet, er hat es auch klar ausgesprochen, daß seine Fälle sich auch von den schwersten Formen der Urticaria scharf unterscheiden. Seine ersten Beobachtungen sind schon 1872 angestellt und mitgeteilt. Vorher sollen, wie Joseph bemerkt, einschlägige Fälle von Stolpertus im Jahre 1778 und von Erichson 1801 mitgeteilt worden sein. Ferner beschrieb Graves die Affektion im Jahre 1848 sehr schön und scharf in einem einzelnen Fall. Ein Mann von gichtischem Habitus bekam nach Ermüdungen ein Gefühl von Schwere und Schmerzen in der Magengegend. Dann traten Schwellungen des

Gesichts an verschiedenen Punkten, besonders an Stirn, Wangen, Auge auf. Die Schwellungen entstanden und vergingen im Verlauf weniger Stunden. Zuweilen waren die Lippen, die Innendfläche des Mundes, das Gaumensegel betroffen; „kürzen solche Schwellungen in der Nähe der Glottis vor, so stehe ich nicht an zu sagen, daß sie ungewöhnlich gefährlich werden könnten“ (nach Curtis zit.). Graves Schilddrüse ist, wie man sieht, exakt und schlagend. Weitere Fälle haben Draper und Perroud berichtet.

Immerhin hat die Affektion erst seit Quinckes Publikation die volle Aufmerksamkeit der Ärzte auf sich gezogen. Heute ist die Literatur, die über sie vorliegt, schon recht umfangreich; freilich sind es der Mehrzahl nach einfach kasuistische Beiträge, die geliefert wurden, und nicht ganz gering ist auch die Zahl der Autoren, die zweifelhafte und auch sicher nicht herbergshörige Fälle berichtet haben. Von wichtigeren Arbeiten nenne ich aus Deutschland die von Börner, Joseph, Strübing und die in jüngster Zeit erschienenen von Schlesinger, aus Frankreich die von Rapin, aus Amerika die von Collins, der im Jahre 1899 75 Fälle sammelt und seiner Besprechung zugrunde legen konnte. Nach dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches haben sich eine ganze Reihe von weiteren Autoren an dem Ausbau der Lehre dieser Krankheit beteiligt, auch Quincke selbst hat noch einmal mit Graß zusammen das Wort dazu genommen.

Die Nomenklatur der Krankheit ist eine außerordentlich verschiedenartige. Die vielen Namen, die man ihr gegeben hat, lassen erkennen, wie mannigfaltig wechselnd die Auffassung des Leidens gewesen ist. Die einen betonen ihre engen Beziehungen zur Urticaria und bezeichnen sie einfach als *forme rare d'urticaire* (Rapin) oder als *Urticaria oedematosa* (Courtois-Suffit), zianit urticaria (Milton), *Urticaria tuberosa*; Hallopeau spricht von *Congestion oedémateuse paraurticarienne*; französische Forscher haben sie mehrfach, indem sie die relative Selbstständigkeit des Krankheitsbildes verkannnten, und die Anschwellungen sehr zu Unrecht als Ausfluß einer rheumatischen Diathese betrachteten, als *Oedèmes rhumatismaux* (Bengué) bezeichnet oder als *Oedème circonscrit arthritique* (Salles), *Oedème rhumatismal essentiel* (Euvier), *Oedème rhumatismal à répétitions* (du Castel), *Oedèmes éphémères de nature arthritique* (Chauvyet, Negel), *Nodosités cutanées éphémères chez les arthritiques* (Féréal). Crépín spricht von *Oedème neuroarthritique*. Das Umherziehen des Ödems über den ganzen Körper kommt in den Bezeichnungen *Wandering oedema* (Brown, Brabyn), *oedème ambulant non inflammatoire* (Boelt) zum Ausdruck; das rasche Kommen und Gehen der Ödeme in den Bezeichnungen *local transient oedema* (Starr), *sudden and*

transient swellings (Curtis), Oedème intermittent (le Gendre), acute recurrent oedema (Kick), oedème aigu de la peau (Courtois-Suffit), acute locale transitory swellings (Crozer). Daß es sich um eine Angioneurose handele, suchten viele im Namen zum Ausdruck zu bringen, und man findet die Affektion wohl am häufigsten als akutes angioneurotisches Hautödem beschrieben. Quincke gab ihr den Namen akutes umschriebenes Hautödem. Ich glaube, wenn wir, wie wir das nach den neueren Erfahrungen tun müssen, statt „Hautödem“ nur „Ödem“ setzen, haben wir einen genügend bezeichnenden und nichts pejorierenden Namen; daß es sich um eine reine Angioneurose handelt, ist nicht wahrscheinlich; deshalb bleibt der Zusatz angioneurotisch besser fort. Schlesinger hat vorgeschlagen, alle die hither gehörigen Affektionen, zu denen neben den akuten Haut- und Schleimhautödemem auch der Hydrops articularis, intermitt. und Ähnliches zu rechnen ist, als Hydrops hypostrophos zu bezeichnen; mir scheint diese Bezeichnung doch gar zu allgemein zu sein. Sie hat sich auch kein richtiges Bürgerrecht gewinnen können.

Vorkommen, Ätiologie.

Das akute umschriebene Ödem ist keine sehr seltene Krankheit; ich habe aus der Literatur ungefähr 100 Fälle sammeln können, eine Anzahl unsicherer oder nur fragmentarisch mitgeteilter abgerechnet, und habe selbst vier Fälle beobachtet. Nach Erscheinen der ersten Auflage habe ich für die statistischen Notizen weitere 60 Fälle zusammengestellt; die Zahl der mehr oder minder genau publizierten Fälle ist aber bei weitem größer. Das Krankheitsbild ist im ganzen sicher ziemlich häufig, und es ist auch nicht zu bezweifeln, daß eine ganze Reihe von Fällen seltener Lokalisation in ihrer Zugehörigkeit zum flüchtigen Ödem nicht erkannt wird. Ich habe in den letzten 10 Jahren etwa 30 eigene Beobachtungen anstellen können, ohne die recht zahlreichen mitzurechnen, bei denen rein symptomatisch gelegentlich einmal flüchtige Schwellungen (bei Migräne usw.) auftraten.

Anfangs schien es, als ob bedeutend mehr Männer als Frauen von der Krankheit betroffen würden, doch besteht nach unserer jetzigen Kenntnis hier keine wesentliche Differenz: ich fand 311 Männer, 50 Frauen, wobei ich allerdings die menstruellen charakteristischen Ödeme mit eingerechnet habe.

Die von der Krankheit befallenen Individuen stehen am häufigsten im dritten und vierten Jahrzehnt des Lebens. Collins gibt als Durchschnittsalter 27 Jahre an, ich fand aus 132 Fällen ein solches von 25,8 Jahren, wobei noch immer zu bedenken ist, daß oft nicht die Zeit des ersten Einsetzens der Krankheit berücksichtigt werden konnte. Folgende Zahlen ergeben genaueren Aufschluß. Es waren betroffen im Alter von


| | | | |
|---------|--------|----|----|
| 0—4 | Jahren | 12 | 25 |
| 5—9 | — | 13 | |
| 10—14 | — | 7 | 30 |
| 15—19 | — | 23 | |
| 20—29 | — | 56 | |
| 30—39 | — | 45 | |
| 40—49 | — | 27 | |
| 50—59 | — | 11 | |
| 60—69 | — | 4 | |
| über 70 | — | 3 | |

Auch das erste Jahrzehnt ist also sehr stark vertreten; hier finden sich insbesondere eine Anzahl hereditärer Fälle. Crozer-Griffith berichtet über ein schon mit 1½ Monaten erkranktes Kind, Dinkelacker beschreibt einen Fall, in dem mit drei Monaten die ersten Zeichen der Krankheit erschienen. Nach dem 40. Jahr nimmt die Zahl der Erkrankungen sehr rasch ab, insbesondere, wenn man nur die Zeit des Einsetzens der Krankheit berücksichtigen würde; die höheren Alter sind fast ganz verschont. Doch fand ich einen Fall einer 79-jährigen Frau, bei der das Leiden vor zehn Jahren zum ersten Male aufgetreten war, einen anderen eines 69-jährigen Mannes, bei dem es seit 8 Jahren bestand. Die älteste mir bekannt gewordene Beobachtung ist die von Raven; sie betrifft eine 86-jährige Frau, bei der plötzlich die rechte Zungenhälfte anschwell und Schwierigkeiten zu sprechen und zu schlucken eintraten; nach einem Tage war alles geschwunden, ein ähnlicher Anfall kam später noch einmal wieder. Vorher hatte die Patientin niemals ähnliche Anfälle gehabt.

Der Beruf ist ohne Einfluß, abgesehen vielleicht von den thermischen Schädlichkeiten, die er mit sich bringt (Arbeiten im Freien, in kaltem Wasser s. u.).

Die Heredität spielt in der Ätiologie dieser Krankheit eine große Rolle. Sie gehört zu denjenigen Leiden, die nicht selten den Mitgliedern einer Familie als stets recht unbehagliches, den Lebensgenuß beeinträchtigendes Erbe für einen längeren oder kürzeren Abschnitt ihres Lebens mitgegeben sind. Und es gibt sogar Familien, in denen ganz regelmäßig eine Reihe von Mitgliedern einer besonders gefährlichen Form des Leidens, dem Glottödem, erliegen. Solche Beobachtungen einer gleichartigen Vererbung verdanken wir Quincke, Dinkelacker, Falcone, Strübing, Schlesinger, Smith, Joseph, Wegner, Yarian, Osler, Riechman, Apert und Delille, Comby, Courtade, Diehl, Donagana, Emsw, Griffith, Halstedt, Masson, Mendel, Morris, Osbury, Pror, Rapin, Sträußler, Whiting. Einige der Autoren haben uns Stammbäume solcher Ödemfamilien übermittelt, so Osler einen solchen, der das Vorkommen der

Krankheit in einer Familie schon in der fünften Generation erkennen läßt und den ich hier reproduziere (die fettgedruckten Bezeichnungen stellen die erkrankten Mitglieder der Familie dar).



Schlesinger spricht von einer Familie, in der in vier Generationen fünf Mitglieder befallen sind, in Riechofs Familie befallt das Leiden jetzt die dritte Generation, in Rapins die vierte. Bemerken ist die Zahl der befallenen Familienmitglieder eine sehr große (Rapin), wie auch aus dem Stammbaum von Osler hervorgeht. Enzorsah unter 80 Familienmitgliedern in drei Generationen 31 von der Krankheit befallen werden, von denen zwölf an Glottisödem starben. Von ähnlich unheilvollem Einfluß war die Krankheit auch in der von F. Mendel beschriebenen Familie; wir kommen darauf noch genauer zurück. Apert und Delille berichten von einer Familie, in der alle männlichen Mitglieder in zwei aufeinander folgenden Generationen von Glottisödem befallen wurden, alle weiblichen blieben frei; zweimal mußte tracheotomiert werden, und die betreffenden Individuen mußten dauernd eine Kanüle tragen. Whiting fand unter 205 mitgeteilten Fällen von flüchtigem Ödem 110 Familien. Diese Familien hatten im ganzen 207 Mitglieder, so daß also mehr als die Hälfte aller Mitglieder befallen wurde. Es wurde schon erwähnt, daß gelegentlich einmal nur die männlichen Mitglieder befallen wurden, doch ist das keineswegs die Regel. Die sonstigen Bedingungen der Auswahl der befallenen Mitglieder in den Ödem-Familien sind uns unbekannt.

In einer Reihe von Fällen wiederholt sich bei den einzelnen Mitgliedern das Krankheitsbild mit photographischer Treue; insbesondere kommt es oft zur gleichartigen Lokalisation, wie in den erwähnten Fällen von Glottisödem oder wie bei Comby zu Larynxödem bei zwei Brüdern.

Es ergeben sich aber bei der Vererbung auch mancherlei Modifikationen des Krankheitsbildes, indem z. B. das Erbrechen, das bei dem

einen Familienmitglied die Schwellungen begleitet, beim anderen fehlt. Als eine solche Modifikation darf es auch angesehen werden, wenn bei einzelnen Familienmitgliedern sich statt des Ödems *Urticaria* findet (Halstedt, Döwagana u. a.). Im selben Sinne auffassen möchte ich das Auftreten anderer vasomotorisch-trophischer Neurosen und Symptome in solchen Ödemfamilien, wovon Diehl und Rapin berichten. Daran schließt sich unmittelbar das Auftreten von Migräne in der Ascendenz an, was um so bemerkenswerter ist, als die Kombination von Migräne und Ödemen sich recht häufig bei denselben Individuen findet (s. u.). Fälle von Migräne in der Ascendenz berichten u. a. Etienne und Rapin. In einem seiner Fälle war die Migräne von Anschwellungen in der Gegend der Augenbrauen begleitet. Auch in einigen meiner Fälle litten die Mütter der Kranken an schwerer Migräne. Schließlich erwähne ich in diesem Zusammenhange noch das Vorkommen von Asthma, das Halstedt bei dem Sohne eines seiner Kranken fand, und Comby bei einem Bruder.

Außer der direkten gleichartigen Vererbung kommt aber auch noch andere Belastung vor. Milton sah einen Fall, wo der Bruder des Kranken Epileptiker war, ebenso Diethelm und Prior, Oppenheimer einen Kranken, dessen Vater an progressiver Paralyse gestorben war, und, dessen Schwester an Chorea litt; aus neuropathischen bzw. psychopathischen Familien stammten auch die Patienten von Banke, Börner, Higier, Widowitz, Fuchs, Calvé (Vater durch Suizid geendet, Mutter wiederholt geisteskrank), Diehl (Mutter manisch-depressiv).

Bemerkenswert ist die Angabe von Valobra, dessen Kranke (Vater und zwei Brüder) aus einer Bluterfamilie stammten.

Von sonstigen Diathesen wäre noch die gichtische zu erwähnen. Oppenheimer erwähnt gichtische Belastung. Ich selbst kenne eine Familie, in der Gicht in der Ascendenz beim Vater und der Familie der Mutter nachweisbar ist, und deren einzelne Mitglieder teils an flüchtigen Ödem, teils an Migräne, teils an ausgeprägter Gicht leiden. Ich halte dies Zusammenvorkommen immerhin für bemerkenswert.

Die besonders in Frankreich verbreitete Lehre vom Neuroarthritismus hat auch für das flüchtige Ödem Anwendung gefunden. In seiner These *Les oedèmes neuroarthritiques* stellt Crépin die dahingehörigen Erfahrungen und Anschauungen zusammen. Auch Morichau-Beauchant vertritt solche Anschauungen.

Es kann aber auch jede hereditäre Belastung fehlen.

Es gibt eine ganze Anzahl von Krankheitszuständen, die als prädisponierende Momente für das Auftreten des akuten unbeschriebenen Ödems angesehen werden müssen, und die dem Auftreten des Ödems entweder vorausgehen oder mit diesem zugleich bestehen.

Von nicht gerade wesentlichem Einfluß scheint die Verschlechterung des allgemeinen Befindens zu sein, wie sie als Folge lang dauernder

und erschöpfender Krankheiten oder selbständig als konstitutionelle Anämie und Chloetoe vorkommt; es wird im Gegenteil oft hervorgehoben, daß der Allgemeinzustand des erkrankten Individuums ein ausgezeichneter ist; nur vereinzelt hört man von lymphatischer, skrophulöser, tuberkulöser Diathese sprechen.

Etwas häufiger wurden rheumatische Affektionen beobachtet (Fritz, Küssner, Negel, Jamieson, Binet). Es bestanden rheumatische Schmerzen in der Muskulatur, ein andermal in den Gelenken, meist lange vor Beginn des Ödems; gelegentlich traten auch beide Affektionen zur selben Zeit auf. Alle diese Dinge sind im allgemeinen aber gar nicht sehr häufig, und auch dort, wo sie gefunden wurden, bestand klinisch keineswegs ein deutliches Abhängigkeitsverhältnis; die beiden Affektionen liegen ziemlich selbständig nebeneinander her; hier und da konnte man wohl einmal an eine gemeinsame Ursache denken, die dann vielleicht in den manchmal nachzuweisenden Durchkältungen des Körpers gesucht werden muß. Die Anschauungen französischer Autoren über einen intimeren Zusammenhang der beiden Erkrankungstypen wurden schon erwähnt.

Viel schwieriger ist das Verhältnis zu gewissen exogenen und endogenen Intoxikationen zu deuten. Einige Male wurde der Alkohol direkt als Ursache der Krankheit beschuldigt. Im dritten Fall Josephs lag starker Alkoholismus vor, und bei Einschränkung des Trinkens hörten die Ödeme immer auf; auch in Josephs erstem Fall war vielleicht übermäßiger Weingenuß nicht ganz ohne Einfluß. Von Bedeutung schien der Alkohol auch in Oppenheimers und einem allerdings nicht ganz typischen Fall Drummonds, ferner in Beobachtungen von Bircher, Diehlhelm und Zilochi. Mathieu et Sikora teilen eine Beobachtung mit, in der flüchtige Ödeme nach leichter Kohlenoxydvergiftung auftraten. Bei einer innerhalb 24 Stunden zum Tode führenden gleichen Vergiftung sah Milian tropische Störungen sich ausbilden, die zum Teil den neuropathischen Ödemen gleich zu setzen waren; daneben fanden sich auch noch zur Gangrän führende Urticaria, Bläschen, Geschwüre, also im ganzen ein sehr vieldeutiges und kompliziertes Bild, das Milian auf eine toxische Polynenritis bezieht. Jedenfalls lag nicht das klinische Bild des akuten umschriebenen Ödems vor.

von Rads Patient war Maher, hatte aber nie an Bleivergiftung gelitten, der Fall ist übrigens in seiner Deutung unsicher. Bei Steiners Kranken konkurrierten Nösten- und Tabakvergiftung, bei einem von Valabras Patienten war möglicherweise Tabak allein zu beschuldigen.

Der Einfluß der Aufnahme bestimmter Nahrungsmittel ist — in auffälligem Gegensatz zu den Verhältnissen bei der sehr nahe verwandten Urticaria — im ganzen gering. Gunn und Osler berichten, daß hauptsächlich durch Essen von Fischen die Krankheit hervorgerufen wurde. Dabei steht aber Gunns Fall jedenfalls auf der Grenze zur

Urticaria. Quincke und Gross sahen das Ödem 60 Stunden nach Genuß von Austern und Champignons entstehen, Palmer nach Genuß von Rhabarberstengeln, Rapin gibt mehrfach Beispiele von in Form von Erbrechen auftretenden alimentären Idiosynkrasien, die er als die *Nesozin des Magens* bezeichnet. Higier glaubt in einem seiner Fälle aus dem gesteigerten Gallengehalt bei hartnäckiger Verstopfung auf excessive Darmfaulnis schließen zu sollen und sieht in ihr eine Ursache des Ödems, zumal wiederholt Darmdesinfektion die Affektion in kurzer Zeit zum Schwinden brachte. Ich betone nochmals, daß solche Fälle aber im ganzen selten sind. Auch andere Autoren heben hervor, daß ein Einfluß von bestimmten Nahrungsmitteln niemals konstatiert werden konnte. Auf die flüchtigen Ödeme bei der Serumkrankheit komme ich später zu sprechen.

Einige Male wurde Malaria in der Vorgeschichte unserer Kranken notiert (Keele, Negel, Riehl, Fuchs, Matas, Riesman). Mehrfach lag die Sache da aber so, daß ein enger Zusammenhang beider Affektionen gar nicht zu denken war. Die Malaria hatte vor langen Jahren bestanden, es waren keine Anzeichen vorhanden, daß das Malariegift jetzt noch irgendwelche Wirkungen im Körper entfalte. Aber in den Fällen von Keele und Matas ist ein Zusammenhang zwischen Malariaintoxikation und Ödemen doch durchaus nicht von der Hand zu weisen; die auf die Stunde genaue Wiederkehr der Ödeme (Matas), das Verschwinden nach Chininmedikation in zwei Fällen von Keele sprechen in diesem Sinne. Riesman glaubt, daß es auch möglich ist, die Anfälle durch Chinin hervorzurufen. Es sei daran erinnert, daß auch zwischen der Asphyxie locale und der Malaria engere Beziehungen zu bestehen scheinen. Immerhin sind es Ausnahmefälle, die man aber nicht wohl abtrennen kann. Dogliotti sah flüchtige Ödeme bei Pneumonie, Valobra bei Typhus.

Löwenheim berichtet über ein articularsches Ödem, das angeblich in Niederschlesien besonders häufig auftreten soll. Er hat 140 Fälle dieser Art in der Gegend von Liegnitz gesehen. Die Fälle sollen sich im Juli und August besonders häufen und nur aus Gegenden, die tiefer im sumpfigen Terrain gelegen sind, stammen. Es handelt sich um akute Fälle mit Schwellungen im Gesicht, um den Mund herum, in den Schleimhäuten, in der Conjunctiva, es soll dabei ein intermittierendes Fieber bestehen. Die Schilderung von Löwenheim ist aber nicht exakt genug, um erkennen zu lassen, ob es sich wirklich in diesen Fällen um eine Häufung von Quinckescher Krankheit, durch besondere klimatische oder andere ätiologische Faktoren bedingt, handelt. Über ein gehäuftes Auftreten von Hautödemen berichtet auch Eschweiler aus dem Gefängnis in Düsseldorf. Bei Gefangenen stellten sich einige Wunden nach der Einlieferung Ödeme an den Unterschenkeln, an den Oberschenkeln, Bauch, Brust, Gesichtshaut ein, die nach einigen Wochen verschwanden. Es

kam dabei zu einer Pulsverlangsamung bis auf 46 und 52 Schläge. Alle Arbeiter, die daran erkrankten, waren mit einer bestimmten Tätigkeit beschäftigt, nämlich mit Einsetzen von Lakritzpastillen. Der Autor selbst ist aber nicht geneigt, diese Ödeme als toxische anzusehen, sondern glaubt, daß die Ödeme durch das Stillsitzen bei Leuten, die Bewegung gewohnt waren, entstanden sind. Das erscheint mir eine ganz unzureichende Erklärung zu sein.

Von besonderem Interesse sind auch hier wieder die Beziehungen zu den Nervenkrankheiten. Über das Vorkommen organischer Nervenkrankheiten im Zusammenhang mit unserem Ödem ist nur wenig bekannt. In einigen Fällen ist wohl kaum mehr als eine zufällige Koinzidenz anzunehmen, so bei Ashton, dessen zur Zeit der Beobachtung 17-jähriger Kranke im Alter von 2 Jahren eine Poliomylitis acuta gehabt hatte, von der jetzt nur noch Residuen vorhanden waren. Milton sah einen Fall, in dem ganz geringe Symptome einer Lepra bestanden, Widowitz einen solchen mit Hydrocephalus. In Josephs einen Alkoholisten betreffender Beobachtung fehlten die Patellarreflexe. Will und Caspers Patient litt an Kompressionslähmung, war aber außerdem stark hysterisch.

Dagegen hat Schlesinger transitorisches Ödem zweimal an Extremitätenabschnitten beobachten können, die auch sonst infolge einer Rückenmarkserkrankung (extramedullärer, das Rückenmark komprimierender Tumor) Veränderungen erlitten hatten. Das Ödem entwickelte sich schmerzlos in wenigen Minuten, ohne Hautrötung, um nach kürzerem oder längerem Bestand, (mitunter erst nach 1–2 Tagen) so rasch wie es gekommen, zu verschwinden. Schlesinger ist der Ansicht, daß das Ödem in diesen Fällen ein Symptom der organischen Krankheit war, und glaubt damit bewiesen zu haben, daß ein akutes, circumscriptes Ödem sich auf der Basis spinaler Veränderungen entwickeln kann. Wie Schlesinger hat übrigens schon Calman einen ganz ähnlichen (denselben?) Fall beschrieben, in dem ebenso wie in dem Schlesingerschen, auch Raynaud'sche Symptome noch zur Beobachtung kamen. Und noch früher hatten Mathieu et Veil die Beobachtung gemacht, daß in einem Fall von Paraplegia dolorosa, die durch Ausbreitung eines bösartigen Tumors auf das Rückenmark entstanden war, neben heftigen Schmerzen in den Gliedern beider Schenkel und anderen Nervengebieten, weiße, wenig eindruckbare Schwellungen an den erkrankten Teilen entstanden. Die Autoren bezeichneten die Ödeme wegen des Fehlens von Albuminurie und jeder Herzaffektion und besonders wegen des Erscheinens im Anschluß an die Schmerzattacken als „*Oedèmes nécropathiques*“.

Flüchtige Ödeme kommen ferner im Zusammenhang mit den Blitzschmerzen bei der *Tabes dorsalis* vor. In einem Fall, den Kürbitz beschreibt, handelt es sich ebenfalls um akutes umschrie-

betes Ödem bei einer Tabeskranken; dorthin treten hier die Schwellungen unabhängig von den Blützuckern im Gesicht und zusammen mit Störungen des Allgemeinbefindens und Magendarmerscheinungen auf, so daß ich dem Ödem in diesem Falle eine selbständige Stellung einräumen möchte. Wir gehen an anderer Stelle nochmals auf den Zusammenhang derartiger Ödeme mit den organischen Nervenerkrankungen ein.

Sehr bedeutsam ist die Rolle, die die funktionellen Nervenerkrankheiten in der Ätiologie unserer Affektion spielen. Es sind sehr häufig nervöse, leicht erregbare, ängstliche, in irgendeiner Beziehung neuropathische Personen, die von der Krankheit ergriffen werden. Das haben fast alle Beobachter betont und schon die nicht seltene neuropathische Belastung mußte uns das erwarten lassen. Bircher sah einen sehr typischen Fall bei einem Menschen, der im Alter von vier Jahren einmal einen epépileptiformen Anfall gehabt hatte. Diesen faßt er als Zeichen der bestehenden neuropathischen Diathese auf.

Das Verhalten des Ödems zur Neuropathie kann dabei ein verschiedenes sein. In sehr vielen Fällen finden wir nur die Zeichen einer allgemeinen Neurose, einer Hysterie oder Neurasthenie; hier bewahrt das Ödem seine Selbständigkeit — es liegt dasselbe Verhältnis vor, das wir nun schon so oft im Laufe unserer Studien gefunden haben, wir können dann nur sagen, durch den allgemein neuropathischen Zustand ist der Boden für die spezielle Affektion — die ihrerseits jedenfalls auch eine Neurose ist — vorbereitet. Einen Fall von Tic und Zwangsvorstellungen, bei dem daneben flüchtige Ödeme bestanden, beschreibt Diethelm.

In manchen dieser Fälle verweben sich die Symptome des akuten Ödems doch so eng mit den übrigen Symptomen der Neurose, daß eine Zweiteilung des Krankheitsbildes unzulässig etwas Gekünsteltes hat. Dann tut man besser, von symptomatischen flüchtigen Ödemen zu sprechen, die wir außerhalb der Neurasthenie und Hysterie bei gewissen funktionellen Krankheiten auch sonst noch finden. Schon hier sei aber noch weiter betont, daß nicht jedes Ödem bei einer Neurose, sei auch dessen neuropathische Natur unbedenklich anzuerkennen, in die Kategorie der akuten flüchtigen Ödeme hineingeht. So gibt es z. B., wie besonders durch Chareot bekannt wurde, ein hysterisches Ödem, dessen klinischer Charakter von dem der flüchtigen Ödeme durchaus abweicht. Die Unterscheidung der beiden neuropathischen Ödemformen, ebenso wie nach noch anderer ähnlicher wird uns im Abschnitt Diagnose zu beschäftigen haben.

Größer noch werden die Schwierigkeiten bei der Kombination des Ödems mit gewissen anderen Neurosen. Zunächst finden wir es bei der Migräne (Etienne, Rapin, Ramsay Smith, Dayne, Riehl, Crocq, Robinson, Ormerod, Jamieson, Halovitchner, Börner, eigene Beobachtung). Wir sahen schon, daß einige Male die Ascendenten der Kranken an Migräne litten; doch kommt sie auch

bei den Kranken selbst vor; so zwar, daß beide Krankheiten eine gewisse Selbstständigkeit gegeneinander bewahren. Es besteht keine zeitliche Koinkidenz zwischen ihnen, beide Krankheiten treten in voller Entwicklung auf. Von hier aus aber gibt es allerlei Übergänge; es kann vorkommen, daß da, wo die Migräne herrscht, dauernd oder gelegentlich einmal an Stelle eines Migräneanfalles oder zusammen mit einem solchen ein Ödem auftritt, das in dem einen Fall sich auf den Kopf oder nach sogar auf die befallene Kopfseite beschränkt, ein andermal wieder in ganz typischer Weise hierhin und dorthin am Körper springt. Es kommt auch ein Ersatz der Migräne durch das Ödem vor, so es daß dauernd oder durch längere Zeit hindurch das Ödem an die Stelle der Migräne tritt, wie ich das einmal bei dem typischen Ödem, einmal bei der nahe verwandten *Coryza vasomotoria* gesehen habe, so es, daß beide Affektionen miteinander alternieren, wie z. B. in einem Fall von Otto.

Ich habe die Kombination von Migräne ophthalmique, rezidivierender Oculomotoriuslähmung und angioneurotischem Ödem gesehen.

Ein jetzt (März 1911) 35-jähriger Mann, der zum ersten Male vor 14 Jahren in unsere Beobachtung kam, gab damals an, daß er seit 1894 an Anfällen von Kopfschmerzen und Doppeltsehen leidet, die sich weiterhin immer wiederholt haben. Er hat zuerst Doppeltsehen, dann kommt es zu einem linksseitigen Ptosismuskulus, hiernächst auch zu linksseitigen Parästhesien, dann zu einem rechtsseitig 3–4 Tage lang andauernden Kopfschmerz. Die Doppeltbilder stehen übereinander, dauern so lange an, als der Kopfschmerz. Im März 1911 merkte er an, wie wiederholt in der ganzen Zeit, wieder auf, das Mal weiter vor einigen Tagen Gesichtschmerzen bekommen hatte, und sich an dieser Stelle eine Anschwellung ausgebildet hatte. Es fand sich in der Fossa supraclavicul. eine mehr als handtellergroße Schwellung, in der Haut und Unterhaut, von der Konsistenz eines Lipoms. Dasselbe war vor einem Jahre schon einmal passiert, die Schwellung verschwand damals so wie jetzt nach wenigen Tagen spontan. Ein zeitlicher Zusammenhang mit der Migräne war nicht zu erkennen.

Am meisten verliert das Ödem seine Selbstständigkeit da, wo es nur im direkten Anschluß an die Migräneanfälle auftritt und sich dann auch noch auf eine kleine Stelle im Gesicht (insbesondere auf das Lid) beschränkt, wo allein es immer wiederkommt. Analog diesen Fällen sind die, in denen bei Neuralgien im Laufe der Schmerzattacken im betroffenen Nervengebiet ein passageres Ödem eintritt.

Wiewohl es sich dabei pathogenetisch sehr wohl um dieselben Dinge handeln kann, wird man ihnen klinisch eine etwas andere Stelle anweisen müssen und ihnen nur eine sekundäre, eine symptomatische Rolle in der Auffassung des Gesamtkrankheitsbildes zuerkennen dürfen.

Nicht anders steht es mit den Ödemen bei Meib. Basedowii (Maude, Millard, Booth, Joseph, Vigoureux, Gowers, Stiller, Benedikt, Homén, Ramsay, Mannheim, Päßler, Sattler u. a.). Sie tragen unzweifelhaft den klinischen Charakter der akuten circumscribten Ödeme, dürfen aber dort, wo sie neben den übrigen Symptomen

der Basedowschen Krankheit höchstens eine diesen gleichwertige Rolle spielen, nicht als selbständige Krankheit angesehen werden. So war der Sachverhalt z. B. in dem Fall, von dem die Fig. 18 stammt.



Fig. 18.

Flüchtige Schwellungen bei Moritz Baschewitz.

Hier traten bei dem seit längerer Zeit bestehenden Basedow immer wieder in den unteren Augenlidern ephemerere Schwellungen auf. Auch hier freilich kommt es auf die Einzelheiten des speziellen Falles an, und man wird den Ödemen auch hier nicht immer jegliche Selbständigkeit absprechen können. Ich denke dabei z. B. an folgende, von Joseph mitgeteilte Beobachtung.

Bei einem Kranken bestehen seit zwei Jahren die sicheren Zeichen eines hoch. Basedow, Polypose, Polyurie, Palpation, Tremor, Tachykardie, Knochenthin und Gräbesches Syndrom. Seit sechs Jahren leidet er an Urticaria am ganzen Körper, während an Händen, Füßen, Lippen und Zunge ödematöse, nicht juckende und nicht gerötete Anschwellungen auftreten; die Ödeme wirken schmerzlos als Quaddeln und dauerten länger, kamen auch ohne die Quaddeln, aber nur im Sommer, oft monatlang Tag für Tag.

Besonders häufig sind hier flüchtige, häufiger aber auch länger anhaltende und etwas derber sich anfühlende Schwellungen an den Augenlidern beobachtet worden (Sattler).

Sehr interessant ist das Vorkommen von augenmyasthenischem Ödem bei myasthenischer Paralyse. Diller beschreibt folgenden Fall.

29jährige Frau. Seit zwölf Jahren verheiratet. Vor zwei Jahren fand Monate im Bett wegen großer Schwäche. Seitdem immer auch schwächlich. Dann Spasmen

schwellen; Schlucken und Kauen gut. Mäßig Temperatursteigerung, Ödem an der rechten Schläfe, an der Außenseite des rechten Arms, aber der rechten Hüfte und an der Außenseite des rechten Beines. Es handelte sich um ausgetriebene Schwellungen, die nach fünf Tagen geschwunden sind. Vorübergehend trat Doppeltsehen auf. Die Sprache zeigte typische pathologische Ermüdbarkeit.

Ich selbst habe folgenden Fall beobachtet:

M., 21jährig, Kaufmann. Erste Untersuchung in der Poliklinik am 8. Juli 1904.

Im Oktober 1903 Augenkrankung, die Augen wurden gerötet, es tat sich um eine Hornhauterkrankung gehandelt haben. Übelkeit tritt neben teils übereinander stehende Doppeltbilder. Vorher einige Zeit Kopfschmerzen, Herzklappen, Laubbengel. Zeitweilig trat eine starke Müdigkeit ein, so daß Patient vor Müdigkeit umfiel, und zwar immer erst, wenn er lange Zeit gegangen war; wenn er sich ausruhte, wurde es wieder besser. Nach jetzt Herzklappen bei Anstrengungen. Keine Ermüdung in den Armen. Keine Ermüdung beim Sprechen. Schlucken, Kauen. Keine Laes. Jetzt wieder Doppeltsehen. Rechte Lidpalpe evg. Papillen gleich. Hebung des rechten oberen Augenlides von vorherem nur unvollkommen. Parese des rechten Rectus externus und geringere des rechten Rectus superior. Entsprechende Doppeltbilder. Pupillenreaktion auf Licht und Konvergenz, Akkommodation intakt. Ermüdbarkeit des rechten Bulbus, in dem auch myasthenische Reaktion nachweisbar ist, ebenso wie im rechten Sternocleid. Das rechte Augenlid wie dessen ganze Umgebung geschwellen. Die Conjunctiva ist hier stark gerötet. Am nächsten Tage besteht eine sehr ausgesprochene Chemosis und sehr starke Schwellung der ganzen Umgebung; im September traten ganz vorübergehend Schwellungen an den Füßen auf. Um teil von pathologischen Bestandteilen. Ge normal. Am 15. Juli ist rechts die Schwellung völlig geschwunden. Auch die rechtsseitige Ptosis ist fort. Dagegen besteht völlige Abduzenslähmung. Im linken Auge ausgesprochene Chemosis und Bewegungsbeschränkung nach allen Seiten. Am nächsten Tage ist auch diese Schwellung verschwunden, am 18. August wieder sehr stark aufzutreten; das linke obere Augenlid ist jetzt prall gespannt. Myk im Sternocleidarmut. In den nächsten Monaten hat der Patient nach bescheidenen Nachträgen ähnliche wechselnde Schwellungen beobachtet können, auch Doppeltsehen und Ermüdung kehrten wieder. Dann haben wir ihn aus den Augen verloren.

Wie man sieht, sind hier die typischen myasthenischen Erscheinungen mit denen der flüchtigen Ödeme eng verwoben, beide spielen sich im wesentlichen in derselben Gegend ab und gehen auch einigermaßen miteinander parallel. An ein rein zufälliges Zusammentreffen ist kaum zu denken, aber der Grund des gleichzeitigen Vorkommens bleibt doch im Dunkeln. Ob man an gleiche lymphoecytäre Infiltrationen in die Gefäßwände oder deren Umgebung, wie man sie regelmäßig in den Muskeln gefunden hat, denken darf, ist mir recht zweifelhaft; ich denke eher an die ähnlichen Verhältnisse bei der eben erwähnten Kombination von Basedow und flüchtigen Ödemen, zumal ja auch das Auftreten von Myasthenie und Basedow nicht allzu selten ist.

Kick hat einen Fall beschrieben, in dem bei Myxoedem flüchtige Ödeme auftraten.

Die von Féré bei Epileptikern beschriebenen allgemeinen, bisweilen rasch verschwindenden, andermal den Tod herbeiführenden Ödeme

haben jedenfalls keine selbständige Bedeutung. Sie werden von diesem Autor auf Vasomotorienkörung zurückgeführt. Ähnliche Zufälle bei Epilepsie beschreibt Shanakau: das Auftreten von paroxysmalen Lungenödem, das gelegentlich ad exitum fährt.

Gelegentlich kommen sie auch bei Individuen vor, die Psychosen verschiedener Art hatten. Wills und Cooper sahen sie bei Hebephrenie und Amentia — die von Dide bei der Dementia praecox beschriebenen Pseudödeme gehören in eine andere Kategorie — Priors Patient war ein Idiot. Mannheimer beobachtete ein intermittierendes Ödem der Hände bei einem Melancholiker. Bekanntlich sieht man bei diesen Kranken oft Circulationsanomalien an den Extremitätenenden, und wir erwähnten auch schon das Vorkommen von Asphyxie locale bei dieser Psychose.

Es ist vielleicht nach allem nicht überflüssig zu erwähnen, daß eine neuropathische Diathese oder eine neuropathische Belastung keineswegs eine *Conditio sine qua non* für das Auftreten unserer Krankheit ist.

Es gibt noch eine Reihe weiterer die unmittelbare Entstehung der Krankheit begünstigender Momente. Ich rechne hieher zunächst kleine lokale Traumen (Ballenger, Banke, Calvé, Courtade, Collins, Sorreys, Ashton, Strübing, Rapin — Ichthales Kratzen — Riehl, Graham). Bei Graham genügte oft das feste Anlassen eines Gegenstandes, eines Beils z. B., um Ödeme hervorzubringen. Halsted sah nach Radfahren enorme Schwellungen an Scrotum und Penis auftreten.

Bei Courtades Patient trat der erste Anfall nach einem Stich ins Auge im 15. Lebensjahre auf; es kam zu einem Ödem des Gesichts und Halses; und es wurde die Tracheotomie nötig. Seither hatte Patient immer wieder neue Anfälle stets an Stellen, wo ein leichtes Trauma einwirkte, beim Gehen an den Füßen, beim Sitzen an den Glutei, beim Arbeiten an den Händen. In einem meiner Fälle traten in der Brust nach Mastitis-Operation flüchtige Ödeme auf. van Iterson sah nach Tonsillotomie ein zum Exitus führendes Glottisödem entstehen; erst später erfuhr man, daß bei dem Patienten auch sonst leichte Verwundungen stets starke Schwellungen bedingt hatten. Es ist wichtig zu bemerken, daß bei lokal einwirkenden Traumen anfangs wohl das Ödem auf den Ort des Traumas beschränkt bleibt, später aber auch an anderen Körperstellen erscheint (Riehl). Den Einfluß leichter lokaler Traumen sehen wir bei einer verwandten Affektion, der Epidermolysis bullosa hereditaria besonders in den Vordergrund treten. Es ist auch eine Kombination beider Krankheitsbilder von Valentin und von Wilhelm beschrieben worden. Schwerere Traumen wirken gelegentlich in

dem Sinn, daß sie den Anlaß zur Entstehung einer Neuroästhesie geben, auf deren Boden das Ödem sich dann entwickelt.

Psychische Erschütterungen können einen ähnlichen Einfluß ausüben. Oft genug trat das Ödem zum erstenmal nach einer starken Erregung, einem großen Ärger, einem heftigen Schreck auf oder auch nach intensiver geistiger Anstrengung (Bauke, Bircher, Collins, Rabin, Riehl — wenige Tage nach dem Tode seiner Frau wurde bei dem Kranken die erste Anschwellung sichtbar — Ramsay Smith, Starr, Schlessinger, Küllner, Lesser, Varian). In der Literatur sind eine Reihe weiterer sehr flagranter Beispiele für die Entstehung der Ödeme unter psychischem Einfluß angeführt. Eine Patientin Kuceras wurde von einem unbekannten Insekt in den Finger gestochen. Sie wurde sehr ängstlich, badete den Finger in kaltem Wasser, nach ihm ab; schon nach wenigen Minuten erschien ein Ödem der linken Gesichtshälfte, das nach einigen Stunden schwand. Kreibich und Sobotta konnten durch künstlich hervorgerufene Aufregungen bei einem Patienten, der an einer sonst auf Kältereize hin auftretenden Urticaria litt, diese hervorrufen. Ein Patient Stekkels, der an Platzangst litt, bekam flüchtige Schwellungen der Beine, wenn er allein über einen freien Platz ging, tat er das in Begleitung seines Arztes, so blieben diese aus. Ein Zuhörer Rabinas bekam Urticaria, als er eine Vorlesung über diese Krankheit hörte, eine meiner Patientinnen bekennt sie in dem Moment, wo sie sie bei ihrem Kind auftreten sieht. Wright erzählt von einem Arzt, bei dem durch mechanische Reize leicht Urticaria entsteht, er ist von Jugend auf imstande, sie durch die Kraft des Willens hervorzurufen.

Hierher muß wohl auch Lakors Beobachtung gerechnet werden, der das (einmalige) Auftreten eines flüchtigen Ödems bei einer Patientin sah, die er wegen ihrer nervösen Beschwerden zum zweiten Mal hypnotisiert hatte. Nur Dinkelacker betont, daß in seinen Fällen geistige Anstrengung, Ärger und Ähnliches «tats.» Einfluß waren. Wenn Försk aber das Auftreten dieser Ödeme aus psychogenen Ursachen einfach abstreift, so setzt er sich mit einwandfreien klinischen Tatsachen in Widerspruch.

Ich erwähne in diesem Zusammenhang weiter als ätiologisch wirksam die akuten körperlichen Erschöpfungszustände (Ballenger, Bauke, Collins, Riehl, Ramsay Smith, Dinkelacker).

Von besonderem Interesse und von besonderer Wichtigkeit sind thermische Schädlichkeiten.

Kälteeinwirkung in den mannigfachsten Formen und Variationen wurde sehr oft als auslösendes Moment beschuldigt, und wenn auch gerade dieser Ätiologie gegenüber natürlich die größte Skepsis am Platz ist, so liegt in unseren Fällen oft genug der schädigende Einfluß der Kälte klar zutage. Auf Kälteeinwirkung muß man es wohl

zumeist zurückführen, daß in nicht wenigen Fällen immer nur die von Kleidung nicht bedeckten Körperteile vom Ödem befallen wurden (Courtois-Suffit, Collins, Joseph). Oft genug genügt eine kurze Kälteeinwirkung, besonders, wenn sie mit jähem Temperaturwechsel verbunden ist (Napier, Higier, Uhl, Wagner, Kirsch, Laudon), etwa eine durch starkes Schwitzen bedingte Abkühlung, in anderen Fällen traten die Ödeme bei längerem Aufenthalt im Freien und bei intensiverer Einwirkung der Kälte wie z. B. gelegentlich einer Schlittensfahrt (Widowitz) auf. Eine Kombination von thermischen und mechanischen Einwirkungen war bei einer meiner Patientinnen im Späde, die einem Hagelwetter ausgesetzt gewesen war, und bei der die Schwellungen unmittelbar danach und zwar nur an den Stellen auftraten, die von den Hagelkörnern getroffen worden waren. Bei Rockwells Patientin schwellen die Finger zum ersten Male bei starker Kälteeinwirkung an; das wiederholte sich dann später immer wieder bei denselben Gelegenheiten. Auch Halten von Eis in den Händen oder Reiben der Lippen mit Eistürbchen brachten denselben Effekt hervor; ja es war auch möglich auf diesem Wege Magendarmsymptome zu produzieren. Auch Baden in kaltem Wasser gab die Ursache ab (Negel, eigene Beob.) oder selbst nur Eintauchen der Hände in kaltes Wasser (Starr). Sitzen am offenen Fenster wurde in Ashtons Fall beschuldigt. Starr sah Ödem auch an den Nates auftreten, wenn Patient zu Stuhl ging.

Bemerkenswert ist, daß auch in zwei Fällen von flüchtigen Ödemen, in denen eine Kombination mit paroxysmaler Hämoglobinurie vorlag, die Entstehung bzw. Lokalisation der Ödeme auf Kälteeinwirkung zurückgeführt wurde: in einem Fall (Roques) entstanden die Ödeme nur an den Stellen, die dem Zutritt äußerer Luft zugänglich waren, im anderen (Wende) war die Wirksamkeit der thermischen Schädlichkeit allerdings weniger sicher. Bekanntlich ist ja für die paroxysmale Hämoglobinurie Kälte eines der hauptsächlichsten auslösenden Momente.

Widowitz bemerkte, daß je kälter seine Kranke in der kalten Luft weilte, desto stärker das Ödem wurde. Und es verschwand nach kurzem Aufenthalt im warmen Zimmer. Der hindernde Einfluß der Wärme wurde auch sonst beobachtet. Andererseits gibt es Fälle, in denen die Wärme ungünstig wirkt, Joseph sah in einem seiner Fälle das Ödem nur im Sommer auftreten, auch Oppenheimer und Hinkelacker fanden Ähnliches. Ob die von Bregmann in einem Fall als Ursache angenommene Insolation hierher zu rechnen ist, ist zweifelhaft. Doch berichtete auch Ward von einer Kranken, die Urticaria an Stellen bekam, an denen sie sich der Sonne aussetzte.

Die Erscheinungen der Menstruation, der Gravidität, des Puerperiums und des Klimakteriums sind oft als krankmachende oder wenigstens krankheitsauslösende Ursachen bezeichnet worden. Am ausführlichsten ist Körner auf diesen Punkt eingegangen. Er

unterscheidet zwei Kategorien von flüchtigen Ödemen dieser Art, der einen gehören jene Fälle an, bei denen im Zusammenhang mit gewissen sexuellen Vorgängen sich bestimmte *neuralgische Zustände* abspielen, die dann mit lokalen Hautschwellungen einhergehen; der zweiten die, in denen gewisse sexuelle Vorgänge mit Ausschluß jedes uns erkennbaren nervösen Zwischengliedes von den örtlichen Hautschwellungen begleitet sind. Menstruation und Klimakterium kommen hauptsächlich in Betracht, es kann bei demselben Individuum das Ödem sowohl als menstruelle wie als klimakterische Erscheinung auftreten; es kann aber im Klimakterium sowohl die eine — direkte — wie die andere — indirekte — Form des Ödems vorkommen. Diese Erfahrung wird dazu benutzt werden müssen, die beiden Formen nicht scharf zu trennen, wenn eine völlige Identifikation auch hier vom klinischen Standpunkt aus unstatthaft erscheint. Außer Bärner haben noch andere Autoren den Einfluß genitaler Vorgänge betont. Baake sah die Anfälle am stärksten vor der Periode werden, Collins sah die Schwellungen zur Zeit der Menses auftreten, doch so, daß sie regelmäßig nachließen, wenn die Menses auftraten. Etienne beobachtete zwei Frauen, bei denen die Ödeme zu gleicher Zeit mit den Menses auftraten, ebenso Valabrega. Lewin sah gleichsam als *supplementäre Menstruation* Anschwellungen der Fußknöchel an Stelle der Menses. Es gibt übrigens auch einzelne Beobachtungen, in denen ein ganz regelmäßiges Auftreten der Ödeme auch ohne Anschluß an die Menses beobachtet wurde. Bei Herters Kranken traten sie stets zur selben Zeit nach Mitternacht im Schlaf auf und waren vormittags wieder verschwunden. Es erinnert das an ähnliche Regelmäßigkeiten bei der Migräne.

Ramsay Smith, Wills and Cooper, Varian, Fuchs, Schlesinger berichten über Verschlimmerungen zur Zeit der Menses oder mit Eintritt ins Klimakterium, Schlesinger sah während der Gravidität die Anfälle cessieren und später wieder auftreten. Auch Rapin betonte die relative Immunität der Frauen zur Zeit der Gravidität, und bezieht sie auf ein durch Hyperthyreoidismus bedingtes Antitoxin. Die Analogie mit den ähnlichen Beziehungen der Migräne zur Menstruation usw. springt in die Augen. Man muß sich hüten, den Einfluß dieser Vorgänge auf das in Rede stehende Leiden zu überschätzen; sie kommen sicher auch bei Frauen ganz unabhängig von ihnen vor (Rapin, Osler u. a.). Ich kann in der Beziehung nur auf das verweisen, was Möbius bezüglich desselben Punktes bei der Migräne sagt (Möbius, Die Migräne, Wien 1894, S. 66). Bei vorhandener Anlage wirken die genitalen Vorgänge als auslösende Reize — reflektorisch — um so leichter, als überhaupt zu dieser Zeit das Nervensystem der Frau zweifelhaft im Zustand gesteigerter Irritabilität ist.

An reflektorische Einwirkung hat man vielleicht auch in einigen wenigen Fällen zu denken, in denen im unmittelbaren Anschluß an eine

Reizung irgendeiner Körperstelle durch eine verhältnismäßig harmlose Substanz das Ödem auftritt.

Eine Beobachtung von Lewin erlaubt eine solche Deutung.

46-jährige Frau. Nicht nervös. Zwei Stunden nach Anwendung von Chromsäure auf Gratulationen im Trimmerfell beginnt die Zunge zu schwellen, so daß Patientin sie nach zwei Stunden nicht mehr hervorstrecken kann; es kommt durch Ödemödem zu starker Dysphagie, andere Schwellungen erscheinen an der Stirn, über beiden Nasenballen, über den Malleoli interni und unter dem Fußballen des rechten Fußes. Nach 24 Stunden ist alles verschwunden.

Bei gleicher Anwendung der Chromsäure hat sich dasselbe Bild schon früher einmal gezeigt. Aber, und das ist sehr wichtig, nach einiger Zeit hatte die Kranke eine passagere Schwellung des Handrückens und des linken Fußballens nach einer geistigen Erregung.

In einem Fall von Hughes bekam ein auch sonst sehr nervöses Kind, wenn es eine süße oder saure Substanz in den Mund einführte, eine sehr rasch verschwindende Schwellung der rechten Gesichtseite.

An eine Intoxikation darf man in diesen Fällen wohl nicht denken. Etwas komplizierter liegen die Verhältnisse bei der Empfindlichkeit vieler dieser Kranken gegen Insektenstiche, die sich nicht nur dadurch dokumentiert, daß die durch den Stich selbst hervorgerufenen Quaddeln besonders groß sind, sondern beweisen auch darin, daß sich an die Schwellungen an der Stichstelle anderweitige Schwellungen anschließen; hier muß man eine sich fortpflanzende reflektorische Einwirkung in Erwägung ziehen, besonders wenn die betreffenden Individuen die juckende Stelle durch Kratzen dauernd reizen; natürlich muß auch mit der Möglichkeit der Produktion antitoxischer Stoffe gerechnet werden.

Symptomatologie.

Wir unterscheiden:

Die durch das Ödem der äußeren Haut hervorgerufenen Symptome,

die durch Beteiligung innerer Organe entstandenen Symptome, von denen zum Teil auch noch der Augenschein lehrt, daß sie auf ein Ödem der Schleimhaut direkt zurückgeführt werden können, das sind die Schwellungen an den Schleimhäuten der Mund- und Rachenhöhle und des Kehlkopfeneinganges, der Augenbindehaut — ferner solche, von denen wir zum anderen Teil mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen können, daß sie auf einem Ödem der dem Gesicht nicht direkt zugänglichen Teile beruhen, Magen-Darmsymptome, Symptome von seiten der tieferen Luftwege.

Hieraus schließen sich die durch passagere Ergüsse in die Gelenke (*Hydrops articuli* *intermittens*) oder Sehnen-scheiden (Schlesinger) oder Muskeln (eigene Beobachtung) hervor-

geratenen Störungen, endlich Symptome von noch zweifelhafter Bedeutung namentlich von seiten der Nieren, (Polyurie, Albuminurie, verringerte Harnmenge, Hämoglobinurie).

In einer Anzahl weiterer Symptome, namentlich von seiten der nervösen Centralorgane, ist die Genese noch schwerer zu beurteilen, insbesondere ist die Schwierigkeit der Entscheidung groß, ob es sich auch bei ihnen um „Lokalsymptome“ handelt, oder ob wir sie zu den in einer Anzahl von Beobachtungen sicher vorhandenen Allgemeinsymptomen zu rechnen haben.

Zu den typischen Fällen des akuten Ödems, in denen Symptome der genannten Art in größerer oder geringerer Vollständigkeit beobachtet werden, gesellen sich die Fälle, die nach einer oder der anderen Richtung vom Typus abweichen. Hierher gehören vor allem Übergangsbilder zur Urticaria die sehr häufig sind, ferner die Fälle, in denen sich Züge im Krankheitsbilde finden, die einer der von mir schon abgehandelten Neurosen angehören, also den Akroparästhesien, der Erythromelalgie, der Raynaudschen Krankheit oder der Sklerodermie entstammen. Solche Zwischenglieder kommen vor, wenn sie auch nicht so häufig sind wie bei den früher behandelten Krankheiten.

Die Krankheit setzt meist akut, ohne Vorboten ein, gelegentlich finden sich als Prodromalsymptome ein geringeres oder stärkeres allgemeines Unbehagen, Mattigkeit, Frösteln, Temperatursteigerung, Krankheitsgefühl, Appetitlosigkeit, Symptome, die auch weiterhin im Verlaufe der Krankheit resp. des einzelnen Anfalls vorhanden sein können.

Die Hautschwellungen selbst stehen diesen Krankheitszeichen gegenüber aber stets weit im Vordergrund. Sie charakterisieren sich als unbeschriebene Schwellungen von sehr wechselnder Größe, meist derb elastischer Konsistenz, so daß ein Fingerdruck gar nicht oder nur für Momente bestehen bleibt, von einer Farbe, die der normalen Hautfarbe sehr ähnlich ist, oft nur einen noch bläueren, gelblichen, wachsartigen Ton hat, seltener ins Rosa und Rötliche hinübergeht; die Schwellungen entstehen rasch, im Verlauf von Minuten und Stunden, um meist etwas länger, ein, zwei, selbst mehrere Tage lang im Stadium voller Entwicklung zu bleiben und dann sehr rasch wieder zurückzugehen. Sie sind meist schmerzlos, jucken auch nicht oder nur wenig und fallen nur durch ein Gefühl von Spannung lästig. Die Entstellungen der äußeren Form, die sie hervorrufen, sind ganz erheblich, naturgemäß besonders störend, wenn sie das Gesicht betreffen. Davon geben die Abbildungen (Fig. 19 bis 22) eine Vorstellung, die einem sehr typischen Fall von flüchtigen Ödem entstammen. Es handelte sich um eine 32 jährige Frau, die seit 5–6 Jahren Anschwellungen an allen möglichen Stellen des Körpers (Füße, Schenkel, Arme, Gesäß, Gesicht, einmal auch Kehlkopf) bekommt. Nach der Schilderung sind es diffuse, etwas rot ansehende

Schwellungen, die sehr umfangreiche Abschnitte des Körpers befallen, z. B. den ganzen Arm, die Schwellungen jucken nicht und sind nicht heiß. Eine bestimmte Ursache weiß sie nicht. Seit einer Gallensteinoperation klagt sie über allgemein-nervöse Beschwerden, keine Migräne, keine Heredität. Keine Empfindlichkeit gegen bestimmte Speisen.



Fig. 19.

Flüchtiges Ödem des Gesichts bei
32-jähriger Frau.



Fig. 20.

Dieselbe Patientin wie in Fig. 19,
außerhalb des Antlitzs.

Die Ödeme sind sehr häufig, so daß sie oft wochenlang nicht einen Tag davon frei ist. Sie entwickeln sich im Verlauf von wenigen Stunden zu voller Höhe, um im Lauf von einigen Tagen zu verschwinden. Bei der ersten Untersuchung bestand ein den ganzen linken Arm einnehmendes Ödem, das prall elastisch war, der Arm sah ein wenig cyanotisch aus. Einige Monate später kam sie mit einem durch Schwellungen völlig entstellten Gesicht, das zwei Tage später wieder ganz normal sich präsentierte; die Temperatur der Haut war etwas erhöht, die Schwellung farblos. Am Tage vorher hatte sie eine Zahnbehandlung, bei der nach Cocain zur Anwendung gekommen war, durchgemacht. Die objektive Untersuchung ergab keine weiteren Störungen. In mehrjähriger Beobachtung blieb das Bild unverändert.

Im einzelnen läßt sich über die Ödeme noch folgendes sagen:

Ihre Größe wechselt sehr. Sie können nur erbsen- bis handteller- groß sein, um ein andermal bis zu Handtellergröße und darüber anzuwachsen. Quincke gibt ihren Durchmesser auf 2–10 cm an, Favier und sogar Schwellungen von 1½ m Länge. Oft schwillt ein ganzer Körper-

teil an, ein Unterarm, ein Unterschenkel. Eine sehr erhebliche Größe erlangen die Schwellungen gelegentlich an den Genitalien, besonders am Scrotum, das kindskopf- oder gar mannskopfgroß werden kann (Rapis). Es wurden auch Schwellungen des ganzen Körpers beobachtet, und zwar von Börner und ganz besonders in dem merkwürdigen Fall



Fig. 21.

Dieselbe Patientin wie in Fig. 19. Flächige Schwellung des ganzen linken Armes, besonders der Hand. Streckseite.

von Diethelm, auf den ich noch genauer zurückkomme. Die Schwellungen können auch aus einzelnen distinkten Knoten zu einem großen Tumor konfluieren. Kriech schildert diesen Vorgang so: es bilden sich auf einer ungefähr handtellergroßen Fläche umschriebene, linsenhis bohnen große, derbe, weiße Quaddeln, die etwa innerhalb einer Stunde zu einer großen, weißen, beertartigen Erhebung zusammenfließen, die alsdann fokussiert wird. Die Schwellungen überragen das Niveau der Haut gelegentlich um mehrere Zentimeter, Napier sah sie 2–4 Zoll hoch anwachsen, meist war $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ cm nicht überschritten. Ihre Grenzen können vollkommen scharf sein, und eine Anzahl Autoren hat auf dies

Kriterium besonderen Wert gelegt; mit Unrecht, denn das Gegenteil, daß zwischen normalen und kranken Hautpartien ein allmählicher Übergang stattfindet, ist keineswegs selten. Küfner beschreibt sie so, daß die centralen Partien am stärksten erhaben sind, und daß ein allmählicher Abfall und Übergang ins Normale stattfindet; nach Strübing, Courtois-Suffit u. a. haben ein allmähliches Übergehen zur



Fig. 22.

Dieselbe Patientin wie in Fig. 19. Streckung des ganzen linken Arms.
Hinterseite.

Norm gesehen. In einem meiner Fälle konnte ich das ebenfalls beobachten. Meist sind die Schwellungen rundlich, gelegentlich auch werden sie als wurstförmig beschrieben (Börner, Elliot). Sie sitzen nach allgemeiner Angabe in der Haut und im Unterhautbindegewebe. Für das Aussehen der Schwellungen, ihre Farbe, ihre Konsistenz scheint mir der mehr oder minder tiefe Sitz von großer Bedeutung zu sein, doch fehlen über diesen Punkt meist genauere Angaben. Dort, wo die Schwellungen sehr umfangreich sind, wird sich ja darüber auch schwer etwas eruieren lassen, während bei kleineren Schwellungen das eher möglich

ist. So beschreibt Péréol kleine erbsen- bis nußgroße Knötchen, die meist mit der Haut leicht verschieblich sind, vereinzelt dagegen aber doch am Perioost fest zu sitzen scheinen. Dort, wo über größeren Erhebungen die Haut in Falten abhebbar ist, wird man einen etwas tieferen Sitz des Ödems annehmen müssen. Auch die Farbe und die Elastizität der Haut der betroffenen Gegend wird durch den Tiefsitz des Ödems beeinflußt werden. Zuweilen sind es auch wirkliche, subkutane Tumoren, die durch die Ödeme hervorgerufen werden (Norton), und mit Recht hat man eine Anzahl von sog. Pseudolipomen hierher gerechnet.

Die Konsistenz ist meist eine zwischen fest und weich in der Mitte stehende; Milton trifft das richtige, wenn er sie mit der des kontrahierten Biceps vergleicht; sie sind eben etwas elastisch. Als wichtiges Merkmal ergibt sich daraus, daß der Fingerdruck nicht wie bei vielen anderen Ödemen lange bestehen bleibt, sondern daß entweder gar keine, oder eine nur kurze Zeit anhaltende Eindrückbarkeit der ödematösen Schwellungen vorhanden ist.

Die Farbe der Haut kann ganz normal sein, doch weicht sie meist etwas von der gewöhnlichen ab, indem sie etwas mehr weiß oder gelblich wird, und die Haut dabei ein eigentümlich glänzendes, durchscheinendes, glasiges oder wachsartiges Aussehen bekommt. Die Blässe der Haut kann sich noch weiter akzentuieren, so daß sie völlig weiß, wie tot aussieht (Rapis, Norton), doch ist das nicht häufig. Nicht selten nimmt die Haut eine leichte Rosafärbung an, die unter Druck rasch verschwindet. Es kommen aber auch stärkere Rotfärbungen vor, und hier beginnen dann die Schwierigkeiten der Abgrenzung von der Urticaria. Die rote Färbung allein genügt nicht, um den Fall der Urticaria zuzurechnen, zumal, wenn sie sich nicht bei allen Erhebungen einstellt, sondern nur diese oder jene betrifft. So beschreibt Milton einen typischen Fall, in dem die meisten Schwellungen von der Farbe der Haut waren, aber einzelne waren etwas röter, und eine war tiefrot; ein Jucken bestand nicht. Ein andermal bildet sich die Rötze der einzelnen Anschwellung erst allmählich heraus. Dinkelaeker sah einmal eine Anschwellung des Penis auf das Doppelte; die Schwellung war anfangs ödematös und kalt, dabei wachsfarben, während sich später Rötung und vermehrte Lokaltemperatur einstellten; Schmerzen bestanden nicht. Ähnlichen Farbenwechsel beschreibt auch Kirsch. Auch das Umgekehrte kommt vor, daß eine Anfangs rote Stelle allmählich abbläßt, und bei größeren Schwellungen ist oft das Centrum am meisten entfärbt. Von Wichtigkeit ist die Tatsache, die noch einmal ausdrücklich betont werden soll, daß Rötze und Jucken nicht immer zusammen gehen. So traten auch in einem Fall Hallopeaus rote Schwellungen auf, die nicht juckten, nur in geringem Maße Brennen erzeugten.

Die Temperatur der Schwellungen wird der Farbe meist parallel gehen, für gewöhnlich ist sie demnach eher etwas unter der

Norm. mit der Röte pflegt sich auch die Hitze einzustellen. Collins hält es für wahrscheinlich, daß die Temperatur zu Beginn meist etwas erhöht ist und später mit der Ausbreitung des Ödems abnimmt. Doch liegen exakte Untersuchungen über diesen Punkt nicht vor. Steiner fand einmal bei einer Schwellung am Nacken mit dem Flächenthermometer 37,5°, auf der entsprechenden Partie der anderen Nackenseite 36,1°, ein zweites Mal bei einer Schwellung des linken Augenlides 36,5°, am rechten 34,9°. Fortlaufende Beobachtungen hat auch er nicht vorgenommen. Dagegen hat Starr in einem Fall, in dem die Kälteeinwirkung überhaupt eine große Rolle spielte, folgende Untersuchungen angestellt. Die Hand ist vor dem Versuch ganz normal. Wird sie dann in kaltes Wasser gehalten, so ist sie nach einer halben Minute blaßrot, nach einer Minute (dänlich)rot, wird dann immer blasser, um nach 5½ Minuten weiß, wachsfarben und glatt zu werden. Die Venen sind erweitert, die Arterien klopfen, die Hand ist von 195 auf 204 mm an den Metacarpophalangealgelenken, von 54 auf 62 mm an dem Mittelfinger (I. Interphalangealgelenk) angeschwollen. Die Finger sind steif. Die Temperatur der im Wasser befindlich gewesenen linken Hand nahm erheblich rascher zu. Zwei Oberflächenthermometer ergaben, in die Hand eingelegt, bei einer ursprünglichen Temperatur von 70° F nach einer Minute rechts 78° F, links 87,5, nach drei Minuten 81 und 91° und nach fünf Minuten 86 und 93°. Nach 15 Minuten begann die Farbe und die glassy-skinartige Beschaffenheit zu schwinden, nach 25 Minuten war die vorher stark behinderte Beweglichkeit freier, der Umfang geringer.

Weitere derartige Untersuchungen sind wegen der Wichtigkeit der Temperaturmessung für die pathogenetische Auffassung des Ödems sehr erwünscht. Ich konnte bei einem meiner Fälle durch kaltes Wasser weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Schwellung und ebenso wenig eine Farbenänderung produzieren; übrigens auch nicht durch das lauwarme Handbad.

Ein sehr wichtiges Kriterium ist die akute Entwicklung der Schwellungen. Es kann nur wenige Minuten dauern, bis sich z. B. eine sehr erhebliche, stark entstellende Schwellung der einen Gesichtshälfte, oder eines Lides, oder der Oberlippe entwickelt; ich habe ein solches fast momentanes Entstehen der Schwellungen in einem Fall mehrfach beobachten können. Meist dauert es wohl länger, einige Stunden, bis die Anschwellung ihren Höhepunkt erreicht hat, auf dieser Höhe verweilt sie einige Zeit, höchstens einige Tage, um dann wieder im Verlauf ganz kurzer Zeit spurlos zu verschwinden. So führt die einzelne Schwellung in der Tat ein sehr ephemeres Dasein; wie sich aus einer Aufeinanderfolge von Schwellungen der einzelne Anfall und aus den einzelnen Anfällen wieder die gesamte, oft ein Menschenleben dauernde Affektion zusammensetzt, läßt späterer Schilderung überlassen.

Die Schwellung braucht gar keine subjektiven Sym-

ptome zu machen, so daß der Kranke erst zufällig auf sie aufmerksam wird. Das ist aber doch die Ausnahme. Oft geht schon dem Auftreten des Ödems ein leichtes Brennen oder Kriebeln voraus; noch häufiger stellt sich ein unbequemes Gefühl ein, wenn die Schwellung eine gewisse Größe erreicht hat; die Kranken empfinden dann ein unangenehmes Spannen und Zerren an der betroffenen Körperstelle, dazu gesellt sich eine Empfindung, als ob die Teile tot, abgestorben, leblos, wie von Holz wären (*wooden feeling* der amerikanischen Autoren). Diese Empfindungen finden ohne weiteres ihre Erklärung in dem Druck und der starken Spannung, unter die die ödematösen Stellen gesetzt werden, zumal diese plötzlich auftritt. Dazu kommen aber in einer Anzahl von Fällen Empfindungen, die wir nicht als mechanisch bedingt ansehen können. Die Schwellungen können von einem Jucken und Brennen begleitet sein, das meist in erträglichen Grenzen sich bewegt und oft auch nur im Anfang vorhanden ist, aber doch gelegentlich für den Patienten durch seine Intensität quälend werden kann (Norton, Rapin, Napier, Kirsch u. a.).

Es ist die Regel, daß erhebliche Röte und starke Temperaturerhöhung mit heftigem Juckreiz zusammen vorkommen. Dort, wo diese Kombination regelmäßig oder auch nur in dem größeren Teil der Schwellungen statt hat, haben wir es aber überhaupt nicht mehr mit dem flüchtigen Ödem, sondern mit der Urticaria zu tun, aber es kann die Trias wohl auch einmal nur bei einer oder der anderen „Quaddel“ auftreten, während der Rest blaß und unempfindlich ist. Und zudem sind die drei Symptome überhaupt nicht unauflöslich aneinander gebunden: es gibt wie schon erwähnt, rote heiße Schwellungen, die nicht jucken, und Kirsch teilt in seinem Fall sogar mit, daß das Jucken aufhörte, wenn die anfangs blassen Schwellungen rot wurden. Schon diese Beobachtungen lehren uns, daß die Übergänge zur Urticaria durchaus fließende sind.

Sehr selten wurde beobachtet, daß heftigere Schmerzen dem Auftreten der Schwellungen vorausgingen (du Castel, Mourou und Mc. Gregor, Morichau-Beauchant und Landry, eigene Beobachtung). Eine objektive Sensibilitätsstörung scheint bei dem flüchtigen Ödem niemals beobachtet zu sein; dem subjektiven Taubheitsgefühl entspricht eine objektiv nachweisbare Abstumpfung der Sensibilität scheinend nicht. Valobra untersuchte mit dem Tasterzirkel die Haut über den geschwellenen Partien, ohne eine Störung nachweisen zu können. Dagegen erwachen den Kranken bei besonderem Sitz und erheblicher Größe der Anschwellungen bisweilen große Unbequemlichkeiten: die Schwellung der Unterlippe kann so groß werden, daß der Mund nicht geöffnet werden kann (Norton); die Entstellung durch die Anschwellung der Hände, die zu unförmigen Massen geworden waren, löselte den Kranken Oppenheimers für

Wochen aus Zimmer, die erwähnten riesigen Anschwellungen des Scrotums führen natürlich Unbequemlichkeiten genug herbei, durch Lidgeschwellungen kann das Auge verschlossen werden, die vom Ödem befallenen Finger sind steif, ungeschickt, zu aller Arbeit untauglich; aber alles das hat bei der Flüchtigkeit der Ödeme meist nicht gerade viel zu sagen.

Die einmalige Schwellung hinterläßt wohl niemals ein Residuum, die Teile bleiben unverändert, nur in wenigen Fällen schält die Haut später ab (Collins, Bregmann, Diethelm, eigene Beobachtung).

Auch bei steter Wiederholung des Ödems an derselben Stelle kommt es in der Regel nicht zu einer dauernden Veränderung der betreffenden Teile. Doch wurden einige abweichende Fälle beobachtet. Riehl fand bei einem seiner Kranken, daß die Augenlider schlaffe Säcke bildeten, nachdem ein paroxysmales Lidödem einige Zeit lang vorausgegangen war; in einem zweiten fand er eine mäßige Verdickung der Haut der Wangengegend. Gerade beim Lidödem scheinen überhaupt etwas häufiger dauernde Veränderungen vorzukommen. Auch Fuchs beobachtete Ähnliches wie Riehl. Bei Reitmanns Patientin war nach wiederholten Ödemanfällen die Schwellheit der Gesichtszüge auffallend. Des-

champs fand an den Lidern vorgeschondener Schwellungen, als erst wenige Anfälle vorausgegangen waren und die ganze Affektion erst zwei Jahre bestand; auch jetzt noch wechselte die Intensität der Schwellungen sehr. Darüber kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten.



Fig. 23.

Häufiges Lidödem. Am linken oberen Augenlid Narbe von Operation zurück.

Ein jetzt 25-jähriges Mädchen hatte zuerst im Alter von 19 Jahren eine Schwellung der linken Gesichtshälfte, die von etwas stehenden Schmerzen begleitet war. Die Schwellung bildete sich zwar sehr erheblich zurück, soll aber gleich nach dem ersten Anfall nicht ganz verschwunden sein. Dann hat sie alle 8–14 Tage Anfälle gehabt. Vor 2 Jahren verplanten sich die Schwellungen auf die rechte Seite und niederhingen sich dann dort ebenso wie links. Es kam allmählich zu einer dauernden Schwellung beider oberen Augenlider bis der ganzen Gegend um das Auge herum; doch ist der Zustand auch jetzt nicht stationär, es treten tiefere immer wieder Exacerbationen auf. Keine Versteinerung während der Hensen. Früher Kopfdruck, schmerzt leicht, bei Hitze im Kopf,

Parästhesien in den Fingern. Es besteht eine elastische Schwellung im beider Augenbrauen, am stärksten an den Lidern (Fig. 23). Am linken Augenlid befinden sich Narben, die von Excisionen herrühren, die hier bereits Beseitigung der Schwellung — ohne Erfolg — gemacht wurden. Der Operateur hatte dabei den Eindruck des Vorhandenseins einer zahnigen Infiltration in das Gewebe. Übriger Befund negativ.

Diese Verlaufsart bildet den naturgemäßen Übergang zu den chronisch sich entwickelnden neuropathischen Ödemen. Solche kommen vor, gehören aber in ihrer ausgesprochenen Form nicht zum klinischen Bild des akuten flüchtigen Ödems. Fallet beschreibt einen Fall, der sich ähnlich entwickelte, wie der Deschamps' und der oben mitgeteilte eigener Beobachtung: nach dreimaligen, vorübergehenden Attacken etablierte sich eine dauernde Schwellung. Auch in einem anderen Fall eigener Beobachtung waren ziemlich ausgeprägte dauernde Veränderungen, allerdings nachdem die Krankheit schon längere Zeit bestanden hatte, vorhanden. Es fand sich namentlich in der Gegend der Fingergelenke eine mäßige, konstante, wenn auch in der Intensität wechselnde Anschwellung. Die Gelenke selbst waren frei.

Ausnahmsweise kommen neben den Schwellungen andere Symptome vor, die den Ernährungszustand der betroffenen Teile alterieren.

Riehl sah einmal Bildung kleiner Blasen an den ödematösen Partien, ebenso Forssberg, Fürstner, Bittorf (nach Steiner), Rumpel. Ich habe selbst einen Fall dieser Art beobachten können. Auf den geschwellenen Partien fanden sich einige mit gelblicher Flüssigkeit gefüllte Bläschen; das soll nach den Angaben des Patienten das gewöhnliche Verhalten bei ihm sein. Einige Male wurde ein geringer Blutaustritt beobachtet, so daß die Farbe der Schwellungen eine bläuliche oder bläulich-rote wurde (Schlesinger, Ormerod, Lavett, Treumann — Schwellung der Oberlippe, deren Schleimhaut dunkelrot ist und kleine punktförmige Blutungen zeigt, die nach einem Tage verschwunden sind —, Rumpel — bei einem zum fünften Male auftretenden Ödem sind beide Lippen prall elastisch geschwollen und es finden sich zahlreiche Blutungen in der umgebenden Haut wie in der Schleimhaut des Mundes — Monro und Mc. Gregor, Cuntz, Riehl, Sträbing, Jamieson, die letzten vier beim Löffödem). Das Zusammenkommen stärkerer Hautblutungen mit flüchtigen Ödemen wurde allerdings auch sonst noch mehrfach beobachtet; wir werden auf diese Kombination später noch einmal zurückzukommen haben: es handelt sich da um Fälle von *Purpura toxica*, wo die Ödeme dann hinter den Blutungen zurücktreten, aber auch hier gibt es Zwischenformen, bei denen man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob *Purpura* oder akutes flüchtiges Ödem vorliegt. Küster sah einige Male Blutungen, einmal aus der Nase, einmal aus den Luftwegen, endlich im Anschluß an Zahnextraktion. Er weiß nicht, ob

sie per rhexin oder per diapedosin entstanden sind, jedenfalls beweisen sie erhöhte Erregbarkeit des Gefäßsystems.

Von sekretorischen Symptomen wird wenig berichtet. Börner fand einmal lokale Hyperhidrosis an der geschwellenen Hand, ebenso Whiting, zusammen mit ausgesprochener Dermatographie. Landou beobachtete in zwei Fällen reichliche Schweißse zur Zeit der Anschwellungen, ebenso Valobra in seiner fünften Beobachtung. Diethelm's Patient zeigte das Symptom des halbsseitigen Schwitzens; in Widowitz' Fall war der Ausbruch des Ödems begleitet von Anfällen gesteigerter Tränen- und Speichelsekretion, letztere fand sich auch bei dem zweiten Fall von Valobra.

Die Schwellungen können an den verschiedensten Körperstellen sitzen — es ist wohl kaum ein Körperteil ganz immun dagegen; aber einzelne sind häufiger, andere seltener befallen, am seltensten wohl die behaarte Kopfhaut (Rapin). Als Prädispositionsstellen werden diejenigen bezeichnet, wo ein recht lockeres subkutanes Bindegewebe vorhanden ist, also Lappen, Augenlider, Wangen, Scrotum (Courtois-Suffit). — Doch ist dies kaum richtig. Collins hat eine Statistik aufgestellt, wonach unter 71 Fällen die erste Schwellung 29 mal im Gesicht, 22 mal an den Extremitäten, 3 mal an den Genitalien, 3 mal am Nacken und 1 mal hinter dem Ohr gesessen hat. Im Gesicht waren 3 mal die Stirn, 3 mal die Augenlider, 7 mal die Lippen betroffen. An den Extremitäten sind die Hände am häufigsten affiziert, dann folgen die Unterarme. Wir brauchen uns dabei nicht länger aufzuhalten, die einen Autoren bezeichnen das Gesicht, die anderen die Extremitäten, die dritten den Stamm oder die Genitalien als Lieblingssitz der Ödeme: sie können eben überall sitzen.

Die Lokalisation ist sicher bisweilen von äußeren Bedingungen abhängig, so besonders von der Einwirkung der Kälte — dann werden nur die von Kleidung nicht bedeckten Teile, Gesicht und Hände, befallen — und von Traumen (s. u.). Wichtig ist, daß die Akra keineswegs in der Weise bevorzugt werden, wie wir es bei der Raynaud'schen Krankheit und den anderen Akro-neurosen gesehen haben; es sind nur spärliche Fälle, die diese Lokalisation zeigen (Starr, Widowitz); für uns sind sie freilich besonders wichtig, und sie sollen uns auch später nochmals beschäftigen. Es ist weiter von Bedeutung, daß die Schwellungen auch nur recht selten symmetrisch sind. Joseph betont direkt ihre Asymmetrie; dagegen hat Brugman einen freilich nicht ganz typischen Fall mit symmetrischen Ödemen beobachtet, ebenso le Gendre und Widowitz — allein auch dessen Fall zeigt Besonderheiten. Halbsseitiges Vorkommen berichtet nur Nauke: bei einer Hysterica beschränkten sich die flüchtigen Ödeme auf die rechte Seite. Féré berichtet, daß eine Urticaria alimentaria bei einer cerebralen Hemiplegie ausschließlich auf der gelähmten Seite gesessen

habe und er betont, daß er ähnliche Vorkommnisse mehrfach — und zwar sowohl so, daß die Schwellungen nur auf den gelähmten Partien saßen als so, daß sie diese ganz frei ließen — beobachtet habe. Die Verteilung des Ödems in der Haut läßt weder Beziehungen zu den peripheren Nerven noch zu spinalen oder radikulären Segmenten noch auch zu bestimmten Gefäßterritorien erkennen. Saquépée stellte einen Fall von herpesartigen Erythemen verbunden mit einem beträchtlichen Ödem des oberen Augenlides vor, mit einer Verteilung wie bei Herpes zoster ophthalmicus. Etienne spricht daraufhin von einem *Ödème aigu zomiforme*. Sicher sind das aber ganz exceptionelle Vorkommnisse, wenn man nicht die früher erwähnten Fälle mit einschließen will, bei denen die Schwellungen als Begleiterscheinungen von Neuralgien oder tabischen Schmerzen rein symptomatisch vorkommen.

Es steht fest, daß die Stelle, an der das Ödem aus irgendwelchen Gründen zuerst aufgetreten ist, auch für die späteren Anfälle ein *Locus minoris resistentiae* bleibt. Das kann einen guten Grund darin haben, daß auf diese auch im weiteren Verlauf der Krankheit immer dieselben Momente wieder schädigend einwirken, so wenn immer wieder Hände und Gesicht befallen werden, weil sie unbedeckt sind und der Kälte stets von neuem ausgesetzt werden. Andermal ist ein solcher Grund für die konstante Lokalisation nicht ohne weiteres zu erkennen. Man hat aus solchen Fällen mit bestimmter Lokalisation vielfach eigene Formen oder Unterformen gemacht. Fuchs und Schlesinger haben namentlich bei dem häufig als besondere Affektion beschriebenen Lidödem auf das Verehrte dieser Anschauung hingewiesen. Weder in den — nicht sehr häufigen — Fällen, wo nur das Lid betroffen war (Doyle, Gunn, Collins), noch viel weniger dort, wo neben dem Lidödem nebenbei noch, wenn auch nur vorübergehend, Ödeme an anderen Stellen der Haut oder Schleimhaut vorkamen, hat man das Recht, von einer besonderen Form des flüchtigen Ödems zu sprechen. Man ist auch nie sicher, ob wirklich in den späteren Anfällen immer nur wieder die erste Stelle betroffen wird, wenn das auch zu Anfang eine Zeit lang der Fall war. Ich zitiere als Beispiel eine Beobachtung von Riehl:

Siphriger Lehrer. Vor drei Jahren Neuralgia capitis facialis. 1870–72 wiederholt Gelenksrheuma ohne Fieber. Krone (Mars 1874. Danach, wenige Tage nach dem Tode seiner Frau, das erste Mal Anschwellung des linken Augenlids im Schlaf, die während der nächsten drei bis vier Jahre immer an derselben Stelle wiederkam, alle drei bis vier Wochen. 1878 wurde das andere Augenlid befallen, und es traten nun alle 14 Tage bis 3 Wochen solche Anfälle bald rechts, bald links auf, folgten auch gewöhnlich damit oder selbständig Schwellungen an der Lippe und der rechten Wange. Im Herbst 1885 Ödem des Pharynx, Schlundbeschwerden. An den Lidern ist die Haut beträchtlich gedehnt, so daß die Unterlider schlaff herabhängende Säcke bilden und die Oberlider in Form einer vorhängelichten Falte bis zur Mitte der Lidpalpe reichen.

Es gibt auch Schwellungen, die immer nur die eine Hand betrafen (Starr, Finger und Daumen der linken Hand), oder solche, wo stets nur die Gegend über dem einen Schlüsselbein affigiert war (Riehl), oder Fälle, in denen die Schwellung immer nur an demselben Gesichtsteil, von Schläfe zu Schläfe ziehend, auftrat (Milton) oder solche, wo immer nur das Scrotum betroffen war (Wiel) und anderes mehr.

Eine besondere Erwähnung verdienen die in den tieferen Partien des Zellgewebes sitzenden Schwellungen. Hierher gehören zum Teil die von Féréal zuerst als arthritisch beschriebenen *Nodosités éphémères souscutanées*. Ähnliche Beobachtungen stammen von Troisier et Brucq, Davaine. Quincke und Gross sahen in einem Fall, der eine Kombination mit dem Erythema nodosum darstellte, mehrfach Schwellungen, die auf dem Knochen unter unveränderter Haut fest saßen. Sie fanden ähnliche, teils scharf umgrenzte, teils mehr diffuse Schwellungen in zwei anderen Fällen, in einem vierten Falle wurde wegen kleiner Schwellungen an der Stirn zeitweilig die Diagnose Tophi gestellt. Morichau-Beauchant hat einmal in einem wahrscheinlich luerhergehörigen Fall eine solche Schwellung, die die Größe einer kleiner Nuß hatte, herausschneiden versucht; aber beim Einschneiden verschwand die kleine Geschwulst, ebenso ging es an einer zweiten Stelle, ein vollgültiger Beweis dafür, daß hier gar keine eigentliche Geschwulstbildung vorlag; es fand sich nur etwas ödematöses Bindegewebe. Herz hat unter dem überflüssigen Namen Periostitis angioneurotica das von ihm in vier Fällen beobachtete Auftreten von flüchtigen, schmerzhaften und druckempfindlichen Infiltrationen des Periosts und seiner nächsten Umgebung an verschiedenen Stellen des Thoraxskeletts beschrieben. Die Schwellungen traten im Anschluß an nervöse Herzbeschwerden, zweimal bei Hysterischen, einmal bei einem Basedow, einmal bei einer paroxysmalen Tachykardie auf. Es handelte sich sicher um nichts weiter als um tiefsetzende flüchtige Ödeme, ebenso wie in den Fällen von Lublinski und Stern, der seine Fälle übrigens richtig deutet.

Eine bestimmte Lokalisation verdient auch noch besonders hervorgehoben zu werden. Häufig sitzen die Ödeme periartikulär (Banke, Norton, Dinkelacker). Ich habe selbst zwei solche Fälle gesehen, in denen die Gegend der Fingergelenke der Prädislokationsort war: es bildeten sich dann dort wall- oder ringförmige Erhebungen um das Gelenk herum, die diese Teile stark geschwollen erscheinen ließen; aber die Beweglichkeit des Gelenkes war völlig frei, und man konnte unter der ziemlich lockeren und verchieblichen Schwellung sicher dessen Integrität konstatieren. Ganz wie in einem Fall von Dinkelacker war aber dazwischen gelegentlich einmal auch in das Gelenk selbst ein Flüssigkeitserguss erfolgt (Näheres über den Fall siehe unten).

Schlesinger hat zuerst den Verdacht ausgesprochen, daß auch die

intermittierende Form der Parotisanschwellung (Moore) in das Gebiet des Hydrops hypostrophos hineingehört. Später beschrieb Freudenthal einen Fall von anfallsweise auftretender Schwellung der Parotis, der mir in der Tat zum flüchtigen Ödem zu gehören scheint.

32jährige Frau. Vor 10–12 Jahren plötzlich meist an der hinteren, linken Backenseite Jucken und borkige Rote. Seit sechs Jahren tritt an dieser Stelle eine käseartige Schwellung auf, die im Verlauf von 10–20 Minuten wieder verschwindet. Nie Speichelfluß. Während der ersten und zweiten Gravidität wieder die Anfälle. Die Geschwulst reicht von der Mitte der Ohrmuschel und des Jochbeins bis zur Mitte des horizontalen Unterkieferastes. Die Konsistenz ist ziemlich prall und umfaßt die Grenzen der Parotis ziemlich genau innerhalb. Der hochgradig neurotische Mann der Patientin bekommt seit einigen Jahren häufig gelegene Anschwellungen von 1½tägiger Dauer ohne Speichelfluß aus.

In diesem Falle, der nebenbei das Interesse einer psychischen Induktion auf den allerdings durch schwere Neurasthenie prädisponierten Mann bietet, ist es nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob es sich um wirklich in der Parotis sitzende Schwellungen, oder vielmehr um eine solche, die in der Haut und Unterhaut dieser Gegend sitzt, handelt, da scheinbar sichere auf Affektion der Parotis deutende Symptome nicht vorhanden sind. Doch muß man unbedingt mit der Möglichkeit einer eigentlichen Parotisaaffektion rechnen, wie weitere Befunde und eigene Erfahrungen zeigen.

Talley beschreibt folgenden Fall von „angioneurotischem Ödem der Speicheldrüsen“.

Eine gegenüber gewissen Arzneimittelwirkungen sehr empfindliche 37 jährige Frau, die auf geringe Querschnittsdosen Ptyalismus, auf kleine Glaindosen Urticaria bekommt, litt zeitweilig an schwerer, einmal an hämorrhagischer Urticaria. Diese Frau bekam später eigentümliche Anfälle von unangenehmen Sensationen im Ohr, Schlund, Zunge, dann schwellen im Verlauf von 15 Minuten die Glandula sublingualis und submaxillaris an, es stellte sich ein profuser Speichelfluß ein. Nach 3–24 Stunden stellten sich normale Verhältnisse her. Clemens berichtet von einem Mann, der Alkoholist war, und der seit 10 Jahren öfter im Frühjahr an Anschwellung der „Halsdrüsen“ litt, und bei dem jetzt eine beträchtliche Schwellung beider Ohrspeicheldrüsen beobachtet wurde. Derselbe Zustand war schon einige Monate früher ebenfalls konstatiert worden. Hier handelt es sich also zweifellos auch um rezidivierende Parotisschwellung. Von einer scheinend familiären kongenitalen chronischen Parotitis bei einem 45jährigen Bierfahrer hat Quinke gelegentlich Mitteilung gemacht. Der Fall gehört wohl nicht hierher.

Ich selbst beobachtete seit vielen Jahren eine Patientin, die Frau eines Arztes, bei der sich neben zahlreichen anderen vasomotorisch-tropischen Erscheinungen — die genauere Krankheitsgeschichte folgt

an späterer Stelle — Parotisschwellungen erst auf der einen, dann auf der anderen Seite anfallsweise einstellten, mit großen Schmerzen und leichten Fiebersteigerungen verbunden. Der Mann der Patientin diagnostizierte zuerst Mumps, und wurde erst stutzig, als diese Schwellungen immer wiederkehrten. Allmählich bildeten sich die geschwellenen Drüsen nicht mehr zur Norm zurück. Jetzt besteht eine in ihrer Intensität noch immer wechselnde Parotisschwellung auf beiden Seiten, die für gewöhnlich nicht wesentlich schmerzhaft ist, es besteht auch eine dauernde Schwellung beider Glandulae sublinguales und submaxillares, die sich, von der Patientin unbemerkt, mit eingeschlichen hat. Und, was die Patientin ganz außerordentlich quält, die Speichelsekretion versagt nahezu vollkommen, so daß der ganze Mund dauernd völlig ausgetrocknet ist.

Ich erinnere hier an den früher von mir mitgeteilten Fall von Sklerodaktylie, bei dem ganz ähnlich wie bei der erwähnten Patientin sich in wiederholten Anfällen das Bild der symmetrischen Mund- und Ohrspeicheldrüsenanschwellung herausgebildet hatte und bei der auch ein gewisses Maß von Eosinophilie bestand, so daß im ganzen ein mit der Mikulicz'schen Krankheit übereinstimmender Symptomenkomplex resultierte.

Derartige Beobachtungen müssen vorläufig registriert werden, ohne daß es uns heute schon gelingt, einen tieferen Einblick in die hier obwaltenden Zusammenhänge zu gewinnen. An reine Zufälligkeiten kann man nach der ganzen Lage der Sache nicht denken.

Unter der Bezeichnung Pseudolipome hat man zum Teil Zustände beschrieben, die auch in diesem Zusammenhang Erwähnung verdienen. Das Pseudolipome arthritique haben zuerst Verneuil und Potain geschildert. Nach deren Beschreibung handelt es um sich bei „Arthritikern“ auftretende, durch ihre Beschaffenheit den Eindruck von Tumoren hervorrufende Schwellungen, die rasch kommen, wieder verschwinden, eine große Neigung zu redivivieren haben, und die Gegend der Oberschlüsselbeinrücken bevorzugen. Auch Rendu beschreibt solche plötzlich auftretenden Schwellungen in beiden Supraclaviculargruben, die den Eindruck von Lungenhernien hervorrufen, elastisch, nicht fluktuierend und schmerzlos sind und von ihm nur bei neuropathisch veranlagten Frauen beobachtet wurden. Crépin betont, daß diese Pseudolipome an allen möglichen Stellen des Körpers vorkommen, besonders auch in der Wand des Thorax und Abdomen. Er zitiert weitere Beobachtungen von Mathieu, in dessen Fall die Symmetrie dieser Schwellungen sehr auffällig ist, und von Testelin. Auch Norton hat sie beschrieben. Schlesinger hat ebenso wie Crépin die Vermutung ausgesprochen, daß es sich hier um Äußerungen der Quincke'schen Krankheit handelt. Diese Vermutung ist für eine Anzahl dieser Fälle gewiß berechtigt, wie überhaupt bei rasch auftretenden, rasch

verschwindenden und in bestimmten Zeiträumen wiederkehrenden elastischen Anschwellungen immer an diese Krankheit gedacht werden muß.

So möchte ich auch folgende Beobachtung hierher rechnen. Eine 29-jährige Frau kommt mit der Klage zu uns, daß sie seit 2 Jahren unter Anschwellungen der Brüste, namentlich der rechten zu leiden habe; an dieser sei sie vor zwei Jahren wegen einer Mastitis operiert worden. Seitdem stellen sich zeitweilig, oft in nur mehrtägigen Zwischenräumen diese Schwellungen ein, die einen Teil der Brust betreffen, mit geringen Schmerzen einhergehen und in einigen Stunden wieder verschwinden. Die Patientin ist im allgemeinen nervös und leidet an der Nothnagelschen Form der Akroparästhesie. Obwohl ich die Anschwellungen nicht selbst beobachtet habe, zweifle ich nicht, daß es sich hier um flüchtige Ödeme handelt; nur bleibt unentschieden, ob diese im Gewebe der Drüse saßen, was mir am wahrscheinlichsten ist, womit sie eine Analogie zur flüchtigen Parotisschwellung darstellen würden oder in der Haut darüber.

Wenn ich bisher von der Lokalisation der Schwellungen sprach, habe ich nur der in der Haut auftretenden gedacht. Ich gehe jetzt auf die Schwellungen der Schleimhäute ein.

Wir finden diese zunächst an den Schleimhäuten der Mund- und Rachenhöhle und des Kehlkopfeingangs. Collins sah die „Atmungsorgane“ in 21% der Fälle betroffen werden. Es kann die Wangenschleimhaut (Higier, Mumford) befallen sein oder die Schleimhaut des Zahnfleisches (Börner), häufiger ist es die Zunge (Wright, Goldschmidt, Quincke und Gross, Fuchs, Joseph, Dorman, James, Wills and Cooper, Elliot, Dinkelacker, Rapin) oder die Mandeln (Favier, Solis Cohen) oder der Gaumen, die Uvula, die Mandeln und der ganze Pharynx (Milton, Boelt, Gibson, Dorman, Goltz, Goldschmidt, Quincke und Gross, Cuntz, Rock, Fuchs). Halstedt beschreibt eine gelblich weiße durchsichtige Schwellung der rechten Rachenseite, des vorderen und hinteren Gaumenbogens, des rechten Velum, der Uvula, während Tonsillen, Zunge und Kehlkopfengang frei bleiben. Riehl berichtet auch von einer Nasenschleimhautschwellung. Am wichtigsten ist die Schwellung des Kehlkopfengangs, wegen der schweren und bedrückenden Symptome, die aus ihr resultieren (Collins, Schlesinger, Riehl, Boelt, Ullmann, Sträbing, Dinkelacker, Woodbury, Hallock, Leddeman, Taylor, Chittender, Ballenger, Apert et De-lille, Bazett, Bircher, Calvé, Courtade, Douglas, Goldschmidt, Garell et Bonnamour, Wardop Griffith, Halstedt, Morris, Quincke und Gross, Rapin, Rooney, Slater, Sträuß-

ler, Whiting, Christis, Fritz, Mendel, Prior, Monro and McGregor.

Es ist den Krankengeschichten oft nicht zu entnehmen, ob das Ödem in diesen Fällen wirklich immer im Aditus laryngis gesessen hat; vielfach liegt eine Kombination mit höher im Pharynx und der Mundhöhle sitzenden Schwellungen vor, die dann einen Einblick in den Kehlkopf nicht gestatten. Laryngoskopische Untersuchungen sind, vielleicht aus diesem Grund, dann auch wegen der Raschheit des Auftretens und Verschwindens der Schwellungen nicht oft gemacht worden. Garel sah laryngoskopisch ein weiches Ödem, zitternd wie Gelée, von opaleszierender, violetter Farbe. Dinkelacker schloß in seinen Fällen aus den subjektiven Symptomen einer bedeutenden Atemnot mit dem Gefühl eines Hindernisses im Kehlkopf, und aus der Tatsache, daß Skarifikationen im Kehlkopfeingang rasch Erleichterung schufen, auf eine Lokalisation im Kehlkopfeingang. Rapin war demgegenüber mehr geneigt, eine Schwellung der Pharynx- und eventuell der Ösophagus Schleimhaut für die Atemnot und die ähnlichen subjektiven Beschwerden verantwortlich zu machen.

Griffith stellte laryngoskopisch ein starkes Ödem der Schleimhaut, der Epiglottis und der aryepiglottischen Falten fest. Es war eine gelblich weiße Schwellung. Die echten Stimmbänder waren wegen der Schwellung der falschen nicht deutlich zu sehen. Auch Quincke und Gross konstatierten ein starkes Ödem der Epiglottis und der aryepiglottischen Falten, das auf der einen Seite stärker entwickelt war; es war eine sehr voluminöse, leicht durchscheinende, graurosa gefärbte Schwellung, die schon am nächsten Tage erheblich zurückgegangen war, aber erst im Verlauf von acht Tagen ganz verschwand. Die diagnostischen Schwierigkeiten waren anfangs erheblich, man dachte an syphilitische oder tuberkulöse Entzündung, auch an ein Erysipelas laryngis.

In einigen Fällen konnte, nach dem durch Larynxödem erfolgten Tode, auch eine anatomische Untersuchung der betreffenden Teile vorgenommen werden. So fand Griffith bei seiner Untersuchung des Kehlkopfs die Schleimhaut ödematös gespannt, so daß die Wände miteinander in Berührung traten. Etwas oberhalb der oberen Apertur begann diese Schwellung und reichte bis unterhalb der Stimmbänder. Schnitte zeigten, daß auch die tieferen Teile ödematös infiltriert waren. Die Flüssigkeit wies eine rein seröse Zusammensetzung auf. In Sträußlers Fall war der weiche Gaumen, das Zäpfchen, die Epiglottis und die aryepiglottischen Falten hochgradig geschwellen, letztere bildeten dicke, blasenförmig aufgetriebene, durchscheinende Wülste. Geringer war die Schwellung im Kehlkopf, in der Luftröhre und an den echten Stimmbändern. Auch Bazett und Whiting konnten bei der Sektion eine Schwellung der Epiglottis und der aryepiglottischen Falten und der diesen benachbarten Teile feststellen, so daß dieser Befund als ein

regelmäßiges Vorkommen bei diesen Fällen von sog. Larynxödem anzusehen ist, während von hier aus und namentlich nach unten und oben die Schwellung meist abzunehmen pflegt. Auch Morris konnte in seinem Fall eine anatomische Untersuchung des Kehlkopfes mit wesentlich gleichem Ergebnis vornehmen.

Selbstverständlich machen diese Ödeme von vornherein sehr starke subjektive Beschwerden. Neben einem leichten Kriebeln treten Schluckbeschwerden und Atemnot in die Erscheinung; wir werden bei vorwiegenden Schluckbeschwerden ohne erhebliche Dyspnoe an einen höheren, bei umgekehrtem Verhalten an einen tieferen Sitz der Ödeme denken müssen. Die Beschwerden steigern sich gewöhnlich sehr rasch zu recht beträchtlicher Höhe entsprechend der raschen Zunahme des Ödems. Die Atemnot wird ganz außerordentlich hochgradig und in einer ganzen Reihe von Fällen hat, wie namentlich die Erfahrung der letzten Jahre lehrt, schließlich dieses Ödem zum Exitus geführt. In einer weiteren Reihe von Fällen konnte nur die Tracheotomie, die auch wiederholt bei demselben Patienten mehrfach ausgeführt werden mußte, diesen unglücklichen Ausgang hintanhalten. Der Exitus erfolgt in diesen Fällen bisweilen mit furchtbarer Schnelligkeit. Dafür mag als Beispiel folgende Beobachtung von Calvé gelten. Ein 23-jähriger Mann, dessen Vater durch Selbstmord getötet hat, dessen Mutter wiederholt geisteskrank gewesen ist, bekommt am 28. Oktober 1898 einen Stoß von einem Pferde gegen die rechte Orbita. Es entstand nur eine leichte Beschädigung, einige Stunden später tritt ein Ödem des rechten Oberlides und der Wange, dann dasselbe links auf. Am nächsten Morgen Ödem des Halses und des oberen Teiles des Thorax, mittags plötzliche Atmungsbehinderung, abends 6 Uhr — 10 Stunden nach Beginn des Anfalls — wird eine Tracheotomie nötig. Ein zweiter Anfall tritt fast ein Jahr später ein. In den nächsten Monaten wiederholte Anfälle, bestehend in Ödem beider Füße, das nach zwei Tagen verschwindet. Am 7. Mai 1900 ein neuer Anfall. Ödem der Oberlippe, der oberen Augenlider, des rechten Unterarmes und heftige Kopfschmerzen. Dauer 2 Tage. Ein letzter Anfall am 21. Januar 1901; es entwickelt sich um 6 Uhr morgens eine Schwellung der Zunge und der Wangen, gegen Mittag stürzt der Patient dann plötzlich auf's Fenster, ist schwer cyanotisch, neigt sich nach hinten über, fällt um und ist nach 2 Minuten tot.

Ein zweiter, ebenfalls ungünstig verlaufender Fall ist der folgende: Ein 30-jähriger Mann, den Bazzet beobachtete, hat im Alter von 6 Jahren Scharlach, seitdem hat er alle 14 Tage Anfälle von heftigen abdominalen Schmerzen, die 24 Stunden dauern; dann gesellen sich dann Schwellungen verschiedener Teile des Körpers, der Hände, der Waden, des Scrotum, Kältereize und leichte Traumen waren besonders instande, solche Schwellungen hervorzurufen. Am 21. Februar 1906 wird eine

Zahnextraktion vorgenommen, am 22. hatte Patient eine leichte Schwellung der Außenseite des Gesichts, diese nahm zu, es trat eine Schwellung der Augenlider derselben Seite ein. Abends dehnte sich die Schwellung auf die Brust und den Nacken aus, in der Nacht erwacht er plötzlich mit schwerer Erstickungsangst und ist nach wenigen Minuten eine Leiche. Bei so rapidem Verlauf kommt die Tracheotomie natürlich zu spät. Sie wurde zum Beispiel in einem Fall von Sträubler noch ausgeführt, konnte aber das Leben des Patienten nicht mehr retten. In anderen Fällen wurde die Tracheotomie zum lebensrettenden Eingriff. Es gibt eine Reihe von Beobachtungen, in denen sie bei demselben Patienten mehrfach vorgenommen werden mußte, so z. B. in den Fällen von Courtade, Morris, Bircher; ein Patient von Apert und Derville mußte dauernd eine Kanüle tragen. Es gibt Familien, in denen mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit eine ganze Anzahl von Mitgliedern an diesem akuten Larynxödem zugrunde gegangen sind. Das ist von Esner, Fritz, Whiting und Mendel beschrieben worden. Auch Griffith, Prior und Sträubler haben Beispiele solcher familiärer, zum Tode führender Larynxödeme beigebracht. Auf diese prognostischen Fragen gehe ich erst später noch genauer ein. Über diesen unglücklichen Fällen darf aber nicht vergessen werden, daß die Ödeme glücklicherweise meist doch von kürzerer Dauer sind, so daß, obwohl bedrohliche Symptome eintreten, eine ernste Gefahr sich nicht herausbildet. Eine sehr hochgradige Schwellung kann im Laufe einer halben Stunde auftreten und spurlos wieder verschwinden. Aber man wird nach den jetzt gesammelten Erfahrungen freilich gut tun, in einem solchen Falle immer aufs äußerste auf der Hut zu sein und zum mindesten alles vorzubereiten, um eine Operation, sei es eine Tracheotomie, sei es auch nur Skarifikationen vorzunehmen.

Die Conjunctiva des Auges kann betroffen werden, was Ashton, Cuntz, Colleville, Rapin, Bouclé (enorme Chemosis) Sabrazès et Muratet sahen. Widowitz beschreibt kurz einen Fall, wo vollkommene Heiserkeit, Schlingbeschwerden, dumpfes Gefühl im linken Ohr, vermehrte Tränensekretion und Schwellungen der Lider am linken Auge, schließlich vermehrte Speichelsekretion anfallsweise im Verlauf weniger Minuten sich einstellten. Riehl gibt an, daß auch eine Schwellung der Urethra vorkommen kann, ich kenne die Beobachtung, auf die er sich bei dieser Behauptung stützt, nicht.

Mehrfach ist auch eine Schwellung der Nasenschleimhaut beobachtet worden. Riehl berichtet einen solchen Fall, ebenso Halstedt, der bei rhinoskopischer Untersuchung eine blaß ödematöse Infiltration der Muscheln feststellen konnte (s. o.). Daß auch zahlreiche Fälle von sogenanntem vasomotorischen Schnupfen hieher gehören, ist mir nicht zweifelhaft. Herzog hat diesen nervösen Schnupfen ausführlicher beschrieben. Eine Beobachtung Schürsingers bewies zuerst, daß

er nichts weiter als eine Teilerscheinung des akuten Ödems sein kann. In einem Fall von familiärem Ödem trat bei einem 20-jährigen Mädchen wochenlang zu einer bestimmten Tagesstunde akutes Ödem der Hände auf, das etwa eine Stunde dauerte. Bisweilen blieb das Ödem an den Händen aus, und es stellte sich dann zu gleicher Stunde unter heftigem Niesreiz und profuser Sekretion ein Schnupfen ein, mit starker Verstopfung der Nase und plötzlichem Verschwinden, späterhin traten Schwellungen der Haut und nervöser Schnupfen gleichzeitig auf. Eine eigene Beobachtung von nervösem Schnupfen regte mir, wenn auch keine Ödeme, so doch andere verwandte Erscheinungen. Das ganze Gefäßnervensystem ist hier in einem sehr labilen Zustand. Die vasomotorische Erregbarkeit der Haut ist erhöht, das Blut dringt leicht zum Kopfe, und es stellt sich leicht Herzklopfen ein. Außerdem bestanden bei der 35-jährigen Kranken seit langem typische Migräneanfälle. Ich habe später zahlreiche andere ähnliche Fälle beobachtet, und auch in der Literatur sind eine Anzahl derartiger Beobachtungen niedergelegt. Ich erwähne die von Sykes, Schwidap, fernere Beispiele finden sich in dem reichen Material von Rapin und auch von Solis Cohen.

Daß auch die tieferen Luftwege befallen werden können, ist nicht mehr zweifelhaft. Schon in den hierher gehörigen Fällen von akutem Larynxödem ist die Trachea gelegentlich mitbeteiligt gewesen. Schlesinger wies dann auf die Möglichkeit hin, daß manche Formen von Asthma nervosum hierher zu rechnen sind. Man müsse zu dieser Annahme dann gelangen, wenn andere Lokalisationen das Bestehen eines Quinckeschen Ödems sichern. Nach seiner Ansicht solle das aber nicht sehr häufig sein. Wright berichtet einen solchen Fall. Später sind dann weitere von Rapin und von Solis Cohen mitgeteilt worden. Namentlich der letztere geht in der Zurechnung derartiger Fälle zur Quinckeschen Krankheit sehr weit. Er bezeichnet geradezu das Asthma als die bestbekannte Angioneurose des Respirationstrakts und unterscheidet drei Typen: einen spastischen, einen paralytischen und einen gemischten. Wenn man auch nicht soweit gehen wird, so kann doch nicht bestritten werden, daß hier hiezuweilen recht enge Beziehungen vorliegen. So beschreibt Packard drei Fälle, bei denen asthmatische Anfälle mit Urticaria der Haut abwechseln. Er stellt noch 34 andere Fälle dieser Art aus der Literatur zusammen, bei denen es sich zum Teil nicht um Urticaria, sondern um ganz echtes angioneurotisches Ödem handelt. Halstedt sah einen Fall von Asthma, in dem dieses seit 30 Jahren bestand, und bei dem plötzlich einmal ein angioneurotisches Ödem der Augenlider eintrat. Auch Zilochi beobachtete angioneurotisches Ödem und Asthma bei demselben Patienten. Niemals traten hier die beiden Erscheinungen zu gleicher Zeit auf.

Der folgende Fall von Stähelin gehört hierher:

Stuhl. Von jeher nervös, schlechter Schlaf, nicht verheilt. Im Sommer 1904 nach einer Anstrengung auf einer Reise plötzlich in der Nacht Atemnot. Der Anfall dauerte sechs Stunden. Später nach mehr als einem Jahre neue Anfälle fast jede Nacht, mehrere Monate lang. Allmählich bemerkt Pat., daß die Anfälle immer nach Genuß bekannter Speisen kamen. Beerenfrüchte, Hülsenfrüchte, Hummer, Schokolade lösten Anfälle regelmäßig aus. Trotz Vermeidung dieser Schädlichkeiten begannen die Anfälle nach längerer Pause von neuem. Pat. fand, daß sie jetzt immer dann auftraten, wenn der Stuhl träge war. Auf eine entsprechende Therapie hin blieben die Anfälle dann wieder weg; schließlich kam aber doch wieder ein neuer Anfall.

Stähelin macht auf die Ähnlichkeit in der Ätiologie dieser Anfälle mit der der Urticaria aufmerksam. Er glaubt, daß es nahe liegt, auch für diese Asthmaattacken eine Vasomotorenstörung als Ursache anzunehmen und sie durch eine vasomotorisch bedingte Schwellung der Schleimhaut der kleinen Bronchien zu erklären.

Für die näheren Beziehungen mancher Fälle von Asthma und dem Quinckeschen Ödem beziehungsweise der Urticaria sind noch Beobachtungen von Bedeutung, auf die ich schon früher aufmerksam gemacht habe, wie die von Comby: zwei Brüder einer Familie, in der Angioneurosen häufig waren, litten an akutem Lidrandödem; einer hatte asthmatische Anfälle. Sehr nahe Beziehungen bestehen auch ohne Zweifel zu dem sogenannten Henschnapfen, wofür wiederum Rabin eine ganze Reihe von recht instruktiven Beispielen bringt. Gelegentliche Anfälle von Anschwellungen der Schleimhaut der Bronchien werden noch von anderen Autoren mitgeteilt, so z. B. von Delbeel, von Stern, von Solis Cohen. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß Widewitz gelegentlich einmal eine plötzlich eingetretene vollkommene Heiserkeit konstatieren konnte, Schlesinger einmal Pseudocrup sah.

Jamieson rechnete als erster einen Fall von Lungenödem hierher. Es handelte sich da um ein bei einer sonst ganz gesunden Person wiederholt sich einstellendes *Odema pulmonum*.

Hermann Müller pulvizierte folgende Krankengeschichte:

Die 25-jährige Patientin litt an einem gut kompensierten Mitralfehler. Vor 8 Jahren wurde bei ihr eine Strumektomie wegen substernaler Struma vorgenommen. Drei Jahre später begannen die Anfälle von Lungenödem, häufig zur Zeit der Menoes, oft auf offener Straße auftretend. Meist von starkem Schweißausbruch begleitet entwickelt sich der Anfall ganz plötzlich und äußert sich alsbald in Atemnot, die sich allmählich bis zur Erstickenngsnot steigert; neben dem Beklemmungsgefühl besteht Herzklopfen; nach einigen Minuten stellt sich Husten ein, der einen mehr oder weniger reichlichen Auswurf zutage fördert, der alle Eigenschaften des Ödems hat, dünnflüssig, fleischwasserähnlich gefärbt und feinschaumig ist. In den schwersten Fällen betrug die Menge bis 200 ccm. Auf der Brust wird dann ein hartes Raseln hörbar, Dauer des Anfalls bis zu $\frac{1}{2}$ Stunde. Während verschiedener Anfälle wurde ein hochgradiges Ödem der linken Gesichtshälfte bemerkt. Eine Be-

ziehung zu dem Herzfehler wurde durch genaue Untersuchung des Herzens, des Urins ausgeschlossen. Bis zur Veröffentlichung seiner Arbeit (1891) zählte Müller 115 Anfälle, wovon 49 in die Zeit der Periode fielen. Über die weitere Entwicklung des interessanten Falles berichtet Diethelm, daß noch eine sehr lange Reihe von Anfällen beobachtet wurde, die meist mit dem Meneses korrespondierten. In den späteren Jahren traten keine Anfälle mehr auf.

Quincke und Gross beschrieben folgenden Fall: Eine 20-jährige Köchin klagte am 28. April 1902 etwas über Halsschmerzen, einige Zeit später stellte sich Atemnot ein, plötzlich entwickelt sich ein sehr schwerer dyspnoischer Anfall von etwa 10 Minuten Dauer. Gegen das Ende des Anfalles trat Husten ein, die Patientin brachte eine schaumig-rötliche Flüssigkeit heraus. Professor Friedrich stellte über der Lunge reichliche feuchte Rasselgeräusche fest. Auch eine halbe Stunde später in der Klinik waren noch einige Rasselgeräusche zu hören. Am Abend war der Lungenbefund normal. Patientin hustete noch etwas mit Blut gleichmäßig untermischten Schaum heraus. Darin fanden sich Blutkörperchen, Plattenepithelzellen und einzelne cylindrische Epithelzellen. Am folgenden Tage Schwellung der linken Hälfte der Oberlippe, die rasch sich ausdehnte und dann wieder verschwand. Patientin hat schon als Kind Schwellungen gehabt. Seit 6 Jahren schon mehrfach Anfälle wie der geschilderte, aber niemals so schwer. Es handelte sich hier also um ein Larynxödem mit Beteiligung der tieferen Luftwege bis in die feinsten Bronchien hinein. Einen ähnlichen Fall beschreibt Rooney. Hier trat im Anschluß an eine Schwellung der Gesichtshaut Heiserkeit, Atemnot und Husten ein. Dabei wurde eine seröse Flüssigkeit abgesondert und das Sputum enthielt zahlreiche Epithelen. Über der Lunge waren Rasselgeräusche zu hören. Der Anfall ging in wenigen Stunden vorbei. Patientin hatte zwei Jahre früher einen ähnlichen Anfall gehabt.

Ob der von Groß, Fuchs, Adler beschriebene *razidivierendes Exophthalmus* hierhergehört, ist zweifelhaft. Näheres darüber siehe später.

Dagegen sind sicher gewisse intermittierend auftretende Magen-Darmerkrankungen hierher zu rechnen, wenn auch über ihre Genese, insbesondere ob sie wirklich ganz oder zum Teil durch Ödeme der Magen- resp. Darmschleimhaut bedingt sind, die Akten noch nicht geschlossen sind. Ihr Zusammenhang mit dem frühigen Ödem wurde schon früh erkannt; die Erfahrungen der sog. *Urticaria interna* hatten von vornherein auf einen solchen Zusammenhang hingewiesen. Quincke-Dinkelacker sahen und deuteten derartige Störungen bereits richtig; unter den späteren Autoren haben sich besonders eingehend Ströbing und Rapin mit ihnen beschäftigt. Weitere Beobachtungen rühren her von Collins, Du Bois-Havenith, Fitz-

gerald, Keller, Morton, Joseph, Ricehon, Smith, Ramsey-Smith, Schlesinger, Courtois-Suffit, Elliot, Osler, Varian, Farkberg, Wills and Cooper, Wright, Bazett, Bircher, Calvé, Courtade, Diethelm, Halsted, Harrington, Morichau-Beauchant, Morris, Quincke-Gross, Whiting, Beck, Solis Cohen.

Collins berechnet, daß in 34% der Fälle von akutem flüchtigem Ödem Magen-Darmerkrankungen aufgetreten sind. In den leichteren Fällen finden sich nur mehr oder minder intensive Schmerzen in der Magenregion, verbunden mit einem Spannungsgefühl; dabei besteht komplette Appetitlosigkeit. Der Schmerz kann eine ganz außerordentlich hohe Intensität erreichen; in Diethelms Falle gingen heftige viscerale Neuralgien dem Erscheinen anderer Symptome jahrelang voraus. Rapin spricht von einer Migraine abdominale. Der Schmerz wird durch Nahrungsaufnahme oft noch gesteigert. Bei weiterer Entwicklung kommt es zu Brechreizigung, schließlich zu wirklichem Erbrechen. Anfangs wird Mageninhalt erbrochen, später werden reichliche, wässrige Mengen herausgedrückt. Die Symptome in schwerster Ausbildung zeigt der erste von Ströbing mitgeteilte Fall, der in jeder Beziehung das Muster eines schweren Falls der Quinckeschen Krankheit ist.

Bei dem Kranken, der ausgedehnte Hautschwellungen und schwere Larynxerscheinungen aufwies, machten sich die Anfälle zunächst durch leichte, allmählich intensiver werdende Schmerzen im Abdomen bemerkbar. Dann stellt sich das Erbrechen ein; bald erbricht der Kranke nur vier- bis fünfmal und der Anfall ist in drei bis vier Stunden beendet, bald zieht er sich über 24 Stunden hin, und 20–30 mal kommt das Erbrechen wieder, erst wird der Speichelfluss entleert, dann folgen gallig gefärbte, wässrige Massen. Die Schmerzen können sich zu unerträglicher Höhe steigern; meist begleitet die schwereren Anfälle eine gewisse Benommenheit. Der Durst ist sehr stark. Während des Anfalls Einziehung des Abdomens. Allmählicher Nachlaß aller Erscheinungen, schließlich schläft der Patient ein.

In diesen schweren Fällen haben wir ganz das typische Bild der gastrischen Krisen bei der Tabes dorsalis vor uns.

Häufiger stehen die Magensymptome ganz im Vordergrund, während die übrigen Erscheinungen des flüchtigen Ödems keine wesentliche Rolle spielen. Diese Fälle nähern sich dem von Leyden als periodisches Erbrechen beschriebenen Krankheitszustand noch mehr und bilden den Übergang zu diesem Syndrom. Der folgende Fall von Keller stellt einen solchen Typus dar.

Es handelt sich um eine 42jährige Frau, deren Großmutter seit dem 26. Lebensjahr an Erbrechen und Diarrhoe litt und im Klirrkammer starb. Von fünf Kindern hatte vier die gleichen Anfälle. Die Mutter der Pat. hat zu sehr heftigen Anfällen (1896), die alle 2–3 Wochen gelegentlich auch im Abstand von 20–12 Wochen auf-

traten, sie starb mit 66 Jahren an einer sonstigen Gangrän. Von den drei Schwestern der Pat. bildet nur eine zur Zeit des Meneses an Kopfschmerzen, ein Vetter leidet an ähnlichen Anfällen wie die Pat. selbst. Sie hat schon als Kind oft in der Nacht Anfälle von Atembeklemmung gehabt. Im 10. Jahr traten periodische Attacken von Erbrechen und Durchfällen ein. Seit 2 Jahren bietet sie die Symptomatik der Tuberkulose der Lungen. Während des 10.—15. Lebensjahres traten regelmäßig alle 10—12 Tage Anfälle auf, jedes im Abstand von 1—3, selten 4 Wochen, einmal war auch ein Zwischenraum von 8 Wochen. Die Vorboten bestanden in Aufgereiztheit, Unruhe, Ideenwandel, Appetitlosigkeit, Neigung zu Diarrhoe. Zuweilen traten eigentümliche Schwellungen auf, die schon nicht vor dem 24. Lebensjahr abgeklungen sind, und zwar schwellt am Tage vor dem Anfall, seltener 2—3 Tage vorher, seltener 3 Tage vorher das rechte Arm an, es kommt auch gelegentlich zu Anschwellungen in beiden Armen oder zur Schwellung irgendeines anderen Teiles; auch von Muskeln, von Sehnen, vom Pericard ausgehend kommen solche Schwellungen vor, die 1—3 Tage anhalten. Sehr selten sind Schwellungen ohne nachfolgende Anfälle. Der Anfall selbst besteht in starker Chloekie, zusammenstehenden Schmerzen vom Nabel bis zum Brustbein, so daß Pat. nur gebückt gehen und stehen kann, Erbrechen, Durchfällen, dabei Unruhe, kalter zum Teil oder vollständiger Schweiß. Die Höhe des Anfalls wird in 1—2 Stunden erreicht. Diese Anfälle dauern 3—5, selten 10—14 Stunden, die Temperatur ist normal. Nach dem Anfall besteht eine große Müdigkeit.

Hier stehen also die Magen-Darmschwerden ganz im Vordergrund. Von da aus geht es Übergänge aller möglichen Art bis zu den Fällen, in denen die Magenbeschwerden nur ganz episodisch die Ödeme begleiten.

Es gibt auch Fälle — am häufigsten wohl unter den familiären, die überhaupt für die schwereren Erscheinungen das Hauptkontingent stellen — in denen schwere Symptome von seiten des Magens sich zu solchen von seiten der Atmungsorgane gesellen. Ich führe als Beispiel eine Beobachtung von Morris an.

21jähr. Mann (zur Zeit der ersten Untersuchung 1901). Mutter leidet an Schwellungen der Hände und Magenstörungen, Schwester an Schwellungen im Gesicht. Im Alter von 12 Jahren merkt Schwellungen der Hände, von 48stündiger Dauer. Später Schwellungen in Füßen, Knien, Ellbogen, Scrotum, Penis. Vor 4 Jahren Ödema glottidis, das eine Tracheotomie nötig machte. Im April 1901 erneutes Larynxödem, das eine zweite Tracheotomie erforderte. Zuweilen treten zusammen mit den Ödemen Schmerzen im Epigastrium, Übelkeit, Erbrechen auf. Bei Ausgelen des Magens gelegentlich einen Bruchanfalls wurde durch die Magensonde ein Stückchen Schleimhaut herausgeholt. Die Resultate der pathologischen Untersuchung dieses Tumors werden unten mitgeteilt. Im weiteren Verlauf wiederholten sich noch mehrfach die Larynxödeme. Einen derselben erlag der Pat. am 5. Januar 1905. Die Autopsie ergab Mund und Pharynx mit Blut gefüllt. Im Larynx extremer Grad von Ödem, daß die Epiglottis, die aryepiglottischen Falten, die wahren und falschen Stimmlippen in sein Bewußt zog. Unter den Stimmbländern bestand kein Ödem.

Eine Untersuchung des nach Entleerung des Speisebreis Erbrochenen in einem Fall von Strübing ergab, daß es aus Schleim und einigen mikroskopisch nachweisbaren Epithellen der Magenschleimhaut bestand. Spezifisches Gewicht der filtrierten, farblosen, opalisierenden Flüssigkeit 1006, Reaktion sauer. In 1000 Teilen finden sich 0,81 g Salzsäure und 3,39 g Asche. Kein Serumweiß. Quincke

und Gross fanden dagegen einen erheblichen Eiweißgehalt in der erbrochenen Flüssigkeit, die stark alkalisch reagierte. Beck konnte im Erbrochenen eines Kranken niemals freie Salzsäure nachweisen, während nach jeder Probemahlzeit eine sehr hohe Gesamtazidität aber fast gar keine freie Salzsäure nachgewiesen wurde.

In einem Fall von Morris wurde beim Ausspülen durch die Magensonde, wie oben erwähnt wurde, gelegentlich ein Stückchen Schleimhaut herausbefördert, die nach der Untersuchung wahrscheinlich von Pylorusteil stammte. Es fand sich ein sehr hochgradiges Ödem, die Lymphräume sind enorm erweitert, die Zellen durch weite Räume getrennt, die Bindegewebsfasern auseinandergedrängt; in den Epithelzellen fanden sich Vakuolen; die Flüssigkeit enthält etwas Eiweiß und an Zahl vermehrte Rundzellen. Morris spricht von einem *extreme edema of gastric mucosa non inflammatory in origin*.

Mit den Magenbeschwerden zusammen, seltener ohne diese treten auch Darmerscheinungen auf: heftige kolikartige Schmerzen, Meteorismus, Empfindlichkeit des Abdomens und profuse Diarrhöen, die von den gewöhnlichen Zeichen solcher Zufälle, heftigem, brennendem Durst, Verminderung der Harnmenge, großer Erschöpfung begleitet sein können (Wallis, Fitzgerald, Rabin, Riccochon, Schlesinger, Ströbing, Whiting, Halstedt, Solis Cohen). Dinkelacker schildert folgende Kombination: Kolikanfälle, bestehend in heftigen Leibschmerzen, besonders links unterhalb des Nabels, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durst, Verstopfung; nach dem Anfall Durchfälle.

Die Durchfälle dokumentieren sich als nervöse durch ihre Unabhängigkeit von der Nahrungsaufnahme, ihr plötzliches Auftreten und Gesseren, als Symptome der Quinckeschen Krankheit durch ihren Zusammenhang mit anderen Erscheinungen dieser Affektion, besonders mit den Hautschwellungen, mit denen sie sich kombinieren oder an deren Stelle sie wohl auch einmal treten können (Millard). Dort, wo sie ohne solche Beziehungen zur Beobachtung kommen, werden sie unserer Krankheit nicht ohne weiteres zuzurechnen sein. Es ist ja bekannt, daß derartige nervöse Diarrhöen bei zahlreichen Neurosen insbesondere der Neurasthenie und dem Morb. Basedowi vorkommen können. Mehrfach wird von intestinalen Hämorrhagien, die bei derartigen Anfällen sich einstellen, berichtet, so von Halstedt und Morris. Solis Cohen erwähnt einen Fall, in dem durch Jahre hindurch anfallsweise sanguinolente Diarrhöen auftreten; er spricht ferner auch von der Enteritis membranacea, deren Beziehungen zu funktionellen Störungen der Darmtätigkeit auch sonst bekannt sind. Whiting erwähnte folgende interessante Beobachtung Harringtons. In einem Fall von angioneurotischem Ödem wurde gelegentlich eines schweren Kolikanfalls eine Eröffnung des Abdomens vorgenommen. Es fand sich dabei eine (durch Kontraktion bedingte) Verdickung des unteren Ab-

schnitts der Wand des Ileum um $2\frac{1}{2}$ Zoll. (a thickening of the whole circumference of the lower wall for $2\frac{1}{2}$ inches was found in the ileum increasing its diameter twofold). Das erinnert an die spastischen Zustände, die, auf dem Boden der allgemeinen Nervosität oder Hysterie entstehend, zum sog. Ileus nervosus oder spasticus führen und gelegentlich schon zu Operationen Veranlassung gaben (Jahowatz, Israel und Korte, Follet). Das Vorkommen eines solchen Symptombildes kann nicht geleugnet werden, so exakte Beobachter wie Lenhe, Bregman haben es beschrieben. Wir haben also keine Berechtigung an dem gelegentlichen Auftreten solcher enterospastischer Zustände als Symptomen der Quinckschen Krankheit zu zweifeln und dürfen in ihnen eine wertvolle Grundlage für die Erklärung der beschriebenen Kolikanfälle sehen.

Eine ganz singuläre Erscheinung ist ein von Schlesinger als *Hydrops hypostrophos tendovaginarum* bezeichnete und als intermittierende Anschwellung der Sehnencheiden aufzufassende Affektion. Schlesinger sah bei einer nervösen 29-jährigen Frau flache, fluktuierende, nicht schmerzhaft Anschwellungen am Dorsum beider Hände, entsprechend den Sehnencheiden. Die Haut darüber war nicht ödematös. Die Anschwellung der Sehnencheiden wird öfter durch schmerzhaft Beugekontraktionen der Finger eingeleitet. Kein Reiben in den Sehnencheiden. Die Anfälle begannen unter heftigen Parästhesien zumeist am Mittag und schwanden des Nachts völlig. Zur Zeit der Menes Verschlimmerung, während der Gravidität cessieren die Anfälle. Einige Male traten an ihrer Stelle blasse, wenig schmerzhaft, umfangreiche Schwellungen an der Stirnhaut und der Haut der Schläfe auf, einmal angeblich auch eine Anschwellung der Kniegelenksgegend.

Ich möchte aus dieser Beobachtung ein Symptom herausgreifen, das noch ich einmal in einem meiner Fälle sah: nämlich eine intermittierende, etwas schmerzhaft Beugekontraktur an den von einem periartikulären Ödem befallenen Fingern ohne Beteiligung der Sehnencheiden; eine zureichende Erklärung vermag ich nicht zu geben.

Ich habe später derartige Erscheinungen bei Kranken mit flüchtigem Ödem noch einige Male gesehen. In einzelnen dieser Fälle habe ich dann einwandfrei feststellen können, daß es sich sicher zum Teil um in den Muskeln sitzenden Anschwellungen handelt, die offenbar durch ein Ödem der Muskeln herangerufen werden. Zuerst beobachtete ich dies in einem später noch genauer mitzuteilenden Fall, der einen Zwischentypus zwischen Raynaudscher Krankheit und flüchtigem Ödem darstellt. Ich konnte feststellen, daß eines Tages das rechte Ellbogengelenk nicht mehr über 140° hinaus gestreckt werden konnte, es bestanden heftige Schmerzen, das Gelenk selbst war frei, aber der Muscul.

litreps war deutlich teigig infiltriert, verbleicht, geschwollen; gleichzeitig damit trat am rechten Zeigefinger eine Schwellung auf, die offenbar im ersten Interphalangealgelenk saß, es stülpten sich zu beiden Seiten des Gelenks zwei kleine Hervorwölbungen heraus. Am nächsten Tage war alles verschwunden.

In einem zweiten ebenfalls sehr komplizierten Falle, den ich schon erwähnt habe und auf den ich noch zurückkomme, waren derartige flüchtige Ödeme der Muskeln sehr häufig. Auch hier handelte es sich meist um die Beugemuskeln des Oberarms. Hier dauerten die Schwellungen und die dadurch bedingte Steifigkeit bisweilen einige Tage. Ich finde z. B. folgende Notizen. 23. Oktober 1904 Muskeln an der Beugeseite des rechten Oberarmes geschwollen, mäßige Schmerzen, abends Frostschauer, Temperatur 37,3. 24. Oktober Gefühl von Fieber, Temperatur abends 37,6; Schwellung der Muskeln beider Oberarme. 25. Oktober Schmerzen im linken Knie, das stark angeschwollen ist, Temperatur 38,1. Schwellung des linken Oberarmes geschwunden. 27. Oktober, der rechte Oberarm noch immer etwas steif. 29. Oktober rechter Arm auch normal. Wohlbefinden. Derartige Zustände kamen bei der Patientin im Laufe der Jahre immer wieder zur Beobachtung. Wie hier so waren auch sonst meist neben flüchtigen Muskel- auch flüchtige Gelenkschwellungen vorhanden; bemerkenswert ist auch, daß es sich in keinem meiner Fälle um einen ganz reinen Typus handelt, sondern daß immer Bewegungen akroparästhetischer und Raynaud'scher Symptome vorhanden waren, wie in der folgenden Beobachtung.

K., stud. jün., 21. Jahr, Untersuchung am 23. Januar 1905. Hat seit über 4 Jahren wegen heftigen Kriebels in den Fingern; nach dem Wachen werden die Finger ganz weiß. Allmählich stärkeres Hervortreten dieser Beschwerden. 1½ Jahre später dieselben Erscheinungen an den Füßen. Die Zehen der Füße wurden auch weiß. Damals auch zum ersten Male plötzlich Anschwellung über dem Handgelenk, nicht schmerzhaft, nicht rot, nicht heiß; er konnte dabei die Hand im Handgelenk nicht gut bewegen. Im Winter 1904/05 kommt es zu den Fingern auch zu Anfällen von Asphyxie locale, niemals dagegen zu irgendwelchen Nekrosen. Die Anschwellungen über den Handgelenken wiederholten sich häufiger. Allmählich werden auch die Zehen von Anfällen von Asphyxie locale befallen. Mehrfach traten dann im Laufe des letzten Jahres Störungen in der Beweglichkeit der Arme auf, indem als er die Arme im Ellbogengelenk nicht vollkommen strecken, nur beugen konnte; ein heftiger Schmerz begleitete diese Bewegungen nicht. Auch während der Beobachtung durch mich waren die geschilderten Erscheinungen zu konstatieren. Asphyxie und Syndaktylie locale an Fingern und Füßen. Flüchtige Schwellungen hauptsächlich über verschiedenen Gelenken, und Anschwellungen der Beugemuskulatur der Oberarme, durch die vollkommene Bewegung und meistens Streckung verhindert wurden.

Diese Beobachtungen lehren uns, daß es auch ein flüchtiges Ödem der Muskeln gibt, das sich anscheinend oft mit ähnlichen Ödemen an und in den Sehenscheiden und an und in den Gelenken kombiniert.

Die letztgenannte Lokalisation bedarf noch einer besonderen

Besprechung; sie ist vielfach unter der Sonderbezeichnung Hydrops articular. intermittens beschrieben worden. Schlesinger hat sie zuerst dem Hydrops hypostrophicus zugerechnet.

Da auch von anderen Autoren schon betonte nahe Verwandtschaft beider Krankheitsarten kann keinem Zweifel unterliegen: es kommen im Verlauf ganz typischer Fälle von flüchtigem Ödem vereinzelte akute Gelenkschwellungen vor, das hat Dinkelsacker schon beschrieben. Ich selbst habe einen gleichen Fall gesehen.

In neuerer Zeit hat Schlesinger, wie oben schon erwähnt, mit erneutem Nachdruck auf die Zugehörigkeit des Hydrops articular. intermittens zu den flüchtigen Ödemen hingewiesen und in einer Publikation in den „Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie“ im Jahre 1900 eine ausführliche Schilderung des Symptomenkomplexes unter Anführung sämtlicher in der Literatur niedergelegter und unter Einfügung zweier eigener Fälle gegeben. Ich beschränke mich auf die Wiedergabe seiner hauptsächlichsten Angaben.

Er unterscheidet einen symptomatischen und einen idiopathischen Hydrops articular. intermittens. Bei dem ersteren handelt es sich um transitorische Ergüsse in die Gelenke, die nur Vorläufer einer dauernd sich dort etablierenden Gelenkveränderung sind, oder sonstwie in gewissen örtlichen Veränderungen in der Nähe der Gelenke ihren Grund haben. Vom idiopathischen Hydrops articular. intermitt. waren bis dahin 41 Fälle beschrieben. Er betrifft meist nervöse Individuen, Männer fast gerade so häufig wie Frauen, ist im jugendlichen Alter häufiger. Oft anscheinend ohne veranlassendes Moment tritt eine Schwellung eines oder mehrerer Gelenke auf, die nach mehrtägigem Bestand verschwindet und nach längerer oder kürzerer Zeit wiederkommt. Die Gelenkschwellungen sind häufig, aber nicht immer von Schmerzen begleitet, die Haut über den Gelenken ist meist nicht gerötet, Fieber besteht nicht. In der Zeit zwischen den Anfällen sind die Gelenke normal. Die Anfälle kehren oft in regelmäßigem Typus wieder, der aber häufig wechselt, bisweilen ist auch gar keine Regelmäßigkeit erkennbar. Bemerkenswert ist, daß in nicht weniger als in 94% der Fälle ein oder beide Kniegelenke betroffen werden, nur zweimal war das Kniegelenk gar nicht befallen, siebenmal neben anderen Gelenken auch das Kniegelenk, im Rest der Fälle nur eins oder beide Kniegelenke. Daß meist nervöse Leute befallen werden, wurde schon erwähnt. Pletzer und Homén sahen die Affektion bei Morb. Basedowii, Féré bei Epilepsie und bei progressiver Paralyse, Chauvet bei Ichas, Senator kurz nach Einsetzen einer Quintuslähmung; öfter wurde sie bei Hysterie beobachtet. Zuweilen sind nicht nur die Gelenke, sondern auch die Weichteile um diese herum befallen (Homén, Rosenbach); in Kösters Fall trat unter Rötung und Hitze plötzlich eine Spannung einer Gesichtshälfte auf, in Senators Fall fand sich regelmäßig eine Schwellung

in der Gesäßgegend. Ferner haben auch Férèl, Baucke und Oppenheim flüchtige Ödeme bei der intermittierenden Gelenkschwellung gesehen. Homén sah beides gleichzeitig in einem Fall von Melus Basedowii. Ebenso wie diese Beobachtungen sprechen zugunsten einer einheitlichen Affektion die Gleichheit der wichtigeren ätiologischen Momente (auch ein familiäres Vorkommen wurde von Blau einmal bei Hydrops articul. intermittens konstatiert). Ferner sind im selben Sinn die Art des Verlaufs und zahlreiche übereinstimmende Begleiterscheinungen wie nervöse Tachykardie, Synkopenfälle, Polyurie und Pollakiurie verwertbar. Nach allem erscheint auch nur der Schluß, der aus diesen Erfahrungen gezogen wird, gerechtfertigt, daß der Hydrops articul. intermittens nur als ein besonderer Typus des Hydrops hypostrophos aufzufassen ist, der durch die eigenartige Lokalisation als selbständige Krankheit imponiert, während er sonst in den meisten wesentlichen Zügen mit dem Haupttypus übereinstimmt. Man wird das Verhältnis der beiden Symptomenkomplexe zueinander etwa ebenso auffassen müssen, wie das der Hemiatrophia faciei progressiva zur Sklerodermie. Die ausführliche Arbeit Schlesingers entlehnt auch eine weiteren Eingehens auf diese Unterart der flüchtigen Ödeme. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit kann ich von einer weiteren Besprechung der Fälle dann um so eher absehen, wenn dem Hydrops articul. intermittens keine eigentliche Selbständigkeit zuzuerkennen ist und diese Anschauung ist durch die nach der Schlesingerschen Publikation erschienenen Arbeiten nur bestätigt worden. T. Kamp beschrieb einen Fall von wechselweise in beiden Knien auftretendem Hydrops, der seit Jahren früher alle neun jetzt alle vier Tage sich bildete; jede Therapie war machtlos. Mendel berichtet von einer Frau, die an einem stets zur Zeit der Menses wiederkehrenden Hydrops beider Kniegelenke litt, was auch Benda schon beobachtet hatte. Bei einem Patienten Oppenheims bildete ein periodisch in regelmäßigen Intervallen auftretender Oberschenkel Schmerz anscheinend ein Äquivalent des früheren Hydrops. Bemerkenswert ist ein von Oppenheim zitierter Fall Burckhards, bei dem Gelenkschwellungen und Asthmaanfälle abwechselten; hier stellten sich auch Hautblutungen ein. Johnson beobachtete eine wohl auch hierhergehörige Kranke, die an unfallweise nur im Winter auftretenden, symmetrischen Schwellungen einer Reihe von Gelenken litt; hauptsächlich waren Kinn, Hand- und Fingergelenke betroffen. Ganz episodisch traten Gelenkschwellungen neben den typischen Hautödemen in einem Fall von Morickau-Beauchant und Landry auf. Das habe ich in den Gelenken der Hand und der Finger zweimal selbst beobachten können.

Oppenheim hat zuerst die Vermutung ausgesprochen, daß sich auch eine Opticusaffektion auf dieser Grundlage entwickeln kann.

Er hat zweimal eine Neuritis optica bei Personen entstehen sehen, bei denen eine ausgesprochene Neigung zu vasomotorischen Störungen vorlag und jede andere Grundlage und Ätiologie fehlte. Handwerker hat dann genauer einen Fall beschrieben, bei dem eine kurz dauernde Schwellung der Sehnervenspapille eines Auges neben anderen akuten Ödemen zu beobachten war.

Es handelt sich um eine 23-jährige Frau, die Anfang September 1906 wegen allgemeiner Schwäche, Appetitlosigkeit und Verstopfung in Behandlung trat. Diese Beschwerden besserten sich. Mitte September, als sie sich schon wohler fühlte, wurde Pat. durch das plötzliche Auftreten einer ungeträgten schalenförmigen Schwellung am Hals unter dem Unterkiefer, die nicht juckte, nur spannte, sehr unruhig, diese Schwellung verschwand sehr rasch. Es wiederholten sich aber in der nächsten Zeit ähnliche Schwellungen öfters. Nach ca. 4 Wochen hörten die Anfälle auf. Anfang April des folgenden Jahres traten wieder zwei flüchtige Schwellungen auf, eine am Kinn, die andere an der Unterlippe. Im April 1907 plötzlich Schwellung des ganzen linken Halbes der Zunge. Am Tage danach hatte Pat. merkwürdige Erscheinungen vor den Augen, es kam ihr vor, als ob weiße Blätter vor ihr zu Boden fielen, die Lichtseheinzungen beschränkten sich auf das rechte Auge, am nächsten Tage war das ganze Gesichtsfeld vernebelt, eine ganz leichte Sehnenempfindlichkeit war an der rechten Schläfengegend vorhanden. Eine augenärztliche Untersuchung am 22. April ergab folgendes: Äußerlich ist an dem Auge nichts Besonderes festzustellen. Die Papillen reagieren normal, ophthalmoskopisch läßt sich eine Schwellung der Papille, deren Peripherie ca. 20 Dioptrien beträgt, nachweisen. Die Grube der Papille ist verschwunden. Die Lösung des geschwellten Sehnervenhügels und seiner zentralen Fasern ist mäßig. Die Gefäße sind deutlich zu sehen, die Arterien dünner und die Venen verbreitert und besonders dort, wo sie über den Rand der geschwellten Papille zur Netzhaut herabsteigen, geklingelt. Im übrigen zeigen die Gefäße und der Augenhintergrund keine Abweichung. Die Sehtörungen besserten sich schnell, eine erhebliche Herabsetzung der Sehschärfe, eine stärkere Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bestand überhaupt nicht. Nach 5 Tagen waren die Sehtörungen so gut wie ganz verschwunden und auch die Erscheinungen an der Papille des rechten Auges völlig zurückgegangen. Man konnte nur noch eine leichte Schwellung des Sehnervenhügels an seiner temporalen Seite konstatieren. Bei einer dritten Untersuchung nach 2½ Wochen war alles normal. Kurze Zeit darauf hatte Pat. wieder einmal ein flüchtiges Ödem und zwar am linken Mundwinkel, danach bis Ende Juni 1907 keine weiteres Anfälle.

In diesem Falle wird man nicht zweifeln dürfen, daß es sich in der Tat um ein flüchtiges Ödem der Sehnervenspapille gehandelt hat.

Oppenheim macht weiterhin darauf aufmerksam, daß in einzelnen seiner Fälle von Ménière'schem Syndrom die diesbezüglichen Symptome durchaus in den Rahmen der Neurasthenie hineinpassen und auf einer vasomotorischen Störung dieses Ursprungs zu beruhen scheinen. Er betont, daß er einige Male Gelegenheit hatte derartige Anfälle selbst zu beobachten und dabei auffällige vasomotorische Störungen zu konstatieren. Besonders war es eine purpurne Rote im Gesicht und am Halse, der Kopf wurde dabei in bestimmter Stellung fixiert gehalten, mehrmals konnte er feststellen, daß bei diesen Individuen die neuropathische Belastung sich auch durch die von Hause aus bestehende Hyperästhesie

der Gleichgewichtsorgane kundgegeben hatte. Es erwähnt, daß eine angioneurotische Grundlage der Menièreschen Symptome auch von anderen Autoren angenommen wird. Eine Verbindung von Menièreschen Symptomen und echten angioneurotischen Schwellungen habe ich an meinem Material bisher nicht feststellen können, ebensowenig in der Literatur Fälle dieser Art auffinden können. Nach den im vorhergehenden mitgeteilten Erfahrungen besteht aber kein Zweifel an der Möglichkeit einer auf diesem Boden entstehenden Affektion des Vestibularapparates resp. des Labyrinth. Politzer spricht direkt von angioneurotischer Schwerhörigkeit. Auch manche bei der Hemikranie beobachteten Erscheinungen von Menièreschen Symptomen (heftiges Ohrensausen, Schwindel und Erbrechen) bald mehr selbständig auftretend und dem echten Hemikranieanfall ersitzend, bald im Geleit eines solchen dürfen eine ähnliche Pathogenese haben und weisen daraufhin, daß der für Circulationsanomalien besonders empfindliche Apparat des inneren Ohrs wohl auch durch flüchtige Ödeme geschädigt werden kann.

Oppenheim beobachtete in zwei Fällen bei neuropathischen Individuen eine rezidivierende mit Hemianästhesie der betreffenden Seite einhergehende Iritis, die ihn in der Art des Auftretens sehr an das Bild des Hydrops articul. intermittens erinnerte.

Merichau-Beauchant und Landry beobachteten folgenden Fall: Es handelt sich um einen 29-jährigen Patienten ohne hereditäre oder individuelle Belastung. Das Leiden begann mit gastrointestinalen Störungen, heftigen Magenschmerzen, unaufhaltsamem Erbrechen, Koliken und Diarrhoe. Im Anschluß daran stellten sich ödematöse Schwellungen ein, die in der Haut und im Unterhautbindegewebe saßen. Diese Ödeme, die an allen möglichen Stellen des Körpers auftraten, kamen plötzlich, entwickelten sich mit sehr intensiven Schmerzen, mit Störungen in den Gelenken und Kontrakturen in den Muskeln, bestanden meist einige Tage oder Wochen, aber selbst monatelang und verschwanden stets vollkommen. Die einzelnen Anfälle folgten so nahe aufeinander, daß der Kranke in der nunmehr dreijährigen Beobachtungszeit nie mehr als einige Tage ohne Ödeme blieb. Sie bestehen auch jetzt noch. Es traten außerdem profuse Schweiße auf, im Blut war die Zahl der vielkernigen Leukozyten vermehrt und es bestand eine doppelseitige plastische Iritis. Mehr ist leider über den Befund an den Augen nicht gesagt, aber in diesem Zusammenhang wird man ähnlich wie in den Oppenheimschen Fällen doch daran denken müssen, daß es sich in der Tat hier um eine besondere Lokalisation des angioneurotischen Ödem handelt.

Es gibt bei der Quinelleschen Krankheit dann noch eine ganze Reihe von Symptomen, die zu besonderer Vorsicht in ihrer Beurteilung und Klassifizierung mahnen. Zuerst sind die Anomalien der Harn-

entleerung zu nennen. Sie können offenkundig sekundär bedingt sein; dort wo kopfloses Erbrechen oder massenhafte Durchfälle auftreten, ist, wie auch sonst stets, die Harnmenge verringert. Strübing allerdings meint, daß die Wasserverluste, wie sie durch das Erbrechen bedingt sind, kaum allein zur Erklärung der verringerten Urinausscheidung ausreichen. — Es kommt auch Polyurie vor, und zwar sowohl während, als nach den Anfällen; es wird dann ein reichlicher heller Urin entleert (Dinkelacker, Schlesinger). Diethelm berichtete, daß während der Anfälle eine ausgesprochene Oligurie bestand, während beim Abklingen des Anfalls eine Polyurie einsetzte. Von einigen Autoren wird eine passagere Albuminurie beschrieben. Strübing sah einen leichten Grad davon auf der Höhe schwerer Attacken sich einstellen; Higiers eine Patientin hatte am Abend des Tages, an dem der Anfall dagewesen war, Erweiß im Urin, sonst nie. Ricochon sah in seinen familiären Fällen zuweilen Albuminurie, Wills und Cooper notierten sie in einem mir zweifelhaft erscheinenden Fall, und Oppenheimer macht die Bemerkung, daß in einem Fall die Albuminurie zur Annahme eines Nierenleidens geführt hatte. Valobra stellte starke Iridianusscheidung fest. Ein sehr interessantes Vorkommnis ist das einer paroxysmalen Hämoglobinnurie in einer von Joseph mitgeteilten Beobachtung. Ich möchte mir die Mitteilung des Falles sowie der ähnlichen von Roques und Wende bis dahin aufsparen, wo ich auf die Beziehungen der Quincke'schen Krankheit zu anderen Akrostenosen usw. eingehe.

Cardiale Symptome sind nicht häufig. Schlesinger erwähnt, daß paroxysmale Tachykardie vorkomme, auch Selig Cohen hat einen Fall von flüchtigen Ödemen am Stamm, Gesicht, an der Uvula und am Pharynx, verbunden mit Urticariaquaddeln und paroxysmaler Tachykardie beschrieben.

Müller berichtet, daß in einem Fall, in dem konstant ein lautes systolisches Geräusch an der Herzbasis bestand, im Anfall sich mehrfach eine leichte Erweiterung des Herzens einstellte. Er erzählt bei derselben Beobachtung von einem eigentümlichen Schwanken des Körpergewichts, es stieg in den Anfallswochen nämlich von 65,5 auf 72 kg; um diese Zeit bestand auch stets Oligurie. Parallel der Abnahme der Urinmenge stieg immer das Körpergewicht. Die Zahl der Blutkörperchen nahm mit steigender Schwellung stetig ab.

Derselbe Fall ist von Diethelm genauer beschrieben worden. Er verdient wegen einer ganzen Reihe interessanter, wichtiger und seltener Symptome eine ausführliche Erwähnung.

Es handelt sich um einen zur Zeit der ersten Untersuchung am 27. Juli 1889 32 Jahre alten Mann, der aus neuropathischer Familie stammt (seine Schwester leidet an Epilepsie). Er war stets nervös und litt einige Jahre lang an eigentümlichen zwangartigen Geschmackseingängen. Die ersten Anfänge seiner jetzigen Krankheit

verlagte Pat. in den Herbst 1878, wo er sehr strengt tätig sein mußte und dabei rheumatischen Schädlichkeiten stark ausgesetzt war. Zu gleicher Zeit lag er damals an übermäßig alkoholischen Getränken zu sich zu nehmen. Zwei Jahre später begannen die eigentlichen Beschwerden mit köhlartigen Bauchschmerzen ohne Durchfall und Verstopfung. Gelegentlich kam es dann zum Erbrechen. Allmählich wuchsen die Anfälle immer stärker und erreichten eine fast unertragliche Intensität. Im Jahre 1883 fiel auf, daß der Pat. nur auf der rechten Gesichtshälfte resp. auf der rechten Körperhälfte schwellte. Darnach traten zunächst im Gesicht Schwellungen auf, die sich im Jahre 1885 auch auf die Unterschenkel ausdehnten. Nach 1–2 Tagen kanten die Schwellungen auf. Die erste Untersuchung in der Züricher Poliklinik ergab folgendes: Keinerlei organische Störungen, insbesondere ist die Herztätigkeit außerhalb der Anfälle regelmäßig und die Herzklappen sind reiz und hart. Das einzelne Anfall verläuft nach den Angaben des Pat. folgendermaßen: Zuerst kommt ein Gefühl von Schwäche mit allgemeiner Müdigkeit, dann stellt sich ein leichtes Frosteln, das von Temperatursteigerung begleitet ist, die Pulszahl nimmt entsprechend zu, es treten dann an den Extremitäten namentlich an den Vorderarmen und an den Unterschenkeln kleine, ca. erbsenkorngroße circumscripte Hervorwölbungen auf, die bald in eine diffuse Schwellung der ganzen Glieder übergehen. Gleichzeitig tritt jedesmal auch eine Schwellung an den Wangen und am gesamten Leib auf. Mit Beginn der Schwellung mehrt sich der Durst und die Harnmenge nimmt ab, der Urin selbst wird etwas dunkler. Je mehr Pat. trinkt, desto intensiver wird die Schwellung und desto weniger Harn kann er lassen. Nach etwa 4–5 Tagen erreicht die Geschwulst den Höhepunkt, dann gehen die geschilderten Symptome zurück, Temperatur und Pulszahl sinken, der Durst läßt nach, die Harnmenge steigt zu bedeutender Höhe, Kopfschmerzen oder Kolikanfälle bezeichnen während dieser Anfälle nicht. Die Anzahl der Schwellungsanfälle bis zur ersten Vorstellung in der Poliklinik betrug nach den Angaben des Pat. ca. 60–80. Am 20. Januar 1887 kommt Pat. wieder mit den gleichen Klagen wie im Sommer des vergangenen Jahres. Am 11. sei er noch völlig gesund und munter bei der Arbeit gewesen, in der Nacht auf den 18. jedoch trat wieder wie bei den früheren Attacken sehr starker Durst auf, dabei große Müdigkeit und schlechter Appetit. Die Untersuchung ergibt heute wieder die gleiche Gehörlosheit des ganzen Körpers, sowohl Gesicht, Wangen, als Extremitäten, wie der Rumpf; nirgends Neben Flügelschwellungen stehen. An der Herzbasis links vom Sternum ist ein deutliches systolisches Geräusch, wie schon bei dem ersten Anfall zu hören. Pat. klagt über Herzklopfen, Puls 126, Temperatur 38,5, das Körpergewicht beträgt 75 Kilo. Nach 2 Tagen hat sich Pat. wieder vollkommen verändert. Das Körpergewicht beträgt 70 Kilo, der Puls ist 78, starke Appetitlosigkeit und Müdigkeit noch vorhanden, Urinmenge 350, spezifisches Gewicht 1006, Farbe ganz hellgelb. Kein Eiweiß, kein Zucker. 25. Januar 1887. Pat. ist heute vollständig wohl, kein verstärkter Durst, kein Müdigkeitsgefühl mehr, Urin spez. Gewicht 1011, Temperatur 37,8. Das Körpergewicht beträgt 68,5 Kilo. Desartige Anfälle werden in der Folgezeit ärztlich nun wiederholt beobachtet. Es sind immer dieselben Erscheinungen, um die es sich da handelt. Die geschilderten Allgemeinsymptome, die Temperatursteigerung, die erhöhte Pulsfrequenz, das systolische Geräusch an der Herzbasis, das Ansteigen des Körpergewichts, das Absinken der Urinmenge im weiteren Verlauf mit Anhören des Anfalls, die Abnahme des Körpergewichts und das Ansteigen der Urinmenge. Ein jeder dieser Anfälle dauert ein paar Tage. In der anfallsfreien Zeit ergibt die Untersuchung des Blutes vollkommen normale Verhältnisse. Vom 15.–18. Februar 1888 wird eine klinische Beobachtung des Pat. vorgenommen, die in allen Einzelheiten die geschilderten Symptome erkennen läßt. Die genaue Temperaturmessung ergab Anstiege des Temperaturs bis auf 40,1, die höchste erreichte Pulszahl betrug 108. Das Körpergewicht lag zunächst vor 65 auf 72 Kilo,

im Jahr im Verlauf von 3 Tagen wieder auf 65 Rds absinken. Der zeitweilig ödemöse Puls wird gegen Ende des Anfalles wieder normal. Die Messungen des Umfanges der einzelnen Körperteile ergaben in den einzelnen Stadien des Anfalls erhebliche Differenzen bis zu 2 cm. Neben der allgemeinen diffusen Schwellung fanden sich in einzelnen Anfällen an verschiedenen Stellen des Körpers, an den Unterschenkeln, an den Händen, Armen bis käsestückgroße Knoten, von anderen Mal traten ausgedehnte erythemartige Erytheme auf und in der diffus geröteten Haut waren zerstreute quaddelartige Erhebungen zu finden. Die Blutanalyse ergab im ganzen normale Verhältnisse, nur schien während der Schwellung die Zahl der roten Blutkörperchen abzunehmen. Der Pat. wird bis zum Jahre 1902 wiederholt in seinen Anfällen und auch außerhalb derselben beobachtet, späterhin hat er nach den eingelegten Erfahrungen keine demnächst schweren Anfälle mehr durchgemacht, aber die Anfälle beginnen jetzt fast immer mit heftigen schlagartigen Schauern und letztere treten zeitweilig auch isoliert auf. In den Jahren 1901 und 1902 sollte gelegentlich heftiger Anfälle eine Darmreizektion stattgefunden haben. Der Pat. starb im Jahre 1902 unter den Erscheinungen einer schweren Pneumonie.

Das ganz Ungewöhnliche des Falles sind die Ausdehnung des Ödems über die ganze Körperoberfläche, die damit in Zusammenhang stehenden Schwankungen des Körpergewichts, die außerordentlich intensiven Temperatursteigerungen, die schweren allgemeinen Erscheinungen, die während der Anfälle bestehende Abnahme der roten Blutkörperchen, die von dem Autor auf eine unvollständige auftretende stärkere Füllung des ganzen Blutgefäßsystems bezogen werden. Bemerkenswert ist auch die Hemihyperhidrosis.

Über starke Körpergewichtsschwankungen berichtet auch Mendel: während eines Anfalls Gewicht 118 Pfund, zwei Tage später 115½ Pfund, woraus er schließt, daß die Menge der Ödemflüssigkeit mehr als einen halben Liter betragen hat.

Von einigen Symptomen ist es schwer zu sagen, ob sie als Allgemeinsymptome aufzufassen sind; in erster Linie sind da die cerebralen Symptome zu nennen, die auch als Mattigkeit, Schläfrigkeit, ja als ausgeprägte Schlafsucht und Somnolenz dokumentieren können (Ullmann, Strübing, Rivochoen, Schlesinger, Mumford, Courtois-Suffit, Dinkelacker, Rapin, Birchena, u. a.) oder als Kopfschmerzen von bisweilen beträchtlicher Intensität (Robinson, Riehl, Falcione, Ormerod, Brown) oder als Schwindel (Forberg, Riehl) oder als psychische Veränderungen: auffällige Verstimmung zur Zeit der Ödeme (Joseph), Reizbarkeit vor den Anfällen (Dinkelacker), depressive Zustände (Schlesinger). Sehr stark waren diese Erscheinungen in einigen Fällen der familialen Form, namentlich bei den von Strübing, auch bei den von Dinkelacker und Rivochoen mitgeteilten, und zumeist traten sie im engeren Anschluß an Magen-Darmsymptome auf, wenn sie auch bei reinen Hautschwellungen immerhin vorkommen (Untz). Ihren höchsten Grad erreichten sie in folgender, von Ullmann mitgeteilter Beobachtung.

24jähriger Heizer, der bei sehr hoher Temperatur zu arbeiten hatte. Am 7. November plötzlich heftige ödematöse Schwellungen an den Handgelenken, die nach wenigen Stunden auf geringere Anschwellungen verschwanden. In den beiden nächsten Tagen nachzutreten starke, nicht mitreißbare Schwellungen erst der linken, dann der rechten Gesichtshälfte, des rechten Gannens, des Zuges. Am 9. November plötzlich Erbrechen von Hirnssek., Pulsverlangsamung, Bewußtseinsverlorenheit, Atmungstillstand, den künstliche Atmung nach längerer Zeit beleben konnte. Dann Ausbruch der Schwellungen im Rücken, Gliedmaßen, das zu Sklerifikationen führte. Jetzt traten allgemeine Krämpfe auf: tonische heftige Anspannung der ganzen Körpermuskulatur, Miosis, Bewußtseinsverlust, nach heftig Miosis allgemeine tonische Konvulsionen. Unter dem Einfluß der Narcolica remitierte die Krämpfe an den nächsten beiden Tagen, während dann, nachdem eine Lidschwellung eingetreten war, ein wahres Status epilepticus mit 12 Anfällen eintrat. Dann kamen noch in den letzten Tagen ein paar heftigste Anfälle; schließlich sehr rasche Genesung. Vor 12 Jahren nach einem Schlaganfall angeblich ähnliche Anschwellungen.

Der Autor glaubt, die Krämpfe auf meningeale Schwellungen, die den an der Haut beobachteten analog seien, zurückführen zu müssen; wir hätten damit ein der Meningitis serosa sehr ähnliches, nur vielleicht durch noch flüchtigere Ergüsse ausgezeichnetes Krankheitsbild. Übrigens hat auch Strübing schon eine ähnliche Erklärung gegeben. Bei der typischen Meningitis serosa scheinen Hautschwellungen usw. noch nicht beobachtet zu sein; ich habe in den zahlreichen Fällen von Meningitis serosa, die ich zu Gesicht bekommen habe, immer darauf geachtet aber in keinem Fall irgendwelche anamnestischen Daten, die auf flüchtige Ödeme deuteten, erhoben. Nicht ganz eindeutig scheint mir ein Fall von Rad zu sein, bei dem von dem Autor epileptische Anfälle als Symptom des Leidens aufgefaßt wurden. Ein 47-jähriger Maler bekam im August 1899 einen epileptischen Anfall, zwei weitere im Oktober; wenige Minuten dauernde Bewußtseinsstörungen, einmal Zungenlaß, nie Erbrechen, kurze Zuckungen; nach dem Anfall Benommenheit und Müdigkeit. Seitdem hat er häufig Schwindel und Bewußtseinstörungen. Seit Mitte November täglich meist früh ödematöse Schwellungen am Gesicht und Hals, allgemeine Übelkeit, Beklemmungen, Unregelmäßigkeit des Pulses mit Neigung zur Verlangsamung. Ende Dezember verschwanden die Ödeme, aber es traten Magenbeschwerden, Druck, Völle, Appetitlosigkeit auf, Herzbeschwerden fortdauernd. Im Oktober 1900 Besserung auch der unregelmäßigen Herzrhythmus. Am 25. April 1901 sind beide Beine bis zum Knie geschwollen, die Schwellung ist nach wenigen Tagen geschwunden. Später hatte der Mann die Symptome eines Mediastinaltumors. Ich bin nicht sicher, ob man hier bei dieser komplizierten Sachlage eine selbständige Quincke'sche Krankheit annehmen darf.

Hahn berichtet von einem 12-jährigen Kinde, das im Verlaufe eines Typhus eine sechs Tage lang anhaltende komplette motorische Aphasie bekam; dabei lag der rechte Mundwinkel etwas. Die Besserung

erfolgte allmählich im Verlauf einiger Tage. Gleichzeitig damit bestand eine *Urticaria gigantea* am rechten Unterarm, an der linken Wange, am nächsten Tage Schwellungen am linken Unterarm und den Oberschenkeln.

Die Flüchtigkeit der Aphase und ihre Koizidenz mit flüchtigen Hautschwellungen läßt die Annahme einer durch später rasch resorbierte Ödeme entstandenen Aphase hier als durchaus plausibel erscheinen.

Als Allgemeinsymptome haben wir sicher die aufzufassen, die prodromal den Erscheinungen des Ödems vorausgehend in einem leichten Krankheitsgefühl, einer gewissen Mattigkeit, Unlust, Appetitlosigkeit, Reizbarkeit bestehen. Ein Patient von Whiting klagte über Trockenheit und einen Metallgeschmack im Munde. Starke Schwellen sind wiederholt beobachtet worden. Dazu kann in einigen Fällen Fieber kommen, das meist nur kurz anhält und für gewöhnlich noch keinen hohen Grad erreicht (Falcone, Müller, Mumford, Quincke, Rapin, Garel et Bonamour, Valobra). Ausnahmsweise kommen aber auch höhere Temperatursteigerungen vor: Ebstein beobachtete ein Ansteigen bis zu 39,5, Apert und Delille bis zu 39°, Diethelm in seinem ausführlich mitgeteilten Falle 40,1°. Bei einer meiner Patientinnen wurden in mehreren Stadien ihres Leidens Temperaturmessungen vorgenommen; es zeigte sich wiederholt, daß beim Auftreten stärkerer Schwellungen unter ausgesprochener Störung des Allgemeinbefindens (Frosteis, Müdigkeit) die Temperatur gelegentlich unter intensiven Schwankungen bis auf 39° anstieg und oft genug 38,0, 38,2, 38,4 erreichte. Auch in drei weiteren Fällen habe ich erhebliche Temperatursteigerungen beobachtet. Es ist das wohl im ganzen kein so seltenes Vorkommen. Erhöhte Temperatur ohne die sonstigen Kennzeichen des Fiebers (ohne Leukocytose und Hamveränderungen) konstatierte Roth auch in einem Fall eines nach einem psychischen Trauma aufgetretenen Ekzems, das jedenfalls dem angioneurotischen Ödem seinem Wesen nach sehr nahe stand. Immerhin sind die Temperaturerhöhungen doch nicht die Regel, und es ist sicher, daß auch die schwersten Anfälle ganz ohne Allgemeinerscheinungen auftreten und so während ihrer ganzen Dauer verlaufen können.

Als Prodromalsymptom können wir noch eins anführen, das häufiger beobachtet wurde: ein allgemeines Erythem von mannigfach wechselnder äußerer Gestaltung (Wills and Cooper, Varian, Osler, Dinkelfacker, Fuchs, Gibson, Schlesinger). Es sind purpurne Ringe oder Flecke, die überall am Körper entstehen können, oder baumartige Verzweigungen und Verästelungen, alles dies von sehr flüchtiger Natur.

Damit ist die Beschreibung der Einzelsymptome der typischen Fälle des umschriebenen flüchtigen Ödems zu Ende geführt.

Es bleibt nur noch übrig, darüber einiges zu sagen, in welcher Form die Einzelsymptome sich zum Anfall, und wie die einzelnen Anfälle sich zur Krankheit gruppieren.

Denn das ist das Charakteristische der Krankheit: der Einzelanfall setzt sich aus Einzelschwellungen zusammen, derart, daß plötzlich oder mit den geschilderten geringen Vorboten das Ödem an irgendeiner Stelle sich entwickelt, rasch zur vollen Höhe gedeiht, und während hier die Krankheit zu verschwinden sich anschickt, schon an anderer Stelle, die meist mehr oder minder weit entfernt ist, eine neue Schwellung auftritt; und es wiederholt sich das Spiel mehrfach, bis kein neues Ödem mehr erscheint und der Anfall beendet ist. Aber nur in sehr seltenen Fällen ist es damit auch die Krankheit; in gewissen Zwischenräumen, bald in regelmäßigen Intervallen, bald regellos kommen neue Anfälle, oft mit ganz typisch wiederkehrendem Verlauf und so kann es ein ganzes Leben lang gehen.

In einzelnen könnte man Fälle reinen Hautödems und solche unterscheiden, in denen die Symptome daneben auch noch auf andersartig lokalisierte Schwellungen hinweisen. Folgende Beobachtung Dinkelacker's kann als ein sehr gutes Beispiel eines Falles mit „gemischter“ Symptomatologie gelten:

22-jähriger Mann, aus gesunder Familie. Beginn der Krankheit im Alter von 7 Monaten. Abwechselnd Anfälle mit folgenden drei Hauptsymptomen: Erstens Kolikanfälle, heftige Schmerzen im Leib, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Diarr. Hockklaffung. Nach dem Anfall Durchfälle. Zweitens Daner. So waren die Anfälle von ersten bis zum 7. Jahre, dann bis 10. Jahre ganz frei, und man gewöhnte sich in den übrigen Symptomen zweites Ödem besonders in der Gegend der Glieder, besonders auch mit Ergüssen im Gelenk; vorangehendes Gefühl von Spannung. Seit einigen Jahren kommen dann drittens starke Schwellungen der Kehlkopfkleinhaut, Erstickungserscheinungen, keine Schlängelschwerden. Die Symptome der ersten, zweiten und dritten Reihe können oft zusammen vor, oft traten nur zwei von ihnen auf, meist in der Art verknüpfend, daß eins als Hauptsymptom erschien. Die Anfälle liefen zwar 7-tägige Perioden ein, konnten aber durch äußere Ablässe post- oder antepozieren. Sie dauerten 1–2 Tage mit verschieden heftiger Intensität. Vor den Anfällen bekommt die Brust oft ein markiertes Aussehen. Nach einer Zeit in Kissingen kam der Kranke (abgelang von Aufregungen der Anfälle, dann kehrte der alte Zustand wieder.

Die Mehrheit bilden demgegenüber die Fälle, in denen nur Hautschwellungen vorkommen, oder gelegentlich einmal hier oder da eine rasch vorübergehende Schleimhautschwellung entsteht. Die komplizierteren Fälle scheinen meist zur Gruppe der familialen Erkrankungen zu gehören (Dinkelacker, Sträbing, Schlesinger, Bicochon, Oster u. a.). Doch gibt es auch viele isolierte Fälle mit gemischter Symptomatologie. Das zeitliche Verhältnis der einzelnen Symptome zueinander kann ein recht verschiedenes sein. Es können Symptome der einen Reihe mit Symptomen der anderen regelmäßig zusammen vorkommen, es kann ein Nacheinander stattfinden, das sehr verschiedene

Intervalle einhalten kann. Oft gehen Magen-Darminstörungen kurze Zeit, gleichsam prodromal, den Hautschwellungen voraus. Es kann ein Vikariieren stattfinden, indem einmal nur die einen, ein andermal nur die anderen Symptome eintreten. Es können schließlich jahrelang Symptome der einen Gattung allein vorhanden sein, und dann erst andere sich dazu gesellen (s. den mitgeteilten Fall von Dinkelacker). Dabei kann es natürlich auch dahin kommen, daß überhaupt nur Symptome von seiten des Magens oder der Luftwege zur Beobachtung gelangen. Hier ergeben sich dann erhebliche diagnostische Schwierigkeiten (Abgrenzung gegen das intermittierende Erbrechen usw.), die uns noch weiter beschäftigen werden.

Daß die Dauer der Einzelschwellung stark variiert, haben wir schon oben; sie kann nur Stunden, ja auch nur Minuten bis zur Entwicklung brauchen, kann aber andererseits erst in Tagen, vielleicht ausnahmsweise auch noch erst in längerer Zeit zu ihrem Höhepunkt gelangen. Auch sind das große Ausnahmen, bei denen man mit der Diagnose sehr vorsichtig sein muß. Gegen einen derartigen Fall, den Lavett mitteilte, lassen sich aber diagnostische Einwendungen kaum erheben.

Hier trat bei einem 23jährigen Frauen eine elastische Schwellung der Haut aller Gliedmaßen und aller Fächeranbahnung ein. Diese Schwellung hielt 4 Wochen an; bevor sie wieder verschwunden war, trat an einer anderen Stelle eine neue auf, so daß der ganze Anfall in einem Zeitraum von 6—8 Wochen verlief.

Morichau-Beauchant und Landry haben folgenden Fall mitgeteilt. Ein 29 jähriger Mann ohne hereditäre Belastung erkrankte mit abdominalen Schmerzen, deren Anschwellungen der Haut und des Unterhautdrüsenwebes folgten, sie saßen an allen möglichen Stellen, entstanden plötzlich unter äußerst heftigen Schmerzen, dehnten sich über Tage, aber auch über Wochen und Monate aus, schwanden aber schließlich doch wieder vollkommen. Die Schwellungen folgten so unmittelbar aufeinander, daß der Patient in drei Jahren im ganzen nur einige Tage davon frei blieb. Er hatte außerdem profuse Schweiße, eine polymorphe Hyperleucocytose und eine doppelseitige Iritis. Schließlich seit Beginn der Schwellungen typische gastrointestinale Symptome, Schmerzen, unstillbares Erbrechen, Koliken, Durchfälle. Man wird den Autoren zustimmen dürfen, daß es sich um einen allerdings in verschiedener Richtung (Chronizität und Schmerzhaftigkeit der Ödeme, Iritis) atypische Quincke'sche Krankheit handelt.

Meist pflügt sich so wie auch in diesem Falle zunächst nur eine Schwellung einzustellen, aber noch bevor diese verschwunden ist, tritt an verschiedenen Stellen eine zweite und dritte auf und so fort, so daß bei etwas längerer Persistenz der Schwellungen zwei, drei und auch noch mehr davon zu gleicher Zeit am Körper vorhanden sein können, aber alle in verschiedenen Entwicklungsstadien. Über die Lokalisation ist dem früher Gesagten in diesem Zusammenhang noch hinzuzufügen,

daß das Diskontinuierliche der Ödeme durchaus die Regel zu sein pflegt; die Schwellungen springen von einer Stelle zu einer zweiten, weit entfernten, ohne erkennbaren Grund, und es kann im Lauf eines Anfalls nacheinander der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen werden. Daß dabei aus diesen oder jenen Gründen für lange Zeit oder auch für immer bestimmte Stellen bevorzugt werden, haben wir schon betont.

Es kommt aber auch ein Fortkriechen der Ödeme vor, die z. B. am distalen Ende der oberen Extremität beginnend, allmählich immer weiter proximalwärts ihre Grenzen verschieben; dieser Modus ist zwar viel seltener als der andere, aber Beobachtungen wie die Browns oder Stephens sind in den übrigen Punkten so typisch, daß man ihre Zugehörigkeit zur Quincke'schen Krankheit anerkennen muß. In diesen Fällen kann man nur von einer Schwellung reden; sonst sind es ja häufig eine ganze Anzahl, selbst nur zwei bis drei; aber auch da, wo eine allmähliche Ausdehnung des Ödems in *continuo* nicht statt hat, kann in seltenen Fällen nur eine Schwellung vorhanden sein. Unter diesen Umständen gerade hat man, wenn immer dieselbe Stelle befallen wurde, dem Leiden einen besonderen Namen gegeben, und hat z. B. so von dem akuten rezidivierenden Lidödem gesprochen; oft genug wird bei späterer Gelegenheit die Regel der Beschränkung auf eine Stelle durchbrochen, und das Ödem erscheint plötzlich irgendwo sonst am Körper (s. o.).

Wie die Zahl der Einzelschwellungen, so variiert auch die der Anfälle. Es sind Beobachtungen publiziert worden, wo nur ein einziger Anfall auftrat, trotz genügend langer Beobachtungszeit (Curtis, Ashton, Lovetti). Recht typisch ist ein solcher Fall von Holmes, wo im Verlauf von drei Wochen an allen möglichen Körperteilen charakteristische Ödeme auftraten; auch Gaumen und Rachen waren befallen. Freilich bestanden auch einige Purpuraflecke. Natürlich wird man, ehe man annimmt, daß wirklich in einem Anfall die Krankheit sich erschöpft hat, lange Zeit abwarten müssen, da lange Pausen sich zwischen die Anfälle einschieben können. Das entgegengesetzte Extrem sind die Fälle, in denen über die ganze Lebensdauer des Individuums hinweg die Anfälle sich erstrecken; so konnte sie Strübling vom 26. bis 70. Lebensjahr verfolgen; Wright sah sie seit 35 Jahren bestehen und niemals länger als sechs Wochen ausfallen, Yarian beobachtete sie bei einer 51-jährigen Frau seit der Kindheit, Courtade bei einem 55-jährigen Mann seit dem 15. Lebensjahr. Seit 25 Jahren kamen Anfälle bei Kranken von Salles, Bircher, Griffith vor, seit 15 Jahren bei den von Rapin, Féréol, Halstedt, über 7—8-jährige Dauer berichten Ledermann, Müller, Rapin u. a.

Auch das Intervall zwischen den einzelnen Anfällen variiert sehr. Es gibt Beobachtungen, wo sie ein sehr seltenes Vorkommnis darstellen, wie sie z. B. bei Salles in 25 Jahren nur viermal notiert werden konnten;

Ein 26-jähriger Patient Valobras hatte seine zweite Attacke, die erste war mit 12 Jahren abgelaufen. Sie können alle paar Monate erscheinen oder jeden Monat, und dann halten sie sich oft an den Termin der Menoes, so weit sogar, daß sie mit diesen ante- und postponieren (Börner). Es gibt Fälle, wo sie Jahre hintereinander immer mehrmals im Monat auftraten (Osler, Rabin). Biskl notierte sie viermal in 14 Tagen, Milton sah seit Jahren nie eine Woche ohne Anfall vorübergehen, und meist kamen sie sogar jeden zweiten Tag. Ähnliches erzählt Fuchs. Tägliches Auftreten beobachteten Higier, Hallopeau, Jureph. So war es auch im folgenden Fall.

C. L., 12-jähriger Knabe. Untersuchung am 31. August 1893.

Die Mutter ist im allgemeinen nervös, leidet an in regelmäßigen Anfällen auftretender Migräne. Hat nie Ödeme gehabt. Vier Geschwister sind gesund, war klug eine Schwester auch schon über Kopfschmerzen. Pat. erlitt im fünften Lebensjahre einen Hutschlag gegen den Kopf, der weiter keine Folgen hatte. Seit jungen ist er nervös, leicht aufgeregt, ängstlich. Anfang Januar 1888 litt er an Halsentzündung. Seit dem Sommer des Jahres 1895 begannen die Ödeme; sie betrafen zunächst die Finger beider Hände, mit Annahme der Daumen. Die Finger wurden weiß, steif, gefühllos und schwellen an, namentlich um die Gelenke herum, um die sich rote Ringe bildeten. Die Schwellungen dauerten anfangs eine Viertel Stunde, später bis zu zwei Stunden, ein Jucken bestand nicht, die Schwellungen kamen anfangs täglich, später auch wohl zweimal am Tage. Weiterhin traten auf dem Handrücken Masse, scharf umschriebene, nicht juckende Schwellungen auf. Diese Schwellungen kamen sehr rasch und vergingen langsam. Das dauerige einige Wochen bis eine mehrmonatliche Ruhepause trat ein. Dann kamen die gleichen Ödeme von der Fußgelenke herum zum Vorschein; hier war die Haut über ihnen etwas gerötet, und es war auch ein leichtes Jucken vorhanden, sie beizten auch ein wenig; sie liebkten zu ihrem Abklat etwa zwei Tage. Nie übertraten. Wieder kam eine Pause von mehreren Monaten und dann kamen wieder die eben beschriebenen Schwellungen, aber nur an den Fingern der rechten Hand, bis über die Metacarpophalangealgelenke, ganz schmerzlos. Die Untersuchung ergab außer den geschillerten Ödemen keinen pathologischen Befund.

Eine Patientin Parkers hatte seit 2 Jahren täglich an irgend-einer Stelle der Haut oder der Luftwege eine Schwellung.

Beachtung verdienen die Fälle, in denen das Ödem sich täglich zu bestimmter Zeit einstellt, wie bei Matas, wo es jeden Vormittag zur gleichen Stunde auftrat und jeden Nachmittag stets um dieselbe Zeit verschwand; Hartzell sah sie zur bestimmten Stunde der Nacht auftreten, ähnliche Regelmäßigkeit berichtet auch Gevaert.

In solchen Fällen verschiebt sich die Grenze zwischen Einzelschwellung und Anfall. Man weiß nicht, ob man von monat- oder wochenlangen, oder von täglichen und aus einer Schwellung bestehenden Anfällen reden soll. Das ist ja auch unwichtig. Im höheren Alter werden die Anfälle im allgemeinen seltner, in der Entwicklung der Krankheit gibt es dagegen oft ein Stadium, wo sie die Tendenz haben, immer rascher aufeinander zu folgen.

Nur einmal (Traumann) finde ich die Angabe, daß ein ganz

regelmäßiger Turnus der Schwellungen innegehalten wird: rechte Zingenhälfte, linke Zingenhälfte, nach 8 Stunden geschwunden, nach 48 Stunden Schwellung der Oberlippe, dann Unterlippe, dann angeblich Schwellung des unteren Endes des Oesophagus während eines Tages, nach 48 Stunden des Augenlids und Chemois. Wiederholung des Anfalls eine Woche später.

Auch bei nicht täglich rezidivierenden Schwellungen können die freien Intervalle sich sehr gleichmäßig gestalten. Es kann jeden 7. oder 11. oder 14. Tag ein Anfall kommen (Collins). Das erwähnt auch Rapin, der auch dann eine Analogie mit der Migräne findet, die in gewissen Fällen z. B. die Sonntage ganz auffällig bevorzugt, offenbar wegen der an diesem Tage veränderten Lebensweise. So soll es gelegentlich auch mit den Schwellungen gehen. Collins hat ausgerechnet, daß im Mittel ein Intervall von 19 Tagen besteht, und daß die Gesamtkrankheitsdauer im Mittel 1—2 Jahre beträgt. Diese Durchschnittszahlen haben der großen Variabilität der einzelnen Fälle gegenüber wenig Wert. Es können sich plötzlich zwischen sonst häufig rezidivierenden Anschwellungen Pausen von mehreren Jahren einschließen, wie in einem Fall von Loitmann. Ähnliches sahen auch Higier und Schleginger.

Selbst nach vieljähriger Dauer können die Anfälle noch für immer verschwinden (Rapin).

Ein Verlaufcharakteristikum aber bleibt bei aller Verschiedenheit der Schwellungen diesen doch stets erhalten. Sie verschwinden wieder, nach verschieden langer Zeit zwar, aber doch so, daß gar keine oder nur unbedeutende und erst nach wiederholter Wiederkehr der Ödeme sich herausbildende, dauernde Residuen sich einstellen. Wo sich in langsamer Progression ein stationäres Ödem entwickelt, handelt es sich nicht um die Quinckesche Krankheit, nicht um akute, blichtige Ödeme.

Prognose.

Das bedrohlichste Symptom bilden die Glottisödeme und im Gegensatz zu der früher hier vertretenen Anschauung muß in der Tat behauptet werden, daß durch diese Erscheinungen in einer ganzen Reihe von Fällen das Leben schwer bedroht und in einer erheblichen Anzahl durch sie der Exitus herbeigeführt wurde. Die ersten beiden derartigen Fälle sind von Mettler beschrieben worden. Ich kann sie leider nicht sicher beurteilen, da ich sie nur aus einem Referat kenne. Weitere höher gehörige Beobachtungen sind dann in den letzten zehn Jahren von Bazett, Calvé, Ensor, Fritz, Griffith, Prior, Rapin, Strömmer, Whiting, Mendel und Morris mitgeteilt worden. Ensor gibt folgende Statistik. Unter 89 Familienmitgliedern erkrankten

33 an angioneurotischem Ödem, davon starben 12. Fritz sah unter 9 Mitgliedern einer Familie 5 an diesem Ödem zugrunde gehen, Whitting 30 unter 110 Mitgliedern in einer von ihm gemachten Zusammenstellung unter den Erscheinungen des akut einsetzenden Larynxödems sterben. Griffiths Patient starb ebenso wie sein Vater. Bei Prior war die Großmutter des Patienten an demselben Leiden gestorben, bei Sträuffer der Vater und der Bruder. Sehr schwer betroffen war auch die Familie, die Mendel beschreibt. Der Urgroßvater starb plötzlich an Erstickung, die Großmutter und deren Bruder ebenfalls, im Alter von 66 Jahren, die Tochter mit 22 Jahren. Der Vater der beobachteten Patientin starb mit 33 Jahren; er hatte während seiner Lebenszeit dauernd Anfälle. Der Bruder der Großmutter starb mit 40 Jahren nach einer Zahnextraktion, jedenfalls an dem durch diese ausgelösten Glottisödem. Er hatte vier Kinder. Eines von diesen starb mit 22 Jahren, die beiden anderen leben, der eine 50, der andere 48 Jahre alt, leiden aber fast wöchentlich an Anfällen und sind in steter Angst vor dem Erstickungstode. Eine Schwester der beiden ist gesund. Die Krankheit ist in dem Dorfe als eine Krankheit dieser Familie bekannt und nach dem Namen dieser Familie von dem Arzt benannt worden. Es scheint sich bei diesen unglücklich ausgehenden Fällen meist um familiäre zu handeln. Daß aber davon Ausnahmen vorkommen, lehrt eine Beobachtung von Rapin. Dessen Patientin hatte seit ihrem 7. Lebensjahre an flüchtigen Schwellungen gelitten und daneben an gastrointestinalen Symptomen. Die Schwellungen saßen überall an den Gliedern und auch am Gesicht wie an den Lippen, den Lidern. Die Erscheinungen sind auch gelegentlich Jahre lang fortgeblieben, sie kamen dann aber immer wieder. Im Alter von 50 Jahren erkrankte die Patientin morgens an einer Schwellung an der Schulter, die sich nachher zum Nacken und zum Halse hinzog, die sehr voluminös wurde, am Abend konnte sie noch mit lauter Stimme lesen; man hatte sie so oft in diesem Zustand gesehen, daß man sich nicht darüber beunruhigte, aber im Laufe der Nacht verschlimmerten sich die Erscheinungen und morgens um 2 Uhr starb die Patientin plötzlich. Ein ähnlicher Fall in der Familie ist nicht bekannt. Immerhin wird aber doch berichtet, daß der Vater der Patientin im Alter von 33 Jahren tot in seinem Bette aufgefunden wurde. Eine Tochter der Patientin hat seit dem 7. Lebensjahr gelegentlich eine Magen-Darmerkrankung.

Der Tod kann, wie aus diesem und schon aus den früher genannten Beispielen hervorgeht, außerordentlich rasch eintreten, so daß zu der sonst lebensrettenden Tracheotomie keine Zeit mehr ist. Einzelne der Patienten sind, wie ebenfalls schon erwähnt wurde, mehrfach tracheotomiert worden. Die Kranken von Apert und Delille und von Bircher waren dauernd gezwungen, eine Kanüle zu tragen, ein Verfahren, das sich für diese Fälle durchaus empfehlen dürfte. Es ist verständlich,

daß das Bewußtsein unter einer so dauernden, so plötzlich eintretenden und so wenig vermeidbaren Gefahr zu leben, den Lebensgenuß der Kranken außerordentlich beeinträchtigen kann, wie das auch von einzelnen von ihnen von dem betreffenden Autoren ausdrücklich vermerkt wird.

Daß auch das angioneurotische Lungenödem gelegentlich zum Exitus führen könnte, ist nicht zu bezweifeln, doch liegt ein solcher Fall in der Literatur bisher nicht vor. Denkbar wäre auch, daß schwere Gehirn-erscheinungen nach Art der von Ullmann berichteten, einen letalen Ausgang herbeiführen könnten. Bei den Fällen mit schweren Magen-Darmerkrankungen kann die Reduktion des Allgemeinzustandes eine recht erhebliche sein, hat aber doch noch nie zu einem das Leben bedrohenden Zustand geführt.

Recht ungünstig ist die Prognose *quoad restitutionem*. Es kommen sehr lange Intermissionen vor, von 10 und 15 Jahren, aber die Neigung zu steten Rezidiven ist doch sehr groß, wie das früher betont wurde. Eine Tendenz zur allmählichen spontanen Besserung mit zunehmendem Alter läßt sich in manchen Fällen nicht verkennen; ähnlich wie bei der Migräne. Aber eine sichere Voraussage ist unmöglich. Oft genug zieht sich das Leiden durch das ganze Leben hin; es kürzt die Lebensdauer abgesehen von dem Ausnahmefall des Glottisödems nicht ab (Oxler, Strübing), aber freilich oft genug beeinträchtigt es Lebensfreude und Lebenstätigkeit.

Beziehungen zu anderen, nahe verwandten Affektionen.

Ganz, wie bei den Krankheitsbildern, die wir bisher behandelt haben, finden wir auch beim flüchtigen Ödem Übergangsformen, die in den bisher geschilderten Typus nicht hineingreifen und die Brücke zu nahe verwandten Affektionen bilden.

Am nächsten steht die Quinckesche Krankheit zweifelhaft der Urticaria, so nahe, daß beide lange Zeit identifiziert wurden, und daß auch heute keineswegs Einigkeit besteht, ob hier eine Trennung gerechtfertigt ist. Milton beschrieb unter dem Titel „on giant urticaria“ neben typischen Fällen des flüchtigen Ödems solche Fälle, die nach allen ihren Symptomen als Urticaria aufzufassen sind.

Freilich die gewöhnliche Urticaria unterscheidet sich genügend von dem flüchtigen Ödem. Ihr Charakteristikum, die Quaddel differiert von der Schwellung der Quinckeschen Affektion erheblich; sie ist viel kleiner, hochrot gefärbt, heiß, sehr stark juckend. Die Quaddel kann aber erheblich größer werden, wenn auch so excessive Größen, wie bei dem flüchtigen Ödem, kaum erreicht werden. Die Farbe ändert sich insofern, als wenigstens die Mitte der Quaddel blaß und anämisch wird,

während allerdings ein stärker geröteter Hof meist bestehen bleibt. Am konstantesten ist wohl das Jucken, das der Schwellung der Quincke'schen Krankheit ja meist abgeht. Man hat diesen Formen der Urticaria auch den Namen Urticaria oedematosa oder porcellanea gegeben; sie sind es, die dem flüchtigen Ödem am nächsten stehen. Auch ätiologisch haben beide Krankheiten viel Gemeinsames. Nervöse Prädisposition und Heredität kommen bei beiden vor; die Kälte löst bei der einen und bei der anderen oft Anschwellungen aus; der Verlauf ist oft ein gleicher, die Flüchtigkeit der Erscheinungen kennzeichnet beide, im allgemeinen sind die Quaddeln aber entschieden noch flüchtiger als die Ödeme. Das typisch familiäre Vorkommen ist, meines Wissens wenigstens, bei der Urticaria nicht in so ausgesprochener Weise beobachtet worden, die Intoxikationen vom Magen-Darmkanal aus spielen bei ihr eine viel bedeutendere Rolle. So gibt es neben vielen Übereinstimmenden immerhin doch auch Differenzen; sie werden wohl genügen, in der Mehrzahl der Einzelfälle eine Unterscheidung zu ermöglichen. Aber nicht immer. Das scheitert schon daran, daß es nicht wenige Beobachtungen gibt, in denen zur selben Zeit bei demselben Individuum typische Urticariaquaddeln und Ödeme sich zeigen. Und es kommt, wenn auch etwas seltener, vor, daß bei demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten einmal Urticariaquaddeln, ein andermal flüchtige Ödeme beobachtet werden, und weiterhin kommt es vor, daß bei dem einen Mitglied der Familie Ödeme, bei dem anderen Urticaria zur Beobachtung kommt. (Donegana: Bruder heftige typische Urticaria, Mutter flüchtige Ödeme, Schwester flüchtige Ödeme, die aber manchmal den Urticariaquaddeln sehr ähnlich.) Im ganzen reichen die Differenzen nicht aus, um eine prinzipielle Trennung der beiden Symptomenbilder durchzuführen, eine Anstimmung, die von der Mehrzahl der neueren Autoren geteilt wird.

Es wird auch nicht einmal immer möglich sein, die einzelne lokale Eruption sicher zu klassifizieren; auf der einen Seite charakterisiert die Urticariaquaddel Röte, Jucken, Hitze, auf der anderen Seite das flüchtige Ödem Blässe, Kühle, Fehlen von subjektiven Störungen; aber es gibt blass geschwellene von beträchtlicher Größe, die sehr stark jucken, es gibt hochrote Quaddeln ohne Jucken. Das Jucken kann zu Anfang vorhanden sein, dann verschwinden und umgekehrt, und was der Möglichkeiten noch mehr sind. Es hat keinen Zweck, für diese mannigfachen Mischungen neue Namen zu suchen; diese Symptomenbilder stehen auf der Grenze zwischen zwei benachbarten und prinzipiell nicht zu scheidenden Affektionen. Dahin gehört z. B. eine Beobachtung, die Ullrich unter einem besonderen Titel (eine merkwürdige vasomotorische Neurose) beschreibt. Hier sprechen Größe und Dauer der Schwellungen mehr für flüchtige Ödeme, Hitze und Jucken für Urticaria. Fälle, in denen früher einmal Urticaria bestanden hat

und jetzt flüchtige Ödeme vorkommen, würden beschrieben von Salles, Osler, Goltz u. a. Hierher gehören auch eigene Beobachtungen. Noch häufiger fanden sich gleichzeitig neben Urticariaquaddeln ödematöse Schwellungen (Dinkelacker, Quincke, Milton, Rapin, Bircher, Valobra, Schlesinger, Minnich, Crozer-Griffith, Elliot, Etienne, Higier, Joseph, Meyer, Oppenheimer, Smith, eigene Beobachtungen). Die nahe Verwandtschaft beider Affektionen betonen auch Collins, Favier, Courtois-Suffit, Fuchs, Valobra, Halsted, Russel. Mehrfach fand sich in typischen Fällen der Quinckeschen Affektion eine Urticaria betitia (Wills and Couper, eigene Beobachtung).

Die nachfolgende Beobachtung Miltons mag als gutes Beispiel eines solchen Übergangsfalles hier genauer mitgeteilt werden.

34jähriger Mann. Leidet seit 7–8 Jahren an der Krankheit. Der Anfall beginnt immer mit allgemeinem Unbehagen, Druck vor dem Magen, Schwellung der Zunge und des Gaumens und einem unangenehmen Geruch aus der Nase. Dann tritt eine Schwellung an irgendeinem Körperteil auf. Die Schwellungen sind von Faustgröße, hart, ohne Verfärbung der Haut, heben sich, daß diese etwas weiß erscheint, aber von einem enorm starken Jucken begleitet; auf der Oberfläche der Schwellungen und um diese herum oft kleine Knötchen, halb erbsengroß, stielartige Knötchen auch an der Wangenschleimhaut und Zunge. Die Anfälle kommen meist im Winter, Wärme lindert sie.

Fällt es hier schwer, zu entscheiden, ob die einzelne Schwellung zur Urticaria gehört oder nicht, so sehen wir im nächsten Fall von Elliot typische Eruptionen der beiden Affektionen nebeneinander.

39jähriger kräftiger Mann. Vor neun Monaten abwechselnd Durchfälle und Verstopfung. Einen Monat später an den Füßen stielartige Schwellung von Hühnergröße, etwas juckend, nach 24 Stunden verschwunden, wüßten mehrere Anfälle, in denen der ganze Fuß betroffen war oder eine Hand, oder das Knie, oder die Lippen, auch die Zunge kam an die Reihe, das Schwellen war behäufelt und einmal einmal Erstickungsgefahr. Dazwischen traten an verschiedenen Körperstellen die gewöhnlichen roten, nekrotischen Quaddeln der Urticaria auf. Vor Beginn der Schwellungen machte sich an den betroffenen Stellen immer ein gewisses Gefühl von Unbehaglichkeit, Spannung und Anwesenheit geltend.

Seltener als zur Urticaria finden sich bei der Quinckeschen Affektion Beziehungen zu den Neurosen, denen wir unsere spezielle Aufmerksamkeit gewidmet haben, zu den Akroparästhesien, zur Raynaudsehen Krankheit usw. In der Literatur wird davon wenig gesprochen, ich selbst habe aber eine Reihe derartiger Übergangsfälle auch hier gesehen; ich will darauf etwas genauer eingehen, und erwähne zunächst die Beziehungen zu den Akroparästhesien. Ich habe fünf derartige Fälle gesehen. Der erste davon ist der schon erwähnte, der auch nahe Beziehungen zur Urticaria hat.

Frl. F., 25 Jahre alt, Arbeiterin, unterstellt 9. Mai 1898. Im Alter von sechs Jahren sei sie über ein Treppengeländer hingefallen ohne ernsthaften Folgen. Im

Alter um 12 Jahren bekam sie Krampfanfälle. Noch während sie bei Bewußtsein ist, werden rechter Arm und rechter Fuß in Streckstellung erhoben, dann verliert sie die Bewußtsein, es treten allgemeine Konvulsionen ein, Zungenbiß, mäßiger tiefer Erstarren und Schlaf, kurz das typische Bild des epileptischen Anfalls. Drei solcher Anfälle im 18. Jahr, in den nächsten Jahren häufigere, dann Pause von drei Jahren und nur alle Jahre ein bis zwei Anfälle. Viel Kopfschmerzen, auch Flimmern vor den Augen und gelegentlich Schreien. Im ganzen leicht ängstlich, aufgeregter, schwach. Anfang Mai 1890 trat plötzlich eine Schwellung an dem Unterschenkel auf, ohne Veränderung der Haut, ohne Schmerzen oder Jucken, zu gleicher Zeit kamen auch noch verschwindende Schwellungen an den Füßen vor, von sehr wechselnder Intensität. Die Schwellungen an den Armen traten im Besonderen dadurch deutlich, daß ihr die Arme ihrer Blase plötzlich zu eng waren. Heute besteht eine etwa fahnenförmige Schwellung an der Außenseite des rechten Unterschenkels, unterhalb des Kniegelenkes; eine viel kleinere am Ulnarrande des linken Unterschenkels, Haut nicht verändert. 4. November 1890. Die Schwellungen betreffen jetzt mehr die Füße. Heute am rechten Unterschenkel, direkt über dem Fußgelenk ziemlich scharf umschriebene Schwellung, von Fingerrückengröße, Fingerdruck nicht sehr festsetzbar. Haut nicht verändert. Ähnliches am linken Unterschenkel. In den letzten Wochen merkte sie des Morgens ein Stechen und Kriebeln in den Fingern und bemerkte ein eigenartliches „zuckendes“, trübes Gefühl, das immer intensiver wird und jetzt auch schon abends kommt. Früher hat sie oft an Nerven, ohne Zusammenhang mit der Aufnahme bestimmter Speisen gelitten. Noch heute deutliche Urticaria betitula; seit längere starker Marasmus zum Kopfe.

Ich glaube, man würde den Dingen Gewalt antun, wenn man hier nicht einen einheitlichen Krankheitszustand als Grundlage der verschiedenen Symptome annehmen würde, die sich bald als Urticaria, bald als flüchtiges Ödem, bald als Akroparästhesien äußern. Ebenso steht es in einem anderen Fall meiner Beobachtung, der manches Interessante bietet.

Frau B., 45 Jahre alt.

Vor vier Jahren angeblich Ernst- und Ropperfollentzündung. Stürze, Ataxie, Fieber, Dauer acht Wochen. Außerdem soll damals ein roter, juckender Ausschlag bestanden haben, der nachher schuppig, und den der Arzt angeblich für Urticaria erklärte. Seit dieser Zeit soll sie anfallsweise Schmerzen in beiden Seiten haben, so daß ihr das Atmen schwer fällt; beim Niesen, Pressen sollen die Schmerzen zunehmen. Nie Erbrechen. Seit drei Jahren leidet sie an anfallsweise auftretenden Schwellungen, die die Gegend der Fingergelenke betreffen, aber auch an anderen Körperstellen, besonders in der Kniegelenkgegend, am Handrücken, am Handgelenk, auch am Hals auftreten. Anfangs sind die Schwellungen nur ganz vorderst vorhanden, später soll die Gegend der Fingergelenke dazwischen etwas dick gefühlt sein; aber auch hier ist der Zustand nicht ein stationärer, es kommen zeitweise sehr beträchtliche Schwellungen immer wieder vor. Dabei keine Schmerzen, kein Kriebeln; niemals rheumatische Schmerzen. Vor einigen Jahren einmal eine zeitlang Kriebeln in den Händen, als ob Nadeln in ihnen wären, mehr tagelänger, weniger in der Nacht. Fuß hatte damals viel zu leiden. Jetzt hat sie öfter ganz plötzlich einsetzende, 1–2 Stunden anhaltende Kopfschmerzen, die früher niemals dagewesen waren. Ist seit einem viertel Jahr im Klimakterium, starke Unregelmäßigkeit der Periode.

Bei der guten Untersuchung am 13. Januar 1890 land ich eine scharf umschriebene, elastische Schwellung der Gegend der rechten Hand; außerdem steht die

vierte rechte Finger in einer eigentümlichen Stellung, indem er im ersten und zweiten Interphalangealgelenk stark gebeugt gehalten wird. Pat. behauptet, daß sich diese Kontraktionen teilweise im dritten und vierten Finger beider Hände einstellen, daß sie sich passiv reduzieren lassen, daß die Finger aber sehr bald wieder die Kontraktionsstellung einnehmen. Von der Richtigkeit dieser Behauptung kann man sich sofort überzeugen, bei der Redressierung der Zwangsstellung hat man das Gefühl, als ob man einem elastischen Zug entgegenwirkt, durch den der Finger auch sehr bald wieder in seine erste Stellung zurückkehrt. Am linken Knie findet sich eine dreimarkstückgroße Schwellung. In der Halbgend ist die Haut etwas gerötet und heiß. Die Interphalangealgelenke beider Hände schmerzen, namentlich an den mittleren Fingern, etwas aufgetrieben. Doch ergibt die Röntgenuntersuchung durchaus normale Verhältnisse. Die tägliche Untersuchung fällt negativ aus. Die Beobachtung in den nächsten Wochen ergibt, daß es sich um wechselnde Anschwellungen an den Interphalangealgelenken handelt; vorübergehend und vereinzelt kommt auch ein Erguß in das betreffende Gelenk selbst vor. Außerdem treten flüchtige Anschwellungen auf an den Fußsohlen, an den Rippen und am Nacken (hinterlich nicht beobachtet). Einige Monate lang bleiben dann die Schwellungen aus.

30. August 1899. Gestern hat Pat. sich das Strumpfband am linken Bein absetzen müssen, weil plötzlich eine Schwellung um das Knie herum eingetreten war; bei den Schwellungen besteht ein deutliches Spannungsgefühl, wie Jacken. Auch Schwellungen am Handrücken haben sich wieder eingestellt, dabei keine Veränderung der Hautfarbe, nur sieht die Haut glanz- und glänzend aus. Augenscheinlich besteht eine starke, spinuliforme Anschwellung am linken dritten Finger, am stärksten über dem ersten Interphalangealgelenk, allmählich ins normale übergehend. Die Farbe der Haut ist dort etwas blauer als die normale Hautfarbe, auf Druck ist die Stelle nicht schmerzhaft. Fingerdruck bleibt nicht bestehen. Die Gelenke sind fest. Die Schwellung betrifft Dorsal- und Volarseite des Fingers. Ähnliche, weniger starke Schwellungen am rechten und linken vierten Finger. Der Umfang über dem ersten Interphalangealgelenk des dritten Fingers beträgt:

links 6,7 cm, rechts 5,5 cm,

über dem ersten links 4,5 cm, rechts 4,3 cm.

Schon während der Untersuchung nimmt der Umfang der Schwellung ab, die heute morgen so stark gewesen sein soll, daß Pat. die Hand gar nicht schließen konnte, was jetzt ganz gut möglich ist. Auch jetzt noch sollen die vorher geschilderten Spannungen in den Fingern teilweise vorkommen (in den nächsten Tagen wiederholt ärztlich kontrolliert). 17. November. Schwellung unter beiden Fußsohlen 12 Stunden lang. 19. November. Linke Hand normal. Rechts Schwellung ähnlich wie am 30. August. Gelenke bei Bewegung.

Munde. I. Interphalangealgelenke am zweiten Finger links 6 cm

„ „ „ „ „ rechts 7 „

Die eigentümlichen Spannungszustände an den Fingern wurden oben bereits erwähnt. Ob die akuten, kurz dauernden Kopfschmerzaufälle mit der Krankheit etwas zu tun haben, habe ich dahingestellt. Auch auf das Vorkommen von passagieren Gelenksanschwellungen in diesem Fall wurde bereits hingewiesen. Hier interessiert uns, daß bei der Kranken vor Jahren typische Akroparästhesien dagewesen sind. Ich habe bereits auch bei einer Dame von ca. 60 Jahren, die aus der Privatpraxis von Herrn Prof. Oppenheim stammt, die Kombination von flüchtigen Ödemen, Urticariaquaddeln und sehr aus-

gesprochenen Akroparästhesien beobachten können. Die letzteren standen, als ich die Kranke sah, im Vordergrund des Krankheitsbildes, es war mit ihnen auch eine geringe Abstumpfung der Sensibilität an den Fingerspitzen verbunden. Die Hände waren dauernd etwas gedunsen und kühl, zur Synkope locale kam es nicht, dagegen schwellen die Handrücken bald rechts, bald links für einige Stunden beträchtlich an, sodaß die Kranke dabei etwas mehr als eine gewisse Spannung empfand. Auch an den unteren Extremitäten kamen, namentlich in der Kniegegend, gelegentlich flüchtige Anschwellungen vor. Auf mein Befragen gab die Kranke an, daß sie zeitweise auch stark juckende, rote Quaddeln an den Armen gehabt habe. Gesehen habe ich derartiges bei ihr nicht. Ich habe eine andere Kranke beobachtet, die früher an Migräne gelitten hatte, bei der später typische Akroparästhesien auftraten, und bei der sich jetzt seit einigen Wochen an verschiedenen Stellen des Körpers flüchtige Schwellungen entwickelten, und ich habe ferner eine 32 jährige Frau gesehen, die seit 9 Jahren an flüchtigen Schwellungen hauptsächlich an den Lippen und am Arme litt, bei der die Schwellungen mit Fieber, Frost, starken Kopfschmerzen einsetzen und ausgesprochene allgemein nervöse Beschwerden vorhanden waren; nebenbei hat sie in den letzten Jahren typische, namentlich morgens exacerbierte Parästhesien an den Fingerspitzen, die dauernd auffällig kühl sind; und ich konnte schließlich einen 49 jährigen Mann beobachten, der seit Jahren an Akroparästhesien litt und im letzten halben Jahre zahlreiche Attacken von flüchtigem Lähmen hatte.

Beziehungen finden sich ferner zur Raynaud'schen Krankheit. Unregelmäßigkeiten der Blutverteilung werden öfter beobachtet; so Blutandrang zum Kopf (eigene Beobachtung, Banke), ebenso sind Klagen über kalte Füße und Hände häufig (Banke, Norton, Osler). In mehreren Fällen traten auffallend starke Erytheme auf, wenn die Kranken sich entblößten.

Die folgenden Notizen, die ich der Güte des Herrn Professor Oppenheim verdanke, betreffen ebenfalls einen in diese Kategorie gehörigen Fall, der durch die Mannigfaltigkeit seiner Symptome und auch durch die hereditären Verhältnisse ausgezeichnet ist.

H.,, Jbl., 22 Jahre alt. Vater litt an lokaler Synkope und Gelenkserschläggen, die vorübergehend waren und als vasomotorische gedeutet wurden, außerdem an Zwangsvorstellungen und Neurasthenie. Pat. selbst litt an Erythrophobie, Urticaria, außerdem seit dem Alter von 14½ Jahren an dauernden Menorrhagien, die auftraten, nachdem sie vorher six Jahr lang ziemlich regelmäßig unregelmäßig waren. Die Blutungen sind bald stärker, bald schwächer, ohne lokalen Befund. Sie traten nur einmal nach dem Gebrauch kalter Bäder für längere Zeit zurück; jede örtliche Behandlung ist erfolglos.

Ausgeprägtere Raynaud'sche Symptome, wie Synkope locale oder Asphyxie locale sind seltener. Fälle der Art, die auch in ihrer sonstigen Symptomatologie der Raynaud'schen Krankheit nahe standen,

sind von Joseph (Fall 1), Starr, Widowitz, Calman, Schlesinger mitgeteilt worden. In Schlesingers Fall, der schon einmal erwähnt wurde, wo ein intradurales Sarkom durch Kompression des Rückenmarks Paraplegie hervorgerufen hatte, wechselten in den gelähmten Gliedern flüchtige Ödeme mit den Erscheinungen von Asphyxie und Erythromielalgie; derselbe Fall ist auch von Calman beschrieben worden. Bei Starr finden wir eine Beschreibung eines Falls, der der Raynaudschen Krankheit zum mindesten sehr nahe steht.

20jährige Frau. Seit Weihnachten 1891 ohne Kälteeinwirkung Schwellungen, die sich auf die Finger und den Damm der linken Hand erstreckten, die Hand selbst blieb frei. Die Finger wurden dunkelblau, geschwellen, hart, stief und wenn sie der Kälte ausgesetzt sind, sehr schmerzhaft. Keine Anästhesie. Kälte wird unangenehm empfunden als an der anderen Hand. Das Ödem konnte leicht, aber nicht dauernd zurückgebracht werden, ebenso behielt die dunkle Farbe immer gleich wieder. Wärme brachte Besserung. Es handelte sich im ganzen um dauernde, aber meistens exazerbierende Veranlassungen.

Ich glaube, der Fall gehört nicht zur Quinckeschen Krankheit, sondern zur Raynaudschen; von den typischen Fällen dieses Leidens weicht er aber außer durch die Asymmetrie durch die Stärke des Ödems, das sonst bei der Raynaudschen Krankheit nur angedeutet zu sein pflegt, ab.

Die erste Beobachtung von Widowitz steht dagegen, trotz Raynaudscher Züge, dem flüchtigen Ödem viel näher.

5jähriger anatomischer Knabe. Vater neuropathisch. Vor zwei Jahren traten beim Pat. periodisch Schwellungen der Finger der linken Hand nach längeren Aufenthalt in kalter Luft auf. Seit jener Zeit traten wieder Schwellungen der Finger, auch der rechten Hand, bei gleichem Anlaß, und auch der Wangen. Fingerbewegungen dadurch unmöglich, das Gesicht entsetzt. Es traten sich Halb-Ödeme, an den Rändern etwas dunkler gefärbte, schaff ungeschriebene Schwellungen, nicht über das Metacarpalalgengelenk hinausreichend, an den Wangen entstehen meist kreisförmige Schwellungen; je länger Pat. im Freien ist, desto stärker ist die Schwellung. Nach kurzem Aufenthalt im warmen Zimmer verschwindet sie sehr bald. — Alles Dinge stets normal.

Hier stimmt die Lokalisation der Schwellungen an den tipfelnden Teilen und ihre Farbe zur Raynaudschen Krankheit, dagegen die Art der Ödeme, das Fehlen sensibler Störungen, insbesondere von Schmerzen zum flüchtigen Ödem, so daß wir hier eine ausgeprägte Zwischenform dieser beiden Krankheiten vor uns haben. Ähnlich steht es mit Josephs Fall.

5jähriger Knabe. Letzt Jahre alter Vetter des Mutter leidet an Schwellungen, sonst keine Heredität. Vor zweieinhalb Jahren bei windigen Wetter merkt kleine Schwellungen im Gesicht und an den Händen. Die Schwellungen sehen wie Basen aus. Im Zimmer verschwinden sie nach 5–15 Minuten; merkt kann sie an von Kleidung bedeckten Körperstellen vor. Stets warm im Winter bekleidet. Sehr leichtes Schütteln. Im kalten Winter enthielt das Kind, während seine Fäße

sich sehr kalt anfühlen, unter starken Schüttelfrost einen dunkel-schwarzen Urin. Das wiederholte sich im ganzen Winter. Einmal froren bei mäßiger Kälte auch die Ohren an und weiden sich, wenn die Schwellungen auftreten, die Ohränder stets livide gefärbt; ebenso treten auch im Gesicht und an den Händen bei der geringsten Kälte neben den Schwellungen bläuliche Flecke auf. Um diese Zeit ist der Kräfte stets still und schmerzlos, klagt über Magenschmerzen. Josephs klinische Beobachtung bestätigt die anatomischen Angaben: bei mäßiger Kälte Auftreten erbsen- bis pfannkuchengroßer Schwellungen an an unbedeckten Stellen, z. B. nicht an befeuchteten Händen, dazwischen livide Flecke; Kräfte locken. Einmal tritt bei 2° Kälte, neben den Ödemen an Händen und Füßen, Entleerung eines blutroten Urins ein, in dem deutlich Hämoglobin nachgemessen wurde, während Blutkörperchen fehlten.

Was die Hämoglobinurie betrifft, so nimmt Joseph an, daß durch die Kälte in den ödematösen Partien ein Blutkörperchenanfall eintritt, der dann die Hämoglobinurie bedingt. Jedenfalls erinnert sie uns an das Vorkommen von Hämoglobinurie bei der Raynandschen Krankheit, wo wir uns über ihre Pathogenese schon ausgelassen haben. An Raynandsche Krankheit erinnert uns hier weiter die auf die exponierten Teile (Wangen, Hände, Füße, Ohren) beschränkte, die Schwellungen begleitende Asphyxie. Zum typischen Bild der Raynandschen Krankheit fehlen nur die Schmerzen. Außerdem sind die Schwellungen durchaus die der Quinckschen Krankheit, so daß wir auch in diesem Fall ein vollkommenes Übergangsbild vor uns haben.

In neuerer Zeit sind noch weitere Beispiele der interessanten Kombination von paroxysmaler Hämoglobinurie mit angioneurotischen Ödemen beschrieben worden. Roques stellte einen Kranken vor, der seit drei Jahren an einer unter dem Einfluß von Kälte eintretenden, paroxysmalen Hämoglobinurie leidet. An allen Stellen, an denen die Luft einwirkt, bildeten sich in diesem Fall flüchtige Schwellungen von etwa 2½ stündiger Dauer. Ausführlicher berichtet ist der Fall Wendes.

Hier trat bei einem 64jährigen Mann, der sich stets viel der Kälte ausgesetzt hatte, ohne daß aber jetzt gerade eine besondere refrigerationsartige Schädlichkeit beobachtet werden konnte, plötzlich eine Spannung am rechten Handrücken auf, und es entstand hier eine sieben Zoll im Umfang messende und allmählich zwei Zoll über die Umgebung sich erhebende Schwellung, in der ein Fingerring nicht bestehen blieb. Die Farbe war Anfangs normal, später etwas cyanotisch, es bestand geringe Taubheit und Steifigkeit, sonst war die Sensibilität normal. Erst nach zehn Tagen schwand diese Schwellung ganz. Vorher aber traten ähnliche Schwellungen aber der Vorderseite des linken Unterarms und dann im Gesicht auf; sie waren von normaler Farbe. Der Urin war am ersten Tage fast schwarz, enthielt große Mengen Erythrocyten, zahlreiche Hämocylinder, gar keine roten Blutkörperchen; nach 24 Stunden enthielt er weniger Hämoglobin, nach vier Tagen war alles normal. Am Tage nach dem Beginn des Anfalls enthielt das Blut 3½ Billionen, nach vier Tagen 4½ Billionen rote Blutkörperchen; deren Gestalt war unverändert, ebenso wie die Zahl und die Gestalt der weißen.

Eine Kombination von Hämoglobinurie und flüchtigen Ödemen beziehungsweise wohl besser gesagt das Auftreten symptomatischer

flüchtiger Ödeme bei Hämoglobinurie beschreibt Valobra. Bei einer 26-jährigen Schneiderin nahm jede Nacht gegen 11 Uhr der Urin eine dunkelrote Färbung an. Die spektroskopische Untersuchung ergab deutlich die Hämoglobulinlinie, die mikroskopische ergab keine roten Blutkörperchen im Urin. Gegen 2 Uhr morgens beginnt die Hämoglobinurie zu schwinden; mittags ist der Urin vollkommen klar und frei von Hämoglobin. Die Pathogenese dieser Anfälle blieb unklar; weder Kälte, noch Ermüdung, noch Malaria, noch Syphilis kamen in Frage. Jeder Anfall von Hämoglobinurie war nun von einem Auftreten von Urticaria an Rumpf und von flüchtigen Schwellungen am Fuhrücken, Augenlidern, Wangen und hiezuweilen von profusem Schweißausbruch begleitet. Diese Symptome schwanden zusammen mit der Hämoglobinurie. Die Anfälle wurden unter Ruhe und entsprechender Diät etwas besser und der Patient entzog sich der Beobachtung. Daß Urticaria-quadriden gelegentlich in Fällen paroxysmaler Hämoglobinurie vorkommen, besonders an den der Kälte exponierten Stellen, wird von Mannaberg und Donath betont. Als eine besonders starke Ausprägung dieser Begleitsymptome sind die Anschwellungen in Valobras Fall anzusehen.

Auch in ausgebildeten Fällen Raynandscher Krankheit ist, wie wir schon sahen, einige Male Urticaria beschrieben worden (Solis-Cohen) und auch flüchtige Ödeme wurden beobachtet (Lévi, Solis-Cohen). In dem von uns bereits ausführlich mitgeteilten Fall von Weiß trat ein Hydrops articulo-rum intermittens auf. Auch in einem Fall von Aërosphyxia chron. habe ich das Auftreten flüchtiger Ödeme konstatieren können.

Ich selbst habe in den letzten Jahren eine Reihe von Fällen beobachten können, in denen die Symptome der Raynandschen Krankheit in ihrer ganz ausgeprägten Form vorhanden waren, bei denen auf der anderen Seite auch ganz charakteristische flüchtige Ödeme auftraten. Einen dieser Fälle habe ich schon oben erwähnt. In drei anderen bestanden die Raynandschen Symptome in Aphyxie und Synkope locale, daneben waren flüchtige Schwellungen an allen möglichen Stellen des Körpers zu beobachten und schließlich waren auch allgemeine nervöse Beschwerden, die zum Teil auf eine Labilität des Vasmotoren-systems zu beziehen waren, nachweisbar. Zwei weitere Fälle dieser Art verdienen eine genauere Erwähnung.

Bei dem einen, von dem ich gelegentlich schon gesprochen habe, handelt es sich um eine zur Zeit der ersten Untersuchung (im März 1903) 35-jährige Frau, deren Krankheit sechs Jahre früher begonnen hatte. Damals wurden ihr beim Schreiben die Finger der rechten Hand ganz weiß und gefühllos und auf dem Handrücken zeigte sich ein runder weißer Fleck von der Größe eines Zehnpfennigstücks. Diese Erscheinungen wiederholten sich in immer kürzeren Zwischenräumen; später wurden auch die Hände in Mitbeteiligung gezogen in der Form, daß an den Fäßen Anschwellungen auftraten, die zum Teil von sehr intensiver, in der Feme sitzenden

Schmerzen begleitet waren. Diese Schmerzen kehrten bei den späteren Anfällen nicht mehr wieder, es traten jetzt nur noch Schwellungen ein, die teils am Fußrücken, teils an der Innenseite des Fußes saßen. Auch an die Stelle der weißen Flecke auf dem Handrücken traten ähnlich Anschwellungen, immer an derselben Stelle mit meist sofort begrenzter Rötung, späterhin stellten sich Anschwellungen an dem Knie, an dem Ellbogen sowie Steifheit der Muskeln am Oberarm ein, dabei waren die Gelenke stets frei. Im Sommer 1900 eine fünfjährige Radiker in Dornhausen; im Winter darauf traten die Anschwellungen in längeren Zwiischensäumen und von weniger Schmerzen begleitet auf, dagegen war das Absterben der Hände und Füße in der kalten Jahreszeit öfter als je. Reiben, Bärhen der Hände, stundenlanges Spaziergehen ist ganz wirkungslos, die Weiß- und Blaufärbung der Hände und Füße hielt trotzdem immer weiter an. Von günstiger Einflüß dagegen war das Trinken von heißen Getränken. Im Sommer 1902 fünfjährige Radiker in Naumburg, daneben schwedische Heilgymnastik. Einnehmen von Eisen.

Darauf trat eine Besserung ein, im Sommer 1903 wiederum eine Radiker, die jedoch keinen Erfolg hatte. Nachdem die Pat. nach fünf Wochen nach Hause zurückgekehrt war, setzten die Anschwellungen mit solcher Heftigkeit ein, daß sie bis zum Zeitpunkt meiner ersten Untersuchung keinen Tag von Schwellungen frei war. Die Schwellungen sitzen am ganzen Körper, jetzt häufig vorwiegend um die Augen herum, von den Schwellungen der Hände und der Füße werden niemals beide Hände oder Füße gleichzeitig, sondern immer abwechselnd eine betroffen. Im allgemeinen wirkt die Hitze ungünstig auf die Anschwellungen und die Kälte in gleicher Weise ungünstig auf das Absterben der Finger, doch genügt es mich, daß die Finger bald mit kaltem Wasser in Berührung kommen oder längere Zeit eine Fohlenhülle oder eine Nadel in den Fingern gehalten wird, um ein Weißwerden oder Absterben der Finger herbeizuführen. Abgesehen von äußeren Einflüssen sind auch innere seelische Erregungen häufig, Anschwellungen, Absterben der Hände und der Füße auftreten zu lassen. Die Anschwellungen sind oft nach wenigen Stunden wieder vollkommen verschwunden. In letzte Zeit erstrecken sich die Anschwellungen auch auf die Finger. Ich habe dann die Pat. im Herbst 1903 und im darauffolgenden Winter einige Monate lang behandelt. Des von ihr gegebenen Schilderung habe ich nur wenige hinzuzufügen. An den Händen bestand seitwieg ganz außerordentlich schwere Asphyxie, die namentlich in den kälteren Zeiträumen oft tagelang andauerte, wie nur mehr oder weniger erheblichen Intensitätschwankungen. Im ganzen trat die Asphyxie locale stärker in Erscheinung wie die Symploc locale. Die Hände waren im ganzen gelähmt, etwas plump und unfähig und erinnerten an das Bild, welches die Kranken mit der Akroasphyxia chronica hypertrophica darbieten. Dazu kamen dann Schwellungen an allen möglichen Stellen des Körpers, meist mit sehr ausgesprochenen Allgemeinerecheinungen, Temperatursteigerung bis 39 Grad, Frostsch, Kopfschmerzen usw.

Ich hatte bereits oben erwähnt, daß es in diesem Falle häufig zu Schwellungen in den Muskeln selbst gekommen ist, aus denen dann Schmerzen und Steifheitszustände in den Muskeln resultierten. Besonders häufig befallen waren die Finger der Unterarme; auch Gelenkergüsse, namentlich in die kleinen Fingergelenke hinauf und in das Knie runden vor mir mehrfach beobachtet. Die Untersuchung hatte im übrigen ein negatives Resultat. Der Urin war stets frei von pathologischen Bestandteilen, am Coe war nichts Wesentliches nachzuweisen. Die Behandlung, die in subkutanen Injektionen von Arsen, Galvanisation des Sympathicus, verschiedenen Formen von Bädern bestand, hatte nur zeitweiligen Erfolg. Ich habe die Pat. dann im Oktober 1905 wieder gesehen. Sie selbst resp. ihr Mann gaben mir folgenden Bericht über ihren weiteren Zustand: die Anschwellungen an den Extremitäten traten in der Zwischenzeit bald häufiger, bald seltener auf. Blauschollen und Absterben der Finger variierte nach je nach der Jahreszeit, es war so namentlich alles beim alten

geblieben. Nur während eines fünfwöchigen Aufenthaltes in Oberhof schien sich der Zustand etwas besser zu gestalten. Um so schmerzhafter kam es gleich nach ihrer Rückkehr, die gegen Ende August erfolgte. Am 6. September 1905 trat nun wiederum eine mäßige Anschwellung der rechten Ohrspeicheldrüse auf. Es waren keine Schmerzen, kein Fieber vorhanden, am 3.—4. Tage danach war die Anschwellung verschwunden, am 12. Oktober hatte sie wegen ein spannendes Gefühl am rechten Ohr. Im Verlauf von zwei Stunden war die ganze rechte Gesichtshälfte stark angeschwollen. Pat. hustete, die Temperatur stieg bis 39° und sie hatte starke Schmerzen, die bis zum 16. Oktober anhielten. Am 26. Oktober war die Anschwellung wieder völlig verschwunden. Am 4. November trat von neuem ein spannendes Gefühl am rechten Ohr auf und im Verlauf von zwei Stunden schwellte die Gegend vor dem Ohr wieder stark an, die Schmerzen waren mäßig, die Temperatur stieg bis $38,5$. Am nächsten Tage trat an beiden Oberschenkel ein Herd von Haut-rotten Flecken auf, die Stellen waren empfindlich und machten beim Liegen die stärksten Beschwerden; sie verschwanden erst nach vier Tagen. Vom 2. November ab ist das Fieber und sind die Schmerzen geschwunden, am 16. November ist jede Spur einer Anschwellung verübert. Im Laufe der nächsten Monate konstatierten diese Anschwellungen nun sehr häufig und betrafen allmählich nicht nur mehr die rechte, sondern später auch die linke Seite. Ich habe den Wechsel der Erscheinungen wiederholt selbst beobachtet. Allmählich resultierte eine dauernde Schwellung beider Ohrspeicheldrüsen. Im weiteren Verlauf kam es auch zu einer Schwellung der beiden Sublingualdrüsen und Submandibulardrüsen, wie das von mir auch schon früher geschildert worden ist. Die Pat. verschwand dann wieder aus meiner Beobachtung, bis ich sie im Winter 1906/11 wieder sah. Nun waren dauernd beide Ohrspeicheldrüsen und beide Submandibular- und Sublingualdrüsen geschwollen. Sie übten sich hart und fest an, aber die Schwellung ist keine kretische, sondern ist noch immer erheblichen Intensitätsschwankungen unterworfen. Die Ounase und die Synkope der Hände war ebenfalls ganz außerordentlich ausgesprochen. Die Schwellung der Hände bestand dauernd in mäßigen Grade. Die Hände waren außerordentlich kalt, die Nägel waren stark dehnbar und das mehren bemerken auch die flüchtigen Schwellungen an den verschiedenen Stellen des Körpers und wiederholten sich in unregelmäßigem Wechsel. Daven mögen einige Notizen als Beispiel gelten. Am 25. Februar 1911 waren beide Kniegelenke, die linke Hand und die linke Schultergelenk angeschwollen, Temperatur $37,5$. Am 26. Februar die rechte Hand geschwollen, die Schwellung dauerte bis zum 4. März. Am 24. März Schwellung über dem Dorsum der linken Hand. 26. März Schwellung über dem Dorsum der rechten Hand, beide Schultern angeschwollen. Vom 1. bis zum 7. April schwellt die linke Ohrspeicheldrüse wieder sehr stark an, die Temperatur betrug $38,2$. Am 20. April ist die linke Hand geschwollen, Temperatur $37,5$. Am 21. April Schwellung des rechten Fußes, rote und violette Flecke besonders über der Schulter. Temperatur $38,5$. Am 12. und 18. Mai die rechte Hand geschwollen, am 14. und 16. Mai Schwellung am linken Oberschenkel. Temperatur $37,5$. Auch die durch Ergüsse in die Peritonealhöhle des Ovariums hervorgerufene Stöckigkeit macht sich wiederum mehrfach bemerkbar. So ist z. B. am 3. Mai der rechte Arm vollkommen steif, Temperatur $37,5$. Am 5. Mai ist alles normal, Temperatur 36° . Ganz außerordentlich quälend ist für die Pat. eine dauernde, fast absolute Trockenheit im Munde, von der ich nicht überzeugen konnte. Dieser Mangel an Speichel verhindert sie an der Nahrungsaufnahme von festen Gegenständen fast vollkommen. Eine Injektion mit Physostigmin ergibt starken Hitzgefühl, Rauschen im Kopf, Schwitzen, aber keine stärkere Speichelsekretion. Behandlung mit Vasocortin bleibt ohne jeden Erfolg.

Hier haben wir also ein recht kompliziertes, schweres und hartnäckiges Krankheitsbild vor uns. Auf der einen Seite stehen die Ray-

naudischen Symptome, die in voller Intensität ausgeprägt sind, wenigstens was die vasomotorischen Erscheinungen angeht, während sich die trophischen Störungen weniger in der Form der nekrotischen Veränderungen als in der einer dauernden Schwellung der Weichteile an den von vasomotorischen Störungen befallenen Extremitäten kundgeben. Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Erscheinungen des flüchtigen Ödems. Bemerkenswert ist erstens das starke Hervortreten der allgemeinen Symptome, das häufige Auftreten von ziemlich erheblichem Fieber, die Lokalisation der Schwellungen, die teils typischen Hautschwellungen, aus Ergüssen in die Muskeln und in die Gelenke bestehen und schließlich das Befallenwerden der Mundspeicheldrüsen, deren Pathogenese ja freilich nicht ganz eindeutig und klar ist, die aber immerhin doch namentlich in diesem Zusammenhange mit größter Wahrscheinlichkeit als Äußerung der Angioneurose aufzufassen ist.

Ein recht kompliziertes Krankheitsbild bietet auch der folgende Fall dar, der seine Symptome teils der Raynandschen Krankheit, teils der Erythromelalgie, teils dem angioneurotischen Ödem entnimmt.

Es handelt sich um eine 46jährige Frau, die im Juli 1906 von mir zum erstenmal untersucht wurde. Sie hat schon seit einer Reihe von Jahren Beschwerden, ist mehr, angegriffen, unaktiv, klagt über Druck über den Augen, über ein zusammenrückendes Gefühl in der Schläfe. Der Kopfschmerz ist dauernd, eigentliche Migräneshalle hat sie nicht. Früher war sie höchst leicht und munter. Sie hat immer darüber zu klagen gehabt, daß sie so leicht rot wird. Seit zwei Jahren ist eine Verschlechterung ihres Befindens eingetreten und zwar hat das begonnen mit Schmerzen in den Fingerspitzen, diese schwellen dick an, werden rot, haben aus wie entzündet, es trat ein sehr heftig brennender Schmerz ein, die Hände, die Füße und der Schenkel dehnten sich dann auf die Hände aus. Ein Jahr später traten Schwellungen an verschiedenen Stellen des Körpers auf. Es bildeten sich da weiche erhabene Stellen, die zunächst außerordentlich schmerzhaft waren, bis die Schwellung eine gewisse Höhe erreicht hatte. Dann ließ der Schmerz nach. Neben den Schwellungen in der Haut kam es zu Schwellungen in verschiedenen Gelenken, besonders im Knie. Die Schwellungen waren begleitet von allerlei Allgemeinerscheinungen, und wie genaue Temperaturmessungen ergaben, auch von erheblichen Fiebersteigerungen bis über 39°. Dieser Zustand dauerte bis Weihnachten 1908. Dann trat bis April 1909 eine Besserung ein. Dann kam plötzlich durch Aufregungen eine neue Verschlimmerung. Dieselbe wurden die Beschwerden durch Darreichung einer Reihe von Antirheumika, insbesondere des Coffein, des Pyrazinon und des Laryogenin erheblich gebessert. Die Schwellungen wurden gelindert, die Schmerzen ebenso und Neben dazu schließlich ganz weg. Diese Besserung hielt sechs Wochen lang an, bis dann erneut leichte Beschwerden auftraten, die sich allmählich verstärkten; zersogen trat sie dann in meine Behandlung. Die jetzigen Beschwerden sind wieder die alten. Bei allen möglichen Anlässen, insbesondere bei Aufregungen, aber auch ohne diese treten in den Händen und namentlich in den Fingerspitzen brennende, stechende, heiße Schmerzen ein, die Finger werden rot, schwellen an, dazwischen kommt es zeitweilig auch zu einem Absterben der Finger, einer weißen Verfärbung, die aber ohne erhebliche Schmerzen abklingt. Diese Veränderungen sind symmetrisch

an beiden Händen und ebenso an den Zehen beider Füße entwickelt. Die Symmetrie ist immer sehr ausgesprochen. Die Pat. ist durch ihre Schmerzen in Händen und Füßen in ihrer Tätigkeit außerordentlich behindert. Sie kann sich nicht anziehen, sie kann nicht stehen, sie kann nicht gehen, muß deswegen den größten Teil des Tages ruhig zu Hause liegen oder sitzen. Die Stellung der Hände ist ohne wesentlichen Einfluß, auch das Herabhängenlassen der Füße erhöht die Beschwerden nicht. Zeitweilig finden sich auch an anderen Stellen rote Flecke, an denen die Haut sich heiß anfühlt, z. B. über beiden Orbitas, ähnliche Stellen an der Nase, an der Oberlippe. Daneben treten dann Schwellungen auf. Die Schwellungen sitzen an den verschiedensten Stellen des Körpers; an der Schulter, am Ellbogen, im Gesicht an den Backen; sie treten unter heftigen Schmerzen ein, wie die Pat. das schon geschildert hat; die Haut ist blass, die Größe der Schwellungen variiert, sie sind im ganzen nicht größer als etwa ein Faustmarkstück. Zu ihrer Entwicklung brauchen sie ein paar Minuten und sie halten ein paar Stunden an. Die Stellen, an denen die Schwellungen häufiger kommen haben, sind zum Teil etwas pigmentiert. Pat. macht ferner die Angabe, daß ihre Augenbrauen in letzter Zeit ausgefallen sind. Die Allgemeinsymptome sind auch während des jetzigen Anfalls erheblich. Es kommen namentlich mit dem Auftreten von Schwellungen fast regelmäßig Temperatursteigerungen bis 38° vor. Daneben große Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Trägheit und Schlaflosigkeit. Die Untersuchung ergibt sonst nicht viel. Die inneren Organe sind vollkommen normal, der Urin enthält keine pathologischen Bestandteile. An den Händen ist die Epidermis etwas verdicht. Demgegenüber erscheint das Unterhautzellgewebe ein wenig geschwunden zu sein, so daß die verdickte Haut eher abnorm leicht verschieblich ist. Sensibilität und Motilität am ganzen Körper vollkommen intakt. Es wird eine Arsenbehandlung eingeleitet, die aber ohne Erfolg ist. Im Gegenteil es kommt allmählich zu einer Verschlimmerung. In den letzten Tagen des August sind neue Schwellungen an der Schulter, am Knie aufgetreten und auch einzelne neue rote Stellen an den Fingern. Am 30. August wird eine Schwellung des ganzen rechten Zeigefingers beobachtet. Am desselben Tage findet sich eine Schwellung in den Deltamuskeln des rechten Arms, der nicht völlig gestreckt werden kann. In den nächsten Tagen finden sich an den Fingern und zwar an den zweiten Interphalangealgelenken kleine Anschwellungen an beiden Seiten des Gelenks, die recht schmerzhaft sind. Die allgemeine Müdigkeit ist in dieser Zeit sehr groß. Bei der Untersuchung sind die Fingerspitzen jetzt meist kalt, kälter als normal, dabei empfindet die Pat. doch ein sehr unangenehmes Brennen. Eine Gangrän ist niemals aufgetreten. Der Gehörseh von Arznenalgie ist auch jetzt sehr erheblich die Beschwerden der Pat., die dann Ende September 1905 aus meiner Behandlung verschwindet. Ich habe sie im November 1911 wieder gesehen; die schmerzhaften Anfälle sind verschwunden, das Allgemeinschleiden ist gebessert, sie hat 20 Pfd. an Gewicht zugenommen. Die Haut der Hände ist sehr weiß, in großen Falten aufhebbar, das Unterhautgewebe ist reduziert, die Gelenke der Finger sind zum Teil aufgetrieben geblieben, das Nagelwachstum ist verkleinert.

Die Symptome der Quinckeschen Krankheit sind auch in diesem Falle recht ausgesprochen. Die Allgemeinsymptome (Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unlust, die Fiebertemperatur, die flüchtigen Schwellungen an verschiedenen Stellen der Haut, Ergüsse in die Gelenke, daneben noch vereinzelt Ergüsse in die Muskeln. Dem kommen dann ausgesprochene vasomotorische und sensible Reizerscheinungen an den gipfelnden Teilen der Hände und Füße, die in der Mitte zwischen Raynaudischen und Erythromelalgiesymptomen

stehen. Neben passageren Synkopen locale können es zu einer regionalen, mit sehr heftigen Schmerzen einhergehenden Hyperämie, während die Asphyxie vollkommen in den Hintergrund tritt. Nekrotisierende Prozesse sind auch hier nicht vorhanden. Bemerkenswert ist auch das Auftreten von hyperämischen Stellen außerhalb der gipfelnden Teile des Körpers. Bemerkenswert ferner auch die sehr erhebliche Schmerzhaftigkeit beim Auftreten der Ödeme, die dann in den Hintergrund tritt, wenn die Ödeme voll entwickelt sind. Eine Angabe hat nur die Patientin noch gemacht, die ich in der Krankengeschichte nicht notiert habe. Sie gab an, daß schon seit vielen Jahren anfallweise die Haut an den Fingern rutzig wurde, als ob sie die Finger lange ins Wasser getan hätte. Es sind das offenbar Kontraktionszustände in der glatten Muskulatur der Haut, Zustände, die ich gelegentlich auch sonst beobachtet und im Kapitel Akroparästhesie auch schon erwähnt habe.

Das Vorkommen von Symptomen von Erythromelalgie im Rahmen der Quinckeschen Krankheit ist in der Literatur sonst nicht erwähnt worden, nur E. Schlesinger hat angeblich noch eine Kombination von angio-neurotischen Ödemen und Erythromelalgie beobachtet. Es handelt sich da um einen 38-jährigen Weizenbäcker, der früher Laes gehabt hatte, und der stark getrunken hat. Er hat seit einem Jahr Schwellungen an den verschiedensten Körperteilen: an Augenlidern, Scrotum, Unterlippe, Zunge, die ganz plötzlich ohne Schmerzen auftreten. Nach einem Spaziergang von 5 Stunden und einem alkoholischen Exzeß bekam er plötzlich pulsierende stehende Schmerzen an den beiden Zehen, die sehr heftig waren, so daß er nicht auftreten konnte. Es war eine bläulich rote Schwellung der Endphalangen, die scharf abgegrenzt war. Die Endphalangen waren wärmer als normal. Zu gleicher Zeit traten eine Reihe von markstückgroßen Quaddeln an der Innenseite beider Unterschenkel auf, ebenso am Scrotum. Das Gefühl war für Berührung, Schmerz und Wärme fast aufgehoben. Die Achillessehnenplantarmere waren erloschen, die Patellarreflexe abgeschwächt. Hier dürfte es sich gewiß nicht um echte Erythromelalgie gehandelt haben, sondern um polyneuritische Symptome mit starker Ausprägung der vasomotorischen Erscheinungen. Das Auftreten flüchtiger Schwellungen beim Alkoholismus chronicus, der auch die Polyneuritis veranlaßt haben dürfte, ist bekannt.

Wilhelm beschrieb folgenden Fall:

Eine 51 Jahre alte Frau, die aus gesunder Familie stammt, berichtet, daß sich bei ihr schon in früher Kindheit an den Fußsohlen Blasen bildeten, die sich späterhin besonders leicht dann wiederholten, wenn die Kranke einen etwas längeren Spaziergang unternahm. Auch überall dort, wo die Kleider fester anlagen, oder ein stärkerer Druck auf die Haut ausgeübt wurde, z. B. beim Schneiden des Rockbänder, zeigte sich die außerordentliche Empfindlichkeit der Haut in sofort auftretender Blasenbildung, ebenso bei Einwirkung thermischer Einflüsse und erst entwickelte sich die Blase nur dann, wenn Pat. ihre Hände durch einige Zeit in warmes Wasser

holt, niemals bei Einwirkung von kaltem Wasser. Deshalb kann die Kranke auch mit nicht richtig temperierte Bäder nehmen, da sonst der ganze Körper von den Flasen, die mit Wasser, massenhaft Flüssigkeit gefüllt sind und Bienen- bis Taubensgröße erreichen, bedeckt wird. Sie trocknen ausweislich nach mehreren Tagen ein, ohne zu verheilen. Im Sommer sind die Blasenempfinden bläßler als im Winter. Keine ähnliche Erkrankung in der Familie. Neben dieser Hautaffektion, die seit der Kindheit in ganz gleicher Weise bis jetzt persistiert, besitzt noch eine zweite. Die Kranke bemerkt angeblich seit dem Eintritt der Menstruation bei heftigen psychischen Erregungen das Auftreten von symmetrischen Anschwellungen auf der Stirn eines fingerhutgroßen vorwiegenden skale Inzerts. Die Schwellungen dauern meist nur kurze Zeit, selten länger als eine Stunde und gingen mit dem Schwinden des Affekts vollständig zurück. Sie waren stets blaß und weiß, nie schmerzhaft. Anfangs ziemlich selten auftretend, in Intervallen von 4–5 Monaten, werden sie späterhin vom 20. Lebensjahr an häufiger, kommen aber immer nur im Zusammenhang mit Affekten und niemals in Abhängigkeit von einem körperlichen Leiden oder der Menstruation. Auch eine Constipation äußerte an dem Verhalten der Schwellungen nichts, wohl aber hörten während dieser Zeit die Blasenempfinden vollständig auf. Seit einem Jahr, nach einer Infektion, selbst intensiver Kopfschmerz. Dabei neigen sich die Ödeme der Stirnhaut in gleicher Weise wie bisher nur bei Erregung. Seit $\frac{1}{2}$ Jahren ist aber wiederum eine Änderung eingetreten, als die Ödeme stabil wurden, wobei sich innerhalb noch eine nervöse Beeinträchtigung bei psychischen Affekten stark eine stärkere Schwellung kündigte. Vor drei Jahren Klimakterium, seit dieser Zeit leidet die Pat. an regelmäßig alle vier Wochen wiederkehrenden äußerst profusen Durchfällen, die sich ohne Diätfehler und ohne ein direkt verursachendes Moment einstellen und angeblich jeder Modifikation trotzen. Seit dieser Zeit besteht seitwärts heftige Erblindung. Die Untersuchung ergibt, daß die inneren Organe völlig normal sind, der Urin ist frei von pathologischen Bestandteilen. Über beiden Augenbrauenhöfen, entsprechend deren medianen Hälften und annähernd denselben parallel finden sich zwei symmetrisch gegenüber, sich nahezu berührende Hautrötze. Die Erhebung beträgt mehr als 1 cm über das Niveau der anliegenden Haut. Die Haut selbst ist vollkommen glatt, glänzend und blaß, wenig leicht gerötet. Die Anschwellungen fühlen sich weich an und sind auf Druck nicht empfindlich, der Fingeringdruck bleibt durch längere Zeit bestehen. Selbst befindet sich rings um Körper ein ödematöses Anschwellen. Wiederholt werden die erwähnten Blasenempfinden beobachtet. Sie sich jederzeit künstlich erzeugen lassen, indem die Backhäute etwas stärker ausgezogen oder die Hände in warmes Wasser getaucht werden. Die Blasen sind meist beknagend mit wasserklarem Inhalt gefüllt, der sich in der Regel am zweiten oder dritten Tage trübt, ohne eitrig zu werden. Eine Rötung, Schwellung oder ein Jucken geht dem Eintreten der Blasen nicht voraus. In der Regel erfolgt nach kurzer Zeit ein Entrocknen der Blase und die Haut gewinnt wieder ihr normales Aussehen. Eine Narbenbildung erfolgt nicht. Nur dort, wo Blasenbildungen sich sehr häufig einstellen, bildet eine leichte Pigmentierung in der Haut zurück. Auch die geschilderten Durchfälle kamen wiederholt zur Beobachtung. Ihre Zahl betrug während 24 Stunden mehr als 20. Nach Durchsicht von 3 g Prostatium sank die Zahl der flüssigen Stuhlginge auf zwei und nach einem weiteren Tage wurde kein flüssiger Stuhl mehr abgesetzt. Die Untersuchung des Nervensystems ergab keine Störung.

Der Autor hat keinen Zweifel über die Zugehörigkeit der rezidivierenden Ödeme der Stirnhaut zum blühigen Ödem. Es handelte sich um einen jenen Fälle, bei dem die Schwellungen immer wieder sich an denselben Stellen lokalisierten, und bei dem sie schließlich nachher

nicht mehr ganz verschwanden. Sehr interessant ist die Kombination mit den seit Jugend bestehenden Bläseneruptionen. Das Bild erinnert durchaus an das der Epidermolysis bullosa.

Als hereditäre Neigung zur Blasenbildung teilte Goldscheider im Jahre 1882 als erster Fälle aus einer Familie mit, bei deren Mitgliedern auf das geringste Trauma hin an den betroffenen Stellen Blasen auftraten. In der Folgezeit ist eine Reihe weiterer derartiger Fälle beschrieben worden. Ich nenne nur die von Valentin, Kühner, Joseph, Bettmann, Bakowski, Petrini; eine ausführliche Darstellung hat das Krankheitsbild durch Leithlen erfahren, dessen Schöpfung ich hier folge. Die Affektion charakterisiert sich durch zwei Momente: die in fast allen Fällen nachgewiesene Heredität sowie die Entstehung der Blasen auf ein geringes Trauma hin. Die Heredität wurde in drei, vier, selbst fünf Generationen beobachtet. Frauen und Männer werden in ziemlich gleicher Weise befallen und übertragen auch in gleicher Weise. Nie wird bei der Vererbung eine Generation übersprungen. In einzelnen Fällen wurden schon bei der Geburt Blasen bemerkt. In anderen beginnt die Blasenbildung kurz nach der Geburt, meist aber erst im zweiten Lebensjahr, wenn die Kinder gehen lernen. Das Leiden besteht das ganze Leben. Die Blasen treten aber entweder nur im Sommer oder besonders während der heißen Jahreszeit auf. Sie können sich an allen Stellen bilden, wo die Haut einer mechanischen Reizung ausgesetzt ist, da wo die Kleidung reibt, wo die Rösche gebunden werden, wo die Strumpfhülsen und die Schuhe drücken, ebenso führt eine fortgesetzte Tätigkeit, wenn sie auch nur mit geringen traumatischen Schädlichkeiten verbunden ist, zur Blasenbildung. Warmes Wasser befördert die Eruption, während Einbettung der Haut dieselbe vermindert. Die Blasenbildung wurde vereinzelt auch auf Schleimhäuten beobachtet. Ein plötzliches starkes Trauma, Schlag, Quetschung rufen keine Blasenbildung hervor, ebenso wenig chemische Reizung. An den betroffenen Stellen entsteht meist ein roter juckender Fleck, auf dem sich unter fortgesetztem Jucken und Brennen nach verhältnißlos langer Zeit eine kleinbohn- bis aufgroße, klar, prallgefüllte, zerthautige Blase, oft von geringerem Umfange als der Fleck bildet. Subjektive Symptome fehlen späterhin zumeist. Die Blasen werden nach verschieden langer Zeit trübe, platzen, worauf eine nässende Fläche zutage tritt, die in zwei oder drei Tagen eintrocknet. Narben bleiben nicht zurück und vorübergehende Pigmentierungen treten nur ein, wenn an den betreffenden Stellen gekratzt wird.

Es wird noch eine zweite Gruppe der Epidermolysis bullosa hereditaria beschrieben, die sich von der eben geschilderten in einigen Punkten unterscheidet. Während bei der typischen Form die Blasen überall dort entstehen, wo die Haut gereizt wird, und nur

seltener auf die Extremitäten beschränkt sind, findet man bei dieser Gruppe häufig eine besondere Lokalisation angegeben, und oft ist auch eine gewisse Symmetrie vorhanden. In einigen Fällen sind es besonders die Extremitäten: Hände und Füße und zwar besonders die Streckseite, die Gelenke, Ellbogen und Kniee, die befallen werden. Außer der Prädisposition für gewisse Stellen und der Symmetrie sind weitere Unterscheidungsmerkmale die den Blasenruptionen folgenden, weitgehenden Hautveränderungen. Es kommt zu Pigmentierungen, zu Narbenbildungen, zur Atrophie der Haut und sehr häufig zu Veränderungen der Nägel. Die Nägel können schon bei der Geburt fehlen oder bald danach ausfallen, wechseln mehrmals, um schließlich ganz oder teilweise auszufallen oder dieselben sind verdickt, rauh, verkrümmt oder in einzelne Schichten gespalten, abblättern oder klauenartig deformiert. Die Schleimhäute werden häufiger befallen als in der ersten Gruppe. Trotz dieser Differenzen weisen Bettmann und Luthien mit Bestimmtheit darauf hin, daß die beiden Gruppen nicht voneinander zu trennen sind.

Die Pathogenese dieser interessanten Affektion ist noch nicht aufgeklärt, obwohl eingehende histologische Untersuchungen bereits vorgenommen wurden. Es ließ sich feststellen, daß die Blase im Rete und zwar in den obersten Schichten desselben liegt. Die Decke wird von der Hornschicht und einem Teil des Rete gebildet, an der Basis finden sich mehr oder weniger zertrümmerte Reteschichten. Die Papillen unter der Blase sind ödematös, die Blutgefäße sind stark erweitert, aber ohne perivaskuläre Infiltration. Für uns ist es besonders bemerkenswert, daß Török als das Wesentliche der Erkrankung eine Gefäßveränderung, eine gesteigerte Reizbarkeit derselben betrachtet, wodurch es leicht zu Ödem, Hyperämie und Transudation kommt. Dieser Auffassung schließt sich auch Luthien an, indem er sagt, die meiste Wahrscheinlichkeit habe wohl die Annahme einer abnormen Irritabilität oder Durchlässigkeit der Gefäße für sich. Dieselbe dürfte aber kaum durch eine Schädigung infolge einer Ansammlung irgendwelcher Stoffwechselprodukte bedingt sein, sondern eher auf einer mangelhaften oder fehlerhaften Entwicklung des Gefäßsystems beruhen.

Der oben beschriebene Fall von Wilhelm weist eine sehr große Ähnlichkeit mit dem Symptomenbild der Epidermolysis bullosa auf. Nur ein wichtiges Moment fehlt allerdings: die Heredität. Vereinzelt sind nicht hereditär und nicht familiäre Fälle aber auch sonst schon beschrieben worden (Fälle von Elliot Russel von Grünfeld, von Knopf und Marks). Das Zusammenvorkommen der Blasenbildung mit dem akuten angioneurotischen Ödem scheint mir nun ein großes Interesse zu besitzen. Schon Valentin hat an Beziehungen gedacht, die zwischen diesen beiden Affektionen bestehen könnten. Die von Wilhelm gemachte Angabe, daß Valentin eine Familie beobachtet habe, bei der die beiden

Erscheinungsreihen zusammen vorkommen, ist unrichtig, es ist ihm nur die Ähnlichkeit des beiden Symptombilder in mancher Beziehung aufgefallen. Kaposi und Luitkha sind für Beziehungen der Affektion zur Urticaria eingetreten, eine Ansicht, die aber Luitkha zurückweist. Ich kann mich aber des Eindrucks nicht entziehen, daß es sich hier um pathogenetisch recht ähnliche Affektionen handeln könnte.

Die von Török und Luitkha vertretene Auffassung der Pathogenese der Erkrankung, von der ich eben berichtet habe, berührt sich sehr nahe mit der Auffassung von der Entstehung der flüchtigen Ödeme. Der Fall von Wilhelm ist natürlich geeignet, in seinem, das Nebereinanderkommen der beiden Erscheinungsreihen so deutlich zeigenden Verlauf eine solche Auffassung zu stützen. Ich möchte noch besonders auf das Auftreten von schweren nervösen Krämpfen bei der Kranken von Wilhelm aufmerksam machen, ein Symptombild, das an die inneren Symptome bei dem flüchtigen Ödem erinnert, das wir auch sonst bei Vasomotorikern häufig genug zu sehen bekommen.

Etienne macht im Anschluß an die Vorstellung eines Falles auf Beziehungen aufmerksam, die zwischen dem akuten Ödemem und dem Herpes bestehen sollen. Er sah einen Fall von Herpes zoster ophthalmicus verbunden mit einem beträchtlichen Ödem des oberen Augenlides, und zwar in einer Ausdehnung, die der Ausbreitung des Herpes ophthalmicus entspricht; er unterscheidet daraufhin zwei Formen, das Oedema zeutur zosteriae und die eigentlichen Quinckeschen Ödeme. Er meint, daß eine Kette von Erscheinungen von dem echten Herpes zoster haemorrhagicus zu den zosteriformen Erythemen, die mit oder ohne Ödem auftreten können, und von da aus schließlich zu den Quinckeschen Ödemen und zur Urticaria führt, und nimmt an, daß die pathogenetischen Bedingungen für alle diese Formen identisch sind, indem es sich um eine sympathische Affektion mit vasodilatatorischen oder vasoconstriktorischen Erscheinungen handelt. Ich glaube, daß man den im Verlauf des Herpes zoster etwa auftretenden flüchtigen Schwellungen nur eine symptomatische Bedeutung beimessen darf, ähnlich wie etwa den die lancinierenden Schmerzen der Tabiker oder seltener den die peripheren Reizerscheinungen bei der Polyneuritis begleitenden flüchtigen Schwellungen, und daß man aus diesen Tatsachen diejenigen Schlüsse bezüglich der Pathogenese ziehen darf, die ich bei der Besprechung dieser symptomatischen flüchtigen Schwellungen bereits erörtert habe.

Daß im Beginn der Sklerodermie flüchtige Ödeme auftreten, ist in dem entsprechenden Kapitel der Sklerodermie schon gezeigt worden. Doch habe ich in der Literatur ebensowenig wie in der eigenen Erfahrung ein Beispiel gefunden, das eine Kombination beider Krankheiten oder eine Vermischung ihrer Symptome aufgewiesen hätte.

Damit sind wir bei den Fällen angelangt, wo bei anderen aus-

gesprochenen Krankheitsbildern gelegentlich auch flüchtige Ödeme vorkommen, die dann aber nicht mehr eine bestimmte Krankheit bilden, sondern nur den Wert eines einzelnen Symptoms haben. Ich habe auf dies Verhältnis schon in dem der Ätiologie gewidmeten Kapitel hingewiesen: wir fanden solche Ödeme als Symptome bei Morbus Basedowii, bei der Migräne, der Tubes als Begleiterscheinung der Blutzuckerkuren. Auch im Verlauf der Malaria sind sie beobachtet worden, und wir werden einen Teil der oben erwähnten, bei der Raynaud'schen Krankheit und der Erythromyalgie beobachteten flüchtigen Schwellungen auch dahin rechnen müssen.

Die Entscheidung darüber, ob wir hier den Ödemen die Selbständigkeit abzusprechen haben, oder ob wir eine Kombination zweier Krankheitsbilder oder Misch- und Übergangsformen annehmen haben, wird keineswegs immer leicht sein. Ich habe darauf schon hingewiesen und auch schon die Schwierigkeiten erläuternde Beispiele erbracht.

Es gibt noch andere bisher von mir nicht erwähnte Krankheiten, bei denen flüchtige Ödeme auftreten, und aus die Entscheidung über ihre Stellung oft recht schwer wird; das ist zunächst die Purpura. Es ist eine ganze Anzahl von Beobachtungen von Purpura berichtet worden, in deren Verlauf akute, flüchtige Ödeme ganz von der bekannten Beschaffenheit, oft zugleich auch noch mit Erbrechen auftraten (Henoch, Conty, Falsans, Binet, Holmes, Willan, Wagner, Barlow, Don, Lemas, Zille, Kerlin). In einem von Willan berichteten Fall endete eine Anzahl der Purpuraflecken sogar in Gangrän.

Ein Ausgang in Gangrän wurde auch in einem von Kuhn mitgeteilten recht schwierig zu beurteilenden Falle beobachtet.

Es handelte sich ja um eine 60jährige Pat., die vom Arzt wegen Gesichtserysipels in die Charité geschickt wurde. Sie hatte eine starke ödematöse Schwellung beider unteren Augenlider; die Schwellung machte in der Tat auf den ersten Blick einen erysipelatösen Eindruck. Es wurden aber keinerlei Entzündungserscheinungen festgestellt und da im Urin Albumen vorhanden war, taufte man die Krankheit zuerst als Nephritis auf. Die Ödeme verschwanden nun sehr bald, um in Zwischenräumen wiederzuerstehen. Der Erweißgehalt war erst 2 pro mille, dann 1,5, schließlich 7₂. Er nahm unabhängig von den sonstigen Krankheitserscheinungen allmählich immer mehr ab. Es traten nun Schwellungen von gleicher Konsistenz in der bei angioneurotischen Ödemen üblichen Form an verschiedenen Körperstellen auf, zunächst wiederholt an den beiden Augenlidern, dann am Hals, an beiden Handgelenken, an den Unterarmen, an beiden Knöcheln, an der Zunge, am Zahnfleisch der unteren Zähe, am Mundboden, am linken Labium majus und infertus an der Unterlippe. Pat. hatte schon seit einem Jahr gemerkt, daß ab und zu die Knieel geschwollen waren und seitdem auch an der Haut der Ober- und Unterschenkel quersprinkelförmige Flecke auftraten. Sie hatte über alles erlebten Geschmeck, Übelkeit und Gefühl von Schwellung im Leibe geklagt, so daß man annahm, daß auch die inneren Organe, besonders der Magen und Darm beteiligt sein müßten. Außerdem

traten wiederholt purpuraähnliche Flecke an den Beinen, am Rumpf und ein unregelmäßig remittierendes Fieber bis zu 40° auf. Das Fieber stand in keinem Zusammenhang mit den sichtbaren Ödemen, ebenso entsprach der Gehalt an Albumen nicht der Schwere der Ödeme. Alle therapeutischen Maßnahmen blieben völlig wirkungslos. Die Ödeme traten und vergingen völlig unbefruchtet. Es entstand dann allmählich ein Ödem an der Unterlippe, das ganz nicht vieler zurück, die Lippe schwell immer mehr an, so daß schließlich die Mund gangränös wurde und auch das Zahnfleisch und die Wangen mit affiziert wurden. Da die Gangren rasch zunahm und auch Ischemie und Drainage versagte, mußte die Pat. operativ behandelt werden. Es wurde die verdächtige Stelle vollkommen bis auf den freigelegten Knochen exstirpiert, so daß unmittelbar große Defekte in den Wangen und an der Unterlippe vorhanden waren. Die Zähne wurden extrahiert, die Wundränder verschloß. Am nächsten Tage trat Exitus ein. Bei der Untersuchung wurden Bakterien oder andere Anhaltspunkte für Nekrose, an die man gedacht hätte, nicht gefunden. Die Autopsie ergab im übrigen eine chronische Nephritis und Herzhypertrophie. Im Darm waren starke Schwellungen der Schleimhaut vorhanden, zum Teil mit Hämoerthagien. Ödem fand sich auch in den Nieren und Präparaten erwiesen, daß die Blöße der Darmkleinhautstellen ödematös und hämoerthagisch, zum Teil nekrotisch geworden war. In der Leber zeigten sich mikroskopisch kleine, hämoerthagisch infiltrierte Herde.

Kuhn schließt, daß es sich um eine allgemeine Gefäßaffektion des ganzen Körpers gehandelt habe, daß man in einem solchen Falle nicht von circumscribtem Ödem, sondern von einem allgemeinen angioneurotischen Ödem sprechen müsse. Er betont die Wichtigkeit der Feststellung, daß die inneren Organe in weitgehendem Maße an dem Ödem beteiligt sein können, und verweist auf die Kombination der Ödeme mit purpuraähnlichen Symptomen. Nach meiner Ansicht wird man den Fall nicht ohne weiteres dem akuten angioneurotischen Ödem zurechnen dürfen. Dazu liegen die Verhältnisse doch allzu kompliziert, und er weicht allzu sehr von den typischen Formen ab. Zweifellos waren ja symptomatisch flüchtige angioneurotische Ödeme vorhanden. Aber die Hämoerthagien in der Haut und in den inneren Organen weisen dem Fall doch vielmehr eine Stellung bei der Purpura zu, und ich habe ihn deshalb erst in diesem Zusammenhange erwähnt. Man wird ohne weiteres zugeben müssen, daß es sich um eine Gesamtschädigung des Körpers handelt, die allerdings eine besondere Affinität zu gewiß nervösen Abschnitten haben muß, deren Läsion sonst für das Auftreten von flüchtigen Schwellungen verantwortlich zu machen ist.

In diesem Zusammenhang ist es sehr interessant zu erfahren, daß auch beim Erythema exsudativum multiforme flüchtige Schwellungen als komplizierende Erscheinungen vorkommen können. Auch hier wird man ihnen nur eine rein symptomatische Bedeutung beilegen dürfen.

Wenn wir nun bedenken, daß die Quincke'sche Affektion ganz in der Art einer akuten Infektion resp. Intoxikation auftreten kann, mit Fieber und sonstigen Störungen des Allgemeinbefindens, ja daß sogar auch bei typischen Fällen vereinzelt Blutungen beschrieben sind, so werden wir begreifen, daß nach dieser Seite die Grenzlinie des flüchtigen Ödems nicht scharf gezogen werden kann; auch hier gibt es

Mittelglieder, eine fortlaufende Kette, wenn auch hier die Beobachtungen in der Mehrzahl sind, in denen die Ödeme hinter den typischen Erscheinungen der Purpura durchaus in den Hintergrund treten. Es ist versucht worden, diese Zwischenglieder noch mit besonderen Namen zu versehen. Apert spricht von einem *Oedème péliovique*, früher bezeichnete man z. T. die Fälle als *Purpura myelopathica* oder *exanthematica*. Morichau Beauchant entwirft von diesen Fällen die folgende Schilderung: Es handelt sich um junge Individuen mit neuropathischer Belastung; unter Fiebererscheinungen, Erbrechen, Diarrhöe, epigastrischen Schmerzen entstehen symmetrisch an den unteren Extremitäten Petechien und Ecchymosen, daneben stellen sich Gelenkschmerzen und Gelenkergüsse ein. Außerdem entwickelt sich sehr häufig subkutane Ödeme, die ebenso rasch wie sie kommen, verschwinden, an beiden Beinen, oft symmetrisch, weiterhin in den nächsten Tagen auch an den Armen, im Gesicht. Die Krankheit kann in verschiedenen Attacken sich wochen- und monatelang hinziehen, geht aber stets in Genesung aus. Diese Schilderung ist gegenüber der Mannigfaltigkeit der wirklichen Erscheinungen viel zu schematisch. Dem entsprechend erübrigt sich auch eine spezielle Namensgebung für diese Zwischenglieder.

Auf das Auftreten von flüchtigen Schwellungen bei der Serrankrankheit, deren Bild den hier geschilderten Zuständen sich sehr annähert, kommen wir noch zu sprechen.

Für die pathogenetische Auffassung der flüchtigen Ödeme ist es natürlich von entscheidender Wichtigkeit, daß wir sie bei einer Reihe von ätiologisch zweifellos verschiedenen Krankheiten auftreten sehen, daß wir sie in dem einen Falle als symptomatische Begleiterscheinungen im anderen Fall als wichtige, das Wesen der Krankheit bedingende Symptome kennen lernen, daß uns das eine Mal ihr toxisch-infektiöser exogener Ursprung sich ohne weiteres aufdrängt, im anderen Fall viel unklarere und kompliziertere ätiologische Bedingungen vorzuliegen scheinen.

Pathogenese.

Das Hauptsymptom der Krankheit, mit der wir uns hier beschäftigen, ist das Ödem. Wir müssen daher etwas näher auf die Pathogenese des Ödems überhaupt eingehen.

Als Ödem bezeichnet man bekanntlich die Flüssigkeitsansammlung in den Geweben, die durch eine abnorm starke, kürzere oder längere Zeit dauernde Durchtränkung der Gewebe mit der den Blutgefäßen entstromenden Lymphe entsteht. Man unterscheidet Stauungsödem und kachektisches Ödem. Das Stauungsödem ist die Folge einer Stauung der Blutzirkulation, genauer des venösen Abflusses. Die Stauung,

durch die ein Ödem hervorgerufen werden kann, muß eine hochgradige sein, sonst kommt es durch die Collateralverbindungen der Venen rasch zum Ausgleich der Störung. Behinderung des Lymphabflusses durch Verlegung der Lymphgefäße hat kein Ödem zur Folge, und zwar wegen der ausgedehnten Anastomosen der Lymphbahnen und des vikariierenden Eintretens der Venen zur Lymphabfuhr. Steigerung des Blutzuflusses erhöht bei Verlegung des Abflusses das Ödem, scheint aber, wenn überhaupt stets nur in sehr geringem Umfang instande zu sein, ohne dies Moment selbst Ödem zu produzieren (Paschutin, Karminghaus). Allerdings hat Ostroumoff durch Lingualreizung Zungenödem hervorzubringen gemeint, und Rogowicz hat nach Durchschneidung des Ischiadicus und gleichzeitiger Galvanisation des peripheren Nervenendes neben Temperatursteigerung auch Steigerung der Lymphmenge gesehen; ähnliches stellten Menzobides und Douardouff fest. Doch ist das Anschwellen des Blutstroms zu den Capillaren von weit geringerem Einfluß auf die Lymphbildung als die Stauung der Venen (Heidenhain) und die Frage, ob er überhaupt zur Ödemabildung führt, noch nicht sicher entschieden.

Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, daß der erhöhte Blutfluß bei ungenügendem Abfluß das Ödem steigert oder event. auch erst in die Erscheinung ruft. So erklärt sich der alte Versuch Ranviers, der zeigte, daß Unterbindung der Vena cava inf. nicht für sich allein zum Ödem führt, sondern erst, wenn durch Durchschneidung des Ischiadicus in der unteren Körperhälfte eine größere Blutmenge sich anhäuft; und ähnlich steht es mit dem Experiment von Gergens (Frösche mit zerstörtem Rückenmark werden unter Verhältnissen ödematös, unter denen das beim unversehrten Rückenmark nicht geschieht).

Als zweite Art des Ödems gilt das hydrämische oder kachektische Ödem. Man meinte früher, daß die Hydrämie, d. h. die Verarmung des Blutes an festen Bestandteilen, sowie die hydrämische Plethora Veranlassung zu einer gesteigerten Transsudation aus dem Blut geben könnte. Seit Cohnheims Forschungen ist diese Annahme jedoch im wesentlichen verlassen. Eine experimentell erzeugte Hydrämie hat nach ihm kein Ödem zur Folge. Für die Ödeme kachektischer Individuen ebenso wie für die bei Herzkranken ist daher anzunehmen, daß sie wesentlich einer Alteration der Gefäßwände ihre Entstehung verdanken, d. h. einer größeren Durchlässigkeit dieser Teile. Dabei ist nicht zu leugnen, daß die Hydrämie und die damit event. verbundene Plethora sehr wohl instande sind, den Eintritt eines Ödems zu begünstigen.

Eine dritte Art von Flüssigkeitsansammlung im Gewebe erwähnen wir hier nur kurz: es ist das collaterale oder entzündliche Ödem; es steht in enger Beziehung zur Entzündung, beruht wahrscheinlich immer auf Gefäßveränderungen größerer Art und ist auch seiner

Zusammensetzung nach wesentlich von den anderen Ödemen unterschieden.

Dagegen hat die Frage des „neuropathischen Ödems“ für uns das größte Interesse. Doch können wir nicht eher an diese Frage herangehen, ehe wir uns nicht in großen Zügen mit den derzeit herrschenden Anschauungen über die Lymphbildung überhaupt bekannt gemacht haben. Wir dürfen da im großen und ganzen zwei Hypothesen unterscheiden, das ist die Filtrations- und die Sekretionshypothese. Die Filtrationshypothese besagt, die Lymphe ist ein Filtrat der Blutflüssigkeit; denn ihre Menge steigt und sinkt mit der Größe des Blutdrucks innerhalb der Capillaren (Ludwig und seine Schule). Demgegenüber hat Heidenhain eine andere Hypothese, die Sekretionshypothese aufgestellt. Er fand bei der Lymphproduktion eine Anzahl von Tatsachen, die ihm durch die Annahme einer einfachen Filtration nicht hinreichend erklärbar erschienen, auf die wir hier im einzelnen natürlich nicht eingehen können; die hauptsächlichsten seiner Gründe sind folgende. Der Lymphstrom im Ductus thoracicus hielt an, obgleich die Aorta oberhalb des Zwerchfells verstopft und also der Blutdruck in der Aorta abdominalis gleich Null war. Zweitens fand er Stoffe, deren in die Blutbahn injizierter Extrakt eine bedeutende Beschleunigung des Lymphstroms hervorrief, ohne den Blutdruck zu steigern. Und drittens stellte es sich heraus, daß diese „Lymphapoga“ den Lymphstrom nicht mehr beschleunigten, wenn durch eine langwährende Abschließung des Blutstroms in der Aorta abdominalis das Capillarendothel in einen schlechten Ernährungsstand gesetzt wurde.

Heidenhains Ansichten gipfeln in dem Satz, daß bei der Lymphbildung unter normalen Circulationsverhältnissen — der Zusatz ist besonders für uns wichtig — die Filtration keine Rolle spielt. Vielmehr glaubt er, daß die Capillarzellen gleich sezernierenden Elementen bei der Lymphbildung beteiligt sind. Ueigens hatten auch Tigerstedt und Sanderson schon vorher es ausgesprochen, „daß die Transsudation aus dem Blut infolge einer aktiven Tätigkeit derjenigen Zellen, welche die Capillarwand zusammensetzen, geschieht“. Heidenhains Ansichten sind unter den Physiologen aber nicht ohne Widerspruch geblieben. Cohnstein und Starling (zit. nach Hamburger) haben ihm widersprochen, später hat auch Pugliese sich dazu gestellt, demgegenüber hat Hamburger in mehreren Publikationen und auf Grund eigener Versuche Heidenhains Hypothese unterstützt, und Heidenhain hat jedenfalls, wie einer Bemerkung Hürthles zu entnehmen ist, bis zuletzt an ihr festgehalten. In dem Handbuch der Physiologie von Nagel erörtert Overton (II, S. 828 und folgende) die Frage ausführlich. Ich entnehme seiner Darstellung, daß auch weiterhin gegen die Auffassung von Heiden-

haben sehr mannigfache Einwendungen gemacht werden sind. Was seine mechanischen Eingriffe anging, so hat Starling ihnen eine andere, nach seiner (und Overtons) Auffassung für die Filtrationshypothese sprechende Deutung gegeben. Auch gegen seine anderen Beweismittel werden mannigfache Einwendungen vorgebracht, die wir hier nicht im einzelnen erörtern können. Overton selbst vermeidet anscheinend eine exakte Stellungnahme, steht aber mehr auf Seite der Filtrationstheorie. Er berichtet des weiteren noch über die Anschauungen Aschers und seiner Schüler, die in dem Satze gipfeln, daß die „Lymphe ein Produkt der Arbeit der Organe sei“ und daß ohne die Tätigkeit der Organe eine Blutdrucksteigerung keinen Einfluß auf die Lymphbildung besitze. Auch er erörtert die Möglichkeit, die Lymphbildung könne ein der Sekretion analoger Vorgang sein. Eine Klarheit unter den Physiologen herrscht über diese Bedingungen bei der Lymphbildung bisher jedenfalls nicht. Tigerstedt sagt: „Als Fazit der vorliegenden Erfahrungen dürfte also hervorgehen, daß rein physikalische Triebkräfte, wie Differenzen des Druckes und der osmotischen Spannkraft nicht allein für sich genügen, um alle die bei der Bildung der Gewebeflüssigkeiten stattfindenden Erscheinungen zu deuten. Zuerst müssen wir uns vorstellen, daß die lebendige Capillarwand durch irgendeinen sekretorischen Prozeß bei der Bildung der Gewebeflüssigkeit beteiligt ist. Daß die rein physikalischen Faktoren dabei mitwirken können, ist dadurch nicht ausgeschlossen, obwohl es uns nicht möglich ist zu unterscheiden, welche Rolle derselben und welche der aktiven Tätigkeit der Capillarwand zukommt.“

Wir dürfen uns in dieser Frage natürlich kein Urteil anmaßen, und für uns ist es daher unentschieden, ob unter normalen Verhältnissen die Lymphbildung durch Filtration oder Sekretion geschieht; uns erscheint aber die letztere Annahme als die wahrscheinlichere.

Auf das engste hängt aber mit der Entscheidung dieser Frage die nach der Genese einzelner Formen der Ödeme zusammen. Freilich die Genese des Stauungsödems wird durch sie nicht wesentlich berührt. Erklärt doch Heidenhain selbst: „Für unzweifelhaft halte ich es, daß der Flüssigkeitsaustritt aus den Capillaren bei voller venöser Stauung auf mechanischen Momenten beruht“. Und er rechnet hierzu alle pathologischen Ergüsse, die aus örtlicher oder allgemeiner venöser Stauung entspringen. Anders steht es schon mit den kachektischen Ödemen. Heidenhain selbst geht auf ihre Genese, soweit ich sehe, nicht ein. Es liegt aber die Annahme nahe, diese Ödeme, wenn man der Heidenhainschen Sekretionshypothese folgt, so zu erklären, daß man eine Reizung der Capillarendothelien durch das veränderte Blut supponiert und daraus die Ödeme hervorgehen läßt.

Am wichtigsten wird aber die Entscheidung dieser Frage für die Pathogenese derjenigen Art von Ödemen sein, von denen wir bei dem

„akuten flüchtigen Ödem“ ein Beispiel vor uns haben. Wenn wir uns der Schilderung erinnern, die wir von den Schwellungen bei dieser Krankheit entworfen haben, so werden wir nicht zweifeln, daß ihre Pathogenese eine andere sein muß, als die der bisher erwähnten Ödeme. Es liegt kein kachektisches Ödem vor; denn der Allgemeinzustand der Kranken ist meist ein guter; von einer hydrämischen Blutbeschaffenheit ist nicht die Rede. Ebensowenig fanden sich die Zeichen einer groben Störung des venösen Abflusses; es lassen sich zunächst einmal gar keine groben, mechanischen Ursachen einer solchen venösen Stauung weder lokaler noch allgemeiner Natur nachweisen, weder Thrombosen, noch eine aus Affektionen des rechten Herzens, der Lungen uow. stammende allgemeine Venenstauung und dergleichen mehr; es fehlen auch die Symptome einer solchen Stauung, insbesondere die Cyanose, und das Ödem trägt neben seiner Flüchtigkeit auch noch den besonderen Charakter an sich, daß in den von ihm befallenen Teilen der Fingerdruck nicht bestehen bleibt. Dagegen finden wir in einer Anzahl von Fällen die Zeichen aktiver Hyperämie, Rüte und Hitze. Wir sahen oben schon, daß es noch zweifelhaft ist, ob durch einfache Erhöhung des Blatzufflusses die Entstehung eines Ödems ermöglicht wird. Aber selbst angenommen, daß eine solche Entstehung experimentell sicher gestellt ist, haben wir guten Grund, für unsere Zwecke sie nicht allzu sehr in Anspruch zu nehmen. Denn in der Mehrzahl der Fälle und gerade in den typischen finden wir gar keine Anzeichen aktiver Hyperämie; die Haut der ödematösen Teile ist nur wenig verläßt, meist durch den Druck des Ödems ein wenig blässer, und nichts berechtigt uns zu der Annahme, daß in den tieferen Teilen die Circulationsverhältnisse andere sind; wo eine anatomische Untersuchung möglich war (Larynx, Magenschleimhaut, gelegentliche Excision von ödematösen Hautstellen) war eine Hyperämie jedenfalls nicht nachweisbar. Ich meine, daß wir als klinische Beobachter allen Grund haben, uns ganz vorurteillos diesen Dingen gegenüberzustellen, und dann können wir nur sagen, wir sehen ein Ödem sich entwickeln, aber wir sehen keinerlei Störungen der Blutversorgung, die uns das Ödem ohne weiteres erklären. Von einer vorgefaßten Meinung ausgehend, haben die meisten Autoren versucht, sich doch zu etwas wie eine aktive Hyperämie zu konstruieren, die nur im Anfang vorhanden sein, dann aber durch das eintretende Ödem gleichsam erdrückt und durch Anämie ersetzt werden sollte. Diese Annahme ist in vieler Beziehung anfechtbar: in erster Linie widerspricht sie den Tatsachen, denn wie wäre es dann möglich, daß ein solches Ödem viele Stunden, ja Tage bis zu seiner höchsten Entwicklung gedauert und doch während dieser Zeit niemals und an keiner Stelle, auch an den neu erkrankenden nicht, irgend etwas von einer Hyperämie zu sehen ist?

Es ist sehr bemerkenswert und scheint mir noch nicht genügend

verwertet, daß Heidenhain durch seine experimentellen Untersuchungen über Lymphbildung auch der Pathogenese der Quinckeschen Krankheit näher getreten ist. Mit derartigen Versuchen beschäftigt sah er eines Tages, wie er erzählt, bei einer Person nach Kriebengnall nicht bloß Urticaria in gewöhnlicher Form, sondern auch ein starkes diffuses Hautödem in der linken Halagegend, vom Unterkiefer bis zum Schlüsselbein reichend, das mehrere Stunden stehen blieb. Er nahm auf Grund dieser Beobachtung Veranlassung den Extrakt von Krebsmuskeln weiter zu prüfen, und fand, daß dieser zu den vorzüglichsten Lymphagoga gehört, d. h. instande war, die Lymphproduktion — gemeinen am Ductus lymphaticus — ganz erheblich zu steigern, während eine wesentliche Steigerung des Filtrationsdrucks durchaus nicht vorhanden war. Ähnliches hat er auch für gewisse Musceln, Köpfe und Leiber der Blut- und Pferdeegel, Darm und Leber von Hunden, Pepton, Hühnerriwiß festgestellt. Er hat noch eine zweite Klasse von Lymphagoga geprüft (Traubenzucker, Harnstoff, Salze), die in größerer Menge in den Kreislauf eingeführt, den Lymphfluß stark vermehren, wobei aber das Lymphwasser nicht aus dem Blut, sondern aus den Gewebezellen herrührt. Seine aus den verschiedenen Versuchen gezogenen Schlüsse habe ich oben bereits mitgeteilt. Starling hat Heidenhains Versuche mit demselben Resultat nachgemacht; er gibt aber eine etwas andere Erklärung, indem er nicht eine stärkere Sekretion der Capillarzellen, sondern eine durch die betreffenden Stoffe bedingte größere Permeabilität der Gefäße annimmt, die er im übrigen nicht als physiologischen, sondern als pathologischen Prozeß betrachtet. Overton (l. c.) bemerkt ausdrücklich, daß die Wirkungsweise dieser Substanzen noch recht dunkel ist. Er betont, daß, da der Lymphfluß nach etwa zwei Stunden zur Norm zurückkehrt, es sich nicht um eine weitgehende Schädigung der Endothelzellen handeln könne; man müßte sich etwa vorstellen, daß die Endothelzellen der Lebercapillaren infolge der Reizwirkung der Lymphagoga sich in tangentialer Richtung kontrahieren, und daß die Lücken zwischen den einzelnen Endothelzellen dadurch noch vergrößert werden. Welche von diesen Auffassungen richtig ist, ist für uns nicht weiter von Bedeutung; jedenfalls sehen wir die Tatsache einer Erhöhung der Menge der austretenden Lymphe durch diese Versuche festgestellt; und eine Veranlassung hier als Mittelglied eine Reizung oder irgendwie anders geartete Beteiligung des Nervensystems anzunehmen, liegt nicht vor. Ich meine, daß wir Grund zu der Annahme haben, daß diese Überproduktion von Lymphe an und für sich schon und ohne Störung des Abflusses das Ödem hervorbringt, weil bei den Experimenten irgendeine erhebliche Einwirkung der Krebsmuskelextrakte auf die Blutzirkulation nicht sichtbar war, und weil, wie schon erwähnt, auch klinisch Zeichen einer ventralen Stauung nicht vorliegen.

Diese Versuche von Heidenhain scheinen mir in erster Linie ein Licht auf diejenigen Beobachtungen, zu werfen, bei denen bei der Quinckeschen Krankheit sich ein Bild ergibt, das in vielen Beziehungen an eine Infektion oder Intoxikation denken läßt. Da ist das Allgemeineibefinden gestört, es besteht Fieber, die Krankheit läuft in einem Anfall ab, zeigt Übergangssymptome zur Urticaria oder zur Purpura rheumatica und ist vielleicht auch durch Genuß bestimmter Speisen hervorgerufen. Fälle dieser Art sind ja von einer großen Reihe von Autoren mitgeteilt worden, die ich hier im einzelnen nicht mehr zu zitieren brauche. Hier liegt der Gedanke an eine Intoxikation sehr nahe. Die Frage, ob unter diesen Bedingungen das supponierte Gift erst durch das Mittelglied des Nervensystems seine Einwirkung entfalten kann, bedarf einer besonderen Beantwortung. Ich muß sagen, daß ich hier ebenso wie bei den oben erwähnten Experimenten keinen ausschlaggebenden Grund sehe, der die Annahme einer direkten Einwirkung der supponierten Gifte auf die Lymphgefäße ausschließen könnte. Die Analogien mit den Heidenhainschen Versuchen scheinen mir in diesen Fällen sehr groß zu sein und alle die oben erörterten Möglichkeiten für die Entstehung des Ödems scheinen mir auch für diese Formen der Quinckeschen Krankheit in Frage zu kommen. Mit aller Entschiedenheit aber möchte ich mich gegen die Auffassung einer Reihe von Autoren aussprechen, die geneigt sind, alle Formen der Quinckeschen Krankheit auf diesem Wege zu erklären. Die Zahl derjenigen Autoren, welche sich für eine solche auf Autointoxikationen oder Intoxikationen beruhenden Pathogenese des Quinckeschen Ödems ausgesprochen haben, ist gar nicht gering. Ich nenne als Vertreter dieser Anschauung aus der neueren Literatur nur Mendel und Herichau-Beauchant. Letzterer führt dafür folgende Beweise an. Die gastrointestinalen Störungen in dem Verlauf der Quinckeschen Krankheit sind so außerordentlich häufig, daß sie einen integrierenden Bestandteil des Symptomenbildes bilden. Im Gegensatz zu den Autoren, die diese Symptome auf Anschwellungen in den inneren Organen zurückführen, ist er, wie er sagt mit der Mehrzahl der übrigen Autoren geneigt, in ihnen die Ursache und nicht den Effekt der Ödeme zu sehen. Das Fehlen von Fieber während der ödematösen Anschwellung sei kein Beweis gegen diese Auffassung. Im übrigen sei Fieber oft genug beobachtet worden. Die Verwandtschaft der Quinckeschen Ödeme mit dem, was der Autor als *Ödème pélorique* (s. o.) bezeichnet, sei eine sehr große und spreche ebenfalls sehr zugunsten der intoxikatorischen Hypothese, da diese Ödeme zweifellos auf Intoxikation beruhen. Wie man sieht, handelt es sich hier — wie so oft — um eine unzulässige Verallgemeinerung aus einer Reihe von Einzelfeststellungen, deren Deutung an und für sich ganz richtig ist. Die Annahme, daß die gastrointestinalen Symptome stets primär sind und die Ödeme verursachen, ist, wenn man sich in die Klinik dieser

Erscheinung vertieft, auf ganz schwachen Füßen, ja darf ohne weiteres als unzulässig zurückgewiesen werden. Außerdem gibt es auch eine ganze Reihe von derartigen Fällen, in denen solche gastrointestinalen Symptome überhaupt nicht vorhanden sind. Die neurogene Genese dieser Ödeme ist in einer ganzen Reihe von Fällen ganz außerordentlich deutlich in die Erscheinung getreten, wie wir das im späteren Verlauf unserer Erörterungen noch im einzelnen anführen werden. Wenn Stähelin aus den Erfolgen der Therapie Gründe für diese Auffassung der Entstehung der Quinckeschen Krankheit herbeizuholen will, besonders also diejenigen Fälle anführt, in denen durch Vermeidung der Aufnahme von Giften oder durch konsequente Entleerung und Desinfizierung des Darms dauernde Erfolge erzielt wurden, so mag auch das für eine Reihe von Fällen Gültigkeit haben. Insbesondere möchte ich auch hier die Erfahrungen von Rapin in diesem Sinne verwertet wissen, aber auch hier ist die Verallgemeinerung unzulässig und es gibt, wie erfahrene Beobachter versichern, und wie auch ich aus meiner Erfahrung mit aller Bestimmtheit behaupten kann, eine ganze Reihe von Fällen, in denen diese Behandlungsmethode, so energisch sie auch angewendet werden mag, vollkommen versagt.

Vielleicht würden sich die Fälle von Malaria auch noch in diese Kategorie hineinfügen (Koele), wenn auch Dinkelacker wegen des Fehlens von Erscheinungen von Malariakachexie und der Unbeeinflussbarkeit durch Chinin diese Ansicht zurückweist. Der Einwand Richls, daß die Resorption des supponierten Giftes nicht so schnell erfolgen könne, wie man bei dem außerordentlich raschen Auftreten des Ödems erwarten müßte, erscheint mir nicht stichhaltig. Es ist zwar richtig, daß diese Wirkung bisweilen ganz außerordentlich rasch eintritt, und daß zu ihrer Auflösung nur ganz minimale Quantitäten notwendig sind. Rapin gibt davon Beispiele: so das einer Köchin, die beim Kochen eines Krebserrichts sofort von den schwersten Erscheinungen befallen wird, das Gesicht wird cyanotisch, die Mundschleimhaut, die Zunge schwellen an, die Stimme wird rau; es tritt Erbrechen ein und starke Diarrhöe; danach große Müdigkeit und am nächsten Tag Wohlbefinden. Rapin erörtert die Möglichkeit einer reflektorischen Entstehung, glaubt aber doch mehr daran, daß es sich um die Folgen einer direkten Aufnahme eines toxischen Körpers handelt, der seine Wirksamkeit an denjenigen Stellen entfaltet, die durch latente Veränderungen in einem besonders disponierten Zustand sich befinden. Das ist natürlich alles recht vage; immerhin aber es gibt Analoga zu so rascher Giftwirkung.

Urticaria und flüchtige Ödeme spielen eine große Rolle in denjenigen Krankheitsfällen, die man jetzt allgemein als Serumkrankheit bezeichnet; genauere Kenntnisse darüber verdanken wir von Pirquet und Schick. Die Symptomenologie kann in manchen Fällen

dieser Art einem schweren Anfall Quinckescher Krankheit ganz außerordentlich ähnlich sehen. Ich führe als Beispiel folgende Beobachtung von Allard an.

D. W. wurde wegen einer Verletzung, die er sich bei der Behandlung eines Tetanospasmoden zugezogen hatte, prophylaktisch mit Tetanusserum also Pfeideserum behandelt, und zwar wurden ihm 10 ccm des Serums in den linken Oberarm injiziert. Nach etwa 4—5 Stunden trat bei dem Pat. ein plötzlicher Anfall von Übelkeit und Schwindelgefühl mit starker Blässe des Gesichts auf, der bald vorüberging. Gleichzeitig bemerkte er das Auftreten von Urticaria am linken Unterarm und Schwellen, Rötung und Schwellungen an der Injektionsstelle. In den nächsten zwei Tagen traten diese Erscheinungen am linken Oberarm noch weiter zu, gingen aber am dritten Tag zurück, nur das Jacken blieb bestehen. Am dritten und vierten Tage trat plötzlich von neuem Urticaria am linken Unterarm auf, die nach einer halben Stunde verschwand. Dieser Vorgang wiederholte sich nun in den nächsten Tagen öfters unter Häufung der Anfälle, die aber immer auf den linken Unterarm beschränkt blieben. In der Nacht vom siebenten auf den achten Tag plötzlich nach einigen vorübergehenden Urticariaanfällen an dem linken Arm eine allgemeine Verbreitung der Urticaria über den ganzen Körper mit unträglichem Jucken. Sofort Erbrechen und Diarrhoe, dabei Erbrechen, Gefühl von Atemnot, zugleich bemerkte er, daß die Urticaria verschunden war. Nach etwa 1½ Stunden wiederholte sich der Anfall von allgemeiner Urticaria, auf diesen folgte diesmal Schlackbeschwerden bekannt, verbunden mit einem Gefühl, als ob ihm der Hals zugeschnürt würde. Dabei starker Diarrhoe, dann Salivation. Auf der Höhe der Beschwerden wiederum plötzliches Verschwinden der Urticaria, kurz darauf Erbrechen und schweres Pyrenosisgefühl; weiterhin noch wiederholte Anfälle, in denen war das Gesicht stark gedunsen, es zeigte sich eine erhebliche Volumenzunahme der Extremitäten, die Hände und Finger hatten geradem unregelmäßig ödematösen angenommen. Der Puls war zunächst nicht fühlbar, Herzstätigkeit 150 bis 160 in der Minute. Oft beengend lange Atempausen. Nach subkutaner Kampferinjektion Rötung der Haut, Quaddelbildung auf der ganzen Haut, das Gesicht rot, cyanotisch und noch mehr gedunsen, Fuß besser fühlbar. Chemo-Stokrocker Atmungstrypas. Nach ungefähr 15 Minuten verschwand plötzlich die Urticaria und das Jacken vollständig. Allgemeine Blässe der ganzen Körperoberfläche. Später wiederholtes Erbrechen. Immer neu auftretende Anfälle im Laufe dieses Tages. Im Laufe des nächsten Tages verschwand das gedunsene Aussehen des Pat. mit einer Hautflut von drei Litern, keine pathologischen Bestandteile im Urin. Am der Anamnese des Pat. ist zu berichten, daß er 1890 mit Diphtherieserum, also Pfeideserum behandelt wurde. Er hatte damals sofort eine leichte lokale Reaktion, aber keine Allgemeinerscheinungen. Im Jahre 1904 ebenfalls wegen schwerer Diphtherie abermals Pfeideserum, einige Stunden später allgemeine Urticaria, die Herzstätigkeit war sehr schnell und erzeugte große Besorgnis.

Die Ähnlichkeit dieser Attacken mit einem schweren Anfall Quinckescher Krankheit, etwa mit dem oben genauer geschilderten Falle von Diethelm springt in die Augen. In einem anderen von Allard beobachteten Falle waren besonders die Erscheinungen der Vasokonstriktionen in den peripheren Gefäßen ganz außerordentlich ausgesprochen, während in der Mehrzahl der Fälle von Serumkrankheit die Erscheinungen der Vasodilatation stärker in den Vordergrund treten. Anfälle von asthmatischer Dyspnoe sind in einer ganzen Reihe von derartigen Fällen beobachtet worden. Auch in dem oben skizzierten waren Schluckbe-

schweren, Zusammenschnürung des Halses, starker Schnupfen und brennende Schmerzen hinter dem Sternum verbunden, sie werden von Allard als durch eine Affektion der Schleimhäute des Rachens, des Kehlkopfs und der Trachea in Form der Ausbreitung der Urticaria bedingt angesehen. In einem Fall von De Bessche stellte sich ein schwerer Asthmaanfall mit Schnupfen ein. Der Atmungstypus in dem oben näher geschilderten Fall entsprach der Cheyne-Stokes'schen Atmung. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß man es da mit einer zentralen Wirkung des Anaphylaxiegiftes auf das Atmungszentrum zu tun hatte. Demgemäß zweifelt Allard auch nicht, daß auch die vasomotorischen Störungen central bedingt gewesen sind. Die Erscheinungen im geschilderten Falle waren sehr schwere, aber es kam doch wenigstens zu einem glücklichen Ausgang, während in einer Reihe von Fällen in der Tat auch der Exitus eintrat. Die Ursache der Erscheinungen liegt in diesen Fällen nicht in einer besonderen Giftigkeit des antitoxinhaltigen Serums, sondern in einer individuellen Überempfindlichkeit und nur wegen dieser Überempfindlichkeit reagieren die Patienten mit den gefährdenden Symptomen auf den scheinbar so harmlosen Eingriff. Es ist das Serum an sich und zwar das in dem Serum enthaltene artfremde Eiweiß, gegen das die Überempfindlichkeit besteht, und das die krankmachende Wirkung auslöst. Dieser Zustand der Überempfindlichkeit gegen artfremdes Eiweiß kann künstlich erzeugt werden durch Vorbehandlung mit eben diesem Eiweiß, wie das in dem geschilderten Falle in der Vorgeschichte auch geschehen ist. Das injizierte Serum bildet nach der ersten Injektion im Organismus spezifische Antikörper, die nun mit dem reinjizierten Serum reagieren. Bei dieser Reaktion entsteht ein Gift, welches die anaphylaktischen Erscheinungen auslöst. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um ein Eiweißabbauprodukt.

In einer gewissen Anzahl von Fällen kommt es bei Menschen schon nach der Erstinjektion von Serum zu Symptomen von Serumkrankheit, die jedoch erst später, zwischen dem achten und dreizehnten Tage nach der Injektion aufzutreten pflegen. Hier wo nach der ersten Injektion bereits Symptome auftreten, liegt eine angeborene Überempfindlichkeit vor. Sehr interessant ist in dieser Beziehung ein Fall von De Bessche. Es handelte sich da ebenfalls um einen Arzt, der jedesmal, wenn er in die Nähe von Pferden oder Pferdeausdünstungen kam, eine Art Heuschnupfen, Niesen, Husten und Asthmaanfälle bekam. Als er nun eines Tages eine geringe Menge Diphtherieserum injiziert erhielt, erkrankte er nach wenigen Minuten unter den Symptomen schwerster expiratorischer Dyspnoe mit Schnupfen und Collapsercheinungen. Daß es sich dabei um einen richtigen anaphylaktischen Anfall gehandelt hatte, ergab sich aus der Beobachtung, daß der Patient nach diesem Tage die frühere Idiosynkrasie gegen Pferdeausdünstungen verloren hatte. Er war also durch den Anfall unempfind-

lich, anaphylaktisch geworden, ein Zustand, der allerdings nur wenige Monate ahielt. Allard zitiert noch eine ganze Reihe von Fällen von Serumkrankheit bei Menschen, während die Mehrzahl der hierhergehörigen Beobachtungen experimentell gewonnen sind. Überall finden sich in diesen Beobachtungen mehr oder minder ausgesprochene Krankheitszeichen, die an die Symptome der Quinckeschen Krankheit erinnern: die Erscheinungen von Schwellung und Cyanose des Gesichts und von Lungenödem in einem Fall von Pirquet und Schick, von universeller Urticaria in einem Fall von Umber, von Asthma und schwerem Larynxödem in einem solchen von Wolff-Eisner; in einem Fall von Scheidemann fanden sich zahlreiche Blutungen an Stirn, Hals und Brust. Thaan und Labbe haben je eine Beobachtung von schweren anaphylaktischen Anfällen mitgeteilt, die unter dem Bilde bedrohlicher Herzschwäche, allgemeiner Urticaria, Oligurie und einmal auch Diarrhöe verliefen.

Für die Auffassung der Pathogenese der Quinckeschen Erkrankung scheinen nur diese Fälle von großer Bedeutung zu sein. Bei der großen symptomatologischen Ähnlichkeit muß man wohl annehmen, daß bei beiden Affektionen ähnliche Stoffe ätiologisch wirksam sind. Aus den oben angeführten Tatsachen geht hervor, daß wenigstens für manche dieser Fälle mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, daß die ätiologisch wirksame Substanz nicht direkt in der Peripherie, sondern am Nervensystem und zwar wohl am Centralnervensystem einwirkt, daß also zwar letzten Endes eine Intoxikation die Ursache der Erkrankungssymptome ist, daß aber diese Intoxikation nicht dadurch zustande kommt, daß die giftigen Körper unmittelbar lymphagog wirken, sondern daß sie sich des Nervensystems zur Vermittlung bedienen.

Halstedt hat schon früher auf die Ähnlichkeit der nach Serum-einspritzungen gelegentlich entstehenden Symptombilder mit den angioneurotischen Schwellungen aufmerksam gemacht, ohne dabei die Unterscheidung zwischen erworbenner und kongenitaler Überempfindlichkeit besonders hervorzuheben. Er zitiert eine Reihe von Fällen, bei denen eine prophylaktische Diphtherieserumeinspritzung heftigste Symptome, selbst den Exitus herbeiführte — am bekanntesten ist der Fall von Langerhans — zur Beobachtung kommen dabei Urticaria, Erytheme, Purpura und angioneurotische Schwellungen in absteigender Häufigkeit. Er sah die Ursache in einer besonderen Empfänglichkeit des Gewebes, und glaubte einige Todesfälle bei therapeutischer Antitoxineinspritzung auf das durch das Antitoxin bedingte Lungenödem zurückführen zu können, nicht auf das Diphtherietoxin. Auch Valobra hat den Gegenstand schon berührt und Feillet ihn neuerdings in einer These behandelt. Ein besseres Verständnis für diese Fälle haben

erst die neueren oben angeführten Erfahrungen bei der Serumkrankheit uns verschaffen können.

Gewisse experimentelle Ergebnisse aus dem Gebiete der Immunitätslehre versucht Stähelin, der sich in letzter Zeit mit der Pathogenese dieser Ödeme beschäftigt hat, für deren Auffassung fruchtbar zu machen. Er zitiert folgenden Versuch von Bloch: Bloch hatte sich selbst durch Einstechen eines achromotischen Pilzes eine Infektion der Haut erzeugt, welche 2 Monate dauerte und eine Überempfindlichkeit der ganzen Haut gegenüber der Intrautanapplikation von Trichophytin zurückließ. Teile seiner Haut transplantierte er auf ein großes Ulcus cruris eines Patienten, auf einen anderen Teil des Geschwüres wurde Haut aus dem Arm des Kranken verpflanzt. Weder diese noch irgendeine andere Stelle der Haut des Patienten ließ bei der Kutanreaktion eine Empfindlichkeit gegen Trichophytin erkennen. Dagegen entstand auf dem von Bloch herstammenden Stück zehn Tage nach der Transplantation auf Applikation von Trichophytin eine Nekrose der transplantierten Zellschicht von 7 mm Durchmesser. Dieser Versuch beweist, daß sich bei Infektions- und Immunisierungsvorgängen eine lokale Veränderung des Gewebes ausbildet, die den Boden für die Giftwirkung empfänglich macht. Das legt nach Stähelin den Gedanken sehr nahe, daß es sich auch bei dem flüchtigen Ödem um eine lokale Veränderung, eine Umstimmung der Gewebe handelt, infolge deren die Gifte, wenn sie ins Blut gelangen, Ödeme hervorrufen. Stähelin nimmt gestützt auf selbst beobachtete Fälle, in denen die Ödeme im Anschluß an Verstopfung auftraten und durch den Gebrauch von Abführmitteln seltener wurden, eine ursächliche Bedeutung der Retention der Verdauungsprodukte im Darm an und schließt nun aus dem oben zitierten Immunisierungsversuch auf eine vorhandene lokale Veränderung der Gewebe, deren Folge bei dem Zusammentreffen mit Gift das Ödem ist. Doch liegt nach ihm auch die Möglichkeit vor, daß die Veränderung nicht in den Organzellen selbst, sondern in den Gefäßwandungen sitzt, ja es erscheint ihm dies deswegen sogar wahrscheinlicher, weil das Ödem nicht nur die Haut, sondern auch die tieferen Schichten des Subkutangewebes zu ergreifen pflegt. Die Annahme, die noch gemacht werden könnte, daß es sich um das Übergehen abnormer Zersetzungsprodukte aus dem Darm in das Blut handelt, ist er geneigt zurückzuweisen, es handelt sich vielmehr um eine abnorme Empfindlichkeit gegen die Gifte, die auch bei normalen Menschen in den Kreislauf gelangen. Der Autor hat auch versucht, eine Entscheidung dieser Frage durch das Experiment zu gewinnen und er hat nachweisen können, daß es im Dünndarm eine Substanz gibt, durch die auf der Haut lokale Exsudation erregt wird, aber es fehlt ihm der Nachweis, daß diese Substanz bei Patienten mit flüchtigen Ödemen stärker wirkt als bei normalen.

Die gleichen Fragen wie beim flüchtigen Ödem liegen auch in der Pathogenese der Urticaria vor. Hier haben sich namentlich Phillipsohn und Török für die lokale Wirkung eines Giftes ausgesprochen. Sie haben Hundem die verschiedensten chemisch gut definierten Substanzen, darunter auch Endprodukte des Eiweißabbaues, mittels Glaskanülen unter die Haut appliziert und bei einer ganzen Anzahl von ihnen das Auftreten von Urticaria konstatiert. Sie haben sich gegen jede Bedeutung des Nerveneinflusses gewandt, doch haben andere Autoren ihren Versuchen nicht die genügende Beweiskraft zugeschrieben. Namentlich hält Krebisch an der nervösen Theorie der Exsudation fest.

Experimentelle Studien, die zur weiteren Aufklärung dieser Frage dienen könnten, sind vielfach auch in bezug auf ein anderes Phänomen angestellt worden, nämlich in bezug auf die Dermographie, die mechanische Reizbarkeit der Haut. Die letzten und ausführlichsten derartigen Versuche stammen von Weidenfeld und ich reproduziere hier kurz ihre Resultate, weil sie mir für die Pathogenese der Ödeme, die uns hier beschäftigten, in der Tat nicht ohne Bedeutung zu sein scheinen. Er schließt die Einzelheiten der Entstehung der Dermographie in der folgenden Weise: Streicht man mit dem Finger über die Haut, so findet man, daß gewöhnlich nach 3–8 Sekunden im Verlauf des Striches, dessen Form und Größe beibehaltend, ein roter Streifen folgt, der von blassen Bändern umsäumt ist. Es zeigt sich nach 30 Sekunden eine Blässe und nach 2 Minuten eine Erhabenheit von der Form und Größe des Striches, nach 15 Minuten allerdings eine flammende Rote weit sich erstreckend, dann ein langsames Abschwellen und Breitenwerden, allmähliche Restitutio ad integrum. Reibt man nun mit Adrenalin die entstandene Quaddel, so wird sie nach einiger Zeit weiß. Trotz dieser auffälligen Wirkung auf die Gefäße im Sinne einer Kontraktion bleibt die Quaddel selbst in derselben Höhe und in derselben Zeitdauer bestehen. Das Adrenalin hat also keinen Einfluß auf die schon bestehende Quaddelformung. Weiterhin läßt sich feststellen, daß auf einer durch Adrenalin anämisierten Hautstelle keine Quaddeln entstehen. Streicht man aber über diese anämische Stelle kräftig mit dem Sondenknopf, so entsteht zwar keine Quaddel, aber eine langdauernde Hyperämie. Man sieht also daraus, daß die Hyperämie allein nicht zu einer Exsudation führt. Weidenfeld macht in diesem Zusammenhang auf die zwei verschiedenen Zellformen aufmerksam, die die Capillärwand zusammensetzen, auf die Mäerschen Zellen, die die Kontraktion vermitteln und auf die anderen Capillärwandaellen, denen man event. nach Heidenhain die anderen physiologischen Funktionen vindizieren könnte. So könnte die Quaddel auf einer Art sekretorischer Tätigkeit der Capillärwände beruhen, während die hyperämischen und anämischen Zustände auf Reizung der Mäerschen Zellen zurückgeführt werden müßten. Auf diese Weise wäre die Häufigkeit der Koinzidenz beider

Phänomene erklärt. Im ganzen neigt sich Weidenfeld der Vorstellung zu, daß die entstehende Quaddel ein Produkt der Sekretion der Capillärwandzellen ist. Ein weiteres interessantes Versuchsergebnis von Weidenfeld ist das folgende: Wenn man mit der Nadel einer Pravazschen Spritze von der subkutanen Seite her die Haut reizt, so tritt ebenfalls eine Quaddel auf; sie ist dem Tastgeföhle erst einige Minuten später zugänglich als beim Streichen der Haut. Es ergibt sich daraus, daß die Erregbarkeit der Gefäße nicht allein auf das Papillarnetz beschränkt ist, sondern daß die Gefäße der Haut in ihrer Totalität in einem leicht erregbaren Zustand sich befinden. Das ist für die Pathogenese der etwas tiefer sitzenden Ödeme von großer Wichtigkeit.

Aus den bisherigen Erörterungen über die Entstehung der flüchtigen Ödeme in Fällen, in denen ein Zusammenhang mit allgemeineren nervösen Störungen nicht ohne weiteres deutlich ist, in denen vielmehr der klinische Verlauf darauf hindeutet, daß toxische Stoffe irgendwelcher Art den unmittelbaren Anstoß zur Entstehung der Ödeme geben, ergibt sich zusammenfassend folgendes zu Möglichkeiten: Das supponierte Gift kann örtlich auf die Gefäßwandungen oder auf das Gewebe selbst wirken bzw. auf beide zusammen. Es kann durch größere Durchlässigkeit der Gefäßwandungen oder Anregung ihrer Zellen zu verstärkter Sekretion zu diesen Schwellungen kommen. Das Ödem kann aber auch entstehen durch Giftwirkung auf die Nerven des betreffenden Gebietes selbst. Das Nervensystem wäre in diesen Fällen dann insofern auch nicht ausgeschaltet, als wenigstens lokal seine Mitwirkung zur Entstehung der Ödeme notwendig wäre. Welche Nerven dabei die Entstehung des Ödems ermöglichen, ist auch in diesem Zusammenhange nicht sicher. Eines scheint nur auch hier mit Bestimmtheit feststellbar: trotz des häufigen Zusammenvorkommens rein vasomotorischer Phänomene mit dem Ödem ist ein unlöslicher Zusammenhang zwischen diesen beiden Erscheinungen nicht anzunehmen, vielmehr nur eine Koinzidenz, die wesentlich durch die örtlichen Verhältnisse bedingt ist. Das Gift kann demgemäß auch nicht allein die reinen Vasomotoren reizen, sondern muß daneben die Nerven in Anspruch nehmen, die die Gefäße in den Stand setzen, entweder eine größere Menge Lymphe zu produzieren oder durch die Gefäßwand hindurchzulassen. Zu ähnlichen Resultaten kommt Quincke bei der Erörterung der Möglichkeiten für die Entstehung der toxischen Ödeme.

In einer großen Reihe von Fällen von flüchtigen Ödemen erscheinen aber die Zusammenhänge zwischen diesen Ödemen und Störungen des Nervensystems allgemeinerer Natur recht deutlich in die Augen zu springen. Die Quinckesche Krankheit ist daher beinahe übereinstimmend von den Autoren den Nervenkrankheiten zugehört worden. Als hier

in Betracht kommende klinische Gründe sind eine ganze Reihe aufgeführt worden. Dinkeltaecker führt an: Die Erblichkeit, die nahen Beziehungen zu dem wahrscheinlich neurogenen Hydrarthros intermittens, das ungestörte Allgemeinbefinden. Ervas vollständiger ist Hauke; neben dem familiären Auftreten betont er, daß sich auch meist andere nervöse Symptome finden, daß oft Erregungen auslösend wirken, daß der als Nervengift bekannte Alkohol besonders schädlich zu sein pflegt. Higier fügt dem noch die bisweilen beobachtete Halbseitigkeit des Ödems, das Auftreten zur Zeit der Menstruation und die Besserung durch Besserung der Neurose, die zugrunde liegt, an. Man kann zugunsten der neurogenen Entstehung auch noch eine weitere Reihe von Momenten ins Feld führen. Das sind zunächst die Beziehungen zu der Raynaudischen Krankheit und den verwandten Affektionen, von denen ich eine Reihe von Beispielen erwähnt habe. Von erheblicher Bedeutung ist ein weiteres Moment, das Auftreten der Ödeme im Anschluß an psychische Vorgänge irgendwelcher Art. Es erscheint mir unmöglich die Vermittlung des Nervensystems auszuschließen, wenn die Einwirkung der Affekte auf die Entstehung der Ödeme so deutlich ist, wie wir das in vielen unserer Fälle gesehen haben. Ich erinnere an die Mutter, die ihre Ödeme bekommt, wenn das Kind die Urticariaanfalle hat, an den jungen Mann, der in der Vorlesung seines Professors, als dieser über Urticaria spricht, an ödematösen Schwellungen erkrankte, an den Neurotiker, der, als er über einen freien Platz geht, eine Platzangst bekommt und dabei zugleich das Auftreten der Ödeme bemerkt, bei dem aber, wenn er über den Platz in Begleitung, also ohne Angst, geht, niemals Ödeme auftreten. Beispiele dieser Art lassen sich leicht häufen. Wenn Stähelin meint, daß solche Erfahrung nichts gegen die Annahme der Autointoxikationstheorie auch für diese Fälle beweist, so möchte ich dem doch recht energisch widersprechen. Er sagt, das Gift könnte bei einer vorhandenen Disposition zu Ödemen an derselben Stelle angreifen, wie in anderen Fällen nervöse Erregungen, die vom Großhirn kommen, oder die Intoxikationen könnten den Boden für die Einwirkung nervöser Erregung geeignet machen. Im ersten Fall würde es sich um gleiche Wirkung zweier Ursachen handeln, im zweiten um ein Zusammenwirken zweier Momente, in jedem Fall aber um eine Giftwirkung, die an verschiedenen Stellen einsetzen kann. Dem ist entgegenzuhalten, daß in vielen solchen Fällen für die Annahme einer Intoxikation eben auch nicht der leiseste Grund vorliegt, wenn wir uns nicht zu der Hypothese verstehen wollen, daß durch nervöse Erregung giftige Substanzen produziert werden. Wie weit eine solche Auffassung möglich ist, soll erst weiterhin noch diskutiert werden.

Die durch die Klinik nahegelegte Annahme einer psychogenen Entstehung der Quinckeschen Ödeme würde eine experimentelle Stütze erhalten, wenn es gelänge auf dem Wege der Hypnose oder auf einem

ähnlichen rein psychischen Wege Urticaria oder Schwellungen oder ähnliche Dinge zu erzeugen. Das ist nun auch mehrfach versucht worden und in einzelnen Versuchen ist auch von vertrauenswürdigen Beobachtern ein positives Resultat erzielt worden. Ich führe hier den Fall von Heller und Schulz an. Einem 19-jährigen Mann, der durch besondere Suggestibilität ausgezeichnet war, der zum Beispiel Instande war, auf rein suggestivem Wege eine Verlangsamung des Pulses hervorzubringen und bei dem eine Dermographie mäßigen Grades, aber keine Urticaria bestand, wurde die Suggestion gegeben, eine auf den Handrücken gelegte Münze sei glühend, sie werde ihn verbrennen und es werde sich eine Blase entwickeln, ohne daß er dabei Schmerzen empfinde. Es wurde ihm ferner eine Erinnerungslosigkeit für die Erlebnisse der Hypnose suggeriert. Er gab nach drei Wochen bei einer Demonstration an, daß er seit einiger Zeit eine Blase auf dem linken Handrücken entstehen gesehen habe, die sich jeden Morgen ohne Schmerzen entwickle und die er täglich mit einer Nadel öffne. Er war damals nicht in dauernder Behandlung. Die Blase schloß sich auf Suggestion in einigen Tagen. Am 4. Juni wurde er in die Klinik von Herzheimer aufgenommen. Am 5. Juni wurde ihm dann in der Hypnose ein Markstück auf den Rücken der linken Hand aufgelegt mit der Suggestion einer schmerzlosen Verlesung. Bei Abnahme der Münze entstand ein roter Fleck. Es wurde dann ein trockener Watteverband aufgelegt und der Kauten durch Professor Herzheimer versiegelt. Um 5 Uhr wurde in erneuter Hypnose eine lebhaft gerötete runde Erythemszirkel von genau Markstückgröße, leicht erhaben, gefunden, die linke Hälfte ist quaddelartig, etwas heller rot; am unteren linken Quadranten ist die Epidermis durch eine flache, harte, augenscheinlich wenig Flüssigkeit enthaltende, unregelmäßig begrenzte Blase aufgehoben. In Verbindung mit dieser Blase steht eine 2,5 cm lange und $\frac{1}{2}$ cm breite, ebenfalls ziemlich harte, blasige Aufhebung der Epidermis über dem Metacarpus, nach abwärts verlaufend, die wenige Tropfen einer schnell gerinnenden Flüssigkeit enthält; in ihr sind vereinzelte Epithelzellen, keine Leukocyten nachweisbar. Nach fünf Tagen verheilt die Blase unter Suggestion, mit heller glatter Narbe. Über ähnliche Versuche berichten Kreibich und auch Kohnstamm. Das sind freilich nur sehr vereinzelte Ergebnisse, die auch weiterhin noch recht sorgfältiger Nachprüfung bedürfen. Aber sie sind immerhin geeignet, den engen Zusammenhang zwischen Nervensystem und diesen Vorgängen zu demonstrieren. Sie helfen die Grundlage für die Auffassung der Quinckschen Krankheit als einer nervösen Affektion bilden.

Die meisten Autoren nehmen an, daß es sich beim flüchtigen Ödem um eine Erkrankung der Gefäßnerven handelt, und sprechen daher von einer Angioneurose, ganz wie auch bei der nahe verwandten Urticaria.

Dabei ergeben sich aber im einzelnen doch noch Unterschiede der

Auffassung. Die einen meinen, daß ganz allein die Veränderungen der Blutcirculation zur Erklärung des Ödems genügen, indem durch Reizung der Vasodilatoren oder Lähmung der Konstriktoren die Hyperämie und damit die Ödeme bedingt werden. Diese Erklärung könnte natürlich nur für die Fälle in Frage kommen, wo klinisch Hyperämie vorhanden ist, und sie ist für diese Fälle von zahlreichen Autoren angenommen worden (Baake, Börner, Joseph). Daß sie experimentell auf schwachen Füßen steht, ist von mir schon genügend betont worden. Zudem müßte für die ohne Hyperämie auftretenden Ödeme eine andere Erklärung ausfindig gemacht werden, und es ist gewiß unzulässig, eine fundamental verschiedene Entstehung für die beiden, oft zu gleicher Zeit bei demselben Individuum vorkommenden Ödeme anzunehmen. Auch für das blasser Ödem hat man nun eine Erklärung allein in der Änderung der Verhältnisse der Blutcirculation gesucht. Von solchen Erklärungsversuchen nenne ich die von Börner und von Unna. Börner betrachtet diese blassen Ödeme „einfach als das Resultat einer von den betreffenden größeren Gefäßen ausgehenden Blutdrucksteigerung, welche zu rasch abläuft, um sofort kompensiert zu sein. Vor Eintritt der nötigen Kompensation hat die auf die Capillaren sich fortsetzende Druckerhöhung bereits vermehrtes Transsudat in das umgebende Gewebe gesetzt.“ Unna hat bereits darauf hingewiesen, daß dieser Erklärungsversuch recht gekünstelt ist. Die Tatsache, daß trotz sicher bestehendes Ödems die erhöhte Transsudation sich stunden- und tagelang immer weiter fortsetzt, scheint mir auf diese Weise völlig unerklärlich; denn einmal ist nicht anzunehmen, daß so lange eine Inkongruenz zwischen Spannungsschwankung des Blutes und Kompensation derselben durch Gefäßerweiterung besteht, und andererseits würde bei schon vorhandenem Ödem dieses selbst trotz erhöhten Drucks im Capillarsystem eine weitere Transudation unmöglich machen, indem es durch seine eigene Spannung dem Capillardruck entgegenwirkt. Unna hat das Problem anders zu lösen versucht. Nach ihm führt weder aktive Hyperämie noch Blutdrucksteigerung allein zum Ödem, sondern immer muß dazu eine relative Insuffizienz der Abflußwege, d. h. eine teilweise Versperrung der venösen Gefäße kommen; diese ist unter allen Umständen die primäre und wichtigste Erscheinung, die höchstens durch aktive Hyperämie unterstützt wird. Beim nervösen Ödem wird diese Sperrung der venösen Abflußkanäle durch Erhöhung des auch normal schon beträchtlichen Venentonus hervorgerufen und zwar auf dem Wege der Reizung der Vaskonstriktoren der Venen. Nach dieser Auffassung ist, wie Unna betont, auch das flüchtige Ödem ein Stauungsödem im Cohnheimschen Sinne, das flüchtig deswegen ist, weil die Steigerung des Venentonus auf passagerer Reizung ihrer Konstriktoren beruht und daher auch vorübergehend ist. Auch Unnas Erklärung, die bisher wenig beachtet wurde, befriedigt nicht: erstens fehlen eben die Zeichen der Cyanose,

die z. B. bei dem von Weiß zur Erklärung der Asphyxie locale angenommenen Venenspasmus auftreten. Und dann ist die Annahme, die Unna macht, daß der Venenspasmus — der nebenbei isoliert ohne Arteriospasmus gedacht werden müßte — so hochgradig werden kann, um eine zur Bildung von Ödem genügende Wegverlegung hervorzubringen, keineswegs bewiesen, ja im Gegenteil bei der immerhin wenig entwickelten Venenmuskulatur höchst unwahrscheinlich.

Ich bin demnach der Ansicht, daß es überhaupt nicht möglich ist, durch die Annahme von einfacher Veränderung der Blutcirculation die blassen Ödeme zu erklären. Es muß da noch ein anderes Moment vorhanden sein. Eine Änderung der Bluteschaffenheit kann nun nicht in Frage kommen; wenn es auch oft chlorotische Individuen sind, so ist doch dies keineswegs die Regel, und es kann in diesem Moment gelegentlich höchstens eine Unterstützung für das Auftreten der Ödeme gefunden werden. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, daß gerade für eine Reihe der für die Entstehung der Urticaria in Betracht kommenden Körper (Krebsextrakt, Blutegelextrakt) die Tatsache bekannt ist, daß sie die Gerinnungsfähigkeit des Blutes herabsetzen. Das mag einzelne Begleiterscheinungen des Ödems erklären (Blutungen uex.); aber die lokalisierten Ödeme zu erklären ist auf diesem Wege naturgemäß nicht möglich. Daß etwa ferner durch neurotisch bedingte Verlegung der abführenden Lymphgefäße das Ödem entstehen könnte, muß auf Grund der Tatsache zurückgewiesen werden, daß selbst durch einen vollkommenen mechanischen Verschuß der Hauptlymphwege bei ungehindertem venösem Abfluß niemals Ödem eintritt.

Wir können nur zweierlei annehmen: daß entweder durch nervösen Einfluß auf die Capillarzellen die Lymphsekretion gesteigert wird — also eine Hypothese, die der Heidenhainischen Sekretionshypothese entsprechen würde — oder daß durch nervöse Vermittlung die Wandbeschaffenheit der Gefäße in dem Sinne geändert wird, daß diese mehr Transsudat durchlassen. Von früheren Autoren haben Quinke, Dinkelacker, Joseph, Horsley and Broyce, Widowitz, Wills and Cooper, Strübing darauf hingewiesen, daß man mit der Annahme einer unkomplizierten Angiostase nicht auskommt, meist allerdings nur in fragmentarischer Form. Dinkelacker ging etwas näher auf die einzelnen Modalitäten ein, „in welcher Weise allerdings eine Zell- oder Gewebsveränderung anzunehmen ist, ob in Form von Alteration der feinen Capillargefäßwände, die einen Durchtritt von Flüssigkeit erleichtert, oder in einer Veränderung des perivaskulären Bindegewebes, wodurch die Saugwirkung desselben gesteigert sein könnte, möchte ich nicht entscheiden.“ Auf das letztgenannte Moment ist Herz entsprechend seinen allgemeinen Anschauungen von der Wichtigkeit der

Tätigkeit des Gewebes selbst für die Blutversorgung näher eingegangen; er meint, wahrscheinlich erweitern sich unter Nerven einfluß die Gewebsinterstitien, welche auch sonst Lymphe aufnehmen, es strömt mehr Lymphe hinein und bei mangelnder Energie der peripherischen motorischen Apparate nicht entsprechend genug ab. Mir erscheint es vollständig jedoch noch recht zweifelhaft, ob diese aktive Tätigkeit des Gewebes selbst eine nennenswerte Rolle spielt. Auch Quincke selbst berücksichtigt übrigens die Möglichkeit einer Mitwirkung des Gewebes an der Entstehung des Ödems und rechnet auch mit der Möglichkeit einer Innervation dieses Gewebes durch trophische Nerven. Wäre Heidenhains Sekretionshypothese allgemein akzeptiert, so würde man sich wohl am ehesten zu der Annahme einer nervös bedingten Sekretionssteigerung entschließen, die in Analogie mit den Veränderungen der Drüsensekretion durch Nervenreizung oder -Lähmung entstände. Von Wichtigkeit hierfür wäre noch die genaue chemische und morphologische Kenntnis der ödematösen Flüssigkeit, die uns aber zum großen Teil abgeht; bei erheblicheren qualitativen und quantitativen Unterschieden gegen das Blutserum gewönne die Sekretionshypothese an Wahrscheinlichkeit.

Unter den neueren Autoren hat sich besonders Valobra etwas eingehender mit der Pathogenese der Ödeme vom Typus Quincke befaßt. Er ist dabei zu Auffassungen gekommen, die den in der ersten Auflage dieses Buches vertretenen sehr nahe stehen. Er hat die Unmöglichkeit, die Ödeme als vasomotorische Phänomene aufzufassen, klar hervorgehoben, und hat die Häufigkeit der Koexistenz der vasomotorischen Erscheinungen mit den Ödemen auf die ähnlichen (topographischen und funktionellen) Bedingungen der vasomotorischen und sekretorisch-trophischen Centren zurückgeführt. Er hat ferner auf die experimentellen Tatsachen hingewiesen, die geeignet sind, die Annahme einer Abhängigkeit der Lymphproduktion von Reizung der Nerven zu stützen. Marcarelli konnte zeigen, daß es durch Reizung des Lingualis gelang, eine Verachlung der Lymphe in dem Maße hervorzubringen, daß es zu einem Ödem der entsprechenden Zungenhälfte kam. Darauf gestützt kam er zu der Auffassung, die flüchtigen Ödeme „sont dus à un phénomène d'excito-sécrétion localisée de la lymphe, qui par sa rapidité produit un manque d'équilibre passager entre la circulation du sang et la circulation lymphatique“.

Hier ist somit die Auffassung einer Überproduktion von Lymphe (und according Bois) vertreten, in Übereinstimmung mit der Heidenhainschen Sekretionshypothese. Für diese spricht vielleicht noch eine andere der Klinik entnommene Tatsache. Es ist mehrfach auf die enormen Gesichtsschwankungen, die zu außerordentlich hohe Werte erreichen können, hingewiesen worden; das scheint mir auch für eine

Sekretionssteigerung zu sprechen, wenn auch die begleitende Ödeme dabei Berücksichtigung verdient.

Doch bleibt die definitive Entscheidung zwischen den beiden in Frage kommenden Möglichkeiten der Zukunft überlassen.

Zum Schluß dieser Erörterungen möchte ich nur noch betonen, daß ich sehr wohl weiß, daß ein experimenteller Beweis für den Einfluß der Nerven auf die Lymphbildung bisher nicht erbracht ist. Heidenhain hat, wie er mitteilt, auf Grund seiner neuen Ansichten über dieses Thema zu arbeiten begonnen, leider hat er uns nichts mehr über seine Resultate berichten können. Etwas besser steht es mit der experimentellen Begründung von Gefäßwandveränderungen neurogenen Ursprungs (s. o.). Ich glaube aber nicht, daß wir heute schon berechtigt sind, aus diesem Grunde allein der letzteren Annahme unbedingt vor der ersteren den Vorzug zu geben.

Loeb hat die neueren Anschauungen über das Wesen und die Wichtigkeit des osmotischen Drucks in den Geweben auch für die Entstehung des Ödems dienstbar zu machen versucht. Es kommt nach ihm zum Eindringen von Flüssigkeit in die Gewebe dann, wenn der osmotische Druck in den Geweben höher ist als der des Blutes und der Lymphe. Wir müssen also dem Ödem solche Ursachen zugrunde legen, welche den osmotischen Druck in den Geweben erhöhen, resp. im Blut und der Lymphe verringern. Bei dem Mangel bestimmter Vorstellungen über die Natur der Innervationsvorgänge ist nach Loeb die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß viele, vielleicht alle Übertragungen des Erregungsvorganges von den Nerven auf die Organe chemischer Natur sind.

Es wäre vordlig, ein bestimmtes Urteil über diese Anschauungen abgeben zu wollen. Für uns unterscheiden sie sich insofern nicht prinzipiell von den zuletzt erörterten Hypothesen, als auch sie eine gesonderte und von der Gefäßinnervation unabhängige Innervation zur Voraussetzung haben. Auch wenn wir sie annehmen, fällt demnach die Quinckesche Krankheit aus dem Rahmen der einfachen Angioneurose heraus.

Die Bahnen, auf denen dieser Einfluß vermittelt wird, können nicht gut andere als die der Vasomotoren sein, und mit dieser Annahme stimmt die Tatsache, daß zusammen mit dem Ödem sichere vasomotorische Symptome, insbesondere aktive Hyperämie sehr häufig vorkommen.

Auch für andere Arten neuropathischer Ödeme außer den flüchtigen Ödemen der Quinckeschen Krankheit, ist eine Kombination mit vasomotorischen Symptomen klinisch mehrfach beobachtet worden. So fand man (Oppenheim u. a.), wie schon in der Einleitung betont wurde, einige Male stärkere, frühzeitige Ödeme zusammen mit Cyanose bei der Hemiplegie; ähnliche Kombinationen bieten die spinalen Ödeme

und die „*Mais succulente*“ bei der Gliosis cervicalis oder die seltenen hochgradigen Ödeme der gelähmten Teile bei der Myelitis (Weir-Mitchell), wobei natürlich nicht an die viel häufigeren unter diesen Verhältnissen vorkommenden Stauungsödeme gedacht ist.

In einer Beobachtung von Lewinski fand sich ein chronisches, offenbar neurogenes Ödem bei einer Sympathicusaffektion. Wir werden nach allem also auch den Entstehungsort der flüchtigen Ödeme im oder in der unmittelbaren Nähe der Vasomotoren-systeme zu suchen haben, ohne aber mit einiger Sicherheit eine bestimmte Stelle bezeichnen zu können. Es ist sogar recht zweifelhaft, ob immer dieselbe Stelle als Sitz der krankmachenden Ursache anzusehen ist.

Es könnte sich um periphere Läsionen handeln; daß bei solchen neuropathische Ödeme und zwar sowohl akute wie chronische vorkommen, lehren die Erfahrungen bei der Neuralgie und bei manchen peripherischen Neuritiden, z. B. bei der Paralysis postdiphtherica (Kraus); es könnte der Grenzstrang des Sympathicus mit seinen Ganglien in Betracht kommen (Lewinski), für den auch Etienne sich ausgesprochen hat, und schließlich dessen medulläre Centren oder die noch höher gelegenen vasomotorischen Centren und Bahnen in der Medulla oblongata, im Subcortex oder Cortex. Nicht spricht sich für einen centralen Sitz aus, wegen der allgemeinen Verbreitung der Ödeme, die nicht an die peripheren Nerven gebunden ist, und wegen der psychischen Erscheinungen. Schlesinger denkt mehr an die im Rückenmark gelegenen Centren; für eine Affektion des Centrums in der Medulla oblongata sind nach ihm die Erscheinungen zu beschränkt, für eine corticale Genese liegen keine Anhaltspunkte vor.

Man muß damit rechnen, daß die Lokalisation eine differente sein kann. Für die der Raynaudschen Krankheit nahestehenden Fälle mit lateral-symmetrischer Anordnung an den fingerförmigen Teilen liegt die Annahme nahe, daß es sich um eine Affektion der übergeordneten Centren handelt (Medulla oblongata). Auch für die typisch-familiären Fälle mit ausgebildeter Symptomatologie, ebenso wie für die symptomatologisch ähnlichen nicht familiären Fälle, mit langer Dauer, häufiger Wiederholung, psychogener Beeinflussung wird eine gemeinsame Instabilität der vasomotorischen übergeordneten Centren anzunehmen sein, ob das betreffende Centrum das Oblongatacentrum ist, ob dieses allein oder auch die corticalen oder subcorticalen Centren, ob vorzugsweise etwa gar die letzteren, das wissen wir nicht, dafür fehlen uns alle sicheren Anhaltspunkte. Oft hat man geradezu den zwingenden Eindruck, als ob die ganze Regulierung, das Ineinandergreifen der einzelnen Teile des so weit verzweigten Vasomotorenapparates und nicht nur dieses sondern des ganzen vegetativen Systems mangelhaft ist. Wenn es sich um isolierte, immer an derselben Stelle

wiederkehrende Ödeme handelt (z. B. das rezidivierende Lidödem), könnte man auch die Affektion peripherer Centren in Erwägung ziehen. Doch muß man wohl mehr damit rechnen, daß irgendein lokaler Anlaß für die besonderen Lokalisationen vorhanden sein kann, daß z. B. der erste Anfall durch ein zufällig die betreffende Stelle löffrendes Trauma ausgelöst wurde, und daß damit für einen bestimmten Zeitpunkt oder für immer die spezielle Form des Ödems gegeben war.

Doch das sind kaum mehr als Vermutungen. Auch die Begleitsymptome des Ödems, also außer den vasomotorischen hauptsächlich die sensiblen Symptome geben uns keinen weiteren Aufschluß.

Wir müssen auf sie aber doch noch einen Augenblick eingehen. Es können ja alle anderen Symptome außer den Ödemen fehlen. Höchstens daß rein mechanisch noch ein gewisses Spannungsgefühl ausgelöst wird. Es kann aber ein erhebliches Brennen und Jucken sich bemerkbar machen. Daß letzteres nicht unwesentlich an das Vorhandensein von Röté und Temperatursteigerung geknüpft ist, lehrte uns die klinische Beobachtung. So müssen wir auch diesen Symptomen eine relative Unabhängigkeit zugestehen. Einen bestimmten Anhaltspunkt über ihre Genese haben wir nicht, es liegt aber natürlich sehr nahe, die verschiedenen chemischen Qualitäten der Ödemflüssigkeit für das Auftreten der sensiblen Reizsymptome verantwortlich zu machen.

Daß die Erscheinungen der Behinderung des Schluckens, des Sprechens, der Atmung auf Schwellungen der Schleimhaut und der submucösen Partien des Rachens und des Kehlkopfes beziehungsweise der Trachea beruhen, ist durch die Inspektion sowohl wie durch die anatomischen Untersuchungen, über die wir oben berichtet haben, sichergestellt. Komplizierter sind die Phänomene beim Asthma, soweit es hierher gehört, beim Lungenödem, beim vasomotorischen Schnupfen; doch bedarf das im einzelnen keiner weiteren Auseinandersetzungen.

Schließlich bleibt uns noch die Pathogenese der „inneren Symptome“ der Affektion zu erörtern übrig. Ströbing, der zuerst diese Symptome genauer behandelt hat, hat schon mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß durch die Annahme eines dem Hautödem ähnlichen Ödems der Schleimhaut sich das Bild, wie es sich in den Anfällen darstellt, nicht völlig erklären läßt. „Möglich, daß ein Ödem die Grundlage dieser Anfälle bildet, möglich, daß durch dasselbe die übrigen Symptome erst hervorgerufen werden, jedenfalls bieten die Kranken während der Anfälle eine Reihe von Erscheinungen, die sich wohl schwer allein auf ein solches Ödem zurückführen lassen“.

Von den in diesen Fällen beobachteten Störungen ist das Erbrechen ausserhalb der wässriger Massen vielleicht am ehesten noch auf ein Ödem der Magenschleimhaut mit nachfolgender Transsudation an deren freie Oberfläche zurückzuführen. In der Tat hat auch in einem Fall

(Morris) die Untersuchung eines beim Ausspülen des Magens gelegentlich eines Brechanfalls herausgebrachten Stückchens der Magenschleimhaut, die aus der Pylorusgegend stammte, ein hochgradiges Ödem ergaben (s. o.), die Lymphräume und Gefäße waren enorm erweitert, die Zellen durch weite Räume voneinander getrennt, die Bindegewebsfasern auseinander gedrängt. Es waren Vakuolen in den Epithelzellen vorhanden, ein Übermaß von Schleim war nicht nachweisbar. Die Flüssigkeit enthielt etwas Eiweiß. Morris faßt das Ergebnis seiner Untersuchung dahin zusammen, daß an extreme oedem of gastric mucosa non inflammatory in origin vorgelegen habe. Er glaubt ausschließen zu können, daß es sich um postmortale Quellungszustände handelte. Dieser Befund bestätigt in wünschenswerter Weise die Vorstellungen, die wir uns über die Genese des Erbrechen gemacht haben. Die oben erwähnte Untersuchung über die Motilität des Magens und die chemische Zusammensetzung des Erbrochenen, deren Fortführung sehr erwünscht ist, stehen dem jedenfalls nicht entgegen. Der nervöse Einfluß auf die Absonderung der Magenschleimhaut ist seit den Entdeckungen Pawlows erwiesen; die Erregung erfolgt durch zwei sensible Bahnen; es besteht erstens ein Reflex vom Epithel des Magens aus, nicht eine direkte Erregung der Epithelzellen; der zweite Reflex läuft von den Sinnesorganen des Kopfes, Auges, der Nase, Zunge zum Gehirn und von dort in heute noch nicht erschöpfte Weise zum Ursprung des Nervus vagus und wird von diesem den Centren im Magen zugeführt (Handb. d. Physiol. von Nagel II S. 534). Die sekretorischen Störungen können auf einem dieser Wege zustande kommen. Damit erscheinen aber die heftigen Schmerzen noch nicht geklärt, ebensowenig die Einziehung des Abdomens, die starke Stuhlverstopfung. Zur Erklärung dieser Dinge nimmt Strübing einen pathologischen Erregungszustand des Bauchsympathicus an, und nach der Kontraktion der Därme zu schließen, auch einen solchen des Plexus myentericus. Jedenfalls sind das Dinge, die der Annahme einer reinen Angioneurose ebenfalls durchaus widerstreben.

Die Erklärung einer Reihe anderer Symptome ist ganz zweifelhaft. Hierher gehört die Polyurie, die Anurie, die Albuminurie und die Hämoglobinurie. „Hier wird man auf Veränderungen in der Innervation der Nierengefäße zurückgreifen müssen“. (Strübing.) Durch Reizung des Splanchnicus erhält man beim Versuchstier Kontraktion der Nierenarterien und Erschwerung der Blutzufuhr zum Glomerulus, es sinkt die Urinmenge, aber es können die Epithelien der gewundenen Kanälchen dadurch auch Ernährungsstörungen erleiden, und die Folge ist eine leichte Albuminurie.

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich: das flüchtige circumscripte Ödem ist keineswegs eine einfache Angio-

neurosis; neben den unzweifelhaft vorhandenen Störungen der Blutcirculation spielen andere Momente, die als trophische oder sekretorische Störungen aufzufassen sind, eine große Rolle, und auch sensible (und entero-motorische) Symptome erfordern Berücksichtigung. Es sind, wie in allen anderen von uns behandelten Affektionen, nicht schwere, anatomisch sicht- und greifbare Läsionen, die die Störungen hervorrufen, (in einem Fall, in dem Mouro und Mc Gregor das Centralnervensystem eines an Tuberkulose gestorbenen Individuums mit flüchtigem Ödem untersuchten, fand sich keine Veränderung), sondern leichte, auch in ihrer Wirksamkeit sich erschöpfende; daher denn auch die Flüchtigkeit der Ödeme. Der krankmachende Reiz kann direkt wirksam werden, oder aber auf dem Wege des Reflexes übertragen werden (Börner, Collins, Lewis, Haynes, Ströbling). Seine genauere Art ist uns unbekannt.

Diese Anschauungen über die Pathogenese der Krankheit machen es uns verständlich, daß auch die Beziehungen zu den übrigen „Angio-Tropho-Neurosen“ hat. Daß klinisch Berührungspunkte mit den Akroparästhesien, mit der Erythromelalgie und besonders mit der Raynaudschen Krankheit bestehen, haben wir schon festgestellt. Bei diesen Affektionen tritt das angioneurotische Element noch stärker zurück als bei der Quinckschen Krankheit, während es bei anderen Affektionen, denen die letztere nahe steht, insonderheit bei der Urticaria sich stärker geltend macht; eine reine Angioneurose kann aber auch die Urticaria nach unserer Auffassung nicht sein, als solche haben nur die einfachen Erytheme zu gelten.

Auch das akute flüchtige Ödem zeigt, wie die Mehrzahl der von uns behandelten Krankheiten als besonderes Charakteristikum den paroxysmalen Verlauf.

Eine Frage drängt sich uns noch auf. Ist die Quincksche Affektion nur ein Symptomenkomplex oder ein Morbus sui generis? Die Frage ist nicht mit einem einfachen ja oder nein zu beantworten. Es gibt Fälle, in denen die Erscheinung der flüchtigen Ödeme so weit hinter anderen wichtigeren Symptomen zurücktritt, daß es nicht angeht, ihnen klinische Selbständigkeit zuzusprechen: hierher gehören die Ödeme bei Morbus Basedowii, die von einzelnen Forschern wie Lövi und de Rothschild als direkte Folge von Hyperthyreoidismus angesehen werden, und aus deren Vorkommen abhaßt wieder in der üblichen Verallgemeinerung auf die ursächliche Rolle von Störungen der inneren Sekretion für die allgemeine Pathogenese der flüchtigen Schwellungen geschlossen wurde; hierher gehören ferner die Ödeme bei Migräne, bei Neuralgien, bei der Tabes, im Gefolge der lancinierenden Schmerzen, die selteneren Fälle, wo sie bei organischen Rückenmarksläsionen auftreten.

Damit ist ja keineswegs gesagt, daß diese symptomatischen flüchtigen Ödeme pathogenetisch anders aufzufassen sind, als die selbständigeren der eigentlichen Quincke'schen Affektion.

In vielen Fällen ist das unbeschriebene flüchtige Ödem aber sicher eine selbständige Krankheit. Freilich wie schon betont, ist die Einheitlichkeit dieser Krankheit nicht sichergestellt.

Zwei Gruppen lösen sich da voneinander. Zu den ersten möchte ich die Fälle rechnen, die auf toxischem, autotoxischem oder infektiösem Wege entstehen, akut einsetzen und akut verlaufen, wie eine Intoxikation oder Infektion, keine Neigung zu Rezidiven haben, oder doch nur soweit, als sie immer wieder durch dieselbe (toxische) Schädlichkeit ausgelöst werden. Sie stehen der Urticaria und der Purpura nahe und zeigen oft Züge dieser Affektionen.

Zur zweiten Gruppe rechne ich die Fälle, wo eine direkte oder indirekte Heredität vorliegt, wo nervöse Züge im Krankheitsbild stark vorherrschen, wo die Anfälle unabhängig von äußeren Verhältnissen, mit fatalistischer Regelmäßigkeit und Bestimmtheit wiederkehren oder psychogene Momente eine wichtige ätiologische Rolle spielen.

Diese beiden Gruppen sind noch viel weniger scharf geschieden, als die ganze Affektion von den nahe verwandten; aber in nicht wenigen Fällen ist die Differenz doch recht merkbar und in die Augen fallend.

Das gemeinsame Kennzeichen ist die flüchtige Schwellung, deren Genese letzten Endes bei beiden äußerlich so verschieden auftretenden Gruppen eine einheitliche ist, wie folgendes Schema demonstrieren mag.

Gruppe a) toxisch-autotoxisch-infektiös. Das supponierte Gift wirkt den Lymphgefäßapparat im weiteren Sinne und bringt auf dem Wege der erhöhten Lymphsekretion oder der erhöhten Durchlässigkeit der Gefäße oder der erhöhten Aufnahmefähigkeit des anliegenden Gewebes das Ödem hervor, meist unter gleichzeitigem Auftreten vasomotorischer und sensibler Phänomene. Der supponierte Reiz wirkt direkt oder auf dem Wege peripherer oder zentraler nervöser Apparate.

Gruppe b) hereditärfamiliäl oder konstitutionell-neuropathisch. Der Reiz wirkt auf dem Wege nervöser Übertragung, die die nervösen Centren und Bahnen des Lymphgefäß- und Vasomotorenapparats benutzt, und bedingt in derselben Weise wie bei a) die flüchtigen Ödeme. An die, wie mir allerdings scheinen will nicht gerade naheliegende Möglichkeit, daß durch die primäre nervöse Erregung toxische Stoffe gebildet werden, die dann in völlig gleicher Weise wirken, wie bei Gruppe a, muß noch gedacht werden.

Womit die für die zweite Gruppe zu supponierende Empfindlich-

keit des Nervensystems besteht, ist nicht festgestellt. Daß es sich um das vegetative System handeln muß, liegt auf der Hand. Anhaltspunkte für die Annahme einer besonderen Empfindlichkeit eines der Abschnitte dieses Systems (Vagotonie, Sympathicotonie) kann ich nicht finden; entsprechende Untersuchungen in größerem Umfang sind noch nicht angestellt, über einzelne nicht entscheidende, zum Teil persönliche Beobachtungen wurde früher berichtet.

Aber jedenfalls müssen wir mit der Annahme einer hereditären oder erworbenen Instabilität des vegetativen Systems rechnen, in gleicher Weise wie wir das in den früheren Kapiteln der Raynaud'schen Krankheit und Sklerodermie auseinandergesetzt haben. Die Beziehungen zwischen dieser Labilität und etwaigen Störungen von Drüsen innerer Sekretion, die man auch für das flüchtige Ödem als primäre Ursache in Anspruch genommen hat, sind hier noch ganz ungeklärt. Positive Anhaltspunkte sind hier spärlicher noch als bei den früher genannten Affektionen zu finden: es bleiben eigentlich nur die flüchtigen Ödeme bei Basedow erwähnenswert. Daß aber selbst beim Nachweis von Störungen innerer Sekretion keineswegs deren primärer Charakter garantiert ist, habe ich früher schon wiederholt betont und habe auseinandergesetzt, daß ich letzten Endes diese Alteration der inneren Sekretion doch wieder als eine neurogene ansehe. Den an früherer Stelle für diese Auffassung angeführten Erwägungen möchte ich hier noch eine anfügen. Versuche von Starkenstein über den Mechanismus der Adrenalinwirkung scheinen zu zeigen, daß die Piquüre eine Adrenalinämie durch zentrale Reizung der Nebennieren auf dem Wege des Sympathikus und dadurch die Zuckerflut herbeiführt, daß diese nach Zerschneidung des Splanchnicus nicht eintritt, ebenso wie auch die sonst nach Kohlenoxydvergiftung eintretende Glykosemie nach Durchschneidung des Splanchnicus ausbleibt. Es liegt auf der Hand, daß derartige Versuche ein Verständnis für die auch beim flüchtigen Ödem auftretenden Symptome der Glykosemie, Albuminurie, Versagen der Salivation und ähnliches eröffnen.

Jedenfalls ist nach dieser Auffassung die Labilität des vegetativen Systems die Grundlage, auf der sich die Symptome der Quincke'schen Krankheit aufbauen.

Diagnose.

Die Diagnose des flüchtigen umschriebenen Ödems macht in den ausgesprochenen Fällen der Krankheit keine besonderen Schwierigkeiten. Diagnostisch bedeutsam ist erstens die Art der einzelnen Schwellungen, Rasch sich entwickelnde, mehr oder minder scharf begrenzte, blasse oder normalfarbige, seltener

etwas gerötete Schwellungen, die bald nur ein Spannungsgefühl hervorbringen oder auch mit Jucken verbunden sind, seltener heftige Schmerzen machen, in denen der Fingerdruck nicht oder nur wenig stehen bleibt, und die nach wenigen Stunden oder Tagen verschwinden. Dann kommt die Multiplizität der Schwellungen, so daß, während eine verschwindet, eine andere sich zu bilden anfängt, weiter die Neigung zu erneuten Anfällen in bald wechselnden, bald konstanten Zwischenräumen, die oft beobachtete Bevorzugung der einmal erkrankten Stelle, der häufig vorhandene allgemeine nervöse Habitus, schließlich in vielen Fällen die durch ihr plötzliches Auftreten und Verschwinden ebenfalls charakterisierten, oben näher geschilderten „inneren“ Symptome.

Aber wir sehen, daß dies typische Bild oft Abänderungen erfährt, und diese erschweren seine richtige Deutung. Die sich ergebenden Schwierigkeiten machen sich hauptsächlich in drei Richtungen bemerkbar. Erstens hat, wie wiederholt betont, das flüchtige Ödem enge Beziehungen zu einigen nahe verwandten Affektionen, in erster Linie zur Urticaria, dann zu gewissen Fällen der Purgura, schließlich seltener zur Raynaudschen Krankheit und zur Erythromelalgie. Auf die Differentialdiagnose gegenüber diesen Krankheiten besuche ich an dieser Stelle nicht mehr einzugehen; ich habe das Nötige darüber schon in früheren Abschnitten gesagt.

In zweiter Reihe gibt es dann eine Anzahl von Beobachtungen, in denen es nicht fraglich ist, daß es sich der Art der Schwellungen nach um flüchtige neuropathische Ödeme handelt, in denen aber die Entscheidung der Frage Schwierigkeiten macht: sind diese Ödeme nur ein Symptom des Grundleidens oder beanspruchen sie klinische Selbständigkeit; im letzteren Falle müßte man dann eine Kombination zweier selbständiger Krankheiten annehmen. Wir sind auch auf diesen Punkt schon mehrfach eingegangen. Solche Schwellungen kommen im Gefolge organischer und funktioneller Nervenkrankheiten vor; von letzteren am häufigsten beim Morbus Basedowii, dann bei den Neuralgien und bei der Migräne. Daß in solchen Fällen eine Entscheidung, ob eine Kombination von Quinckescher Krankheit und Neurose oder eine Neurose mit symptomatischen flüchtigen Ödemen vorliegt, schwer oder selbst unmöglich sein kann, sei nochmals betont. Es ergibt sich auch aus unserer bisherigen Darstellung, daß die Forderung einer sicheren Trennung der „symptomatischen“ und „idiopathischen“ flüchtigen Ödeme bei der gleichen Pathogenese dieser Störungen oft genug unerfüllbar und unhaltbar sein muß. Auch bei organischen Nervenkrankheiten kommen, wie wir sehen, symptomatische flüchtige Ödeme vor. Der symptomatische Charakter dieser Erscheinungen, denen wir besonders bei der Tabes dorsalis, bei der Gliose, und bei einigen seltenen Fällen von Kompressionserkrankungen des

Rückenmarks begegnet sind, dokumentiert sich oft darin, daß sie einmal örtlich an die Ausbreitung der durch die Grundkrankheit bedingten sonstigen nervösen Störungen gebunden sind. So konnten Mathieu et Veil in einem Fall, in dem die Ödeme die lancinierenden Schmerzen eines Tabikers begleiteten, den Weg, den diese Schmerzen nahmen, durch die Ödeme bezeichnet finden. Und die Ödeme ließen auch zeitlich mit den Schmerzen zusammen. Bei der Glissis spinalis kommt die nahe verwandte Urticaria öfter vor. „An Hautstellen, welche im Bereich der erkrankten Körperabschnitte liegen, treten dann Eruptionen von rosearoten, ziemlich derben, linsengroßen oder noch größeren Quaddeln anscheinend ohne Veranlassung auf“ (Schlesinger). Trotz sonstiger Sensibilitätsstörungen an den betroffenen Stellen waren sie mit Jucken verbunden. An denselben Stellen findet sich dann auch oft Urticaria laetitia. „Die Urticaria bei Syringomyelie unterscheidet sich von der gewöhnlichen Form durch ihre Ausbreitung, während sonst bei der Urticaria die Affektion sich über die ganze Körperoberfläche erstreckt, so werden hier entweder die anästhetischen Körperstellen vorzugsweise ergriffen, und es bleibt sonst die ganze Körperoberfläche frei, oder die Urticaria tritt nur an den sensiblen, nicht an den anästhetischen Stellen auf“ (Schlesinger).

Neurotische Ödeme hat Reimack zuerst bei Syringomyelie beobachtet und sie als spinale Ödeme bezeichnet. Sie wurden bisher nur in vereinzelten Fällen beobachtet. Völlig intaktes Gefäßsystem, ganz normale Tätigkeit des Herzens und der Nieren zeigen im Verein mit der ungewöhnlichen Lokalisation an, daß die Ödeme spinale Ursprungs sind. Am häufigsten wurden sie bisher an den oberen Extremitäten gefunden. Sie entwickeln sich oft außerordentlich rasch in wenigen Stunden (Guesda-Schlesinger, Fürstner, Zacher). Schlesinger weist selbst auf die dadurch sich ergebenden Ähnlichkeiten mit den Quincke'schen akuten Ödemen hin. Nach Schlesingers Angaben dauern sie aber meist längere Zeit an (Reimack, Ewald-Schlesinger, Testi), vergehen seltener schon nach mehreren Tagen vollkommen (Fürstner, Zacher, Weintraud, Guesda-Schlesinger). Bisweilen treten sie intermittierend auf wie im Falle von Kofend. Die Ausdehnung der Schwellung ist bisweilen eine erhebliche. Sie kann sich über die ganze Extremität und auch die angrenzenden Rumpfabschnitte erstrecken (Guesda). Die Ödeme betreffen aber nicht nur die Haut, sondern auch die tiefen Gebilde und besonders bemerkenswert ist nach Schlesinger, daß zu wiederholten Malen eine Koinkidenz mit einer Arthropathie eines großen Gelenkes der betroffenen Extremität statthabte (Guesda, Roth), ähnlich wie dies auch bei Tabes beobachtet worden ist. Schlesinger glaubt nicht, daß zur Erklärung des Symptomenbildes die Annahme eines Kapselrisses notwendig ist, und verweist in dieser Beziehung gerade auf die Erfahrung bei dem

Quinckeschen Ödem. „Diese akuten Ödeme bei Syringomyelie zeigen in bezug auf Erscheinen, Verschwinden, Intermittenz, Entwicklung eine große Übereinstimmung mit dem flüchtigen Ödem, unterscheiden sich aber doch wesentlich von letzteren, die stets nur an anatomisch nicht veränderten Körperstellen entstehen, während das akute Ödem bei der Syringomyelie stets organisch veränderte Körperteile befallt.“ Ob die letztere Angabe wirklich immer zutrifft, ist zweifelhaft; ich möchte die Möglichkeit aufrechterhalten, daß das Ödem gelegentlich auch bei der Syringomyelie an Stellen auftritt, die sonst noch keine Veränderungen in irgendeiner Beziehung aufweisen, wie das gerade von Schlesinger selbst für die Urticaria behauptet und beobachtet worden ist; jedenfalls aber muß sich die Diagnose auf die für Syringomyelie charakteristischen Symptome stützen. Daß auch bei dem akuten flüchtigen Ödem wieder die Syringomyelie diejenige organische Erkrankung des Nervensystems ist, bei der am häufigsten die Kombination vorkommt, ist in pathogenetischer Beziehung von großer Wichtigkeit, die daraus zu ziehenden Schlüsse decken sich mit denjenigen, die wir in früheren Kapiteln bereits erörtert haben.

Bei der Malaria kommen ebenfalls flüchtige Ödeme vor, die, wenn sie in den typischen Intermissionen des Malariaanfalls und ev. an Stelle des Fieberparoxysmus oder mit diesem zugleich auftreten, auch nur symptomatischen Wert beanspruchen können. Hier sind freilich wieder Fälle denkbar und auch beobachtet worden, in denen die Entscheidung, ob symptomatische oder idiopathische flüchtige Ödeme vorliegen, zweifelhaft wird.

Eines der Hauptkennzeichen unseres Ödems ist seine Flüchtigkeit, sein rasches Entstehen und Verschwinden. Wir haben aber schon im symptomatologischen Abschnitt gesehen, daß auch dies Charakteristikum sich bisweilen zu verwischen droht; wir sahen Schwellungen sich entwickeln, die allmählich über bestimmte Teile des Körpers „fortkrochen“; ein andermal brauchten sie zu ihrem Entstehen und Vergehen so lange Zeit, daß der Ausdruck „flüchtige Schwellungen“ nicht mehr am Platz zu sein schien, oder es entwickelte sich nach anfänglich vorhandenem akuten Schüben allmählich ein persistentes Ödem. Ich habe einen Fall beobachtet, bei dem sich an einer Stelle ein dauerndes Ödem entwickelte, während an den anderen Stellen immer flüchtige Ödeme auftraten. Es handelt sich um ein 19 jähriges Mädchen, das seit einer Reihe von Jahren an typischen Migräneanfällen litt. Zugleich mit den Migräneattacken stellten sich Anschwellungen im rechten Zeigefinger ein, die anfänglich wieder verschwanden; daneben traten auch an verschiedenen anderen Körperstellen flüchtige Schwellungen ein. Während diese immer wieder zurücktraten, blieb in den letzten Monaten die Schwellung am Zeigefinger bestehen. Dieser ist jetzt erheblich geschwollen, und ein wenig cyanotisch; der Druck auf das erste Interphalangeal-

gelenk ist hier etwas schmerzhaft. Keine Sensibilitätsstörungen, kein sonstiger objektiver Befund. Zehn Monate später besteht die Schwellung des Fingers im gleichem Maße fort; die Schwellung geht auch etwas auf die Vorderseite der Hand über. Im übrigen kommen in der Zwischenzeit Anfälle von Migräne und flüchtige Ödeme vor. Vielleicht war hier die Persistenz durch eine bei der Tätigkeit der Patientin notwendige dauernde Anstrengung des Fingers bedingt. Von solchen Fällen aus gibt es dann Übergänge zu denen, in denen eine ausgesprochen langsame Entwicklung sich unserer Beobachtung darbietet, und nebenher auch noch die weiteren Kennzeichen der Ödeme, ihre Multiplizität und das Wiedervergehen nach mehr oder minder langem Bestehen verschwinden. Dabei kennzeichnen sich diese Schwellungen als neuropathische noch immer durch das Fehlen jeglicher anderen Ursache, durch ihre Ausbreitung und die engen Beziehungen zu anderen Nervenkrankheiten, er, auch durch ihr hereditär-familiäres Auftreten.

Es wäre verfehlt, diese Ödeme noch als Symptome der Quinckesehen Krankheit aufzufassen. Das Verhältnis scheint mir hier ähnlich zu liegen wie bei der Asphyxie locale. Wo gar keine Spur eines paroxysmalen Auftretens mehr vorhanden ist, haben wir nicht mehr die Berechtigung, von der Quinckesehen Krankheit zu sprechen, so wie wir dort, wo die Asphyxie locale sich von vornherein chronisch-graduell entwickelt, nicht mehr Raynaudsche Krankheit diagnostizieren dürfen. Hier wie dort kommen Übergangsfälle vor, die uns aber nicht abhalten dürfen, wenigstens einen Versuch der Trennung dieser beiden Formen der neuropathischen Ödeme zu machen.

Auch diese chronischen, neuropathischen Ödeme treten entweder als selbständige Krankheitsformen auf, oder als Symptome anderer Nervenkrankheiten. Symptomatische Ödeme dieser Art finden wir z. B. bei der Gliosis spinalis; die bei ihr vorkommenden oben schon erwähnten Anschwellungen haben bisweilen eine Neigung zu langdauernder Persistenz, wie in den Fällen von Remak, Ewald-Schlesinger, Gyrman, Klippel et Mallet, ferner bei cerebralen Hemiplegien, oft zusammen mit anderen vasomotorischen Störungen — nähere Angaben darüber finden sich im allgemeinen Teil S. 36 — hierher gehört wohl auch ein Fall von Brissaud und Mosttier: elephantiasisches Ödem beider Beine, das nicht durch Gefäßstörungen bedingt ist, auch nicht die Kennzeichen des Trophödems trägt und auf multiple kleine cerebrale Erweichungsherde zurückgeführt wird, wie auch die gleichzeitig bestehende Taubheit, Astereognosis usw.; bei mannigfachen spinalen und peripheren Lähmungen, bei der Myelitis dorsalis. Die Abgrenzung gegen das akute flüchtige idiopathische Ödem ist hier immer auf Grund der schon mehrfach angegebenen Merkmale leicht zu erreichen.

Die größten Schwierigkeiten macht die Unterscheidung von

hysterisches Ödem. Man unterscheidet hier bekanntlich zwei Unterformen: oedème blanc oder Sydenhamisches Ödem und oedème bleu oder Charcotisches Ödem. Das Ödem findet sich meist mit anderen hysterischen Symptomen zusammen, also mit Lähmungen, Kontrakturen und Anästhesien (ich folge der Schilderung von Gilles de la Tourette, mit der sich die Binswangers in seiner Hysterie (Wien 1904 S. 591) in den wesentlichsten Punkten deckt), nur ausnahmsweise ist es eine isolierte Erscheinung. Es betrifft meist Erwachsene, ist meist einseitig, kann dabei Arm und Bein zu gleicher Zeit befallen. Aber es kommt auch eine Generalisierung resp. Dissemination des Ödems vor, wie ein später noch zu berücksichtigender Fall von Fabre zeigen soll; auch eine mehr oder minder über den ganzen Körper verbreitete Ausdehnung des Ödems wurde beobachtet. Das Gesicht bleibt auch dann, wie auch sonst meist, frei. Die Farbe der Haut wechselt, ist weiß (oedème blanc), öfter etwas cyanotisch (oedème bleu) oder rosa (oedème rouge), entsprechend ist die Temperatur normal, herabgesetzt oder gesteigert. Es erscheint meist mit der Kontraktur oder Lähmung zusammen, kann aber auch vorausgehen, wechselt sehr an Intensität, kann plötzlich erscheinen und verschwinden, ist aber meist von langer Dauer.

Gilles de la Tourette beschränkt die Differentialdiagnose gegenüber dem akuten Hautödem, das er übrigens nicht für ein scharf umschriebenes Krankheitsbild hält, als recht schwierig. Unterscheidungsmerkmale sind das Freibleiben des Gesichts beim hysterischen Ödem (nur Fabre und Wills and Casper haben auch das Gesicht von ihm betroffen gesehen), und die Koexistenz des akuten Hautödems mit den Erscheinungen von seiten der Schleimhäute. Die Differentialdiagnose der beiden Symptombilder ist auch von anderer Seite (Étienne, Collins, Higier, Norton, Riehl, Edgeworth, Soyex, Onuf) in Angriff genommen worden. Collins rekuriert auf die anderen hysterischen Stigmata, auf den weniger akuten Verlauf und das Fehlen der Multiplizität der Schwellungen. Higier bezeichnet als Kennzeichen des hysterischen Ödems: plötzliches Auftreten, chronischen Verlauf, gleichzeitiges Bestehen motorischer und sensibler Stigmata, besonders an den ödematösen Teilen, Beeinflussbarkeit durch Suggestion. Étienne sagt, es erscheint an anästhetischen Teilen und besteht lange. Norton hält es für zweifelhaft, ob das hysterische und angioneurotische Ödem zu trennen sind. Das hysterische Ödem ist nach ihm im allgemeinen mehr isoliert und umfangreicher; es kann an ein und derselben Stelle wochenlang bestehen, es kommen aber Intermissionen und häufige Rückfälle vor.

Das wären ja Unterscheidungsmerkmale genug, aber es bleiben doch große Schwierigkeiten. Wenn wir uns überlegen, daß die Quincke'sche Affektion oft genug neuropathische Individuen beläßt, so müssen

wir uns auch auf die Kombination von Hysterie und flüchtigen Ödemen gefaßt machen. Also, hysterische Stigmata genügen nicht immer, um auch das Ödem zu einem hysterischen zu stempeln. Handelt es sich z. B. im folgenden Fall Barkes um hysterisches Ödem?

35-jähriges Fräulein, hereditär nervös belastet. Immer anästhetisch, ausgeprägt hysterische Symptome. Seit einiger Zeit an verschiedenen Körperstellen, aber fast rechts, plötzliche Hautschwellungen, meist über handtellergroß, keine Schmerzen. Meist nach geistiger Anspannung, Anstrengung, argem Schreck, am stärksten vor der sie stark erregenden Periode. Durch Freude oder Schreck können die Schwellungen auch verschwinden. Mit der Abnahme des Nervosität-Bewegung der Symptome.

Der Autor beschreibt den Fall als angioneurotisches Ödem; vieles stimmt auch damit; aber die Halbseitigkeit, allerdings ohne Hemiplegie oder Hemianästhesie, die leichte Beeinflussbarkeit der Affektion durch Vorstellungen sprechen sehr zugunsten der Hysterie. In dem schon erwähnten Fall von Fabre bestanden multiple flüchtige, farblose Schwellungen, daneben aber Sensibilitätsstörungen; hier ist die Entscheidung ebenfalls sehr schwierig; ebenso im dritten Fall von Riehl. Curschmann beschreibt ein bei einer typischen Hysterica auftretendes Ödem, das die Brust und den rechten Arm betraf, dann auf den linken Arm überging und sich schließlich auf beide Beine erstreckte. Die ödematösen Stellen waren stets anästhetisch; durch Suggestion war ein leichtes Ödem der oberen Gesichtshälfte, Schwellung und Injektion der Conjunctiva und entsprechende Anästhesie zu erzielen. Ähnlich liegt ein von Dufour beschriebener Fall: Bei einer 21-jährigen Frau, die hysterische Symptome darbietet, tritt vor 6 Monaten nach einer Aufregung eine schmerzhafte Schwellung des rechten Armes ein, die nach drei Monaten plötzlich verschwindet. Seit drei Wochen besteht ein ähnlicher Zustand links, eine weiche Schwellung des Armes, die plötzlich drei Finger breit unter der Schulter aufhört. Es sind Schmerzen im Arm, besonders im Verlauf der Nervenstämme vorhanden. Hier ist freilich sehr an ein Artefakt zu denken.

Überher gehören auch Beobachtungen, die Edgeworth mitgeteilt hat.

Ein 35-jähriger Mann klagt wegen einer seit Jahren bestehenden Schwellung der rechten Hand in ärztliche Behandlung. Vor elf Monaten war zum erstenmal eine Schwellung aufgetreten, die unter der rechten Fußselle auf und nur einige Stunden dauerte. Seitdem ist kaum eine Woche vergangen, ohne daß eine der Hände, oder Hand und Unterarm, oder die Füße angeschwollen wären. Gewöhnlich geht ein leichtes Kriebeln voraus, die Schwellung hält 24 Stunden an, um dann zu verschwinden. Augenblicklich ist die rechte Hand bis zum Handgelenk geschwollen, die Schwellung läßt Fingerdruck nicht bestehen, die Haut der erkrankten Stelle ist nicht hyperämisch oder heiß, aber die Haut über der Schwellung und noch zwei Zoll darüber hinaus ist für Berührung und Temperaturreize partiell, für Schmerzreize total unempfindlich. Das Nervensystem ist in übrigen intact, es sind keine hysterischen Zeichen vorhanden.

Edgeworth berichtet noch einen zweiten ähnlichen Fall. Er

glaubt, auf Grund eines weiteren typischen Falles von flüchtigen Ödemen ohne Sensibilitätsstörungen, aber mit sonst ganz gleichen Symptomen, daß es eine allgemeine Krankheit gibt, ein paroxysmales Ödem, das als eine vasomotorische Neurose aufzufassen ist. In manchen Fällen sollen Gestalt und Verteilung der Ödeme einen kortikalen Ursprung annehmen lassen, und es kann dann in ihrem Verlauf zu Sensibilitätsstörungen hysterischen Charakters kommen. Aber wahrscheinlich sind nicht alle paroxysmalen Ödeme pathogenetisch gleiche Affektionen.

Von einer anscheinend besonderen Form der Anschwellungen bei Hysterie berichtet auch Binswanger in seinem zitierten Werk. Er sagt: Eine besondere Stellung nehmen die flüchtigen Schwellungen ein, welche bei der hyperalgetischen Form der Neurasthenie und bei der ausgeprägten Hysteroneurasthenie im Verlauf von Schmerzattacken an unbeschriebenen Partien des Körpers, am häufigsten in der Supra- und Infralaviculargrube, in der Nackengegend und am Oberarm sich gelegentlich vorfinden. Die Schwellungen sind bis handtellergroß und gehen allmählich in die normale Umgebung über. Sie haben eine weiche, fast teigige Beschaffenheit und sind mit der Fingerkuppe leicht eindrückbar. Es wurde stets nur Hyperästhesie resp. Hyperalgesie, und niemals Anästhesie im Bereich dieser Schwellungen gefunden. Die Haut hatte immer eine normale Färbung, die lokale Temperatur war nicht erhöht. Es dürfte nach meiner Ansicht unmöglich sein, diese Schwellungen von den eigentlichen und echten flüchtigen Ödemen zu unterscheiden. Denn das Kriterium der Überempfindlichkeit ist doch ein zu unsicheres, als daß es diagnostischen Wert haben könnte. Wir würden dann in diesen Fällen jedenfalls immer nur dazu kommen zu sagen, daß es sich um flüchtige Schwellungen bei hysterischen handelt, während eine engere Beziehung zu der Hysterie damit noch nicht gegeben zu sein scheint. In die gleiche Kategorie wie diese Schwellungen versucht Binswanger eine Symptomengruppe einzurufen, die seit langem als „sein hystérique“ bezeichnet wird. Die Mamma wird schmerzhaft, äußerst druckempfindlich und in ihrem Volumen ein wenig vergrößert. Das Wesentlichste ist hier der Schmerz, aber Binswanger erwähnt doch, daß in einzelnen Beobachtungen die Schwellung eine sehr beträchtliche Größe mit Rötung und Spannung der Haut und lokaler Temperaturerhöhung zu erreichen pflegt. Auch isolierte knotige Verdickungen innerhalb der Brustdrüse werden erwähnt. Überall da wo es zu wirklichen Schwellungen kommt, wird man auch in diesem Zusammenhang an die Möglichkeit der Kombination der Hysterie mit flüchtigen Ödemen im engeren Sinne des Wortes denken müssen. Ich erinnere dabei daran, daß in einem meiner Fälle eine Schwellung der Brustdrüse beobachtet wurde, die mir durchaus als Symptom der Quinckeschen Krankheit imponieren mußte. Und wenn Binswanger diese Schwellungen so schildert, daß er sagt, sie sind einseitig oder doppelseitig, treten nur für Stunden oder Tage auf und

besitzen eine rezidivierende Tendenz, so erkennt man sofort, wie viel in dieser Schüdderung an die Quinckeschen Ödeme erinnert.

Ich bin also geneigt, in der Mehrzahl dieser Fälle mehr an eine Kombination der beiden Affektionen zu denken als anzunehmen, daß sich auf dem Boden der Hysterie echte hysterische multiple flüchtige Schwellungen entwickeln. Eine solche Auffassung scheint mir auch für eine Kranke Geltung zu haben, welche ich seit vielen Jahren beobachte, und die seit langer Zeit ausgeprägte hysterische Symptome zeigt: Anästhesien, Lach- und Weinkrämpfe, Globus, große Emotivität. Bei dieser Kranken haben sich gewöhnlich im Anschluß an Aufregungen flüchtige Schwellungen gezeigt, meist im Gesicht an der Oberlippe, Wangen, Augenlidern, gelegentlich auch am Rumpf. Die Idusen, nicht juckenden Schwellungen waren stets nur singular, bildeten sich im Verlauf weniger Minuten und verschwanden nach Stunden bis halbtägiger Dauer. Sie hatten zu den Anästhesien new, keine Beziehung. Die Kranke leidet außerdem an Urticaria, die sehr oft nach dem Genuß mannigfacher Speisen, aber auch ohne solche Ursachen auftritt. Schließlich kommen auch einfache Erytheme vor. Die Mutter litt an typischer Migräne. Wegen des Sitzes und der Flüchtigkeit der Ödeme, wegen des Fehlens von sensiblen und motorischen Störungen an den ödematösen Teilen, in Rücksicht auf die anderen Zeichen vasomotorischer und sekretorischer Labilität kann ich mich nicht entschließen, in diesen und ähnlichen Fällen die Ödeme als hysterische im engeren Sinne anzusehen. Ich möchte darüber hinausgehend noch betonen, daß auch da, wo sensible Störungen im Bereich der Ödeme vorhanden sind, damit ihr hysterischer Charakter noch keineswegs garantiert wird, da naturgemäß bei der großen Eindruckslähigkeit der Hysterischen ein Hinzutreten von sensiblen Störungen sei es im Sinne der Anästhesie oder auch der Hyperästhesie leicht verständlich wird, und es auf diese Weise zu einer Auflagerung hysterischer Symptome auf die anders zu deutenden Erscheinungen der flüchtigen Schwellungen kommt.

Ich bin demgemäß geneigt, das Geltungsgebiet der hysterischen Ödeme einzuschränken. Wir wären aber aller dieser diagnostischen Schwierigkeiten mit einem Schlag überhoben, wenn in der Tat eine Lehre volle Geltung beanspruchen könnte, die im Anschluß an die Aufstellungen von Babinski von einer Reihe französischer Autoren vertreten wird.

Babinski hat sich darüber gelegentlich der großen Hysteriedebatte in der Pariser Neurologischen Gesellschaft sowohl wie auch bei verschiedenen anderen Gelegenheiten geäußert. So sagt er z. B.: Die Neurologen sind jetzt sehr vorsichtig in der Interpretation von Ödemen zweifelhaften Ursprungs. Es genügt ihnen nicht mehr zu konstatieren, daß bei diesen Kranken hysterische Symptome vorhanden sind. Und das gilt nach dieser Auffassung nicht nur für die Ödeme, sondern auch für

die übrigen tropfischen Störungen der Haut, für das Fieber und die Hämorrhagien. Rabinski scheint geneigt die Möglichkeit einer Entstehung dieser Störung auf dem Boden der Hysterie vollkommen abzulehnen. Er sieht in ihnen entweder Artefakte oder leugnet die hysterische Natur dieser Symptome oder glaubt, daß es sich um andersartige Fehldiagnosen handelt. Es kann auch keinem Zweifel unterliegen, daß ihm resp. seinen Anhängern in einer Reihe von Fällen der Nachweis gelungen ist, daß angebliche hysterische Ödeme diese Bezeichnung nicht verdienen. In einer Reihe von Fällen wurde in der Tat nachgewiesen, daß es sich um Kunstprodukte handelt. Als Beispiel führe ich einen Fall von Glorieux an, der ein voluminöses Ödem des Unterarmes und der Hand bei einer Hysterica vorstellte. Nach einer von Meige vorgenommenen Untersuchung handelte es sich aber in diesem Falle um Simulation. Meige, Dony und Dupré bemerken dazu, daß dasselbe Resultat die Untersuchung aller in den letzten Jahren vorgestellten Fälle von angeblich hysterischen Ödemen ergeben hätte. Claude fand auf der anderen Seite in einem Fall, der als hysterisches Ödem angesehen wurde, als Ursache des Ödems des Handrückens eine Tuberkulose der Scheinsehne. Ich habe keine Veranlassung diese Frage in allen ihren Einzelheiten hier aufzurollen und zu besprechen. Aber ich möchte nur der Überzeugung Ausdruck geben, daß es mir nicht berechtigt zu sein scheint, prinzipiell die Möglichkeit des Entstehens aller dieser Störungen auf hysterischer Basis abzulehnen.

Ich komme auf diesen Punkt im nächsten Kapitel noch einmal zu sprechen.

In der Literatur finden sich nur noch eine ganze Reihe von anderen Fällen, in denen Ödeme auftraten, für deren Entstehung eine der gewöhnlichen Ursachen nicht gefunden werden konnte und die sich dadurch und zum Teil auch durch das Vorhandensein anderer nervöser Symptome als neuropathische Ödeme zu demonstrieren schienen. Die Klassifikation dieser Fälle macht große Schwierigkeiten. Es handelt sich meist um allmählich entstehende Ödeme, die auch in der Mehrzahl der Fälle singular auftreten.

Hierher rechnet zum Beispiel der folgende Fall eigener Beobachtung:

8. 23jähriges Fräulein, untersucht am 8. Juni 1886. Pat. ist Sträßenkonditorin, sie hat die rechte Hand bei selbständiger Arbeitszeit ziemlich stark anzuheben. Sie will seit längere Zeit unregelmäßig, ängstlich und erschreckt sein. Seit neun Wochen besteht auf der Rückseite der rechten Hand eine Schwellung, die auch früher schon einmal vorhanden gewesen, dann aber ganz geschwunden sein soll. Die Untersuchung ergibt: guter Allgemeinzustand, keine hysterischen Stigmata, — innere Organe, Herz, Nerven normal. An der Dorsal- der rechten Hand und weiter distalisiert bis an die Endphalangen der Finger reichend findet sich eine Masse, bei Druck nicht empfindliche und keine Dehnung zurücklassende Schwellung, die die Sehnen der Strecker verdeckt und dem Handrücken ein gepolstertes Aussehen

verleitet. Die Schwellung macht der Kranken keinerlei Beschwerden, sie empfindet kein Brennen, keine Schmerzen, es besteht auch keine objektive Sensibilitätsstörung, keine Lähmung oder Kontraktur. Pat. kann mit der Hand den ganzen Tag arbeiten. Sie wird mit hirudischer Handhütern behandelt, das hat den Erfolg, daß die Schwellung allmählich etwas zurückgeht. Am 20. Juni 1888 tritt ohne äußere Schädlichkeit plötzlich auf dem ödematösen Gebiet ein Ausschlag auf, der aus etwa erbsengroßen, roten, glänzenden und juckenden Erbsenkeben besteht, am nächsten Tag hat sich die Schwellung wieder stark akzentuiert. Unter Puderbehandlung verblaßt unter raschem Nachfluß das Kratzen, die Schwellung dagegen nimmt nur ganz allmählich ab. Außerdem fällt am 24. Juni ein deutliches Abgestorbensein der zweiten und dritten Phalangen sämtlicher Finger der rechten Hand auf. Diese sind gelblich-weiß, kühl, etwas mit Schweiß bedeckt, keine erhebliche Schmerzen, brennend, Ähnliche Anfälle kommen wieder. Erst im Verlauf von 8–10 Wochen ist die Schwellung geschwunden. Bis jetzt (Oktober 1889) ist kein Ödem wieder aufgetreten.

Das ist jedenfalls kein hysterisches Ödem. Ausgesprochene Zeichen der Hysterie fehlen, im speziellen ist an der betroffenen Hand keine weitere Störung nachweisbar. Das Ödem war durch Hypnose, die versucht wurde, nicht zu beeinflussen, ebenso wenig durch andere Suggestion; es war auch, soweit zu ermitteln war, nicht im Anschluß an eine Erregung aufgetreten. Es war andererseits recht hartnäckig, ganz singulär, gehörte also auch nicht zu der Quinckeschen Affektion. Man könnte an den Einfluß der Überanstrengung denken, aber dann wäre nicht zu verstehen, wie es bei der Kranken monatelang fortbestehen konnte, ohne daß sie die rechte Hand noch weiter irgendwie anstrengte. Von Stauungen konnte nirgends am Körper die Rede sein. Seine neurotische Natur, die auch sonst kaum einem Zweifel unterliegt, wird durch das gleichzeitige Bestehen anderer neurotischer Erscheinungen (Urticaria, Synkope locale) nahezu sichergestellt. So steht es also pathogenetisch den Ödemen der Quinckeschen Affektion jedenfalls nahe und gehört zu den idiopathischen, chronischen neuropathischen Ödemen.

Meigs beschreibt als *Hémiface sacculente* einen Zustand, der sich bei einer an Migräne ophthalmique leidenden Kranken eingestellt hatte, nach wiederholten Anfällen vorübergehender Facialislähmung. Die Haut ist ein wenig infiltriert, sacculent, die Schwellung wechselt an Intensität und trat, als weniger Anfälle kamen, sehr zurück. Hierher zähle ich auch eine Beobachtung von Kalberlah. Ein 22-jähriges sehr nervöses Mädchen erkrankte vor einem halben Jahr mit einer Schwellung einer Gesichtshälfte, die sich innerhalb von $10\frac{1}{2}$ Stunden entwickelte. Diese Anschwellung besteht seitdem dauernd fort. Nach Aufregungen und Anstrengungen nimmt die Schwellung zu. Der übrige Befund ist völlig negativ. Es gibt also auch Fälle, bei denen auf einen akuten Anfang ein chronisches Stadium folgt. Um chronische neuropathische Ödeme dürfte es sich auch bei einer Patientin, die Rosenfeld beschrieben hat, handeln. Zwei Schwestern der Kranken litten an Basedow, seit 15 Jahren bestehen bei der Patientin, die keine ausgesprochen hysteri-

sehen Symptome aufweist, Anschwellungen auf beiden Handrücken, die zeitweilig stärker hervortreten, vorübergehend auch ganz verschwinden. In einer dreijährigen Beobachtung bleibt das Bild ohne wesentliche Änderungen. Auf einen schweren psychischen Shock hin nimmt die Intensität der Anschwellungen zu; Jodkali scheint günstig zu wirken.

Solche Ödeme sind auch sonst noch mehrfach beschrieben worden. Debove veröffentlichte die Krankengeschichte einer 22-jährigen Frau, bei der im Verlauf von neun Monaten sich ein Ödem beider Beine, beginnend am rechten Knie entwickelte. Es war rechts stärker als links, und schritt fort, indem es jedes Bein in einzelnen Abschnitten bedeckte (*Ödème segmentaire*), also sich erst auf beide Oberschenkel, dann auf beide Fußrücken ausdehnte. Daneben bestand Polynurie und eine kompensierte Mitralinsuffizienz. Virgoux sah eine 22-jährige Frau, an deren linkem Bein ein hartes, weißes, festes Ödem bestand, das Bein war 13 cm dicker als das gesunde, die Haut war rötlich, kälter und verdickt. Es hatte vor neun Jahren begonnen und war in den letzten Jahren nicht mehr fortgeschritten. Es lag keine Heredität vor. Einen ähnlichen Fall berichtete Duckworth.

Unter dem Namen „an undescribed variety of hereditary *ordema*“ hat Milroy folgende Beobachtung mitgeteilt.

31-jähriger Mann, sehr kräftig und gesund. Es besteht ein Ödem beider Unterschenkel bis zu den Knien, links stärker als rechts. Farbe etwas rosa, nach oben zu abnehmend. Auf Druck verschwindet die Farbe, um rasch wiederzukehren. Auf dem roten Grunde befinden sich kleine weiße Flecke. Tiefer Druck über der Kante der Tibia bringt eine 10 Minuten dauernde Delle hervor. Das Ödem soll von Geburt an bestehen und mit wachsenden Extremitäten immer dieselbe relative Lage innegehalten haben. Nie Schmerzen. Abends ist die Schwellung stärker. In 6 Generationen der Familie unter 97 Individuen kamen 22 solcher Fälle vor (23%), 12 männliche, 7 weibliche, 3 unbekannten Geschlechts; die Ausdehnung der Schwellung soll in der letzten Generation, die prozentualer ebenso stark beteiligt ist, abnehmen. Behandlung stets ohne Erfolg. Als Charakteristika des Ödems sind zu betrachten: es ist kongenital, es zeigt ein dem übrigen Wachstum relatives Wachstum, es ist dauernd, es beschränkt sich auf beide Beine, alle sonstigen lokalen oder allgemeinen Symptome fehlen. Von diesen Regeln zeigten sich in einigen wenigen Fällen unbedeutende Abweichungen. — Osler rechnete die Fälle zum „angioneurotischen Ödem“. Aber die Unterschiede liegen auf der Hand, und sie sind so bedeutend, daß es nicht zu rechtfertigen ist, diese Anschwellungen den angioneurotischen Ödemen im engeren Sinne zuzurechnen.

Auf diesen Standpunkt stellte sich auch Meigs, der eine fast ganz gleiche Affektion bei zahlreichen Mitgliedern einer anderen Familie

beobachten konnte und aus Anlaß dieser seiner persönlichen Beobachtungen die Literatur, soweit sie ähnliche Krankheitsbilder enthält, berücksichtigt. In seinem Fall waren acht Mitglieder, die sich auf vier Generationen verteilen, von der Krankheit befallen worden. Es entwickelte sich bei allen ein chronisches, weißes, hartes und schmerzloses Ödem, nur in einem Fall waren Schmerzen vorhanden. Das Ödem erschien zur Zeit der Pubertät, nahm bald die Füße und Unterschenkel, bald auch die ganzen unteren Extremitäten ein und war mit einer einzigen Ausnahme doppelseitig. Stets waren die inneren Organe gesund, und es fand sich nie einer der gewöhnlichen Gründe der Ödeme. Außer der Beobachtung von Milroy zitiert Meige noch eine Arbeit von Desnos, der im Jahre 1891 ein „*oedème rhumatismal chronique*“ beschrieb. Hier handelte es sich um ein hartes Ödem der Unterschenkel und Füße bei einer 63 jährigen Frau, die mehrere Anfälle von langdauerndem allgemeinem Rheumatismus gehabt hatte und suprascapular-Pseudolipome darbot. Nach Desnos sollen solche Ödeme bei Frauen häufiger sein und hauptsächlich in der mütterlichen Linie forterben. Meige schließt „il est permis de croire à l'existence d'une affection oedémateuse héréditaire et familiale, capable d'envahir progressivement de bas en haut les membres inférieurs, tantôt un seul, tantôt les deux à la fois, s'arrêtant soit au cou-de-pied, soit au genou, soit à la racine de la cuisse, affection indolore, apyrétique, chronique et permanente qui n'entraîne aucune trouble de la santé générale et peut même persister jusqu'à un âge avancé.“ Er gibt dieser Affektion den Namen tropho-oedème chronique héréditaire. Meige betont, wie erwähnt, den Unterschied gegen die angioneurotischen Ödeme, wenn er auch die Beziehungen der beiden Arten von Ödemen zueinander nicht übersieht. Er weist auch darauf hin, daß es zwischen dem akuten und dem chronischen Ödem Übergänge gibt. Nach der Annahme von Meige ist die Ursache auch dieser chronischen Ödeme in Schädigungen des Nervensystems zu suchen; vielleicht in solchen der grauen Achse des Rückenmarks. Meige erwähnt schließlich noch die gegensätzliche Stellung, die das von ihm umgrenzte Krankheitsbild der Sklerodermie gegenüber einnimmt.

In den seither verfloßenen zehn Jahren hat die Lehre von dem Trophödem einen weiteren Ausbau erfahren. Meige ist alsbald nochmals auf das Thema zurückgekommen. Er hat darauf aufmerksam gemacht, daß auch die oben erwähnten Fälle von Vigouroux und Debove zu dieser Affektion zu gehören scheinen, ebenso ein solcher früher von Mathieu und von Praxinos publizierter. Später erschienen weitere Beiträge von einer Reihe von französischen Forschern. Ich nenne Rapin, Mabillo, Hertoghe, Lannols, Valobra, weiterhin Parhon et Cazacou, Hope and French, Rolleston. In Deutschland fand das Leiden merkwürdig wenig Beachtung. Eine ausführliche

Schilderung erfolgte erst im vorigen Jahre in einer Dissertation von Henning, während ich selbst in der Zwischenzeit mehrfach kurz auf den Gegenstand zu sprechen gekommen bin. Die Zahl der bisher publizierten Fälle beträgt ungefähr ein halbes Hundert. Die Krankheit ist also jedenfalls nicht ganz selten, wenn auch unter dieser Zahl vielleicht einige sind, die nicht hierher zu rechnen sind.

Meige hat drei Gruppen unterschieden. Isolierte Fälle, heredo-familiale Fälle und kongenitale Fälle, wobei man die letzteren wiederum in zwei Unterabteilungen, kongenitale und hereditäre und rein kongenitale Fälle einteilen kann. Kongenitale und familiäre Fälle sind mitgeteilt worden von Sutherland, Lannois, Hope and French, Griffith and Newcome. Dazu kommen die älteren Beobachtungen von Nonne und Tobiesen, und schließlich die schon zitierten von Milroy und von Meige selbst. Hope und French konnten in fünf Generationen von 42 Mitgliedern 13 affiziert sehen. Nonne sah in seinem sicher bisher zu rechnenden Fällen in drei Generationen acht Personen befallen werden. Tobiesen berichtet von vier Fällen in drei Generationen. Familiäre Fälle wurden von Rolleston, Lortat und Jacob, Meyer, French mitgeteilt, und eine ganze Reihe isolierter teils kongenitaler, teils im späteren Leben entstandener ist sonst noch bekannt geworden. Hierher gehören die von Parkis, Weber, Sicard-Lavastine, Sainton-Voisin, Mahille, Klippel, Henning, Achard et Ramond, Etienne, Bauer et Desbuis, Valobra, Courtellemont, Collet et Bentler, Parhon et Florian, Vigouroux mitgeteilten Fälle; hier lag eine direkte Belastung zwar nicht vor, aber es war doch manchmal eine neuropathische Diathese nachweisbar. So litt der Vater der Patientin, die Sainton und Voisin beobachteten, an vasomotorischen Störungen, insbesondere an Cyanose der Extremitäten. Die Schwester einer von mir beobachteten alsbald näher zu beschreibenden Kranken stand wegen mannigfacher nervöser Störungen, die sich hauptsächlich im Bereich der vasomotorischen Symptome abspielten, in meiner Behandlung; die Eltern der Patientin sind beide nervös. Der Vater von Valobras Patient war Alkoholist, die Mutter litt an Hysterie. Auch in denjenigen Fällen, wo es sich um ein kongenitales resp. familiäres Auftreten handelte, waren andere nervöse Erscheinungen in der Ascendenz nachweisbar. Der Vater des Patienten von Lannois war Epileptiker. Bei den Patienten selbst zeigten sich zum Teil ausgesprochene nervöse Beschwerden, so bei einer Patientin von Klippel et Monnier-Vinard, bei der Patientin von Mahille bestand eine chronische Chorea und eine linksseitige cerebrale Parese mit Demenzercheinungen. Harris beschreibt einen Fall, bei dem es sich scheinend um eine Kombination von progressiver Myopathie und Trophödem handelte. Andere Kombinationen sahen Lannois mit Adipositas und Laiguel Lavastine mit Basedowscher Krankheit.

Meigs glaubt, daß zuweilen Infektionskrankheiten für die Entstehung des Trophödems eine Rolle spielen und benützt Rheumatismus, Typhus, Scharlach, Masern, doch kann man nicht sagen, daß eindeutige derartige Beobachtungen vorliegen. Es wird mehrfach darauf aufmerksam gemacht, daß bei isolierten Fällen die Veränderungen in der Pubertät sich ausbilden. Bauer und Desbuis sahen einen Fall nach der Menopause entstehen. In einer Reihe von Fällen wird ein Trauma beschuldigt, so von Sicard und Laignel Lavastine, ebenso von Etienne. Es gibt auch Fälle, in denen irgendeine Ätiologie nicht zu finden ist.

Es sind erheblich mehr Frauen als Männer betroffen. Ich zähle 31 Frauen auf 11 Männer. Der Beginn des Leidens fiel, wenn wir natürlich von den kongenitalen oder ganz früh erworbenen absehen, in das 1. bis 10. Lebensjahr einmal, vom 10. bis 19. zähle ich 31 Fälle, vom 20. bis 25. 5, später sind nur vereinzelte Fälle, mit Beginn im 33., 45., 66. Lebensjahr beschrieben worden. Der älteste von Rosenzweig mitgeteilte ist sehr zweifelhaft. Es handelt sich um ein Ödem bei einer 77-jährigen Frau, das nach einem Herpes thoracicus auftrat und Hand, Unterarm und unteres Drittel des Oberarms betraf. Es war ein weißes, nicht schmerzhaftes und nicht eindrückbares Ödem; der Autor nimmt als wahrscheinliche Ursache eine lokale Übersekretion von Lymphe im Zusammenhang mit einer Störung des Gleichgewichts der trophischen Nerven an.

Die Art des Ödems wird in allen Beobachtungen annähernd gleich geschildert und deckt sich durchaus mit dem, was Meigs selbst festgestellt hatte. Es handelt sich um ein weißes, hartes, elastisches Ödem, das sich schmerzlos entwickelt. Der Fingerdruck hinterläßt entweder gar keinen oder nur einen unbedeutenden, schwer zu erzielenden und rasch verschwindenden Eindruck. Die Färbung der Haut ist im allgemeinen normal. Es kommt eine leichte Hellrosafärbung, auch eine leichte violette Färbung vor. In dieser Beziehung weicht der von mir beobachtete Fall erheblich ab, in dem sich deutliche und wechselnde vasomotorische Symptome, namentlich eine graublau an die Asphyxie lokale erinnernde Verfärbung geltend machten. Auch eine fleckige Rötung trat oft auf. An dem an den Beinen sitzenden Ödem wurde oft beobachtet, daß nach längerem Gehen die ganze ödematöse Partie oder wenigstens die abhängigen Teile eine Beschaffenheit annehmen, die einen tieferen Fingerdruck entstehen läßt. Nach längerer Ruhe pflegen diese eindrückbaren Schwellungen aber wieder zu verschwinden, so daß dann meist morgens der gewöhnliche Zustand hergestellt ist. Die Haut ist in Falten nicht abhebbare. Sie erscheint häufig etwas verdickt, mit der Unterlage etwas fester verwachsen als unter normalen Bedingungen. Das Ödem verursacht die Konturen der davon befallenen Körperabschnitte, so daß die Beine wie runde Zylinder von oben bis unten gleich-

fürnig dick aussehen. Die Zunahme des Umfanges kann eine ganz außerordentliche sein. In einem Fall von Parkon et Florian maß die rechte Wade 30, die linke 46 cm, in dem von Hensling betrug der größte Wadenumfang links 45, rechts $34\frac{1}{2}$ cm, der größte Oberschenkelumfang 58 zu 61 cm. Auch die durch Gehen, Stehen usw. noch weiterhin hervorgerufene Umfangszunahme kann sehr erheblich sein, wie in einem Falle von Rolleston, wo die rechte Wade $13\frac{1}{2}$, die linke $16\frac{1}{2}$ Zoll maß, aber nach längerer Bettruhe der Umfang um einige Zoll abnahm. Rolleston bemerkt, daß wenn die Beine der Kälte ausgesetzt waren, die Färbung eine cyanotische wurde. Auch am Arm können die Differenzen sehr erheblich werden; in dem Fall Klippel und Monnier und Vinard maß das gesunde Handgelenk 15 cm, das kranke 18 cm im Umfang. Valobra konnte auch eine Abnahme der Hauttemperatur feststellen, die am gesunden Bein 35,6, am kranken 33,5 betrug.

Die Autoren machen wiederholt darauf aufmerksam, daß man bei der Palpation nicht den Eindruck des Ödems, sondern den einer Zunahme des subkutanen Bindegewebes hat.

Über die Lokalisation ist folgendes zu sagen: In der großen Mehrzahl der Fälle befällt das Ödem die unteren Extremitäten und zwar ist bald ein Bein, bald beide Beine betroffen. Das Ödem kann sich auf die distalen Abschnitte beschränken, es kann aber auch die ganze Extremität in Anspruch nehmen, doch meist so, daß die distalen Partien jedenfalls stärker betroffen sind, als die proximalen. Parhon et Cazacu sah aber eine symmetrische Anschwellung beider Oberschenkel. Die oberen Extremitäten werden viel seltener befallen. Rapin sah ein kongenitales Ödem beider Arme und der rechten Gesichtshälfte. Im Falle von Etienne war der linke Arm betroffen, in dem von Collet und Beutler ebenfalls der linke Arm, in dem von Bauer und Deshais beide oberen Extremitäten, in dem von Archard und Ramond der linke Unterarm. In einem älteren Falle von Collet und in dem von Herroghe war das Gesicht befallen. Die Diagnose dieser Fälle scheint mir nicht ganz sicher zu sein.

Die Begrenzung der Schwellung ist, wie der französische Ausdruck lautet, *segmentaire*, d. h. es werden immer solche Körperabschnitte ergriffen, für welche im Rückenmark gemeinsame Segmente bestehen. Wenn wir uns rein an das Tatsächliche halten wollen, so müssen wir sagen, daß in der Tat entweder die Füße oder die Füße und die Unterschenkel oder die ganze Extremität befallen werden, die Begrenzung sich also im wesentlichen nach den einzelnen Gliedabschnitten richtet. Die Grenze pflegt meist eine scharfe zu sein. Häufig wurde ein Abschneiden der Schwellung, das mit der Inguinal- resp. mit der Glutaealfalte zusammenfiel, beobachtet.

Eins der Hauptkennzeichen ist die allmähliche, langsam

progressive Entstehung des Ödems. Das Ödem entwickelt sich aus unmerklichen Anfängen langsam weiter, bisweilen sehr langsam, so daß es Jahre bis zu seiner höchsten Ausbildung braucht. Der folgende von mir beobachtete Fall entspricht in fast allen Beziehungen dem klassischen Typus des Trophödems.

Es handelt sich um ein 27jähriges Feinbin, das zum ersten Male am 23. November 1911 von mir untersucht wurde. Sie stammt von nervösen Eltern, und hat früher selbst ausgesprochen nervöse bzw. hysterische Symptome dargestellt, hat an Weidenrindgen gelitten, zeitweilig Selbstmordgedanken gehabt. Die Stimmung ist auch jetzt noch recht labil. Eine Schwester stand vor dem in meiner Behandlung, sie war normal, hatte Schicksalsschläge gehabt, an Zwangsvorstellungen, Übelnachen, zeitweilig auch an Migräne und flüchtigen Schwellungen gelitten.

Vor drei Jahren fing das rechte Bein der Pat. allmählich an anzuschwellen; die Schwellung begann am Fußgelenk herum, und stieg von da aus ganz allmählich immer höher hinauf, bis zu dem jetzigen Zustand. Der Fuß blieb von vornherein frei. Die Pat. gibt an, daß sie zeitweilig ein ziemlich starkes Juckgefühl in dem rechten Bein und öfter besonders in den Gelenken Schmerzen verspürt habe. Die Schwellung soll gewissen Schwankungen unterliegen, niemals aber in der ganzen Zeit hat das Bein seinen normalen Umfang angenommen. In dem Bein hat sie immer ein Gefühl von Schwere, hat aber nie eigentliche Schwäche gespürt. Die Kranke macht weiter die bemerkenswerte Angabe, daß sie in letzter Zeit öfter rasch vorübergehende Lähmungsverfugungen gehabt habe, die von mir nie beobachtet werden konnten.

Das ganze rechte Bein ist geschwellen, die Konturen des Beines sind verwischt. Die Schwellung beginnt unmittelbar oberhalb des Fußes am Knöchel, während der Fuß selbst ganz frei ist. Die Schwellung ist am stärksten am Unterschenkel, erstreckt sich aber auch auf den ganzen Oberschenkel, um in der Inguinalfalte plötzlich aufzuhören. An der Hinterseite ist es ungefähr die Glutealfalte, die die Grenze bildet, doch ist hier die Abgrenzung nicht so scharf. Der größte Umfang des rechten Unterschenkels ist 38½ cm, des linken 35 cm, am Oberschenkel beträgt die Differenz nur 2 cm. Die Farbe des rechten Beins ist einem raschen Wechsel unterworfen, der weder von der Außentemperatur noch von der Färbung deutlich abhängig ist. Stets ist das rechte Bein mehr graublass gefärbt, als das linke; zeitweilig verstärkt sich diese Farbe zu intensiv dunkelblauen, mehr oder minder umfangreichen, unregelmäßig abgegrenzten Flecken, zwischen die hier und da einzelne hellere Partien sich einschließen. Am intensivsten ist die Cyanose um den Knöchel herum. Auch die Verfärbung nimmt proximalwärts ab. Die Abbildung Tafel XXIV beleuchtet besser, so hoffe ich, über die Farbveränderung, als eine detaillierte Schilderung. In der Haut sieht man einige kleine Haarvenen, nichts ist von Varizen zu entdecken. Die Temperatur des rechten Beins ist ungefähr dieselbe wie die des linken. Die Schwellung ist überall elastisch fest, nirgends bleibt der Fingereindruck auch nur spurweise bestehen. Das Haarwachstum am rechten Bein zeigt keine Abweichung. Der Druck auch in der Tiefe ist nirgends schmerzhaft. Sensibilität, Motilität, Reflexe sind beiderseits völlig gleich. Die Fallreflexe palpierten beiderseits gleich gut. Die Untersuchung der Beckenorgane ergibt völlig normalen Befund. Das Harngeblü zeigt keine Abweichung von der Norm, auch nicht in der Struktur des Knochens des rechten Beins. Es besteht weder am kranken Bein noch sonst am Körper eine krankhaft gesteigerte oder verminderte muskelschwache Hartenregbarkeit. Die inneren Organe sind völlig normal, auch das Herz, das auch nicht besonders empfindlich ist, Rhythmus normal. Auf Wasserpörschleim reagiert die Kranke in normaler Weise. In den oberen Extremitäten und am Gesicht, in den Hirnnerven ist keiner Drückung etwas Besonderes. Der Zustand im Herbst (Juli 1912)

unverändert geblieben. Nur die vasomotorischen Erscheinungen sind einem in mäßigen Grades schwankenden Wechsel unterworfen.

Die Beschaffenheit der Hautschwellung, die langsame Entwicklung, die segmentäre Abgrenzung mit distaler Zunahme der Schwellung entsprechen dem Typus. Die vasomotorischen Phänomene sind ungewöhnlich, berechtigen aber meines Erachtens durchaus nicht zur Aufstellung eines anderen Typus, so interessant und wertvoll für die Auffassung der Affektion sie auch sind. Bemerkenswert ist die schwere Belastung; und wenn es sich auch nicht um ein echt familiales Tryptödem handelt, so hat doch die Schwester der Patientin ausgesprochene Zeichen einer vasomotorischen Labilität und hat auch an flüchtigen Ödemen gelitten, die sich jetzt nach Entwicklung des chronischen Ödems auch bei der Kranken selbst nach ihrer bestimmten Versicherung einstellen. Das ist gewiß im höchsten Maße interessant. Unsere Kranke gehört also doch einer „Ödemfamilie“ an, und sie stellt so ein verbindendes Glied in der Kette der Erscheinungen dar, die von den flüchtigen zu den stabilen nervösen Ödemen führen.

Andere Zwischenglieder sind diejenigen Fälle, in denen die Entwicklung der Schwellung nicht eine rein progressive war. Denn wenn auch nicht zu bezweifeln ist, daß eine solche stetige, und ohne Schwankungen sich vollziehende Form der Progression vorkommt, so steht uns doch auf der anderen Seite eine große Reihe von Beobachtungen zur Verfügung, in denen diese Entwicklung keine ganz allmähliche gewesen ist, in denen vielmehr entweder erhebliche Schwankungen in dem Fortschreiten des Leidens festgestellt werden konnten oder sich das Leiden sogar aus einzelnen Attacken heraus entwickelte. Diese Art der Entwicklung hat für uns naturgemäß das allergrößte Interesse, weil sie uns den Übergang zu den flüchtigen Ödemen zeigt und die nahe Verwandtschaft der beiden Ödemformen erkennen läßt.

Für die erste Kategorie mag folgende Beobachtung von Klippel und Monnier Vinard als Beispiel dienen. Bei einer 43jährigen Frau begann das Leiden vor 10 Jahren mit Schwellungen an der Rückseite des 5. Metacarpus, die in den nächsten 5 Jahren an Umfang wuchsen, aber allmählich dauernd wurden. Vor 2 Jahren trat eine Ausdehnung auf das ganze Dorsum der Hand ein, dann wurden allmählich Handgelenk, Unterarm, Oberarm, das rechte Bein und schließlich die rechte Gesichtshälfte von der Schwellung eingenommen. Die Finger blieben frei. Kurz vor der Periode war immer eine Zunahme, während demselben stets eine Abnahme des Ödems zu bemerken. Bei der Untersuchung ist das Ödem hart, elastisch, nicht eindrückbar, rechtes Handgelenk mißt 18, die linke 15 cm im Umfang, am Bein ist nur ein Unterschied von 1 cm vorhanden. Im Gesicht besteht ein leichter Grad von Schwellung. Ähnlich liegt ein Fall von Achard et Ramsd.

Hier bestand bei dem 21 jährigen Patienten das Ödem seit 7 Jahren, betraf den linken Unterarm und die linke Hand und schnitt am Ellbogen scharf ab. Das Ödem war fest, elastisch, die Haut war etwas verdickt, mit der Unterlage ein wenig fester verwachsen, die Farbe etwas violett, die Temperatur etwas erhöht. Die Affektion hatte mit einer plötzlichen Anschwellung des linken Unterarms eingesetzt. Die Schwellung verschwand nicht mehr, von Zeit zu Zeit trat Fieber auf, in dessen Verlauf die Schwellung erheblich zunahm. Die Attacken waren sogar von Allgemeinerscheinungen, Übelkeit, allgemeiner Ermattung, Stechen im Unterarm, starkem Schauern, allgemeinem Zittern und Zähneklappern begleitet. Die Erscheinungen dauerten 3—4 Stunden. Während die Schwellung zunahm, wurde die Hand rot, schmerzhaft. Druck und auch die Bewegungen waren schmerzhaft. Die Dauer einer solchen Attacke betrug im ganzen drei Tage, dann trat ein Rückgang ein und es stellte sich das frühere Bild wieder her. Solche Allgemeinerscheinungen sind auch sonst noch beobachtet worden. So berichtet Rapis in einem Fall, daß ein Mädchen von 20 Monaten 10 Tage lang Fieber und Unbehagen hatte, dann trat plötzlich eine starke Schwellung des Arms, eine Cyanose der Haut ein, im Verlauf weniger Tage ging die Schwellung wieder zurück, ohne daß jedoch der Arm wieder ganz normal wurde. Im Alter von 3 Jahren kam es dann plötzlich zu einer Anschwellung des linken Beins, die allmählich zunahm und bei dem jetzt 7jährigen Mädchen noch besteht. Auch Parhon et Florian sprechen von zeitweiligem Fieber, von Schmerzen, die auch in unserem Fall zu registrieren waren, von kleinen herpesartigen Bläschen in einem Fall, bei dem die Schwellung im übrigen dauernd zunahm. Lannus berichtet Folgendes. Im Alter von 10 Jahren stellte sich ein ein halbes Jahr dauerndes Ödem des Knöchels und der Füße ein. Mit 18 Jahren plötzlich eine Anschwellung des rechten Unterschenkels, seitdem blüht das rechte Bein geschwollen. Die Schwellung nahm in der Schwangerschaft zugleich mit der Zunahme einer allgemeinen Adipositas zu. Allmählich wurde auch das linke Bein umfangreicher; bei der jetzt 38 jährigen Patientin besteht nun ein festes Ödem beider Beine, das rechts immer stärker ist als links. Hennings Patient bemerkte eines Morgens beim Erwachen am linken äußeren Fußknöchel eine nicht mehr als taigegroße rundliche, hart anzufühlende Schwellung. Die Haut war von normaler Farbe, es bestand weder Fieber, noch Schmerzen, noch irgendwelche Allgemeinerscheinungen, die Schwellungen gingen nach einigen Tagen wieder zurück, sie kamen und verschwanden wiederholt auf dieselbe spontane Art, bis sie nach einem Jahr einmal dauernd bestehen blieben. Die Schwellung schritt dann nach oben weiter, und in kurzer Zeit waren Unter- und Unterschenkel von ihr befallen. Auch diese Schwellung ging nie zurück, sondern wurde vielmehr ganz allmählich stärker. Besonders im letzten Jahr. Auch Sicaud und Mabile beschreiben eine in sub-

akuten Schüben sich entwickelnde Progression. Diese Schübe können auch im weiteren Verlauf des Leidens noch vorkommen, nachdem zu Anfang der Fortschritt des Leidens ein ganz allmählicher gewesen ist. So berichten Hope und French von ihrem Fall, daß im Alter von 16 Jahren zum erstenmal Anfälle eintraten, die mit Fieber, Erbrechen, Rötung, Schmerzen und Zunahme der Schwellung einhergingen, die sich nach einigen Tagen wieder verloren, während bis dahin seit dem Alter von 3 Monaten eine allmähliche Zunahme stattgefunden hatte. Valobra beschreibt folgenden Fall:

Eine 26-jährige Frau hatte mit 12 Jahren zum erstenmal flüchtige Ödeme, die in sechs Monaten an verschiedenen Stellen des Körpers sich entwickelten. Dann traten keine Ödeme mehr auf; sie war stets etwas nervös. Seit 3–4 Wochen besteht absolute Appetitlosigkeit, leichtes Fieber, hartnäckige Verstopfung, Magenschmerzen. Seit vierzehn Tagen treten sich Ödeme an verschiedenen Stellen des Körpers. Pat. liest in den nächsten Wochen fortwährend solche zwecklosen Ödeme an allen möglichen Körperstellen da. Dabei ist über ihnen die Hauttemperatur etwas verändert. Während die anderen Ödeme weichen, ist die rechte Hand immer wieder betroffen. Nach mehr als einem Monat verschwanden die Ödeme bei absoluter Mißbilligkeit, nur die rechte Hand ist etwas geschwollen. Ein halbes Jahr später besteht das Ödem in der rechten Hand noch wie vor. Die Hand ist im ganzen deformiert. Es ist nicht mehr die frühere schöne musische Hand. Der Handrücken ist geschwollen, man sieht die Sehnen unter der Haut nicht mehr; die Schwellung beginnt über dem Handgelenk. Die Haut ist blaß, um 1° kälter als am Unterarm. Fingersdruck bleibt nicht bestehen. Die Haut ist im ganzen etwas gespannt. Die Finger sind warzenförmig, jede Phalange ist für sich geschwollen. Der Umfang der Hand in der Höhe des Handrücken ist 3 cm größer als links. Einige Monate später bestanden noch immer dieselben Verhältnisse. Das Allgemeinbefinden war gut.

Valobra selbst faßt die Geschichte des Falles zusammen in den folgenden Worten: eine junge nicht hysterische Frau bekommt im Anschluß an eine intestinale Vergiftung die Erscheinungen der Quinckeschen Krankheit. Die Ödeme wiederholen sich und betreffen besonders die rechte Hand. Die Kranke wird gesund, die Ödeme verschwinden, aber die rechte Hand löset dauernd das Bild einer Art von chronischem, persistierendem Trophödem. Wir haben hier also den Übergang des Quinckeschen Ödems in das chronische Trophödem in der schönsten Form vor uns. Es erinnert uns das an die Fälle, von denen oben schon die Rede gewesen ist, bei denen sich allmählich unter dem Einfluß dauernder, d. h. an derselben Stelle immer wiederkehrender flüchtiger Schwellungen gewisse Veränderungen der Haut allmählich herausbilden, wie wir das z. B. beim flüchtigen Lidoem kennen gelernt haben. Valobra hat noch einen zweiten ähnlichen Fall publiziert, bei dem die anfänglich passageren Ödeme wenn auch nicht in so ausgesprochenem Maße wie in dem eben zitierten die Zeichen der flüchtigen Ödeme trugen. Parhon und Coxacou sahen ein chronisches Ödem beider Beine bei einer Person sich entwickeln, die während

vier Jahren jedem Winter an ausgedehnten Urticaria-Eruptionen zu leiden hatte. Um dieselbe Zeit begannen die Schwellungen.

Auch im einzelnen erinnern die Schwellungen in ihrer Art oft ganz an die flüchtigen Schwellungen und weichen von dem gewöhnlichen Typus des Trophödems ab. So bemerkt Meige in einer Diskussion gelegentlich eines Falles von Achard und Ramond, daß das Ödem nicht so hart, nicht so weiß und nicht so elastisch ist, wie sonst beim Trophödem, so daß es in allen diesen Beziehungen die Übergänge zur Quinckeschen Krankheit zeige. Er betont aber, daß er damit nichts gegen die Diagnose des Falles gesagt haben will, weil auch er an der Möglichkeit der Übergangs- und der Zwischendformen durchaus festhält.

Für diese Übergangsfälle, die dem Quinckeschen Ödem so nahe stehen, wird man bezüglich der Pathogenese naturgemäß zu denselben Resultaten kommen müssen, wie beim Quinckeschen Ödem. Das hat am schärfsten Valobra ausgesprochen, indem er sagt, Urticaria, Quinckesche Krankheit und Trophödem sind nur verschiedene Grade derselben Affektion, welche unter dem Einfluß derselben ätiologischen Faktoren je nach der Dauer sich in verschiedener Weise äußern kann. Gemeinsam ist allen dreien die erhöhte Lymphsekretion, die mit oder ohne gleichzeitige arterielle Gefäßerweiterung die anatomische und physiologische Basis sowohl der Urticariaquaddel wie der Schwellung beim Quinckeschen Ödem bildet. Bei diesen beiden Formen handelt es sich um vorübergehende Störung, denn die Lymphe, die gebildet wird, wird rasch resorbiert. Beim Trophödem wie bei der Elephantiasis besteht eine dauernde Hypersekretion der Lymphe und ihre Stauung verursacht eine Hyperplasie des Bindegewebes, d. h. eine dauernde Deformation. Der Unterschied des Trophödems gegenüber der Elephantiasis besteht in dem Mechanismus der Stase. Sie ist bei der Elephantiasis lokaler Genese, während bei dem Trophödem jede lokale Schädigung ausgeschlossen ist. Die Veränderung in der lymphatischen Sekretion ist hier vielmehr bedingt in einer erhöhten Reizbarkeit der Centren für die Lymphsekretion. Diese Störung kann eine hereditäre, familiäre, angeborene sein, kann aber auch erworben werden unter dem Einfluß von Infektionen, Intoxikationen oder anderen äußeren Schädlichkeiten. Unter den letzteren ist besonders das Trauma zu nennen. Letzteres wurde namentlich in den Beobachtungen von Etienne als ätiologisch wirksam beschuldigt; über seine Wirksamkeit macht sich der Autor folgende Vorstellungen: Es kommt zunächst zu einer Reizung der sensiblen Nervenendigungen. Dies bleibt nicht ohne Einfluß auf die Spinalganglien. Von hier aus pflanzt sich der Reiz fort auf den Sympathicus. Zuerst werden nur das Spinalganglion der zugehörigen Wurzel und die entsprechenden sympathischen Abschnitte, später mit Hilfe anastomosierender Arterencylinder eine Reihe benachbarter Spinal-

ganglien und sympathischer Ganglien betroffen. Daraus erklärt sich die segmentäre Anordnung der Störung auch für diese Fälle. Schließlich geht der Reiz auf die die Lympsekretion regulierenden Centren über. Einige Autoren haben auch hier wieder versucht, in den Störungen der inneren Sekretion eine ausschlaggebende Ursache für die Entstehung der Veränderungen zu sehen. Insbesondere hat Hertoghe derartige Anschauungen vertreten und auch Parhon und Cazacou haben von Hypothyreoidismus gesprochen. Irgendwie beweisende Erfahrungen liegen keineswegs vor.

Anatomische Untersuchungen wurden nur in einem Fall von Long vorgenommen. Es handelte sich dabei um den früher von Rapin publizierten Fall einer 36-jährigen Frau mit angeborener Hypertrophie beider oberen Extremitäten, der rechten Wange und des rechten Ohres. Auf dem einen Handrücken hatte sich ein karzinomähnliches Geschwür ausgebildet, das extirpiert wurde. Die Neubildung recidierte in der Folge und es wurde eine Amputation des Unterarmes vorgenommen. Bei der von Long ausgeführten anatomischen Untersuchung fand sich eine Vermehrung der verschiedenen bindegewebigen Elemente von der Subcutis bis in die tiefen Schichten gehend. Auch die Aponeurosen enthielten übermäßig stark entwickelte bindegewebige Fasern. Zwischen den Muskeln bestand eine bindegewebig-fettige Wucherung, die Muskeln selbst waren intakt. Der Medianus war insofern verändert, als seine bindegewebige Scheide hypertrophisch und sehr stark vergrößert war, aber die Nervenfasern selbst waren intakt und ebenso auch die zwischen die einzelnen Fasern eintretenden bindegewebigen Bündel. Viel weniger war der Nervus ulnaris verändert. Die Gefäße zeigten keine auffälligen Läsion. Long schließt aus diesem Befunde, daß es nicht nötig ist, für diese Fälle eine spinale Genese anzunehmen, sondern daß die Annahme einer Entwicklungsanomalie des mittleren Keimblattes genügt.

Für derartige Fälle, wie den von Long-Rapin beschriebenen, scheint mir auch in der Tat eine solche Annahme nahe zu liegen. Man kommt auf diese Weise zu der Auffassung, daß die unter dem Namen Tryptödem vereinigten Fälle nicht eine einheitliche Genese haben. Denn wir haben ja oben gesehen, daß für diejenigen Fälle, die dem Quinckesehen Odem nahestehen, eine andere Genese angenommen werden muß. In der Tat läßt auch die klinische Beobachtung zwischen den einzelnen Fällen mannigfache Unterschiede erkennen. In einer Reihe von ihnen liegen keine Anhaltspunkte vor, die genügen würden, sie von den kongenitalen Hyperplasien abzutrennen; so ist es z. B. mit dem Fall von Hertoghe mit der Hyperplasie der einen Gesichtshälfte. Denn wenn der Autor davon spricht, daß das Skelett nicht beteiligt ist, so gibt er selbst Zahnanomalien an; und es bestand auch eine Hypertrichosis. Ähnliche diagnostische Bedenken erheben mir auch in anderen

Fällen vorzuliegen, auf die ich hier im Einzelnen nicht eingehen will. Sicher ist die Unterscheidung gegenüber der Hypertrophia faciei in denjenigen Fällen, in denen die Affektion nur das Gesicht betrifft und der Hemihypertrophia totalis, in den allerdings sehr seltenen Fällen, in denen die eine Körperhälfte betrifft, außerordentlich schwierig. In die letzte Gruppe gehört der Fall von Klippel und Monnier Vinard, über den ich oben schon einige Notizen gegeben habe.

Weitere diagnostische Schwierigkeiten dürften sich ergeben in der Abgrenzung gegenüber der Sklerodermie, die in ihren ersten Stadien ja mit einem Ödem einhergehen kann. Der weitere Verlauf wird im allgemeinen abhand eine Entscheidung ermöglichen, da die schließlich resultierenden Veränderungen durchaus differente sind.

Die Abgrenzung gegenüber der Elephantiasis dürfte niemals erhebliche Schwierigkeiten machen, wenn man auf die Ätiologie dieses Leidens eingeht. Es liegt hier stets eine Infektion zugrunde. Sie entwickelt sich mit erysipelartigen Entzündungserscheinungen und es treten auch später im ausgeheilten Zustande Erysipela auf. Der Boden, auf dem die elephantiasischen Verdickungen entstehen, ist der der chronischen Entzündung der Haut oder venöser Stauung oder Lymphstauung. Derartige Möglichkeiten müssen jedesmal, bevor wir die Diagnose eines Trophödems stellen, selbstverständlich ausgeschlossen werden. Noch weniger kommt die Tropenelephantiasis diagnostisch in Frage.

Die Differentialdiagnose gegenüber anderen neuropathischen Ödemen kann schwierig sein, es muß das Vorhandensein von anderen organischen spinalen Erkrankungen, insbesondere der Gliosis ausgeschlossen werden. Die Zeichen der hysterischen Ödeme haben wir oben genügend erörtert. Daß wenigstens zeitweilig damit Verwechslungen möglich sind, liegt auf der Hand.

Die lange Persistenz der Ödeme, ferner ihre Lokalisation im Gebiet bestimmter peripherischer Nerven sind geeignet, eine Unterscheidung der Ödeme, die sich in einem Fall von Kraus fanden, von den flüchtigen Ödemen zu ermöglichen. Hier hatten sich nach einer Diphtherie Schwellungen eingestellt, die im Gebiet der gelähmten Nerven auftraten, an den meisten Stellen teigig waren, aber an den Unterschenkeln und den Wangen Fingerdruck nicht bestehen ließen. Auch hier handelte es sich offenbar um neuropathische Ödeme, aber nicht um die flüchtigen Ödeme der Quincke'schen Krankheit.

Unter dem Titel „Oedèmes vasomoteurs sans albuminurie“ hat Tschirkoff allgemeine Ödeme mit Ergüssen in die Körperhöhlen beschrieben, die eintraten, ohne daß der Urin Eiweiß enthielt; auch sonst sind die inneren Organe gesund. Sie scheinen meist auf syphilitischen Gefäßveränderungen zu beruhen und weichen einer Jodkali-Quecksilberbehandlung. Eine Verwechslung dieser wenig bekannten

und in ihrer Deutung unsicherem Ödeme mit unserer Krankheit ist wohl kaum je zu befürchten.

Vom stabilen Ödem (Lassar, Riehl) ist die Unterscheidung meist nicht schwierig. Die Anamnese (wiederholte Erysipels usw.) und die Dauer des Ödems, die über das weit hinaus geht, was wir auch bei abnorm persistenten „flüchtigen“ Ödemen sahen, machen die Differentialdiagnose leicht. Doch habe ich einen Fall gesehen, bei dem sich Schwierigkeiten der Deutung ergaben, weil nach den bestimmten Angaben der Mutter des zehnjährigen Jungen die früheren Attacken in einer auf psychische Traumen hin einsetzenden Schwellungen einer Gesichtshälfte bestanden, die anfänglich ganz zurückgingen, während allmählich immer noch unter anfallweiser Steigerung eine dauernde Schwellung sich entwickelte. Jetzt besteht eine harte Schwellung der rechten Backe und rechten Oberlippe, die ganz den Charakter des stabilen Ödems trägt, doch kommen immer noch Exazerbationen dieser Schwellung vor. Auch mit dem Erysipel und der Phlegmone ist eine Verwechslung nicht wohl möglich. Allgemeine und lokale Temperaturerhöhung, Röte und Schmerzen kennzeichnen diese Affektionen als echte Entzündungen (Dinkelacker, Courtols-Suffit, Collins, Higier, Riehl).

Die Differentialdiagnose gegenüber dem Erythema multiforme kommt vorzüglich für die der Urticaria nahe stehenden Formen in Betracht. Doch unterscheiden sich die Effloreszenzen dieser Affektion durch ihre größere Beständigkeit und ihre Lokalisation (meist symmetrisch auf Hand- und Fußrücken, ev. auf der Streckseite in der Gegend der Ellbogen- und Kniegelenke, nach Lesser).

Auch vom Erythema nodosum ist die Unterscheidung nicht schwierig. Die anfangs blassen, später intensiv roten oder lividen Knoten von derber Konsistenz und bis über Walnußgröße befallen zunächst nur Unterschenkel und Fußrücken, erst bei größerer Zahl Vorderarme, Oberschenkel und Oberarme, am seltensten Rumpf und Gesicht. Sie sind oft spontan, noch mehr auf Druck schmerzhaft, verschwinden in wenigen Tagen, indem sie in charakteristischer Weise die sämtlichen Farbenveränderungen sich resorbierender Blutextravasate zeigen; meist sind erhebliche Allgemeinerscheinungen vorhanden (nach Lesser). Das angeführte genügt zur Unterscheidung.

Troisier hat „Nodosités rhumatismales“ beschrieben, die zum Unterschied von unter ähnlichen Bezeichnungen von französischen Forschern beschriebenen Schwellungen nicht zu den flüchtigen Ödemen zu rechnen sind. Sie unterscheiden sich von diesen durch ihre größere Persistenz und ihren tieferen Sitz, gewöhnlich sind sie auch nur an der behaarten Kopfhaut vorhanden (Rapin).

Sehr erhebliche diagnostische Schwierigkeiten könnten sich ergeben, wenn die Hautsymptome in den Hintergrund traten und nur die inneren

Symptome auf dem Plane erscheinen. In bezug auf das Larynxödem sagt Schlesinger zu diesem Punkte folgendes: „Andererseits soll man bei der Diagnosestellung sich ja nicht zu schnell zu einer Annahme eines Hydrops hypertrophus entscheiden, und in dieser Hinsicht den Rat Schrötters beherzigen, welcher zur äußersten Vorsicht bei der Stellung dieser Diagnose mahnt. Ich möchte speziell betonen, daß Begleitscheinungen ödematöser oder vasomotorischer Natur an anderen Körperstellen ein Erfordernis für die Stellung dieser Diagnose sind und nur bei wiederkehrenden Ödemen die Frage der Zugehörigkeit zum Hydrops hypertrophus diskutiert werden soll, weil damit die Möglichkeit entfällt, daß bei einer Schwellung übersehene oder nicht erkennbare lokale Schädlichkeiten Ursache der Larynxschwellung gewesen sind.“

Dieselben Vorsichtsmaßregeln haben für die ähnlichen Symptome von seiten des Magen-Darmapparates Geltung.

Von den den inneren Symptomen vorausgehenden vasomotorischen Erscheinungen scheinen mir die diagnostisch wichtigsten, weil noch am häufigsten vorkommenden, die erythematösen Plaques zu sein, deren relative Häufigkeit wir früher schon hervorgehoben haben. Auch Onuf betont ihre Häufigkeit. Im übrigen wird eine minutiöse Allgemeinuntersuchung jede andere Ursache für die inneren Symptome ausschließen haben. Von Wichtigkeit ist ferner die Erforschung der hereditären Verhältnisse, weil gerade beim familiären Auftreten anfangs sehr wohl Hautsymptome fehlen können.

Die Magen-Darmsymptome können, wie Strübing zeigte, absolut identisch mit dem von Leyden beschriebenen periodischen Erbrechen sein, und ebenso wie diese den Crises gastriques der Tabiker aufs Haar gleichen. Wo also das periodische Erbrechen ganz allein auftritt, ohne irgendwelche andere Kennzeichen, wird man eben bei der Diagnose periodisches Erbrechen stehen bleiben, wenn nicht hereditäre Verhältnisse es wahrscheinlich machen, daß das Erbrechen nur als eine Teilerscheinung des flüchtigen Ödems aufzufassen ist. Es ist übrigens bemerkenswert, daß in der Literatur der letzten Jahre keine Fälle mehr zu verzeichnen sind, in denen es sich um ein isoliertes Auftreten von periodischem Erbrechen handelt. Es gewinnt den Anschein, als ob dies Symptomenbild ganz in der Quinckeschen Krankheit aufgeht.

Therapie.

Die Behandlung des akuten unbeschriebenen Ödems gehört nicht zu den dankbaren Aufgaben des Arztes. Die von mir schon erwähnte Tatsache, daß es ein ganzes Leben lang immer wieder mit neuen Anfällen erscheinen kann, weist schon darauf hin, daß wir stets Relativs durch unsere Mittel nicht hintanhalten können; und selbst die bescheidenere

Aufgabe, den einzelnen Anfall zu mildern und abzukürzen, können wir oft genug nicht erfüllen. Immerhin liegt die Sache nicht so, daß wir die Hände ganz in den Schoß legen müssen; hier und da ist durch verschiedenartige Mittel doch manches erreicht worden.

Da, wo das Ödem im innigen Zusammenhang mit einer Grundkrankheit auftritt, werden wir dieser naturgemäß unsere Aufmerksamkeit in erster Linie widmen; wir werden bei schlechtem Allgemeinzustand unseren Kranken eine entsprechende diätetische Behandlung angedeihen lassen, und werden versuchen, mit den Mitteln, die Natur und Kunst uns liefert, hier zu bessern. Ebenso werden wir die Behandlung der allgemeinen Neurose an erste Stelle setzen, wenn Symptomenbild und Verlauf der Krankheit uns einen Zusammenhang annehmen lassen. Daß mit der Besserung der allgemeinen Neurose sich auch die Erscheinungen des Ödems milder äußern, wurde wiederholt beobachtet (Börwerf); es waren allerdings meist Fälle, in denen man begründete Zweifel betreffs der Selbständigkeit des Symptomenkomplexes legen mußte.

Selbstverständlich ist die Forderung, diejenigen Stoffe bei der Nahrungsaufnahme zu meiden, die nach früheren Erfahrungen den Ausbruch des Ödems bedingt haben. Bei der Spärlichkeit diesbezüglicher Beobachtungen wird man — im Gegensatz zur nahe verwandten Urticaria — zu speziellen Maßregeln selten genug Gelegenheit haben; am ehesten wird noch der Alkohol zu verbieten sein (Onuf, Oppenheimer). Sehr wichtig erscheint aber auch die Regelung der Darmtätigkeit. Es ist wiederholt, selbst in hartnäckigen Fällen beobachtet worden, daß durch darauf gerichtete Maßnahmen ein Aufhören oder ein erheblicher Nachlaß der Krankheitserscheinungen erreicht wurde. Dinklaeker sah günstige Erfolge von einer Kar in Kissingen, Rabin von einer solchen in Bex. Higier nahm auf Grund eines gesteigerten Indikangehalts eine durch die bestehende Obstipation hervorgerufene exzessive Darmfäulnis an und brachte mit der auf Grund dieser Erwägungen eingeschlagenen Anwendung von Darmdesinfizientien (Menthöl, Salol, Kampher) die Krankheit, die übrigens der Urticaria sehr nahe stand, zum Schwinden. Ähnliche Erfahrungen berichteten Elliot, Hartzell, Baruch. Entsprechend der weit verbreiteten Ansicht von der toxischen und autotoxischen Genese der Krankheit, haben sich nach zahlreiche andere Autoren für eine „Antisepsis des Darmes“ ausgesprochen (Joseph, Morichau-Beauchant, Mendel, Saligue, Stähelin u. A.). Joseph hat Behandlung mit Hefe mit Erfolg verwandt; zur Antisepsis des Darmes empfiehlt er Menthöl 0,1, Öl amygd. dule. 0,25 ad capsul. gelat. 3mal tgl. eine Kapsel. Saligue gibt detaillierte Vorschriften; erst salinische Abführmittel, dann reichlicher Gebrauch von Alkalien (Natr. bicarbon. 3—4 mal tgl.) resp. von entsprechenden Wässern (Vichy), und eine sorgfältige Diät. Stähelin empfiehlt Aloe-pillen und Regelung der Diät: Gemüse, Obst, wenig Fleisch. Alle diese und

ähnliche Maßnahmen müssen gewiß versucht werden: man wird sie zusammenfassen können in die Formel: Regelung der Darmtätigkeit und laktovegetabile Diät. Ich habe gute Erfolge gesehen. Aber auch Mißerfolge trotz aller Konsequenz in der Durchführung der Behandlung. Rockwell berichtet auch ein Versagen der Behandlung mit reiner Milchdiät, die Rapin u. A. empfohlen haben.

Baier glaubt, daß eine uratische Diathese oft eine Ursache des Leidens ist, und empfiehlt entsperrende Behandlung.

In den wenigen Fällen, in denen das Ödem als larvierte Malaria aufzufassen war, schien Chinin ohne Erfolg zu sein, dagegen wirkte hier Arsen günstig.

Die physikalischen Methoden sind mannigfach in Anwendung gezogen worden: Massage, von der Starr Erfolg sah, ferner die Wärme, sowohl als trockene (Collins) wie als feuchte Wärme (Dampfbäder, Milton). Häufig wurde die Elektrizität versucht, allgemeine oder lokale Faradisation, insbesondere auch in Form der faradischen Handbäder, Galvanisation des Hals-sympathikus. Durchschlagende Erfolge gab es nicht, aber hier und da doch Erleichterung, die ich auch selbst einige Male gesehen habe. In einem Falle habe ich einen natürlich sehr vorsichtig angestellten Versuch mit Röntgenbestrahlung gemacht; der Erfolg war null. Hochgebirgsklima scheint bisweilen günstig zu wirken.

Am wenigsten haben wohl innere Mittel gekostet. Collins empfiehlt das Strychnin energisch „as an all-around vasomotor and general tonic to the muscular system of the body“, es soll in großen Dosen gegeben werden. Dinkelacker sah guten Erfolg von Atropin in subkutaner Injektion, Higier von Arsen. Letzteres habe ich viel verwendet, wie mir schien relativ oft mit Erfolg, in Form von subkutaner Injektion des Natrium kakodylium. Auch von Chinin in kleinen Dosen (0,15 3mal tgl.) längere Zeit gebraucht, habe ich Gutes gesehen. In anderen Fällen versagten aber diese Mittel ebenso gut wie andere Interna jeglichen Dienst; Eisen, Bromkali, Jodkali, Ergotin, Natrium salicylicum, Antipyrin, Belladonna und ähnliche Mittel sind ohne Erfolg verwendet worden, einige Male wurde ihnen sogar eine direkte Verschlimmerung in die Schuhe geschoben. Mendel lobt das Aspirin sehr, in einem meiner Fälle hatte eine Kombination von Coffein und Pyramiden wenigstens vorübergehenden Erfolg.

Natürlich ist auch Thyroëdin versucht worden. Whiting sah Besserung. Ich habe das aus theoretischen Gründen empfohlene Calcium chlorat. angewendet, eine sichere Einwirkung war nicht zu konstatieren. Schrötter schlägt die Einspritzung von Nebennierenextrakt in die Venen vor. Deschamps spritzte mit Erfolg in einem Fall von rezidivierendem Lidödem in die Gegend ober- und unterhalb der Augenhöhle eine Lösung von Zinkchlorid (1:20) ein.

Die einzelne Schwellung wird nur selten Gegenstand der Behandlung sein; sie kann wohl entstehen, aber das ist namentlich bei ihrer Flüchtigkeit meist nicht allzu tragisch zu nehmen. Chirurgische Maßnahmen sind kaum je indiziert, sie können bei der Neigung zu Rezidiven auch keinen dauernden Erfolg bringen. Doch hat Wiesinger in einem Fall von intermittierendem Hydrops genu durch Punktion mit nachfolgender Jodtörninglycerininjektion einen Erfolg erzielt. Eine Ausnahme machen die Larynxödeme, bei denen ein rasches chirurgisches Eingreifen (Skarifikationen, Tracheotomie) oft genug nötig wurde. Die Einzelheiten wurden früher schon erwähnt, auch daß gelegentlich eine Dauerkanüle getragen werden mußte. Sliker berichtet, daß bei diesem Sitz des Ödems einmal Venasektion Besserung brachte. Besonders quälend können die Magensymptome werden. Sie erwiesen sich mehrmals gegen jede Behandlung ebenso refraktär wie die gastrischen Krisen bei der Tabes. Nur Morphinum brachte Erleichterung (Strübing). In Strübing's Fall bestand auch nach dem Anfall noch eine gewisse Empfindlichkeit gegen schwere Speisen, der durch vorsichtige Diät und Verordnung von Pepsin und Salzsäure Rechnung getragen wurde.

Das Jacken und Brennen, das auch beim flüchtigen Ödem sehr heftig sein kann, trotz oft jeder Behandlung. Joseph empfiehlt 10 bis 20proc. Bromocollsalbe, oder folgende Kombination:

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|------|
| Bromocoll. solul. | 5—10—20,0 | oder Eugoform | 10,0 |
| Zinc. oxyd. | | | |
| Amvl. za | 20,0 | | |
| Glycerin | 20,0 | | |
| Aq. destill. ad | 100,0. | Zum Aufpinseln. | |

Die multiple neurotische Hautgangrän.

Es sind in der Literatur einige Beobachtungen niedergelegt, in denen als hauptsächliches Krankheitszeichen eine multiple Gangränbildung auftrat, die sich weder aus dem Zustand des Gefäßsystems, noch dem der allgemeinen Ernährung, noch auch aus einer bakteriellen Invasion genügend erklärte. In der Mehrzahl der Beobachtungen lagen dagegen Zeichen einer nervösen Erkrankung vor. Die nosologische Stellung dieser Affektion, die im übrigen recht selten ist, ist noch sehr strittig. Die beschriebenen Fälle weichen in zahlreichen Einzelheiten voneinander ab, so daß ein einheitliches Krankheitsbild sich nicht mit Sicherheit ableiten läßt. Die Differenzen in der Symptomatologie sowohl als in der Auffassung des Krankheitsbildes prägen sich schon in der mannigfach wechselnden Nomenklatur aus. Von deutschen Autoren ist der Symptomenkomplex meist als multiple Hautgangrän beschrieben worden, mit verschiedenen erläuternden Zusätzen wie akute multiple Hautgangrän (Dostrelopont, Dinkler, Zieler), multiple neurotische Hautgangrän (Kopp, Joseph, Adrian, Brandweiner, Chvostek, Dehio, Moormeister, Kreibich, Latte, Ledermann, Rätthler), multiple trophoneurotische Hautgangrän (Müller), oder auch einfach multiple Hautgangrän (Hintner, Stahenrauch), spontane Hautgangrän (Cronquist and Bjerre). Truffi spricht von *Gangrène multiple spontanée de la peau*. Neumann bezeichnet seinen Fall noch allgemeiner als umschriebene Gangrän. Sangster spricht in seinem (zweifelhaften) Fall von *Neurotic excoriations*, Renshaw von *multiple insular necrosis of skin and subjacent tissues*. Sinkler publizierte seine Beobachtung unter dem Titel *trophoneurosis of the hands (acro-trophoneurosis) with spontaneous amputation of the fingers*, Wende unter der Bezeichnung *Dermatitis vesicobullosa et gangraenosa mutilans*. Anspruchsvoller ist der namentlich von Kaposi bevorzugte Name *Herpes zoster gangraenosis, ex.* noch mit dem Beiwort *hystericus*, den auch Isaac u. A. anwenden. Diese Kennzeichnung als Gangrän hysterischen Ursprungs kehrt noch mehrmals wieder und scheint namentlich bei den Franzosen die Regel zu sein: *Gangrènes disséminées et successives de la peau d'origine hystérique* (Bayet), *Eruption pemphigoïde gangréneuse d'origine hystérique* (Gaucher), *Gangrène cutanée d'origine hystérique* (Tousselier, Venillot). Auch Ekrl wählt die Be-

zeichnung *Gangraena cutis hysterica*; ebenso Justus, Matzenauer = A. Vorsichtiger sind Balzer et Michaux, ebenso Féré, die nur von *Gangrènes cutanées multiples chez une hystérique* sprechen. Auch Valabra betitelt seine Arbeit als *Contribution à l'étude des gangrènes cutanées spontanées chez les sujets hystériques*, Baranis als *Ulérations cutanées angioneurotiques menstruelles chez une femme hystérique*. Als *Urticaire gangréneuse* bezeichnet sie schließlich Renaut. Das häufig gegebene Beiwort hysterisch läßt uns zunächst die Frage aufwerfen, ob wir es bei der multiplen Hautgangrän immer und ausschließlich mit einem hysterischen Symptomenbild zu tun haben. Diese Ansicht ist mehrfach, insbesondere von Tonnellier, einem Schüler Gilles de la Tourettes, verfochten worden; er hat alle bis dahin bekannten Fälle, und darunter waren so charakteristische wie die von Kopp, Dautrelepont und Joseph, als hysterischen Ursprungs bezeichnet. Wenn dem wirklich so wäre, so verdiente dieser Symptomenkomplex im Rahmen unserer Studien keine Erwähnung; denn ich habe nicht die Absicht, die vasomotorisch-trophischen Störungen bei der Hysterie einer gesonderten Besprechung zu unterziehen. Es scheint mir aber, als ob man bei dieser Annahme der Einheitlichkeit der Auffassung zu Liebe den Tatsachen Gewalt antun wollte; es ist nicht bewiesen, daß alle Träger dieses Symptomenkomplexes hysterische Individuen waren, noch weniger, daß die Symptome selbst stets nichts als eine Manifestation dieser Neurose waren. Dieser von mir vertretenen Auffassung ist eine Reihe von Autoren, die einschlägige Fälle in neuerer Zeit beobachteten, beigetreten (Dinkler, Zieger, Rothler).

Es ist, bevor wir zu die genauere Schilderung des Symptomenkomplexes herangehen können, noch ein zweiter Punkt zu erledigen. Die Erscheinung, daß irgendwo am Körper eine Gangränbildung ohne die uns sonst bekannten Ursachen einzutreten auftritt, hat etwas ungemein Frappantes, Überraschendes und Unerklärliches. Es ist daher sehr bald, gleich bei der Mitteilung der ersten Fälle, die Frage aufgeworfen worden, ob diese multiple Gangränbildung überhaupt je ein spontaner Vorgang ist, oder ob wir es bei ihr nicht stets mit Kunstprodukten zu tun haben. Sehr lehrreich ist in Beziehung auf diese Simulationsfrage die Diskussion, die sich an die Vorstellung des Neumannschen Falls im Jahre 1882 knüpfte, und in der ein Billroth mit Entschiedenheit die multiple Gangrän des vorgestellten Kranken als Artefakt erklärte. Die Frage nach der Simulation wurde mit uns so großem Recht gestellt, als es sich bei diesen Kranken eben oft um Hysterische handelt und deren Neigung, die Ärzte und ihre gesamte Umgebung zu täuschen, ja bekandt ist. Es ist nun in der Tat gar nicht selten gelungen, in Fällen von anscheinend multipler Gangrän sowohl, wie auch bei der einfachen *Gangraena cutis hysterica* den unumstößlichen

Beweis dafür zu erbringen, daß durch Atzmittel und ähnliche Dinge artefiziell Gangrän hervorgerufen wurde. Um diesen Nachweis haben sich u. a. Strümpell, dann auch Hebra, Riecke, Krecke verdient gemacht. Diese Erkenntnis führte zu der Annahme, daß in allen derartigen Beobachtungen mit großer Wahrscheinlichkeit Artefakte vorliegen.

In der seit Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches vergangenen Zeit ist dieser Frage große Aufmerksamkeit zugewendet worden. Es war früher schon davon die Rede, daß die neuere französische, namentlich von Babinski inaugurierte Hysterie-Lehre nichts von auf dem Boden der Hysterie entstehenden vasomotorisch-trophischen Störungen wissen will. Von dieser Auffassung wird besonders die hysterische Gangrän, mag sie nun isoliert oder multipel auftreten, betroffen. Es wird ihr von diesen Forschern durchaus und stets eine artifizielle Genese zugeschrieben. In mehrfachen Diskussionen wurde betont, daß gerade in Paris, im Hauptsitz der schweren Hysterie, in den letzten Jahren niemals ein einwandfreier Fall von hysterischer Gangrän zur Beobachtung gekommen ist, frühere als hysterische Gangrän publizierte Fälle (Balzer) wurden als Artefakte entlarvt (Brissaud et Sicard). Bono hat während sieben Monaten alle Krankenhäuser von Paris durchsucht, ohne auf eine hysterische Gangrän zu treffen. Immerhin wird man mit dieser Methode nicht zum Ziele kommen, man kann ja nicht einfach durch ein Dekret von Paris aus die Nichtexistenz der hysterischen Gangrän verkünden; aber man wird an jeden Fall von vermeintlicher hysterischer Gangrän den Maßstab schärfster Kritik anlegen und von den Beobachtern jede erdenkliche Vorsichtsmaßregel verlangen müssen.

Es ist nun auch in der Tat gelungen, auch weiterhin in einer ganzen Reihe von Fällen den Nachweis zu erbringen, daß es sich um Artefakte handelte. Außer den oben schon genannten führe ich hier die Namen Bettmann-Lewontin, Dultz, Frankenberger, Gross, Towle, Azam, Hollstein, Dieulafoy, Latte, Rona, Rosenthal, Cavagnis, Nobl, Shepherd an, die in ihren Fällen, oft unter großen Schwierigkeiten den Nachweis des Artefakts erbrachten. In einer großen Anzahl weiterer Fälle ist der Nachweis der artefiziellen Entstehung der Gangrän zwar nicht geführt worden, aber bei kritischer Beurteilung ergaben sich doch mehr oder minder stärkere Verdachtsmomente, wie frühere Täuschungsversuche, sofortiges Aufhören der Entstehung von Nekrosen bei Eintritt in die Klinik, Auftreten von Nekrosen nur an den für die Kranken leicht zugänglichen Stellen; oder die Beobachtungsdauer war so kurz, oder der Untersucher hatte sich nicht genügend gegen die Möglichkeit artefizieller Entstehung geschützt, und anderes mehr. Ich muß auf die Frage der hysterischen Gangrän im Laufe dieses Kapitels (siehe Abschnitt Diagnose und Pathogenese) noch wiederholt zurückkommen und führe hier zunächst nur diejenigen Fälle aus der Literatur

der hysterischen Gangrän an, die mir, obwohl der Nachweis der artefiziellen Entstehung nicht erbracht wurde, doch gegen den Verdacht einer solchen Entstehung nicht genügend geschützt zu sein scheinen. Es sind das die Fälle Balzer et Michaux, Veillot, Féré, Gaucher et Barbe, Bruchon, Riehl, Veillon, Corlett, Cutler, Blandin, Rasch, Texdorpf, Adrian, Baum, der gelegentlich seiner Demonstration auch von Pinkus, Wechselmann, Rosenthal angezweifelt wurde, Gahbi, Gécévrier, Meams, Szölösky, Geyer, Isaac, Cronequist und Bjerre, Wende, Borzecki, Baronio.

Die Zahl der „suspekten“ Fälle zusammen mit der Zahl der sicher artefiziellen, die oben angeführt wurden, überwiegt bei weitem diejenige, bei denen keine hinreichend begründeten Verdachtsmomente in der Richtung eines Artefakts vorliegen. Aber ich glaube nicht, daß es möglich ist, einer Theorie zu Liebe, diese Fälle einfach verschwinden zu lassen, durch die Annahme, daß es sich in allen Fällen multipler neurotischer Hautgangrän um Artefakte handle, wobei ja auch noch zu bemerken ist, daß einige Male das Auftreten multipler spontaner Hautnekrosen auch bei nicht hysterischen Individuen (s. u.) beobachtet wurde. Es scheinen mir also selbst bei schärfster Kritik doch einige Fälle von sicherer multipler neurotischer nicht artefizieller Gangrän übrig zu bleiben. Ich rechne hierher die Beobachtungen von Dentrelepont, Kopp, Joseph, Hintner, Singer, W. Sinkler, Neumann, Leloir, Bayet (I und II), Renaut, Dekio, Moormeister, Truffi (zwei Fälle), Dinkler, Zieler, Valobra, Kreibich, Branon. Dazu kommen noch einige nebenbei in Dictionaren, Lehrbüchern usw. erwähnte Beobachtungen (Newmann, Newberger, Ledermann, Justus, Müller, Matzenauer), die nur mit Vorsicht benutzt werden können, da sie zu kurz mitgeteilt sind, um eine zureichende Beurteilung zu ermöglichen. Die erstgenannten Fälle sind der nachfolgenden Besprechung im wesentlichen zugrunde gelegt worden. Ein Fall von Rothmann, bei dem Simulation ebenfalls nicht angenommen werden darf, steht sonst ziemlich abseits von den hier besprochenen Fällen. Nicht über jedem Zweifel erhaben scheinen mir die Beobachtungen von Stubenrauch und Rühler, die ich aber im folgenden doch verwerte, ebenso ein eigener Fall, den ich unten etwas genauer mitteile; noch zweifelhafter sind die von Ehrl und Sangster, wenn auch in keinem dieser Fälle mehr als eine gewisse Vermutung auf Artefakt besteht. Ich will übrigens nicht verschweigen, daß auch gegen einige der oben von mir als sicher klassifizierten Fälle von anderer Seite Bedenken erhoben wurden, so gegen die von Singer und Hintner (von Lotte), gegen Valobra (von Babinski), gegen Dinkler. Ich vermag mich diesen Bedenken nicht anschließen. Gewisse Bedenken habe ich selbst dagegen gegen den Fall von Brandweiner, besonders weil, wie in der Kranken-

geschichte steht, die Patientin früher Neigung zu Selbstbeschädigung gezeigt hatte. Über den Fall von Hallopeau et Darmanv steht mir nur ein Roderat zur Verfügung, nach dem eine sichere Entscheidung in der vorliegenden Frage nicht möglich ist.

Es gilt ferner eine Anzahl von Beobachtungen, in denen es nicht zweifelhaft ist, daß eine spontane, multiple Gangränbildung vorliegt, in denen aber die Diagnose zwischen multipler neurotischer Gangrän und anderen, mit multipler Gangränbildung einhergehenden Affektionen schwankt. Hierher gehören die Fälle, die Ähnlichkeit mit der Raynaud'schen Krankheit haben (Beobachtungen von Schulz, Smith, Hutchinson, Renshaw, Didier), ferner solche, in denen die Entscheidung ob multiple bakterielle bzw. intoxikatorische Gangrän oder neurotische Gangrän (Audry, Zengerle, Atkinson) schwer zu fällen ist, oder die Abhängigkeit von einem organischen Nervenleiden in Frage kommt (Neuberger-Asmus, Kreibich Fall II, Müller). Diese Beobachtungen werde ich an einem späteren Punkt meiner Darstellung natürlich berücksichtigen müssen.

Ätiologie.

Von den etwa 25 Kranken, über die ich entsprechende Angaben habe, waren 3 männlichen Geschlechts; das weibliche Geschlecht überwiegt also beträchtlich; alle waren jugendliche Individuen, 11 standen im Alter von 20–27 Jahren, 13 im Alter von 18–20 Jahren. Nur meine eigene Patientin war 37 Jahre.

In der Ätiologie kommen zwei Umstände besonders in Betracht.

Sehr häufig ging dem Eintritt der Gangrän ein Trauma mehr oder minder lange Zeit voraus. Nicht weniger als 17 mal wurde ein solches konstatiert. Siebenmal war es eine Verbrennung zweiten Grades (Hintner, Kopp, Sinkler, Müller, Valobra, Dehio, Moormeister). In Kopps Fall lag sie allerdings schon sechs Jahre zurück, es befanden sich aber an der Verbrennungsstelle noch zahlreiche, immer wieder aufbrechende Kelode; auch im Fall Hintner wird über immer erneutes Aufbrechen der Brandblasen berichtet. In Dehios Fall lag eine leichte Verbrennung durch Heißwasserdampf am linken Handgelenk vor. In Müllers Fall hatte vor drei Jahren eine Verbrennung am rechten Unterschenkel stattgefunden; seit dieser Zeit traten etwa 40 gangränöse Stellen und zwar nur am rechten Bein bis zur Leistenbeuge hinauf auf. Bei Valobras Patientin entstanden nach einer Verbrennung der linken Hand im Juni 1905 schon 14 Tage später unter heftigen Schmerzen um die heilende Wunde herum kleine Stippeln, die allmählich gangränös wurden und sich vergrößerten. Nach und nach Auftreten der Nekrosen an zahlreichen anderen Körperstellen. Bei Moormeisters Kranken blieb die ursprüngliche Brandwunde am

rechten Handgelenk nach einem Jahre wieder auf, die Wunde schloß sich nicht, es wurde eine Transplantation gemacht, die ohne weiteres gelang. Kurze Zeit darauf erschienen die ersten Nekrosen am rechten Oberarm. In Ledermaans Fall hatte 8 Jahre zuvor eine Verbrennung am linken Handrücken stattgefunden, vier Jahre später ein Hundebiß am rechten Oberarm; um die Bißnarbe herum entstanden vesiculopapulöse Plaques, die sekretisch wurden. Dinklers Kranke machte sich heftige Aufschläge auf die Brust, danach entstanden rote Flecken und Blasen, die geschwürig zerfielen. Eine Schwefelsäureverbrennung ging in den Fällen von Joseph und Bayet (II. Fall) voraus; bei Josephs Kranken bestand eine langwierige Eiterung und langsam erst trat Heilung ein, während in Bayets Fall die Wunde offenbar ziemlich rasch heilte. Auch in Kalbi, von Kaposi kurz erwähntem Fall lag Säureverbrennung vor.

Dentrelepoints Kranke stieß sich eine Nadel unter den Nagel des linken Daumens; dieser wurde nach mehreren Tagen durch Eiterung abgestoßen. Singers Kranke fiel auf ein Nadelkissen, es mußten aus dem Arm einige Nadeln herausgezogen werden, nach vier Wochen wurde aus einer empfindlichen Stelle nochmals ein Nadelstück extrahiert. Stubenrauchs Patientin hatte sich den Haken einer Nadel in die Dorsalgegend des linken Handgelenks angeblich versehentlich eingestoßen; einige Tage später kann derselbe entfernt werden, einige Wochen später wird aus der linken Mamma ein verrostetes Nadelstück herausgezogen. Gerade dieser Umstand macht die ganze Beobachtung Stubenrauchs etwas simulationsverdächtig, der Autor selbst glaubte sich allerdings gegen den Verdacht des Artefakts durch Anlage eines festen Verbandes genügend geschützt. Kreibichs zweite Patientin hatte sich einen rostigen Nagel eingestoßen, die Wunde eiterie, in der Umgebung traten Bläschen auf, die nekrotisierten, es bestanden hier aber die Symptome einer beginnenden Tabes dorsalis. Neuberger's Kranke hatte sich beim Kartoffelschälen am vierten Finger verletzt, drei Tage später mit Soda gewaschen, sie bekam heftige brennende Schmerzen, und es traten dann am verletzten Finger die ersten nekrotischen Erscheinungen auf. Bei Röthlers Kranker heilten kleine Verletzungen (Verbrühung, Stiche) stets sehr schwer. Schon die Mutter hatte eine äußerst empfindliche Haut gehabt; die kleinsten Verletzungen bedingten lange Blutungen.

Das gemeinsame aller dieser Verletzungen scheint mir im Folgenden zu liegen: es handelt sich in jedem Fall um Veränderungen, die wohl geeignet waren, auf die Nerven der betreffenden Gebiete einen lange dauernden Reiz auszuüben und diese damit in einen gewissen Zustand von Übererregbarkeit zu versetzen. Gegen ein zufälliges Zusammentreffen spricht der erhebliche Prozentsatz der vorausgegangenen Traumen, noch mehr die Tatsache, daß in Bezug auf die Ort-

lichkeit ein intimer Zusammenhang zwischen Trauma und erstem Auftreten der Gangrän zu bestehen scheint. Immer betraf die Gangrän zuerst den Ort des Traumas, in Singers Fall war sogar die Inzisionswunde selbst die zuerst nekrotisierende, die weitere Ausbreitung erfolgt in der Regel so, daß die späteren Nekrosen zuerst an der verletzten oberen Extremität saßen, um dann später sich auch noch auf andere Körperstellen auszudehnen; oft wurde dabei noch lange, öfter überhaupt dauernd (Kopp) nur die Seite der Verletzung von den Nekrosen heimgesucht. Als bemerkenswert verdient noch erwähnt zu werden, daß in zwei Fällen (Kreibich, Böhler) nekrotische Stellen dort auftraten, wo subkutane Injektionen (einmal von salpetersaurem Quecksilber, einmal von Morphium) stattgefunden hatten.

Sehr schwankend ist die Zeitdauer, in der die Gangrän dem Trauma folgt; es liegen nur wenige Tage (Doutrelepont, Singer, Bayet, Dinkler, Müller, Valobra), ein Monat (Sinkler), 6 Wochen (Dehio), aber auch Jahre zwischen Verwundung und Auftreten der Gangrän (Kopp), wobei allerdings der Zusammenhang durch immer erneutes Aufbrechen der Narben hergestellt wird.

Ein vorausgehendes Trauma fehlt in den sonst typischen Fällen von Renaut, Bayet (II. Fall), Leloir, Neumann, Justus, Bronson, Zieler, Truffi (I. und II. Fall), Brandweiner und in meinem Fall.

Von großer Wichtigkeit ist in der Ätiologie eine weitere, schon oben von uns gestreifte Beziehung. Es ist sicher, daß die multiple Hautgangrän meist „nervöse“ Personen betroffen hat; für eine ganze Anzahl von ihnen erscheint nach die Diagnose Hysterie zweifellos; es für die Fälle von Singer, bei dessen Kranker sicher hysterische Konvulsionen vorgelegen haben, ebenso für die von Bayet (Fall I) und Stubenrauch, in dessen Beobachtung es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um hysterische Aphasie handelte. Auch Hiltner berichtet in seinem Fall von einer plötzlich eintretenden Stimmlosigkeit, von nervösem Husten und ähnlichem. Ebenso kam es bei der Kranken Doutreleponts im weiteren Verlauf der Krankheit zu sicher hysterischen Symptomen (Konvulsionen usw.), die Patientin von Justus war gleichfalls hysterisch. Brandweiners Kranke war wegen Epilepsie und Hysterie wiederholt in der Irrenanstalt; zwei Brüder von ihr waren geisteskrank; auch von Neumanns Patientin heißt es, daß sie an Hysterie und Epilepsie litt. Dasselbe gilt für meine Patientin. Die von Valobra beschriebene Kranke hatte seit dem Jahre 1903 hysterische Anfälle, im Juni 1906 traten nach einer Verbrennung zweiten Grades an der linken Hand die ersten nekrotischen Stellen auf. Auch im weiteren Verlauf der Krankheit kam es immer wieder zu schweren Konvulsionen. Die Kranke starb plötzlich, wahrscheinlich durch Suizid. Hysterische Symptome boten weiterhin

nach beide Kranken von Truffi, deren eine an hysterischen Brech-
anfällen litt, deren andere hysterische Charaktersveränderung und Kon-
vulsionen hatte; ferner die Kranken von Dinkler und von Dehio, bei
der einzige Attacken im unmittelbaren Anschluß an Aufregungen eintraten.
In anderen Fällen bestehen wohl Zeichen einer allgemeinen Neurose,
doch genügen die dort angeführten Symptome keineswegs immer,
um die Diagnose Hysterie zu stellen. Bayet berichtet von einem
gewissen Grad von Nervosität und von Aufstoßen nach dem Essen,
Leloirs Patientin litt an Migräne, ihre Mutter war hysterisch. Re-
nauts Kranker war ein nervöser Mensch, bot aber kein Zeichen von
Hysterie. Kopps Kranke war stets nervös und kränklich, ihr Vater
war durch eine Apoplexie seit drei Jahren doppelseitig gelähmt. Zieler
bezeichnet seine Kranke als etwas reizbar, nicht nervös; Röthler
bestreitet zwar das Vorliegen einer Hysterie bei seiner Kranken, Einzel-
heiten, die er in der Krankengeschichte mitteilt, lassen diese Behauptung
aber recht zweifelhaft erscheinen. Mormeisters Kranke lernte schlecht
in der Schule, laß die merkwürdigsten Dinge, war zweifellos imbecill.
Schließlich fehlt in Neumanns, Josephs und Bronsons Fällen über-
haupt jedes Zeichen von Neuropathie.

Ich habe schon oben meine Meinung dahin ausgesprochen, daß
das vorliegende Material nicht genügt, um die multiple
Gangrän zu einer stets hysterischen Affektion zu stem-
peln, wenn auch nicht daran gezweifelt werden kann, daß in der
übergroßen Mehrzahl der Fälle die multiple neurotische Gangrän bei
Personen sich entwickelt, deren Nervensystem durch die bestehende
Hysterie als krank stigmatisiert ist. Dinkler schließt sich ungefähr
meiner Ansicht an, wenn er sagt, die Gangrän ist keine Teilersehung
der Hysterie, sondern diese stellt nur die für die Entstehung der
Gangrän förderliche Disposition dar.

Ich werde an späterer Stelle meine Ansicht noch näher zu begründen
haben.

In einigen wenigen Fällen von Gliosis spinalis wurde im Be-
reich der auch von Störungen der Sensibilität und Motilität befallenen
Körperteile das Auftreten kleiner, multipler, gangränöser Herde beob-
achtet (Neuberger-Armus, Pospelsky), in einem Fall von Mäller
maß man mit der Möglichkeit des Bestehens einer Gliose rechnen,
in einem Fall von Kreibitz entstanden die nekrotischen Herde bei
einer Kranken, die die Zeichen einer Tab. dors. intip. darbot. Einige
Male wurde das gleiche Vorkommen bei peripheren Neuritiden
konstatiert (Neuberger, Nikolky). Auch diese Tatsachen sprechen
gegen die Annahme, daß die multiple neurotische Gangrän eine rein
hysterische Affektion sei. Sie werden ebenfalls später noch zu berück-
sichtigen sein. Von sonstigen atölogischen Bedingungen für die Genese
der Krankheit ist nicht viel bekannt; höchstens verdient noch bemerkt

zu werden, daß unsere Kranken häufig von allgemein schwächlicher Konstitution waren.

Symptomatologie.

Das hauptsächlichste Charakteristikum der Affektion ist das Auftreten kleiner, multipler, nekrotischer Herde in der Haut, ohne daß der Allgemeinzustand hierzu Veranlassung gäbe, wie bei der multiplen kachektischen Gangrän, und ohne daß eine bakterielle Invasion die Nekrosen erklärte, wie bei der idiopathischen, multiplen, bakteriellen Gangrän; des weiteren fehlen die erheblicheren Gefäßveränderungen der multiplen arteriosklerotischen Gangrän. Alles dies sind nur negative Kriterien, alle diese Dinge müssen aber ausgeschlossen werden, bevor die Diagnose multiple neurotische Hautgangrän in Erwägung gezogen werden darf, und wenn man sich erinnert, daß für jeden Fall auch der Anschluß von Simulation notwendig ist, so wird man von vornherein begreifen können, welche Kautelen bei Stellung der Diagnose „multiple neurotische Hautgangrän“ notwendig sind.

Wie steht es demgegenüber mit den positiven Kennzeichen dieser Gangränform?

Fast regelmäßig geht dem Auftreten der Gangrän ein Brennen und Prickeln an den Hautstellen voraus, die Sitz der Nekrose werden sollen. Bayets Kranke beobachtete das schon zwei Tage lang vor dem Eintritt der Nekrose, Leloirs Kranke 24 Stunden lang, meist ist es nur weit kürzere Zeit vorhanden, einige Minuten oder Stunden (Doutrelepont, Kopp, Joseph, Stubenrauch, Neumann, Bronson, Valebra, Zieler, Dinkler, Traffi, Moormeister, Kreibich). Traffi bemerkt von seiner ersten Kranken, daß sie jedesmal bei Entstehung der Blasen über Schmerzen an den entsprechenden Stellen der Wirbelsäule klagte. Dinkler berichtete von brennenden und juckenden Empfindungen, gibt daneben aber noch an, daß die Kranke eine Abstumpfung des Gefühls bemerkt, eine lederartige Empfindung gehabt habe. Die sensiblen Reizsymptome sind aber nicht ganz konstant, begleiten auch in demselben Fall nicht immer die Entstehung der Nekrosen. Sie können übrigens recht heftig werden. Einige Male waren die vorausgehenden sensiblen Symptome mehr diffus, Schmerzen in dem ganzen befallenen Arm zeigten sich. Dies Hervortreten sensibler Symptome bei Beginn des Prozesses verdient alle Beachtung. Es sei gleich hervorgehoben, daß auch im weiteren Verlauf sensible Symptome, Schmerzen sowohl wie Sensibilitätsstörungen vielfach beobachtet wurden.

Vasomotorische Symptome, also Veränderungen des Blutgehalts der betreffenden Teile, waren seltener und unregelmäßiger zu

konstatieren. Die ausgesprochensten Alterationen weist Renauds Fall auf, bei dem die Gangrän aus einer typischen Urticariaquaddel hervorging (*Urticaire gangrèneuse*). Renaud konnte die Entwicklung des Prozesses direkt beobachten, und macht darüber folgende Angaben. Unter lebhaftem Jucken entstehen in der Kniekehle eine Anzahl Urticariaquaddeln. Eine oder die andere dieser Quaddeln bleibt bestehen, wird in der Mitte zunächst stark hyperämisch, allmählich im Verlauf von einigen Tagen direkt hämorrhagisch, und schließlich entsteht im Centrum der Papel ein kleiner, schwarzer, stecknadelkopfgroßer Fleck, der sich allmählich vergrößert, bis auf 3 mm Durchmesser, und nachdem der ganze Prozeß zwölf Tage gedauert hat, abfällt. Die Heilung erfolgt mit Kolloidbildung. Andere Nekrosen waren erheblich größer. Es ist wichtig, daß in Renauds Fall ausgesprochene Dermographie bestand, und daß von den auftretenden Quaddeln bei weitem nicht alle gangränös wurden. In ähnlicher Weise entstanden die Nekrosen in Truffis zweitem Fall. Nach heftigen Schmerzen trat eine Bläse der Haut ein, dann wurde die Stelle ödematös-glänzend, umgab sich mit einem roten Hof, sah aus wie eine Nessel, schließlich bildeten sich in der Haut allmählich zusammenfließende, geldförmige Flecke, aus denen im Verlauf von 30—48 Stunden nach Beginn der Schmerzen nekrotische Stellen wurden. Ähnliche Vorgänge schildert auch Zieler: auf diffus gerötetem hyperämischen Grunde entstanden flache quaddelartige Erhebungen mit weiß gelblichem Centrum, das allmählich braun und schwarz wird, während der rote Hof verschwindet.

Eine geringe vorangehende Hämorrhagie sah auch Bayet. Eine Hyperämie ging bisweilen bei Leloirs Kranken den Nekrosen voraus.

In einer Reihe von Fällen war es den Untersuchern möglich, durch direkte Beobachtung den näheren Modus der Entstehung der Nekrosen zu fixieren.

Es ist da wichtig, zwischen den Fällen zu unterscheiden, in denen eine Bläschenbildung der Gangrän vorausging (Hintner, Bayet (Fall I), Stubenrauch, Sinkler, Doutrélepoint, Kaposi, Justus und wohl auch Kopp, ferner Brandweiner, Neuburger, Ledermann, Moormeister) und denjenigen, wo eine solche fehlte (Joseph, Singer, Neumann, Leloir, Bayet (Fall II), Bronson, Valobra). In einigen Fällen (Zieler, Dinkler, Kreibich, Truffi, Rothler) scheint der Modus der Entstehung der Nekrosen gewechselt zu haben, indem sie sich bald aus einem vesiculösen Stadium entwickelten, bald direkt sich ausbildeten. In letzterem Falle tritt nach einem Stadium der Rötung oder Bläse oder aber auch ohne daß davon etwas zu bemerken wäre, unmittelbar die Verschorfung ein. Leloir beschreibt die Entstehung der Nekrosen in folgender Weise. Nach mehrstündigem Kriebeln, das sich auf eine bestimmte Stelle lokalisiert, bildet sich dort ein roter Fleck, von wechselnder Größe. Nach einigen Stunden zeigt

sich in der Mitte dieser roten Stelle eine grau-weißliche Verfärbung, die von einem mehr roten Rand umgeben ist. Neumaun sah, wie nach vorausgehender Rötung und Brennen in der Haut eine allmähliche Abgrenzung der gesunden und verschorrenden Teile sich vollzog, indem die letzteren sich zu einem Fleck gestalteten, der an der Peripherie braun wird, während die centralen Partien noch weiß bleiben, und erst im Laufe einer kurzen Zeit, vielleicht einer halben Stunde braun werden. Die Flecken sind von einem geringen Entzündungshof umgeben. Eissal sah der Autor allerdings in der Umgebung der Gangrän Bläschen. Sehr genau hat auch Bayet die Entstehung der Nekrosen verfolgt. Nach vorausgehendem Brennen stellte sich z. B. am Unterarm eine Rote ein, die wesentlich größer ist, als der eigentliche Fleck. Es erscheinen auf diesem Grunde dann kleine, weiße, glänzende Punkte, die unter der Lupe ihre Zusammensetzung aus Epidermischuppen erkennen lassen und allmählich braun werden. Zwischen ihnen sieht man kleine hämorrhagische Stüppchen; die Hyperämie nimmt allmählich ab, und die Sekorifikation ist nun vollendet. Es können nebeneinander mehrere solcher Herde entstehen und allmählich konfluieren, so daß ein größerer Herd herauskommt.

Diese Zusammensetzung aus kleineren Herden wird bei mikroskopischer resp. Lupenuntersuchung noch deutlicher.

Valobra gibt folgende Beschreibung der Entstehung der Nekrosen: Seine Patientin, der er selbst einen festen Störkleisterverband gemacht hatte, klagt plötzlich über Schmerzen im Unterschenkel. Nach Abnahme des absolut unversehrten Verbandes fand er an der Innenseite des Unterschenkels einen weißen, kalten, anästhetischen, von einem sehr empfindlichen aber normal gefärbten Hof umgebenen Fleck. In seiner Mitte sieht man einige dunklere, runde, linsengroße Fleckchen, keine Bläschenbildung. Allmähliches Abstoßen des Sekorbes im Laufe von zwei Monaten. Auch Truffis Beschreibung ist interessant. Nach einem 6–8 stündigen schmerzhaften Vorstadium wird die Haut in wechselnder Andehnung — die Flecken haben 1–8 cm Durchmesser — blaß, leuchtend, ödematös, ragt etwas hervor; der Fleck ist von einem roten Hof umgeben. Nach einigen Stunden erscheinen in der Mitte kleine, gelbliche, eingesunkene Stellen, die zusammenfließen und einen erst gelblichen dann allmählich dunkler und schließlich dunkelschwarz werdenden Sekor bilden, der von einer ödematösen Zone umgeben ist. Das ganze spielt sich im Laufe von 30–48 Stunden ab. Aus einem hyperämischen Stadium heraus entwickelten sich die Nekrosen im Falle von Brownson, die Rote wird allmählich dunkler, violett, namentlich nach der Mitte zu, und die oberflächlichen Schichten stoßen sich ab. In den späteren Stadien dehnte sich die Gangrän viel weiter, bis schließlich auf die Knochen aus; die Verschlechterung war vielleicht auf Röntgenstrahlenbehandlung zu beziehen.

Etwas anders gestalten sich die Vorgänge in den Fällen mit Bläschenbildung. Hienter sah zuerst an einer bestimmten Stelle eine Anzahl kranzförmig angeordneter, roter Punkte, ganz wie das auch Dautrelepont und Köpp beschreiben; diese Punkte gehen im Verlauf eines Tages in Bläschen über, die sich mit einem hellen, serösen Inhalt füllen. Dann trocknen die Bläschen ein, und es bildet sich ein Schorf. In späteren Anfällen flossen die kleinsten Bläschen im Gegensatz zum ersten Anfall oft zusammen, und es bildeten sich so größere Schorfe. Weiterhin trat dann einmal eine Blase von Dreimarkstück-Größe auf, die sich am nächsten Tage in einen graugrünen, anämischen Schorf verwandelte. Für die ganze Auffassung des Falles ist es noch sehr wichtig, daß sich späterhin wiederholt Bläscheneruptionen von sehr wechselnder Größe der einzelnen Blasen (Hirse Korn- bis Fünfmarkstück-Größe) finden, die keine Neigung zur Verschärfung haben, dagegen mit sehr heftigen Schmerzen einhergehen.

In Bayets erstem Fall handelt es sich ebenfalls um Blasen, die bald isoliert blieben, bald konfluerten, dann sich mit brauner Kruste bedeckten und verschorften; ähnlich war es bei Stubenrauchs Krankem. Übrigens kamen auch in Bayets II. Fall gelegentlich Blasen vor, aber nur in der Weise, daß nach der Narbenbildung über den Narben gelegentlich Blasen aufschossen. Eine ganz gleiche Entwicklung nehmen die Fälle, die Kaposi als Herpes zoster gangraenosus hystericus auführt; auf sie kommen wir noch zurück.

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Beobachtung Dautreleponts.

Dautrelepont hatte anfangs niemals eine Bläschenbildung beobachten können. Er fand, ganz in gleicher Weise wie nach ihm Köpp, zunächst als frühestes Stadium Entstehung einer leichten, punktförmigen Räte unter Brennen und Prickeln, aus der sich nach ein bis zwei Stunden ein gelblicher Schorf entwickelte. Die mikroskopische Untersuchung lehrte ihn freilich gleich damals die richtige Auffassung dieses Prozesses. Er fand nämlich, daß die Plaques in der Tat aus kleinen veränderten Zellgruppen bestehen, die von gesunder Cutis umgeben sind. Die primären Veränderungen zeigte das Rete Malpighi, die Zellkerne waren hier abnorm hell, das Zellprotoplasma geschwollen, die Zellen durch ein Exsudat auseinander gedrängt, in späteren Stadien fand sich Vakuolenbildung und Zellschwund. An einzelnen Stellen waren auch die Papillen in den nekrotischen Prozeß hineinbezogen. Ihre Gefäße waren stark mit Blut gefüllt, um sie herum bestand nur Rundzelleninfiltration, die Gefäße selbst waren ebenso wie die Nerven normal. — Der ganze Prozeß war nach Dautreleponts Erklärung durchaus dem analog, den man bei der Bläschenbildung sieht. Der weitere Verlauf seines Falles brachte ihm eine glänzende Bestätigung dieser seiner Auffassung. 21 Monate nach Beginn der Erkrankung sah er zum erstenmal auch klinisch Bläschen-

bildung; es schloß eine Bläschengruppe an der Innenseite des linken Fußes auf, die Bläschen trockneten allmählich ein, ohne daß die Haut gangränös wurde. Seit dieser Zeit wurde neben den immerhin zahlreichen Verschorfungen Bläschenbildung oft beobachtet, zum Teil auch in der Peripherie der gangränösen Herde. Noch viel später als die kleinen Bläschen traten aus Konfluenz entstandene, größere Blasen auf, die Handtellergroße erreichten. Bläschen, die erst später gangränös wurden, wurden dagegen anscheinend nicht beobachtet. Dentrelepont erklärt das Fehlen von Bläschen bei den nekrotischen Herden so, daß er annimmt, diese kamen anfangs nicht soweit zur Entwicklung, um klinisch als solche zu imponieren, weil noch vorher Gangrän eintrat.

Die Entstehung der Gangrän aus gruppenweise zusammenstehenden Bläschen beschreibt Brandweiner; die einzelnen Vesiculae waren haarkorn- bis linengroß, der Blaseninhalt war anfangs klar oder leicht getrübt; die Gangrän entstand immer am Grund der Blase. Die Bläschen ließen später oft zusammen zu bohnen großen Blasen, mit schlaffer Decke. Eine ganz gleiche Schilderung entwirft Moor-meister, ebenso Dinkler.

Man wird nach den Erfahrungen Dentreleponts bei der Beurteilung der Fälle, die klinisch angeblich ohne Bläschenbildung einhergegangen sind, vorsichtig sein müssen, da ja die Erwartung, daß später doch noch einmal die Genese aus Bläschenbildung sich dokumentiert, nahe liegt. Der Frage der Entstehung der Nekrosen sind auch spätere Forscher noch mit vielem Eifer nachgegangen, und es hat sich ergeben, daß direkte Nekrosenbildung und Entstehung aus Bläschen vielfach nebeneinander hergehen. Eine genaue Schilderung der klinischen Erscheinungen wie auch der histologischen Verhältnisse verdanken wir Zieler. Auf diffus gerötetem hyperämischen Grunde bilden sich nach ihm flache, quaddelartige Erhebungen mit weiß-gelbem, alabasterfarbenem Centrum. Eine circuläre Rötung des Randes verschwindet zunächst auf Druck; das Centrum, aber auch die gerötete Peripherie ist auf Druck sehr empfindlich; allmählich sinkt die Erhebung wieder in das Niveau der Haut zurück, der rote Hof ist geschwunden, die weißgelbe Färbung des Centrums geht in eine helle rötliche, dann in eine scharf begrenzte bräunliche über. Nach einer Woche oder später stößt sich von der Oberfläche eine Hornlamelle ab, unter der normale Haut zum Vorschein kommt, oder es tritt nach Abstoßung eines ganz oberflächlichen Scharles eine etwas unter die Oberfläche der Haut eingesunkene Narbe, zum Teil mit bläulich roter Verfärbung zutage. Der gangränöse Prozeß, der anfangs die tieferen Schichten des Coriums mitgegriffen hatte, hörte später während der klinischen Beobachtung nur zu ganz oberflächlichen Nekrosen oder betraf sogar nur die Epidermis. Einzelne Stellen bildeten sich zurück, ohne daß es überhaupt zur Nekrose kam. Die Überreste verschwanden zum Teil völlig, ohne Spuren, oder nach leichter Schup-

pung, andere hinterlassen leichtere, wieder andere schwerere Pigmentierung, zum Teil mit ganz oberflächlichen Narben, und endlich haben wieder andere die Haut lokal zerstört, und an ihrer Stelle befinden sich linsengroße, wie mit dem Lorbeisen ausgeschlagene, dunkel pigmentierte Defekte. Ihr vorwiegender Sitz ist an den unteren Extremitäten. Die Oberflächlichkeit der Gangrän bedingt, daß die Schorfe nicht schwarz, sondern höchstens bräunlich erscheinen. Die histologische Untersuchung des Anfangsstadiums ergab zunächst Hyperämie und Ödem der Cutis und des Papillarkörpers mit geringer kleinzelliger Infiltration um die Gefäße herum. Das Ödem führt zur Kompression der Gefäße, greift auf die Epidermis über, bedingt hier eine Erweiterung der Saftspalten und Aufquellen der Epithelien, die bald eine geringere Färbungsfähigkeit als normal erkennen lassen. Zur Vakuolen- und Blasenbildung kommt es nur selten und in sehr beschränktem Maße, da das Ödem keine hohe Ausbildung erreicht. Blasenbildung ist ausgeprägt erst in späteren Stadien vorhanden gewesen, wo sie auch klinisch zutage trat. Die folgende oder begleitende Gangrän erstreckt sich fast nur auf die obersten Schichten des Papillarkörpers und die Epidermis. Blasen im Epithel ließen sich als primäre Effloreszenzen nicht nachweisen. Auch in den späteren Stadien schienen sie wohl nur die Folge des stärkeren, von der Cutis und dem Papillarkörper auf die Epidermis übergreifenden Ödems zu sein. Zieler hält es nach dem klinischen Befund für sicher, daß die primäre vasomotorische Schädigung in der Cutis sitzt, und daß dieser erst sekundär die Nekrose des Epithels folgt. Die histologischen Befunde Brandweiners entsprechen im allgemeinen den oben mitgeteilten von Doutrélepost. Er fand Bläschenbildung im Epithel.

Dinkler beschreibt den Vorgang folgendermaßen: Es tritt an einer unbeschriebenen Stelle ein lebhafter Juckreiz auf, die Stelle wird gerötet, bläulich-rot, nach 10–20 Stunden wird die Haut gelbgrünlich und an ihrer Oberfläche trocken, zeigt keine Falten und sinkt ein. Die betreffende Stelle ist dann empfindungslos; ihr Bezirk wird von einem roten Hof umgeben, der Blasenbildung zeigt. Die Blasen platzen, es erfolgt eine Infektion und starke Sekretion, dann Abstoßung des Schorfes. Das Ganze spielt sich im Verlaufe von 2–3 Monaten ab.

Histologisch untersucht wurde ein zwei Tage alter Herd. Es fand sich eine Eintrocknung des Epithels, eine Nekrose der Bindegewebszellen, der zu- und der abführenden Papillargefäße, eine dichte kleinzellige Infiltration um die Schweißdrüsen herum, zeltener um die Capillaren, um kleine Arterien und Venen. Sehr bemerkenswert war ein Befund an den Hautnervenzämmchen. Diese zeigten eine wechselnde Zahl Emern von großem und kleinem Kaliber, deren Nervenmark bei der Färbung mit der Marchéschen Methode geschwärzt wird und demnach im Zerfall begriffen war. Der Axencylinder ist entweder nicht alteriert

oder nicht mehr färbbar und geschrumpft. Aus der Tiefe der histologisch vollkommen normalen und von dem nekrotischen Prozeß der Epidermis und des Corium nicht betroffenen Schicht subkutanen Fettgewebes lassen sich die Nervenstämmchen mit ihren erkrankten Fasern noch bis in die Pars papillaris des Corium verfolgen. Die Nervenfasern der bulbösen Randpartien zeigen keine deutlichen Veränderungen. Dieser von Dickler zum erstenmal erhobene und später auch nicht noch einmal bestätigte Befund einer Degeneration der peripheren Nervenstämmchen ist gewiß außerordentlich interessant. Aber ich möchte doch schon an dieser Stelle — übrigens in Übereinstimmung mit Bedenken, die auch Zieler geäußert hat — von einer Verwertung des Befundes in pathogenetischer Beziehung abraten und darauf hinweisen, daß in der Nähe von Ulcerationen vielfach degenerierte Nervenfasern gefunden wurden, deren Degeneration offenbar sekundär entstanden war.

Eine von Huber in einem Fall vorgenommene histologische Untersuchung kam zu dem Resultat, daß es sich um intraepitheliale Bläschen handelte, und daß die Bläschenbildung durch degenerative Zustände in den Retezellen eingeleitet wird. Der Bau der Bläschen entspricht durchaus dem bei Herpes zoster bekannten, nur handelt es sich in dem Falle von Huber um einkammrige Blasen.

Genaue klinische und histologische Beobachtungen verdanken wir auch Kreibich. Aus seiner Schilderung geht die Multiplizität der Erscheinungen mit besonderer Deutlichkeit hervor. Er fand in seinem ersten Fall fleckenförmige Rötung, die ohne in Bläschenbildung oder Verschorfung überzugehen, sich nach kürzerer oder längerer Zeit zurückbildete, fleckenförmige Rötung, nach deren Abblässung gruppierte Kröteben zurückblieben, die auf ihrer Höhe kleine, grüne Schorfe trugen, solitäre und herpetisch gruppierte, derbe, harte Bläschen, häufig mit centraler Delle in Form und Aussehen vollkommen des Herpes zoster-Bläschen ähnelnd; Blasen, an deren Basis graugrüne oder bei Blutbeimengung braungraugrüne Schorfe auftraten, graugrüne und braune Schorfe, die von einem Blasenwall umgeben sind, polycyclisch begrenzte Schorfe, die während der Nacht in scheinbar vollkommen gesunder Haut entstanden waren und keinen peripheren Blasenwall zeigten, sich also scheinbar als reine Hautgangrän darstellten. Eine genaue Untersuchung der erkrankten Partien ergab aber später, daß sich zwischen Rötung, Blasen- und Schorfbildung ein hochgradiges anämisches Ödem in Form vollkommen blauer Quaddelbildung einschaltete. Auf der Höhe der Quaddeln traten kleine Nekrosen in Form grünllicher Schorfe auf, oder es schoß auf der Quaddel eine Blase empor, die wieder sehr oft in der Tiefe der Blasenbasis das Auftreten der Nekrosen erkennen ließ. Kreibich sah auch Rötungen auftreten, in deren Mitte sich flache anämische Ödeme ausbildeten, die zum Teil zurückgingen, zum Teil oberflächlich verschorften und dann unter die Un-

gebung einsanken. Er sah Blasen und Nekrosen sich unter seinen Augen vergrößern. War die Schorfbildung vollendet, so ging je nach der Tiefe des Scharfes die Heilung mit größerer oder geringerer Eiterung, meist sehr langsam vor sich.

Die histologischen Untersuchungen, die Kreihoch anstellte, beziehen sich im wesentlichen auf die von ihm experimentell hervorgerufenen Veränderungen. In dem ersten Stadium, das durch eine Hyperämie und Ödem der Haut gekennzeichnet war, war die Epidermis normal, die Cutisfasern etwas verbreitert, im Gewebe fanden sich keine Exsudatzellen, hingegen traten die Gefäße durch eine deutliche Vermehrung ihrer fixen perivaskulären Zellen, durch eine vermehrte Anlagerung von Mastzellen hervor. Weiter fand sich im Vergleich mit gesunder Haut eine wenn auch geringe, so doch deutliche Vermehrung der fixen Bindegewebszellen überhaupt. In weiter vorgeschrittenen Stadien finden sich zwischen normalen Epithelinseln eingestreut, zahlreiche Bläschen; die Epithelkerne sind in ihrer Färbbarkeit herabgesetzt und in verschiedenem Grade geronnen. In der Cutis treten Zeichen intensiver Entzündung hervor, besonders unter den Bläschen, die in der Epidermis liegen. In der Nähe der Gefäße besteht eine stärkere Fibrinausscheidung. Das perivaskuläre Infiltrat verfolgt die Gefäße bis zur Subcutis. Geringere Infiltrationen sind auch um die Gefäße in der Peripherie, wo keine Epithelveränderungen mehr nachweisbar sind, vorhanden. Wo es zu einer Schorfbildung bereits gekommen ist, findet man das Epithel colligativ degeneriert, in der Cutis eine Nekrose bis zur Subcutis herab. In dem nekrotischen Anteil ist eine starke Exsudation vorhanden, Blutungen und reichliches Fibrin in der Epidermis und Cutis.

Schließlich sind noch die Untersuchungen von Traffi zu erwähnen. Bei seiner ersten Patientin beobachtete er das Entstehen von nekrotischen Herden, die sich auf Haut und Unterhaut erstreckten ohne Bildung einer Blase. Diese Herde hatten eine konische Form mit der Basis an der Oberfläche der Haut und mit der Spitze im Unterhautzellgewebe. Außerdem beobachtete er gangränöse Herde in der Unterhaut, die sehr schmerzhaft waren, über denen die Haut rot leuchtend infiltriert war und sich mit hämorrhagischen Bläschen bedeckte. Schnitt man auf einen solchen Herd ein, so bekam man einen mortifizierten Pfropf. Die histologische Untersuchung ergab dann, daß die Nekrose bereits bis zur Zerstörung des Gewebes der Haut fortgeschritten war. Man konnte nur einige elastische Fasern und einige Bindegewebsfasern differenzieren. Die Epidermis war vollständig abgehoben. Ihre einzelnen Teile waren besser erhalten als die der Cutis. Zwischen Papillarschicht und Epidermis sieht man Blutaustritte und in den Seitenteilen eine geringe kleinzellige Infiltration. In der Cutis ist der Schorf umgeben von einer dichten kleinzelligen Infiltration. Auch in seinem zweiten

Fall konnte Truffi die Vorgänge genau beobachten. Die Kranke klagte zunächst über heftige Kopfende Schmerzen. In den ersten 6 bis 12 Stunden kann man keine Veränderungen der Haut konstatieren. Dann wird diese an einer mehr oder minder ausgedehnten Stelle weiß, anämisch, später nimmt sie einen leuchtenden, ödematösen Ton an und springt etwas über die normale Oberfläche hervor. Die erkrankte Stelle ist um diese Zeit von einem roten Rand umgeben und sieht aus wie eine Quaddel. Einige Stunden später sieht man in dem Centrum der erkrankten Partie zahlreiche eingesunkene kleine Stellen von gelblicher Färbung entstehen, die sich miteinander vereinigen, und aus denen ein trockener, eingesunkener, gelbbrauner, später vollkommen schwarz werdender Fleck hervorgeht, der von einer ödematösen Zone umgeben ist. Diese Veränderungen brauchen zu ihrer Entwicklung 30 bis 48 Stunden. In einem Stück, das aus der Umgebung eines solchen nekrotischen Fleckes entnommen ist, wo also die Nekrose erst im Beginn war, fand Truffi in den oberflächlichen Schichten der Haut kleine gangränöse Herde, die ziemlich regelmäßig gestaltet waren, Kegelform hatten, deren Basis gegen die freie Oberfläche der Haut gerichtet war. In diesen Herden färbten sich die Gewebe gleichförmig, nur die elastischen Fasern sind noch erhalten, die Gefäße sind verengt und blutleer. In der Umgebung besteht keinerlei Veränderung der Gefäßwandungen, nur hier und da eine geringe Ausdehnung und eine ganz minimale perivaskuläre Infiltration. Auf die für die Pathogenese sich aus diesen klinischen und histologischen Untersuchungen ergebenden Schlüsse gehen wir erst später ein.

Das Ende aller dieser in ihren Einzelheiten abweichenden Vorgänge ist jedenfalls die Verschorfung. Die Schorfe zeigen ein mannigfach verschiedenes Aussehen; sie sind bald gelblich weiß, bald wieder mehr braun oder grau, oft grünlich-grau, oft zu Anfang gelegentlich weich, später pergamentartig trocken und von sehr wechselnder Ausdehnung in Länge und Tiefe; zudem verschieden gestaltet, indem sie bald glatte, bald gezackte oder ganz unregelmäßig konfigurierte Ränder haben.

Die Größe variiert auch im selben Fall und sogar bei gleichzeitig oder rasch hintereinander auftretenden Nekrosen. So sah Kopp in seinem Fall eine Nekrose von 4 cm Länge und 1 cm Breite und zugleich solche von nicht mehr als Linsengröße. Dinkler beobachtete Zehn-pfennig- bis Talergöße. Renault konnte als kleinste gangränöse Stelle einmal eine solche von 5 mm Durchmesser auffinden. Demgegenüber sahen Doutrelepont und Joseph Schiefe von Talergöße, Leloir von 6 cm Länge und 3 cm Breite. Müller sah solche bis Fußmarkstück-Größe, Bronson eine Gangrän von 2×4 Zoll Größe am Schienbein.

Die Schorfe sind hart, pergamentartig, so fest, daß man sie nur mühsam mit einer Nadel durchstechen kann, natürlich empfindungslos.

Die Zone der Anästhesie ging aber in Leloirs Fall noch über die Grenzen des Schorfs etwas hinaus. Im weiteren Verlauf tritt fast stets um sie herum ein Entzündungskegel auf, der 1–2 mm breit ist und etwas über das Niveau des eingesunkenen Schorfs hinausragt. Die Verschorfung ist fast stets oberflächlich, nur die obersten Schichten der Haut tangierend, doch reichen die Nekrosen bisweilen auch tiefer bis in die Subcutis, und es kommt sogar vor, daß die tieferen Partien der Haut stärker betroffen sind, als die oberflächlichen, bzw. daß der nekrotische Herd in der Subcutis sitzt (Traffi). Ausnahmeweise geht die Gangrän tiefer, wie in Hintners Fall, wo einmal eine Nekrose bis auf die Muskulatur des Vorderarms reichte. Wir erwähnten schon den Fall von Bronson, bei dem aber die Bestrahlung mit Röntgenstrahlen wohl an der ungewöhnlichen Ausdehnung der Gangrän, die bis auf den Knochen reichte, schuld gewesen sein dürfte.

Der Schorf stößt sich nach mehr oder minder langer Zeit ab resp. wird durch eine demarkierende Entzündung eliminiert, und das Geschwür liegt dann zutage.

Die Zeit, die zu dieser Umwandlung gebraucht wird, wechselt und hängt wenigstens zum Teil naturgemäß von der Größe des Schorfs ab. Der Prozeß kann sich innerhalb eines Tages vollziehen oder mehrere Tage bis Wochen dauern. (Kopp gibt für seinen Fall 9–15 Tage an, Renaud 5 Tage, Hintner einmal 4 Wochen bei der großen, oben erwähnten, bis zur Muskulatur reichenden Nekrose, Leloir 12 Tage bis 3 Wochen und noch mehr, Dinkler 2–3 Monate, Brandweiner 4–6 Wochen usw.)

Die Geschwüre zeigen meist nicht viel Besonderes. Die Granulationen sind oft recht üppig, bluten bei geringer Berührung und können äußerst empfindlich sein. Die Vernarbung der Geschwüre geht meist verhältnismäßig langsam vor sich. In Kopp's Fall brauchte sie einen Zeitraum von sechs Tagen bis fünf Wochen, Hintner sah einmal acht Wochen bis zur Vernarbung vergehen, Bayet zwei Monate, Singer sechs Wochen, Valobra 4–5 Monate. Jedenfalls wird sehr oft betont, daß die Heilung äußerst langsam vor sich geht, während an denselben Kranken vorgenommene chirurgische Eingriffe gelegentlich keine verzögerte Heilungstendenz erkennen ließen (Moormeister, Wende).

Die Art der Vernarbung verdient ebenfalls Aufmerksamkeit. Es ist mehrfach, namentlich bei etwas größeren Ulcerationen beobachtet worden, daß eine keloidartige Narbe entsteht (Doustrelepont, Hintner, Kopp, Leloir, Schwimmer, Justus, Joseph, Valobra, Traffi, Röthler, Moormeister). Die Keloids sind keine regelmäßigen Erscheinungen und auch da nicht immer vorhanden, wo sie einmal aufgetreten sind. Sie sind von wechselnder Form, strahlig oder mehr rund; auch Leloirs Angaben ähneln sie sehr den durch Verbrennung mit Schwefelsäure hervorgerufenen Narben. Sie können lange Zeit,

wie bei Kopp's Kranken, druckschmerzhaft bleiben. Hier waren sie von dunkelblauer oder roter Färbung und waren mit Teleangiectasien besetzt, ebenso wie in dem Falle von Moormeister. Joseph hat die Frage erörtert, ob diese Keloidbildung an sich auf trophische Störungen zurückzuführen ist, und ob durch sie nicht andererseits wieder ein Reiz auf die peripheren Nervenendigungen ausgeübt wird. Zu einem sicheren Entscheid ist er nicht gekommen; es scheint mir aber, als ob durch eine Erfahrung Dautreleponts, die von Joseph selbst bestätigt wird, die Bedeutung dieser Keloidbildung wesentlich herabgesetzt wird. Dautrelepont fand nämlich, daß in seinem Fall, in dem früher immer Keloidbildung eingetreten war, unter antiseptischen Umschlägen, am besten Sublimatumschlägen, eine Keloidbildung nicht mehr eintrat. Auch andere haben diese Erfahrung gemacht. Es ist daher sehr fraglich, ob diese Keloidbildung nicht doch mehr als ein zufälliges Accidens anzusehen ist, bedingt vielleicht durch mangelnde Reinlichkeit, oder dadurch, daß die meist nervösen Kranken durch häufiges Nachsehen der Wunde, durch Reiben und Lockern des Verbandes usw., vielleicht gelegentlich auch mit einer gewissen, wenn auch krankhaften Neugiertheit einen Reiz auf die Granulationsfläche ausgeübt und dadurch zur Entstehung der Keloidbildung wenigstens zum Teil beigetragen haben.

Blasen treten über den alten Narben auch immer wieder von neuem Blasen auf (Kopp). Im Fall von Röthler bildeten sich nach Ablauf des Prozesses in der Umgebung einer großen Keloidnarbe am rechten Unterarm kleine Abszesse. Im weiteren Verlauf sind übrigens meist auch die hypertrophischen Narben flacher geworden und haben sich in ihrem Aussehen den einfachen Narben genähert. Truffi konnte nach einem Jahr sogar eine Rückbildung der Keloidbildung bis zur völligen Verschwinden feststellen. Oft ist auch von vornherein eine gewöhnliche Vernarbung eingetreten. Die Größe der meist stern- oder kreisförmigen Narben richtete sich natürlich nach der Größe des Geschwurs.

Wenn allein die Epidermis von dem gangränösen Prozeß befallen ist, so überhäutet sich der gesetzte Defekt naturgemäß, ohne daß es zur Narbenbildung kommt. Solche Stellen, die als *fausse gangrène* oder *gangrène avortée* von Tonsellier bezeichnet wurden, sind z. B. wiederholt in Hinters's Fall beobachtet worden. Auch Dinkler erwähnt in seinem Fall, daß sich oberflächliche Hautschichten ablösen, ohne daß es zur Geschwulstbildung kam, ebenso berichtet Zieler, daß sich bei seiner Kranken Hornlamellen lösten, unter denen normale Haut zum Vorschein kam. Die Narben besitzen meist, wie erwähnt, eine ziemlich erhebliche Druckschmerzhaftigkeit, die allerdings im Laufe der Zeit nachläßt. Leloir fand dagegen eine ausgesprochene Anästhesie im Gebiet aller Narben, leichte Nadelstiche, leichte Berührungen ebenso wie ein geringer Druck wurden gar nicht wahrgenommen; dagegen be-

stehen auch in diesen anästhetischen Narben oft spontane Schmerzen. Schließlich wäre noch zu erwähnen, daß sich als Residuum des gangränösen Prozesses bisweilen eine abnorme Pigmentierung gefunden hat (Dautrelepont, Hintner, Bayet, Zieler, Wende, eigene Beob.).

Die Nekrosen treten aber nicht nur auf der Haut, sondern auch auf den Schleimhäuten auf. Das hat Dautrelepont zuerst beschrieben. Hier stellten sich die ersten Nekrosen auf den Schleimhäuten ein, nachdem schon die ganze Haut befallen gewesen war. Zuerst wurde ein kleiner umschriebener Hof am Ligan. glosso-epiglottic. beobachtet. Dann wurde häufig rezidivierende Bläschenbildung und oberflächliche Verschärfung des Rachens, des harten und weichen Gaumens gesehen, schließlich ähnliches auch an der Schleimhaut der äußeren Genitalien und an der Conjunctiva bulbi. In Hintners Fall saßen kleine Nekrosen im Meatus auditorius externus und am Trommelfell. Kreibitz berichtet von seiner ersten Patientin, daß im weiteren Verlauf an der Schleimhaut des Mundes, der Vulva und Vagina Epithelabhebungen vorkamen, die Bläschen entsprachen. Von Dinklers Patientin wird berichtet, daß bei ihr an Zunge und weichem Gaumen unter juckenden, brennenden Schmerzen die obersten Schleimhautpartien sich abgestoßen hätten; zur Geschwürsbildung kam es hier nicht. Treffs zweite Patientin hatte zuerst einen bläsigen Ausschlag an der Unterlippe, der mit Narbenbildung heilte. Zwei Monate später traten gangränöse werdende Bläschen im Gebiete des ersten Astes des linken Trigemini auf. Erst nach mehr als 2 Jahren entwickelten sich gangränöse Stellen an der Oberfläche des Halses, ohne Blasenbildung, mit heftigen Schmerzen, dann ähnliche Stellen am Unterarm, Oberarm, Brust, Oberlädern, äußeren Gehörgang. Als Ulex neuroticum macrose eris hat Löblowitz eine Affektion beschrieben, die er selbst als eine besondere Lokalisation der multiplen neurotischen Gangrän, als eine neurotische Schleimhautgangrän auffaßt. Er berichtet über eine Beobachtungsreihe von exquisit familiären Typus und stellt die von früheren Autoren beschriebenen Fälle, denen er eine ähnliche Deutung gibt (Fälle von Jacobi, Sihley, Kiek, Court) zusammen. Ich kann seiner Darstellung keinen Grund entnehmen, der berechtigte, diese Affektion auf eine Alteration des Nervensystems zu beziehen, und ich sehe daher von einer genaueren Beschreibung dieser Affektion ab.

Der Gesamtverlauf der Krankheit resp. des Symptomenkomplexes, dessen Hauptcharakteristikum die geschilderte multiple Gangrän ist, ist etwa folgender.

Daß ein Trauma vorauszugehen pflegt, und daß es meist „nervöse“ Personen sind, die befallen werden, ist uns schon bekannt. Verschieden lange Zeit nach diesem Trauma zeigt sich an der ursprünglichen Narbe oder doch wenigstens in deren Nähe der erste gangränöse Fleck, dem

in wechselnden Zwischenräumen, zunächst immer in der Nähe der Verwundungsstelle neu folgen. Während wir an der ersten Stelle schon die Vernarbung eintreten sehen, befinden sich, meist etwas proximalwärts zum Stamm zu, teils sich eben bildende Geschwüre, teils Schorfe, teils die ersten beginnenden Symptome des Prozesses. So sind wir oft in der Lage, an einer Extremität die verschiedenen Stadien des Prozesses in aller Bequemlichkeit studieren zu können. Auf einer von Leloir gegebenen Abbildung z. B. sind Ulcerationen, Schorfe und Narben nebeneinander am selben Unterarm vorhanden. Nachdem verschieden lange Zeit hindurch nur die verletzte Extremität Sitz des Krankheitsprozesses gewesen ist, breitet dieser sich weiter aus und geht auf die übrigen Teile der affizierten Körperhälfte über. Es können viele Monate vergehen, ehe es so weit kommt, es können aber auch schon nach einigen Tagen weit entfernte Stellen derselben Körperhälfte befallen werden. Der Prozeß kann sich dauernd auf die einmal befallene Seite beschränken (Köpp), aber nach mehr oder minder langem Verlauf, oft erst nach vielen Monaten kommt meist auch die andere Körperhälfte an die Reihe. Ein besonderes Interesse bieten die Fälle, in denen die Nekrosen an symmetrischen Stellen sitzen (Bronson, Kreibich, Truffi, eigene Beob.). Der Fall von Bronson ist von dem Autor geradezu unter dem Titel *symmetrische Gangrän* veröffentlicht worden, und er hat auch gewisse Beziehungen zur Raynaudschen Gangrän (s. u.). Die Fälle von Truffi und Kreibich sind dagegen klassische Typen der multiplen neurotischen Hautgangrän. Die Symmetrie ist in dem Kreibichschen Falle besonders groß, in der Einzahl waren da nur die Herde in der Mittellinie ebenso wie bei meiner Kranken, bei der die Gesamtzahl der Nekrosen allerdings gering war (siehe Figur 24). Die Zeit, die bis zum Auftreten des symmetrischen Herdes vorfloß, war verschieden groß, einmal 3—6 Stunden, gewöhnlich 10 Stunden, einmal betrug das Intervall drei Tage. Für viele Fälle wird demgegenüber die absolute Regellosigkeit der Ausbreitung betont.

Es kann in den schwersten Fällen (hierher gehören die von Leloir, Hintner und vor allem der von Doutrelepont, weiter die von Truffi, Moormeister, Kreibich) allmählich der ganze Körper, eingeschlossen das Gesicht, Sitz der Nekrosen werden. Von Interesse ist, daß in Hintners Fall kleine Nekrosen im Meatus auditorius externus und sogar am Trommelfell saßen; und noch bedeutsamer ist die schon erwähnte Tatsache von dem Vorkommen dieser Nekrosen auch auf den Schleimhäuten in Doutreleponts Fall, ebenso wie in den von Dinkler, Kreibich und Truffi.

Der zeitliche Ablauf des Prozesses zeigt in den einzelnen Fällen die größten Divergenzen. Die Nekrosen können in sehr rascher Aufeinanderfolge entstehen: Leloir berichtet, daß seine Kranke in der ersten Beobachtungszeit nicht vierzehn Tage, später nicht einmal acht

Tage hintereinander vom Auftreten neuer Scherfe verschont blieb. Und nach drei Jahren war noch keine Besserung dieses Zustandes eingetreten. Eine fast kontinuierliche Reihe von Nekrosen durch fünf Jahre hindurch gab es auch bei der Patientin Doutreleponts, und hier setzte erst der an Tuberculosis pulmonum erfolgende Tod dem Leiden ein Ziel. Bei Dinklers 15 jähriger Kranken hatte das Leiden vor zwei Jahren begonnen und anscheinend kontinuierlich zum Auftreten neuer Effloreszenzen geführt. Der Patient stand später einige Monate in klinischer Behandlung und es wurden, da täglich neue Herde entstanden, weit über 500 frische Veränderungen beobachtet.

In Sinklers Fall erstreckte sich die Beobachtungsdauer zur Zeit der Publikation bereits auf sieben Jahre; die ersten vier Jahre war hier nur der linke Arm, an dem nach einer Verbrennung die Nekrosen zuerst aufgetreten waren, betroffen, dann erschienen sie, als hier Heilung eingetreten war, plötzlich am rechten Unterarm. Ebenfalls sieben Jahre dauerte der Prozeß bereits bei der Kranken von Justus; vor der zuletzt aufgetretenen Ulceration war die Kranke allerdings zwei Jahre von Manifestationen des Leidens frei geblieben. In Truffis erstem, zuerst 1891 von Massazza beschriebenen Fall, erstreckte sich die Krankheit zur Zeit der letzten Entlassung (1904) auf eine Dauer von 17 Jahren. Die Kranke hatte damals 221 Narben. Brandweiners Kranke hatte in der vier Jahre dauernden Beobachtungszeit nur geringe Unterbrechungen der Nekrosebildungen.

Über eine mehrmonatliche Beobachtung mit immer neuen Rezidiven in ganz kurzen Zwischenräumen berichten auch Hintner, Bayet, Moormeister, der nach kurzer Zeit bei seinem noch in voller Entwicklung begriffenen Fall 60 Narben zählte, Zieler, bei dem späterhin die Nekrosen seltener wurden, um nach 1½ jähriger Dauer bis zu dem ein Jahr später erfolgenden Tode zu verschwinden. Größer waren die freien Intervalle bei Renault, der alle drei Monate eine neue Quaddel-eruption sah, von denen immer einige nekrotisch wurden.

Noch größer waren die Intermissionen in Josephs Fall. Hier traten anfangs die Nekrosen in ziemlich regelmäßig halbjährigem Turnus auf, dann verging ein volles Jahr bis zum Recidiv, und das nächste trat nach sieben Monaten auf, nachdem ein erneutes, ganz unbedeutendes Trauma vorangegangen war. Valobras Kranke hatte die ersten Nekrosen im Juni 1905, 14 Tage nach einer Verbrennung. Heilung nach 5 Monaten; der zweite Schub begann im Dezember 1905, der dritte im März 1906. Bronsens Kranke, ein 17 jähriges Mädchen, hatte mit 12 Jahren die ersten Nekrosen. Diese kamen anfänglich nur im Sommer, ein- bis zweimal, später auch im Winter. Zwischen den einzelnen Anfällen lagen Pausen bis zu 18 Monaten. Allmählich wurden die Anfälle häufiger und schwerer. Eine Intermission von zwei Jahren wies, wie oben erwähnt, Justus' Kranke auf. Dinklers Patientin war eine 35-

jährige Lehrerin, bei der im Alter von 22 Jahren nach heißen Aufschlägen auf die Brust rote Flecke an verschiedenen Stellen beider Brüste auftraten, aus denen sich Blasen entwickelten, die schließlich zu Geschwüren wurden; ähnliche Prozesse liefen an beiden Beinen ab; die Geschwüre trafen immer schubweise auf, durch fünf Jahre hindurch, dann hatte die Kranke fünf Jahre lang Ruhe. Nachdem sie sich mit dem Bein an einen Koffer gestoßen hatte, begann die Nekrosenbildung vor 2½ Jahren aufs Neue.

Wir haben es also mit einer rezidivierenden, wenn auch im einzelnen in sehr unregelmäßigen Etappen ablaufenden Affektion zu tun.

Der Verlauf ist also dem ganz ähnlich, wie ihn Kaposi für seinen Herpes zoster gangraenosus hystericus schildert. In 10–20 jährigem Verlauf treten mit Zwischenräumen von Wochen und Monaten immer frische und cyklisch verlaufende Zosteranbrüche, bald halb-, bald doppelseitig und zugleich über vielen Nervengebieten einer oder beider Körperhälften auf. Die Bläschen haben oft kaum Mohr- bis Hirsekorngröße, die Basis der einzelnen Bläschen oder ganzer Gruppen von ihnen wird nekrotisch, und es kommt im weiteren Verlauf zu koloidähnlicher Vernerfung.

In zweiter Reihe kommen neben den trophischen Symptomen die sensiblen in Betracht, auf die ich hier auch noch einmal im Zusammenhang hinweisen will. Dem Auftreten der Nekrose geht oft ein umschriebenes Brennen voraus, mit ihr zugleich sind häufig neuralgiforme, diffuse Schmerzen beobachtet worden, meist nicht im Gebiet bestimmter Nerven, ebensowenig wie die Gangrän sich auf solche zu beschränken pflegt. Josephs Kranker klagte über abnormes Kältegefühl in dem betroffenen Arm. Wichtiger noch sind die objektiven Ausfallerscheinungen. Die nekrotischen Stellen sind anästhetisch, das ist ja natürlich, aber die Anästhesie geht auch über das nekrotische Gebiet hinaus (Leloir), und sie kann einen großen Teil der befallenen Extremität in Anspruch nehmen (Bayet). Die Narben sind meist überempfindlich, werden später erst normal empfindlich. Aber in Leloirs Fall bestand an ihnen dauernd eine deutliche Anästhesie.

Von wesentlicher Bedeutung ist, daß eine bestimmte Anordnung der Sensibilitätsstörungen nirgends zu erkennen ist. Sie hatten weder eine peripher-neuritische oder radikuläre, noch eine spinal-segmentäre Verteilung. In Bayets erstem Fall schienen sie hysterischen Charakters zu sein, dagegen handelte es sich in Leloirs Fall um eine deutlich fleckweise, nur auf die Narben beschränkte, ähnlich wie bei der Lepa gestaltete Anästhesie. In Josephs Fall ließen die Kälteparästhesien an die gleichen, häufiger bei der Syringomyelie gefundenen Erscheinungen denken.

Die lokalen Störungen der Blutzirkulation und die anderweitigen

vasomotorischen Symptome lokaler Art, soweit sie die Entstehung der Nekrosen begleiten oder ihr vorausgehen, sind häufig beobachtet und von mir oben bereits genügend berücksichtigt worden. Daneben kommen aber nicht allzu selten Störungen allgemeinerer Art im Gebiete des Vasomotorensystems vor, die eine eingehende Berücksichtigung erfordern. Wiederholt ist die Rede von einer besonders starken Dermographie (Truffi, Röhler). Die Kranke von Röhler bot außerdem noch andere bemerkenswerte Erscheinungen auf dem Gebiete der Vasomotilität. Es fanden sich bei anscheinend sehr sorgfältigen Temperaturmessungen große Differenzen zwischen beiden Körperhälften bis zu 1,5 Grad. Die Pulszahl war einem beständigen Schwanken unterworfen. Gelegentlich trafen bei ihr Erscheinungen des flüchtigen Ödems auf. In diesem Zusammenhang verdienen auch die auffällig intensiven Erscheinungen, die nach einer Injektion von nur $\frac{1}{2}$ Milligramm Pilocarpin bei der Patientin zu beobachten waren, Berücksichtigung. Es fand eine enorm starke Schweißsekretion statt. Auch der Speichel wurde in sehr großer Menge sezerniert, es trat dann ein fast eine Minute dauernder Schüttelfrost ein, der aber nicht von einer Temperaturerhöhung begleitet war. Eine andere Wirkung einer Pilocarpininjektion beschreibt Truffi in seinem zweiten Fall. Er erzeugte durch Injektion von Pilocarpin Hyperämien, durch die er sogar das Auftreten von Nekrosen glaubte verhindert zu haben. Nach der jetzt gebräuchlichen Nomenklatur würde der Hinweis der besonderen Empfindlichkeit gegenüber dem Pilocarpin als Zeichen der Vagotonie zu deuten sein. Versuche, die vasomotorische Reaktion der Haut auf physikalische und chemische Reize hin zu prüfen und Abweichungen vom normalen Verhalten festzustellen, sind mehrfach angestellt worden. Interessante Beobachtungen hat zuerst Hüntner in seinem Fall in dieser Beziehung gemacht. Nach jedem Nadelstiche trat da eine ziemlich bedeutende Transudation und Infiltration von seröser Flüssigkeit in das Gewebe ein, so daß sich in kurzer Zeit unter seinen Augen jeder einzelne Nadelstich zu einer linsengroßen typischen Quaddel umwandelte, welche im Laufe einer Stunde zurückging. Demgegenüber verdient hervorgehoben zu werden, daß der Gangranbildung selbst in diesem Fall aber nicht Urticaria, sondern Bläschenbildung voranging.

Über Versuche, die erhöhte Empfindlichkeit der Haut gegenüber mechanischen und chemischen Reizen experimentell festzustellen, ist von verschiedenen Seiten berichtet worden (Dinkler, Kreibich). Davon werden wir alsbald noch sprechen.

Von klinischer Bedeutung erscheint mir Dentreleponts Angabe, daß bei seiner Kranken Störungen vorgelegen haben, die sehr an die Asphyxie locale erinnern. Im späteren Verlauf der Beobachtung fand Dentrelepont folgendes: „Am 7. November wurde eine neue Stelle der Körperoberfläche befallen, nämlich die Nägel: der linke

Daumennagel zögte an diesem Tage eine starke blauschwarze Verfärbung, eine leichte ähnliche Verfärbung die drei letzten Finger der rechten Hand. Diese Erscheinung beachte lange Zeit bis zum vollständigen Verschwinden und rezidierte später noch mehrmals.“ Die geschilderten Symptome sind als lokale Asphyxie aufzufassen. Wir sehen damit ein Symptom in die Symptomatologie unserer Krankheit eintreten, das wir zu den Raynaudischen Symptomen zu zählen gewohnt sind. Das ist für uns von besonderer Wichtigkeit insofern, als wir dadurch den Hinweis auf Beziehungen erhalten, die zwischen der Raynaudischen Krankheit und gewissen, unter dem Namen akute multiple Hautangrän beschriebenen Fällen abwalten können. Eine weitere Durchsicht der Literatur ergibt uns in dieser Hinsicht noch andere Anhaltspunkte, die später vergertet werden sollen.

Allgemeinsymptome fehlen oft völlig. Wiederholt wird das Fehlen von Fieber hervorgehoben; einige Male wurde jedoch eine Temperatursteigerung beobachtet (Hintner). Temperaturanstiege konnte Rötiker wiederholt konstatieren, ebenso bisweilen Brandweiner, der auch eine Anschwellung der regionären Lymphdrüsen sah. Kopp beobachtete Uebelbefinden, Appetitlosigkeit, Erbrechen jedesmal bei erneutem Auftreten der Affektion. Auch Sinkler berichtet von Erbrechen und Schlaflosigkeit.

Die Kranke Dontrelepont starb, wie erwähnt, an Tuberculpulmen. Es wurde eine Untersuchung des Nervensystems von Ribbert vorgenommen. Weder im Gehirn, noch im Rückenmark, noch in ausgeschnittenen peripheren Nerven ergab sich bei makroskopischer und mikroskopischer Untersuchung ein pathologischer Befund. Die Spinalganglien, auf deren Beschaffenheit man bei ihren Beziehungen zum Herpes zoster neugierig sein dürfte, wurden nicht untersucht.

Also fehlt auch hier wieder ein erklärender anatomischer Befund, wie bei allen bisher von uns besprochenen Krankheitsformen.

Die bakteriologische Untersuchung, die Dontrelepont zu wiederholten Malen in seinem Fall vorgenommen hat, hatte ebenfalls niemals ein positives Resultat. Auch Veillon u. A. fanden in den frischen Bläschen der Kranken bei zahlreichen Untersuchungen nie Bakterien, später waren nur die bekannten Eitererreger nachzuweisen.

Prognose.

Die Prognose des Leidens ist quoad vitam günstig. Von den beschriebenen Kranken ist bei einem (Dontrelepont) der Tod an Tuberculosis pulmonum eingetreten, also an einer Komplikation, bei einer zweiten Kranken, die Valahra beschrieben hat, erfolgte plötzlicher Exitus, dessen Ursache nicht aufgeklärt werden konnte,

vielleicht handelte es sich da, wie schon erwähnt, um ein Suicid. Sonst war, wie bei den geringen oder ganz fehlenden Störungen des Allgemeinbefindens zu erwarten stand, die Affektion ungefährlich. Dagegen kann die Dauer der Affektion eine sehr lange sein, und wir haben kein Mittel an der Hand, das immer wieder erneute Auftreten gangränöser Plaques zu verhüten. In dieser Beziehung ist die Voraussage zum mindesten zweifelhaft. Die Möglichkeit, daß durch sekundäre Infektion der Wunden gefährliche Komplikationen entstehen könnten, ist ja wohl vorhanden, scheint aber bisher nicht realisiert zu sein. Tonnellier betont die psychische Depression, die durch das immer wieder erneute Auftreten gangränöser Herde leicht hervorgebracht und dauernd unterhalten werden kann.

Pathogenese.

Die erste Frage, die wir uns stellen, ist die: haben wir es bei der neurotischen multiplen Hautgangrän mit einem einheitlichen Krankheitsbild zu tun?

Ich habe schon erwähnt, daß eine Anzahl Forscher, besonders Gilles de la Tourette und sein Schüler Tonnellier, ferner auch Bayet und Kaposi insofern eine Einheitlichkeit herzustellen versucht haben, als sie alle berichteten Fälle auf dem Boden der Hysterie entstehen ließen. Tonnellier sagt: „La gangrène cutanée commune — d. h. die multiple neurotische Hautgangrän — est une affection toute spéciale et dépendant exclusivement de la névrose.“ Ich habe schon bemerkt, daß dieser Standpunkt mir nicht richtig zu sein scheint. Erstmals fehlte bei einzelnen Kranken absolut jedes nervöse Symptom — Joseph hebt ausdrücklich hervor, daß sein Patient ein sonst nervengesunder, kräftiger Mensch war, die Kranken von Neumann, Bronson waren ebenfalls nicht nervös, die von Zieler war jedenfalls nicht ausgesprochen hysterisch, sondern boten nur Zeichen einer gewissen nervösen Übererregbarkeit, denen das Prädikat hysterisch nicht zukommt. — andererseits ist es auch keineswegs zulässig, jedes bei einem Hysterischen gefundene Symptom ohne weiteres auch als hysterisch zu bezeichnen. Es muß aus Art und Verlauf des Einzelsymptoms dessen hysterische Natur deutlich oder wenigstens doch wahrscheinlich werden.

Gilles de la Tourette führt als Beweis, daß es sich in den genannten Fällen um hysterische Gangrän handelt, die Tatsache an, daß erstmals stets der Allgemeinzustand — trotz zahlreicher Nekrosen — ein guter bleibt, daß ferner Fieber stets fehlt, und daß schließlich alle diese Fälle untereinander eine sehr große Ähnlichkeit haben. Was den letzten Punkt angeht, so sind bei aller Ähnlichkeit doch auch nicht zu übersehende Differenzen vorhanden. Es wurde ja oben ausführlich erörtert, daß die Gangrän direkt ohne das Vorstadium eines Bläschen

entstehen kann, daß sie meist aus einer Bläschenbildung heraus sich entwickelt, daß sie schließlich auch das Endstadium einer Quaddelbildung sein kann. Ob alle diese anscheinend vorhandenen Differenzen bei genauerer Beobachtung schließlich sich doch noch auflösen lassen, ob insbesondere stets eine anämische Quaddel im Sinne Kreibichs die erste Manifestation bildet, ist noch recht ungewiß, ich möchte für einzelne Fälle (Leloir, Joseph, Bronson, Valobra) doch eher an eine primäre Nekrose denken und werde das noch begründen. In keinem Fall aber ist die Einheitlichkeit des äußeren Habitus der Nekrosen als zuverlässiger Grund für eine einheitliche Ätiologie zu verwenden.

Daß der Allgemeinzustand gut ist und Fieber fehlt (übrigens auch nicht immer, wie Beobachtungen von Hintner, Röthler, Brandwainer lehren) spricht wohl dafür, daß kein allgemeines Leiden, wodurch die Nekrosen bedingt sein könnten, vorliegt, und daß bakterielle Infektion nicht vorhanden ist, es spricht also höchstens dafür, daß die hier in Frage stehende Gangrän trophoneurotischen Ursprungs ist; es ist aber doch noch zulässig, sie damit auch schon als hysterischen Ursprungs zu stigmatisieren.

Die ganze Frage der hysterischen Gangrän, von der die multiple hysterische Gangrän nur eine Unterart wäre, ist äußerst schwierig. Ich kann hier auf sie in ganzem Umfang nicht eingehen. Das Bestehen einer hysterischen Gangrän ist bekanntlich lange bezweifelt worden, und wird auch jetzt von manchen Seiten noch nicht anerkannt; ja, die neuere von Babinski inaugurierte Hysterie-Lehre verwirft mit allen übrigen trophischen und vasomotorischen Symptomen — auch das hysterische Ödem wird nicht anerkannt — jede Annahme einer hysterischen Gangrän; jeder Fall einer hysterischen Gangrän wurde als artifiziell entstanden gedeutet; der in sehr vielen Fällen geführte Nachweis des tatsächlichen Artefakts konnte naturgemäß nur dazu dienen, dieser Auffassung eine feste Stütze zu verleihen. Man wird ja von vornherein um so eher geneigt sein, die Möglichkeit der hysterischen Gangrän zu leugnen, je größer die Schwierigkeiten sind, die sich dem Verständnis der Entstehung einer Gangrän auf diesem Boden entgegenstellen. Auch die Tatsache, daß die Unterscheidung zwischen artifizieller und einer eventuellen neurotischen Gangrän auf die größten Schwierigkeiten stößt, daß die Fähigkeit dieser Kranken, ihre Umgebung hinters Licht zu führen, außerordentlich groß ist, gibt uns, wie ich glaube, doch noch nicht das Recht, ohne weiteres alle Fälle „hysterischer“ Gangrän als Artefakte aufzufassen. Ich stehe da auf demselben Standpunkt wie in der Frage des hysterischen Fiebers, dessen Existenz meines Erachtens nicht ohne weiteres abzuleugnen ist.

Daß dem Verständnis einer Pathogenese der hysterischen Gangrän sich sehr große Schwierigkeiten entgegenstellen, ist zugegeben.

Gilles de la Tourette stellt sie als den äußersten Grad der

„Diathèse vasomotrice“ hin — „au premier degré du processus c'est la dermatographie, au deuxième l'œdème, puis la lésion vésiculeuse, bulleuse ou pustuleuse, à un degré ultime se montre la gangrène (L. c. II, S. 423).“

Ähnliche Gedankengänge leiht Renaut, auf den sich Gilles de la Tourette beruft. Nachdem er in übrigen auch nicht einwandfreier Weise die Quaddelbildung bei der Urticaria geschildert hat, und insbesondere auf die nacheinander folgenden Stadien des oedème congestif und oedème anémique hingewiesen hat, fährt er fort: „Si dans ces cas d'urticaire vulgaire les lésions cutanées n'étaient pas comme on l'observe effectivement ou tout à fait ou relativement éphémères, l'œdème anémique aurait une autre conséquence, que le lecteur a déjà prévue: la gangrène superficielle, arrondie, siégeant dans la portion de la peau voisine du corps muqueux, laquelle ne peut subsister qu'au prix d'une irrigation soutenue comme l'indique l'énorme développement de ses réseaux capillaires en bouquets“. Die Entstehung der hysterischen Gangrän auf diesem Wege ist höchst zweifelhaft. Sie könnte höchstens für die Fälle in Frage kommen, in denen auch klinisch schwere vasomotorische Erscheinungen, außerdem Quaddelbildung usw. vorgegangen sind, ist aber auch für diese nach meiner Ansicht durchaus nicht sichergestellt; in der Mehrzahl der Fälle fehlen aber alle klinischen Erscheinungen von Quaddelbildung. Wenn wir die später zu erörternden Auffassungen von Kreislich und wohl auch von Truffi über die Entstehung der neurotischen Gangrän überhaupt akzeptieren wollten, so wäre freilich der klinische Nachweis der Quaddelbildung insofern nicht nötig, als nach dieser Anschauung jede derartige Gangrän auch auf dem Boden eines wenn auch geringfügigen und passageren anämischen Oedems entwickelt. Diese Hypothese soll unten noch weiter diskutiert werden.

Ein zweiter Weg wäre die Gangrän aus einer lokalen Asphyxie oder Synkope hervorgehen zu lassen; ebenso wie bei der Raynandschen Krankheit scheint mir aber auch hier diese Annahme unbewiesen und die Möglichkeit einer direkten neurotrophischen Gangrän eher anscheinbar. Hinsichtlich der Einzelheiten dieser Erwägungen verweise ich auf das diesbezüglich im Kapitel Raynandsche Krankheit schon Gesagte; hier kam es mir nur darauf an, festzustellen, daß wir kein einwandfreies Material haben, die bei Hysterischen beobachtete Gangrän als den natürlichen Endpunkt von anderen, häufigeren und sicher hysterischen Prozessen anzusehen. Dagegen liegt die Möglichkeit immerhin vor, solche Erscheinungen auf dem Boden der Hysterie einigermaßen unserem Verständnis näher zu bringen. Als eins der wesentlichsten Charakteristika der Hysterie gilt uns ja allgemein, daß Vorstellungen und Affekte bei ihr einen weit größeren Einfluß auf gewisse körperliche, insbesondere allerdings vasomotorische Phänomene haben als in

der Norm; daß ein solcher Zusammenhang auch unter normalen Verhältnissen besteht, ist tausendfältig sichergestellt. Wie bei einer Hysterika einfach durch Affekte und Vorstellungen Erbrechen, Lähmungen, Anästhesien, Veränderungen der Pulsfrequenz, des Blutgehaltes der Haut, der Turgescenz der Haut, der Absonderung aller Arten von Drüsen in gegenüber der Norm meist verstärktem Maße hervorgerufen werden können, so können wir uns auch vorstellen, daß auf diesem Wege auch eine Ernährungsstörung der Gewebe entstehen kann, vorausgesetzt, daß wir einen direkten Einfluß des Nervensystems auf die Gewebsernährung überhaupt zulassen. Jedenfalls muß aber dann diese Störung in den Ablauf der Neurose hineinpassen, eine gewisse Abhängigkeit von ihrem Verlauf zeigen, sich mit ihr bessern und mit ihr verschlechtern, wenn auch die direkte Abhängigkeit von bestimmten Affekten oder Vorstellungen nicht immer nachweisbar zu sein braucht.

Es ist ja klar, daß es oft sehr schwer ist, dieser Forderung gerecht zu werden; können wir das aber nicht — und es ist in der Mehrzahl der uns hier beschäftigenden Fälle nicht einmal versucht worden — so müssen wir uns eben bescheiden und über die Natur dieser Gangränform ein *Non liquet* aussprechen. Sehr zugunsten einer hysterischen Genese spricht es natürlich, wenn wir die Nekrosen im engen Zusammenhang mit anderen hysterischen Symptomen sehen, wie z. B. in einer Beobachtung von Hallopeau et Costenson, wo sie sich im engen Anschluß an ein hysterisches Ödem entwickelten. Der sicherste Beweis für die hysterische Natur der Gangrän wäre dann erbracht, wenn es gelänge, sie auf dem Wege der Suggestion zu erzeugen. Valobra spricht von einigen Fällen, in denen auf dem Wege der Suggestion die Entstehung von Gangrän erzielt wurde; er nennt die von Wende, Tanzi, Bernheim. Der Fall von Bernheim scheidet aus; Bernheim schrieb an Babinski, daß er nichts von einem solchen Fall wüßte; der Fall von Wende scheint mir, wie ich schon betont habe, nicht zweifellos, den von Tanzi konnte ich nach dem Citat von Valobra nicht finden. Cronquist und Bjerre glaubten in ihrem Fall durch Suggestion eine Heilung erzielt zu haben, was ja ebenfalls beweiskräftig für die hysterische Natur der Affektion wäre. Sie haben aber meines Erachtens durchaus keinen Beweis für ihre Behauptung erbracht. Auch Kreibich hat in einem Fall Versuche mit der suggestiven Erzeugung von nekrotischen Flecken gemacht; er glaubt einige Male das Experiment mit Erfolg ausgeführt zu haben. Aber auch sein Fall ist nicht beweisend, die Möglichkeit spontaner Entstehung ist nicht ausgeschlossen. So steht der Beweis für die Entstehung der Gangrän auf suggestivem Wege auch aus. Ich habe im vorigen Kapitel erwähnt, daß es einige Male gelungen zu sein scheint, bei entsprechend disponierten Individuen flüchtige Schwellungen durch dahinzielende Suggestion hervorzurufen. Viel häufiger als dieser

experimentelle ist der klinische Beweis der psychogenen Entstehung der Urticaria erbracht worden. Daran kann meines Erachtens nicht gezweifelt werden und was z. B. Török gegen das Vorkommen der „psychischen“ Urticaria anführt, ist durchaus ohne Beweiskraft. Diese sicher gestellten Erscheinungen psychischer Einwirkung auf die Entstehung pathologischer Vorgänge in der Haut sind geeignet, uns den Weg zum Verständnis noch weiter gehender Alterationen der Haut auf psychogener Basis zu ebnen. Aber wie gesagt, der Beweis für eine solche Entstehung von Nekrosen ist bisher nicht erbracht. Erwähnung verdient aber die von Delio berichtete Tatsache, daß bei seinem Kranken sich mehrfach Nekrosen im unmittelbaren Anschluß an Aufregungen einstellten. Er gibt folgendes Beispiel. Es fällt ein schweres Buch mit lautem Geräusch vom Tisch. Die Patientin sagt sofort, hier schmerzt es, ich bekomme einen Fleck; im demselben Augenblick entsteht ein weißer Fleck über dem rechten Augenlid, der später bläuet wird und sich nach und nach in einen bräunlichen Epidermischief umwandelt, der sich allmählich abstößt.

Für die hysterische Genese dieser Gangränform ist auch, wie wiederholt erwähnt, Kaposi und in ähnlicher Weise Doutrelepont eingetreten. Sie haben die Krankheit als *Herpes zoster gangraenosus hystericus* bezeichnet. Die Bezeichnung *Herpes* stimmt nun einmal nicht für alle Fälle, weil in einigen Bläschen nicht nachweisbar waren. Für die übrigen nehmen Kaposi und Doutrelepont selbst einen atypischen *Herpes zoster* an. Und in der Tat, atypisch genug ist dieser *Herpes zoster*, so atypisch, daß von dem, was man sonst so bezeichnet, so gut wie nichts mehr übrig bleibt. Die Eruption beschränkt sich nicht auf ein Nervegebiet, sondern betrifft repetito, ohne sich irgendwie an den Verlauf der peripheren Nerven und Wurzeln zu kehren, den ganzen Körper oder unregelmäßige Abschnitte desselben; das erste Charakteristikum des *Herpes zoster* fehlt also ganz. Die Eruptionen werden ferner im späteren Verlauf sehr oft doppelseitig. Recidive in großer Zahl bei demselben Kranken kommen regelmäßig vor. Für diese so wichtigen Abweichungen kann das Verhalten der Sensibilität nicht Ersatz bieten. Schmerzen und Parästhesien sind zwar meist vorhanden, aber auch sie sind nicht so typisch und nicht an bestimmte Nervenbahnen gebunden, wie beim echten *Zoster*. Aus allen diesen Gründen scheint mir der Name *Zoster* oder *Herpes zoster gangraenosus atypicus recidivus hystericus* nicht passend; auch Neüller und Rasch haben ihn zurückgewiesen; höchstens könnte man für die Fälle, in denen Bläschen vorkommen, die rein descriptive Bezeichnung *Herpes* (ohne das Beiwort *zoster*) gebrauchen und also von einem *Herpes gangraenosus recidivus* sprechen. Für das Beiwort *hystericus* gilt das oben Gesagte; es ist möglich, und sogar mehr oder minder wahrscheinlich, daß in einigen Fällen die Affektion auf hysteri-

sehem Boden erwachsen ist. Die Bezeichnung ist später dann übrigens von der Mehrzahl der Forscher aufgegeben worden.

Joseph, dessen Kranker sonstige Störungen des Nervensystems nicht aufwies, sagt ganz allgemein, daß das Nervensystem bei der Genese der Affektion eine große Rolle spiele. Ob man annehme, daß auf dem Wege der trophischen oder der vasomotorischen Nerven der pathologische Zustand ausgelöst wurde, bleibe vorläufig dahingestellt. Auch die Möglichkeit, daß eine Neuritis ascendens wenigstens für einen Teil der Symptome mit im Spiele wäre, zieht er in Betracht. Ähnliche Anschauungen äußert Hüntner.

Während die Mehrzahl der späteren Autoren sich nur ganz allgemein mit der Annahme begnügt haben, daß die multiple neurotische Hautgangrän durch gewisse Alterationen des Nervensystems bedingt ist, hat Kreibich versucht, diese Pathogenese im Einzelnen weiter aufzuhellen. Ich bin auf seine Forschungen schon in einem früheren Kapitel eingegangen, muß aber hier auf dieselben noch einmal zurückkommen. Er sagt: Wir halten die neurotische Hautgangrän für eine sympathische Reflexneurose, bedingt durch eine gesteigerte Erregbarkeit des dominierenden Vasodilatatorenzentrums. Der Prozeß leitet sich mit einer aktiven Hyperämie ein, die oft weit über das Gebiet sich hinaus erstreckt, das später der Sitz der schweren Störungen ist. Diese Hyperämie ist als eine vasodilatatorische anzusehen. Die Rötung kann allein bestehen oder sie kombiniert sich mit einem Ödem, welches verschiedene Grade erreichen kann. Das Ödem ist dadurch bedingt, daß durch Nerveneinfluß die Gefäßwand durchlässiger wird. Im Gebiete der dilatatorischen Hyperämie ergibt sich dann eine scharf umschriebene Quaddel, die eine auffallend gelblichweiße Farbe annimmt. Die Hautfaltung ist ganz oder wenigstens im Zentrum verstrichen, und von der umgebenden Hyperämie verbleibt zuletzt nur ein schmaler rosaroter Saum. Ist der Prozeß intensiver ausgebildet, so entsteht eine Gefäßwandschädigung: die ödematöse Stelle sinkt dann weiter ein, verschwindet aber jetzt nicht, sondern im Umkreis der Quaddel bleibt ein scharf umschriebener hyperämischer Fleck zurück, der bald cyanotisch wird. Diese Hyperämie ist nicht mehr vollständig zu verdrängen. In der Folgezeit stoßen sich Anstriche der Epidermis ab oder dieselbe läßt sich mit dem Finger wegwischen. Manchmal bildet sich eine schwache Blase, über anderen Stellen ist nach Rückbildung des Ödems die Epidermis blasig, glänzend, gummiartig, drückt auf die Unterlage, wodurch eine Atrophie vorgetäuscht wird. Bei schwereren Formen dieser Art stoßen sich dickere Lamellen ab und es verbleibt ein dunkelroter unendlicher Fleck, der aber von Epidermis überzogen ist. Diese Stellen heilen zwei bis drei Wochen und gehen dann in Pigmentation über. So wenigstens läuft der Prozeß in denjenigen Fällen ab, in denen es Kreibich gelang, auf experimentellem Wege diese Veränderungen zu

erzielen, insbesondere trat er häufig nach elektrischer Reizung auf. Er bezeichnet diese Phänomene als dilatatorische Erytheme.

Spontan häufiger und dem Pemphigus neuroticus gangraenosus im eigentlichen Sinne darstellend sind Veränderungen, welche aus den beschriebenen bei fortgesetzter Exsudation hervorgehen. Darnach nämlich die Exsudation, welche zum anämisierenden Ödem der Cutis führt, fort, so wird durch sie die Epidermis abgeworfen. Die Stelle näßt, bedeckt sich aber wegen der eigentümlichen Beschaffenheit des Exsudats nach mit einer fest haftenden Borke, unter welcher die Cutis in verschiedenem Grade anämisiert ist. Dem Grade dieser Anämie entsprechend kommt es dann zu tiefer oder oberflächlicher Nekrose. Diese Nekrose findet klinisch ihren Ausdruck in der grünen Verfärbung des Blasengrundes. Hat sich die Nekrose vollzogen, so sinkt die Blaseendecke ein und der Schorf kommt in die Mitte eines Blasenwulsts zu liegen. Das Ödem darf nicht als ein Transsudat aus gelähmten Gefäßen angesehen, sondern muß auf Dilatatorenwirkung bezogen werden. Es hat eine dickflüssige ladenziehende Beschaffenheit, die auf den hohen Eiweißgehalt und den Reichtum an Fibringeneratoren zu beziehen ist.

Wie entnehmen aus dieser Schilderung, daß Kreibich jedenfalls für die Erklärung der Genese der neurotischen Gangrän eine Kombination von vasomotorischen Störungen und solchen der Gefäßwandfunktion annimmt, daß er also im weiteren Sinne eine Störung trophischer Impulse neben vasomotorischer Störung für die Entstehung der Gangrän verantwortlich macht. Unseres Erachtens ist es ihm aber nicht gelungen nachzuweisen, daß es in diesen Fällen nicht zu einer direkten neurotrophischen Alteration der Gewebe selbst kommt, und nach unseren allgemeinen Auffassungen möchten wir daran festhalten, daß dieser Faktor für die Genese der trophischen Störung auch bei der multiplen neurotischen Hautgangrän von Wichtigkeit ist.

Von großem Interesse sind die experimentellen Versuche von Kreibich. Er konnte bei einer Reihe von Kranken durch folgende Einflüsse vasomotorische Veränderungen erzeugen, durch elektrische Reize und zwar meist durch Anwendung des faradischen Pinsels. Die Veränderungen folgten nie unmittelbar auf den Reiz, sondern zwischen beiden verlief ein gewisser Zeitraum; der kürzeste betrug ca. $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Stunde, der längste bis 16 Stunden. Durch wiederholte Versuche steigerte sich anfangs die Erregbarkeit und das Zeitintervall wurde kürzer. Später nahm die Erregbarkeit ab und das Intervall wurde größer. Ähnliche Effekte erreichte er durch warme Bäder, nach diesen traten ausgedehnte unbeschriebene Hyperämien, Ödeme, Quaddeln und entzündliche Erytheme auf, ferner durch urticariogene Reize, durch Nadelstiche, Einreiben mit Kochsalz und Urticaria urens, durch Kollaterierung von Nervenstämmen und durch psychische Vorgänge. Kreibich nahm an, daß die vasomotorischen Veränderungen

nicht durch direkte Reizung sympathischer Fasern entstanden sein können, sondern auf reflektorischem Wege in Form der Spätreflexe. Es erscheint mir zweifelhaft, ob diese Feststellungen von Kreibich späteren Forschungen stand halten werden. Vereinzelte Versuche sind auch noch von anderen Forschern angestellt worden, so von Dinkler mit positivem Erfolge, indem nach Reiben einer Stelle am Rücken im Vollbad eine Rötung der Haut, dann eine ausgesprochene Gelbfärbung und ein Einsinken unter das Niveau zu konstatieren war. Aber die Versuche von Kreibich und ihre Deutung, die von manchen Seiten, z. B. von Türök, einer durchaus ablehnenden Kritik unterzogen wurden, bedürften doch noch sehr weiterer Kontrolle.

Truffi kommt auf Grund seiner oben zitierten histologischen Befunde zu der Annahme, daß eine Vasokonstriktion eine erhebliche Rolle in der Entstehung der Nekrosen spielt. Weitere Anhaltspunkte für diese Auffassung findet er in der der Schofobildung vorausgehenden Anämie und der Trockenheit des Schorfes und in der Raschheit der Entstehung. Schließlich glaubt er auch folgende Tatsachen für diese Annahme verwerten zu können: Es gelang ihm durch Injektion von Pilocarpin einen künstlichen arteriellen Blutzufuß zu erzeugen und auf diese Weise das Auftreten von Nekrosen zu verhindern (s. o.). Zu demselben Ziele gelangte er durch Anwendung von warmem Wasser und ebenso durch Applikation von äußeren Reizen, die imstande waren einen stärkeren Blutzufuß zu den betreffenden Particen hervorzubringen. Die besondere Empfindlichkeit gegenüber Pilocarpininjektion ist auch in einem Falle von Röthler beobachtet worden. Derselbe Autor hat, wie schon erwähnt, die außerordentlich große Labilität der Hautgefäße feststellen können, eine Tatsache, die auch von anderer Seite mehrfach bestätigt werden konnte. An dem Vorhandensein einer solchen übermäßigen Labilität der Hautgefäße, d. h. also an einer besonderen Irritabilität der Hautgefäßnerven kann nach alledem nicht gezweifelt werden.

In diesem Zusammenhange sind Versuche von großem Interesse, die von Bettmann und Lewontin angestellt wurden. Sie beobachteten ein 21-jähriges hysterisches Mädchen, bei dem im Laufe der letzten zwei Jahre an verschiedenen Stellen des Körpers eine Geschwürsbildung eintrat. Es sprach von vornherein vieles für Simulation und der Verdacht einer solchen wurde noch gesteigert, als die Kranke begann Odeme am linken Arm zu zeigen, die nicht anders entstanden sein konnten als durch eine Abschnürung. Es ließ sich dann schließlich feststellen, daß die Patientin in der Tat durch Anwendung von Lysol sich die Geschwüre erzeugt hatte. Weitere Untersuchungen ergaben nun, daß bei dieser Kranken schon eine Lysolösung von einer Konzentration von 20 Proc. und weniger eine Hautnekrose herbeizuführen imstande war, die nach Aussehen und Verlauf mit den früher beobachteten völlig übereinstimmte.

Es entstand zuerst nur eine Rötze, aus der erst nach ein bis zwei Tagen sich die Nekrose entwickelte. Nach Abheilung dieser Herde blieb eine Pigmentierung zurück. Versuche, die Lewentlin an sich selbst vornahm, ebenso wie Tierversuche zeigten, daß die Reizbarkeit der Haut bei der Patientin in ganz abnormer Weise gesteigert war. Mit einer 25proc. Lösung konnte der Autor an sich selbst nur eine ganz geringe Rötung hervorbringen. Mit einer solchen von 50 Proc. eine Rötung, die bald wieder verschwand, und erst mit einer 100proc. Lysoflösung war es ihm möglich, zuerst eine Gefäßkontraktion, dann eine geringe Schwellung der Haut infolge von Ausdehnung der Kapillaren mit geringer Exsudation von Serum hervorzurufen. Diese Erscheinungen verschwanden sehr bald wieder und bedingten eine Nekrose der oberen Epithelschichten. Es bildete sich nämlich ein Schorf, der sich nach 10 Tagen ablöste. An seiner Stelle blieb für eine längere Zeit ein Pigmentfleck zurück.

Hier ist also bei einer sicher künstlichen Gangrän einer hysterischen Person der Nachweis einer größeren Labilität der Haut experimentell gelungen, ein Nachweis, der nun einerseits für die Auffassung dieser hysterischen Selbstschädigung nicht ohne Bedeutung zu sein scheint, andererseits aber auch unser Verständnis für die Entstehung spontaner Hautnekrosen in gewissem Sinne zu erleichtern imstande ist.

Auch Zieher hat ähnliche Versuche angestellt. Er untersuchte, ob die Einwirkung roher Salzsäure stets zu den multipler Hautgangrän entzephenden Nekrosen führt, oder ob dazu eine besonders leichte Erregbarkeit der Vasomotoren erforderlich ist. Versuche an ihm selbst ergaben kein Resultat; sogar energische Reizung der Haut (Abreiben mit Alkohol-Äther, Bürsten mit Seifenspiritus) bewirkte nur eine rasch vorübergehende Quaddelbildung, selbst bei 10 Minuten langer Einwirkung der rohen Salzsäure. Ganz anders verhielt sich eine 30 jährige Wärterin ohne deutliche Zeichen von Hysterie, aber mit sehr labilem Gefäßsystem der Haut. Einfaches Auftupfen auf die nicht vorbehandelte Haut übte auch hier nur vorübergehende Wirkung aus. Nach Vorbehandlung der Haut (Reiben mit Äther 3–5 Minuten lang) und Auftupfen von roher Salzsäure für 10 Minuten ging folgendes vor sich: Nach 10 Minuten entstand eine anämische Quaddel von beschränkter Dauer um ein gegen den Rand leicht vertieftes Centrum; nach 2–3 Stunden war meist nur eine anämische Fläche in unveränderter Umgebung zu bemerken. Nach 6 Stunden bestand schon deutliche Nekrose, nach 24 Stunden trat die Demarkation an dem trockenen lederartigen Schorf ein. Unter Narbenbildung heilten in 2–3 Wochen die Nekrosen ab, die wenn die Hyperämie stark genug war, bis in die Cutis reichten.

Trotz aller dieser Erfahrungen und Lehren, daß in der Tat in manchen Fällen von multipler Hautgangrän das Vasomotorensystem der Haut sich in besonders labilem Zustande findet, ist unserer Allgemeinanschau-

ungen entsprechend doch keineswegs erwiesen, daß die Gangrän nichts weiter ist als die Folge dieser Labilität des Vasomotorensystems, daß sie restlos aus reinen Vasomotorensymptomen zu erklären ist. Warum wir uns einer solchen verhältnismäßig einfachen Erklärung widersetzen, ist in den früheren Kapiteln, namentlich in den der Pathogenese der Raynaudschen Krankheit gemachten Abschnitten, wiederholt auseinandergesetzt worden. Bei der multiplen neurotischen Hautgangrän liegen die Verhältnisse in keiner Beziehung anders.

Diese Affektion hat ja überhaupt nun ihrerseits auch gewisse Beziehungen zu Raynaudscher Krankheit. Darauf haben Neumann und Leloir zuerst hingewiesen.

Doch betont Leloir für seinen Fall, daß die Raynaudsche Krankheit bei ihm sicher nicht vorliegt: „la dissémination des lésions, le fait qu'au lieu de sièger aux extrémités comme dans la gangrène symétrique elles siègent surtout au cou, à la face, et aux avant-bras, l'absence de modifications dans la coloration de la peau nous autorisent à rejeter cette hypothèse.“ Er begnügt sich mit der Konstatierung, daß es sich um „plaques gangréneuses cutanées superficielles en rapport avec une lésion du système nerveux“ handle.

Die von Leloir hervorgehobenen Unterscheidungsmerkmale von Raynaudscher Krankheit und neurotischer multipler Hautgangrän sind gewiß schwerwiegend genug. Und doch gibt es Fälle, die einen Übergang zwischen beiden Krankheiten zu vermitteln scheinen. Jedes der von Leloir als für die Raynaudsche Krankheit beweisend angesehenen Symptome kann bei dieser fehlen — die Symmetrie sowohl, wie das Voraussgehen vasomotorischer Erscheinungen und der Sitz an den Akra — und andererseits kommen in sonst typischen Fällen von Raynaud auch multiple Nekrosen an den verschiedensten Körperstellen vor (s. oben z. B. den Fall von Weiß). Es gibt also auch hier wieder Übergangstypen; hierher zählt z. B. der meist als Raynaudsche Krankheit zitierte Fall von Schulz.

26jährige Frau. Während eines Typhus erlidet Albert im vierten Monat; im Stadium decrescentis des Typhus Klagen über Schmerzen in beiden Unterschenkeln, Kriebeln und Eingeschlafenheit in den Füßen. Es entstehen dann an der Außenseite beider Unterschenkel blasse, weiß verfarbte genau symmetrische Stellen, Zehnjohannistafel groß, links findet sich eine gleiche auch an der Innenseite. Die Sensibilität ist normal. In der nächsten Zeit entstehen ähnliche Nekrosen genau symmetrisch an der Außenseite beider Unter- und Oberarme, und eine auf der linken Brustseite. In den Fingerspitzen Kriebeln. Die Sensibilität ist objektiv kaum herabgesetzt. Die nekrotischen Stellen, die die Haut bis zu verschiedener Tiefe affiziert hatten, heilten unter Narbenbildung.

Trotz des Fehlens aller vasomotorischen Vorläufer, trotz des Verschwindens der Akra, trotzdem die Krankheit sich in einem einmaligen Anfall erschöpfte, wird diese Beobachtung wie erwähnt meist der Raynaudschen Krankheit zugerechnet. Für diese Diagnose spricht

die annähernde Symmetrie der Nekrosen. Ähnliche Fälle sind mehrfach mitgeteilt worden. Dem Schnitzschen Fall gleicht eine von Smith publizierte Beobachtung in vielen Stücken. Hutchinson beschreibt unter dem Titel *Symmetrical acrosphacelus without Raynauds phenomena* einen 37-jährigen Buchbinder, der unter großer Hinfälligkeit und lebhaften Schmerzen mit einer Gangrän der Enden aller Finger und Zehen, der Ränder der Ohren, der Nasenpitze erkrankte. Symptome von Circulationsstörung außer einer etwas dunkleren Färbung der erkrankten Teile gingen nicht voraus. Der Kranke wurde nach Abstoßung der nekrotischen Teile völlig wieder hergestellt. Hier entspricht die Lokalisation der Symptome durchaus der bei der Raynaudschen Krankheit. Aber durch das Fehlen der vasomotorischen Symptome und den akuten Ablauf in einem Anfall unterscheidet sich der Fall doch wieder erheblich von den Raynaudschen Fällen.

Eine Beobachtung Sinklers weist noch mehr als die bisher erwähnte die Züge der multiplen neurastischen Hautangrän auf. Ich habe sie deshalb auch diesem Symptomenkomplex zugerechnet.

Unlängeres Mädchen. Im September 1890 Verbrennung auf der Beugfläche des linken Unterarms. Die etwa einen Dollar große Stelle heilte vollkommen ab, entzündete sich aber nach einem Monat, wurde schmerzhaft, der ganze Unterarm schwell an. Sechs Wochen darauf erschien eine papulo-vesiculöse Eruption auf der Außenfläche des Unterarms nahe der verbrannten Stelle; nach ein bis zwei Wochen entstanden kleine Geschwüre, die sich mit einer Kruste bedeckten und allmählich neblig verteilten. Durch drei Jahre hindurch bildeten sich am linken Unterarm immer neue Flecke, bis dann plötzlich am rechten Zeigefinger ein Geschwür auftrat; diesem folgten neue an allen Fingern und über der ganzen Innen- und Rückenfliche der Hand. Das erste Glied des Zeigefingers, später auch das des Mittelfingers fiel ab. Die Sensibilität war überall außer an den Sitzpunkten des zweiten und dritten Fingers normal. Zuletzt änderte sich die Art der Entzündung der Nekrosen; es bildete sich ein kleiner entzündeter Fleck, der in zwei bis drei Tagen nekrosierte.

Hier erinnert die Abstoßung ganzer Phalangen wieder an das bei der Raynaudschen Krankheit oft gesahene Bild.

Der folgende Fall, der von Brouson als ein Fall von symmetrischer Gangrän veröffentlicht wurde, gehört ebenfalls hierher.

Die damals 15-jährige Pat. wurde zuerst im Winter 1890 untersucht. Sie gab an, daß ihr Leiden drei Jahre zuvor mit Schmerzen an gewissen Stellen der Beine begonnen habe. Die Schmerzen waren brennend, stechend, nahmen nachts an Intensität zu. Gleichzeitig stellte sich an den betreffenden Stellen eine rote Schwellung ein und ein Kitzelgefühl, während niemals Anfälle von Synkope beobachtet wurden. Die Rote wurde allmählich immer intensiver und schließlich entfiel sich die Epidermis ab, ohne daß irgendwelche Blasenbildung eintrat. Es kam zu einer langsamen Heilung. Die Dauer des Anfalls betrug sechs Wochen. Es erkrankten immer symmetrisch gelegene Teile. Solche Anfälle kamen in den nächsten Jahren ein- bis zweimal im Jahr und zwar zunächst immer nur im Sommer, danach im Winter. Allmählich wurden die Anfälle häufiger und dauerten länger. Im Dezember 1898 wurde ein Anfall beobachtet und zwar entstanden hier an der Vorderfläche beider Unterschenkel an der Vereinigung des mittleren und äußeren Drittels wiederum rote, allmählich

zunehmende Stellen, die schließlich zu einer Abkantung der Epidermis und in einen oberflächlichen Geschwür führten, das langsam heilte. Danach war eine Pause von 18 Monaten. Im April 1902 kam ein neuer Anfall. Es wurde in der Gegend beider Kniekel die Innen- und Außenseite der Beine befallen. Nach einem Versuch, die entstandenen Geschwüre durch Röntgenstrahlen zu behandeln, trat eine erhebliche Verschlimmerung ein. An beiden Schenkelbeinen bildeten sich umfangreiche Geschwüre und tief rot-cyanotische Stellen. Im weiteren Verlauf bestand ein erheblicher Wechsel der Erscheinungen, indem die Färbung bald intensiver, bald schwächer war. Am 12. Oktober setzte ein gangränöser Prozeß ein, der mit enormem Schmerz verließ und am Schenkel mit Gangränisierung eines zwei Zell langen, vier Zell breiten Stranges führte. Auch an den Kniekeln kam es zu einer Gangrän, die nur weniger ausgebreitet war. Der Schoß war hart, trocken und völlig schwarz. Zeitweilig hatte sich ein papulöses Erythem, das an den Beinen begann und über den ganzen Körper zog, eingestellt. Es bestand aus schabenen Papeln und ging mit einem störenden Jucken einher, dabei war die Temperatur erhöht. Die Gangrän ging schließlich bis auf die Knochen. Nach längerer Zeit wurden die Schorfe entfernt und dann ging die Heilung glatt von statten. Der Autor macht auf die Ähnlichkeit der Gangrän mit der bei Röntgenbestrahlung eintretenden aufmerksam, was auch von anderer Stelle schon mehrfach betont wurde. Ein neuer Rückfall trat im Juli 1903 auf.

In diesem Fall erinnert die exakte Symmetrie der Nekrosen, die allerdings auch sonst wiederholt beobachtet wurde, erinnert ferner das Vorgehen ausgesprochener vasomotorischer Störungen, die lange Zeit anhielten, an die Raynaudsche Krankheit, während ausdrücklich bemerkt wurde, daß niemals Synkopeanfälle vorhanden waren, und ferner auch das vollkommene Freibleiben der Akra ein vom Raynaudschen Typus durchaus abweichendes Verhalten darstellt. Irgendwelche Zeichen einer Gefäßerkrankung waren nicht vorhanden. In mancher Beziehung bietet der Fall auch gewisse Beziehungen zur Erythromelalgie, namentlich das anfangs stets beobachtete Auftreten im Sommer, die starke und intensive Rüte, die außerordentlich intensiven, langanhaltenden Schmerzen von brennendem Charakter, das Pulsieren der Gefäße stimmt zu dem Bilde der Erythromelalgie. Es wird ausdrücklich betont, daß Herabhängenlassen der Glieder keine Steigerung der Beschwerden hervorbrachte. Für Hysterie fand sich kein Anhaltspunkt. Auch die Frage des Artefakts wurde vom Autor erörtert und diese Annahme wurde mit Recht deswegen zurückgewiesen, weil die oberflächlichen Partien der Haut immer erst sekundär befallen waren, der Prozeß also in der Tiefe begann. Gegen Artefakt führte er ferner die exakte Symmetrie und das Fehlen einer winkligen Begrenzung der gangränisierten Stellen an. Ich halte mich für berechtigt, den Fall im Ganzen der multiplen neurotischen Hautgangrän zuzurechnen, und glaube, daß die Beziehungen, die er zur Raynaudschen Krankheit und zur Erythromelalgie bietet, von besonderem Interesse sind.

Sehr viel näher steht der Raynaudschen Krankheit ein von Didier mitgeteilter Fall; hier weicht besonders neben der etwas atypischen

Lokalisation der Verlauf vom Typus der Raynaudschen Krankheit ab. Zengerle hat unter dem Titel „Über asymmetrische Gangrän“ („Raynaudsche Krankheit“) einen Fall beschrieben, in dem symmetrisch neben den Endgliedern der Finger zahlreiche andere Stellen wie die Gegend über der Spina anterior sup. usw. von Nekrosen befallen wurden; hier fehlte wieder jedes vasomotorische Vorstadium, die Nekrosen entstanden als kleine grau-grünliche Schorfe, oder gingen aus kleinen Pusteln hervor, sie heilten mit pigmentierten Narben. Die Kranke war sehr kachektisch. Die Diagnose des Falles ist schwierig; von Raynaudscher Krankheit würde ich jedenfalls nicht sprechen, es handelt sich um multiple Nekrosen, deren neurotische Natur mir trotz der Symmetrie nicht sicher gestellt zu sein scheint.

Schließlich möchte ich in diesem Zusammenhang noch eine von Renshaw unter dem Titel multiple insular necrosis of skin and subjacent tissues publizierte Beobachtung erwähnen.

Ein 4jähriges gut genährtes Kind klagte im Mai 1891 über Kälte in den Extremitäten. Die Hände waren etwas geschwollen und blaßfleckig; später wurden die Finger beider Hände schmerzhaft. Am Zeigefinger der rechten Hand trat eine Nekrose ein, die Spitze des Fingers stieß sich ab, und es bildete sich ein neuer Nagel. Dann trocknete die Spitze des linken zweiten und fünften Fingers ein; in der Mitte des rechten Arms bildete sich ein sich später abstoßender Schorf. Das Kind, das erhebliche Schmerzen litt, wurde allmählich remitt., ruhlos, verlor den Appetit. Die Anfälle dauerten von Mai 1890 bis März 1892. Im März 1893 traten von neuem Nekrosen auf. Kinn und Finger wurden livide, dann tief dunkelrot; auch sonst zeigten sich am Körper zahlreiche Zeichen gestörter Vasomotilität: es kam am Kinn an Schwellbildung, zwei symmetrische Schorfe traten an jeder Seite der Halswirbelsäule auf; in dem Falle kam es nur zu schwerer Asphyxie, nicht zur Nekrose; nur an einer Stelle des Falldekrets trat eine ganz oberflächliche Gangränveränderung ein. Dagegen traten später noch Nekrosen an den Lippen, am rechten Ellenbogen, an den Fingern auf. Das Kind erhob sich dann und blieb bis zum Ende der Beobachtungszeit gesund. Die Nekrosen hatten sich nicht auf die Haut beschränkt, sondern auch die Unterhaut und die Knochen betroffen. Die Affektion blieb Scherbo bis auf eine kurze Zeit im März 1895, wo aber eine rheumatische Komplikation für das Fieber verantwortlich zu machen war. Ein Grund für die Nekrosebildung war im Allgemeinzustand des Kindes ebenso wenig wie in dem des Gefäße auffindbar.

Die hier mitgeteilten Beobachtungen stellen eine kontinuierliche Kette dar, in deren einem Ende die auch der Raynaudschen Krankheit sehr nähernden Beobachtungen von Didier und Hutchinson stehen; stärkere Abweichungen von der Raynaudschen Krankheit, mehr Beziehungen zu der multiplen neurotischen Hautgangrän zeigen die Fälle von Renshaw, Smith, Schulz, Bronson, nur noch geringe Abweichungen vom Typus der letztgenannten Krankheit der von Sinkler, während die Zengerlesche Beobachtung überhaupt nicht sicher in dies Gebiet hineingehört.

Die Mehrzahl der genannten Fälle, ausgenommen sind davon die von Sinkler, Renshaw und Bronson, unterscheiden sich durch ein ihnen gemeinsames Kennzeichen von den typischen Fällen der

Raynaudschen Krankheit sowohl wie der akuten neurotischen Hautgangrän; sie verlaufen in einem einzigen Schub. Diese Fälle tragen im ganzen mehr den Charakter einer akuten Krankheit. Eine bestimmte Stellung werden wir ihnen zur Zeit noch nicht zuweisen können. Ätiologisch haben sie möglicherweise eine gemeinsame Ursache, indem sie als Infektions- resp. Intoxikationskrankheiten aufzufassen sind. Als solche ständen sie dann der Purpura rheumatica, die in Ausnahmefällen auch mit Nekrotisierung verlaufen kann, nahe und würden auch zu gewissen Formen der Urticaria und des akuten hochtigen Ödems (siehe das vorige Kapitel) in Beziehung zu setzen sein. Hutchinson hat neben anderen Erklärungsversuchen für seinen erwähnten Fall auch eine Giftwirkung, durch die die peripheren Arterien temporär verschlossen werden, in Erwägung gezogen, und Monto hat dem zugestimmt. Daß diese „vasomotorische“ Theorie der Nekrosebildung hier ausreichen soll, möchte ich so wenig wie sonst glauben. Jedenfalls möchte auch ich noch für eine Giftwirkung als Ursache aussprechen.

Auf die chronisch intermittierenden Fälle (Beobachtungen von Sinkler, Bronson, Renshaw) ist diese Erklärung kaum anwendbar. Alle diese Beobachtungen aber zeigen, wie zusammenfassend nochmals bemerkt sein mag, symptomatologisch nahe Beziehungen zur Raynaudschen Krankheit. Daß Raynaudsche Symptome in typischen Fällen multipler neurotischer Hautgangrän vorkommen können, beweist schließlich auch die von mir schon mitgeteilte Beobachtung von Asphyxie locale im Fall Dautreponts.

Sehr bemerkenswert ist das Vorkommen von multipler neurotischer Hautgangrän im Zusammenhang mit organischen Erkrankungen des Nervensystems.

Hier ist es wieder die Gliosis spinalis, auf deren Boden diese trophischen Störungen am ehesten sich einzustellen vermögen. Als erstes Beispiel dient uns nochmals der Pospelowscher Fall, der eine wahre Musterkarte aller möglichen vasomotorisch-trophischen Störungen darstellt. In diesem Falle, in dem Raynaudsche Symptome, solche von Erythromelgie und von Sklerodermie auftraten, fand sich im späteren Verlauf ein Herpes zoster gangraenosus in der Mittellinie des rechten Oberschenkels. Neuburger hat einen Fall beschrieben, in dem bei einem 36-jährigen, hochgradig hysterischen Mädchen im Anschluß an eine Verletzung des rechten Mittelfingers kleine nekrotische Herde entstanden, und zwar erst an diesem Finger, dann an anderen Teilen der rechten oberen Extremität, an Brust und Rücken, endlich auch an der linken oberen Extremität. Die Effluveszenzen schossen gewöhnlich nachts auf, unter heftigen brennenden Schmerzen, in der Form kleiner oder größerer Bläschen; diese färbten sich allmählich dunkel, sanken

unter das Niveau der umgebenden Haut ein und trockneten allmählich zu Schorfen ein. Diese stießen sich ab, die zurückbleibenden Geschwüre heilten unter Kelsidbildung. Es bestanden außerdem ausgeprägte Sensibilitätsstörungen und die klinische Diagnose lautete Hysterie; aber die Sektion ergab in dieser, sonst der Beschreibung nach den anderen Fällen sehr gleichenden Beobachtung Syringomyelie (Asmus), auf die Neißer die trophischen Störungen zurückführen möchte. Lesné hat einen Fall von multipler Nekrosenbildung vorgestellt, bei dem kompetente Beobachter, die ihn sahen (Jacquet, Jeanselme), auf Grund der vorhandenen Skoliose, der Sensibilitätsstörungen und der spastischen Erscheinungen an den Beinen die Diagnose Gliosis stellten. In dem folgenden leider nur kurz mitgeteilten Fall von Müller muß man meines Erachtens auch an eine organische Affektion, insbesondere an Gliosis denken. Es handelt sich um eine Frau, die vor 3 Jahren sich am rechten Unterschenkel eine Verbrennung mit heißem Wasser zugezogen hatte. Seit dieser Zeit traten an etwa 40 Stellen Einmark- bis Fünfmarkstück große Nekrosen, ausschließlich auf der Streckseite des rechten Beines bis zur Leistenbeuge auf; es bestand gesteigerter Patellarreflex, Fußklonus, Schwäche im rechten Bein, angedeutete Peroneuslähmung, Störung der Sensibilität. Jedenfalls wird in jedem Fall von multipler neurotischer Hautgangrän, und insbesondere wenn sich die Nekrosenbildung lange Zeit in artlich beschränkten Grenzen hält, auf Symptome zu fahnden sein, die für die Gliosis spinalis bezeichnend sind, also auf die oculopapillären Symptome, auf Sensibilitätsstörungen, auf degenerative Muskeltrophie und auf spastische Erscheinungen an den Beinen. In dem Fall von Röthler fand sich an der rechten Hand eine Syndaktylie zwischen Daumen und Zeigefinger und Fehlen der Endphalangen dieser beiden Finger; außerdem ist der rechte Arm um 3 cm verkürzt und die rechte Unterarmmuskulatur weniger gut ausgebildet; das sind Dinge, die an die Möglichkeit von leichten organischen Veränderungen in der spinalen grauen Substanz, ähnlich wie bei Gliosis spinalis, denken lassen.

In einem Fall von Kreibich, bei dem die multiplen Nekrosen am linken Vorderarm saßen, in den sich die Kranke vor drei Monaten einen rostigen Nagel eingestoßen hatte, bestanden die Symptome einer Tabes (Pupillenreflexstörungen, Fehlen der Patellar- und Achillessehnenphänomene). Über tabische Symptome am Arm wird nichts berichtet.

Die multiple Gangrän scheint ferner noch bei peripheren Neuritiden bzw. Nervenverletzungen vorzukommen. Auf die Frage der „neurotischen Gangrän“ bin ich bereits an anderer Stelle meines Buches näher eingegangen. Hier sei nur konstatiert, daß in einigen wenigen Fällen ein Zusammenhang zwischen multipler Gangrän und peripherer Neuritis durch die Begrenzung der Gangrän auf die sensibel-motorisch

affizierten Teile bestimmter peripherer Nervengebiete gegeben zu sein sehen. So hat Neuhberger einen Fall von Medianusklusion beschrieben, in dem die Nekrosen nur im Gebiet dieses Nerven saßen. Weir-Mitchell hat in seinem bekannten Buch über die Folgen der Verletzungen der peripheren Nerven (p. 167) ebenfalls einige Beispiele dafür gegeben, daß bei peripheren Verletzungen neben anderen trophischen Störungen der Haut kleine, aus multiplen Bläschen entstandene Ulcerationen der Haut auftreten.

Hierher dürfen wir auch die Fälle des klassischen Herpes zoster rechnen, in denen einige wenige oder seltener die Mehrzahl der Bläschen im weiteren Verlauf durch Verschörfung der Bläschendecke zu Ulcerationen werden (Kaposi, Hebra). Die Erkennung dieser multiplen Nekrosenbildung als eines Symptoms der peripheren Neuritis resp. des Herpes zoster stützt sich auf die bekannten klinischen Erscheinungen dieser Affektionen.

Immerhin können sich hier gewisse Schwierigkeiten ergeben, wenn die gewöhnlichen Symptome der peripheren Nervenerkrankung stark in den Hintergrund treten. So ist z. B. in folgendem Fall Quinquauds die Pathogenese und Diagnose unsicher.

22-jähriger Mann. Erleidet am 22. März 1892 bei einer Dampfkesselexplosion eine Verletzung der rechten Hand. Die Wunde eintret und erst nach vier Monaten tritt Heilung ein; während dieser Zeit nur unbedeutende Schmerzen im Handgelenk. Die Schmerzen nehmen dann zu, sind brennend und nach 14 Tagen erscheinen die ersten Geschwüre an der Palmarseite des Handgelenks, denen bald andere folgen. Es entsteht ein roter Fleck, mit einem Bläschen in der Mitte; die Untersuchung ergibt: Haut an griffe, beim Versuch die Finger zu extendieren, starke Schmerzen, dabei bis acht runde, ungleich große Ulcerationen stellenförmig am Dorsum des dritten rechten Fingers und der Hand bis zum oberen Drittel des Unterarms angeordnet; gelbbraun, zum Teil mit Schorfen versehen; auch keine der Geschwüre ist vernarbt. Es besteht Anästhesie für alle Empfindungsqualitäten im Gebiet des N. ulnaris und medianus, außer am Daumen; das Radialgebiet ist im wesentlichen frei. Die Ulcerationen sitzen nur in den anästhetischen Teilen. Hand im ganzen kalt und etwas cyanotisch.

Quinquaud faßt den Fall so auf: C'est un terrain préparé par les lésions nerveuses à l'envahissement microbien et les troubles de vascularisation expliquent suffisamment les eschares qui se produisent dans ces régions, où la circulation est difficile et altérée du moins dans la région dermique et hypodermique — und er denkt in erster Reihe an eine Neuritis ascendens als Ursache. Für eine solche waren in der Tat die Verhältnisse hier sehr günstig. Immerhin ist diese Affektion doch recht selten, und zudem erfahren wir auch über die motorischen Innervationsstörungen, insbesondere über die Verhältnisse der elektrischen Erregbarkeit nicht genug, um mit Sicherheit eine Neuritis annehmen zu dürfen. Erst eine weitere Beobachtung, vor allem darüber, ob die Ulcerationen die Tendenz zur Weiterausbreitung über größere Körperabschnitte haben, würde uns den Fall sicher deuten lassen.

Diagnostische Schwierigkeiten können sich auch sonst noch ergeben, so z. B. wenn, wie Staub in einem Fall von *Herpes zoster gangraenosus* sah, die Eruption sich nicht ganz auf bestimmte Nervenbahnen beschränkt und dabei zufälligerweise auch noch eine Hysterika betrifft. Immerhin spricht sich auch in diesem Fall die Krankheit mit ganz wenigen Ausnahmen in einem Hautbezirk ab, der genau der Ausbreitung des VIII. bis XII. Dorsalnerven entsprach, sowie im Gebiet einiger Hautnerven, die dem ersten und zweiten Paar des Plexus lumbalis entstammen. Die Affektion war zudem meist einseitig, und nur einige Male wurde die Mittellinie unbedeutend überschritten. Auch sonst zeigte der Fall das bei *Herpes zoster* gewöhnliche Bild in bezug auf Bläschenbildung, Fieber und sensible Symptome, so daß schließlich doch kein Zweifel besteht, daß ein ausgebreiteter *Herpes zoster gangraenosus* bei einer Hysterica vorlag. Für die Pathogenese der neurotischen Gangrän sind diese Fälle ja gewiß sehr wichtig und interessant, in klinischer Beziehung wird es aber sehr erwünscht sein, wenn wir diese symptomatischen Formen der multiplen neurotischen Gangrän soweit als möglich von den idiopathischen Formen abtrennen und sie auch schon bei der Nomenklatur als Teile derjenigen Krankheit erkennen lassen, zu der sie gehören.

Die vorstehenden Überlegungen und Erörterungen leiten notwendig zu dem Resultat, daß die multiple neurotische Gangrän keine Krankheit sui generis ist, sondern ein unter verschiedenen Bedingungen sich findender Symptomenkomplex.

In der Mehrzahl der von uns hier zur Besprechung gestellten Fälle haben wir Veranlassung, auf Veränderungen des Nervensystems als Ursache der geschilderten Nekrosenbildung zurückzukommen. Immerhin gibt es, wie wir noch in dem der Diagnose gewidmeten Abschnitt sehen werden, eine Form der multiplen Gangränesezierung, die bei hier behandelten klinisch sehr nahe steht und mit Wahrscheinlichkeit auf eine Erkrankung des Gefäßsystems zu beziehen ist (multiple arteriosklerotische Hautgangrän). Und auch für einen Teil der schon besprochenen Beobachtungen ist die neurogene Genese der Nekrose nicht über allen Zweifel erhaben (akute multiple intoxicatorische Gangrän).

Auch die Formen der Gangrän, die wir mit Wahrscheinlichkeit als neurogene bezeichnen können, sind nicht einheitlicher Natur.

Die multiple neurotische Gangrän findet sich als seltenes Symptom einiger organischer Nervenkrankheiten. (Bei der Gliosis spinalis, vielleicht bei der Tabes, bei der peripheren Neuritis, beim *Herpes zoster*).

In anderen Fällen treten neben ihren Symptomen solche einer schweren Urticaria deutlich in den Vorder-

grund, so daß wir wohl von einer *Urticaria gangraenosa* sprechen dürfen.

Es gibt Fälle, in denen sie wie eine selbständige Infektion oder Intoxikation von der Art der gewöhnlichen Urticaria oder der von uns oben näher charakterisierten toxisch-infektösen Form des angioneurotischen Ödems auftritt. Gerade diese sind es, in denen die neurogene Natur der Gangrän wieder etwas zweifelhaft wird, und die nahe Beziehungen zur multiplen kathektischen Gangrän haben. (Siehe den Abschnitt Diagnose.)

Die übrigen hier besprochenen Fälle multipler Hautgangrän tragen die Bezeichnung neurotisch insofern ganz mit Recht, als sie offenbar auf dem Boden einer allgemeinen neuropathischen Diathese erwachen. In sehr vielen Fällen zeigt das Grundleiden deutlich die Züge der Hysterie, ja sehr oft handelt es sich da um ausgesprochene und schwere Fälle von konvulsiver Hysterie. In anderen weniger zahlreichen Fällen liegt keine ausgesprochene Hysterie vor; die Kranken sind hereditär nervös belastet, reizbar, ungleichmäßig, instät „nervös“. Symptomatische Differenzen lassen sich zwischen diesen beiden Gruppen nicht nachweisen. Die außerordentlich große Seltenheit des Vorkommens von Gangrän bei Hysterie ebenso wie der Mangel eines Nachweises dafür, daß selbst in den Fällen, wo Hysterie vorliegt, die multiple Gangrän ein hysterisches Symptom ist, läßt es geraten erscheinen, keine engen Beziehungen zwischen der Neurose und dem nekrotisierenden Prozeß anzunehmen, die beiden Gruppen nicht zu trennen und in dem Vorhandensein der neuropathischen Diathese nur eine sehr häufige Voraussetzung für die Entstehung der Nekrosen zu sehen. Daß wir dabei wiederum geneigt sind, eine weitere Spezialisierung vorzunehmen, und auf eine besondere Beteiligung gewisser Abschnitte des vegetativen Systems unser Augenmerk richten, liegt vorzüglich in unseren allgemeinen Anschauungen begründet. Wir haben aber doch auch einige spezielle Anhaltspunkte; dahin rechne ich die einige Male experimentell nachgewiesene, einige Male klinisch deutlich gewordene Labilität des Hautgefäßnervenapparates, und die Empfindlichkeit gegen Pilocarpin.

Außerdem muß dem fast in allen Fällen in der Vorgeschichte der Affektion erwähnten Trauma eine gewisse Bedeutung zugesprochen werden. Es ist stets derart gewesen, daß es auf periphere Nervenenden für lange Zeit einen Reiz auszuüben vermochte. Es ist daher die Annahme statthaft, daß es auf reflektorischem Wege eine erhöhte Reizbarkeit entfernterer vasomotorischer Nervengebiete produziert hat die ihrerseits eben auch schon oft durch die neuropathische Disposition vorbereitet war.

Es liegt auf der Hand, daß es nur zur Unterstützung dieser An-

schwankungen dienen kann, wenn wir auch wieder bei der multiplen neurotischen Hautgangrän Beziehungen zu den anderen vasomotorisch-trophischen Neurosen auffinden. Daß diese nicht fehlen, wurde oben erwähnt. Wir besprachen insbesondere die Übergänge zur Raynaud'schen Krankheit und Erythromelalgie (Fälle von Renshaw, Sinkler, Brousson). Wenn schließlich in einigen wenigen Fällen (Joseph, Leloir, Brandweiner) gar kein Zeichen sonstiger nervöser Erkrankung vorhanden ist, so brauchen wir aus diesen, sonst mit den obigen völlig identischen Fällen keine besondere Gruppe zu bilden; auch das entspricht durchaus dem Verhalten, das wir bei den verwandten Affektionen so vielfach konstatieren konnten, daß die (vasomotorisch)-trophischen Störungen die einzige Manifestation der Erkrankung des Nervensystems bilden können.

Über die Art des pathogenen Reizes und darüber, wo er im Nervensystem angreift, sind wir, da die einzige Sektion, die vorliegt, ein negatives Resultat hatte, auf die angedeuteten Vermutungen angewiesen, die sich in derselben Richtung zu bewegen hatten, wie bei der Raynaud'schen Krankheit. Es genügt daher, wenn ich auf die betreffenden Abschnitte dieses Kapitels verweise.

Diagnose.

Da in zahlreichen Fällen multipler Gangrän der Verdacht auf Artefakt ausgesprochen wurde, und da tatsächlich auch oft genug eine artefizielle Entstehung dieser Gangränart nachgewiesen worden ist, werden wir uns in erster Linie zu bemühen haben, Unterscheidungsmerkmale vom Artefakt ausfindig zu machen. Wir werden uns nicht begnügen dürfen, festzustellen, daß wir bei dem betreffenden Kranken einen verständlichen Grund für die Annahme einer absichtlichen Hervorbringung der Gangrän nicht auffinden können. Wir sind oft genug nicht instande, den verschlungenen Wegen des Innenlebens besonders unserer hysterischen Kranken, mit seinen zahllosen krankhaften Beziehungen, Erregungen, Wünschen und Absichten soweit nachzugehen, daß wir einen dem gesunden Empfinden verständlichen und zureichenden Grund für die Handlungen dieser psychisch abnormen Kranken auffinden können. Wie weit diese dem normalen Menschen unverständliche Sucht zur Selbstverstümmelung gehen kann, zeigt ein von Dientafoy gegebenes Beispiel. Bei einem 30-jährigen Kranken entstanden seit 2½ Jahren gangränöse Geschwüre an Armen und Beinen. Die verschiedensten Behandlungen, auch Dehnungen der Nerven blieben ohne Erfolg. Es wurde die Amputation des linken Armes dem Kranken vorgeschlagen und mit seiner Einwilligung ausgeführt. Auch danach traten fortwährend neue Geschwüre auf. Später gelang es nachzuweisen, daß sie durch kautisches Kali künstlich hervor-

genau worden waren. Wir müssen also tatsächlich stets die Möglichkeit eines Artefakts ausschließen. Am besten geschieht das durch zuverlässige Aufsicht im Krankenhaus und direkte Beobachtung des Entstehens nekrotischer Stellen. Daß auch die Anlegung eines festen Verbandes ohne klinische Beobachtung nicht mit aller Sicherheit gegen Täuschungen schützt, haben mannigfache Erfahrungen erwiesen, wenn auch immer wieder dadurch einer Simulation vorzubeugen versucht wird (Stubenrauch).

Am häufigsten wird zur artefiziellen Herstellung der Gangrän-Atznatron verwendet, wie auch Strümpell direkt in seinem Fall nachgewiesen hat. Strümpell hat bei einer Patientin auch seinerseits mittels dieses Stoffes alle die Lacerationen hervorbringen können, die auch vorher bei ihr gezeigt hatten. Übrigens waren bei seiner Kranken die Nekrosen doch wesentlich anders verlaufen, als in unseren Fällen multipler Hautgangrän: es ging der Verschorfung eine heftige Dermatitis voraus, die Nekrosen und Geschwüre waren unregelmäßig begrenzt, von wechselnder Ausdehnung in Breite und Tiefe. Auch Krecke hat das Atznatron experimentell angewendet und gezeigt, daß an den oberflächlich verätzten Stellen Rote und Bläschenbildung, an den tiefer geätzten ein grauer Schorf mit einem dunklen Punkt in der Mitte entsteht. Chlorzinklösung wendete eine von Hollstein beobachtete Kranke an, Salpetersäure eine von Riecke, Schweinfurter Grün die von Narath; Kantharidenpflaster (Rasch), Kresonol (Lafite, Shepherd), Salzsäure (Gross, Narath) sind benutzt worden. Daß auch viel harmlosere und deswegen auch stets leicht erhältliche Mittel zu gleichem Zwecke Verwendung finden können, konnte zuerst Riecke feststellen. Durch ein Geständnis einer seiner Kranken veranlaßt, sah er, daß nach oberflächlichem Rätzen der Haut und Einreißung dieser Stelle mit Salz Gangrän entstand. Hier spielt das mechanische Moment des Reibens und Ritzens der Haut eine Rolle, das auch sonst allein oder in Verbindung mit reizenden Mitteln in Frage kommt (Singer, Colecot Fox, Riecke Kratzen und Waschen mit grüner Seife und Eisigwasser). Thermische Schädigungen sah Shepherd in zwei Fällen: eine Kranke benutzte eine stark erhitzte Metallbüchse, eine andere brennende Zigaretten. So mag noch eine ganze Reihe von Prozeduren in Frage kommen, auf die der erfinderische Geist dieser Kranken verfällt. Es wurde schon früher erwähnt, daß es eine ganze Reihe von Fällen gibt, in denen als Begleitumstände die artefizielle Genese wahrscheinlich machten, ohne daß der exakte Nachweis des Kunstprodukts gelang. Das sicherste Unterscheidungsmerkmal zwischen spontaner und artefizieller Gangrän scheint das von Kaposi angegebene zu sein, daß nämlich bei einer aus Bläschen entstehenden Gangrän durch die intakte Epidermis die nekrotischen tieferen Teile der Haut hindurchschimmern. Freilich, so sicher dies Merkmal ist, so selten ist es auch, und es

darf natürlich dort überhaupt nicht erwartet werden, wo der Nekrose eine Bläschenbildung nicht vorausgeht.

Ein weiteres, sicheres Kennzeichen wäre das Auftreten von Nekrosen an Stellen, die der künstlichen Einwirkung der Kranken nicht zugänglich sind (siehe die Fälle von Doutrelepont und Hintner). Dazu gehört aber nicht das Auftreten von Nekrosen in der Vagina, die z. B. von der Patientin von Gross künstlich hervorgerufen wurden; ganz unzugänglich dürfte schließlich wohl überhaupt keine Stelle der äußeren Haut und der entsprechenden Schleimhäute für eine geschickte und erfinderische Kranke sein; z. B. könnten gewisse Partien zwischen den Schultern, dadurch daß die Patienten sich die betreffenden Reagentien in der Bettlage unter den Rücken schieben, erreichbar sein. Das Auftreten von Nekrosen nur auf der linken Seite (bei Rechtshändlern) verstärkt den Verdacht des Artefakts. Das Fehlen von Rötung in der Umgebung der Nekrose wurde ebenfalls vielfach zur Unterscheidung der spontanen von der artefiziellen Gangrän verwertet; bei ersterer tritt erst, wenn der Scharf sich abstoßen will, ein kleiner Entzündungshof auf; doch ist bei sehr vorsichtigem Aufbringen des Atznatrox auf die Haut eine stärkere Entzündung auch zu vermeiden; meist wird sie freilich, wie bei Strampelli's Kranker deutlich sein. Gross macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Schwellung und Hyperämie auch in der Umgebung artefizieller Nekrosen fehlen können. Daß Bläschen in der Umgebung der Nekrose für deren Spontanentstehung charakteristisch sein sollen, wird von Tonnellier behauptet, von Narath aber mit gutem Grunde zurückgewiesen. Für die spontane Entstehung soll nach den Ausführungen Bayet's u. a. die Tabacarte sprechen, daß im einzelnen Fall sowohl wie bei Vergleichung verschiedener Fälle die Nekrosen einander sehr ähneln. Es muß zugegeben werden, daß diese Erwägung berechtigt ist, weil man sonst annehmen müßte, daß überall mit demselben Stoff und in derselben Weise die Nekrose hervorgebracht worden sei. Die Fälle von sicher nachgewiesenem Artefakt zeigen auch für gewöhnlich nicht diese Gleichmäßigkeit und in einer Reihe von Fällen aus der Literatur, in denen der Nachweis des Artefakts nicht gelang, genügt die Polymorphie der Nekrose, die Unregelmäßigkeit der Umgrenzung (polycyclische Nekrosen), um den begründeten Verdacht des Artefakts zu erwecken. Wenig sicher für die Unterscheidung scheint mir ein von Bayet angegebenes Moment: die Verzögerung der Heilung der Nekrosen. Gerade das kann man bei hysterischen und überhaupt bei nervösen Personen oft sehen, daß einfache Wunden usw. sehr schwer heilen, weil die Kranken teils mit teils ohne Absicht immerfort an ihnen manipulieren; gerade dabei kommt es auch — durch Reizung der Granulationen — häufig zu üppigem Wachstum dieser, das überhaupt nach Billroth für Atzwunden charakteristisch sein soll, und ferner zu hypertrophischen Narben. Die Keloidé haben

dennoch auch meiner Auffassung, die ich schon oben vertreten habe, keinen großen symptomatologischen oder diagnostischen Wert, zumal sie auch durch eine entsprechende Behandlung vermieden werden können. Man hat ferner durch chemische Untersuchung der auf den gangränösen Stellen befindlichen Schorfe oder der von den Ulcerationen sezernierten Flüssigkeit zu entscheiden versucht, ob eine auf chemischem Wege künstlich erzeugte Gangrän vorliegt (Neumann, Joseph). Der Nachweis im positiven Sinne genügt natürlich für die Diagnose Artefakt. Schwieriger ist bei negativem Ausfall der Untersuchung die Beurteilung. Ludwig wenigstens, der im Neumannschen Falle die Untersuchung vorgenommen hatte, sprach sich sehr reserviert aus und protestierte gegen eine zu weit gehende Deutung seiner Angaben; ein chemisches Agens sei zwar nicht gefunden worden, könne aber immerhin doch vordem vorhanden gewesen sein.

Für Simulation spricht es natürlich, wenn das Entstehen der Nekrosen sofort aufhört, sobald Krankenhausbehandlung und damit genaue Beobachtung eintritt; sehr zweifelhaft muß es uns auch machen, wenn wir in anderer Beziehung Täuschungen von seiten der Kranken erleben müssen.

So wird unser Verdacht im Fall Stubenrauchs dadurch aufrecht erhalten, daß die Kranke offenbar früher sich Nadeln in ihren Körper hineinpraktiziert hatte, ebenso liegt die Sache in einem von Adrian mitgeteilten Falle und auch in dem von Brandweiner, erregt das Vorkommen früherer Selbstbeschädigung Verdacht, obwohl der Autor unter Uhrglasverband die Entstehung der Nekrosen und auch das Auftreten der Gangrän auf dem Blasengrunde beobachtet haben will. Auch in Tesdorpf's Fall ist der Verdacht auf Artefakt, den Jolly schon bei der Vorstellung der Kranken geäußert hatte, deshalb durchaus gerechtfertigt, weil, wie der Autor selbst feststellen konnte, die Kranke sich sowohl in wie außerhalb der Hypnose vermittelt ihrer Hände Verletzungen beibrachte. Die Annahme von Tesdorpf, daß trotzdem ein Teil der nekrotischen Hautveränderungen auch auf anderem als mechanischem Wege zustande gekommen sei, scheint mir nicht gerechtfertigt. Denn daß bei der Kranken unmittelbar nach einer Gemüts-erregung eine weißliche Verfärbung der Backe, also eine lokalisierte Ischämie auftrat, beweist nicht, daß die später an dieser Stelle vorhandene Nekretisierung nicht artifiziell gewesen ist oder wenigstens gewesen sein kann. Und ebenso genügt auch in dem Falle von Gélisvriat die Tatsache, daß das befallene Bein immer kalt war und die Zehen wie Totenzehen aussahen, nicht, um die Möglichkeit einer artifiziellen Gangrän auszuschließen. Und ich möchte immer wieder betonen, daß es für die Annahme eines hysterischen Gangrän notwendig ist, auch die Möglichkeit der artifiziellen Gangrän auszuschließen.

In zahlreichen Fällen, in denen es sich sicher um Artefakte handelte,

war ein Trauma der Gangrän vorausgegangen. Auch darin haben wir also kein brauchbares Unterscheidungsmerkmal zwischen spontaner und artefizieller Gangrän. Offenbar kommen hysterische Kranke auch einer vorausgegangenen Verwundung nicht auf die Idee der Selbstbeschädigung.

Selbst die Tatsache der Entstehung der Nekrosen unter den Augen des Beobachters ist nicht ein durchaus vollgültiger Beweis für ihre spontane Entstehung. Gross ließ Salzsäure einige Minuten einwirken; dadurch entstand zunächst ein Erythem; nach Entfernung der Säure entwickelte sich aus diesem Erythem allmählich eine weiße anämische Nekrose, „so daß man die Entwicklung einer scheinbaren Spontannekrose zu beobachten glaubt.“

Will man die Möglichkeit eines Artefakts ausschließen, so muß also die Beobachtung von vornherein eine absolut zuverlässige sein. Eine solche ist natürlich nur in der Klinik durchzuführen; es ist die Anlegung eines festen, dauernd kontrollierten Verbandes notwendig; wenn dann unter diesem Nekrosen trotzdem noch auftreten, scheint mir freilich die Möglichkeit des Artefakts ausgeschlossen, so etwa in dem Fall von Truffi, in dem der Autor schreibt: daß jede Simulation ausgeschlossen sei *par l'observation la plus minutieuse; j'ai vu les lésions se manifester sous des bandages amputés complètement et sûrement hermétiques.*

Wo eine solche Art der Kontrolle nicht durchführbar ist, wäre auf dem von Zeller beschrittenen Weg das erwünschte Ziel diagnostischer Sicherheit zu erreichen. Dieser Autor hat sich nicht mit dem klinischen Nachweis der Integrität der obersten Schichten der Epidermis begnügt, sondern hat auch die oben schon erwähnten histologischen Untersuchungen der exzidierten Nekrosen angestellt und sie mit den Ergebnissen von Salzsäure-Nekrosen verglichen. Er kam zu folgendem Resultat: „Mikroskopisch finden wir bei der akuten multiplen Hautgangrän Veränderungen, die nur auf in der Cutis ablaufende Prozesse bezogen werden können, während jede Andeutung einer von der Hautoberfläche kommenden Einwirkung fehlt. Bei der Salzsäurenekrose dagegen können die vom Papillenkörper ausgehenden Veränderungen nur als Reaktion auf den von außen einwirkenden Reiz aufgefaßt werden, dessen Einfluß auch sonst sich vorwiegend auf die äußersten Schichten der Haut erstreckt, während die tieferen jede Einwirkung vermissen lassen.“ Zu seinen Untersuchungen hatte er ein, drei und 24 Stunden nach der Ätzung exzidierte Stücke benutzt. Wie schon oben betont wurde, muß man aber mit der Möglichkeit echter trophisch-nekrotischer Nekrosen, die nur die obersten Epithelschichten betreffen, rechnen; hier würde das Kriterium, daß der Prozeß seinen Sitz in der Tiefe hat, ausfallen, es ist also nur da, wo der Nachweis im positiven Sinne geführt ist, die Möglichkeit einer artefiziellen Schädigung ausgeschlossen.

Jedenfalls ist über der dringende Wunsch auszusprechen, daß fortan überall wo die Frage: neurotische oder artifizielle Gangrän zur Diskussion steht, die histologische Untersuchung exzidiierter Stückchen ausgeführt wird.

Für die bisher in der Literatur niedergelegten Fälle ist die Entscheidung artifizielle oder spontane multiple Gangrän, wie aus dem Gesagten zur Genüge hervorgeht, oft genug recht schwer zu beantworten gewesen. Ich habe mir Mühe gegeben, die entscheidenden Kriterien aus den Beobachtungen heranzuziehen; nicht immer bin ich zu einem sicheren Resultat gekommen.

Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, daß die Anwendung von Radium und von Röntgenstrahlen instande ist, zu einer Geschwürsbildung anzuregen. Es ist schon mehrfach betont worden, daß eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Röntgendermatitis und den als neurotische Hautgangrän angesehenen Fällen vorliegt. In diesem Zusammenhang soll nur an die Möglichkeit einer artifiziellen Erzeugung der Nekrosen auf diesem Wege hingewiesen werden.

So wird die Frage: Artefakt oder nicht, keineswegs stets leicht zu beantworten sein; und nicht immer, wie z. B. in den Fällen von Sangster und Stubenrauch wird die Entscheidung eine endgültige sein können; aber wir werden unter Berücksichtigung aller Momente doch oft zu einem Resultat kommen. Dort, wo auch nur schwache Anhaltspunkte für die Annahme eines Artefakts vorliegen, habe ich geglaubt von einer weiteren Verwertung des Falles Abstand nehmen zu sollen. An dem Vorkommen einer multiplen neurotischen Hautgangrän halte ich aber fest.

Herr Dr. Glaser-Schöneberg hatte die große Freundlichkeit, mir auf seiner Abteilung des Schöneberger Krankenhauses den folgenden Fall zu zeigen und mir die Krankengeschichte wie die Photographie (Fig. 24) des Falls zur Benutzung zu überlassen.

Von zur Zeit der Untersuchung (15. II. 1909) 27-jährige Frau gibt an, aus gesunder Familie zu stammen, leidet angeblich seit dem Alter von 18 Jahren an Epilepsie und will wegen dieser Krankheit im Alter von 20 Jahren 5 Monate lang in der Chur bei behandelt worden sein; weiter will sie alle 2–3 Monate einen derartigen Anfall haben und kommt auch deswegen zur Aufnahme in das Schöneberger Krankenhaus. Hier wurden typische epileptische Anfälle mehrfach beobachtet; außerdem bestand eine rechtseitige Lähme. Der übrige Befund vonseiten der inneren Organe wie des Nervensystems war negativ. Nur bestand eine diffuse, links stärker noch als rechts ausgebildete Hypalgie. Schon bei der Aufnahme fanden sich einige Epitheldefekte, und zwar ein solcher an der Venebene prominens, der in der Abbildung (Fig. 24) nur unbedeutlich in seinen Rissen zu sehen ist, ferner zwei je rechts und links über den Spinae scapulae und einige zusammenhängende beiderseits symmetrisch über dem Kinnbein. Die einzelnen Defekte sind etwa 5 Markmal groß, gelblich, mit kleinen Epithelknäppchen bedeckt. Die Peripherie der Defekte wird von einem etwa 5 mm breiten Saume, der stärker gerötet ist, gebildet. Die Epitheldefekte, die ganz charakteristisch blieben, zeigten eine gute Tendenz zur Heilung und hinter-

leben, wie auch die Photographie (Abb. 14), eine starke Neigung zur Pigmentierung. Im Verlauf von 6–12 Stunden traten in der Folgezeit über sämtlichen Rückenrücken und in der Kreuzbogensgegend neue derartige flache Eruptionen auf. In der Krankengeschichte heißt es: „es ist ausgeschlossen, daß die Kranke die Eruptionen sich selbst zugefügt haben kann, denn sie wurde ständig sehr beobachtet.“



Fig. 14.

Rück von weniger ausgedehnter Blutgangrän.

und es wurde nie bei ihr irgendwas Verdächtigtes gefunden, woraus sich derartige Schädigungen hätte ableiten lassen.“ Die Kranke blieb sechs Monate in Behandlung. Vereinzelt traten bis zuletzt besonders in der Kreuzbogensgegend die genannten oberflächlichen Eruptionen auf, die stets unter starker Pigmentierung abheilten. Im Jahre 1911 war die Kranke wiederholt von neuem im Krankenhaus; neue Stellen kühlten sich nicht mehr; die Pigmentierung blieb unverändert bestehen.

Auch diesen Fall vermag ich nicht als vollkommen sicher anzusehen. Er erfüllt nicht alle von mir eben aufgestellten, meines Erachtens für die Diagnose notwendigen Bedingungen. Ich selbst habe ihn nur einmal gesehen, damals bestand keine frische Ulceration. Im Krankenhaus hielt man die Möglichkeit eines Artefakts für völlig ausgeschlossen. Die Tatsache, daß bei der Kranken nie irgendwelche ätzenden Stoffe gefunden werden konnten, schließt den Erfahrungen anderer Autoren zufolge, die wir anerkennen müssen, Artefakte nicht aus; ich erinnere an die Möglichkeit, durch Salzkörnchen, die energisch in die Haut eingerieben werden, derartige Dinge hervorzubringen. Gegen eine solche Täuschung schützt eben nur ständige Beobachtung unter Anlegung eines festen Verbandes. Was mir gegen Artefakt zu sprechen scheint, ist die Lokalisation der Ulcerationen gerade an Stellen, die der Kranken kaum zugänglich sind, insbesondere die Stellen über den Scapulae, ferner die außerordentlich exakte Symmetrie und schließlich die trotz rascher Heilung sich alsbald ausprägende starke Pigmentierung, die auch bei jahrelanger Beobachtung bestehen blieb.

Bemerkenswert ist die von den Untersuchern festgestellte diffuse Hypalgie; auch sonst scheinen hysterische Züge neben der Epilepsie dem Krankheitsbild nicht fremd gewesen zu sein.

Wenn ich den Fall also auch nicht für vollkommen gesichert anzusehen vermag, so glaube ich doch, bei der Seltenheit derartiger Beobachtungen ihn hier anführen zu sollen, zumal gerade seine bildliche Darstellung ungewöhnlich scharf und exakt die einzelnen Züge der multiplen neurotischen Gangrän erkennen läßt.

Über weitere diagnostische Erwägungen sei noch folgendes bemerkt:

Bei der Hysterie soll die multiple Hautgangrän verschiedene Formen annehmen können, indem außer der hier geschilderten Form noch eine zweite vorkommen soll: der Herpes zoster gangraenosus hystericus (Kaposi), zona hystérique gangrénée (Tennelier). Ich habe im Vorhergehenden auf die Unterscheidung dieser beiden Formen verzichtet zu sollen geglaubt; es ist das nach meiner Ansicht eine unzulässige Differenzierung; jedenfalls hat auch der Herpes zoster gangraenosus hystericus nur sehr wenig mit dem echten Herpes zoster zu tun.

Im allgemeinen wird in allen Fällen multipler neurotischer Gangrän die diagnostische Aufgabe hauptsächlich darin bestehen, zunächst einmal festzustellen, ob neben den Erscheinungen der multiplen Gangrän sich nicht Symptome eines Grundleidens, besonders des Nervensystems finden, als deren Teilerscheinung die Gangrän anzusehen ist. Am meisten wird unsere Aufmerksamkeit auf Erscheinungen der Gliosis, der Paresen, der Erkrankungen und besonders der Verletzung peripherer

Nerven gerichtet sein müssen. Was in dieser Beziehung der Erwähnung und Berücksichtigung wert erschien, wurde bereits erörtert. Bisweilen wird man auch Veranlassung haben, an die Lepra zu denken.

Leloirs Fall ist von einigen Autoren, die ihn gesehen haben, als eine besondere Art der Lepra aufgefaßt worden (*Lépre lazantine ou mazonne* nach Poncelet). Doch hat Leloir bei dem Fehlen aller übrigen leprösen Symptome, bei der Seltenheit des Vorkommens dieser Form der Lepra in Europa — was allerdings heute nicht mehr so unbedingt zugegeben werden darf — diese Annahme für unwahrscheinlich erklärt, zumal auch positive Unterscheidungsmerkmale, vor allem das fast regelmäßige Auftreten von Keloiden gegen Lepra sprächen; auch mir scheint nach Lähns Schilderung der nervösen Krankheitserscheinungen der Lepra der Standpunkt Leloirs der richtige zu sein.

Es gibt eine Art von multipler Gangrän, die in ihrer Entstehung nichts mit dem Nervensystem zu tun hat, sondern auf dem Boden der Kachexie erwächst. Es scheint sich dabei meist um infektiöse Ursachen zu handeln (Janovsky und Monrek), von anderen wird die Gangrän auf Thrombosenbildung zurückgeführt (Atkinson), so daß man ev. nach da wieder mehrere Gruppen unterscheiden müßte. Neben der Kachexie bietet auch sonst der Allgemeinzustand genug charakteristische Merkmale dar: so ist das Fieber, das in den Fällen neurotischer Gangrän fehlt oder gering ist, intensiver, die Gangrän ist von sehr wechselnder Ausdehnung, oft ausgedehnter als wir sie bei der neurotischen Gangrän sehen, der Verlauf ist, wenn auch nicht immer ein ganz akuter, doch meist kein über viele Monate und Jahre sich ausdehnender, die sensiblen Erscheinungen treten mehr zurück.

Hierher rechne ich auch einen interessanten Fall von Carle:

Ein 21jähriger Mann, nicht sich im September 1900 eine Läsion am vierten Finger durch Verletzung mit einem Messingring an. Ende December 1900 Schwellung der Drüsen in der rechten Achselhöhle, Kopfschmerzen, Mattigkeit, fünf Tage später an der rechten Oberlippe kleines rotes Knötchen, das gangränös wird, ähnliche Nekrosen an der linken Oberlippe und am rechten Auge. Die nekrotische von einem kleinen roten Hof umgebene Stelle dehnt sich vier bis fünf Tage lang aus; der Hof löst sich allmählich ab. Der Prozeß verläuft meist schmerzlos. Ähnliche Attacken wiederholen sich im Februar 1901 (Nekrosen an der Brust und an den Extremitäten), im Mai 1901 (Gesicht, bekannte Kopfhaut befallen), August (Thorax, Glutalgegend) und November 1901 (linker Arm). Seit Januar 1902 ist der Zustand chronisch geworden. Das Nervensystem ist normal, es besteht starke Kachexie. Der anatomische Befund zeigt die charakteristischen entzündlichen Veränderungen.

Fieber, Drüsenschwellung, Allgemeinerscheinungen, Kachexie, entzündliche Veränderungen an Tonsillen und Nebenhoden, völliges Fehlen aller Veränderungen von seiten des Nervensystems zeichnen diesen Fall, der offenbar als chronische Infektion zu deuten ist, aus.

Freilich will es mir scheinen, als ob gewisse Fälle, die meist als neurotische Hautgangrän aufgefaßt wurden, doch auch den Typus der

Infektionskrankheit an sich tragen, wie ich eben schon erwähnte. Der Unterschied ist vielleicht der, daß die Infektion hier primär zunächst das Nervensystem betrifft und erst sekundär die Gangrän entsteht. Für diese Fälle könnte sich wohl eine Schwierigkeit der Unterscheidung ergeben, die wir denn auch in Atkinsons Fall angedeutet finden.

Schwer zu klassifizieren ist auch Rothmans Fall.

64-jähriger alter Mann. Seit Dezember 1889 Empfindung von Jucken an der linken Wade. Dort bildet sich ein roter Fleck, um den neue circumscripte Flecken auftreten, die später auf der Oberfläche schwarz werden. Ähnliche Flecken entstehen auch auf der rechten Wade. Bei eingenen der gangränösen Stellen bildet sich eine Demarkations-, der nekrotische Scharf fällt ab, und es bleibt ein Geschwür übrig mit scharfen Rändern und verschiedener Tiefe. Bei anderen häutet der Scharf ein, wird allmählich ganz schwarz und fällt ab. Der Prozeß ist auch nicht an Ende. Nie Schmerzen. Das Herz und die großen Gefäße sind ganz gesund. Der Urin ist klar.

Trotz des Fehlens einer allgemeinen Arteriosklerose glaubt Rothman den Fall doch als multiple arteriosklerotische Gangrän auffassen zu sollen; Köhner berichtet in der Diskussion über diesen Fall von einem ähnlichen. Von den Fällen neurotischer Gangrän unterscheidet sich Rothmans Beobachtung dadurch, daß nichts auf die neurotische Entstehung hindeutet, weder eine allgemein neuropathische Disposition noch Sensibilitätsstörungen. Auch das Alter des Kranken ist viel höher als in den Fällen neurotischer Gangrän. Ich habe den Fall daher gesondert mitgeteilt und möchte sagen, daß ich ihn für unauflösbar gehalten muß.

Therapie.

Bezüglich der Behandlung ist nicht viel zu sagen; nach Dentreponts und Josephs Erfahrungen erweisen sich lokale Sublimatumschläge insofern als nützlich, als sie die Keloidbildung verhindern; im übrigen richtet sich die Behandlung nach den in anderen Kapiteln dieses Buches gegebenen Anhaltspunkten. Daß sie auch hier oft wenig wirksam ist, beweist der oft sehr chronische Verlauf des Leidens und die Liste von Heilmitteln, die z. B. Lefoir ohne Erfolg in seinem Fall anwendete. Es waren Arsen, Eisen, Calciumphosphat, Jodkali, Gichtchlorid, Jodoform, Acidum carbolicum. Bemerkenswert sind die Erfolge, die Rötlier mit Biercher Stauung, Traffi mit lokaler Hyperämie (Sinapiemen, Anwendung von heißem Wasser, Injektion von Pilocarpin) erzielte. Auf ihre Bedeutung für die Pathologie wurde schon hingewiesen. Jedenfalls wird man in Zukunft diesen Prozeduren, insbesondere der Stauungshyperämie und Heißluftbehandlung besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Die schlechten Erfahrungen, die Bronsen mit Röntgenbehandlung machte, seien nochmals hervorgehoben.

Schluss.

Die in diesem Buch studierten Krankheitsbilder haben eine große Anzahl gemeinschaftlicher Merkmale. Es ist die besondere Art und die besondere Lokalisation der Symptome, die ihnen einen allen eigentümlichen Charakterzug verleiht und ihre Zusammenfassung in eine Krankheitsgruppe rechtfertigt. Im Mittelpunkt des Krankheitsbildes stehen die vasomotorischen Störungen, um diese herum gruppieren sich die übrigen Symptome, die sensiblen, sekretorischen und trophischen Erscheinungen.

Eine weitere Analyse lehrt, daß die einzelnen Symptomengruppen in Unterabteilungen zerfallen. Bei den vasomotorischen Symptomen unterscheiden wir: die lokale Synkope, die lokale Asphyxie und die lokale Hyperämie. Die sensiblen treten meist in Form von Parästhesien und von Schmerzen auf. Sehr häufig sind dabei die Thermoparästhesien und Thermalgien besonders betont. Ihn gegenüber stehen die objektiven Sensibilitätsstörungen an Bedeutung zurück, namentlich tritt eine Anästhesie selten in den Vordergrund, eher noch kommen Hyperästhesien vor. Die sekretorischen Symptome äußern sich als Anhidrosis und Hyperhidrosis. Von größerem Interesse als die letzteren sind wieder die trophischen Störungen. Wir sind da zunächst der Gangrän, dem lokalen Gewebetode begegnet, außerdem trafen wir Zeichen eines abnorm starken oder abnorm geringen Wachstums bestimmter Teile, und schließlich trat uns eine besondere Art der Ernährungsstörung entgegen, die als sklerodermatische bezeichnet wurde. Alle Gewebebestandteile (Haut, Unterhaut, Muskeln, Knochen, Gelenke) können an den trophischen Störungen teilnehmen, Fast ausnahmslos fehlten primäre motorische Störungen irgendwelcher Form.

Neben der eigentümlichen Art der Symptome tritt noch ihre besondere Lokalisation auffällig hervor. Die gipfelnden Teile des Körpers sind fast stets der Hauptsitz der Krankheitserscheinungen, Finger und Zehen, Nase, Ohren, Kinn und Zungenspitze werden vorzüglich befallen. Dabei ist sehr häufig eine ausgesprochene Symmetrie der Veränderungen bemerkbar. Die Abgrenzung gegen das normale Gebiet ist oft wenig scharf, namentlich sind die Schmerzen häufig diffus verbreitet.

Die Schmerzen sind niemals im Gebiete eines peripheren Nerven oder einer hinteren Wurzel lokalisiert. Das ist eine Regel, die kaum eine Ausnahme hat. Auch für die objektiven Sensibilitätsstörungen gilt das nach meiner Erfahrung fast ausnahmslos.

Und ein drittes gemeinsames Zeichen ist der Verlauf, der im

allgemeinen als ein auf lange Zeit sich erstreckender, aber mit typischen Intermissionen einhergehender und meist nicht progredienter bezeichnet werden muß.

Wie die Symptomatologie, so bietet auch die Ätiologie manche gemeinsame Züge. Die Frauen erkranken im ganzen etwas häufiger. Thermische Schädlichkeiten sind meist von Einfluß auf Entstehung und Verlauf der Krankheit, im einzelnen differieren sie freilich sehr in ihrer Wirkung, bald wirkt Wärme, bald Kälte günstig oder ungünstig. Auch der Einfluß allgemeiner Dyskrasien, wie vorausgehender Infektionskrankheiten tritt häufig merklich hervor. Am wichtigsten ist aber, daß es in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle neuropathische Individuen sind, die von einer dieser Krankheiten befallen werden. Die Neuropathie dokumentiert sich zum Teil nur in der hereditären nervösen Belastung des Kranken, zum Teil tritt sie direkt in Erscheinung, indem mehr oder minder ausgesprochene organische oder öfter noch funktionelle Nervenkrankheiten bei den Patienten selbst beobachtet werden.

Sehr häufig finden sich besonders allgemeine Störungen von seiten des vegetativen Systems, und zwar aller seiner Unterabteilungen: der autonomen Abschnitte wie der sympathischen im engeren Sinne. Es besteht ein labiler Gleichgewichtszustand dieser Nervengebiete von einer vasomotorischen Ataxie, besser gesagt von einer vasomotorischen Labilität oder Instabilität ist oft die Rede; aber neben den sympathikotonischen Symptomen sind auch vagotonische vorhanden, ohne daß es bisher gelungen ist, in einer dieser beiden Gruppen ein für die einzelnen Krankheitsbilder entscheidendes und beweisendes, differentialdiagnostisch zu verwertendes Kriterium zu sehen. Die Forschung steht hier erst im Beginn.

Geben uns die angegebenen Kriterien schon genügend Berechtigung, von einer unbeschriebenen Gruppe von Krankheiten zu sprechen, so kommt noch etwas Weiteres hinzu, um diese Zusammenfassung zu einer Notwendigkeit zu machen: Sehr oft finden wir Misch- und Übergangsfälle, die die Grenzen zwischen den einzelnen Krankheitsbildern stark verwischen.

Darüber soll nicht vergessen werden, daß ein andermal dem Beobachter sich eine gewisse Gegensätzlichkeit der Symptomatologie, so z. B. zwischen Raynandscher Krankheit und Erythromelalgie aufdrängt.

Das symptomatologisch reichste der hier besprochenen Krankheitsbilder scheint mir die Raynandsche Krankheit zu sein. Es ist daher am besten, wenn wir für eine übersichtliche Betrachtung des ganzen Gebietes diese Affektion in den Mittelpunkt stellen. Hier finden wir oft alle drei Arten vasomotorischer Symptome: die Synkope, die Asphyxie und etwas seltener die Hyperämie. Es treten

sowohl Parästhesien, als Schmerzen, als Anästhesien auf. Die trophischen Symptome sind hauptsächlich durch die Gangrän vertreten, aber einfache dystrophische Veränderungen fehlen nicht, und neben der Gangrän sind in manchen Fällen auch sklerodermatische Erscheinungen nachweisbar; ebenso können sekretorische Störungen vor, und so können in einem Fall Raynaudscher Krankheit alle oder fast alle für unsere Krankheitsgruppe charakteristischen Symptome vertreten sein. Freilich ist dies keineswegs immer der Fall, und oft genug ist das Krankheitsbild viel weniger komplex. Die Akra sind sehr stark bevorzugt, es gibt aber auch Fälle mit allgemeinerer Verbreitung der Nekrosen und der übrigen Symptome. Meist herrscht eine ausgeprägte Symmetrie vor; für die Asymmetrien, die auch vorkommen, sind oft besondere Bedingungen maßgebend.

Tritt nun bei sonst gleicher Symptomatologie nur die sklerodermatische Veränderung der Haut und der tieferen Teile ein, so haben wir den Übergang zwischen Raynaudscher Krankheit und Sklerodaktylie vor uns. Je mehr dann in weiteren Abstufungen die sensiblen und vasomotorischen Symptome an Wichtigkeit verlieren, um so scharfer bildet sich das Krankheitsbild der Sklerodaktylie aus. Gesellen sich zu den Veränderungen an den gipfelnden Teilen solche an anderen Körperstellen, so haben wir eine Sklerodermie mit Sklerodaktylie, und von hier aus gibt es alle möglichen Übergangstypen zur diffusen oder circumscripten Sklerodermie ohne sensible und mit geringen und flüchtigen vasomotorischen Symptomen. Und auch in bezug auf den Ablauf der Krankheit gelangen wir damit von dem chronisch intermittierenden zum chronisch progredienten Typus.

Überwiegt im Bilde der Raynaudschen Krankheit unter den vasomotorischen Symptomen einmal stark die Hyperämie, so nähern wir uns damit der Erythromelalgie, mit der die Ähnlichkeit noch beträchtlich größer wird, wenn die Gangrän nur vorübergehend auftritt oder auch ganz ausbleibt, und nur Vermehrung des subkutanen Bindegewebes und ähnliche trophische Erscheinungen in stärkerem Maße vorhanden sind. Diese trophischen Störungen sind im Gegensatz zu der ursprünglichen Annahme bei der Erythromelalgie häufig genug vorhanden, und auch an dem Auftreten von Nekrosen im Laufe dieses Leidens kann kein Zweifel sein, so daß an die Stelle der Gegensätzlichkeit der beiden Symptomenbilder schließlich große Ähnlichkeiten treten, die eine strenge Differenzierung im einzelnen Falle unmöglich machen.

In vielen Fällen, die man der Raynaudschen Krankheit zuschreiben muß, fehlen trophische Störungen oder es fehlt wenigstens die Gangrän, und andere sind nur angedeutet. Von hier aus ergeben sich die Übergänge zu den vasomotorischen Neurosen, wenn auch die

Asphyxie schwächer sich ausprägt und nur mehr Parästhesien und Synkope deutlich sind.

Und treten andererseits die vasomotorischen Symptome stark in den Hintergrund, und sind auch die sensiblen Symptome weniger betont, so haben wir wieder ein neues Zwischenglied vor uns, das uns zu der multiplen neurotischen Gangrän führt, wo dann sensible und vasomotorische Symptome fast ganz verschwunden sind. Noch abweichender wird diese Krankheitsform, wenn auch eine Bevorzugung der Akra nicht mehr erkennbar wird und die ganze Krankheit sich in einem Anfall erschöpft.

Der intermittierende Verlauf der Raynandschen Krankheit vermischt sich oft in späteren Stadien. Die freien Zwischenräume verkürzen sich und verschwinden allmählich; selten tritt diese Neigung schon sehr früh hervor; wo es der Fall ist, haben wir Anklänge an die Beobachtungen, in denen von vornherein Anfälle vermischt werden und die ganze Krankheit sich zu einer allmählich progressiven lokalen Asphyxie mit dystrophischen Störungen reduziert. Ich habe diese Fälle unter der Bezeichnung *Akroasphyxia chronica* abgesondert; meist fehlen hier auch sensible Reizsymptome, aber selbst bei sonst typischen Fällen Raynandscher Krankheit sehen wir oft eine Abnahme und selbst ein gänzliches Verschwinden der Schmerzen dort eintreten, wo die Kurve der Anfälle allmählich abflacht.

Die geschilderten Übergangsformen sind nicht etwa theoretisch konstruiert; ich habe vielmehr auf den vorhergehenden Seiten überall Beispiele solcher Zwischenglieder teils eigener, teils fremder Beobachtung geben können.

Nicht ganz so deutlich sind die Beziehungen, die das umschriebene flüchtige Ödem zu den anderen Krankheiten unserer Gruppe hat; auch späten flüchtige Ödeme in der Symptomatologie dieser Affektionen keine so große Rolle, wenn sie auch oft genug vorkommen. Wir haben aber eine ganze Reihe von Beispielen kennen gelernt, die uns den Beweis geliefert haben, daß auch das flüchtige Ödem nicht isoliert dasteht. Die Verbindung wird hier weniger durch die Ähnlichkeit der lokalen Symptome gefördert, als durch die Erscheinungen, die auf allgemeinere Störungen des vegetativen Apparates, auf eine pathologische Reizbarkeit und Empfindlichkeit des gesamten vegetativen Systems hinweisen. Die paroxysmale Hämoglobinurie, tachykardische Anfälle, Polyurie und Polydipsie, Neigung zu weit verbreiteten Erythemen, andere vagotonische und sympathikotonische Symptome bilden hier die Verbindungsglieder. Die dem flüchtigen Ödem nahe verwandte Urticaria kommt bei typischer Raynandscher Krankheit vor, und selbst eine Gangränbildung ist andererseits beim flüchtigen Ödem nichts Unerhörtes.

| Krankheit | Lokali- sation | Symptome | | | |
|--|---|-------------------|-----------|------------------|---------------------|
| | | Parästhe- sien | Schmerzen | Anästhe- sien | Hyper- ästhesien |
| Akro- parästhesien | nur an den Akro, sym- metrisch | Parästhe- sien | Schmerzen | Anästhe- sien | |
| Vasomotorische Neurose Noth- nagels | nur an den Akro, sym- metrisch | Parästhe- sien | Schmerzen | Anästhe- sien | |
| Erythro- malgie | meist an den Akro, oft asym- metrisch | Parästhe- sien | Schmerzen | | Hyper- ästhesien |
| Zwischenform zwischen Ery- thromalgie und Raynaudscher Krankheit | meist an den Akro, sym- metrisch | Parästhe- sien | Schmerzen | | Hyper- ästhesien |
| Raynaudsche Krankheit | meist an den Akro, sym- metrisch | Parästhe- sien | Schmerzen | Anästhe- sien | |
| Sklerodaktylie | vornehm- lich an den Akro, sym- metrisch | Parästhe- sien | Schmerzen | | |
| Sklerodermie | am ganzen Körper, sym- metrisch oder asym- metrisch | | | | |
| Aerospasmus chronicus | meist an den Akro, sym- metrisch | Parästhe- sien | Schmerzen | Anästhe- sien | |
| Multiple neu- rotische Gangrän | am ganzen Körper, be- wusst mit Betroffung der Akro, selten sym- metrisch | Parästhe- sien | | | |

Ich glaube, daß die vorstehende Tabelle die engen Beziehungen zwischen den einzelnen Krankheitsbildern, die uns hauptsächlich beschäftigen, deutlich vor Augen führt. Ich habe in ihr natürlich nur die wichtigsten Symptome berücksichtigt und deshalb z. B. die sekretorischen Symptome weggelassen. Es ist auch nicht möglich, in einer solchen tabellarischen Übersicht alle wirklich in der Natur beobachteten

| matologie | | | Trophische Symptome | | | Verlauf |
|---------------------|----------|-----------|--|--------------|--------------------|--|
| Vasomotor. Symptome | | | Allgeme. dystroph. Prozesse u. d. Haut | | | |
| Synkope | Asphyxie | Hyperämie | Gangrän | Sklerodermie | | |
| Synkope | | | | | | chronisch intermittierend |
| | | Hyperämie | | | Dystroph. Prozesse | chronisch intermittierend |
| | Asphyxie | Hyperämie | Gangrän | | Dystroph. Prozesse | anfängs stets intermittierend, später oft chronisch mit Exacerbationen |
| Synkope | Asphyxie | Hyperämie | Gangrän | | Dystroph. Prozesse | anfängs stets intermittierend, später oft chronisch mit Exacerbationen |
| Synkope | Asphyxie | Hyperämie | Gangrän | Sklerodermie | | meist chronisch, mit öftentlichen Exacerbationen |
| | Asphyxie | Hyperämie | | Sklerodermie | | oft rein chronisch-progressiv |
| | Asphyxie | | | | Dystroph. Prozesse | chronisch, öftl. Exacerbationen |
| Synkope | | Hyperämie | Gangrän | | | intermittierend oder in einem Anfall ablaufend |

Schattierungen anzunehmen, nur die wichtigsten unter ihnen sind aufgeführt. Das flüchtige Ödem habe ich aus der Übersicht, weil es etwas mehr isoliert steht, ausgeschlossen. Die Hauptsymptome der einzelnen Krankheiten sind dick gedruckt, um sie von den weniger wichtigen und häufigen zu unterscheiden. Auch diese Trennung kann naturgemäß nur eine etwas willkürliche sein.

Die Schwierigkeiten, die sich aus den zahlreichen Zwischenformen für eine Klassifizierung und damit auch für eine Beschreibung unserer Krankheiten ergeben, liegen auf der Hand und haben uns oft genug beschäftigt. Der Ausweg, alle diese Krankheitsbilder zu einem einzigen zusammenzufassen, ist völlig ungangbar. Dazu stehen die Endglieder der Reihe einander in jeder Hinsicht viel zu fern. Es bleibt nichts übrig, als im vollen Bewußtsein der Unzulänglichkeit unserer Einteilung und Benennung die Namengebung nach den hauptsächlichsten Symptomen zu gestalten. Es läßt sich nicht vermeiden, daß dabei nahe verwandte Symptomenkomplexe gelegentlich auseinandergerissen werden.

Wenn überall die vasomotorischen Symptome im Vordergrund standen, so mußte die Pathogenese dieser Störungen das Problem sein, das sich in erster Linie aufdrängt. Daß die größte Rolle Reiz- nicht Lähmungssymptome spielen, war ohne weiteres zu erkennen; die Synkope wie die Asphyxie locale, aber auch die lokale Hyperämie, wiesen auf irritative Momente, auf Reize teils im Vasoconstrictoren-, teils im Vasodilatatorensystem. Trotz einer gewissen Gegensätzlichkeit, die dabei zwischen einzelnen Gliedern der Gruppe abzuwachen schien, ließ sich alsbald erkennen, daß da keine tiefen und wesentlichen Differenzen vorliegen konnten; denn Zwischenglieder vorhanden in kontinuierlicher Reihe auch diese scheinbar entgegengesetzten Pole.

Der enge Zusammenhang der trophischen mit den vasomotorischen Symptomen, der zweiten die Krankheitsgruppe auszeichnenden pathologischen Erscheinungsweise war überall deutlich. Eine rein sekundäre Bedeutung konnte ich diesen Symptomen aber nicht beimessen und mir nicht der Annahme anschließen, daß die trophischen Symptome die direkte Folge der vasomotorischen seien. Ich kam vielmehr zu dem Schluß, in einer Störung der Reflexe, die von der sensiblen Bahn auf die vasomotorische übergehen, die Ursache der trophischen Störungen zu sehen. In der Mehrzahl der Krankheitsbilder kam die Beteiligung sensibler nervöser Gebiete deutlich genug zum Ausdruck, auch hier durchaus überwiegend in der Form von Reizerscheinungen, Parästhesien, Hyperästhesien, Schmerzen, auch hier durch gemeinsame Merkmale weiter dahin ausgezeichnet, daß Verteilung und Art des Schmerzes und der Parästhesien überall identische Züge aufwiesen, die ihre Erklärung am besten in der Annahme fanden, daß besonders vasosensible Anteile betroffen wurden. Auch die Analyse der sensiblen Symptome führt uns somit wieder auf das Vasomotorensystem.

Das System, das ja nur einen Teil eines größeren Ganzen darstellt, war nun aber offenbar nicht isoliert erkrankt. Eine Reihe „allgemeinerer“ Symptome ließ erkennen, daß die Annahme einer solchen Beschränkung

anzulässig sei. Wir fanden zunächst freilich vielfach nur Zeichen einer allgemeinen Instabilität des Vasomotorensystems, die im einzelnen schon vielfach erwähnt wurden; aber auch Zeichen einer Störung der Innervation der Schweißsekretion, der Eingeweide, mannigfacher Drüsen, der glatten Muskulatur der Haut traten in die Erscheinung. Eine weitere Differenzierung dieser Symptome in vagotonische und sympathikotonische mit Hilfe neuerer Forschungsmethoden wurde angebahnt. Die bisherigen Untersuchungen ergaben das Vorkommen beider Reihen von Krankheitszeichen bei denselben Krankheitsbildern.

Die Beziehungen der allgemeinen zu den lokalen Symptomen sind keineswegs überall geklärt. Vielfach scheinen die ersteren nur die Zeichen der Diathese, der Krankheitsbereitschaft zu sein — sind der Ausdruck einer hereditär überlieferten oder später erworbenen Disposition; die krankhafte Anlage ist der Boden, auf dem die spezielle Krankheit sich, begünstigt durch anderweitige Momente, als da sind körperliche und namentlich psychische Traumen, Infektionen, Intoxikationen, Kachexien, entwickeln kann.

Ein anderes ist aber noch möglich. Die allgemeineren Symptome können der direkte Ausdruck einer ihnen und den lokalen Symptomen gemeinsamen Krankheitsursache sein, somit also direkt zur Symptomatologie des betreffenden Leidens gehören.

Unsere Erkenntnis ist nicht vorgeschritten genug, um hier immer jede notwendige Aufklärung zu schaffen.

Die Bevorzugung der Akra durch die Krankheitssymptome ist dadurch zu erklären, daß offenbar gerade auf die Gefäße dieser Gegenden Reiz- und Lähmungszustände im Vasomotorenapparat am stärksten zu wirken pflegen und auch sonst diese Teile vielfach unter ungünstigen Circulationsbedingungen stehen. Daß aber auch an anderen Stellen des Körpers ganz gleiche Erscheinungen sich geltend machen können, liegt auf der Hand und ist durch die Erfahrungen, über die wir berichtet haben, genügend belegt.

Wir sehen nach allem den Sitz der Raynaud'schen Krankheit und der verwandten Krankheitsformen im Vasomotorenapparat, beziehungsweise im ganzen vegetativen System. Vieles spricht dafür, die centralen Abschnitte dieses Apparates in Anspruch zu nehmen, namentlich die weite Verbreitung der Symptome in den komplizierteren Fällen, der oft enge Zusammenhang zwischen psychischem Geschehen und krankhaften Erscheinungen. Es ist aber schwer zu sagen, ob dieser zentrale Sitz auch für die einfacheren Symptomenbilder unbedingt Geltung hat.

Über die Ursache und Art des krankmachenden Reizes ist nur wenig Positives zu sagen. Wir könnten überall feststellen, daß organische Veränderungen bisher nicht nachgewiesen wurden. Für die Mehrzahl der Krankheitsbilder ist es nach deren Art auch recht unwahrscheinlich, daß organische Läsionen vorliegen könnten. Schon die fast stets zu beobachtende, in den Zwischenzeiten erfolgende Rückkehr zur Norm läßt für die Mehrzahl der Erkrankungen eine dauernde organische Grundlage ausschließen, die immerhin aber für einzelne Fälle (*Akromesophyxia chronica*, *Sclerodermie*, *Trophödem*) wohl in Frage kommen könnte.

Bei den engen Beziehungen, die überall zwischen vegetativem System und den Organen der inneren Sekretion bestehen, lag es nahe, für die Entstehung der vasomotorisch-trophischen Symptomengruppen an Störungen im Ablauf der Funktion der Drüsen mit innerer Sekretion zu denken. Das eine solche Annahme stützende tatsächliche Material ist meines Erachtens zurzeit noch recht ungenügend. Man hat auf die Verbindungen der vasomotorisch-trophischen Neurosen, insbesondere der Raynaud'schen Krankheit und der Sclerodermie mit dem Morbus Basedowii und Addisonii hingewiesen, auch auf Ähnlichkeiten oder Gegensätzlichkeiten gegenüber anderen Erkrankungen etwa der Akromegalie, aufmerksam gemacht. Ich habe im speziellen Teil betont, wie spärliche Ausnahmefälle das sind, und wie selbst in diesen Fällen jede Sicherheit dafür fehlt, daß die vermutete Alteration der inneren Sekretion wirklich die Ursache der vorhandenen vasomotorisch-trophischen Symptome ist, daß vielmehr in jedem derartigen Falle auch andere Möglichkeiten vorliegen: die Störungen der inneren Sekretion können ebenso wie die vasomotorisch-trophischen Symptome ihre gemeinsame Ursache in einer Alteration des vegetativen Systems haben, oder sie können sekundär durch die auf dem Boden der vasomotorisch-trophischen Affektion sich entwickelnde Läsion der Drüsen bedingt sein, wie z. B. eine sklerotische Veränderung der Thyreoiden mit ihren Folgeerscheinungen im Verlauf der Sclerodermie sehr wohl denkbar ist.

Es muß also der künftigen Forschung vorbehalten bleiben, die Ursache dieser Erkrankungen festzustellen, wo ihren Angriffspunkt im vegetativen System nehmen.

Wenn wir so als Neurosen bezeichnen, so tun wir das im vollen Bewußtsein der Unzulässigkeit dieses Ausdruckes. Handelt es sich doch bei ihnen ganz gewiß nicht um funktionelle Veränderungen im eigentlichen Sinne, sondern um solche, deren Nachweis mit unseren anatomischen und chemischen Untersuchungsmethoden nicht möglich ist.

So intim die allgemeinen pathologischen Beziehungen im Gebiet der ganzen Krankheitsgruppen sich gestalten, so ist damit weder die völlige Einheitlichkeit der Pathogenese noch die absolute Identität

des Sitzes der Erkrankungen garantiert, und es muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß es späterhin gelingt, Abgrenzungen dort vorzunehmen, wo sich zurzeit noch keine Handhabe dafür bietet. Darauf habe ich im speziellen Teil mehrfach hinzuweisen Gelegenheit gehabt: ich erinnere an die Erythromelalgie mit peripherem Sitz und an die akuten infektiösen oder toxischen Fälle des flüchtigen Ödems.

Unsere Annahme, daß diese Krankheitsbilder sich häufig auf dem Boden erblicher oder erworbener Unterwertigkeit gewisser Abschnitte des Nervensystems entwickeln, läßt es ohne Schwierigkeiten verstehen, daß enge Beziehungen zwischen ihnen und den allgemeinen Neurosen, der Hysterie und Neurasthenie bestehen, beziehungsweise daß die vasomotorisch-trophischen Symptome oft genug nur einen Ausschnitt aus dem gesamten Krankheitsbilde darstellen, das dauernd oder zeitweilig neben ihnen noch die übrigen Erscheinungen dieser Neurosen auf sensiblen, motorischem und psychischem Gebiete aufweisen kann. Das sind die Grenzgebiete, wo es oft individuellem, mehr oder weniger willkürlichem Ermessen überlassen bleibt, ob man von einem rein symptomatischen Auftreten der vasomotorisch-trophischen Symptombilder sprechen will, oder ob man ihnen den Wert eines eigenen Syndroms zubilligt.

Schließlich kommen alle die genannten Symptome einzeln oder zu Gruppen vereinigt auch bei einer großen Reihe von organischen Nerven- und auch Gefäßkrankheiten vor, wo sie, wenn man sie rein als Zustandsbilder auffaßt, sich oft den selbstständigeren Krankheitsbildern durchaus ähnlich darstellen. In diesen Fällen läßt die genaue Untersuchung und namentlich die Beobachtung des Verlaufes den Unterschied zwischen symptomatischem und idiopathischem Auftreten meist erkennen; nur ausnahmsweise dürfte dauernd ein Zweifel bestehen können. Wir müssen hier wie sonst darauf achten, über dem ähnlichen Zustandsbild den Unterschied zwischen symptomatischem und idiopathischem Auftreten der Krankheitserscheinungen nicht zu übersehen.

Unter den organischen Nervenkrankheiten ist besonders die Gliosis spinalis instande, Symptomenverbindungen zu produzieren, die unseren Krankheitsbildern sehr ähnlich oder ganz gleichen.

Das symptomatische Vorkommen vasomotorisch-sensibel-trophischer Syndrome bei allen möglichen Nervenkrankheiten wird uns nicht wundernehmen, wenn wir bedenken, daß für die Entstehung von Krankheitszeichen von seiten des Nervensystems ebensoviel der Ort, an dem der pathologische Reiz wirkt, wie dessen Art in Frage kommen; und so kann die Gliawucherung im Rückenmark, wenn sie nur die gleiche Lokalisation hat, wenigstens zeitweilig ganz denselben Symptomenkomplex produzieren, wie ein Reiz, der z. B. nur in chemi-

sehen, durch unsere Mittel bisher nicht nachweisbaren Veränderungen an derselben Stelle seine Wirksamkeit entfaltet.

So sehr ich also auch anerkenne, daß es vasomotorisch-trophische Symptome bei zahlreichen anderen Erkrankungen (Neurosen, organischen Gefäß- und Nervenkrankheiten) gibt, so halte ich unbedingt daran fest, daß auch eine Krankheitsgruppe vorhanden ist, deren Einzelglieder eigene Krankheitsformen darstellen.

Die Akroparakthesien, die vasomotorische Neurose Nothnagels, die Erythromelalgie, die Raynaudsche Krankheit, die Akroasphyxia chronica, die Sklerodermie und Hemiatrophia faciei, das anschiebende flüchtige Ödem, das Trophödem und die multiple neurotische Gangrän sind in vielen Fällen als selbständige Krankheitsbilder anzusehen.

Literaturverzeichnis.

I. Kapitel.

1. Die vasomotorischen Bahnen und Centren.

- Andersen, *Journal of physiolog.* XXVIII, p. 510, 1902.
Asher, Die zentrale Gefäßinnervation und der periphere Gefäßtonus. *Ergebnisse der Physiologie* 1902, I, II. Abteilung, S. 546.
Auerbach, Die Innervation der Hirngefäße. Berlin J.-D. 1905.
Axelil, Vasomotor disturbances. *New York med. Journ.*, 1903, 12. August, p. 181.
Bancroft, The vasomotor nerves of the hind limb. *Amer. Journ. of physiology*, I, p. 477.
Bayliss, On the origin from the spinal cord of the vasodilator fibres of the limbs and on the nature of these fibres. *Journ. of physiol.* XXIII Suppl., p. 14, 1899.
Derselbe, On the origin from the spinal cord of the vasodilator fibres. *Journ. of physiologie*, 1902, 5/4.
Derselbe, Further researches on autonomic nerve impulses. *Journ. of physiol.* XXVIII, p. 226, 1902.
Derselbe, Die Innervation der Gefäße. *Ergebnisse der Physiologie* V, S. 515, 1902. (Dort ausführliche Literaturangaben.)
Bechterew, Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark. Deutsch von Weinberg. I. Aufl. Leipzig 1899, S. 98.
Derselbe, *Neurologisches Centralblatt*, 1894, S. 473.
Derselbe, Die Funktionen des Nervencentra. Jena 1905, I, S. 315.
Derselbe, Die Funktionen des Nervencentra. 1911, III, S. 1658.
Bleidl, Über die Centra der Spinalchord. *Wien. Mon. Wochenschr.*, 1866, 8, 904.
Bornerzi, I vasomotori e i centri vasomotori nel midollo spinale e nel cervello. I nervi vasodilatatori nelle radici posteriori del midollo spinale. *Bullet. dell. R. acad. med. di Roma*, XIII, p. 533.
Bruce, Alexander, Distribution of the cells in the intermediolateral lobe of the spinal cord. *Transactions of the society of Edinburgh*, 1906.
Bruckner, Sur les phénomènes de réaction dans le système sympathique. *Comptes rend. de la société de Biologie*, 1901, p. 982.
Brustein, Über die vasomotorischen Centren des verlängerten Marks. *Observ. psychiatry* 1902 ref. *Neural. Jahrb.* 1901, S. 221.
Cavazzini, Sur l'innervation motrice des vaisseaux du cerveau et de la moelle. *Archiv. ital. de Biolog.* 1909, XXXVIII, p. 17-32.
Derselbe, Sur l'existence de fibres vasomotrices pour la régulation réciproque du sympath. cervical. *Archiv. de Biol.* II, 8, p. 387, 1905.
Cekanovic, Dissertation. Petersburg 1897. Zit. nach Bechterew.
Cushing, Concerning a definite regulatory mechanism of the vasomotor centre. *Bull. of the John Hapt. Hosp. Rep.* 1903, p. 209.
Dale, Observations chiefly by the degeneration method on possible fibres in the dorsal nerve roots of the frog and dog. *Journal of physiolog.* XXVII, p. 129.
DeGanillo, Azione della respirazione sul centro bulbare inhibitorio del cuore e sul centro bulbare vaso-contrattore. *Riv. degl. Organi. e dell. clinica*, 1909, p. 503.

Delezenne, Demonstration de l'existence des nerfs vasomoteurs régulateurs de la pression sanguine. *Compt. Rend. de l'Acad. d. sciences*, CXXIV, p. 200.

Dürflinger, *Berichte über die Verhandl. d. kgl. sächs. Gesellsch. d. Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-physikal. Klasse*, 1873.

Edinger, *Behandlung der Kränkheiten im Bereich der peripheren Nerven. Pseudobulbär-Störungen* Handbuch, VI, S. 549.

Eggen, Contribution à la topographie radiaire et périphérique des vasomoteurs de l'extrémité supérieure chez l'homme. *Compt. rend. de la société de biologie* 86, 1901, p. 604.

Derselbe, Un cas de syringomyélie unilatérale avec le syndrome de Brown-Séquard. Hémiesthésie croisée de la face et du corps. Étude sur le parcours des vasomoteurs dans la moelle. *Revue neurologique*, 1905, p. 553.

Eulenbarg und Landolt, Über die thermischen Wirkungen experimenteller Kugeln am Nervensystem und ihre Beziehung zu den Gefäßnerven. *Vierteljahrsschr. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien*, Bd. 68, S. 245.

Fletcher, The vasoconstrictor fibres of the great auricular nerve in the rabbit. *Journal of physiol.* XXII, p. 259.

De Francesco, Contribuzione alla patologia del sistema nervoso trifido e cranio. *Gazzetta degli Ospedali*, XXIII, 1902, p. 649.

Frankel, J., The relation of the nervous system to visceral and trophic phenomena. *Medic. Record*. Bd. 63, 1905, p. 481.

Friedländer und Schlessinger, Über die etiology, Behandlung der Hirnsyphilis. *Mon. u. d. Grenzgeb. der Medizin u. Chirurgie*, III.

Frerley, Über Entwicklung und Bau des autonomen Nervensystems. *Centralblatt f. Nervenkunde*, 1906, 1905, Medizin.-naturwissenschaftl. Archiv 1907, 2, 2.

Fuchs, *Wiener klin. Wochenschr.* 1900, S. 488.

Gartner, Über den Verlauf der Vasodilatatoren. *Wien. klin. Wochenschr.* 1888, S. 880.

Gergens und Weber, Über lokale Gefäßnervencentren. *Pflügers Archiv*, XIII, S. 44.

Guinelli, The Belong-Westphal Tract. *Journal of mental pathology* VIII, 1, 1906.

Gulitz und Ewald, Der Hund mit verkürztem Rückenmark. *Pflügers Arch. f. Physiol.* Bd. 63, 1896, S. 502.

Güttlich und Meyer, Die experimentelle Pharmakologie als Grundlage der Arzneibehandlung. Berlin 1912, S. 126.

Grasset et Raizet, *Leçons sur le syndrome bulbo-médullaire*. Montpellier, 1900.

Griffmann, Beitrag zur Lehre von den reflektorischen vasomotorischen Störungen nasalen Ursprungs. *Wiener med. Wochenschr.* 1908, S. 16.

Grützner, Über vasomotorische Nerven. XXII. Versammlung österreichischer Neurologen und Irrenärzte, 26/27. V. 1906.

Hallion et Gaulte, *Circulation capillaire chez l'homme*. *Archiv d. physiol.* 1894, p. 383.

Derselbe, Sur les réflexes vasomoteurs bulbo-médullaires, dans quelques maladies nerveuses. *Archiv d. physiol.* 1895, p. 20.

Hallion et Frank, Sur l'innervation vasomotrice de l'apoplexie. *Archives de physiologie*, 1896, 476-508.

Hare, A report of a case of arterial occlusion in hemiplegia. *Journal of nerv. and ment. diseases*, 1898, 8.

Hastorick und Biedl, Über die Innervation der Hautgefäße. *Wien. klin. Wochenschr.* 1905, VI, 3.

Hellou, *Innervation vaso-motrice du larynx*. Société de Biologie 26. 1906. et. Revas mensuel. 1907, p. 145.

Hellweg, Studien über den centralen Verlauf der vasomotorischen Nervenbahnen. Archiv für Psychiatrie, XIX, 3. 194.

Hill and Macleod, A further inquiry into the supposed existence of central vasomotor nerves. Journ. of Phys. XXVI, 1903, p. 241.

Horsben, Über von centralen oculo-pulsalen. Dissertation Utrecht, 1896.

Huber, Observations on the innervation of intra-cranial vessels. Amer. Journ. of physiol. 1899, II, p. 12.

Huot, De gevolgen der extirpatie van het ganglion superius colli nervi sympathici voor het centrale zenuwstelsel. Amsterdam 1898.

Hürthle, Untersuchungen über die Innervation der Hirngefäße. Pflügers Archiv XLIV, S. 165.

Jacobsohn, Über Veränderungen im Rückenmark nach peripheren Lähmungen, zugleich ein Beitrag zur Lokalisation d. Centren oculo-pulsale u. zur Pathologie d. Tabes dorsalis. Zeitschr. f. Klin. Medic. XXXVII, p. 228.

Derselbe, Über die Kerne des menschlichen Rückenmarks. Berlin 1895. S. 31.

Jagorow, Zur Frage der Innervation der Gefäße. Neurolog. Centralbl., 1888, S. 168.

Jassé, La vasoconstriction déterminée par l'adrénaline n'est pas due aux centres sympathiques. Comptes rendus de la société de Biologie, LV, 30.

Ito, Über den Ort der Wärmefühler nach Gehirnschnitt. Zeitschr. für Biologie, 1899, Bd. 48, S. 392.

Kaiser, Über eine halbseitige vasomotorische Störung vererbten Ursprungs. Neurol. Centralbl., 1899, S. 457.

Karplus und Kravitz, Gehirn und Sympathicus. II. Mitteilung. Ein Sympathicuscentrum im Zwischenhirn. Archiv f. die gesamte Physiologie, Bd. 135, 401, 1910.

Kocher, Die Verletzungen der Wirbelsäule. Mit. u. d. Grenzgebieten der Med. und Chirurg. I, 1, 1896.

Kohnstamm, Die centrifugale Leitung im weissen Rückenmark. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. XXI, 309, 1902.

Kohnstamm und Wallstein, Versuch einer physiologischen Anatomie des Vagusursprungs und des Kopf-sympathicus. Journal f. Psychiatrie u. Neurologie VIII, 1907.

Kölliker, Handb. d. Gewebelehre Bd. II.

Laignel-Lavastine, Recherches sur le plexus solaire. Thèse de Paris, 1892.

Landis, Artikel Gefäße. Encyclopädie Realencyclopädie. III. Aufl. Bd. VIII, p. 344 ff.

Langley, Note on the connection with nerve cells of the vasomotor nerves of the test. Journ. of physiology, XII, p. 325.

Derselbe, Journal of physiology. XV, p. 116.

Derselbe, The effect of various poisons upon the response to nervous stimuli chiefly in relation to the bladder. Journal of physiol., XLIII, 1911, p. 325.

Derselbe, On the nerve cell connection of the splanchnic nerve fibres. Journ. of physiol., XX, 1896, p. 223.

Derselbe, Remarks on the result of degeneration of the upper thoracic white rami communicantes chiefly, in relation to communicating fibres of the sympathic system. Journal of physiology, XXV, 1906, p. 468.

Derselbe, Das sympathische und verwandte nervöse System der Wirbeltiere (autonomes nervöses System). Ergebnisse der Physiologie. II, 2, S. 815.

Langley and Anderson, E., On the union of the 10th cervical nerve with the superior cervical ganglion. Journ. of physiol. XXX, p. 428.

Hirschman, On the effects of joining the cervical sympathetic nerve with the chorda tympani. *Proceed. of the Roy. society*, LXXIII, p. 19.

Hirschman, The union of different kinds of nerve fibres. *Journ. of physiol.*, XXXI, 5, p. 362.

Lapinsky, Zur Frage über die Beteiligung der Nervenfäden der hinteren Extremität an der vasomotorischen Innervation der distalen Gebiete derselben. *Virchows Archiv*, Bd. 183.

Lapinsky, Studien über die lokale Blutirkulation im Bereich gelähmter Nerven. *Archiv f. Anat. u. Physiologie. Physiol. Abt. Supplement* 1899.

Lapinsky und Cassirer, Über den centralen Ursprung des Sympathicus. *Zeitsch. f. Nervenk. u. Nervenheilk.* XVIII, 1900.

Lépine, Note historique sur les vaso-moteurs et particulièrement les vaso-dilatateurs. *Revue de médecine*, 1896, p. 283.

Lewandowsky, Anatomie des sympathischen Systems und Physiologie des sympathischen Systems im Handbuch der Neurologie, I, S. 308 u. S. 411.

Derselbe, Die Funktionen des centralen Nervensystems. *Jena* 1902.

Levaschev, Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung d. Nervensystems bei Gefäßerkrankungen. *Virchows Archiv*, Bd. 92, S. 152.

Lévy, Action des sécrétions internes sur les centres vaso-moteurs. *Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences. Biologie*, 14/21, IX, 39.

Loeper et Grunze, Contribution à l'étude des hémocéphales chez *Thomophagus*. *Nouvelle iconographie de la salignière*, 1904, p. 151.

Lewinsky, Trophoneuril. Knochenatrophie als Ursache dauerhafter Erwerbsminderung. *Arch. Sachverst.-Ztg.*, 1902, S. 436.

Mager, Vasomotorische Symptome bei Hirntumoren. *Obersteiner's Arbeiten*, XVI, S. 140.

Magnus, Über periphere Gefäßtonus im Splanchnicengebiet. *Archiv f. die gesamte Physiologie*, Bd. 115, S. 351.

Maragliano, Die Hautgefäßreflexe im physiologischen Zustande. *Deutsch. Arch. f. Klin. Med.*, 1889, XLIV, S. 265.

Marek, de, Le sympathisme cervical comme affaiblissement vasomoteur du cerveau. *Archiv. de biol.*, II, 3, p. 297.

Minor, L., Zur Bedeutung d. Corp. striatum. I-D. Moskau, 1892. (Russisch), (zit. nach Rossolimo, *Zeitsch. f. Nervenk. u. Nervenheilk.* VI).

Monakow, Gehirnpathologie. Wien, II. Aufl., S. 164.

Morat, Origine et centres trophiques des nerfs vasodilatateurs. *Com. méde. de Paris*, 1902, p. 486.

Derselbe, Sur la constitution du grand sympathique. *Comptes Rendus des séances de l'Acad. d. sciences*, 1897, CXXIX, p. 1889.

Derselbe, Les origines des nerfs vasodilatateurs. *Leurs Centres trophiques*. *Le Progrès médical*, 1897, p. 310.

Morat et Bozay, Les éléments centrifuges des racines postérieures médullaires. *C. R. d. l'Acad. d. sciences*, CXXV, p. 126.

Müller und Sieberk, Experimentelle Untersuchungen über die Vasomotorik des Gehirns. *Verhandlungen des XXIII. Kongresses f. innere Medizin*, München 1900.

Nicolaïff, *Mémoires russ. neurolog.* 1902, 3, p. 12. *Revue neurolog.* 1903, p. 506.

Neuberg, Über die sekundäre Degeneration nach Durchschneidung des Hals-sympathicus. I-D., Marburg 1897.

Obersteiner, Bemerkungen zur Helmholtz'schen Drehtischbahn. *Arbeiten aus dem Institut Obersteiner*, 1900, VII, S. 286.

Dersellier, Über das Hirnrythmische Bündel. *Neural. Centralbl.* 1899, 546.

Dersellier, Die Innervation der Gehirngänge. *Obersteiner's Arbeiten*, V, S. 210.

Onuf and Collins, Experimental researches on the localization of the sympathetic nerve in the spinal cord and brain. *Journal of nervous and mental diseases*, 1898, p. 66.

Dersellier, Experimental researches on the central localization of the sympathetic with a critical review of its anatomy and physiology. *Archiv of neurology and psychiatry*, 1900, III, p. 1—222.

Olf, Vasomotoric centres in the thalam. *Journal of nerv. and ment. diseases*, 1891.

Oswajannikow, Bericht über die Verhandlungen d. kgl. sächs. Gesellschaft der Wissensch. zu Leipzig. Mathematisch-physikal. Klasse, 1871.

Parkin, *Troubles vasomoteurs dans l'hémiplegie*. Thèse de Bakarest 1900.

Parkin et Goldstein, Sur quelques troubles vasomoteurs dans l'hémiplegie. *La Revue médicale*, 1900, avril.

Pattazzi, I riflessi vascolari nelle membra e nel cervello dell' uomo per vari stimoli e per varie condizioni fisiologiche e sperimentali. *Riv. sperim. d. fisiol.* XXIII, 1897, 1.

Pick, Beiträge zur Pathologie u. pathologischen Anatomie des Centralnervensystems. Berlin 1898, S. 222.

Pierret, Sur les relations du système vasomoteur du bulbe avec celui de la moelle épinière chez l'homme et sur les altérations de ces deux systèmes dans le cours de tumeurs, Gangl., rend. de l'Acad. d. science, 1882, p. 225.

Porter, Richardson and Pratt, The relation of afferent impulses of the vasomotor centres. *The Americ. Journal of physiology*, XXVII, 2, p. 276.

Pre-Smith, Observations upon the persistent effects of division of the cervical sympathetic. *Journal of physiol.* VIII, 1887, p. 35.

Ravvier, Des nerfs vasomoteurs des veines. *Compt. rend. d. séances de l'Acad. d. science*, CXX, p. 19.

Reinhold, Beitrag zur Kenntnis der Lage des vasomotorischen Centrums in der Medulla oblong. des Menschen. *Deutsche Zeitschr. für Nervenheilk.* 5, 1897, p. 97.

Rubinstein, *Arch. f. mikrosk. Anat.* 1880, S. 465.

Rottbach, Ein Fall von halbseitiger im Anschluß an starke Körperbewegungen auftretender Cyanose des Gesichts. *Centralblatt für Nervenheilk.* 1886, S. 231.

Rossolimo, Zur Symplicanatomie und chirurgischen Behandlung einer eigentümlichen Großhirn cyste. *Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk.* VI, 1895, S. 75.

Sachs, Ernest, Relation of the optic chiasm to respiratory circulation, temperatur and the spleen. *The Journal of experimental medicine*, XIV, 1911, Nr. 1.

Salvioli, *Archiv. per le scienze mediche*, Bol. Omis. I. Physiol., 1897, p. 388.

Scalfelli, Sur la présence de fibres éfferentes dans les racines postér. et sur l'origine des fibres vasomotrices qui s'y trouvent. *Archiv. di Fisiol.* I, p. 186.

Schlesinger, Beiträge zur Klinik der Rückenmarks- und Wirbelsäulen, Jena 1898, S. 135.

Schultz, P., Das sympathische Nervensystem. In Nagels Handb. der Physiologie. IV, S. 585.

Schuster, Demonstration in der Berliner Gesellschaft f. Neurolog. u. Psych. 1899, 15/2. ref. *Neural. Centralbl.* 1899, S. 281.

Ström, Das Arterienkrampf nach Verletzung der Arterien. *Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abteilung* 1910.

Sutrin, *Centralbl. für die med. Wissensch.* 1873, S. 161.

Spallitta e Consiglio, Les vasomoteurs des membres inférieurs. *Arch. ital. d. biologie*, XXVIII, 1897, p. 251.

Hesslertien: Action des quelques substances sur les vaisseaux paralysés. Arch. d. Anatomie et comp., Bd. V, ref. Jahrbuch f. Neurol. u. Psych., 1895, p. 180.

Szirmai: Motorische Funktionen kleiner Spinalnervenwurzeln. Pflügers Archiv, Bd. 90, 1895.

Stursborg: Über Störungen der Gefäßreflexe bei Querschnittverletzung des Rückenmarkes. Deutsches Arch. für klin. Medizin, Bd. 194, S. 262.

Tanagl: Untersuchungen über den Einfluß des vasomotorischen Nervensystems auf den Stoffwechsel. Pflügers Arch. LXI, S. 161.

Thalbitzer: Hoffmays Brekantenkake in der Med. abh. Arch. f. Psych., Bd. 47.

Thayer und Pal: Über vasodilatatorische Centren im Rückenmark. Wien. med. Jahrb., III, S. 21.

Théry: Recherches expérimentales et histologiques sur les altérations trophiques et fonctionnelles du système nerveux sympathique. Annal. de l'école de médecine de Paris, 1900, 2.

Thöle: Hyperthermie bei Operationen am Hirn. Mit. a. d. Grenzgebieten d. Med. u. Chirurg., III, S. 22.

Tronchikofsky: Sur les rapports du grand sympathique et du système nerveux central. Moniteur russe neurop., 1899, ref. Rev. neurop., 1899.

Trzaska-Chrzostowiczewsky: Zur Lehre von den vasomotorischen Nerven. Virchows Archiv, Bd. 152, S. 371.

Valpian: Leçons sur les vaisseaux, Paris, 2 Bd.

Valek: Sur les centres vasomotriciens périphériques dans l'état normal et pathologique. Soc. des med. triéques de Prague, 15. II. 1899, ref. Rev. neurop., 1899, p. 261.

Weber: Über die Selbständigkeit des Gehirns in der Regulierung seiner Blutversorgung. Arch. f. Anatomie u. Physiologie, Physiologische Abteilung 1905.

Wersilow: Über die vasomotorischen Funktionen hinterer Wurzeln. Physiologie russe, I, S. 45, ref. Centralbl. f. Physiol., XII, 1900, S. 892.

Wiggers: On the action of adrenalin on the cerebral vessels. Amer. Journ. of physiol. XIV, 1905, p. 452.

Wladyschewski: Über die Lokalisation der Centren der Vasokonstriktion im menschlichen Rückenmark. Revue der Psychiatrie, Neurologie u. experimentellen Physiologie, XV, 1910, 471 (russisch).

2. Die sekretorischen Bahnen und Centren.

Adamkiewicz: Artikel Schweiß. Eulenburgs Realencyclopädie, II. Aufl., Bd. XVIII, S. 115. (Auf diesen Artikel stützt sich zum Teil meine oben gegebene Darstellung.)

Bernhardt: Erkrankungen d. peripheren Nerven. 1896. Nothnagels spec. Pathol. u. Therapie, IX, 1.

Bloch: Contribution à l'étude de la physiologie normale et pathologique des nerfs. Thèse de Paris 1898. (Zit. nach Bernhardt, Erkrankungen d. peripheren Nerven.)

Boers: Paul marion emating. Lancet 1895, I, p. 1036.

Eulenburg: Über Erythromelalgie. Deutsche mediz. Wochenschrift, 1895, Nr. 50.

Friedländer: Ein Fall von Hyperästhesie unilateralis. Centralbl. für Nervenk., 1898, S. 380.

Deitelbe: Zur Kenntnis der Hyperästhesie unilateralis. Deutsche mediz. Wochenschrift 1905, 28.

Goldzieker: Schwieggers Archiv für Ophthalmologie, XXVIII, 1

Goltz, Pflügers Archiv, 1875, XI, S. 71.

Heidenhain, Über sekretorische und trophische Drüsenzerven. Pflügers Archiv, XVII, S. 1.

Jeniffassak, Pest. med. chirurg. Presse, 1893, Nr. 48-50.

Kendall u. Luchsinger, Zur Theorie der Sekretionen. Pflügers Arch. XIII, S. 212.

Kölliker, Die Verletzungen u. chirurgischen Erkrankungen der peripherischen Nerven. Deutsche Chirurgie, 24b, 1886, S. 31. (Zu. nach Remak.)

Koster, Klinischer u. experimenteller Beitrag z. Leben von d. Lähmung d. N. lachrym. zugleich ein Beitrag z. Physiologie d. Gesichtsmusk., Schweiß-, Speicheld- u. Tränenabsonderung. Arch. f. klin. Mediz. LXVIII, S. 343.

Langley, On the course and connections of the secretory fibres supplying the sweat glands of the foot of the cat. Journ. of physiology, 1901, XII, p. 345.

Levy-Dorn, Die Schweißnervenzubehöre zwischen d. Nerv. lachrymus u. der Peripherie bei der Katze. Ihre teilweise Trennung von den motorischen Bahnen. Centralbl. f. Physiol., 1892, Nr. 24.

Derselbe, Blüthen der Haut und Sekretion. Zeitschr. f. klin. Mediz., XXI, 1 und 2.

Luchsinger, Die Wirkung von Pilocarpin u. Atropin auf die Schweißdrüsen der Katze. Pflügers Archiv, XV, S. 492.

Derselbe, Die Schweißdrüsen für die Vorderextremitäten der Katze. Centralbl. für die mediz. Wissenschaft., 1878, S. 26.

Derselbe, Pflügers Archiv, 1877, XIV, S. 569.

Mohr, Zur Pathologie des Hysteropathicus. Berl. Hin. Wochenschrift, 1884, 15/18.

Munk, Artikel Sekretionskrankheiten. Eubenburgs Realencyklopädie, II. Aufl., XVIII, S. 189.

Derselbe, Artikel Sekretion. Eubenburgs Realencyklopädie, Bd. XVIII, II. Aufl.

Nawrocki, Z. Innervation der Schweißdrüsen. Centralbl. für d. mediz. Wissenschaft., 1878, 2.

Ostrowskoff, Moskauer ärztlicher Anzeiger, 1878, 25.

Pandi, Halbseitige Gesichtsröthungen bei centraler Facialislähmung. Wien. klin. Wochenschr., 1886, 32. (Mit zahlreichen Literaturangaben.)

Raymond, Des épidermes de la face. Archiv. de neur., XV, 1888, p. 53.

Remak, Neuritis u. Polyneuritis. Pathologie spec. Pathol. u. Therapie, XI, 3, S. 8, 129/132.

Schlesinger, Über centrale Tuberkulose des Rückenmarks. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., VIII, 1896, S. 388.

Derselbe, Über spinale Schweißdrüsen. Festschrift für Kaposi. Wien 1900.

Schmidt, Angeborene multiple Hirnervenlähmung. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., X, S. 409.

Seeligmüller, Casuistische Beiträge zur Lehre von der Hyperidrosis unilateralis faciei. D. Zeitschr. f. Nervenheilk., XV, S. 159.

Sollner, Des centres reticulés des écorces. Rev. neurolog., 1895, Nr. 16.

Tenacher, Hyperidrosis unilateralis. Neurol. Centralbl., 1897, p. 1025.

Urbanowitsch, Zur Ätiologie halbseitiger Störungen der Schweißsekretion (Hyper- und Anhidrosis unilateralis). Wiener klin. Wochenschr. 1904, S. 1218.

Volgus, Gaz. hebdomad., 1878, p. 283 u. 294.

Wundschel, Über den Zusammenhang der Hyperidrosis unilateralis faciei mit pathologischen Zuständen des Facialis. Münch. med. Wochenschr., 1890, S. 882.

3. Die trophischen Funktionen des Nervensystems.

Abraham, Die Durchschneidung des N. mandibularis. Arch. für mikrosk. Anat., Bd. 54, 2.

Adrian, Das mal perforant. Journ. 1904.

Angelucci, Sur les altérations trophiques de l'œil consécutives à l'extirpation du ganglion cervical supérieur du sympathique chez les mammifères. Archiv. Italien. di biologia, 1880, XX, p. 67.

Anderson, The nature of the lesions which hinder the development of nerve cells and their processes. Journ. of physiol. 1902.

Arlsing, Des rapports fonctionnels du cordon sympathique cervical avec l'épiderme et les glandes. Archiv. de physiol., 1891, p. 160.

Arnoux, Des lésions trophiques consécutives aux maladies du système nerveux. Thèse d'aggrégation, Paris 1894.

Axmann, Jahrb. d. Kgl. Akad. gemeinnützigen Wissenssch. zu Erlang. Neue Folge, 1894, ref. Near. Centrbl. 1894, S. 860.

Derselbe, De ganglionis systematis nervorum etc., Berlin 1847.

Barrel, De l'hémistrophie latérale dans ses rapports avec les lésions du ganglion cervical inférieur. Thèse de Lyon 1901.

Bayet, Über neurotische Alopecia. Dermatolog. Zeitschrift V, 1900, 324.

Bechterew, Die Funktionen des Nervensystems. Journ. 1905. Kapitel VIII. Die trophischen Funktionen des Nervensystems.

Derselbe, De l'influence trophique du système nerveux sur l'appareil vasculaire et sur la peau. Rev. de psychiatrie, XIV, 2, p. 52.

Berges et Loewy, Sur les nerfs trophiques de la cornée. C. R. d. l. Soc. de Biol. LIV, p. 688.

Bernhardt, Erkrankungen der peripheren Nerven, Netzhauts spez. Pathol. u. Therapie, XI, 1, 97.

Bertorel, Unrecher Observation, 1880, ref. Centrbl. für Nervenh., 1886, S. 22.

Bethe, Die anatomischen Elemente des Nervensystems und ihre physiologische Bedeutung. Biolog. Centrbl., S. 541, 1906.

Derselbe, Altpen. Anat. u. Physiologie des Nervensystems. Leipzig 1903.

Bielschowsky, Über den Bau des Spinalganglion unter normalen und pathologischen Bedingungen. Journ. f. Psych. und Neurol., 1906, S. 188.

Bischoff, Quelques mots sur les atrophies réflexes. Congrès des Aliénistes et Neurolog. de France. L'Encephale, V, 2, 1903, 236.

Bier, Ein Fall von Akromegalie, Mitteilungen aus der chirurg. Klinik zu Kiel, 1888 (siehe auch Fischer, J.-D. Kiel 1891).

Bikeler, Anatomische Befunde nach Durchschneidung von Rückenmarkswurzeln beim Hunde. Neurolog. Centrbl. 1903, 6.

Bikeler und Jaitzaki, Zur Frage der trophischen Nerven. Centrbl. für Physiol., 1898, S. 345.

Borchard, Die Knochen- und Gelenkerkrankungen bei der Sympgonomye. Deutsche Zeitschr. für Chirurg., Bd. 72, S. 552.

Boussinquet, Considerations on the possible influence of the nervous system in the time-life of the higher animals. Lanet 1898, 1, p. 291.

Bräunig, Über Degenerationsvorgänge im motor. Nerven nach Durchschneidung der hinteren Rückenmarkswurzeln. Arch. f. Anat. u. Physiol. Abt. 1903, S. 456.

Breglia, Del sistema nervoso secondo le dottrine anatomiche attuali, con idee sulle funzioni del medesimo, specialmente rispetto al trismo. Giorn. dell'Anatomia e fisiologia, dei medici e naturalisti, VI, 2-6, 1897, ref. Rev. neur., 1907, p. 280.

Breglia, Über experimentelle auftragende Degeneration motorischer und sensibler Hirnnerven. Obertinens Arbeiten, I, S. 73.

Brenbächer, Der Einfluß der Nervendurchschneidung auf die Struktur des Zahngulps. *Vinchow Archiv* Bd. 187, S. 526.

Brisson, *Leçons sur les maladies nerveuses* (Deuxième série), Paris 1899.

Browning, Fitting about the hairs cups a trophic change in the skin in certain nervous diseases of central origin, *Medical news*, 1896, II, p. 333.

Brown-Séquard, *Leçons sur les névroses*, Paris 1872.

de Buck et Vanderlinden, Note sur un cas de rai personnel (plaie d'origine diabéto-traumatique, *Belgique médicale*, 1897, Nr. 19.

Bum, Über arthritische Muskelatrophie. *Wien. medic. Presse*, 1896, Nr. 51, S. 309.

Burns, Die experimentelle Durchtrennung der vorderen und hinteren Wurzel des zweiten Halsnerven usw. *Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol.*, München 1902.

Bunzel, Über den Einfluß der vorderen und hinteren Nerven auf die durch Verletzung hervorgerufene Entzündung des Knochensarkes. *Arch. für experiment. Pathologie und Pharmakologie*, XXXVII, p. 445.

Cassirer, Über Veränderungen d. Spinalganglienzellen usw., *Deutsche Zeitschrift f. Nervenhilk.*, XV, S. 190.

Derselbe, Die trophische Funktion des Nervensystems. *Ergebnisse d. allg. Pathol. u. pathol. Anat. d. Menschen u. der Tiere*. XIII, 1900, S. 86.

Derselbe, Die trophischen Störungen. *Handb. d. Neurol.* Herausgeg. von Lewandowsky, Bd. I, S. 1135.

Derselbe, Neuritis und Polyneuritis. *Deutsche Klinik*, IX.

Chernomir, I.-D. Petersburg 1897 (nach Bucherer).

Chastetresse, Sur un cas de syringomyélie à forme acromiaglique, *Rev. de nérol.*, 1895.

Charcot, *Clinique des malad. du syst. nerv.*, I, Paris 1902, Leçon XVII.

Derselbe, *Leçons sur les maladies du système nerveux*, (Ouvrages complètes, I.

Chatin, Troubles trophiques et troubles de la sensibilité chez les hémiplegiques. *Rev. d. méd.*, 1900, p. 701.

Chrastle, Note upon a possible relationship between carcinoma and trophic areas. *British med. Journal* 1903, I, p. 304.

Claude et Chauvet, *Séméiologie réelle des sections des nerfs paires périphériques*. Maloin, Paris 1911.

Corlett, Diseases of the skin associated with derangements of the nervous system, *Amer. Journ. of med. sciences*, 1892, CIII, p. 633.

Cutro, Ricerche sul centri trofici delle ossa, *rel. Annal. d. medec. univ.* 1898, p. 298.

Crykharz und Heibing, Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen von Nervendurchtrennungen zu Gefäßveränderungen, *Centralbl. für allg. Pathol. u. pathol. Anatomie*, 1897, I, XI.

Danilewski, *Wiatsch* 1892, 47 u. *Centralbl. f. Chirurg.*, 1893, 14.

Darkschewitsch, *Arch. für Psychiatr.*, XXIV, p. 521.

Dejerine et Leloir, *Archives de physiologie*, 1891.

Dejerine, Atrophie osseuse dans l'hémiplégie, *L'Indépendance méd.* 1903, 3.

Dejerine, M. et Mout. Contribution à l'étude des localisations motrices spinales dans un cas de désarticulation omphalo-humérale remontant à l'enfance. *Revue neurol.* 1909, p. 525.

Dere, E., On cathectas affectum in various diseases, with especial reference to certain angioneuroses. *Brit. Journ. of Dermatology*, XVIII, 1906, p. 216.

Deutloff, Contrib. à l'étude des nerfs trophiques. *Sémin. de Botkin*, 1904, 21, et *Rev. neurol.*, 1894, p. 556.

- Dujon, Troubles trophiques de l'œil après section du grand sympathique au cou. Le bulletin médical, Juli 1897.
- Duplay, Hémikypetrophe partielle. Gazette hebdomadaire de médecine, 1897, 45.
- Duplay et Cuzin, Recherches expérimentales sur la nature et la pathogénie des atrophies musculaires consécutives aux lésions des articulations. Arch. général de médecine, Janvier 1891, 1.
- Duplay et Morat, Recherches sur la nature et la pathogénie du mal perforant du pied (mal plantaire perforant). Arch. général de médecine, 1873, p. 267.
- Durantis, Des troubles trophiques et des troubles circulatoires dans la paralysie générale. Gaz. des hôpitaux, 1894, 9/10.
- Dutillet et Lamy, Contribution à l'étude de l'artère oblitérante progressive. Archiv. de médecine expérimentale, 1895, p. 302.
- Eckstein, Erich, Angeborene familiäre atrophische Minderbildungen an den Händen. Mit ausst. lithograph. für Chirurgie u. inn. Medizin. XXII, 494.
- Eckhard, Zur Frage über die trophischen Funktionen des Quers, Centralbl. für Physik., 1892, S. 328.
- Erlanger, Behandlung der Krankheiten im Bereich der peripheren Nerven. Pseudotumor-Handb. der spez. Therapie, 1. Aufl., V. Bd., S. 540.
- Egget, La fièvre dans les névroses vasomotrices. IV. assemblée de la société suisse de neurologie 12/13 XI 1910. Bol. Revue neurolog. 1911, p. 628.
- Eisenlocht, Beiträge zur Hirnkalibration. Deutsche Zeitschr. für Neurologie, III, 8, 360.
- Engelhardt, Gefäßalteration und Intestinalcarcinom. St. Petersb. medic. Week., 1899, 48.
- Erlé, Zur Pathologie und pathologischen Anatomie peripherer Paralyse. Arch. für klin. Medic., Bd. IV u. V.
- Erikson, Drei Fälle trophischer Störungen im Ausbreitungsgebiet des Sympathicus. Neurologischer Botz (russisch) XVII, 460, 1910.
- Etienne, Sur les atrophies musculaires progressives d'origine myopathique. Nouv. Journal de S. Salpêtr., 1899, p. 358.
- Etienne et Chagny, Les lésions cellulaires des cornes antérieures de la moelle dans les atrophies nerveuses. L'Encephale, 1906, 6, p. 269.
- Fabre, Ein Fall von neuropathischer Keratitis nach Trigeminusdurchschneidung beim Menschen. Centralbl. f. prakt. Augenheilkunde, 1898, XXII, S. 88.
- Ferriss, Recent work on the cerebellum and its relations, with remarks on the central connections and trophic influence of the fifth nerve. Brain XVII, p. 25.
- Fleissner, Periphere Paralyseförmigkeit mit retrograder Neurodegeneration. Zeitschr. f. klin. Medic., 1907, XXXII.
- Fleming, The effect of ascending degeneration on the nerve cells of the ganglia on the posterior nerve roots. Phila. med. Journ., 1897, I, p. 279.
- Forel, Einige klinisch-anatomische Betrachtungen v. Ergänzungen. Arch. f. Psychiatrie, Bd. XVIII, S. 191.
- Fox, T., The influence of the sympathetics on the disease, London 1865 (mir nicht zugänglich).
- Frankel, Centralbl. für allg. Pathol. und pathol. Anatomie, 1898, 1.
- Derselbe, Ueber neurotische Angiodilatare. Wirt. klin. Wochenschr. 1896, S. 146.
- Fuchs, Atrophie bei cerebraler Hemiplegie. Jahrbuch f. Psychiatrie. XXXII, 312.
- Fuchs, Neurologische Demonstrationen. Gesellschaft des Ärzte Wiens. Wiener klin. Wochenschrift, 1910, S. 1614.
- Gaulé, Der trophische Einfluss der Sympathicusganglien auf die Muskeln, Centralbl. für Pathologie, 1891, S. 197.

Derselbe, Der Einfluß des Trigemini auf die Hornhaut. *Centralbl. f. Physiol.* 1891, 8, 470 u. 480.

Derselbe, *Centralbl. f. Physiol.* 1892, 25 u. 8, 383.

Derselbe, Die trophischen Eigenschaften der Nerven. *Berl. klin. Wochenschr.* 1893, 40/45.

Derselbe, Neues von den trophischen Kräften des Organismus. *Archiv f. Physiologie* 52, 1893, 8, 552.

Gayet et Bonnet, Les altérations nouvelles d'origine nerveuse. *Arch. général. d. méd.* 1910, 46 (Literatur).

von Gudden, Anatomie fine de la cellule nerveuse. *Compt. rend. du XII. Congr. international de méd.*, IV, p. 191.

Derselbe, Les phénomènes de la réparation dans les centres nerveux après la section des nerfs périphériques. *La presse médicale* 1899, 1.

von Gudden et Biervliet, Le nerf de l'oculomoteur contenu 10, 19 et 23 mois après la section du nerf. *Le névrosé* 1911, II, p. 205.

Guillini, *La semaine médicale*, 1887, p. 299.

Girard, Experimentelle Hemiatrophie faciale. *Rev. méd. d. la Suisse romande*, 1891, 6.

Gley, E. Atrophie de l'oeil trophique après la section intracrânienne du trijumeau. *Compt. rend. d. l. Société de Biologie*, 14, III, 91.

Gley et Mathison, Note sur quelques troubles trophiques, causés par l'irritation du nerf trijumeau. *Arch. d. physiol.* 1888, I, p. 232.

Goldschneider, Über die Lehre von den trophischen Centren. *Berlin klin. Wochenschr.*, 1894, Nr. 18/19.

Derselbe, Die Bedeutung der Beize für Pathologie und Therapie. Leipzig 1898.

Derselbe, Eine neurotische Knochentrophie und die Frage der trophischen Funktionen des Nervensystems. *Zeitschr. f. klin. Med.* 60, 1 u. 2.

Goldschneider und Flatau, Normale und pathologische Anatomie des Nervensystems. Berlin 1898. (Zusammenfassende Arbeit mit zahlreichen Literaturangaben.)

Goldschtein, Kritische und experimentelle Beiträge zur Frage nach dem Einfluß des Nervensystems auf die embryonale Entwicklung und die Regeneration. *Archiv f. Entwicklungsmechanik* XVIII, 1, 1901.

Goltz, *Pflügers Archiv*, XX, 2.

Grützmacher, Einige neuere Arbeiten über trophische Nerven. *Deutsch. med. Wochenschr.* 1895, I, 8, 15.

Hagelstein, Lähmung des Quintus und Entartung seiner Wurzel infolge einer Neubildung in der Gegend des Ganglion Gasseri. *Deutsche Zeitschr. f. Neurologik*, XIII, 8, 206.

Hallopeau et Neumann, Contribution à l'histoire des inflammations rétrobulaires. *Gazette médicale de Paris*, 1878.

Hansen, Experimentalkritische Untersuchungen über die Ursache der nach Trigeminausfunktionsstörung eintretenden Hornhautveränderungen. *Zeitschr. f. Biologie*, XXIV, 8, 140.

Hayem, Note sur un cas de troubles trophiques. *Archives de physiologie*, 1878.

Head and Campbell, The pathology of herpes zoster and its bearing on sensory localization. *Brain* XXIII, p. 355.

Herz, Über die Folgen der Exstirpation des Ganglion cervicale superius bei jungen Tieren. *Archiv f. Ophthalmol.* 1890, 21, 8, 470.

Hirsch, *Deutsche med. Wochenschr.* 1900, 26 u. 31.

Höcker, Die Neurosenlehre und ihre Gegner. Berlin 1899.

Hofmeier, Über systemische Gangrän und lokale Asphyxie. *Wien. med. Jahrbücher*, 1886.

Hofla, Zur Pathologie der arthritischen Muskelatrophien. Volkmann Sammlg. Klinischer Vorträge, 1892.

Hofschewalkoff, Ein Fall von Springomyelie von verbunden mit trophischen Störungen (Aktionegale). Virchow's Arch., Bd. 112, S. 10.

Jamin, Experimentelle Untersuchungen am Leber von der Atrophie gelähmter Muskeln. Ann. 1904. (Vollständiges Literaturverzeichnis.)

Jarisch, Über die Korrelation von Erkrankungen der Haut und der grossen Arterien des Rückenmarks. Vierteljahrsschr. f. Dermat., 1880, S. 193.

Jahn, Über die klinische Äußerung der Reaktionsanomalie akuter Delirien. Abg. Zeitschr. f. Psychiatrie, XXXII, 1899, S. 27.

Jendrasik, Allgemeine Bemerkungen über das Wesen und die Funktion des vegetativen Nervensystems. Virch. Arch., Bd. 145, S. 425.

Jensen, Das Problem d. troph. Nerven. Med. Naturw. Archiv II. 499, 1910.

Jungfranz, Troubles vasomoteurs et trophiques d'origine cérébrale. Eruptions périphériques et ecchymoses purpuriques dans l'hémiplegie. Echo médical du Nord, XIV, p. 177.

Joffroy et Archaud, Névrose périphérique d'origine vasculaire. Arch. de méd. expérimentale, 1891.

Jones, Über experimentelle nervöse Lungenangsten. Deutsches Archiv für klin. Medizin, 87, S. 389.

Juretschke, Über das Verhalten des Blutgefäße im Gebiete durchschalteter vasomotorischer Nerven. Beitrag zur pathol. Anatomie und zur allgemeinen Pathologie. XXXII, 146.

Joseph, Zur Physiologie der Spinalganglienzellen. Du Bois' Archiv, 1882, S. 296.

Derselbe, Beiträge zur Lehre von den trophischen Nerven. Virchow's Archiv, Bd. 107, S. 118.

Julianburger u. Meyer, Beitrag zur Pathologie der Spinalganglienzelle. Neurol. Centralbl., 1899, 4, S. 151.

Kaplanowicz, Das Verhalten der Kasein nach behäufelungserschütterung. Archiv f. Chirurg., 96, 2.

Kassowitz, Die Phosphorbehandlung der Blachitis. Zeitschr. f. klin. Med., VII, 1884.

Kilian, Muskelatrophie nach Frakturen. New Yorker med. Monatsschr., VIII, 20, VIII, 26.

Kirchhoff, Über trophische Hirnerkrankungen und über den Verlauf trophischer und sensorischer sowie einiger Faserzweige von unilateraler Funktion im Gehirn. Arch. f. Psychiatrie, XXIX, S. 388.

Kleist, Die Veränderungen der Spinalganglienzellen nach der Durchschneidung des peripheren Nerven und der hinteren Wurzeln. Berlin Inaug.-Dissert. 1903.

Klippel, Les neurones. Les lésions fondamentales de leurs dépendances. Arch. de méd., 1886, 1, p. 418.

Kocher, Die Läsionen des Rückenmarks bei Verletzungen der Wirbelsäule. Mitt. u. d. Grenzgebieten d. Med. u. Chir., I, 4.

Kohnstamm, Die centrifugale Leitung im sensiblen Endorgan. Deutsche Zeitschr. für Nervenhe., XXI, S. 209.

Kopp, Die Trophicosen der Haut. Wien 1886.

Krüger, Zur Physiologie der Spinalganglien und der trophischen Nerven sowie zur Pathologie der Tabes dorsalis. Leipzig 1894.

Kranke, Die Neuralgie des Trigemini. Leipzig 1886.

Kreibitz, Die zugangsärztliche Untersuchung. Wien 1905.

Labridy, Section réflexionnelle du Quinzo. Les troubles trophiques en sont. Compt. Rend. d. l. Soc. de Biologie, 26, II, 89.

- Lande, L. Essai sur l'aphasie lumineuse progressive (atrophie du tiers optique) celle de la face en particulier. Paris 1868. (Nach Richman.)
- Langelin, Nederlandse Vereniging van Psych. en Neurolog. 2/3, 1906. Ref. Neurolog. Centralbl. 1906, 1080.
- Langlois et Richer, Troubles trophiques bilatéraux après lésions de l'encéphale. Compt. Rend. d. l. Soc. de Biol., 31. V. 96. Ref. Centralbl. f. Physiol., 1896.
- Lannois, Dermographisme chez des épileptiques. Soc. française d. la Salpêtr. XIV, 1901, p. 267.
- Lapinsky, Deux cas de dégénérescence trophique des vaisseaux carotidiens à la même périphérie. Arch. de méd. expér., 1889, 1.
- Derselbe, Zur Frage von der Degeneration der Gefäße bei Läsion d. N. sympath. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., XVI, 5, 240.
- Derselbe, Trophische Gefäßerkrankung im Laufe der Neuritis. Zeitschr. f. klin. Med., XXXVIII, 1—3.
- Derselbe, Über die Vasomotoren d. Ohres. Journal von Prof. Sikorsky, 1905, 14.
- Derselbe, Zur Frage über die Beteiligung der Nervenzustände der kranken Extremität an der vasomotorischen Innervation usw. Virch. Archiv. Bd. 183.
- Derselbe, Die Degeneration der Gefäße bei Sympathetismus. Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilk., XVI, 240.
- Derselbe Trophische Gefäßerkrankung im Laufe der Neuritis. Zeitschr. f. klin. Med., XXXVIII, 5, 1—3.
- Lapinsky und Cassirer, Der Ursprung des Hämiparästhesien im Rückenmark. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde., XIX, 5, 187.
- Leguen, Claude et Villaret, Sur un cas d'atrophie nerveuse calcaine, consécutive à une arérite limitée d'origine traumatique. L'encéphale, 1900 I, 5, 52.
- Lejair, Recherches cliniques et anatomo-pathologiques sur les affections cutanées d'origine nerveuse. Paris 1882.
- Lejkussck, Der feinste Bau des Nervensystems. II. Aufl. Berlin 1905.
- Leredde, Le rôle du système nerveux dans les dermatoses. Archiv. général de méd., 1898, I, p. 282.
- Levaditi, Contribution à l'étude des atrophies musculaires expérimentales. La presse médicale, 1899, Nr. 52, p. 214.
- Lewy, Die Einwirkung des Mal perforant du pied. Mitteil. von den Grenzgebieten der Medizin u. Chirurgie., XXII, 5, 84.
- Lewaschew, Zur Lehre von den trophischen Nerven. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., 1888, 8, 192.
- Derselbe, Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Nervensystems bei Gefäßerkrankungen. Virch. Arch., Bd. 92, 5, 152.
- Lewy, F. H., Der Muskelbefund bei cerebraler und spinaler Muskelatrophie. Berlin. klin. Wochenschrift 1910, Nr. 47, 8, 2696.
- Derselbe, Zur Frage d. cerebralen Muskelatrophie. Pflügers Archiv f. d. ges. Phys. CXXXVII, p. 511.
- v. Leyden-Goldschneider, Die Erkrankungen des Rückenmarks. Pathologisch spec. Path. u. Ther., X, 8, 157ff.
- Loebel und Wiesel, Zur Klinik und Anatomie der Hemiatrophia totalis prope. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., XXVII, 1904, 8, 325.
- Londre, De l'arthropathie nerveuse vraie et de troubles trophiques artériels. Nerv. français, d. l. Salpêtr., 1897, p. 392. (Mit zahlreicher Literaturangaben.)
- Ludlum, The relationship between the spinal cord, the sympathetic system and sympathetic nerves. Contrib. from the department of neurology for the year 1906, IV, Philadelphia.

- Lagaro, Sull' alterazione delle cellule nervose dei gangli spinali etc. Riv. di patol. nerv. e ment., 1896, 12 n. 189, 12.
- Lahusch, Über einen Fall von Komat. neuropathol. Wien. med. Wochenschr., 1907, 8, 274.
- Lanz, Ein Fall von Syringomyelie mit Chorea magna. Deutsche med. Wochenschr., 1908, 42.
- Lazzari, Über vasomotorische Muskelatrophie. Deutsche Zeitschr. f. Nervenk., XXIII, 1905, 8, 602.
- Lagni, Comment se comportent les os en cas d'anémie quand ils sont soumis à l'influence nerveuse. Arch. ital. di med., XLIV, p. 21.
- Mantegazza, Delle alterazioni fisiologiche prodotte dal taglio dei nervi. Gazzetta medic. (italian. Milano, 1867. (Nach Stier.)
- Derselbe, Di alcune alterazioni fisiologiche dei tessuti al taglio dei nervi. Giornale d'anat. e fisiolog. patol., Pavia, 1865. (Nach Stier.)
- Marie, Un cas de syringomyélie à forme pseudo-amyotrophique. La sem. médic., 1894, 22.
- Marincovic, Recherches sur la biologie de la cellule nerveuse. Arch. d. Anat. u. Physiol., 1899, Physiol. Abteilung.
- Derselbe, La greffe médullaire, 1905 u. 1899.
- Derselbe, Pathologie générale de la cellule nerveuse. Compt. rend. du XII. Congr. international de méd., IV, p. 338.
- Derselbe, Über Verwundung der Nerven u. des Rückenmarks nach Anspaltungen. Ein Beitrag zur Nerventrophik. Neurol. Centralbl., 1902, 8, 463.
- Martin, Considérations générales sur la pathologie des scléroses dystrophiques consécutives à l'endartérite oblitérante progressive. Rev. de méd., 1896, janvier.
- Maschke-Wies, Ein Fall von peripherer Facialislähmung mit trophischen Störungen. Ref. Neurol. Jahresbericht 1910, 8, 542.
- Mathison, The effects of apoplexy upon medullary centres. The vasomotor centre. Journ. of physiology XLII, 4, 1911.
- Mc Ewen, E. L., The relation of nerve impulse to constant inflammation. Journ. of the Amer. Med. Assoc., XLVII, 1, p. 8.
- Mayet, Sur les troubles de nutrition des axes hilaires périphériques du système nerveux. Lyon médical, 1885.
- Meudel, Neurologisches Centralblatt, 1888, 14.
- Meunier, Analyse. Nerv. leçons. d. I. Salpêtr., 1897, X, p. 15.
- Meyer, E., Über Rippenkrümmigkeit bei Geisteskranken. Arch. f. Psychiat., XXIX, 8, 350.
- Militsin, Die anatomische Gehirnstruktur. Nahrungsges. Pathologie u. Therapie, XI, 2, Wien 1885.
- Michailow, Versuch einer systematischen Untersuchung der Leitungsbahnen des sympathischen Systems. Archiv f. die gesamte Physiolog. Bd. 128, 8, 283. (Im Text nicht berücksichtigt.)
- Modena, Die Degeneration und Regeneration des peripheren Nerven nach Lösung desselben. Obersteiner's Arbeiten, XII, p. 242.
- Motrichanoff, Über Erkrankung des sensiblen Apparates auf neuropathischer Grundlage. Deutsch. Zeitschr. für Nervenk., XII, 98.
- Monakow, Gehirnpathologie, Nahrungsges. Pathol. u. Therapie, IX, 1, Wien 1897.
- Morat, Troubles trophiques consécutifs à la section des racines postérieures médullaires. Gazzetta des idég., 1890, 64.
- Derselbe, Le système nerveux et la nutrition des nerfs trophiques. Revue scientifique 1896, p. 233 u. 234, ref. Rev. neur., 1896, 244.

Derselbe, Centres nerveux fonctionnels et centres nerveux trophiques. *Rev. scientifique*, 1. XII, 94 p. 679, ref. *Rev. neurolog.*, 1895, p. 171.

Morpurgo, Sur les processus histologiques consécutifs à la névrite mixte. *Arch. ital. de biol.*, 1892, 11.

Naase, Über d. Einfluß der Nervendurchschneidung auf die Ernährung, insbesondere auf die Form u. Zusammensetzung der Knochen. *Pflügers Archiv*, 1881.

Müller, Ein Beitrag zur Kenntnis der Hypophyse universali. *Münchener med. Wochenschrift* 1903, 8, 1954.

Nerat et Doyen, C. R. d. l. Soc. d. l'Acad. d. Sciences, 1887.

Nekam, Über Innervation und Disposition. Fragen aus dem Gebiete der experimentellen Pathologie von S. Stricker, 1904, 1.

Neumann, Zur Frage der Sensibilität der inneren Organe. Funktioneller Nachweis sensibler Fasern im Nervus sympathicus und Vagus. *Centralbl. f. Physiologie* XXIV, 26, 8, 1213.

Derselbe, Z. Frage d. Sensibilität d. inneren Organe. Ein Beitrag zur Funktion des Plexus mesentericus. *Centralbl. f. Physiol.* XXV, 2, 8, 55.

Nissl, Über die Veränderungen der Ganglienzellen am Facialisstern d. Kanarienvogels u. Ausfallung des Nerven. *Allg. Zeitschr. für Psychiatrie*, Bd. 45.

Nathaniel, Atrophierungen u. Angiehungen. *Zeitschr. f. klin. Medizin* XX.

Nathaniel, E., Nerv und Muskel. Ergebnisse d. Anat. u. Entwicklungsge-schichte von Merkel u. Bonnet XI, 1901.

Obolensky, Neurotische Hodenatrophie nach Durchschneidung des N. spermatic. extern. *Centralbl. für die mediz. Wissenschaft*, 1897, 8, 497.

Okada, Experimentelle Untersuchungen über die causale Trophik der peripheren Nerven. *Obersteiners Arbeiten* XII, 8, 59.

Onuf and Collins, Experimental researches on the central localization of the sympathetic with a critical review of its anatomy and physiology. *Archiv. of anat. and psychopathol.* III, 1 u. 2.

Oppenheim, Über die senile Form der multiplen Neuritis. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1893, 35.

Derselbe, Skiosse und Nervenleiden. *Deutsche Ärztenzeitung*, 1900, 2.

Derselbe, *Lehrb. d. Nervenkranke*, V. Aufl.

Oppenheim u. Sommerling, Beiträge zur Pathologie der Tabes dorsalis u. der peripheren Nervenerkrankungen. *Arch. für Psychiatrie*, XVIII.

Orzechowski, Rückenmarkstetanus bei Angustabulidosen der oberen Extremitäten. *Obersteiners Arbeiten*, XIII, 8, 97.

Pagano, Une preuve de l'existence des nerfs trophiques. *Arch. ital. d. biologie* XLIII, 1, p. 16.

Parhon, Contribution à l'étude sur les causes de la vasoconstriction en emiplegie. *Bukarest* 1900. *Ref. Neurolog.* *Centralbl.* 1901, 8, 1000.

Parhon and Goldstein, *Rev. neurol.* 1905, 4.

Peterson, A case of synergomyelia combined with acroasphygia. *New York med. Record*, 1893, 11.

Potger et Bonin, *Jeux. d. Biol. de Bordeaux* 1911, 5, VI.

Petrina, Über cerebrale Muskelatrophie. *Präg. mediz. Wochenschrift*, 1899, 8, 511.

Pitres, Gangrène spontanée des artères chez un tabétique. *Rev. neurol.*, 1893, 1, 8, 292.

Pitres et Vaillard, Contribution à l'étude des névrites périphériques chez les tabétiques. *Rev. de méd.*, 1891, p. 574.

Potain, Varioles consécutives à une névralgie postigue. *Gaz. des hôp.*, 1883, 47.

Frantaux et Etienne, Troubles trophiques osseux et articulaires chez un homme atteint d'atrophie musculaire myopathique. *Revue de medec.*, 1894, p. 291.

- Quincke, Über cerebrale Muskelatrophie. Deutsche Zeitschr. f. Nervenk., IV, S. 209.
- Derselbe, Über cerebrale Muskelatrophie. Deutsch. Arch. f. Klin. Medizin, XXXIII, S. 492.
- Kahnmann, Zur Frage der retrograden Degeneration. Jahrb. f. Psych., 1900, XIX, 1.
- Raymond, Recherches expérimentales sur la pathogénie des atrophies musculaires, aux artères innervées. Rev. de méd., 1890, X, p. 375.
- Remak, Neuritis und Polyradialis. Notkungsbeil. speziell. Pathol. und Therapie, XI, 3.
- Rivers und Head, A human experiment in nerve division. Brain, November 1905.
- Roger, Influence des paralysies vaso-motrices sur l'évolution de l'érysipèle expérimental. Compt. rend. d. l. Soc. de Biol., 2. Mai 1890, p. 222.
- Roger, Pathogénie de la gangrène. Gaz. des hôp., 1901, p. 372.
- Romberg, Klinische Ergebnisse, 1846.
- Rosenfeld, Über die Beziehungen der vasomotorischen Neurose zu den funktionellen Psychosen. Archiv f. Psychiatrie XLVI, 1, 34.
- Rosenthal, O., Die Angioneurosen und die hämatogenen Hautentzündungen. Archiv f. Dermatolog. u. Syphil., Bd. 102.
- Roux, Verhdlg. d. Vereins für innere Mediz. zu Berlin, 1897/1898, XVII, p. 380.
- Roussier, Iconographie rouge et blanc. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière XXIII, p. 197, 199.
- Roux et Briss, Neurol. Jahrbuch, 1904, 290, 1905, 201.
- Sabrazès, Syringomyelie. Nouv. Iconogr. d. l. Salpêtr., XII, 1899, p. 489.
- Sabrazès et Cabanne, Hémiparésie faciale. Nouv. Iconogr. d. l. Salpêtr., 1898, 5.
- Sachalber, Keratitis neuroparalytica. Wien. Min. Wochenschr., 1893, p. 681.
- Salvioli, Sulla pretesa influenza trofica dei nervi sui tessuti del corpo animale. Archiv. per le scienze medic., 1897, 4.
- Salzer, Demonstration. Verh. d. Gesellsch. d. Ärzte in Wien 1910, 1910. Bei Wien Min. Wochenschr. 1910, S. 211.
- Sanson, Entzündung durch Nervenreizung. Königsberg. mediz. Jahrb., I, p. 2370.
- Derselbe, Über den Einfluß der Nerven auf die Entzündungsprozesse. Königsberg. med. Jahrb., I, S. 21-33.
- Derselbe, Die trophischen Nerven. Ein Beitrag zur Physiologie und Pathologie. Leipzig 1890.
- Derselbe, Über anatomische, hyperämische u. neuritische Entzündungen. Virchows Archiv, Bd. 121, S. 386.
- Derselbe, Artikel: Trophäoneurosen, Eakensbergs Realencykl., XX, II. Aufl. Derselbe, Das Gewebeschmerz bei Störungen der Innervation. Virch. Archiv, Bd. 113, S. 272.
- Sato, Les lésions des karyons matrices de la moelle épinière. Annot. 1898.
- Schaffer, Zur Lehre der cerebralen Muskelatrophie selbst Beitrag zur Topik der Neurosen. Monatschr. f. Psychiatrie u. Neurol., II, S. 80.
- Derselbe, Das Verhalten der Spinalganglienzellen bei der Tabes auf Grund von Nissl-Färbung. Neurolog. Centralbl., 1898, 2.
- Schäfer, Z. Lehre von d. cerebralen Muskelatrophie. Erlangen 1910.
- Schweib, Beitrag zur Kenntnis der Geschmacksinervation u. der gustatorisch-Asymmetrisierung. Zeitschr. für Klin. Mediz., 1896, XXVIII, S. 441.

Schiff, Recherches sur l'influence des nerfs sur la nutrition des os. C. R. d. Séances de l'Académie. d. scienc., XXXVIII.

Derselbe, Physiologie de la digestion, I, p. 235.

Derselbe, (Experimentelle Hemiatrophie faciale.) Rev. méd. d. l. Suisse romande, 1891, 7.

Schlossinger, Über eine durch Gefäßerkrankungen bedingte Form der Neurose. Neurolog. Centralbl., 1886, 8, 578 u. 614.

Derselbe, Zur Kenntnis d. Akromegalie u. der akromegalischen Zustände. Wien. Med. Wochenschr., 1892, 19.

Derselbe, Hydrops hypostrophos und Hydrops articularis intermittens. Mitt. u. d. Grenzgebieten der Medizin u. Chirurg., V, 8, 441, 1890.

Derselbe, Über Hämorrhagien an der Haut bei centralen Affektionen des Nervensystems. Deutsche med. Wochenschrift, 1897 27, 8, 1068.

Schmoll, Ein Fall vollständig isolierter Trigeminuslähmung nebst Bemerkungen über d. Verlauf der Gschmacksfasern der Chorda (sympati) und über trophische Störungen. Deutsche Zeitschr. f. Nervenh., VI, 8, 435.

Schnell, Lésions radiculaires d'origine nerveuse. Thèse de Paris, 1894. Nach Gley et Mathieu.

Schwimmer, Die neuropathischen Dermisosen. Wien 1883.

Seeligmüller, Verstärktes Längenwachstum d. Knochen bei spinaler Kinderlähmung. Centralbl. für Chirurg., 1878, 29.

Seydel, F., Ein Beitrag zur Lehre von der Ketall. Isotriparalyt. Arch. f. Ophthalmol., XLVIII, 8, 142.

Souques et Harvier, Nécrose sénile. Revue neurolog., 1898, 56.

Spiller, G., Pathological report on a case of dermatitis vesiculobullousa et gangrenosa cutillis maxillis (Birking) with a consideration of the relations of vascular and nervous changes to spontaneous gangrene and Raynaud's disease. Journ. of experim. Medicine V, 1, 1900.

Steiner, Über die Muskelatrophie bei der cerebralen Hemiplegie. Deutsch. Zeitschr. f. Nervenh., III, 8, 29. (Mit Literaturangaben.)

S. Stier, Experimentelle Untersuchungen über d. Verhalten der quergestreiften Muskeln nach Läsionen des Nervensystems. Archiv für Psychiatric, XXIX, 8, 229. (Mit ausführlichem Literaturverzeichnis.)

Steud, Über trophische Nerven nebst einigen einschlägigen Versuchen an Kaninchen. I.-D. Halle.

Strauß, Zwei Fälle von isolierter peripherischer Lähmung des N. musculocutaneus. Berl. Med. Wochenschr., 1897, 37.

Strücker, Über Veränderungen der motorischen Rückenmuskeln nach Ausreifung der peripheren Nerven. Jahrb. f. Psychiatric, XXI, 1.

Sudeck, Ein operativ gebildeter Fall von traumatischer reflektarischer Neurose der Hand. Monatsschrift f. Unfallheilk., VII, 60, 1910.

Derselbe, Über die Muskelatrophie (Reflextheorie u. Inkontinenztheorie). Deutsch. med. Woch., 1897, 22, 8, 881.

Sulzer, Anatomische Untersuchungen über Muskelatrophie articularis Ursprung. Basel 1897. Berl. Neurol. Centralbl., 1897, 8, 845.

Tedesko, Über Knochenatrophie bei Syringomyelie. Deutsche Zeitschrift f. Nervenh., XXVI, 8, 350.

J. Thomas et Thamesco, Considérations sur l'étiologie générale des dermatoses avec une étude spéciale sur le rôle du système nerveux dans la pathologie de quelques affections cutanées. Thèse de Paris, 1890. Berl. Annot. de Derm., 1900, 8, 1476.

Tscherniak, Über tonische u. trophische Innervation. Folia neurobiol. III, p. 676.

- Trendelenburg, Zur Frage der trophischen Nervenfunktion. *Neurol. Centralbl.* 1906, 8, 390.
- Vajon, Ein Beitrag zur Anatomie u. Physiologie des Spinalganglions. I.-D. München 1883.
- Virehow, Handb. der speziellen Pathologie, 1854, 8, 319—323.
- Wernicke, Über neurotische Atrophie. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1889, Nr. 28.
- Vulpian, Sur les modifications qui suivent les lésions des racines sous l'influence de la section des nerfs. *Arch. d. physiol.*, II, 1893.
- Derselbe, Leçons sur l'appareil vasomoteur. Paris 1873.
- Warrington, Further observations on the structural alterations observed in nerve cells. *Journal of physiol.* XXIV, 8.
- Weber, Centralblatt für die med. Wissenschaften, 1864, 8, 147.
- Weir-Mitchell, Des lésions des nerfs et de leurs conséquences, Traduit par M. Dastre, Paris 1874.
- Wilbrand und Sanger, Die Neurologie des Auges. Wiesbaden 1901, II, 1 u. 8, 305 ff. (Aufschluß über Linsenerkrankungen über Keratitis neuroparalytica).
- Wittich, The influence of the nervous system on skin diseases. *Medical News*, 1897, II, 2. August.
- Witte, The bearing of the neurotrophic function on cutaneous conditions. *Philad. med. Journ.* 25, 1, 1900.
- Wittich, Über troph. Störungen bei primären Gelenkerkrank. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1893, 28.
- Zahn, Akute Hautablösungen bei progressiver Paralyse. *Allg. Zeitschr. f. Psych.* 34, 1907, 8, 551.
- Ziehen, Über den Sympathicus. *Vortr. im Verstr. f. innere Mediz. in Berlin* 1890.

Zweites Kapitel.

Die Akroparästhesien und verwandte Zustände.

- Alibert, Contribution à l'étude du mal de Bright. Thèse de Paris 1836.
- Armandin, Contribution à l'étude de l'acroparésie. Thèse de Paris 1899.
- Artner, Max, Anoparästhesia. *Medic. Council* 1897, XII, 271—278.
- Gilbert (Ballet), L'acroparésie. La semaine médicale. 1896, XV, p. 473.
- Ranpp, Acroparésie avec troubles à topographie radiaire et dissociation de la sensibilité. *Revue neurlog.* 1901, p. 98.
- Singer, Über eine eigenartige Form von Parästhesie. *Bösch. ärztliche Zeitschr.* 1920, 8, 40.
- Borsky, Über eine weniger bekannte Neurose der Extremitäten, besonders der oberen. *Centralbl. f. Nervenkranh.*, 1898, 8, 31.
- Beuchaud, Un cas d'acroparésie avec troubles de la sensibilité objective à topographie segmentaire. *Revue neurlog.* 1901, p. 626.
- Brisaud et Lande, Acroparésie. *Urticae, tumeurs pustuleuses.* *Revue de médecine.* 1901, p. 542.
- Braun, Neuropathologische Mitteilungen. *Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 56, 8, 799.
- Bruce, Some forms of paralysis dependent upon peripheral neuritis. *The Lancet*, 1888, II, p. 163.
- Chabot, Thèse de Lyon, 1896 (cit. nach Lecheboulet).
- Collins, John, et al., *nerf and mental diseases.* August 1900.
- Collins, Acroparésie (the parasthetic syndrome) the analysis of one hundred cases. *New York med. Rec.* 1901, 51, p. 814.

Curschmann, Über vasomotorische Krankheitsfälle bei echter Angina pectoris. Deutsche med. Wochenschrift 1906, 32, S. 1125.

Derselbe, Über Angina pectoris vasomotoria. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilk. XXVIII, 1903.

Dejerine et Egger, Les troubles subjectifs de la sensibilité dans l'acroparésie et leur topographie radulaire. Revue neurolog. 1904, p. 54.

Dionisioy, Union médicale, 1886, p. 396.

Edgeworth, Acroparesthesia. The Lancet 1900, I, p. 1756.

Edinger, Behandlung der Krankheiten im Bereich der peripheren Nerven. Handbuch der speziellen Therapie von Pötzsch-Stünzling, 4. Aufl. Bd. V, S. 654.

Egger, L'acroparésie. Une lésion du nerf ou du péricér. Revue neurolog. 1906, p. 171.

Engelskjön, Die ungleichartige therapeutische Wirkungsart der beiden elektrischen Stromesarten. Archiv für Psychiatrie, XV, S. 306.

Ferris, Sull'acroparésia. Il Morgagni, 1889, p. 201—223.

v. Frankl-Hochwart, Akroparästhesien. Neurolog. spec. Patholog. und Therapie, 1908, XI, 2, II. Aufl. 1904.

Friedmann, Zur Akroparästhesie. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1903, 5, 420.

Fry, Acroparesthesia. Philadelph. med. journal. 13, X, 1862.

Gallais, Bulletin médical. 1888, p. 1162.

Glorieux, A propos de l'acroparésie. Ann. d. l. police. à Paris. 1886, 4, 388.

Ham, Etude sur l'acroparésie. Lille 1905.

Hackovic, Über die Akroparästhesien. Wien, Klinische Rundschau. 1897, 42.

Jones, Studies on functional disorders. 1870, p. 450.

Lagier, Über eine besondere Form von Parästhesien der Extremitäten (Akroparästhesien Schultze). Neurolog. Centralblatt, 1883, 188.

Lereboullet, L'acroparésie. Ann. hebdomad. 1868, p. 561.

Levin, Acroparesthesia. A study of two hundred cases. Med. Record LXX, p. 331.

Lévi et Wernser, Névrite sensitive-motrice des extrémités par abas lésion des nerfs. Revue neurolog. 1904, p. 1273.

Martin, Über eine Quelle des Zustandskomplexes der sehr complizierten Nervenleiden. Speyer 1885.

Möller, Behandlung der vasomotorisch-angiolischen Neurosen. In Pötzsch-Stünzling's Handbuch der spec. Therapie, Bd. V, S. 492.

Mondio, Contribuzione allo studio dell'acroparésia. Riv. ital. di neuropatol., psichiatra ed elettroterap. III, 241, 1910.

Peter Mokr, Inaug.-Diss. 1886. Bonn (lat. nach Schultze).

Muir, Lancet 1885, II, p. 305.

Negri, Contrib. à l'étude des acroparésies. Bollet del Policl. di Torino. 1905 u. 1906.

Nataeq, Norsk. Mag. f. Lægevid. 1886, XI, 362.

Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkranh., V. Aufl.

Ormerod, On a peculiar numbness and parest of the hands. St. Bartholomew's Hosp. Rep., 1888.

Peretz, Sensibilitätsstörungen bei d. multiplen Sklerose des Gehirns und Rückenmarks. I.-D. Berlin 1910.

Pfeiffer, Gültlinger. Berl. klin. Wochenschr., 1891, S. 599.

Pick, Recherches sur la pathologie des acroparésies. Revue neurolog. 1904, p. 12.

Pathani, Series of cases of paresthesia mainly of the hands of periodical occurrence and possibly of vasomotor origin. Arch. of medicine. 1894.

Raymond et Courtoislemont, Nécrite professionnelle chez un vecker. *Revue neurolog.* 1904, p. 500.

Rizzman, Trigger-finger (digital tendons) associated with acroparesthesia. *The Philadelphia Polyclinic*. VII. 18, vol. Neurol. Jahrbuch, II, p. 867.

Rosenda, Pour la monition des acroparesthésies. *Recherches sur la sensibilité objective*. *Archiv de psychiatrie, neuropathol. exp.* XXV, 1904 p. 628. *Revue neurol.* 1905, p. 339.

Rosenbach, Die Aufreißung der Endphalangen der Finger, eine bisher noch nicht beschriebene trophische Störung. *Gestützt. f. Neurologik.*, XIII 1899, S. 199.

Sandbery, On a special form of numbness of the extremities. *The Lancet*, 1889, II, p. 422.

Savill, A clinical lecture on acroparesthesia, erythromelalgia, odonodactylia and other angioneurotic disturbances. *The Lancet* 1901, I, p. 1513.

Schmidt, Zur klinischen Pathologie des peripheren Nervensystems bei Lungen-tuberkulose mit spezieller Rücksicht auf Akroparesthesien. *Wien. klin. Wochenschr.*, 1899, S. 721.

Schneyer, *La Roumisme médicale*, 1897, 434.

Schulze, Über Akroparesthesie. *Deutsche Zeitschr. f. Neurologik.*, 1892, III, S. 300.

Senator, Erkrankungen des Nerven. *Nothnagel's spec. Path. and Therapie*, XIX, 1, S. 75.

Schuster, *Archiv f. Psychiatrie*. XXXV, S. 242.

Shaw, Vascular and toxic acroparesthesia or sensory disturbances of the extremities occurring independently of primary disorder of the nervous system. *The Practitioner* 1903, p. 156.

Simons, Polkyonographische Untersuchungen der Gefäßreflexe bei Nerven-kranken. *Arch. f. Anat. u. Physiol. Phys. Abt. Suppl.* 1900, S. 429.

Sinkler, On a form of numbness of the upper extremities. *Philad. med. Times*, 1884.

Derselbe, The treatment of acroparesthesia (numbness of the extremities). *Medical News*, 1894, II, p. 178.

Solis-Cohen, Vasomotor ataxia. A contribution to the subject of idiosyncrasy. *Am. Journ. of medic. scient.*, Bd. 107, 1894, p. 130.

Sommer, Akroparesthesien nach Trauma. *Berliner klin. Wochenschrift* 1902, 40, S. 929.

Souza-Leite, *De l'erythromelgie*. Paris 1890.

Sternberg, Die Akromelgie. *Nothnagel's spec. Path. u. Therapie*, VII, 2, S. 82.

Trope, Über Akroparesthesien. *Deutsche med. Wochenschrift* 1910, 19, S. 822.

Trombert, Contribution à l'étude de la sensibilité objective dans l'erythromelgie. *Thèse de Paris* 1906.

Verstraeten, G., *L'erythromelgie*. *Revue de méd.*, 1889, p. 372.

Weber, F. Parkes, Sensory tetany, vasomotor tetany. *British med. Journal*, 1911, 25, 11.

Whiting, A clinical lecture on acroparesthesia. *The Med. Press and Circular* LXXXIII, 1902, 15, 388.

Widl, Über Akroparesthesien nach Trauma. *Ärztlich. Sachverständigen-Zeitung*, 1901, 7.

Wunderlich, Die Pathologie und Therapie der klinischen Neurose. *Deutsche Praxis*, 1897, 7.

Wolleraux, Contribution à l'étude de l'erythromelgie. *Thèse de Paris*, 1899.

Drittes Kapitel.

Die Erythromelalgia.

Athard et Lévi, Erythromelalgia, Maladie de Raynaud. *Sémiologie nerveuse* von Gilbert et Thénot. 1911, p. 563.

Areangeli, Eritromelgia ed oncomelucia. *Rivista d. Soc. Lanza, di sped. di Roma* 1905, XXV., p. 85—91.

Auché et Lespinaux, Sur un cas d'Erythromelalgia ou névrose congestive des extrémités. *Rev. de médecine*, 1889, Bd. IX, p. 1049.

Auerbach, Über Erythromelalgia. *Deutsche Zeitschr. f. Nervenh.*, 1897, XI, 1 u. 2.

Baginsky, Verhandlungen der Berl. mediz. Gesellsch., 1892, S. 241.

Bauer, Eine atypische Neurome. *Berl. klinische Wochenschr.*, 1894, 5.

Benoist, Étude sur l'Erythromelalgia. Thèse de Paris 1911.

Berbez, P. et H., Sur l'Erythromelalgia. *La France médicale*, Paris 1887, p. 161—163.

Bersharadt, Ein Fall von Erythromelalgia. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1892, S. 1129.

Bignone, A contributo allo studio clinico dell'Eritromelgia, *Gaz. di ospedal.*, 1894, XV, p. 1122.

Blaschko, Symmetrische Erythrodermie der Arme. *Monatsh. für Dermatol.*, 1905, 1, S. 495.

Bowen, A case of erythromelalgia. *Journal of cut. diseases* 1908, XXIV, 486.

Brissaud, Leçons sur les maladies nerveuses (II. série), Paris 1899. Leçon III, VII, VIII, XXI.

Buch, Die Sensibilitätsverhältnisse des Sympathicus und Vagus mit besonderer Berücksichtigung ihrer Schmerzempfindlichkeit in der Bauchhöhle. *Archiv für die gesamte Anatomie und Physiologie, Physiol. Abt.* 1901, S. 197.

Camp, A case of erythromelalgia. *The Journal of nervous and mental disease*, 1904, XXXI, p. 548.

Carlisle, Case of erythromelalgia. *Glaug. med. Journ.*, I, 1886, p. 438.

Carr, Case of erythromelalgia. *St. Thomas Hosp. Rep.* London 1864, XXXI, p. 86.

Cavazzini e Eracci, Sul reflexo vasomotorio nell'eritromelalgia. *Il Morgagni*, 1900, I, p. 50.

Charles, Sur un cas d'Erythromelalgia. *La Pratique médicale*, Paris 1892, p. 307.

Chill, Erythromelalgia. *The Practitioner* 1910, p. 845.

Collier, James, The occurrence of erythromelalgia in diseases of the spinal cord; an account of ten cases. *The Lancet*, 1898, II, p. 491.

Cristiani, Due casi di eritromelalgia (paralisi vasomotorie delle estremità) in alienati di mente. *Riform. medic.*, 1894, X, 4.

Crocker, Case of erythromelalgia. *British Journ. of dermatol.*, 1886, I.

Délio, Un cas d'Erythromelalgia. *Arch. vas. de Pathol.*, I, 2, p. 204, ref. *Schmidt's Jahrb.* 252, p. 131. (Derselbe Fall wie der folgende.)

Derselbe, Über Erythromelalgia. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1896, No. 37.

Dide, Trouble trophique intermédiaire entre les syndromes de Raynaud et celui de Weir-Mitchell chez une malade atteinte de pseudotumeur catartique. *Rev. neurol.* 1904, p. 893.

Dogiel, Die sensiblen Nervenendigungen im Hirne und den Blutgefäßen der Saugtiere. *Archiv f. mikroskopische Anatomie*, 52, S. 41.

- Dünger, Ein Fall von Erythromelalgie. *Der prakt. Arzt*, XXXIV, 10, ref. *Monatsh. für Dermatol.*, 1884, 19.
- Eddy, Erythromelalgia. *British med. journal*, April 1900.
- Eichhorst, *Handb. der spez. Pathologie und Therapie*, 1896.
- Elmer, A case of erythromelalgia. *Medical society of the state of New York, Med. Record*, LI, 1897, p. 172.
- Elmer, H. L., Recent experiences with erythromelalgia. *Medical News* 1901, LXXVIII, 466.
- Engelen, Ein Fall von Erythromelalgie kombiniert mit Basedowischer Krankheit. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1907, S. 1634.
- Engelskjön, Die ungleichartige Wirkungsweise der beiden elektrischen Stromesarten mittels elektrodiagnostische Gesichtsfeldmessung. *Arch. für Psychiatrie*, Bd. XV und XVI.
- Erb, Über das intermittierende Hinken und andere nervöse Störungen infolge von Gefäßerkrankungen. *Deutsche Zeitschr. für Nervenerkrankh.*, XIII, 1898, S. 1.
- Eulenburg, Über Erythromelalgie. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1893, 60.
- Derselbe, Artikel Akrotynie in *Eulenburgs Realencyklopädie*, III. Aufl., Bd. I, S. 260.
- Derselbe, Artikel Erythromelalgie in *Eulenburgs Realencyklopädie*, III. Aufl., Bd. VII.
- Finger, Fall von Erythromelalgie. *Veröff. d. Wien. dermatol. Gesellsch.*, ref. *Arch. f. Dermat. u. Syph.* XXXVIII, S. 34.
- Fischer, Ein Fall von Erythromelalgie. *St. Petersburger med. Wochenschr.*, 1895, S. 70.
- Fujitwara, Ein Fall von Erythromelalgie (japanisch). *Ref. Neurologia* II, p. 101.
- Galloway, A case of erythromelalgia in a woman aged sixty six years. *British journal of dermatol.* 1909, XXI, p. 223.
- Gelpke, Vorstellung eines Falles von Erythromelalgie. *Korresp.-Bl. für Schweizer Ärzte*, 1886, 1.
- Gerhardt, Über Erythromelalgie. *Berliner klin. Wochenschrift*, 1892, p. 1125.
- Gerrard, Burning foot or Erythromelalgia tropica. *The Ind. med. journal of med. sciences* 1913, Sept., p. 122.
- Glagolew, *Veröff. d. Ärzte-Gesellsch. von Sankt Petersburg* 1892/1893.
- Glorieux, Über Erythromelalgie und congestive Neurase der Extremitäten. *La pédiatrique*, 1895, 33.
- Goette, Ein eigenartlicher Fall von Erythromelalgie. *L.-D. Leipzig* 1903.
- Goldscheider, Die Behandlung der arteriosklerotischen Schmerzen. *Zeitschrift f. physikalische und praktische Therapie*, XIII, S. 1909.
- Gordon, Trophomalous of the hands allied to erythromelalgia and to Raynaud's disease. *Am. Journal of med. sciences*, 1897, 1, p. 471.
- Graves, *Clinical lectures*, 1864, p. 826.
- Greuter, Affection des extrémités non décrite par les auteurs. *Bordeaux medical* 31, IX, 71.
- Halloponnet Laroit, Congrès pour l'avancement des sciences, Marseille 1891, in: *Arch. Gille de la Tourrette. Traité de Physique*, II, p. 483.
- Hamilton, Report of a case of erythromelalgia with the postmortem finding. *Journal of nervous and mental disease*, 1904, 4, p. 212.
- Hann, A case of erythromelalgia. *The Lancet*, 1897, II, p. 1156.
- Halsband, Et Tittable of Erythromelalgia. *Reep. Tidsskr. Kjöbenhavn*, 1893, p. 60.
- Reichmann, Zwei Fälle von akuter Erythromelalgie. *Berl. klinische Wochenschr.* 1885, S. 1186.
- Heber, Die Erkrankungen des Nagel. *Berlin* 1900, S. 200.

- Benoch, Gesellschaft der Charité-Ärzte. Sitzung vom 30. VI. 92.
 Heß und Königstein, Über Neurosen der Hautgefäße. Wien. klin. Wochenschrift, 1911, No. 32.
 Hilbert, Über Endothelentzündung bei Erythromelalgie. Wochenschrift für Therapie u. Hygiene des Auges. Dresden 1906, II, p. 193.
 Hirsch, Ein Fall von Erythromelalgie. Neurologia, IV, 1905.
 Hughes, The Alienist and Neurologist, 1905, XXVII, 1, p. 93.
 Jacoby, Fall von Erythromelalgie. New Yorker med. Monatschr. 1909, Juli.
 Kahane, Erythromelalgie, Sammelreferat. Zeitschrift für d. Grenzgeb. der Med. und Chirurgie, 1910, 1, S. 340.
 Kanok, A case of erythromelalgia. The Journal of the American med. Association, LI, p. 2157.
 Kass, Ein Fall von Erythromelalgie. Deutsche Mediz. Wochenschrift, 1902, Vereinsbeilage, S. 262.
 Kelly, Bruce, U., A case of erythromelalgia. The Lancet 1904, I, p. 154.
 Kloss, Fall von Angiomaurose mit Symptomen von Erythromelalgie. St. Petersburger med. Wochenschr. 1909, S. 345.
 Klingmüller, Über Erythromelie. Festschrift zu Ehren von Kaposi. Wien 1910.
 Koch, Berl. klin. Wochenschr., 1892, S. 1146.
 Koppens, Primäre Erythromelalgie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. 1909, 24. Jahrg., Über Störungen der Schmerz- und Temperatursensibilität infolge von Erkrankungen des Rückenmarks. Arch. f. Psychiatrie. XXVIII, 733.
 Landgraf, Gesellschaft d. Charité-Ärzte, 30. 6. 1892.
 Lannois, Paraplsis vasomotrice des extrémités ou Erythromelalgie. Thèse de Paris 1890.
 Lannois et Perot, Erythromelalgie saisie de gangrène des extrémités avec autopsie. Gangrès de Bruxelles, 1903, 1.—8. S., Rev. neur., 1903, p. 503.
 Derselben, Erythromelalgie saisie de gangrène des extrémités avec autopsie. Revue de méd. XXIII, 1903, p. 824.
 Lassar, Berl. klin. Wochenschr., 1900, S. 593.
 Leotta, Sur l'erythromelalgie. X. Congrès de la société italienne de chirurgie. Rome, octobre 1902. Riform. med. 1907, p. 1418.
 Lévi, D'une forme hystérique de la maladie de Raynaud et de l'erythromelalgie. Arch. d. neurol., XIX, 1905, 1.
 Lévi, L., De l'erythromelalgie, syndrome de Weir-Mitchell. La presse médicale, 15. IX. 1897.
 Lewin, G. and Th. Benda, Über Erythromelalgie. Berl. klin. Wochenschr., 1894, S. 1311.
 Lier, E. H. van, Erythromelalgia. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. 1907, I, p. 1216.
 Lohr, Erythromelalgia. Budap. orv. szeg. 1906, IV, p. 159.
 Lombroso e Ottolenghi, Eritromelalgia in una infermiera. Arch. di psichiatrie, 1888, p. 592.
 Luzzato, Eritromelalgia sintomatica. La settimana medica, 16. 11, p. 289, ref. Arch. für Dermat. u. Syphilis, 1, p. 274.
 Lysch, Erythromelalgia. Journal of Med. sciences of Portland, 1903, X, p. 73.
 Mackol, Berl. klin. Wochenschr., 1892, 14, p. 1319.
 Mackenzie, Diskussion zu Sturges Vortrag in der Clinical Society of London.
 Maier, Zwei merkwürdige Fälle von Angiomaurose. Wien. med. Presse, 1878, 23.
 Martucci, Sulle nevrosi vasomotorie e sensitive della cute plantare. (Eritromelalgia di Weir-Mitchell). Giorn. ital. di salute, ven. XXVIII, 1887, p. 297.

- Meyer, Deutsch. med. Wochenschr., 1894, 24.
- Mills, Vasomotor and trophic affection of the fingers. *Americ. Journ. of med. sciences*, 1928, II, p. 431.
- Mintz, C. H., Two cases of erythromelalgia. Tr. *Lancet Co. Med. Society*, Wilkesbarre, 1930, XIII, 129.
- Möbius, Behandlung der vasomotorisch-trophischen Nerven. In *Neurolog. Statistings Handb. d. spez. Therap.*, Bd. V, S. 491.
- Morél-Lavallée, *Gazette des hôpitaux*, 1891, S. 880.
- Morgan, Erythromelalgia. *The Lancet*, 1893, I, p. 18.
- Müller, Allgemeines Klinisches über die Empfindungen in unseren inneren Organen. Vortrag I. Jahresversammlung deutscher Nervenärzte, Dresden 14—15. IX. 1905.
- Mutchnick, Ein Fall von Erythromelalgia. *Schweizerische med. Wochenschr.*, 1894, 7. Bd. Allg. med. Centralztg., 1894, 8. 495.
- Neill, Erythromelalgia. *West-Virginia med. Journal*, Dec. 1908.
- Nieden, Über Erythromelalgie und Angerben. *Archiv für Augenheilk.*, XXVIII, 1.
- Nolen, Erythromelalgia. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, 1894, 12. Bd. Centralbl. für Nervenheilk., 1895, 8. 96.
- Oppenheim, Intermittierendes Hinken u. neuropathische Diathese. *D. Zeitschrift f. Nervenheilk.*, XVII, 8. 317.
- Oty y Enquerda, Erythromelalgia. *Revista de med. y chir. pract.*, Madrid 1901, Nr. 478.
- Page, H. St. *Bartholem. Hosp. Reports*, 1874, p. 67.
- Fajot, Über Erythromelalgie. *Progr. med.-chir. Presse*, 1896, 3. Anz. *Gyógyászat*, 1896, 51.
- Pasquale, Bomeo, Deux cas d'érythromelalgie ou névralgie rouge. *Gaz. degli ospedali e delle cliniche*, XXIX, p. 1386, 1908.
- Pedrazzini, Erythème par microcoque tétragone simulant l'érythromelalgie. *Gaz. degli osped. e delle cliniche*, XXVII, No. 45, 22. 4. 1906.
- Personali, Beitrag zur Ätiologie der Erythromelalgie. *Monatsh. für prakt. Dermatol.*, XVIII, 1894, S. 406.
- Derselbe, Nuovo contributo allo studio dell'eritromelalgia. *Riform. med.*, XV, 1899, p. 367.
- Perzoli, Ein Fall von Erythromelalgie. *Wien. klin. Wochenschr.*, 1906, No. 65.
- Pick, Erythromelie. 66. Versammlung Deutsch. Naturforscher und Ärzte in Wien. *Bd. Monatsh. für Dermatol.*, 1904, 2.
- Pekrowsky, *Wrasch* 1894.
- Paspelov, Trophische Störungen der Haut bei spinaler Gliosis oder Syringomyelie. *Arch. f. Dermatol. und Syph.*, XLIV.
- Patain, Angiémie locale des extrémités et érythromelalgie chez un même sujet. *Journ. de méd. et chirurgie pratique*, 10. I. 1895.
- Prentiss, *New York med. Record*, 1897, LII, p. 39.
- Derselbe, Two cases of erythromelalgia (Mitchell). *Transact. of the association of the americ. physicians*, XII, p. 310.
- Quinby, Treatment of trophic nerve lesions: study based on a case of mal perforans, of lumbic paralysis and of erythromelalgia. *Bost. med. and surg. Journal*, 1906, 27, 1.
- Remak, Neuritis and Polyneuritis. *Neikungsh. spez. Pathol. und Therap.*, XI, 8. 3. p. 157.
- Reynolds, H. B., Erythromelalgia with report of a case. *Occident med. Times*, 1903, May.

Bolleston, A case showing some of the features of erythromelalgia and of Raynaud's disease. *Lancet* 1898, I, p. 781.

Bossa, Über Erythromelalgie. *Berl. klin. Wochenschr.* 1889, No. 49, p. 1081.

Rees and Bury, On peripheral neuritis, 1899, p. 357 u. 383.

Reit, Verhandlungen des Vereins für innere Medizin, Berlin 1898, XVII, S. 378.

Rudaki und Hornowski, Ein Fall von Erythromelalgie. *XL Kongreß polnischer Ärzte und Naturforscher in Krakau*. 30. VII. 1911 und Erythromelalgia. *Neurologi polskiej*, 1912.

Sachs, Erythromelalgia and allied diseases. *Journ. of nerv. and mental diseases* 1899, p. 377. (Mit anschließender Diskussion.)

Sachs und Wiener, Die Erythromelalgie. *Deutsche Zeitschr. für Nervenh.* XV, p. 268. Siehe auch *Journ. of nerv. and ment. diseas.*, 1899, p. 349.

de Sanctis, G., Contributo alla casistica dell' eritromelalgia. *Gli incurabili*, Napoli, 1899, X, 144—156.

Savitt, Th. D., Lectures on hysteria and allied conditions. London 1909, Lecture X, p. 218.

Schenk, Klinische Untersuchungen des Nervensystems in einem Falle von Erythromelalgie. *Wien. med. Presse* 1894, 45.

Schlesinger, Beiträge zur Klinik der Rückenmarks- und Wurzeltruncen. *Jena* 1898, S. 136.

Schmidt, Erythromelalgie. *Wiener klinisch. Wochenschr.* 1892, S. 162.

Schütt, Erythromelalgie und Hautatrophie. *Dermatol. Zeitschrift*, VI, S. 297.

Schmierheid, Ein Fall von Erythromelalgie. *Medezinskoje obozrenje* 1897, 10.

Deruelle, Un cas d'erythromelalgie. *Revue russe de médecine*, 1897, p. 807.

Schwarz, Fall von Erythromelalgie. *Ungar. med. Presse*, 1897, II, p. 23.

Darcsyhe, Erythromelalgie bei einem Kinde. *Ungar. med. Presse*, 1900, S. 32.

Seeligmüller, Lehrb. d. Krankheiten der periph. Nerven. Braunschweig 1883, S. 377.

Senator, Über Erythromelalgie. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1892, S. 1127.

Serie-Basile, L'eritromelalgia nell'infanzia. *Pediatrics*, VI, p. 190.

Severina, Un cas de ritromelalgia. *Gaz. degli ospedali e delle cliniche*. 12. Nov. 06, XXVI, p. 1438.

Seymour, *Medical Record*, 1890.

H. Batty Shaw, The morbid anatomy of erythromelalgia based upon the examination of the amputated extremities of three cases. *Brit. med. Journal*, 1903 I, p. 602.

Shields, Erythromelalgia. *Cincinnati Lancet clinic.*, 1903, Bd. 51, p. 608.

Shimazono, Ueber Erythromelalgie, zugleich ein Beitrag zur hydropischen Erweichung des Rückenmarks. *Deutsche Zeitschrift für Neurologik*. XLII.

Sigerson, Note sur la paralysie caennatique générale des membres supérieurs. *Progrès médical* 1874, p. 229.

Souza-Leite, De Varicombalgia, Paris 1890, p. 112.

Spiller, Diskussion zu dem Vortrag von Sachs: erythromelalgia and allied diseases. *Phil. neurol. Society* 27. III. 1899. In *Journ. of nerv. and mental diseas.* XXVI, p. 377. (Siehe dort auch die Bemerkungen von Sinkler, Sailer, Esner u. a.)

Städler, Zwei Fälle von Erythromelalgie bei Kindern. *Centralblatt f. Kinderheilk.*, XI, S. 169.

Staub, Über Erythromelalgie. *Monatsh. für prakt. Dermatol.*, XIX, 1894, S. 10.

Sternberg, Die Akromegalie. *Nichtingeh. spez. Pathol. u. Therapie*, VII, 2. Wien 1897, S. 85.

- Stillé, siehe Weir-Mitchell. *Amer. Journ. of med. sciences*, 1875, II.
- Straus, *Soc. médic. des hôp.* 1880, 25, III. Ref. *Gazette des hôp.* 1880 p. 235.
- Strong, A case of rare vasomotor distichæmia in leg. *British med. Journ.* 1879, I, p. 793.
- Taubert, Erythrodalgie. *Deutsche med. Wochenschr.* 1900, II.
- Taniguchi, A case of erythrodalgie. *Gan Igaku Kwaï Zasshi*, Tokyo 1899, p. 196 (zit. nach Elsner).
- Tausiljew, Ein Fall von Erythrodalgie. *Med. obs.*, 1904, 8, 158.
- Twardzinsky, Ein Fall von Erythrodalgie. *Wratck*, 1900, Nr. 40.
- Vannini, Contributo allo studio dell' eritrodalgie. *Bullet. delle scienze mediche di Bologna*, 1896, VII, p. 655/677.
- Voorhies, Erythrodalgie. *Journal of amer. med. association*, 1907, I, Juni.
- Voorhies, Some notes on a case of erythrodalgie with treatment. *Med. news*, Ed. 85, p. 237.
- Vulpian, Leçons sur l'appareil vasomoteur. Tome II, p. 63.
- Weber, Polycythæmia and erythrodalgie. *Brit. med. Journ.*, 1904, I, p. 1017.
- Dersellie, A case of erythrodalgie illustrating its relation to Raynaud's symptom complex, diffusion of the phenomena during period of exacerbation; *Brit. Journal of dermat.*, XVI, 1904, p. 79.
- Weir-Mitchell, On a rare vasomotor nervous of the extremities. *Philadelphia med. Times*, 1875, p. 81.
- Dersellie, On a rare vasomotor nervous of the extremities and on the maladies with which it may be confounded. *Amer. Journ. of med. sciences*, 1875, II, p. 15.
- Dersellie, Erythrodalgie: not neuralgia of the extremities — vasomotor paralysis of the extremities — terminal neuritis. *The medical News*, 1893, p. 197.
- Dersellie, Clinical lessons on nervous diseases. *Philadelphia* 1897. (Book 58).
- Weir-Mitchell and Spiller, A case of erythrodalgie with microscopical examination of the tissue from amputated toe. *Amer. Journ. of med. sciences*, January 1899.
- Weil, Ein Fall von Erythrodalgie. *Wien. Mit. Wochenschr.*, 1896, 47.
- Wendel, Erythrodalgie. *The medical Record*, 1890, II.
- Wierchubski, Kasusitkie eritrodalgii. *Wratck*, St. Petersburg, 1904, III, p. 547.
- Woodcut, *Philadelphia neurological society* 28. IV. 1884. (Zit. nach Lewin-Benda).

Viertes Kapitel.

Die Raynaud'sche Krankheit und verwandte Zustände.

- Abetronbie, On some points in connection with Raynaud's disease. *Archives of pediatrics*, 1886, III, p. 367.
- Abraham, Raynaud's disease. *The Post-Graduate* XXI, p. 439, 1906.
- Ailfrick, Observations on two cases of Raynaud's disease. *Brit. med. Journ.* 1888, II, p. 1208.
- Aitken, A case of Raynaud's disease associated with uræmia. *The Lancet* 1896, II, p. 875/876.
- Aka et Labin, Maladie de Raynaud à localisation locale et articulaire et erythrodalgie chez un enfant. *Nouvelle Iconogr. de la Salp.*, 1911, p. 328.

- Albers-Schönberg, Röntgenplatten eines Falles von Raynandischer Krankheit. Ärztlicher Verein in Hamburg, 26. VI. 1906. Deutsche mediz. Wochenschr., 1906, 8. 2098.
- Altschlow, Demonstration zweier Kranken, welche an Trophoenangioneuronosen litten. Gesellschaft d. Neuropathol. Moskau, ref. Neur. Centralbl., 1886, 8. 185.
- Algerie, Contributions alle studio della così detta asfonia locale negli alienati. Riv. speriment. d. freniati., X, 1884, p. 126.
- Arnott, Edm. 1886, No. 14.
- Anderson, Two cases of Raynaud's disease. Glasgow med. Journ., XLIV, p. 417.
- Derselbe, Case of disturbance of the circulation of the left arm, the symptoms resembling those of the early stage of Raynaud's disease. Glasg. med. Journ., XXXVIII, p. 193.
- Angély, Un cas de gangrène symétrique des extrémités au cours d'un érysipèle. Annal. de médecine, 6. VI. 1895, ref. Rev. neurol., 1895, p. 530.
- Apel, Über Trophoenuronosen. I.-D., Jena, 1903.
- Armstrong, Journal de méd. de Bordeaux, 1877/78.
- Arnung, Ein seltener Fall von Morbus Raynaud. Arch. f. Dermatol. u. Syphilis, Bd. 84.
- Atkin, Lancet 1896, I, p. 555.
- Atkinson, Multiple ectas. ulceration. Am. Journ. of medical sciences, 1884, LXXVII, p. 67.
- Audry, De l'érythème et de chromidites asymétriques. Gaz. hebdom. de méd. et de chir., 1894, p. 211.
- Barlow, Three cases of Raynaud's disease. Transact. of the clinic. society, 1883, XVI, 179—188.
- Derselbe, Sequel to paper on three cases of Raynaud's disease. Clin. Societ. Transact., 1885, XVIII, 305—312.
- Derselbe, Appendix to translation of Raynaud's two essays. New Sydenham Society, 1888.
- Derselbe, Some cases of Raynaud's disease. Illustrated med. News, 1889, III.
- Derselbe, Clin. Society Transact., 1889, XXII, 401—414.
- Derselbe, „Raynaud's disease.“ Albutt's system of medicine, VI, 1890 (nur nicht zugänglich).
- Barré, Asphyxie locale des extrémités et albuminurie. Thèse de Paris 1901.
- Bauer, Zur Funktionsprüfung des vegetativen Nervensystems. Zeitschr. f. d. gesamte Neurologie u. Psychiatrie, IV, 8. 696.
- Batman, A case of Raynaud's disease. Journ. of Americ. med. association, 1894, XXIII, p. 848.
- Beader, A case of symmetrical gangrene. Medical News, 1888, I, p. 461.
- Beale, Brit. med. Journal, 1887, I, p. 779.
- Bechterew, Über asymmetrische Akrocyanosen. Obsor. psych., 1908, 10.
- Beck, Raynandische Krankheit beim Säugling. Jahrbuch f. Kinderheilk., Bd. 72, 8. 84.
- Beck, Some new points in regard to Raynaud's disease. Americ. journal of the med. sciences, 1901, CXXII, p. 536.
- Beeror, Brit. med. Journ., 1889, I, p. 683.
- Begg, Miopathie gangrene of the four extremities, case and cure. Lancet, 1879, II, p. 382.
- Beersvoet, ref. Neurol. Centralbl., 1885, 8. 468.
- Bellamy, Symmetrical gangrene following variola in a child aged four years, causing death on the fourth day. Brit. med. Journ., 1887, I, p. 780.

- Benders, Ein Fall von halbseitiger angiospastischer Gangrän. Deutsche Zeitschr. f. Neurologik, XLII.
- Benson, La presse médicale, 1906, 4. IV.
- Berend, Ein Fall von symmetrischer Gangrän (Raynaud'scher Krankheit) bei einem Kinde. Ungar. medic. Presse, 1889, IV, 23/24.
- Bernhardt, Zwei Fälle von lokaler Asphyxie der Extremitäten. Archiv f. Psychiatrie, XII, S. 488.
- Bernstein, London medic. Record, 1886, XIII.
- Berthier, Contribution à l'étude de la gangrène des extrémités dans la pneumonie. Thèse de Paris juillet 1892.
- Bilroth, Wien. med. Wochenschr., 1873, Nr. 6.
- Bismwanger, Pathol. und Therapie der Neurothosen, Jena 1897, S. 220.
- Birt, Brit. med. Journal, 1890, I, p. 1343.
- Bjering, Nord. med. ark., II, 2, 24.
- Bland, Case of Raynaud's disease following acute mania. Journ. of med. science, 1889, XXV, p. 392.
- Blendermann, Ein atypischer Fall von Raynaud'scher Krankheit. Jena, L-D., 1904.
- Blumenthal, Berlin. Min. Wochenschr., 1892, S. 227.
- Bacquet, Journal de Gynécologie, XVI, p. 283, 1896 (nach Raynaud).
- Baeri, Gaz. d'osped. e delle clin., 1894.
- Baunefoy, Traitement de la maladie de Raynaud par les courants d'haute fréquence. Bull. de la société franç. d'électrothérapie, 1907, S. 184.
- Derselbe, Les troubles vasomoteurs et les trophodystrophies sur le littoral méditerranéen. Centre 1908.
- Bonnenfant, Du rôle étiologique de la tuberculose dans l'asphyxie locale et la gangrène symétrique des extrémités. Thèse de Paris 1904.
- Böttiger, Ein Fall von Akrotoomie, kompliziert durch Erscheinungen der Raynaud'schen Krankheit. Münch. med. Wochenschr., 19. XII, 1899.
- Baretius, Hygiea, LV, 1892.
- Bouchez, Asphyxie locale. Ses rapports avec les végétations. Thèse de Paris, 1902.
- Baurelly, Asphyxie locale considérée comme symptôme. Thèse de Paris, 1897.
- Bousseret, Asphyxie locale des extrémités. Lyon méd., 1884, rel. Virch.-Hirsch' Jahresber. 1884.
- de Boyer, Deux cas d'élongation nerveuse (Maladie de Raynaud et Gangrène des extrémités). Gaz. d. hôp., p. 154.
- Derselbe, De l'élongation nerveuse dans la maladie de Raynaud. La semaine médicale, 1904, p. 42.
- Bowen, A case of Raynaud's disease. Medik. Record, 1900, LVII, p. 824.
- Bowen, A case of spontaneous gangrene in an infant. The Lancet, 1901, II, p. 588.
- Boy, Asphyxie locale. Traitement par le sulfate de quinine. Gaz. d. hôp. 1881, 245.
- Bramann, Über asymmetrische Gangrän. Centralbl. für Chirurg. 1889.
- Brändt, Thèse de Paris, 1899.
- Brusch, Raynaud'sche Krankheit und Trauma. Fest. Gesellschaft. f. Psych. u. Nervenk., S. V, 1899.
- Brückner, Quelques considérations sur l'asphyxie locale. Thèse de Paris, 1924.
- Brongniès, Étude sur les formes graves de la maladie de Raynaud. Thèse de Paris, 1906.

Beet et Chaillet, *Maladie de Raynaud et lésions cardio-vasculaires*. *Revue de médecine*, 1911, 8.

Brewer, Symmetrical gangrene of the legs in Raynaud's disease, double amputation. *Annal of surgery*, 1888, p. 128.

Bridgton, *New York med. Journ.*, 1891, 53.

Mc Bride, *Médik. Rekord.*, 1878, II, IV.

Briese, Ein Fall von symmetrischer Gangrän der oberen und unteren Extremitäten. *Beiträge zur wissenschaft. Medizin*. Braunschweig 1897 (nur nicht zugänglich).

Brissaud, *Gangrène symétrique des extrémités, avec le syndrome gaze*. *La France médicale*, 1878, p. 163.

Brissaud et Sabin, *Sclérodémie et maladie de Raynaud avec syndrome bulbaire*. *Ser. d. neurolog.*, 4. Paris, 8. XI, 1909. *Revue neur.*, 1909, p. 1433.

Brissaud, Hallicon et Meige, *Acrocyanose et crampes des extrémités*. *Revue neur.*, 1903, p. 654.

Bristowe and Copenman, Case of paroxysmal haemoglobinuria with experimental observations and remarks. *Medic. society Transact.*, 1889, XII, p. 256.

Brown, *Gangrène symétrique des extrémités, maladie de Maurice Raynaud*. *Bullet. médical*, 2. V, 1902, p. 429.

Brownson, A case of symmetrical cutaneous atrophy of the extremities. *Journ. of cutan. and genito-urinary diseas.*, 1895, p. 1.

Brouardel, *Thèse d'agrégation*, Paris 1882.

Brünniche, *Nord. med. ark.*, II, 4, Nr. 27, et. *Schmidt's Jahrb.*, 1878, Bd. 167, 15/20.

Bruno, *Neurologisch. Centralbl.*, 1903, 8. 109.

de Buck, Nouvelle contribution à la dissociation fonctionnelle en lésage des nerfs dans les troubles angioneurotiques. *Journal de neurolog.*, 1900, p. 302.

Derselbe, *Maladie de Raynaud et gangrène névrotique*. *Bullet. d. l. société méd. de Belge*, 1904, No. 114.

Derselbe, *Maladie de Raynaud et gangrène névrotique cutanée multiple*. *Bull. d. l. Soc. méd. nat. d. Belgique*, 1905, 45.

Dezorges, The thrombo-angitis obliterans related to Raynaud's disease and erythromelalgia. *Americ. med. journal of med. sciences*, 1900, Jan.

Derselbe, Thrombophlebitis migrans der oberflächlichen Venen bei Thrombo-angitis obliterans. *Mitteilungen aus den Grenzgeb. der Medizin u. Chirurgie*, 1910, Bd. XXI, II, 2, p. 335; derselbe, *International Clinics* III, p. 85.

Derselbe, The veins in thromboangitis obliterans. *Journal of the Americ. medical association*, LII, 1909, p. 1319.

Derselbe, Thrombo-angitis obliterans, A study of the vascular lesions leading to premature spontaneous gangrene. *Americ. Journal of the med. sciences*, 1908, Oktober.

Hull, *Norsk. magaz. i. Læger*. III, 3, p. 693, et. *Schmidt's Jahrb.* 1878.

Burns, A case of Raynaud's disease. *Boston Dermatolog. Society*, 29. III, 1904.

Bazet, *Aphysie locale des extrémités chez une hystérique*. *Rev. d'hypnot.*, IV.

Bary, On a case of multiple peripheral neuritis. *The medical chron.*, April 1899.

E. Bary, *Étiologie et pathogénie des phénomènes de Raynaud*. *Th. d. Lyon*, 1899.

Byers, Cases of amerochaes associated with Raynaud's disease and pulmonary tuberculosis. *The Lancet*, 1899, 28. VIII.

Callenfeldt, Ein geval van gangrène symmetrisch. *Raynaud's ziekte*. *Nederl. Weekbl.*, I, 10.

- Calligaris. Sur une certaine forme d'anesthésie dans la lèpre et dans la gangrène des extrémités. *Revue italienne de Neurolog.*, 1906, II, 2, p. 81.
- Calmeide. Zur Kenntnis der Raynaud'schen Krankheit. *Jahrb. für Psych.*, XV.
- Calmeide. Sur les rapports de l'asphyxie locale des extrémités avec la fièvre intermittente paludéenne et quelques autres affections. *Revue mens. méd. milit.*, 1877.
- Calmeide. Associations patholog. dans la maladie de Raynaud. Thèse de Paris 1904.
- Calwell. Case of Raynaud's disease. *Brit. med. Journ.*, 1890, I, p. 1484.
- Cassavino. Gangrène symétrique des extrémités; asphyxie de la langue. *Jeune. méd. de Bordeaux*, 1906, p. 402.
- Casazza. Idiostomie et atrophie palatine. *Gazette degli ospedali e della clinica*, 1904, p. 57.
- du Castel. Gangrène des doigts chez un émérit. *Société d. dermatolog.*, 10. I. 1901. *Annales d. dermatol.*, 1901, p. 35.
- Deverill. Maladie de Raynaud. *Annales de dermatolog.*, 1901, p. 32.
- Castellano e Gardi. Sulla gangrena simmetrica delle estremità. *Il Morgagni* 1896, I, p. 605.
- Cates. Nitroglycerin in the treatment of Raynaud's disease. With report of a case. *Univ. med. Magaz.*, Philadelphia, 1891/92.
- Cattell. *Brit. med. Journal*, 1899, I, p. 1083.
- Cavafy. Symmetrical congestive mottling of the skin. *Brit. med. Journ.*, 1902, 9. XII.
- Chace. O. Report of a case of Raynaud's disease with symmetrical gangrene. *The Post-Graduate*, XXII, 1907, p. 1115.
- Cailliet. Du syndrome de Raynaud dans la fièvre typhoïde. *Lyon médical*, 106, p. 426.
- Chavillat. Sclérodermie avec hémistrophie linguale ayant débüté par le syndrome de la maladie de Raynaud. *Gaz. des hôp.*, 1906, p. 818.
- Chavancie. Maladie de Maurice Raynaud et Endartérite. *La Loire médicale*, XVII, 1906, 223—229.
- Chénier. *Brit. med. Journal*, 1890, I, p. 18.
- Chenier. Bionipis or life wear, trophic changes in old age. *British medical Journal*, 1909, p. 1411.
- Cherrier. De l'asphyxie locale et de la gangrène des extrémités dans les maladies infectieuses. Thèse de Paris, 1899.
- Chiavattini. Syndrome de Raynaud. Observation clinique et autopsie. XX. congrès de médec. interne Glasg. 25—26. X. 1905, *Berns neurolog.*, 1906.
- Chvostek. Zur Symptomenkunde der Akromegalie. *Wien. Med. Wochenschr.*, 1899, 5. 1068.
- Ciarrochi. *Rivista d. Soc. Lancis. d. Osped. di Roma*, 1887.
- Clarke, E. W., Raynaud's disease. *Quarterly med. Journ.*, 1896/97, V, 350 (nach Mazon).
- Claude. Ruse et Teuchard, Maladie de Raynaud, sclérodermie, rhumatisme chronique. *Gaz. des hôp.*, 1902, p. 390.
- Cleeman. Case of Raynaud's disease associated with angina pectoris. *Transactions of the coll. of Physicians*, Philadelphia, 1892, 163.
- Clément. Maladie de Raynaud. *Lyon méd.* XVIII, p. 194. Fév. 11.
- Cohn. Raynaud'scher Symptomenkomplex mit Sklerodermie. *Berl. Gesellschaft f. Psychiatrie und Nervenkrankh.*, 12. V. 1902. *ref. Neurolog. Centralbl.*, 1902, 8. 645.
- Colleville. Un cas d'asphyxie locale d'origine rhumatismale. *France médic.*, 1904, 7.

- Callier, Symmetrical gangrene. *Manchester Medical chronicle*, 1888/89, IX, p. 203.
- Callins, Chronic cyanosis of the extremities associated with polycythemia and splenomegaly. *Med. Rec.*, 1903, II, p. 807.
- Colman and Taylor, Case of Raynaud's disease. *Clinic. Soc. Transact.*, 1890, XXIII, p. 125.
- Colson, Un cas de gangrène spontanée chez un enfant de quatre ans et demi. *Ann. d. l. Soc. médico-chirurg. d. Liège*, 1894, p. 334.
- Colucci, Contributo alla diagnosi del così detto morbo di Raynaud. *Attal. d. neurolog.* XVI.
- Cotchy, Maladie de Maurice Raynaud chez l'enfant. *Archiv. de méd. des enfants*, VIII, 1905, p. 497.
- Coutiniaux, Un cas de maladie de Raynaud, suivi de mort chez une jeune fille lymphatique et tuberculeuse; examen anatomico-pathologique. XIV. *Congrès de méd. aliénées et neurolog. de France*, Paris 1—5, VIII, 1904; *Revue neurolog.*, 1904, p. 300.
- Croopland, Case of erythema gangrenosum, or Raynaud's disease. *Transact. of Clinic. Soc.*, XXI, p. 279.
- Courchet, Le syndrome de Raynaud et l'artère oblitérante. *Th. d. Lyon*, 1899.
- Courtesy, Raynaud's disease in the insane. *Journ. of nerv. and ment. dis.*, XXVII, Jan 1899.
- Cramer, K., Über metatraumatische vasomotorisch-trophische Neurosen. *Archiv für Orthopädie*, 1900, VII, S. 431.
- Crocker, London. *dermatol. Gesellsch.*, 8. II, 1899.
- Croighton, Cutaneous lesions with neurotic symptoms. *Journal of nerv. and mental disease*, XXVIII, p. 29.
- Crispien, v., Ein kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Erkrankungen des Gefäßsystems, welche vermutlich auf nervöser Basis beruhen. *Deutsche mediz. Wochenschr.*, 1900, S. 469.
- Crisiati, Due casi di morbo di Raynaud. *R. Morgagni*, 1908, I, p. 175.
- Cutcliffe, A case of Raynaud's disease. *British med. journal*, 1902, I, p. 292.
- Curston, A fatal case of Raynaud's disease. *The Lancet*, 1904, I, p. 1349.
- Carrozzmann, Untersuchungen über das funktionelle Verhalten der Gefäße bei trophischen und vasomotorischen Neurosen. *Münchener mediz. Wochenschr.*, 1907, S. 34.
- Derselbe, Über atypische Formen und Komplikationen der arteriosklerotischen angiospastischen Gangrän. *Münch. med. Wochenschr.*, 1910, XI, S. 689.
- Derselbe, Fall von Raynoldscher Krankheit. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1901, S. 220.
- Derselbe, Über vasomotorische Krampfzustände bei echter Angina pectoris. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1906, Nr. 68.
- Curtis, Sajour, Vol. II, 1880.
- Dickson, H., Treatment by the tourniquet to counteract the vasomotor spasm of Raynaud's disease. *Journal of nerv. and mental disease*, XXIX, p. 657.
- Grasda, Ein Fall von symmetrischer Gangrän an den oberen Extremitäten. *Wien. mediz. Wochenschr.*, 1890, S. 625.
- Danlos, Asphyxie des mains, avec plaque de sphacèle cutané au doigt du petit doigt. *Annales de dermatolog.*, 1900, p. 64.
- Dana, On artemisinia. *Medical Record*, 1883, II, p. 57.
- Dardignac, *Revue de rhéologie*, 1891, p. 229/740.
- Rayman, *Brit. med. Journal*, 1883, I, p. 254.

- Debove, Note sur un cas de gangrène symétrique des extrémités supérieures dans le cours d'un typhus. *L'union médicale*, 1880, p. 803.
- Deek, A case of Raynaud's disease. *Brit. med. Journ.*, 1894, I, p. 162.
- Declaux, Ribadeau-Dumas et Saherjéau, Localisations jones de la maladie de Raynaud. *La presse médicale*, 1900, p. 783.
- Dejorin, Zur Kasistik der Raynaudischen Krankheit. *Journal für Hautkrankheiten*, Russisch, 1900.
- Delrance, Considérations sur la gangrène symétrique. Thèse de Paris 1886.
- Dehls, Über symmetrische Gangrän der Extremitäten. *Deutsche Zeitschr. f. Nervenhk.*, 1886, IV, S. 1.
- Dejerine et Leloir, Recherches anatomo-patholog. et cliniques sur les altérations nerveuses dans certains cas de gangrène. *Arch. d. physiol. norm. et path.*, 1881, p. 389.
- Delamare, Troubles trophiques des angles au cours de l'hystérie et de la maladie de Raynaud. *Neuv. iconogr. d. l. Salpêtr.*, 1886, 6.
- Destel, Hygiène avec syndrome de Raynaud. *Gaz. hebdom.*, 1900, p. 248.
- Determann, Über Herz- und Gefässneurosen. *Sammlung klin. Vorträge von Volkman*, X. F. 1894, Nr. 96/97.
- Detléfelsen, Raynaud's system. *Med. arkiv*, Copenhagen, 1892.
- Dickinson and Huber, Raynaud's gangrene in connection with parturition. *Clinic. Soc. of London*, 22. IV. 98. *Ref. Brit. med. Journ.*, 1898, I, p. 1178.
- Dide, Maurice et Darocher, Asphyxie symétrique des extrémités et pseudo-oedème symétrique. *Soc. méd. scientifique de l'univ.*, 3. XII. 1903.
- Dilier, Gangrène symétrique des extrémités. *La méd. moderne*, 1894, p. 967.
- Dixon, Gangrene of the foot in a case of Raynaud's disease. *Illustrat. med. News*, 1889, III, 25.
- Dominguez, Des formes atypiques de la maladie de Maurice Raynaud. Thèse de Paris, 1888.
- Druitt, Two cases of intermittent hæmaturia. *Med. Times and Gazette*, 1873.
- Dubreuilh, Gangrène symétrique des doigts. *Faax parisi des guéres des Reins*. *Gaz. méd. de Paris*, 1884, 21.
- Duchesne, *Journ. de méd. et de chirurg. pratique*, 1894.
- Dufor, Note sur la pathologie des gangrènes symétriques des extrémités dans les infections pneumoniques à propos d'un cas avec autopsie. *Bulletin de la soc. méd. des hôpitaux*, 24. X. 1901, p. 1008. *Revue neurolog.*, 1902, 233.
- Dukeman, Raynaud's disease with report of a case resulting in death. *Med. News*, 1899, LXXV, p. 630.
- Durand, Fièvre typhoïde atypique. Gangrènes des membres inférieurs. Amputation, guérison. *Archiv. d. médecine et pharmacie militaire*, Paris 1894.
- Dagré et Kahn, Schlerémie et maladie de Raynaud. Syndrome pléroglandulaire. *Gaz. d. hôp.*, 1889, p. 866.
- Duranda-Duante, Deux observations rares d'une forme mortelle d'asphyxie symétrique des extrémités chez les nouveau-nés, dont les parents étaient syphilitiques (Maladie de Raynaud). *Pediatrics* IV, 1888, 3. III.
- Duret, *France médicale*, 1876, 1.
- Duvall, Gangrène spontané des doigts. *Echo médical suisse*, 1888, Sept.
- Ehrenberg, Fall af symmetriska frusna med Raynaud's symptom jämte inktagande öfver lufttemperaturen i fingrarna till friska och sjuka. *Uppsala läknot. förh.*, 18, B. 3, 1893.
- Ehrmann, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. *Ref. Arch. für Dermatol. u. Syphil.*, XXXV, p. 413.

Einkhorst, *Lehrb. d. spec. d. Pathol. und Therapie*. III. Aufl., Sympathicomorosen.

Elias, *Observation de gangr. par asphyxie locale des extrémités*. *Algér. méd.*, 1878. (Nach DeFrance.)

Eisenberg, *Die sog. Raynaud'sche Krankheit (gangrena symmetrica) syphilitischen Ursprungs*. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, XXIV, p. 677.

Elmer, *Erythrodalgia associated with Raynaud's disease*. *Medical News*, LXX, 1897, I, p. 817.

Englisch, *Über lokale Asphyxie mit symmetrischer Gangrän an den Extremitäten*. Wien, med. Presse, 1878.

Epinvier, *Asphyxie locale des extrémités*. Thèse de Lyon, 1884.

Erb, *Über das intermittierende Hinken und andere nervöse Störungen infolge von Gefäßerkrankungen*. *Zeitschr. f. Nervenheilk.*, XIII, p. 1, 1888.

Ercklentz, *Raynaud'sche Krankheit*. *Schlesische Gesellschaft für vaterl. Kultur*, 77. II, 1900, 264. *Deutsche med. Wochenschr.*, Vereinsbeilage, S. 253.

Escherich, *Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilk.* Wien, 6. XII, 1896.

Estlander, *Über Brand der unteren Extremitäten bei exanthematischen Typhus*. *Archiv für klinische Chirurgie*, 1871.

Etienne, *Rôle du froid intense dans la pathogénie des asphyxies*. *Arch. général. de Médecine*, Bd. 82, II, p. 338.

Extenburg, *Symmetrische Asphyxie*. Artikel in Eisenberg's *Recherches*, Opuscule, III. Aufl., Bd. XXIII.

Derselbe, *Jahresber. f. Neurol. u. Psych.* über d. Jahr 1897, S. 341.

Evans, *Two cases of Raynaud's disease*. *Archiv of neurology*, 1907, III, p. 328.

Evors, *Ein Fall von Spontangangrän an einzelnen Fingerspitzen der linken Hand*. *Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie*, Bd. 87.

EWALD, *Über einen Fall von atypischer Gangrän*. *Wien, mediz.blätter* 1904, Nr. 49.

Ewart, *Raynaud's disease and scleroderma*. *The Lancet* 1902, I, p. 450.

Fabre, *Un cas de gangrène symétrique des extrémités*. *Gazette médicale de Paris*, 1883, 48.

Falta, Newburgh u. Noble, *Zeitschrift für klin. Medizin*, Bd. 71, S. 25 u. Bd. 72, S. 97.

Fagge, *Principles and practice of medicine*. Vol. II, p. 88.

J. M. Farland, *A case of spontaneous gangrene of all four extremities and the body of very acute course and fatal termination without discoverable cause*. *The Philad. med. Journ.*, II, 15.

Favie, *Quelques considérations sur les rapports entre la sclérodémie spontanée et la gangrène symétrique des extrémités*. Thèse de Paris, 1880.

Favre, *Gangrène symétrique des extrémités*. *Gaz. des hôp.*, 1874, p. 347.

Féré, *Note sur l'asphyxie locale des extrémités chez les épileptiques et en particulier sur un cas d'asphyxie disséminée*. *Neur. Congr. d. V. Salpêtr.*, 1891.

Féré et Barigne, *Note sur un nouveau cas d'asphyxie locale des extrémités avec lésions congénitales de la peau chez un épileptique*. *Rev. de médecine*, 1892, XII, p. 891.

Fernet, *Asphyxie locale et Symplocie locale nach Typhus*. *La France médicale*, 1882.

Fischer, *Der symmetrische Brand*. *Arch. f. klin. Chirurgie*, 1875, XVIII, S. 335.

Follet, *Asphyxie périphérique (symétrique de Raynaud) d'origine sympathique au cours d'une typhoïde à rechutes*. *Gaz. hebdom.*, 1907, No. 62.

- Fallet et Saquépée, Syndrome de Raynaud, Tétanie, Sclérodémie. *Bullet. et mensuel de la Soc. médic. des hôp. de Paris*, 32, VII, 1902.
- Fordyce, Raynaud's disease. *Journ. of genito-urinal and cutan. diseases*, 1886, p. 87.
- Forsythe, New York Dermatolog. society, 22, III, 1904. *Journal of cut. and genito-urinary diseases*, XXIV, p. 284.
- Foucaquier, Considérations sur l'asphyxie locale. Thèse de Paris, 1874.
- Fournier et Sabardann, Maladie de Raynaud. *Annales de dermatolog.*, IV, 3, II, III, p. 23, 1901.
- Fowler, Raynaud's disease. *Brit. med. Journal*, 1889, I, p. 80.
- Fox, Gelée ophtalmique avec maladie de Raynaud. *Soc. dermat. d. London*. *Sci. Rev. neur.*, 1888.
- Derselbe, Raynaud's disease. *Lancet* 1888, II, p. 1286.
- Derselbe, *Brit. Journ. of dermat.*, 1893.
- Fox, T. Colcott, On two cases of Raynaud's disease. *Clin. Soc. Transact.*, XVIII a. XXII.
- Fox, Symmetrical gangrene of the extremities. New York Dermatolog. society, 21, I, 1906. *Journal of cutan. and genito-urinary diseases*, XXIV, p. 116.
- Fox, G. H., Two cases of Raynaud's disease with ocular symptoms, one case complicated with choreoemia. *Journal of cut. dis.*, XXV, 1907, p. 337.
- Fränkel, *Zeitschr. f. klin. Med.*, VI, p. 277.
- François, Essai sur la gangrène spontanée. Reclus 1882.
- Friedel, Ein Fall von symmetrischer Gangrän. *Inaug.-Diss.*, Greifswald 1868.
- Friedmann, A case of Raynaud's disease. *Medic. Rec.*, 1900, S. 814.
- Derselbe, Local asphyxia of the extremities (Raynaud's disease) with the hitherto undescribed complication of intermittent achylia gastrica. *Americ. journal of med. sciences*, Febr. 1910, p. 238.
- Fuchs, Raynaud'sche Krankheit und Sklerodaktylie. *Wiener klin. Wochenschr.*, 1896, Nr. 39.
- Derselbe, *Wiener klin. Wochenschr.*, 1902, S. 663.
- Derselbe, *Verein für Psychiatrie und Neurologie in Wien*, S. III, 1904. *Ref. Wiener klinische Wochenschr.*, 1904, S. 496.
- Alfred Fuchs, Zwangsstellungen bei Raynaud'scher Krankheit. *Wiener klin. Wochenschr.*, 1908, Nr. 33, S. 1227.
- Gaillard, Suppuration et gangrène dans la stéiré. *Archiv. de médecine*, Mai 1902.
- Gandois, De la gangrène symétrique des extrémités, type Raynaud. Thèse de Paris, 1904.
- Garland, Raynaud's disease. *Journal of the americ. med. association*, 1905, II, p. 837.
- Garrigues, Syndrome ou asphyxie locale. Gangrène, Sclérodémie. Thèse de Paris, 1900.
- Derselbe, Syndrome et asphyxie locale, gangrène dite de Raynaud, sclérodémie. *Gaz. des hôpitaux*, 1901, p. 65.
- Gaspardi, Un cas de gangrène symétrique locale des extrémités. *Gaz. degli osped. e cliniche*, 28, XII, 1902, p. 1565. *Revue neurolog.*, 1903, p. 387.
- Guston, Troubles trophiques des extrémités avec syndrome syringomyélique. *Annal. de dermatol.*, 1888, p. 342.
- Guscher, Chénin et Gussone, Maladie de Raynaud d'origine syphilitique. *Bull. de la Soc. franç. d. dermatol. et de syphil.*, XXII, 6, p. 251. *Rev. neur.*, 1911, II, p. 699.

Gaucher, Flurin et Cominaud, Maladie de Raynaud. *Bullet. de la société de dermatol.* 1900, p. 128.

Gaupp, Symmetrische Gangrän bei einem 31jährigen Mädchen. *Schles. Gesellsch. f. vaterländische Kultur*, 18. III. 1900. *Beil. Deutsche med. Wochenschr.*, 6. IX. 1900.

Griffith, Über symmetrische Gangrän der Extremitäten (Raynaud'sche Krankheit). *Deutsche militärärztliche Zeitschr.* 1905, 11.

Gericke, Über spontane Gangrän. L.-D. Halle 1896.

Germer, Raynaud'sche Krankheit. L.-D. Berlin 1893.

Gilbert, De la valeur de la sépiote au cours de la maladie de Raynaud. *Thèse de Paris*, 1899.

Gilbert et Villaret, Gangrène symétrique des extrémités d'origine radicaire probable. *L'Encephale* 1909, II.

Gintra, Cours théorique et clinique de pathologie interne et thérapeutique, III, p. 429. Paris 1893. (Nach Raynaud.)

Giovanni, Symmetrische Gangrän der Finger. *Gloss. Ital. delle Mal. ven. e della pelle*, 1885. *Ref. Arch. f. Dermat. u. Syph.*, 1886, p. 591.

Glabé, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. L.-D. Leipzig 1904.

Godin, *Bulletins d. l. Société anatomique*, 1896, XI, p. 169. (Nach Raynaud.)

Derselbe, *Archiv. général. de méd. Decennaire*, II, p. 52. 1896. (Nach Raynaud.)

Gorbel, Spontane Gangrän bei einem Kinde auf Grund einer Gefäßerkrankung. *Archiv für klin. Medizin*, 63, 1899, S. 184.

Gorke, Spontane Gangrän an den vier Extremitäten. *Feder-Vereinigung der Chirurgen Berlin*, 23. VII. 1903.

Gahlschmidt, Gangrène symétrique et ulcéreuse. Observation, autopsie. *Rev. de méd.*, 1887, III, p. 401.

Derselbe, Un cas de gangrène symétrique d'origine traumatique suivi de quelques réflexions sur la pathologie de l'affection. *Société med. des hôpitaux de Paris*, 1905, p. 748.

Goldstandl, Über symmetrisches Brand. *Inaug.-Diss.* Berlin 1887.

Goodhart, Zur Raynaud'schen Krankheit. *Dermatol. Zeitschr.*, III, 1896, S. 193.

Graber, Gangrän bei Typhus. *Inaug.-Diss.* 1869. (Nach Goldstandl.)

Gradenigo, *ref. Schmidt's Jahrb.*, Bd. 248, S. 105.

Grancher, Différentes espèces de gangrène chez l'enfant. *Maladie de Maurice-Raynaud*. *Annal. de méd.*, 1891, 17, 6.

Grant, A case of Raynaud's disease. *Transactions of the internat. med. congr. of Australia*. *Ref. Neurol. Centralbl.*, 1890, p. 414.

Graves, Sclérose et asphyxie locale des extrémités. *Gaz. d. hôp.*, 1876, p. 29.

Derselbe, *Montpellier médical*, 1875, p. 503.

Derselbe, Nature et pathologie de sclérose et d'asphyxie locale des extrémités. *Archiv. générales d. médecine*, 1894, II, p. 60.

Graves et Hauser, Asphyxie locale à Malad. du syst. nerveux. *IV. Ann.*, 1898, II, p. 348.

de Grazia, La serietà periferica nella malattia di Raynaud. *La riforma med.*, 1892, S. X., p. 38.

Griebach, Über symmetrische Gangrän. *Inaug.-Diss.* 1892. Bonn.

Griffith, Three cases illustrating some of the affections of Raynaud's disease. *Med. Chronic*, 1891/92, XV, p. 89.

Derselbe, On the changes in the bones observed in a case of Raynaud's disease. *Medical Chronicle*, 1901, p. 369.

- Grinker, A case of Raynaud's disease with rheumatoid arthritis. *Chicago Med. Record*, XXIII, p. 514, 1905.
- Gruberl, Ein Fall von symmetrischer Gangrän beider Unterschenkel. *St. Petersburger med. Wochenschr.*, 1899, 8, 412.
- Guillain et Thorez, Aphasie locale et gangrène des extrémités d'origine tuberculeuse. *La presse médicale*, 16. VI. 1905.
- Guillaumin, Contribut. à l'étude de la gangrène des extrémités dans les affections cardiaques. Thèse de Paris, 1905.
- Gunkel, Deutsche mediz. Wochenschr., 1903, Versammlung, 8, 185.
- Haig, A case of Raynaud's disease with paroxysmal hæmoglobinuria. *Trans. of the med. societ. of London*, 1892, XV, p. 143.
- Derselbe, Case of Raynaud's disease. *St. Barthol. Hosp. Reports*, 1892, XXVIII, p. 29-46.
- Haley, A case of Raynaud's disease. *Medic. Record*, 1902, II, LXXIX, p. 753.
- Hall, Brit. med. Journal, 1901, I, p. 411.
- Hallgren et Lænnier, Sur une aphasie locale des extrémités avec ischémie des ongles. *Bullet. de la Société franç. de dermatologie et de syphiligraphie*, 7. II. 1907, p. 51.
- Hameau, Gangrène sèche, aphasie locale et glycosémie. *Le Boeuz médical*, 1873, rel. Virchow-Hirsch' Jahrbücher, 1873, II, p. 349.
- Hamilton, Chronic vasomotor hyperirritation. *New York med. Journ.*, 1874, XX, 326.
- Handford, Disinherited myositis and neuritis, probably of alcoholic origin etc. *Transactions of the clinic. Society*, XXIII, 1890.
- Harbison, Sclerodermia associated with Raynaud's disease and Addisonian pigmentation. *British medical Journal*, 1904, I, p. 126.
- Harbitz, Francis, Kasuistik über Angiomeurosen. 2. Symmetrische Gangrän (mit anatomischer Untersuchung). *Münchener mediz. Wochenschr.*, 1911, 8, 45.
- Hardy, *Gaz. des hôpitaux*, 1877.
- Hare, Francis, Pathological variations of physiological vasomotor action, with special reference to the malarial paroxysmal nervous. *The Practitioner*, 1905, II, p. 345.
- Derselbe, Paroxysmal nervous. *The Practitioner*, Februar 1906.
- Harold, A case of Raynaud's disease or neuropathic gangrenous trophoneurosis of the lower extremities. *Lancet*, 1895, I, p. 541.
- Hartzell, Philadelphia dermatolog. Society, 18. I. 1900, refer. *Journ. of cut. and genito-urinary diseases*, XXVII, p. 215.
- Hastreiter, Ein Fall von symmetrischer Aphasie der Extremitäten. *Wien. mediz. Presse*, 1882, XXIII, p. 165.
- Hauptmann, A case of Raynaud's disease. *Medical Record*, I, p. 413.
- Häuser, Angiomeurose und Neurangiose. *Deutsche Zeitsch. f. Nervenheilk.* XVIII, 8, 393.
- Häuser, Beitrag zur Lehre von den Gangrätformen mit symmetrischer Lokalisation. *Wien. Med. Wochenschr.*, 1898, 5, 1048.
- Havas, *Pres. med. cliniq. Paris*, 1898, 25.
- Du Bois Reymond, Schlietrophosenrose et aphasie locale des extrémités. *La pédiatrique*, 1903, 18.
- Hilgard et Wolf, Mémoires d. la Société de Médecine, 1817.
- Heller, Trophische Nagelkrankung nach Einführung oder Raynaud'sche Krankheit. *Dermatolog. Zeitschrift*, XV, 5, 630.
- Henneman, Trois cas de gangrène symétrique chez les enfants. *Bullet. med. du Nord*, 1891, XXX, p. 112.

- Henry, B., *Gazette médicale*, 1857, p. 323. (Nach Raynaud.)
- Henry, Clinical report of two cases of Raynaud's disease. *Americ. Journ. of medic. sciences*, Bd. 338, 1884, p. 19.
- Hertel, Zur symmetrischen Gangrän. *Beiträge z. prakt. Heilkunde*, 1882, 8, 102, Knodt.
- Hertius, Ch. de Nassau, *Ephemerides des curieux de la Nature*, 1685. (Nach Raynaud.)
- Herscheimer und Hartmann, Über Akrodermatitis chronica atroph. *Archiv für Dermatolog. u. Syphilis*, Bd. 61, p. 255.
- Herr, Strömkele und Angina pectoris vasomotoria. *Wien. med. Wochenschr.*, 1910, 44.
- Hess, Ein Fall Raynaud'scher Krankheit. *Neurolog. Centralblatt*, 1901, 8, 1151.
- Hell und Eppinger, Die Vagotonie. Berlin 1910.
- Hell und Königstein, Über Nerven der Hautgefäße. *Wiener klin. Wochenschrift*, 1911, 42.
- Heydenrich, De la gangrène par l'endartérite oblitérante. *La sem. médic.*, 1892, p. 272.
- Hig, Symmetrische Gangrän an der großen Zehe und den Ohren. *Medizin. Gesellschaft in Göttingen*, 2. V. 1907.
- Hinckel, Beitrag zur Erkenntnis der Pathogenese der Raynaud'schen Krankheit. *Wiener Mit. Ratschauer*, 1906, 48, 8, 781.
- Hochenegg, Über symmetrische Gangrän und lokale Asphyxie. *Wien. med. Jahrbücher*, 1885, 8, 569.
- Hodanpyl, *Medical Record*, 1891, XXXIX, p. 450.
- Hollmann, Raynaud, *Tipische v. Genesek*, 1906, 13.
- Hodlia, Über lokale Asphyxie. *München. mediz. Wochenschr.*, 1898, 4.
- Hodlia, v., Zur Kenntnis der Raynaud'schen Krankheit. *Münchener med. Wochenschr.*, 1909, 29.
- Hosmer, v. E., Lokale Asphyxie und symmetrische Gangrän der Extremitäten. *Nederl. Tijdschr. v. Geneeskunde*, 1885, 30, Teil Centralbl. f. Chirurg., 1885, 5, 834.
- Holm, Fall von Rase mit symmetr. Gangrän. *Nord. med. ark.* IV, 4, 29, 1852, gel. Virchow-Hirsch' Jahresh.
- Holst, v., Über die Raynaud'sche Krankheit. Inaug.-Diss., Halle 1896.
- Holst, Om lokal asfyxi og symmetrisk gangræn (Raynaud's sygdom). *Norsk. Magas. f. Lægervidensk.*, 1907, p. 183.
- Horteloup, Thèse de Paris, 1865.
- Houvet, Regional vasomotor hypertension with report of a case. *Medical Rek.*, 77, p. 1971.
- Howe, v., Observation de gangrène symétrique des extrémités. *Annal. de Gand*, 1889, Janvier.
- Hughes, Herpes gangrenosus, symmetrical gangrene. *Indian. med. Journ.*, 1903, April.
- Humphreys, *Brit. med. Journ.*, 1896, II, p. 1184.
- Hutchinson, Gangrene of tip of nose and part of ear, triphlegia etc. *Med. Times and Gaz.*, 1871, II, 678.
- Derselbe, Pathol. Societ. of London, 17, October 1892, *Lancet* 1892, II, 663.
- Derselbe, Case of syphilis in which the fingers of one hand become red and cold—superf. arteritis. *Med. Times and Gazette*, 1894, I, p. 347.
- Derselbe, *Med. Times and Gazette*, 1894, II, p. 3536.
- Derselbe, An address on the study of skin diseases as illustrating the doctrine of general pathology. *Brit. med. Journal*, 1897, II, p. 162.

Derselbe, On certain local disorders more or less cognate with Raynaud's disease. *Arch. of surgery*, 1899, I, 226.

Derselbe, Raynaud's phenomena with thrombotic scars. *Brit. med. Journal*, 1891, II, p. 8.

Derselbe, Anomophyria (Raynaud's phenomena). *Arch. of surgery*, 1892, III.

Derselbe, De l'anomorphie; maladie de Raynaud et états similaires. *La semaine méd.*, 1893, p. 169.

Derselbe, Congenital syphilis — fair health but defective development of mental powers — at the age of six aggressive idiosy. — Raynaud's phenomena. *Arch. of Surg.*, 1894, 250.

Derselbe, Raynaud's phenomena in an elderly woman. *Clin. Journ.*, 1895, V, 74-75.

Derselbe, Raynaud's disease accompanied by severe hæmorrhages. *Clin. Journ.*, 1896, VII, 322-323.

Derselbe, Symmetrical anophorides without Raynaud's phenomena. *Arch. of surgery*, 1896, 201. (Ein Teil der Arbeiten von Hutchinson mit nach Meiss.)

Jacob, Raynaud's disease. *Brit. med. Journ.*, 1887, I, p. 625.

Jacoby, A contribution to the diagnosis of Raynaud's disease. *New-York med. Journ.*, 1890, 7, 11.

Jacoud, Gangrène symétrique des extrémités. *Journ. d. méd. et de chir. prat.*, 1875.

Jamagisawa, Über die Raynaud'sche Krankheit (japanisch). *Ref. Neurologia* II, 1901, 8, 206.

James, *Lancet*, 1888, II, p. 1366.

Derselbe, *Lancet* 1896, I, 29 II.

Jungkrantz et Dubouquet, L'asphyxie des extrémités envisagée comme symptôme d'insuffisance circul. *Lille* 1902. *Ref. Revue neurolog.* 1902, p. 304.

Johnston, Case of vasomotor tremors of a face both recurring in a child. *Amer. Journ. of abstr.*, 1885, XVIII, p. 292.

Johnson, An essay on asphyria. London, 1889. *Brit. med. Journ.*, 1894, I, 260.

Provence, *Soc. de biologie*, 14. VI. 1894, *ref. La semaine méd.*, 1894, p. 184.

Landelsohn, Ein Fall von reitifizierender symmetrischer lokaler Asphyria der Extremitäten. *Petersb. mediz. Wochenschr.*, 1894, 8, 143.

Larrosa, C. Maladie de Raynaud et syndromes similaires. *Revue de Dermatol. milit.*, 1908, II, 14, p. 331.

Justus, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. *Archiv für Dermatolog. u. Syphilis*, 59, p. 297.

Kaposi, *Verhände. d. Wien. dermatol. Vereinigung*, 2. V. 1894.

Keyser, de, La maladie de Raynaud; ses rapports avec les engelures. *Journal med. de Bruxelles*, 13, XI. 1902.

Khrushchsky, Un cas d'angiotétrose (Asphyria localis Raynaud) sur le terrain de cachexie paludéenne. *Questions mosc. de méd., neuro-psychique*, 1900, V, p. 116, *ref. Rev. neur.*, 1900, p. 610.

King, Emil, Raynaud's disease. *Amer. Medicus*, Mai 1900.

Kinnear, Spasmodic neuritis and their scientific treatment. *Philad. Reporter*, Ed. 77, 23.

Klots, On the occurrence of ulcers resulting from spontaneous gangrene of the skin during the later stages of syphilis. *New-York med. Journ.*, 8, X, 81.

Derselbe, A case of syphilis in which several fingers of both hands became cold and lived; suppurated afterwards. *Am. Journ. of med. scienc.*, 1889, II, p. 162.

Derselbe, Case of Raynaud's disease. New York, Dermatol. Society, 25. II. 1908. *Journal of cut. and genito-urinary disease*, XXVI, p. 266.

Kockereels et Diets, Un cas de maladie de Raynaud. *Annal. et bullet. d. l. société méd. d'Anvers*, Juin, 1897.

Koster, Ein Fall af neurotisk gangræn. *Det. Nordl. Centr.*, 1888, p. 545.

Derselbe, Ein Fall af symmetrisk gangræn. *Göteborg Lakarsällsk. Förel.*, 1892, p. 71, ref. *Centralbl. f. inn. Med.*, 1893, p. 644.

Kolliack, Zur Kenntnis der sogenannten Raynaud'schen Krankheit. *Frankfurter Zeitschrift für Pathologie*, V, 1893, S. 571.

Kopp, Die Trophomenosen der Haut. *Wien* 1895.

Kornfeld, Über symmetrische Gangræn. *Wien. med. Presse*, 1892, S. 1888.

Kosak, Ein Beitrag zu den Neurosen des Sympathicus. Paradoxe Kälte-reaktion. *Casop. lékař.*, 1907, 25. Jahresbericht für Psychiatrie und Neurologie, 1907.

Krasny, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. *Schlesische Ges. f. natürl. Kultur*, Breslau, 17. I. 1902. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1902, S. 82.

Kruege, Über vasomotorische Störungen bei der hysterischen Neurose. *Arch. für Psychiatrie*, XXII, S. 240.

Krusowski, Ein Fall von symmetrischer Gangræn auf Resultat hysterischer Basis. *Jahrb. f. Kinderheilk.*, Bd. 40, 1895, S. 57.

Kroner, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. *Verein für innere Medizin in Berlin*, 16. Oktober 1899.

Lahr, Über Nervenkrankheiten nach Rückenmarkverletzungen. *Charité-Annalen*, XXII, S. 685.

Laignel-Lavastine, L'extrémité locale de la circulation cutanée de la main dans l'hémiplégie organique et le syndrome de Raynaud. *Revue neurol.*, 1902, p. 514.

Lamotteaux, Des troubles vasomoteurs et trophiques liés à l'alcoolisme et à quelques autres intoxications chroniques. *Union médicale*, 1891, p. 745.

Derselbe, Des trophodermoses des extrémités ou acrotrophodermoses etc. *La semaine médicale*, 1894.

Landry, Gangrène symétrique d'extrémités chez une malade hyst. *Soc. méd. psychiatr.*, 25. I. 1907.

Lapowsky, Raynaud's disease. *Journal of cut. disease*, XXV, 281.

Larger, Sur un cas de doigt à mort lié à une trophodermose. *Associat. franç. de chir.*, Paris, 21. X. 1901, ref. *Revue neurol.*, 1907, p. 511.

Lasser, Raynaud'sche Krankheit. *Verhöl. d. Berl. med. Gesellschaft*, 1888, S. 901.

Lasser, Über lokale Asphyxie und symmetrische Gangræn der Extremitäten. *Inaug.-Diss.*, Straßburg 1884.

Laurenti, Un caso di gangrena simmetrica da origine spasmica da influenza. *Riforma med.*, 1894.

Lazarus, Spasm of the arteria and report of a case of vasomotor neurosis. *Journal of the amer. med. association*, 1909, II, p. 1771, Bd. 53.

Lazarus, P., Gesellschaft der Charitéärzte, 17. I. 1907.

Leibere, De l'asphyxie locale des extrémités dans les états pathologiques bulbo-pontobulbariens. *Semaine médicale*, 1900, p. 302.

Legroux, Asphyxie locale des extrémités. Ses rapports avec les engelures. *Annal. d. dermatol. et de syphil.*, 1892, p. 184.

Derselbe, Gangrène symétr. des extrémités. *La semaine médicale*, 1907, p. 58.

Lehle, Anzeiger, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit im Säuglingsalter. *Inaug.-Diss.*, München 1896.

- Lekmann, Archiv für Kinderheilkunde, XVI.
- Leichtenstern, Übersymmetrische Aphyxie und Gangrän der Extremitäten. München. med. Wochenschr., 1888, 1.
- Leloir, Recherches cliniques et anatomopathologiques sur les affections cutanées d'origine nerveuse. Paris 1882.
- Leloir et Merklen, Synopsis locale des extrémités. Essai de la puerie des mains et des doigts. Annal. d. dermatol. et de syphil., 1892, 1.
- Leiman, A case of Raynaud's disease. Journal of the American med. association, 1911, 22, VII, p. 200.
- Les, Niederhein. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Bonn, 18, II, 1907. Deutsche med. Wochenschr., 1907, 8, 1278.
- de Léon, Annal d'Electrologie, 1899, p. 393.
- Lereboullet, Soc. méd. des hôp., 1878, 22, III, rel. Gaz. hebdom., 1878, p. 201.
- Lévi, Dans forme hystérique de la maladie de Raynaud et de l'érythromélie. Arch. d. neurop., XIX, 1896, p. 1.
- Leopold-Lévi et de Rothschild, Corps thyroïde et vasomotricité. Société de neurologie, 5, III, 1906. Revue neurolog., 1906, p. 209.
- Léveillé, Syndrome de Maurice Raynaud et Péricardites. Thèse de Paris, 1900.
- Levy, Fränkel et Castel, Maladie de Raynaud. Rétraction de l'aponévrose palmaire. Bulletin de la société de dermatol., 1910, 161.
- Liégeois, De l'efficacité de sulph. de quinine dans un cas d'aphyxie locale. Concours méde. de Paris, 1892.
- Linsert, Über die Egidernadyitis bullosa hereditaria und ihren Zusammenhang mit der Raynaudschen Krankheit. Archiv f. Dermatolog. u. Syphilis, LXXXIV, 1907, 8, 6.
- Lippmann, Fall von Raynaudscher Krankheit. Verein für innere Mediz., 26, XI, 1900. Deutsche med. Wochenschr., 1900, Vereinsbeilage, 8, 295.
- Little, Case of Raynaud's disease. Clinic. Soc. of London, 1897, I, p. 465.
- Lloyd, Spontaneous symmetrical gangrene of the feet. British medical Journal, 1903, I, p. 290.
- Lochte, Ein Fall von allgemeiner Gefäßverrose mit peripherer Gangrän, sog. Raynaudsche Krankheit. Mitt. aus d. Hamburger Staatskrankenanst., 1897, 8, 70.
- Loewenhardt, Fall von Gangrän fast sämtlicher Finger und Zehen, infolge unwillkürlicher Genusses spiritueller Getränke. Med. Zeitschr., 1845, 8, 19.
- Louis, Modification du pied dans la maladie de Raynaud. Thèse de Paris, 1885.
- Lunn, A case of cyanosis of feet (Raynaud's disease). Trans. of Clin. soc. of London, 1887, XX, p. 259.
- Lusgarten, Raynaud's disease in a syphilitic. New York Dermatol. society transact. II, 25, 1906. Journal of cut. and gen.-urin. disease, XXIV, p. 272.
- Lustig, Ein Fall von Raynaudscher Krankheit. Münchener med. Wochenschr., 1908, 46.
- Lutz, Mitteilung eines Falles von symmetrisches Gangrän neben Eklème denselben. Bayr. med. Arch. (Intelligenzbl.), XXXI, 1884.
- Lytle and Greaves, A case of Raynaud's disease. Philad. med. Journal, 1901, p. 230.
- Macdonald, Symmetrical gangrene of the extremities (Raynaud's disease) due to multiple endarteritis and phlebot. Northwest. Lanc., 1903, p. 209.
- MacKenzie, A case of local aphyxia with acute periorica and lupus erythemat. Brit. Journ. of dermatol., 1895.

Macpherson, Case of acute mania with symmetrical gangrene of the toes (Raynaud's disease). *Journ. of ment. scienc.*, 1889, XXXV, p. 61.

Mader, Angiostenosis spastica. Besprechung. *Mittell. aus der III. medizn. Abtheilung. Jahrbuch d. Wiener Krankenzustände*, I, S. 668.

Maixner, Verhandl. d. XII. internat. Congr., nat. Neurol. Centralblatt, 1897.

Makins, A case of spontaneous gangrene of toes in a child with some remarks on its nature etc. *St. Thomas Hosp. Rep.*, XII, 1883, p. 135.

Mälicher, Über Sklerodermie und Sklerodaktylie. *Inaug.-Diss.*, Leipzig 1904.

Manheimer, Ein Fall Raynaud'scher Erkrankung. *New Yorker med. Wochenschr.*, 1906, S. 526.

Mannaberg und Danath, Über paroxysmale Hämoglobämie. *Deutsch. Arch. f. klin. Mediz.*, 1889, Bd. 56, 3 u. 4.

Marsbach, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. *Sitzungsberichte der Künigl. mediz. Gesellschaft u. Polikl.*, 20. X. 1898.

Mege v. Manteuffel, Über angiodermatose Gangrän. *Arch. für klin. Chirurgie*, 1891, 42, S. 549.

Manile, Some forms of vasomotor disturbances including Raynaud's disease. *British med. Journal*, 1902, I, p. 577.

Marchand, *Journal des connaissances médicales de Nantes*, 1857 (nach Raynaud.)

Marion, Syndrome locale des extrémités supérieures à la suite d'une contusion métallique. Disparition rapide de l'affection. *Arch. général de méd.*, 1887, II, p. 485.

Marras, *Archiv. de méd. navale*, XIII, 1870.

Marsh, F., Raynaud's disease associated with hereditary syphilis. *Brit. med. Jour.*, 1892, I, p. 1083.

Marsh, J. H., A case of Raynaud's disease. *Brit. med. Jour.*, 1896, I, p. 147.

Martinez, Syndrome locale des extrémités supérieures. *New York med. Journal*, 1892, p. 492.

Masson, *Bullet. de la société med. de Belge*, 1904, No. 114.

Masseret, Fall von spontaner Gangrän nach Abdominaltyphus. *Deutsch. Arch. für klin. Mediz.*, 1889, V, S. 445.

Massy, *Journal de méd. de Bordeaux*, 1888.

Mattéoli, Artérié oblitérante et gangrène des extrémités. *Gaz. degli Ospedali e delle cliniche*, XXVI, p. 1228, 1903.

Maugue, Contribution à l'étude de la maladie de Raynaud; en fréquence chez les jeunes enfants; forme à siège localité. *Thèse de Paris*, 1895.

Mendel, Gangrène symétrique chez un enfant de quinze mois. *Annal. d. dermat. et de syphil.*, 1895, p. 465.

Meillon, Aphasie locale des extrémités. Psoriasis et melanoderma en plaques. *Bull. et mémo. d. la société d. hôp. de Paris*, 29, V. 1902.

Meyer, Nephasthioidartige Anschwellungen beider Unterextremitäten mit eigenartigen vasomotorischen Störungen an den Händen und Füßen. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1894, 24.

Middleton, A case showing some of the phenomena described in Mr. Jonathan Hutchinson's articles on Acropathology. *Glasg. med. Jour.*, 1894, II, p. 161.

Mills, Charles K., Vasomotor and trophic affection of the fingers. *Americ. Journ. of med. scienc.*, 1878.

Milne, An unusual case of Raynaud's disease. *British med. Journal*, 1906, II, p. 1672.

Misoi, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. *Neurol. Centralbl.*, 1886, 8, 664.

Missa, Zuzhien, Über die Beziehung zwischen paroxysmaler Hämoglobinurie und Raynaud'scher Krankheit mit Berücksichtigung ihrer Ursache. *Syphilis* (japanisch); ref. *Neurologia*, II, 8, 105.

Mohberg, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. *Dermatol. Gesellschaft Stockholm*, 2. V. 1900. *Archiv f. Dermatolog. u. Syphil.*, Bd. 97, 8, 340.

Möbius, Vasomotorisch-trophische Neurosen. *Petersb. Stiftungs Handb.*, V. Bd. I. Aufl., p. 472.

Molin, *Journal de l'art de la mort*, XVI, p. 253, 1898 (nach Raynaud).

Mongouri, Epistaxis et asphyxie locale des extrémités. *Arch. cliniques d. Boileaux*, 1897, 7, ref. *Rev. med.*, 1898, p. 417.

Morre, Th. K., Raynaud's disease. *Glasgow* 1899.

Derselbe, Chorea with Raynaud's disease. *Glasg. med. Journal*, 1897, XLVII.

Derselbe, Raynaud's disease with gangrene of the ear. *Glasgow med. Journal*, 1897, XLVII, p. 32.

Derselbe, Complicated case of Raynaud's disease: local asphyxia with gangrene occurring at a very early age etc. *Glasgow med. Journal*, 1894, XLII, 267.

Hanaki, Eigenständige trophonemotische Störungen. Medizinische Sektion der Schlesischen Gesellschaft für innere, Geburtsh. u. Kinderheilkunde, 3. XI. 1899, ref. *Allgem. med. Centralztg.*, 1899, Nr. 100, 8, 1896.

Horgan, Case of Raynaud's symmetrical gangrene in a patient suffering from constitutional syphilis etc. *The Lancet*, 1899, II, p. 30.

Morton, Raynaud's disease with report of three cases. *Journ. of cutan. and genitourinary diseases*, 1884, XII, p. 248.

Moilliet, A case of Raynaud's disease. *Brit. med. Journ.*, 1897, II, p. 866.

Moussolein, Über die spontane Gangrän. I.-D., Straßburg 1884.

Mouroux, Étude clinique sur l'asphyxie locale des extrémités et sur quelques autres troubles vasomoteurs dans leurs rapports avec la fièvre intermittente. *Arch. de méd. navale*, 1890, p. 340.

Müller, Beitrag zur Raynaud'schen Krankheit. I.-D., Basel 1910.

Müller, Maladie de Raynaud avec troubles trophiques accentués des extrémités des doigts; cardiopathie concomitante. *Lyon médical*, Bd. 114, p. 112.

Munk, Sur la gangre spontanée. *Gaz. hebdomad.*, 1897, 23, IX.

Munro, N. O., A case of symmetrical gangrene with peripheral neuritis. *Brit. med. Journ.*, 1897, II, p. 648.

Murray, Raynaud's disease. *Brit. med. Journ.*, 1896, I, p. 79.

Musser, Raynaud's disease. *Transactions of the coll. of Physic.*, Philadelphia 1886, p. 341.

Myers, Case of Raynaud's disease. *Clinic. Societ. Transact.*, XVIII, 1885, p. 326.

Myrtle, Case of anemic sphacelus. *Lancet* 1861, I, p. 662.

Ni Nabb, *Univers. med. mag.*, Sept. 1891, ref. *Monatsh. f. Derm.*, 1896, XX, p. 674.

Nash, Two cases of Raynaud's disease. *Journ. of genito-urinary and cutan. diseases*, 1896, p. 292.

Naudascher, Paralyse générale et asphyxie symétrique des extrémités. *Revue de Psychiatrie*, XIII, 1909, p. 117.

Nannys, *Uebersichtslicher Anzeiger*, 2. III. 1901. *Münchener med. Wochenschrift*, 1901, 8, 621.

Necker, Ein Fall von Raynaud'schem Symptomencomplex. *Wiener klin. Wochenschrift*, 1888, 3, 815.

Nedopil, Symmetrische Gangrän der Extremitäten. Wien med. Wochenschrift, 1875, S. 623.

Nekras, Über eine unter Raynaud'schen Symptomen erkrankte Familie. Ark. aus dem dermat. Institute, 1903, 2. Beiheft d. Deriv. Betilap, 29. I. 1903. Dasselbe Fest. med. chir. Press, 1909, S. 910.

Neubert, Ein Fall von öfterer Sklerodermie mit Raynaud'schem Symptomenkomplex und Mischelostrophie nebst Beobachtungen über Gelenk- und Knochenveränderungen mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Kiel, i. d. 1906.

Neumann, Ein Fall von mischelstropher Gangrän. Ann. d. Ges. d. Ärzte in Wien, 12. u. 25. V. 1882.

Derzelbe, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. Archiv f. Dermatolog. u. Syphilis, 58, S. 271.

Nicolas et Favre, Sklerodermie et Maladie de Raynaud: examen radiographique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, p. 24.

Nielsen, Ein Fall von symmetrischer Asphyxie und symmetrischer Gangrän, vgl. Virchow-Hirsch' Jahresbericht, 1875, S. 177.

Nüsse, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. Arch. Verh. in Hamburg, 16. X. 1894.

Nothnagel, Zur Lehre von den vasomotorischen Nervenz. Deutsch. Arch. f. klin. Medic., II, 1867, S. 173.

Nott, Provincial med. and surg. Journ. 1846. (Nach Raynaud.)

Noyes, Raynaud's disease (two cases). Australian med. Journ., 1895, p. 265, febr. 1896, p. 140 und 1894, 37—44 (nach Morton).

Obrastoff, Contribution à l'étude des rétroes vasomotrices des extrémités. Cas d'asphyxie locale symétrique. Moniteur med. neurolog., 1902, p. 148.

O'Connor, Raynaud's disease. Brit. med. Journ., 1888, I, p. 588.

Derzelbe, Symmetrical gangrene. Brit. med. Journ., 1884, I, p. 400.

Olliv et Chassy, Adipose indolence accompagnée de troubles vasomoteurs et de sclérodémie. Revue neurolog., 1902, p. 72.

Oehler, Zur Kasuistik und zur Behandlung neuropathischer Gelenkerkrankungen. Beitrag zur klin. Chirurgie. Bd. 68, S. 63.

Olliv, Cyanosis general and local. The Lancet, 1906, II, p. 1772.

Oppenhejm, Zur Lehre von den neurovaskulären Erkrankungen. Deutsche Zeitschrift f. Nervenhelkunde, XL, S. 376.

d'Ormelac, Gangrène spontanée des doigts par arthrite syphilitique. Annal. d. dermatol. et de syphil., 1888, p. 33.

Oshima, Ein Fall von spontaner symmetrischer Gangrän. (Japanisch.) Ref. Neurologia II, S. 106, 1911.

Oster, William, The cerebral complications of Raynaud's disease. Americ. Journ. of med. sciences, 1896, Bd. 112, p. 322.

Oster, Philad. med. Society, ref. Neur. Centralbl., 1898, p. 453.

Owen, Brit. med. Journ., 1893, I, 357.

Paccinotti, La lesione vascolare de Raynaud. Gaz. degli osped. e dell. clin. 1890, p. 55.

Paget, Case illustrating certain nervous disorders. St. Barthol. Hosp. Rep., 1871, p. 67.

Pal, Gefäßknoten. Leipzig 1905.

Palmer, The pathology of Raynaud's disease or local cyanosis or asphyxia locale with report of an unusual case. Transact. of the IX. International medic. Congr., Washington 1887, III, 422.

Panas, Sur un cas de gangrène sèche spontanée du pied gauche. Arch. général. de méd., 1884, II, p. 110.

- Parkinson, A case of local asphyxia of one hand. Clin. Societ. Transact. of London, XXV114, p. 262.
- Pasteur, A case in which transient attack of local asphyxia (Raynaud's disease) was determined by a dog-bite. Lancet 1889, II, p. 14.
- Patella, De la maladie de Raynaud. Clinica moderna, III, 1909, p. 257.
- Patterson, Symmetrical gangrene of the extremities. „Raynaud's disease“. Dublin quarterly Journ. 1893, II, p. 72.
- Pechkranz, Pschyakia melis. Neurolog. Centralbl., 1889, 8, 290.
- Petersen, Neurolog. psych. Gesellschaft, Januar 1907, ref. Neurolog. Centralbl. 1908, 141.
- Pelmar, Symmetrische Gangrän der Fingerklappen. Casopis on. lek., 1906, p. 211.
- Penny, Case of Raynaud's disease. Bristol med. Journal, VI, 48.
- Perone Gradenigo, Gangri spontan. sinist. del das poliglioni delle punta del muso e delle dita dei piedi. Arch. italian. di med. 1894, II, 235.
- Perrin, Acro-asphyxie et acro-sphacèle dans un cas de tabes insipiens. Revue medic. de l'Est., 1908, p. 408.
- Pérges et Banin, Maladie de Raynaud avec coexistence du syndrome adhésion. Journ. de méd. d. Bordeaux, 1911, 5. Juin.
- Petit et Verzeuil, Asphyxie locale et gangrène palustre. Rev. de chirurg. 1885, III.
- Petrin und Thierling, Untersuchungen über das Vorkommen von Vagotonia und Sympathikotonia. Zeitschrift für Klin. Medizin, 73, 1. und 2.
- Petri, Ein Fall von symmetrischer Gangrän. Berl. Klin. Wochenschrift, 1879, 8, 509.
- Peyton, Raynaud's disease. American medecinr, March 1894.
- Plister, Die Raynaud'sche Krankheit. New Yorker med. Wochenschrift, 1909.
- Philip, Über vasomotorisch-trophische Störungen im Anschluß an die Beschreibung eines Falles von Raynaud'scher Krankheit. Journal f. Psychiatrie und Neurologie, XVI, 8, 129.
- Pizzas, Maladie de Raynaud et maladie de Basedow. Il Policlino, XV, 5, 1908, p. 218.
- Ploening, Beitrag zur Therapie lokaler Asphyxie bei Raynaud'scher Krankheit. I.-D. Kgl. 1911.
- Perry et Parvat, Gangrène symétrique des extrémités chez une phthisique hémiste. Lyon medic., 1905, II, p. 769.
- Pisarszewski, Ein Fall von d. sog. hysterischen Ödem und der symmetrischen Gangrän des unteren Extremitäten (Raynaud'sche Krankheit). Gazeta lekarska, 1894, 16. Ref. Neurolog. Centralbl., 1894, 8, 167.
- Pitres et Vaillard, Contribution à l'étude des gangrènes mucroes d'origine nerveuse. Archiv. d. physiol., 1885, V, p. 103.
- Pitt Newton, Brit. med. Journal, 1892, I, p. 273.
- Pléque, L'asphyxie locale des extrémités et son traitement. La presse médicale, 1899, p. 299.
- Pollard, Die ätiologische Rolle des Vasomotoricentrums bei Herzneurosen, Morbus Basedowii und Angioneurosen der Haut. Centralbl. f. innere Medizin, 1907, 2.
- Portal, Gangrène sèche des premières phalanges de tout les doigts des deux pieds et des deux mains. Archiv. général d. med., 1896, XI, 228.
- Porter, The Lancet, 15. II. 1896.
- De Velle, Raynaud's disease of a gangrenous type. Journal of nerv. and mental diseas. XXVII, p. 600, 1900.
- Porpelen, Trophische Störungen der Haut bei spinalen Gliosis oder Syringomyelie. Arch. f. Dermat. u. Syph., XLIV.

Derselbe, Ein Fall von Raynoldscher Krankheit. *Monat. versch. d. dermat. Gesellsch.*, 27. Hft. 92. *Ref. Monatsh. f. Derm.*, 1893, I, 167.

Derselbe, Über ein neues Symptom der Raynoldschen Krankheit. *Med. obs.*, Juni 1901.

Portin, Asphyxie locale des extrémités et érythémalgie chez un même sujet. *Journ. de méd. et de chir. prat.*, 1892.

Powell, Case of Raynaud's disease following diphtheria. *Brit. med. Journ.*, 1886, I, p. 205.

Power, A case of symmetrical gangrene of the feet. *Lancet* 1899, I, 249.

Puzey, *Brit. med. Journal*, 1874, II, 274.

Quercy, *Traité de la gangrène*, Paris 1749.

Racle, Mémoire sur d. nouveaux caractères d. l. gangrène et sur l'existence de cette lésion dans de maladies. *Gaz. médicale d. Paris*, 1859.

Radziżewski, Eine observation de gangrène spontane symétrique des doigts de la main. *Progrès méd.*, 1888, p. 44.

Rakhtzantsoff, Contribution à la sclérose périphérique. Un cas de gangrène symétrique. *Revue de méd.*, 1892, p. 321.

Randall, Raynaud's disease. *Medical age*, 1888, 22.

Ransom and Kingston, Symmetrical gangrene. *Brit. med. Journal*, 1883, I, p. 1063.

Ravogli and Heideggsfeld, Raynaud's disease. *Journ. et the Amer. Med. Assoc.*, 1901, 4, p. 271.

Raymond et Gagerol, Gangrène symétrique des extrémités par artérite chronique oblitérante transitive ou permanente d'étiologie inconnue. *Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière*, 1908, I.

Raynaud, M. De l'asphyxie locale et de la gangrène symétrique des extrémités. Paris 1862, L. Leclerc, Translated by Thomas Barlow, 1888.

Derselbe, in Bousard, Traitement du diabète, Thèse d'agrégation, Paris 1889.

Derselbe, Gangrène symétrique des extrémités. *Nouv. Diction. de médec. et de chir.*, pratique par Jaccoud, Bd. 15, 1872.

Derselbe, Nouvelles recherches sur la nature et le traitement de l'asphyxie locale des extrémités. *Arch. général de médec.*, 1874, I, p. 1.

Reiche, Symmetrische periphere Gangren im Verlauf einer Cholera asiatica. *Ref. Schmidt's Jahrb.*, 240, S. 90.

Reil, Über das Absterben einzelner Glieder, besonders der Finger. *Arch. für Physiologie*, 1807, 1808.

Reipen, Fall von vasomotorisch-nerpischer Neurose. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1898, Vereinshefte, Nr. 28. *Allgem. ärztl. Verein in Köln*, 28. Juni 1897.

Reis, *Vergleichende*, 1892, 5; nach Beck.

Rénou, Du rôle étiologique de la tuberculose dans quelques cas d'asphyxie et de gangrène symétrique des extrémités. (Syndrome de Raynaud.) *Congrès de Paris*, 1900, Section de pathologie interne. *Revue névrol.*, 1902, p. 32.

Rénou, Fèvre et Lacroix, Gangrène symétrique des extrémités. *Soc. méd. des hôp.*; séance d. 13. Janvier 1899.

Rénou et Follet, Sur un cas de maladie de Raynaud. *La semaine médic.*, 1888, p. 286.

Renshaw, Multiple insular necrosis of skin and subjacent tissues. *Brit. med. Journ.*, 1894, I, p. 1238.

de Renzi, Mocho del Raynaud. *Riforma med.*, 1893, p. 262.

Rey, *Archiv. de médec. navale* XII, 1889, p. 131.

Rham, de, Un cas de maladie de Raynaud. *Revue médic. d. l. Suisse romande*, 1897, XVII, p. 574.

- Richard, Gangrène symétrique dans la fièvre typhoïde. *L'union méd.*, 1880, p. 829.
- Richardson, Local syncope et suspended life in local anæsthesia. *Aphlepiad*, 1885, 1-2. (Nach Morris.)
- Riettschel, Ein Fall von paroxysmaler Hämoglobinurie mit Raynaud'scher Gangrän. *Charité-Anzeigen*, XXXI.
- Riggs, C. Report of a case of Raynaud's disease with pathological findings. *Journ. of the Americ. med. assoc.*, Vol. XXI, 24.
- Ritti, De l'asphyxie locale des extrémités dans la période de dépression de la folie à double forme. *Annal. médico-psychol.*, 1882, II, p. 16.
- Riva, Vasomot. Lähmung mit Kälterecheinungen. *Rivist. clin.*, März 1871. (Ref. in Virch.-Hirsch' Jahrbuch.)
- Rivet, Thèse de Lyon, 1906 (nach Fock).
- Derselbe, Syndrome de Raynaud avec gangrène du nez. *Société de Pédiatrie*, 16. IV, 1907, ref. *Revue neurolog.*, 1907, p. 803.
- Rognetta, Gangrènes blanches. Négrées. Gaireson. *Revue médicale française et étrangère*, 1884, I, p. 308. (Nach Raynaud.)
- Rolleston, A case showing some of the features of erythromelalgia and of Raynaud's disease. *Lancet* 1888, I, p. 781.
- Rolleston and Pearson, Generalised akrostermia with Raynaud's disease. *British med. Journal*, 1893, I, p. 273.
- Rondet, Des gangrènes spontanées. Thèse de Paris, 1880.
- Routh, Symmetrical gangrene after enteric fever. *British med. Journal* 1901, I, p. 196.
- Roques, Note sur un cas de gangrène symétrique chez un albuminurique. *L'union méd.*, XXXV, 1893.
- Ross, Seltenes Fall von Gangrän. *Correspondenzbl. für Schweizer Ärzte*, 1876.
- Rosenbaum, Raynaud'sche Krankheit. *Verein für innere Medizin in Berlin*, 23. V. 1892.
- Rosenfeld, Über einige Formen der vasomotorischen Neurase. *Meditr. Klinik*, 1904, S. 38.
- Rosenthal, O., Die Arterienneurase und die hämogenen Hämaturien. *Archiv f. Derm. u. Syphilis*, 61, S. 4.
- Ross and Bury, On peripheral Neuritis. *Lancet* 1893, p. 424. Ref. *Neural. Centralbl.*, 1893, p. 300.
- Ross, Mc Nallen, Amo-artilit. digit. of trochan. nature with asymmetry symptoms. *Lancet* 1899, II, p. 1156.
- Rovignot, De la gangrène symétrique des extrémités chez l'enfant. Thèse de Paris, 1888.
- Roze, Three cases of nervous disease. *Medical Record*, 14. III, 1894.
- Rückert, Bayerisches Intelligenzblatt, 1860.
- Sachs, Raynaud's disease, erythromelalgia and the allied conditions in their relation to vascular disease of the extremities. *Americ. Journal of med. sciences*, 84, 188, p. 300.
- Derselbe, Quelques trophobrémoses: leur rapport avec la maladie des vaisseaux des extrémités. *Philosoph. med. Journal*, 29, I, 1901, ref. *Revue neurolog.*, 1902, p. 145.
- Sackur, Fall von Angiostrophonemose beider Hände. *Beckmann chirurg. Gesellschaft*, 16. V. 1899, ref. *München. med. Wochenschrift*, 1900, 3, 190.
- Säuger, Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. IV, 1902. *München. med. Wochenschrift*, 1902, S. 810.
- Sackton, Asphyxie symétrique des extrémités et menace de gangrène chez

us cuturnin. Traitemens par les bains locaux d'oxygène. La France médicale, 1882, p. 221.

Saint-Philippe, Asphyxie locale des extrémités. Mémoires de Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, 1883.

Salvini, Gangrène symétrique des extrémités supérieures dans un cas d'angine de poitrine. Riforma med., XXIII, 1902, p. 322.

Santvoord, van, Two cases of Raynaud's disease with remarks. Medic. Record, 1888, I, p. 35.

Sarda, Nouveau Hespeller médical, 1892, 25.

Sarvonnat, Étiologie et pathogénie de la maladie de Raynaud. Con. des hôpitaux, 1902, p. 771.

Sauer, Über lokale Asphyxie und symmetrische Gangrän der Extremitäten. Stralburg, L.-D., 1884.

Savill, Lectures on hysteria and allied vasomotor conditions. London 1909, p. 112 u. 4.

Scarpini, L'infiammazione locale delle estremità. Arch. univ. di med., April 1884.

Schäffer, Raynaud'sche Krankheit und Trauma. Ärztliche Sachverständigen-Zeitung, 1902, S. 22.

Schamberg, Un cas de maladie de Raynaud. Dermatolog. Society of Philadelphia, 19, XI, 1901.

Scheiber, Ein Fall von symmetrischer Asphyxie. Wiener med. Wochenschrift, 1892, Nr. 39/42.

Schiff, Ein Fall von symmetrischer Gangrän (Raynaud) auf hereditärer Grundlage. Journal f. Kinderheilk., 64, 1900, S. 370.

Schlesinger, Beiträge zur Klinik der Rückenmarks- und Wirbelsäulen. Wien 1898, S. 135.

Derselbe, Die Syringomyelie. Wien 1899. Duodec. II. Aufl. Wien 1902.

Derselbe, Diskussion zum Vortrag von Mauthner: Hämiplegie und Syringomyelie. Wiener klin. Wochenschrift, 1906, S. 739.

Schmid, Symmetrische Gangrän nach Raynaud. Schweizerische Gesellschaft f. innerl. Naturg., 22, I, 1909. Ber. Deutsche med. Wochenschrift, 1909, S. 1291.

Sekrader, Bernhard, Collection académique, partie française, III, p. 238, 1771/74.

Sekhor, Nord. med. ark., I, 4, Nr. 3, 1869, p. 72. Ber. Virch.-Hirsch' Jahrb., 1878.

Schultz, Pykno abdominalis und symmetrische Gangrän. Deutsches Arch. f. Klin. Med., XXXV.

Schuster, Fußgangrän infolge von Syphilis. Arch. f. Dermatol. und Syph., XXI, S. 779.

Schwab, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. Breslauer dermatolog. Vereinigung, 15, XII, 1902. Derselbe Fall von Juliusburg. Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. Archiv f. Dermatol. u. Syphilis, LX, S. 128 u. Breslauer Dermatolog. Vereinigung, 2, II, 1901.

Schwimmer, Die neuropathischen Dermosen. Wien 1893.

Sie, Asphyxie locale et gangrène symétrique. La Pratique dermatolog., I, p. 436.

Seeligmüller, Lehrb. d. Krankh. d. periph. Nervensystems. Braunschweig 1888, S. 377.

Seldmann, Ein Fall von symmetrischer Gangrän der Extremitäten nach Pneumonie. Deutsche Zeitschrift für Nerven., XXVII, S. 214.

Sgrana, Riberna medica 1890, 70. Ber. Wochenschr. f. Dermatol., 1890, I, p. 197.

Skane, Raynaud's disease. New York med. Journal, 1886, I, p. 676.

Sheppard, Three cases of trophic lesions occurring symmetrically on the extremities. *The British med. Journal*, 1908, 28, II, p. 1908.

Derxolbe, A hitherto undescribed form of superficial dermatitis probably trophic in origin. *Journal of the Malaya branch of the British medical Assoc.*, December 1905.

Sherrwell, Brooklyn Dermat. and Genito-urinary Assoc., II, XI, 62.

Short, *Brit. med. Journal*, 1907, I, p. 1349.

Short, A case of Raynaud's disease. *British med. Journal*, 1911, I, p. 755.

Sischer, Über intrakraniale trophicomeiotische Blutaffecten. *Archiv f. Gynäk.*, Bd. 58, 465, II, 3.

Simpson, Remarks on Raynaud's disease with cases. *Edinb. med. Journ.*, 1883, I, p. 1008.

Derxolbe, Case of Raynaud's disease. *Brit. med. Journal*, 1899, I, p. 805.

Sinkler, W.A., A case of trophicneurosis of the hands (acrotrophicneurosis) with spontaneous amputation of the fingers. *Journ. of nerv. and mental diseas.*, XXVI, 2, p. 387.

Skipton, A case of Raynaud's disease. *Lancet* 1893, I, p. 144.

Skop, Über Raynaud'sche Krankheit. *Oecon. psych.*, 1909, 7.

Smith, Case of spontaneous gangrene of the thumb and fingers of the right hand. *Clin. Societ. Transact.*, 1886, XIII, p. 196.

Derxolbe, *Brit. med. Journ.*, 1892, I, p. 573.

Solis-Ushon, Vasomotor ataxia: a contribution to the subject of dyscrasias. *Amer. Journ. of med. scienc.*, Bd. 102, p. 120 u. Assoc. of the Am. Phys. 1902.

Solly, Remarkable case of dry gangrene with some remarks on the disease. *Medic. Chirurg. Transact.*, 1838, XXII, 255-266. 1840, XXIII, 257-242.

Sommelet, Contribution à l'étude de la gangrène symétrique des extrémités (maladie de Raynaud) chez les enfants. *Thèse de Paris*, 1905.

Souques, Maladie de Raynaud de nature hystérique. *Séances de la société med. des hôpitaux de Paris. Hist. des hôpitaux*, 1902, p. 645.

Souques et Vincent, Un cas de syndrome de Raynaud d'origine broncho-ectasique. *Bull. et Mém. de la société méd. des Hôpitaux de Paris*, 19, VII, 1906, rel. *Revue neur.*, 1907, p. 492.

Southey, Case of local asphyxia. Symmetrical gangrene. *Clinical Society Transact.*, 1883, XVI.

Derxolbe, Case of symmetrical gangrene with some remarks on the disease. *St. Barthol. Hosp. Rep.*, 1886, XVI, p. 71.

Spiegler, Spontane symmetrische Gangrän. *Wien. dermatolog. Gesellschaft*, I, XII, 1901, rel. *Wiener klin. Wochenschrift*, 1902, S. 737.

Spieler, Gesellschaft f. innere Medizin und Kinderheilk. in Wien, 2, XI, 1905, rel. *Wien. klin. Wochenschrift*, 1905, S. 1195.

Spillmann, La maladie de Raynaud. *La médecine moderne*, 1894, 66.

Stanley, A case of digital mortui of four and a half year's duration. *Journ. of nerv. and ment. diseases*, 1886, XX, p. 28.

Stevensson, The electric bulb. *Lancet* 1887, I, p. 925.

Steiner, Spontane symmetrische Gangrän. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1888.

Stern, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit, dabei Schwelungen im Gesicht. *Schlesische Gesellschaft f. vaterländische Kultur*, I, II, 1907.

Stevensson, A case of Raynaud's disease. *Lancet* 1890, II, 4, 927.

Stewart, W., A case of Raynaud's disease. *Transact. med. chirurg. Soc.*, 1905, p. 100.

Derxolbe, Coexistent symmetrical gangrene. *The Lancet*, 5, V, 1883.

Stewart, Purves, Die Diagnose der Nervenkrankheiten. *Deutsche Über-*

setzung von Dr. Karl Stein. Leipzig 1910, S. 352. (Familiäre Gangrän an den Füssen bei drei Brüdern; im Text ist diese Beobachtung, die dieselbe Erkrankung, wie bei Bruns, Nekem, Ockelcker betrifft, nicht vermehrt worden.)

Strunz, Zur Kasuistik der Raynaud'schen Krankheit. Med. Obs., Juni 1901. Sturmshof, On symmetrical gangrene. New York med. Record, 1891, 1.

Suckling, Brit. med. Journal, 1887, II, p. 298.

Sudeek, Symmetrische neurotische Gangrän nach Lumbalanästhesie. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, 106, S. 618, 1910.

Symonds, Brit. med. Journ., 1892, I, p. 275.

Tannahill, Purple suffusion of the extremities alternating with attacks of hematuria. Brit. med. Journ., 1888, II, p. 1213.

Derselbe, Raynaud's disease or local asphyxia and symmetrical gangrene of the extremities. The Glasgow med. Journ., 1888, XXX, p. 425.

Targowla, Un cas d'asphyxie locale symétrique intermittente des extrémités chez un lymphatique. Annal. médico-psycholog., 1892, XV, p. 490.

Taylor, A case of Raynaud's disease. Lancet 1887, I, p. 298.

Derselbe, Two cases of Raynaud's disease. Journ. of cutan. and genito-urin. diseas., VIII, p. 382.

Telesko, Ein Fall von symmetrischer trophischer Öhraffektion bei Syringomyelie. Wiener med. Wochenschrift, 1910, S. 870.

Teodorpf, Beitrag zur Lehre von der symmetrischen Gangrän. Arch. f. Psychiatr., XXXIII, S. 258.

Testat, De la symétrie dans les affect. cutan. Thèse de Paris, 1876.

Thère, Considérations sur un cas d'asphyxie locale des extrémités. Thèse de Paris, 1872. (Nach Hossion und Garrigue.)

Thibierge, G., Les lésions artérielles de la syphilis. Gaz. d. hôpit., 1899, II.

Thiersch, Ein Fall von symmetrischer Gangrän der Extremitäten (Raynaud'sche Krankheit), Tod infolge von Apoplexie. Arteriosklerose. Münch. med. Wochenschrift, 1895, S. 1128.

Thomas, A case of Raynaud associat. with contractions and haemoglobinuria. John Hopkins Baltimore Reports, 1890/91, II, p. 114.

Thomson, Zwei Fälle von Raynaud. Monatschr. f. Dermat., 1888, I, p. 338.

Thompson, A case of Raynaud's disease occurring in a patient suffering from Graves disease. Med. Record, II, X, 1902.

Tonison, Vasomotor neuron. Lancet 1892, II, p. 877.

Topinard, Bulletins d. l. Société anatomique. I. Serie, XXX, p. 523. (Nach Raynaud.)

Taunton, Brit. med. Journal, 1894, I.

Gilles de la Tourette, Traité clin. et thérapeut. de l'hystérie. II. Paris 1895.

Towle, A possible case of Raynaud's disease. Journal of cut. and genito-urinary disease, XXVII, p. 563.

Tracy, New York med. Record, 1881, p. 288.

Treves, A case of pulsating tumour of the head with Raynaud's disease. Brit. med. Journ., 1886, II, p. 721.

Tscherbäck, Hypo- bzw. Areflexie bei funktionellen Nervenkrankheiten. Korakoffs Journal 1910. Festschrift für Roth, Neurolog. Centralbl., 1911, S. 743.

Touretzini, Sclérodermie et asphyxie symétrique des extrémités. Rev. med. d. l. Suisse Romande, 1910, p. 340.

Twedd, Symmetrical gangrene of ears. Dubl. med. Journ., 1885, II, p. 175.

- Unna, Über Frost. Monatschr. f. Dermatol., 1889, I, S. 292.
- Urbanowitsch, Fall von spontan. symmetr. Gangrän. Sitzung d. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 30. V. 1890.
- Urquhart, On two cases of Raynaud's disease. Edinburgh med. Journ., 1895, I, p. 812.
- Vaillard, Revue médic. mens. milit., 1877.
- Vendor, A case of symmetrical gangrene. Med. News, 1888, p. 461.
- Verdalle, Asphyxie locale et gangrène symétrique des extrémités. Athérome artériel généralisé. Journ. d. méd. d. Bordeaux, 1882.
- Verdelli, Contribuzione allo studio dell'atrosia e gangrena simmetrica delle estremità (Morbo di Raynaud). Rivist. clin., 1896, XXXV.
- Vernieuil, Compt. rend. de l'Acad. de Méd., 3. XI. 1897. Ret. Alg. med. Centralztg., 1898.
- Vespa, Sopra un caso di sclerodermia e uno di malattia di Raynaud. Boll. della Soc. Lanci., XVI.
- Villard, Gangrène symétrique ou maladie de Raynaud, localis. six semaines après. Lyon médic., 1890, p. 195.
- Viville, Contribution à l'étude des gangrènes des pieds d'origine nerveuse. Thèse de Paris, 1888.
- Vaisselet et Fontaine, A propos de quelques observations de la maladie de M. Raynaud. L'encéphale, 1910, II, p. 196.
- Valpian, Asphyxie et syncope locales des quatre extrémités. Accidents cérébraux et cardiaques. élection; amputation. Gaz. des hôp., 1884, p. 65.
- Derselbe, Clinique médic. de l'hôpital de la Charité, 1879, p. 872.
- Wald, Raynaud's disease. Brit. med. and surg. Journ., 1888, 8.
- Walsh, Journ. of dermatology, März 1897.
- Wandel, Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. Münchener med. Wochenschrift, 1889, 8. 288.
- Warrings, Hygiea 1889, 41, p. 117. Ret. Neurol. Centralztg., 1890, 8. 103.
- Warren, Symmetrical gangrene of the extremities. Brit. med. and surg. Journ., 1879, I, p. 25.
- Weaver, Case of symmetrical gangrene. Lancet 1888, II, p. 859.
- Weber, Handb. der Chirurgie von Pitha-Billroth, I, 1, S. 555.
- Weil, M., Über symmetrische Gangrän. Wiener Klinik, 1882, 8. 347ff.
- Derselbe, Über sogenannte symmetrische Gangrän. Prager Zeitschr. f. Heilkunde, 1882, 8. 233.
- Weil, E., Untersuchungen über die spontane Gangrän der Extremitäten und ihre Abhängigkeit von Gefäßerkrankungen. Inaug.-Diss., Dorpat 1903.
- Werner, Über einen typischen Fall von spontaner symmetrischer Gangrän. I.-D. Jena 1900.
- West, Samuel, Raynaud's disease. Brit. med. Journ., 1888, I, p. 359.
- Westphal, Über hysterische Pseudotetanie mit eigenartigen vasomotorischen Erscheinungen. Berl. Min. Wochenschrift, 1902, 49, 8. 1567.
- Wetherell, Case of Raynaud's disease. Lancet 1889, I, p. 1202.
- Wetzel, Ein Fall von multipler Neuritis mit Athetose und Raynaud'scher Krankheit. Münchener med. Wochenschrift, 1899, 8. 417.
- Wherry, Clinical sketches. August 1890. (Nach Morris.)
- White, W. H., Fatal case of Raynaud's disease in a girl having mitral and tricuspid stenosis etc. Clin. Journ, 1894, III, 369—375.
- White and Davis, Raynaud's disease. Boston med. and surg. Journ., CLII, p. 749, 1905.
- Dieselben, Case of Raynaud's disease. Journal of cut. and genitourinary disease, XXV, p. 126.

- Whitton, Case of Raynaud's disease. Austral. Med. Gaz., 1890/91, p. 353—354. (Nach Monroe.)
- Wiener, Boston med. and surg. Journ., 1896, I, p. 146.
- Wigglesworth, Periphreal neuritis in Raynaud's disease (Symmetrical gangrene). Brit. med. Journ., 1887, I, p. 52.
- Wilke, S., Case of haemoglobinuria, gangrene of the fingers etc., associated with prolonged suppuration. Med. Times and Gazette, 1879, II, p. 207.
- Wittl, Ein Fall von Gangrän an beiden oberen Extremitäten infolge von Atheritis obliterans. Berl. klin. Wochenschr., 1896, 8, 258.
- Wills, On some cases of Raynaud's disease and its association with scleroderma. Clin. Journal, XXI, 1902, p. 10.
- Windscheid, Die Pathologie und Therapie des Klimakterischen Neuroses. Deutsche Praxis, 1897, 7.
- Winstanley, A case of symmetrical gangrene of the lower limbs. Lancet, 1896, II, p. 811.
- Wölfl, A., Fall von Raynaud'scher Krankheit. Berl. med. Gesellschaft, 22. XI. 1906.
- Wood, Transact. of the Coll. of Physic. Philadelphia 1882.
- Woodson, Clinical history and presentation of two cases of Raynaud's disease. Medical Fortnightly, XXXIV, 1904, p. 420.
- Wroblevsky, Verhandlungen der Section für Chirurgie, IV. Kongreßrussischer Ärzte, Januar 1890. Ref. im Centralbl. f. Chirurg. 1891, p. 336.
- Wynhoff, Weckblad von Nadel, Tidnede, 1896.
- Young, Brit. med. Journal, 1884, II, p. 835.
- Zambaco, Gangrène spontanée produite par perturbation nerveuse. Paris 1857.
- Zaxodafetelli, Intoxication par le tabac et ses rapports avec les angiospasmes et la maladie de Raynaud. Assemblée scientifique des médecins de l'Académie psychiatr., 17. II. 1903, Berns. neurol., 1911, p. 422.
- Zeller, Zur Kenntnis der Raynaud'schen Gangrän. Inaug. Dissert., Berlin 1894, und Berl. klin. Wochenschr., 1897, 8, 1263.
- Zengerle, Über symmetrische Gangrän (Raynaud'sche Krankheit). Mediz. Correspondenz-Blatt des Württemb. Med. Landesvereins, LXIX, 4. III. 1899, p. 274.
- Zerbes, Über symmetrische Gangrän. Wiener med. Wochenschrift, 1896, 8, 251.
- Zingerle, Ein Fall von vasomotorischer Neurose, zugleich als Beitrag zur Kenntnis der nervösen Störungen im Klimakterium. Jahrbuch f. Psychiatrie, XIX, 362.
- Zoja, Le poati de la main pendant les accès d'angiospasmus et d'angiospasmolyse; contribution à l'étude de la maladie de Raynaud. Gazet. med. di Torino 1898, p. 641, ref. Rev. neur., 1898.

Anhang.

Babkin, Ein Fall von Akroasphyxie bei einem 14-jährigen Mädchen. Sammlung von Arbeiten der Ärzte der Kinderklinik d. kaiserlich. Wilhelms. Medizin. Akademie St. Petersburg, 1908 (russisch), zit. nach Kärtle.

Barker and Sladen, On acrocyanosis chronica anaesthetica with gangrene, its relation to other diseases especially to Raynaud's disease and erythromelalgia. Journal of nerv. and ment. disease, 1907, p. 743.

Böttiger, Ein Fall von Akroasphyxie, kompliziert durch Erscheinungen der Raynaud'schen Krankheit. Münch. med. Wochenschrift, 19. Dezember 1899.

Chrastek, Zur Symptomatologie der Akroasphyxie. Wien. Med. Wochenschr., 1899, 8, 1896.

- Crocq, De l'akrocyranose. La semaine médicale, XVI, 1896, p. 238.
- Garcin et Souquet, Un cas d'hypertrophie des pieds et des mains avec troubles vasomoteurs des extrémités chez un hystérique. Nouv. Iconogr. d. L. Salpêtr., 1892.
- Hallopeau, Sur une variété d'angio-nerose donnant lieu à des plaques d'insensibilité profonde-périodiques avec œdème, anesthésie, achromatose et taches pigmentées. Annal. d. dermat. et de syphil., 1891, p. 330.
- Hallopeau et Grandchamp, Sur une dermite végétante avec Elephantiasis cutané sur une aphyxie locale mutilante des extrémités. Annales de dermatolog., 1906, p. 168.
- Hirschfeld, Über Vergrößerung der Hände und Füße auf nervitischer Grundlage. Zeitschrift für Min. Medizin, 44, S. 251.
- Hoffmann, Bemerkungen zu einem Fall von Akromegalie. Deutsch. med. Wochenschr., 1885, S. 368.
- Hutshinson, Zwei bemerkenswerte Fälle symmetrischer peripherischer ödemiger Hauthypertrophie mit Induration. Monatsh. f. Dermatol., 1888, II, S. 1262.
- Jordens, Über eine seltene Kombination von Syringomyelie mit Catia laza und Hyperflexibilität. Medizin. Klinik, 1909, S. 849.
- Johannessen, Lokale Aphyxie kombiniert mit Funktionsstörungen vonseiten des Gehirns. Deutsch. mediz. Wochenschr., 1897, S. 547.
- Kartje, Über Akroasphyxie im Kindesalter. Archiv für Kinderheilkunde, LIII, S. 302, 1916.
- Kollaritz, Akromegale und Schwellung der Weichteile. Deutsch. Archiv für klinische Medizin, LXXXVI, S. 504.
- Mager, Zur Kasuistik der vasomotorischen Neurosen. Prager med. Wochenschrift, XXVI, 1901, Nr. 26, S. 316.
- Meyer, Elephantienische Anschwellungen beider Unterschenkel mit eigenartigen vasomotorischen Störungen an den Händen und Füßen. Deutsche med. Wochenschr., 1894, 24.
- Necknagel, Zur Lehre von der vasomotorischen Neurose. Deutsch. Arch. f. Min. Med. II, 1862, S. 171.
- Péris, L'acrocyranose chronique hypertrophique. Nouvelle Iconogr. d. L. Salpêtr., 1893, p. 1.
- Scheiber, Ein Fall von symmetrischer Aphyxie. Wien. mediz. Wochenschr., 1892, Nr. 39/42.
- Schütz, Rhythmusstörung und Hautatrophie. Dermatol. Zeitschr., VI, 1899, S. 297.
- Sonza-Leite, De l'acrocyralie. Paris 1886, p. 112.
- Steinberg, Lokale Aphyxie. Schlesische Gesellschaft f. vaterl. Kultur, 3. III, 1906. Deutsche med. Wochenschrift, 1906, Vereinsbeilage S. 1171.
- Steinberg, Die Akromegalie. Necknagel's spez. Pathologie und Therapie, VII, 2, Wien 1897.
- Stollner, Ein Fall von angeborener Akroangiostomie. Charité-Analen, Bd. XXVIII.
- Wirschowski, Zur Frage über die Akroasphyxie. Praktische Ärztschr., 1904 (russisch).

Fünftes Kapitel.

Die Sklerodermie.

- Arckharcé, Sur un cas de sklerodermie en plaques, guéri par l'ectralysine. Gaz. med. d'Orléans, XLVII, p. 20.

- Adam, Ein Fall von isolierter Sklerodermie der Lider. Berl. Ophthal. Gesellschaft. 25. IV. 1902.
- Addison, On leprosy. Medie. chirurg. Transactions. 1858, S. 27.
- Adler, Berl. med. Gesellsch., Sitz. 11. III. 1899.
- Afaelins, Sklerodermie mit Histiophilus bacillus. Archiv f. Dermatolog. u. Syphil., Bd. 106, S. 1.
- Alexander, Mehrere Fälle von Histiophilie. Dermatolog. Zeitschrift. XI, 5, S. 338.
- Allen, New York Dermat. Soc., Oct. 1897. Ital. Arch. f. Dermat., Bd. 50, S. 106.
- Alpir, Verhandl. des Vereins ungar. Dermatologen und Urologen. 25. III. 1897, und 27. I. 1898.
- Alquier, Sur la nature de sclérodémie. Gaz. des Hôpitaux. 1904, 106.
- Alquier et Teuchard, Des lésions périvasculaires de la sclérodémie généralisée. Société de Biologie. 23. XII. 1905.
- Andersen, Fall v. Sklerod. Brit. Journ. of Dermat., Febr. 1898.
- Anitschkoff, ed. Virchow-Hensen' Jahresber., 1898, II, S. 620.
- Apert, Erace et Rousseau, Sclérodémie avec arthropathie ankytose et atrophie musculaire chez un enfant de 21 ans. Bullet. de la Société franç. de Dermatolog. 1908, 7, 244.
- Arrangeli, Tre casi di sclerodermia. Bollettino della società Lancia. XIV, 1886, II, p. 52.
- Arning, Sklerodermie. Deutsche med. Wochenschr., 1897, Nr. 27.
- Arnold, Three cases of scleroderma. Ant. Journ. of med. sciences, July 1868.
- Arnsperg, Gefäßveränderungen bei Sklerodaktylie. Intern. dermat. Congr. Paris 1888.
- Asher, L. Centralbl. f. Physiolog. 24, Nr. 39, 1904.
- Asher und Flack, Zeitschr. f. Biologie Bd. 55, S. 82, 1910.
- Aubert, Lyon médical, 1877, Nr. 39, und 1878.
- Bailey, Behandlung der Sklerodermie. New York Acad. of Med., 16. IV. 1886.
- Ball, Gazette médicale, 1872. Soc. méd. des Hôpitaux, 1871.
- Ballet et Helffer, Myopathie progressive avec troubles mentaux et sclérodémie (myodermopathie progressive). Revue neurolog., 1905, S. 441.
- Bamberger, Das Skleroderm und seine Beziehungen zur Sklerodermie. I.-D. Heidelberg, 1908.
- Baraquet, L. Histoire clinique d'un cas d'atrophie du tissu cellulo-adipeux. Barcelone 1906. Ref. Neurolog. Centralbl., 1907, S. 1972.
- Barth, Ein Fall von Sklerodermie bei einem Kinde von dreiviertel Jahren. Lang.-Diss., 1882, Rostock.
- Bérigneuil et Monnier, Sur un cas de sclérodémie avec aplasie congénite. Gazette médicale de Nantes, 1893, 1894, S. 78, 82.
- Becker, Demonstration eines Falles von Sklerodermie. Wanderversammlung sächsisch-deutscher Neurologen und Irrenärzte. Baden-Baden 1./2. VI. 1907, ed. Neurolog. Centralbl., 1907, S. 619.
- Beer, Über Sklerodermie. Wiener med. Wochenschr., 1894, 45.
- Beer, Zur Pathologie der Sklerodermie u. d. Hochen Baselinii. Wiener medizin. Presse, 1906, S. 1919.
- Beutner, v., Über einen nach Gebrauch von Radiumstationen wesentlich gebesserten Fall von Sklerodermie. Deutsche medicin. Wochenschrift, 1901, S. 22.
- Bernhardt, Zeitschr. f. Mik. Med., Bd. VI, p. 277.
- Beron, Zur Kasistik der trophischen Erkrankungen der Haut. Zeitschrift für Dermatol., 1897, Sept., S. 614.

- Bertin, Sur un cas de sclérodémie diffuse. *Echo méd. du nord*, 1902, VI, p. 253.
- Besnier, Observation pour servir à l'histoire des dermatoscléroses. *Ann. de dermat. et de syph.*, 1889, p. 83.
- Besnier et Doyon, *Maladies de la peau par Raposé*. Trad. avec notes et additions. Paris 1890.
- Beuke, Ein Fall von diffuser Sklerodermie. *Deutsche mediz. Wochenschrift*, 1911, 42.
- Bettmann, Krankendemonstration. *Münchener mediz. Wochenschrift*, 1900, 302.
- Biro, Über Sklerodermie. *Medycyna*, 1896, No. 46—49.
- Derxelle, Sklerodermie. *Neurolog. Centralbl.*, 1902, 8. 1071.
- Hitot, zit. nach Möbius.
- Blaine-Denver, Americ. *Journal of dermatology and genito-urinary diseases*, 1897.
- Blaschko, Die Nervenverteilung in der Haut in ihrer Beziehung zu den Erkrankungen der Haut. Wien 1901.
- Bleandale R., A case of diffuse sklerodermis. *Brit. med. Journal*, 18. III. 1900.
- Bloch, Ein Fall von Sklerodermie. *Berl. med. Ges.*, 15. III. 1899.
- Bloch und Reitmann, Untersuchungen über den Stoffwechsel bei Sklerodermie. *Wien. klin. Wochenschrift*, 1906, 8. 630.
- Blumenthal, *Berl. klin. Wochenschr.*, 1882, 8. 127.
- Boldani, Un caso de sclerema de neonati e su terapia. 1872.
- Bombarda, Un cas de trophoblérome généralisé. *A medicina contemporanea*, XVI, 1888, p. 5. ref. *Rev. neural.*
- Bowth, zit. nach Raymond.
- Bouillies, Thèse de Paris, 1886.
- Beauvryon, De l'hémistrophie faciale dans ses rapports avec les lésions du ganglion cervical. *Revue neurolog.*, 1902, 8. 211.
- Bradshaw, A case of sklerodermis. *Brit. med. Journal*, 1900, I, 5. IV, p. 964.
- Brault, Trois observations de sclérodémie en plaques limitées au front et au cuir chevelu. *Annal. de dermat. et de syph.*, 1891, p. 778.
- Briessand, *Leçons sur les maladies du système nerveux* (deuxième série). Paris 1888.
- Bracq, Sclérodémie en bandes traitée par l'électrolyse. *Ann. d. dermat. et syph.*, 1892, p. 27 und *Ibid.*, 1898, 2.
- Bracq et Veillon, Sclérodémie en plaques et en bandes chez une petite fille. *Ann. de dermat.*, 1896, p. 693.
- Bronson, *New York Dermat. soc.*, 25. IX. 1894, ref. *Annal. d. dermat.*, 1895, p. 571.
- Broschin, *Gaz. des hôp.*, 1873, 16. März.
- Bruno, Über einen Fall von diffuser Sklerodermie der Beine mit scharf spinal-segmentärer Abgrenzung nach oben. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1899, 8. 486.
- Bülow, Ein Fall von Sklerodermie. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1885, 8. 27.
- Cagliati, Klinischer und anatomischer Beitrag zum Studium der halbseitigen Hypertrophie. *Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilk.*, XXXII, p. 282, 1907.
- Calerotte et Pages, Un cas d'hémistrophie faciale progressive. *Nouvelle Iconogr. d. l. Syph.*, 1900, p. 26.
- Calwell, Sclérodémie circonscrite. *Univ. med. Society*, 28. II. 1907, ref. *Revue neurolog.*, 1907, p. 1011.
- De Casal, Ein Fall von Sclerosis indeterminata. *Ref. Monatshefte f. Dermatol.*, 1894, XVIII, p. 270.

- Du Castel, La sclérodermie. *Gaz. des hôpitaux*, 1902, p. 567.
- Castellino e Cardì, Sclia gangrena simmetrica delle estremità. *R. Morgagni*, 1880, I, p. 625.
- Cattarossi, Un cas d'hémistrophie de la face. *R. Policlinico*, 1900, XVI, p. 518.
- Cavalet, *Brit. Journ. of Dermat.*, Juli 1896.
- Christens, Zur Sclérodermie im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderheilk.*, XXXVI, 1893, p. 86.
- Chalvet et Luyt, éd. von Garnier (ed. nach Levin-Hellès).
- Charcot, Oisique des Maladies du système nerveux, 1892. Œuvres complètes, Bd. X. Chapitres 1.
- Chervet et Carle, Deux cas de sclérodermie progressive avec mélanodermie généralisée. *Lyon médical*, 1904, p. 357 et 363.
- Chaufard, Sclérodermie avec hémistrophie linguale ayant débüté par le syndrome de la maladie de Raynaud. *Gazette des hôpitaux*, 1896, p. 818.
- Chiari, Über den anatomischen Befund in einem Falle von Scleroderma universale. *Vierteljahrsschr. f. Dermat.*, 1878, p. 187.
- Chiari, Sclerodermitis facialis progressiva. *Ill. med.*, 1910, 19.
- Cohen, *Deutsche med. Wochenschr.*, 1885, p. 28.
- Collez, Thèse de Paris, 1873 und *Gazette des hôpitaux*, 1873.
- Collin, Thèse de Paris, 1896.
- Collins, Facial Hemistrophy. *The Post-Graduate*, XX, p. 519.
- Colucci, Contributo alla diagnosi del così detto morbo di Raynaud. *Annal. d. nevrol.*, Bd. XVI.
- Constantin et Leyrat, Observation sur l'état du sang dans la sclérodermie. *Journal de dermatol. et de syphil.* VIII, 2, 130, 1906.
- Corlett, A case of circumscript scleroderma (Morphea). *Journ. of cutaneous and genito-urinary diseases*, 1894, p. 32.
- da Costa, Sclérodermie. *Annales de dermatol.*, 1899, p. 487.
- Crocker, Clinical lectures on Scleroderma. *Lancet* 1885, I, p. 190.
- Crouzet et Villaret, Hémistrophie congénitale. *Revue neurolog.*, 1907, p. 406.
- Cruse, *Jahrb. f. Kinderheilk.*, XIII, 36, 1878.
- Dana, Scleroderma and Facial hemistrophy. *Medic. Record*, 1896.
- Daniels, Cas de sclérodermie en plaques. *Annal. de dermatol.* 1896, p. 373.
- Dezsolibe, Dermatosclérose en bandes. *Soc. d. Dermatol. et de syph.*, 25 November 1898.
- Dezsolibe, *Annales de dermatol.*, 1903, p. 585.
- Dazier et Gaston, Sclérodermie en plaques du type insidieux. *Ann. d. dermat.*, 1897, p. 431.
- Day, Case of Scleroderma. *Amer. Journ. of medic. sciences*, 1870, Bd. 69, p. 352.
- Déhs, Sclérodermie ou Myxodème. *Annal. de dermatol.*, 1899.
- Dejerine et Mitrault, *Arch. d. physiol.*, 1895, p. 780.
- Delbanc, *Ärztliches Verein s. Hamburg* 23. IV. 1906 und 13. XI. 1906. *Münchener med. Wochenschr.*, 1906, 8. 1186 u. 2324.
- Dercum, On scleroderma and chronic rheumatoid arthritis. *Journ. of nerv. and ment. diseases*, 1898 p. 383.
- Derselbe, Scleroderma. *New York Academy of Medic.*, 16. IV. 1896. *Ref. Med. Rec.*, 1896, I, p. 603.
- Despagnet, Sclérodermie palpébrale. *Médecin modic.*, 1900, p. 187.
- Dinkler, Zur Lehre von der Scleroderma. *Deutsches Archiv für Klin. Med.*, 48, 1891, 8. 514 ff.

- Dittrichs, Über Morbus Basodermi. Basel 1885. I. D. 24016.
- Doy, in: Arch. f. Dermatol., XXXII, 8, 433.
- Doutrelepont, Ein Fall von Sklerodermie. Deutsche med. Wochenschrift, 8. VI. 1882. Versammlungs.
- Dreschfeld, On two cases of diffuse scleroderma. Medical chronicle, 1897, Januar.
- Dreyzel and Oppler, Arch. f. Dermatol., XXX, 8, 62.
- Duclos, Quelques cas de sclérodémie localisée à distribution métastatique. Thèse de Paris, 1896.
- Dubouché, Archiv. de dermatol. et de syphil., 1904, p. 355.
- Dührwick, Rheumes miliaires folliculaires. Sclérodémie consécutive. Annal. d. dermat. et de syphiligr. VII, p. 563, 1906.
- Dufour, Gazette médicale de Paris, 1873, p. 425.
- Dupré et Guillaum, Association des syndromes basidermies, sclérodémique et érythémateux. Mem. de la société méd. des hôp. de Paris, 1900, 4, V.
- Dupré et Kahn, Sclérodémie et maladie de Raynaud. Syndrome polyglanulaire. Gaz. des hôpitaux, 1909, p. 895.
- Epstein, Zur Pathologie und Therapie der Sklerodermie im Kindesalter. Deutsche med. Wochenschrift, 1905, 1 u. 2.
- Erdowas, Englische dermatolog. Gesellschaft, 26. IX, 1898. Ref. Dermat. Centralbl., 1899.
- Ehlers, La sclérodémie et sclérodactylie serait-elle une manifestation de la tuberculose. Soc. de dermatolog. et syphil., 8. XII. 1900.
- Ehrenberg, Beteiligung des Urogenitalapparates bei einem Fall von Sklerodermie. Berl. klin. Wochenschrift, 1911, 8. 1382.
- Ehrmann, Arch. f. Dermatol., XXXII, 8, 227, XXXIX, 8. 120, XI, 8. 342.
- Derselbe, Fall von Sklerodermie. Wien. klin. Wochenschrift, 1906, p. 204.
- Derselbe, Über die Beziehungen der Sklerodermie zu den autochthonen Erythemen. Wiener med. Wochenschrift, 1903, 8. 1097.
- Eichhoff, Zur Ätiologie der Sklerodermie. Arch. f. Dermat. and Syphil., 1890, 8. 357.
- Elliot, in: Deutsch. med. Wochenschr., 1892, 8. 148.
- Emmighaus, Über halbseitige Gesichtstrophie. Deutsch. Arch. f. Klin. Med., XI, 1873, 8. 90.
- Engelmann, Ein Fall von Sklerodermie. St. Petersburg. med. Wochenschrift, 1897, Nr. 9.
- Epstein, Ein Fall von Sklerodermie en plaques. Allg. med. Centralzeitung, 1897, 10.
- Erben, Zur Frage über die Ätiologie der Sklerodermie. Vierteljahrschrift f. Dermatol., XV, 8. 757.
- Erlenberg, Artikel Gesichtshypertrophie Erlenbergs Bealmyklopiet, Bd. IX, III. Aufl.
- Derselbe, Über progressive Gesichtstrophie und Sklerodermie. Zeitschr. f. Klin. Med., V, 1882, 8. 463.
- Derselbe, Über Sklerodermie. Deutsche med. Wochenschrift, 1894, 8. 455.
- Derselbe, Über tartrischen und galvanischen Leitungsreiztand der Haut bei Sklerodermie. Dermatol. Zeitschr., 1894, 8. 316.
- Kraus, Scleroderma and Raynaud's disease. The Lancet, 1902, I, p. 450.
- Page, Transactions of the pathological Society, 1871, p. 160.
- Fayier, Sur les rapports entre la sclérodémie spontanée et la ganglione symétrique des extrémités. Thèse de Paris, 1890.
- Feileroft, in: auch Schlesinger: die Syringomyelie.

Pérez, *Sclerodermie généralisée avec névrite brachiale et végét. parasternale*. Union médicale, 1879, p. 273.

Pfeifer, Zur galvanischen Behandlung der Sklerodermie. Wiener med. Wochenschrift, 1879, No. 50, p. 1332.

Pfeiffer und Oppenheim, Die Hautatrophien. Wien 1910.

Pisoker, Ein Beitrag zur Lehre von der Hemiatrophia facialis progressiva. Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, XIV, S. 305.

Fisher, A case of bilateral facial hemiatrophy. Journal of nerv. and ment. disease, XXXII, 1905, p. 118.

Forster, Würth. med. Zeitschr., II, 1861, S. 297.

Fonterton, A case of localized gangrene of the leg occurring in the course of scleroderma. Lancet, II, XI, 1892.

Fournier et Loeper, *Sclerodermie en bandes du front*. Soc. de dermatol. et de syphil., 10, XI, 1898.

Fox, *Géité ophtalmique avec Maladie de Raynaud*. Soc. de dermat. de Londres, 9, VI, 1897.

Frankel, A case of morphea. New York neurolog. society, 2, I, 1902. Journal of nerv. and ment. disease, 1902, p. 281.

Das selbe, Generalized scleroderma with vasomotor spasm of the tongue. New York neurolog. society, 2, XII, 1902, ref. Journal of nerv. and mental disease, 1903, p. 214.

Frankel, bei Lewin-Heller.

Frémy, Thèse de Paris, 1872.

Freund, Über den Zusammenhang von Sklerodermie mit Morbus Basedowii. Wien. Min. Rundschau, 1906, p. 648.

Friedheim, Beiträge zur Kenntnis der Sklerodermie. Märkische med. Wochenschrift, 1895, 7. Mai.

Freihändler, Arch. f. Kinderheilk., IX, 1886.

Fronhold-Tren, Die Hemiatrophia facialis progressiva. Inaug.-Diss. Dorpat 1893. Zitiert nach Mahaux.

Fuchs, Raynaud'sche Krankheit und Sklerodaktylie. Wiener klin. Wochenschrift, 1890, S. 822.

Fuchs, Eigenartiger Fall von väsenarterieller Neuritis. Sitzb. des Vereins f. Psychiatrie und Neurologie in Wien 13. II, 1906.

Gallway, Société de dermatol. de Londres, 15, IV, 1896.

Gardère, Atrophie faciale double. Lyon méd. CXII, p. 363.

Gaskoin, Rev. med. Journal, 1877, I, p. 423.

Gaucher, *Maladies de la peau*. Paris 1903.

Gaucher et Cyon, Petites plaques de morphee ou de sclerodermie. Société méd. des Hôpitaux. Gaz. des Hôpit., 1899, 61.

Gaucher, Gaston et Charay, Sur un cas de sclerodermie généralisée progressive. Soc. de dermatol. et syphil., 1903. Revue neurolog., 1903, p. 557.

Gilkey, On Etiology and Pathology of Morphea. Arch. of Dermat., 1879.

Gillette, Archiv. général. de médecine, 1894, p. 657.

Gintres, Journal de médecine de Bordeaux, 1847.

Glanville, Moskauer veterolog. Gesellschaft, 18, XII, 1898. Bol. Dermat. Centralb., 1899, p. 192.

Goldschmidt, Sklerodermie und symmetrische Gangangien. Rev. de médecine, 1887.

Dasselbe, Sklerodermie sans arthrite, grippe ulcéreuse, gangrène d'origine diffuse. Gaz. méd. de Strasbourg, 1902, 4.

- Goodell, A case of congenital scleroderma. *Brit. Med. Assoc. J. Abstr.*, 1871, II, p. 341.
- Gowers, Local anæsthesia. *Review of neurology*, 1903, 1.
- Derselbe, The influence of facial hemiatrophy on the facial and other nerves. *Review of neurology* 1906, p. 2.
- Graf, *Neurolog. Centralbl.*, 1893.
- Graham, *Journal of cutaneous and gen. diseases*, 1896, XI.
- Grancher, Différentes espèces de gangrène chez l'enfant. *Maladie de Marries* Raynaud. *Annal. de méd.*, 1891, 17. Juni.
- Grasset, En „homme moué“. *Nouv. leon. de la Salpêtr.*, 1896, 3.
- Derselbe, Sclérodémie et asphyxie locale. *Archives général. de méd.* 1901, p. 3164.
- Grasset et Apellinaris, *Gazette des hôpitaux*, 1878, p. 250.
- Grawitz, Über eine akut aufgetretene trophisch-neurastische Erkrankung einer ganzen unteren Extremität. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1903, 27.
- Greig, Unilateral hypertrophy. *Edinburgh Hosp. Rep.* 1896, p. 212.
- Griffith, *Medical Chronicle*, 1891/1892, XV, p. 89.
- Grosje, A brief resume of the present aspect of scleroderma. *Journal of the amer. med. Association*, 1903, 6, p. 416.
- Grünfeld, Ein Fall von Sclerodermie, kombiniert mit Marbys Basedowski. *Wien. med. Blätter*, 1896, 50.
- Gubian, *Lyon médicale*, 1881, No. 62.
- Mr. Guire, Case of diffuse symmetrical scleroderma with marked muscular atrophy. *New York med. Record*, LIII, 25, p. 889.
- Gutk und Rosenfeld, Sclerodermie und Myosklerose. *Frag. med. Wochenschrift*, XXVIII, 1903, p. 391.
- Hänel, Gesellschaft f. Natur und Heilkunde, 2. V. 1901. *Münchener med. Wochenschrift*, 1901, 35.
- Hahn, Schles. Gesellschaft f. natürl. Kultur, 28. XI. 1902. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1903, p. 38.
- Halliox, zit. nach Hachten.
- Hallepeau, Sur un cas de sclérodémie en bandes limitée à la sphère de distribution du brachial cutané interne. *Annales de dermatol.*, 1886, p. 22.
- Derselbe, Sur un cas de sclérodémie en bandes et en aires généralisées avec éruptions tuberculeuses et bulleuses et lichénoides. *Annal. de dermat.*, Juin 1899, p. 192.
- Derselbe, Note sur un cas de sclérodémie avec atrophie de certains os et arthropathies multiples. *Gaz. méd. de Paris*, 1878, p. 684.
- Hallepeau et Nazare, Aga, Sur un cas de morphie avec hyperémie et ictères intermittents quotidiens. *Société de dermatol. et syphil.*, 1900, 7. II.
- Handford, *Illustr. Medic. News. The Lancet*, 1885, 26. Sept.
- Harrison, Scleroderma associated with Raynaud's disease. *Brit. med. Journal* 1904, 16, 1.
- Hardy, *Gazette des hôpitaux*, 1877 n. 1881, p. 97.
- Hasley, *Med. and chirurg. transactions*, LX, p. 131.
- Derselbe, Case of slowly advancing sklerosis attended by cardiac and gastric disorders. *Lancet* 1877, I, p. 129.
- Derselbe, *Brit. med. Journ.*, 1877, 27. Januar.
- Haseavee, Scleroderma avec scléroclatylie. *Soc. de med. techniques de Prague*, 4. 12. 1892.
- Hastam, Scleroderma. *Lancet* 1892, I, p. 324.
- Haxlund, K. N., *nd. Centralbl. f. Nerv. Heilk.*, 1887, 5. 719.

- Hauschalter, Sklerodermie en plaques dissimines chez une fillette de 11 ans. *Rev. méd. de l'Est*, XXXI, 1899, p. 274.
- Hauschalter et Spillmann, Quelques cas de sclérodémie et de vitiligo chez des enfants. *Nouvelle iconographie de la Salpêtrière*, XII, 1899, p. 192.
- De Boie-Havenith, Sclerodermatose und Asphyxie der abessin. Extremitäten. *La polémique*, 1899, Nr. 18. *Ref. Monatsch. f. Dermatol.*, 1899, II, p. 569.
- Habra, *Wiener Dermat. Gesellschaft*, II, 1. 1899.
- Heinemann, Über Hemiatrophia faciei. L.-D., Leipzig 1900.
- Hektoen, Ein Fall von Sklerodermia diffusa etc. *Centralbl. f. allgem. Path. u. pathol. Anatomie*, 1907, Nr. 17.
- Heller, Ein Fall von Sklerodermie als Beitrag zur Pathologie des Lymphgefäßsystems. *Deutsch. Arch. f. klin. Med.*, 1872, p. 141.
- Herringsham, *Transactions of the clinical Society*, XXVII, 1897, p. 274.
- Herringsham, Sklerodermia and infarcts of fingers with recurrent attacks of local syncope. *Transact. of the clinic. society of London* 1900, XXXIII.
- Herzheimer, Zur Kasuistik der Sklerodermie. *Inaug.-Diss.*, Greifswald 1896.
- Herz, Ein Fall von Sklerodermie. Heidelberg, L.-D., 1902.
- Herzog, Ein Fall von Sklerodermie. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1934, p. 198.
- Hewek, Atrodermatitis atrophicans mit sklerodermie-ähnlichen Veränderungen. *Iconographia dermatolog. fascicul.*, 2, 49, 1907.
- Hewster, *Deutsche med. Wochenschr.*, 1892, S. 196.
- Heynacher, Ein kasuistischer Beitrag zur Ätiologie der diffusen Sklerodermie. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1903, S. 267.
- Hillariet, *Le progrès médical*, 1879.
- Hiller, Hemiatroph. faciei. *Münchener med. Wochenschrift*, 1909, p. 2037.
- Hirtz, Sclérodémie diffuse avec arthrite coxo-femorale et neurite sciatique. *Bulletin de la société méd. des hôpitaux de Paris*, 4, VII, 1901, p. 702-754.
- Hofara, Bey, Un cas de sclérodémie pigmentosa de Kaposi. *Rev. med. d'Orient*, 1902, XLVII, p. 67.
- Hühne, Ein Fall von circumscripter Sklerodermie. *Münchener med. Wochenschrift*, 1908, S. 1360.
- Hoffa, Zur pathologischen Anatomie der Sklerodermie. *Münchener med. Wochenschr.*, 1895, S. 35.
- Hoffmann, Zur Kenntnis der Hemiatrophia facialis progressiva. *Neurolog. Centralbl.*, 1900, S. 199.
- Derselbe, Hemihypertrophia facialis progressiva. *Deutsche Zeitschrift f. Nervenk. u. Geistesheilk.*, XXIV, S. 425, 1903.
- Derselbe, Naturhistorischer Verein Heidelberg, 3, II, 09. *Deutsche mediz. Wochenschr.*, 1909, S. 1416.
- Derselbe, Naturhistorisch-mediz. Verein Heidelberg, 3, VII, 1900. *Münchener med. Wochenschrift*, 1901, S. 290.
- Hoppe-Seyler, Zwei Fälle von Sklerodermie. *Deutsch. Arch. f. klin. Med.*, XLIV, S. 581, 1899.
- Brach, Über einen Fall von neurotischer angeborener Hemiatrophie. *Wiener klin. Wochenschrift*, 1904, p. 543.
- Raker, Hemiatrophia facialis progressiva. *Archiv of pediatr.*, 1909, February, XVI, 2.
- Huet, Nouvelle représentation de la malade atteinte de sclérodémie en bandes, occupant le territoire inférieur du plexus brachial. *Revue neurol.*, 1904, p. 1118.
- Huet et Ségard, Sclérodémie en bandes occupant le territoire radiculaire inférieur du plexus brachial. *Revue neurol.*, 1905, p. 1118.
- Huisman, Über die Beziehungen von Gefäß- und Bluthröhrerkrankungen zur Sklerodermie. *Münchener med. Wochenschrift*, 1905, 10, p. 451.

- Butcherson, Morphaea hypertrophica, Brit. med. Journ., 1930, L, p. 1194.
- Derselbe, Localized liability to Raynaud's phenomena with great proneness to chilblains — gradual increase to generalized local asphyxia — acrosphacelia with scleroderma. Arch. of surgery, 1893, IV, 312.
- Derselbe, Typical and severe case of Raynaud's phenomena, approach to the condition of diffuse morphaea. Arch. of Surgery, 1893, IV, 177.
- Derselbe, Case of Raynaud's disease with acrosphacelia. Arch. of surgery, 1892, III, p. 511.
- Derselbe, Acroscleroderma following Raynaud's phenomena. Clin. Journal, VII, 246. (Die vier letzten Arbeiten nach Memo.)
- Jacobsohn, Verhandl. d. Berl. Dermatolog. Gesellsch., 13. XI. 1896. Archiv f. Dermatolog. u. Syph., Bd. LXXXIII, S. 257.
- Jacoby, Two cases of localized scleroderma. Journ. of nerv. and ment. Dis., XXVI, p. 376.
- Jaques et de St. Germain, Lésions de la muque (myélite crânienne) dans la sclérodémie. Annal. de dermatol., 1892, p. 308.
- Jaquet et Grullier, Morphée tubéreuse. Société de dermatolog. et syph. Mai 1902. Ref. Revue neurol., 1902, p. 1116.
- Jadassohn, Halbseitige Gesichtstrophie mit Sclerodermie. Korrespondenzblatt Schwäb. Arch., 1901, S. 404.
- Jakimoff, ref. Annal. de Dermat., 1899, p. 893.
- James, Lancet 1896, II, p. 1766.
- James, A., Scleroderma associated with Raynaud's disease. Scottish med. and surgery journal, IV, 2, 1899.
- Jamieson, A case of Morphaea. Edinb. med. Journ., 1896, January.
- Jastrowitz, Zur Bilanz des Stoffwechsels bei Sclerodermie. Zeitschrift f. experiment. Patholog. u. Therap. IV, 2.
- Jeanseine, Sur la coexistence du polype ophtalmique et de la sclérodémie. Mémoires méd., 1895, I.
- Derselbe, Sur un fait de passage entre la sclérodémie en plaque et les atrophies cutanées circonscrites. Société franç. de dermatolog. et syph. avril 1903, ref. Revue neurol., 1903, p. 908.
- Jendrassik, Über die Hemiatrophia faciei. Deutsch. Arch. f. klin. Med., 1896, LIX, S. 222.
- Jonas, Zwei Fälle von Sclerodermie mit anatomischer Untersuchung eines Mischstückchens bei einem derselben. Inaug.-Diss., Bonn 1896.
- Joppich, Ein Fall von Sclerodermie. Inaug.-Diss., Würzburg 1894.
- Kahler, Über die Erweiterung des Symptomenkomplexes der Basedowschen Krankheit. Prager med. Wochenschr., 1888, Nr. 30.
- Kalk, Über einen Fall von halbseitiger Sclerodermie mit halbseitiger Atrophie; zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Metamerie. Erlangen, L.-D. 1904.
- Kalischer, Zur Kasuistik der Sclerodaktylie. Wiener klin. Wochenschr., 1899, Nr. 5.
- Kann, Max, Acute Mastoiditis kompliziert durch Sclerodermie. Zeitschrift f. Ohrenheilk. XXXVII, S. 11.
- Kaposi, Lehrbuch der Hautkrankheiten, V. Aufl., 1886, S. 672. (Ätiol. Sclerodermie).
- Derselbe, Arch. f. Dermat., XXXII, S. 257.
- Derselbe, Verhandl. d. Wiener dermat. Gesellsch., 25. II. 1891 und 29. XI. 1894.
- Derselbe, Zwei Fälle von Sclerodermie. Wiener klin. Wochenschr., 1895, S. 125.
- Keller, Diskussion u. Vortrag v. Ullenhuth.

Klingmann, Facial hemiatrophy. The journal of Amer. med. association. XLIX, 1907, p. 1888.

Klippel, La sclérodémie dans le goître simple. La semaine médicale, 1910, p. 305.

Knapp, Case of hemiatrophy with scleroderma. British med. and surgery journal, Bd. 164, p. 671, ref. Rev. neur., 1909, p. 827.

Köhner, Über Sklerodermie. Berl. med. Centralblatt, 1908, No. 63.

Köhner, Die Beteiligung der Ohrspeicheldrüse und des Kiefergelenks bei der Hemiatrophia faciei. Zeitschrift f. Otolaryng., XII, 357.

Kone-Nichyo, Beitrag zur Kasuistik der Sklerodermie. I.-D., Göttingen 1910.

Kopp, Die Trophaneuronen der Haut. Wien 1896, S. 114.

Kopczynski, Über die progressive Gesichtshemiatrophie. Arbeiten des 1. Kongresses polnischer Neurolog. und Psychiater, 1909. Neurolog. Jahresbericht, 1909, S. 764.

Korn, Über Hemiatrophia faciei progressiva. Berlin, I.-D., 1910.

Kornfeld, Zur Pathologie des Sklerodermie und des Morbus Basedowii. Wien. medicin. Presse, No. 14, 1906.

Kracht, Über einen Fall von Sklerodermie bei einem 12jährigen Knaben. Ref. Monatsh. f. Dermatol., XXI, 1895, S. 187.

Kron, Über Sklerodermie der Mundschleimhaut. Archiv f. Dermatolog. u. Syphil., Bd. XIV, S. 163.

Krieger, Ein Fall von Sklerodermie nach vorausgegangenem Morbus Basedowii. Münchener med. Wochenschrift, 1900, S. 1772.

Krümer, Genitalbeschwerden bei Sklerodermie. Medizin. Verein in Greifswald, D. XI, 1910. Deutsche med. Wochenschrift, 1911, S. 286.

Kronheimer, Nürnberg. medicin. Gesellschaft u. Pathol., D. VII, 1900. Münchener med. Wochenschrift 1900, S. 1940.

Kryszewicz, Ein Beitrag zur Histologie der diffusen Sklerodermie. Monatsschrift f. praktische Dermatolog., 1906, 42, S. 143.

Lafaud, Sclérodémie et corps piquants. Thèse de Lyon 1902.

Lamark, Des phénomènes bulleux dans la syringomyélie. Rev. de méd., 1886, p. 309.

Lamarche, Thèse de Montpellier, 1876.

Lamschowsky, Zur Frage des Sklerodermie. Obozrenje Psych., 1908.

Lande, Sur une forme d'atrophie partielle de la face. Arch. général de médecine, 1870. (Zit. nach Möbius.)

Lannois, Hémiatrophie faciale double. Sclérodémie probable. Société nat. de médecine de Lyon, 20. XI, 1905. Revue neurolog., 1907, p. 343.

Larégue, Arch. général de médecine, 1903, p. 721.

Lassar, Deutsche med. Wochenschr., 1894, XX, Nr. 27.

Derselbe, Monatsh. f. prakt. Dermatol., 1894, S. 308.

Ledermann, Arch. f. Dermatol., 1886, XXXVI, S. 245 und Verhandl. d. Berl. dermatol. Gesellsch., 1. VII, 1887 und 2. II, 1889.

Legroux, Gazette des hôpitaux, 1880, p. 750.

Letarink, Deutsche Klinik, 1888.

Leloir, Recherches cliniques et anatomopathologiques sur les affections cutanées d'origine nerveuse. Paris 1882.

Leloir et Merklen, Sympôme local des extrémités, scélème de la paume des mains et des doigts. Annal. de dermat., 1882.

Leschke, Farsenische Haut mit einer Sklerodermie; atrophie et dégénérescence scléreuse plantaire; mort du fœtus; lésions dégénératives de ses organes. Bull. d. l. Soc. anat. de Paris, 1889, p. 215.

Lépine, Gazette méd. de Paris, 1873, p. 156.

- Lepra-Kolikoren in Berlin. Mitteil. und Verhandl. Berlin 1888.
- Lepréyssi, *Gazette méd. de Paris*, 1880, p. 208.
- Leredde et Thomas, *Sclérodermie généralisée*. Arch. de méd. exp., 1898, p. 162.
- Leskowski, *Obser. Psych., Neurol. u. exper. Psychol.* 1905, 2.
- Leslie, *Scleroderma following injury in a child and resulting in contraction of the right index finger*. British journal of dermatology, 1900.
- Lesser, *Diskussion z. Vortrag v. Uhlenhuth*.
- Lesser, *Gesellschaft der Charitéärzte* 10. VII. 1902. *Münchener med. Wochenschrift*, 1902, S. 1288.
- Derselbe, *Gesellschaft der Charitéärzte*, 30. VI. 1904. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1904, S. 1257.
- Leube, *Klinische Berichte v. d. med. Abteil. d. Landeskrankenhaus*. Erlangen 1875, S. 28.
- Leven, *Kurze Mitteilung in dem Falle von Scleroderma*. *Dermatolog. Zentralblatt*, V, 1902, 4. u. VI, 1904, S. 188.
- Levy, Magnus, *Myxödem*. Zeitschr. f. Klin. Mediz., Bd. 56.
- Lewandowsky, F., *Hautkrankheiten und Nervensystem*. Zeitschrift f. d. gesamte Neurologie und Psychiatrie. *Skizze* II, S. 242.
- Lewin, G. and Heller, J., *Die Sclerodermie*. Berlin 1895.
- Lewkowsky, *Über die Hemiatrophia facialis progressiva*. *Obser. psych.* 1902, 6.
- Lichtwitz, *Über einen Fall von Scleroderma u. Mischung Basedowii teilt Bemerkungen über die Physiologie u. Pathologie des Sympathicus u. d. Nebennieren*. *Deutsche Zeitschrift f. Klin. Medizin*, XCIV, 1908, S. 567.
- Lieberich, *Verhandl. d. Halleschen Gesellschaft in Berlin*, 1895.
- Lindemann, *Beiträge z. Diagnostik und Therapie d. Sclerodermie*. *Deutsch. Arch. f. Klin. Med.*, Bd. LXII, 1899, S. 154.
- Lindström, *Arch. f. Dermatol.*, 1896, XXXI, S. 434.
- Little, *Transactions of the clinical. Soc. of London*, 25. II, 1891.
- Loebl und Weissel, *Klinik und pathologische Anatomie der Hemiatrophia facialis progressiva*. *Deutsche Zeitschrift f. Neurologik*, XXVII, S. 355.
- Lommel, *Zwei Fälle chronischer aussergewöhnlicher Hauterkrankungen*. *Münchener med. Wochenschrift*, 1905, S. 1545.
- Lugetschikow, *Ein neues Augensymptom bei diffuser Sclerodermie*. *Deutsche med. Wochenschrift* 1901. *Versuchsbeilage* S. 345. *Diesebe Med. obs.*, 1901, 23.
- Lücke, *Sclerodermie mit Muskeldystrophie und Symptomen der Raynaudischen Krankheit*. *Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie*, Bd. XIII, S. 198.
- Luzzati, *Hemiatrophia facialis cruciata*. *Bef. Neurolog. Centralbl.*, 1896, S. 1046.
- Luzzati, *Paralyse agitante et sclérodémie*. *II Morgagni* XLVI, 1904, 755. *Bef. Brain neurolog.* 1905, p. 522.
- Machion, *Sur la nature de la sclérodémie*. *Thèse de Paris*, 1897.
- Mackay, *On so called facial hemiatrophy*. *Brain* 1904, XXVII, p. 388.
- Mader, *Ein Fall von Scleroderma universalis*. *Vierteiljahrsschr. f. Dermatol.*, 1878, S. 185.
- Maize, *Observation d'un cas de sclérodémie dactylapne*. *Journal de Neurologie*, 1900, p. 27.
- Mailhones, *Facial hemiatrophy*. *New York med. society*, XXVIII, p. 225.
- Marianelli, *Contributo clinico allo studio della scleroderma*. *Giornale ital. delle malattie venere, et de la pelle*, 1895/1896.
- Marinaccio, *Un cas de dystrophie généralisée*. *Bull. de la société des sciences méd. de Bourges* 1901, 2. rel. *Revue neurolog.* 1905, p. 45.
- Mattelle, *Union méd.*, 1872, p. 505.

- Martiz, A case of acute diffuse scleroderma etc. *Brit. News*, LXVI, p. 427.
- Marty, Thèse de Montpellier, 1886.
- Marty, P., Contribution à l'étude de la sclérodémie et de son traitement par le iodure de potassium à haute dose. Thèse de Toulouse, 1897.
- Mathieu, Sclérodémie d'abord symétrique puis disséminée précédée au début par des phéromènes d'asphyxie des extrémités. *Revue de Méd.*, 1884, p. 180.
- Mellier, Beitr. zur Lehre vom Sclerema adultorum. *Abg. Diss.*, Straßburg 1883.
- Mendel, *Neurolog. Centralbl.*, 1888, Nr. 14.
- Derselbe, Ein Fall von Sklerodémie. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1890, 8, 763.
- Méneau, La sclérodémie. *Journ. d. maladies cutan. et syph.*, März 1898.
- Ménétrier und Bloch, Un cas de sclérodémie diffuse, amélioration considérable par le traitement thyroïdien. *Revue prat. de maladies cutanées*, 1905, 4.
- Méry, Anatomie pathologique et nature de la sclérodémie. Thèse de Paris, 1889.
- du Mesnil, *Arch. f. Dermatol.*, 1893, p. 565.
- Metzcherski, Ein Fall von diffuser Sklerodermie. *Journal russ. de maladies cutanées*, 1903, Bd. VI.
- Metzcherski, Ein Fall von Erythrodermie (Eryk). *Journal russ. de maladies cutanées* 1904, VII.
- Meyer, *Gazette médicale de Strasbourg*, 1887, p. 126.
- Meyer, Ernst, Totale Hemiatrophie. *Neurolog. Centralbl.*, 1903, 8, 450.
- Millard, Sclérodémie améliorée par arsénal. *Bull. et mémo. de la société méd. des hôpitaux de Paris*, 2. III. 1905.
- Minor, Ein Fall von Hemihypertrophie des Gesichts. *Neurolog. Centralbl.*, 1903, p. 486.
- Mitchell, A case of paralysis of the lower extremities with hypertrophy of the skin, cutaneous and muscular tumours. *Amer. Journ. of the med. sciences*, 1885, XC, p. 362.
- Möbius, Der menschliche Gesichtsvorwand. *Neuropath. spezielle Pathologie und Therapie*, XI, 2. Wien 1895.
- Mohr, *Arch. f. Dermatol.*, XLIX, p. 141.
- Mounet, Injections of Brown-Séquard's fluid in cutan. myeloneuritis. *Med. Record*, 1894.
- Montesano, *Riforma medica*, 1896, p. 343.
- Moore, ed. Virchow-Hirsch' Jahresbericht, 1873, II, p. 687.
- Morrow, A case of symmetrical morphea attended with the formation of bullae and extensive ulceration. *Journ. of cutaneous and genito-urinary diseases*, 1896, 8, 419.
- Marselli, Dystrophies et Trophodermes. *Gia. degli ospedali e cliniche*, 1900, XXVI, p. 1528.
- Marselli, Scleroderma progressiva: forma atipica di scleromielia? *Riforma medica*, 1895, No. 11.
- Mosler, Über Scleroderma diffusa. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1898, 8, 439.
- Moser, Fall von Sklerodermie und Sklerodactylie. *Deutsche med. Wochenschr.*, *Verhandlungen*, 1900, 8, 109.
- Nauwys, Ein Fall von Sklerodermie. *Verhandl. d. internationalen Ärztencongr. v. 27. IV. 1896*. *Bel. Deutsche med. Wochenschr.*, *Verhandlungen*, 8, 176.
- Neuberges, Fall von Sklerodermie. *Ärztlicher Verein zu Nürnberg*. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1900, *Verhandlungen*, 8, 22.
- Neumann, *Arch. f. Dermatologie*, Bd. XXXI, p. 433.
- Derselbe, *Lehrbuch d. Hautkrankheiten*, II. Aufl., Wien 1878, 8, 342.

- Derselbe, Verhandl. d. Wiener dermatol. Gesellschaft, 22. I. 1892.
- Neumann, Der Taillermassige Apparat. Berl. Klin. Wochenschrift, 1901, 8. 167.
- Derselbe, Über Sklerodermie nach eigenen Beobachtungen. Archiv f. klin. Medizin, LXX, 8. 168, 1902.
- Neumann, H., Ein Fall von Sklerodermie. Archiv f. Kinderheilkunde, 1897, XXIV, 8. 24.
- Newcom, Die Erkrankungen der Nebennieren. Northridge spec. Pathologie and Therapie, Bd. XVIII, 8. 63.
- Newmark, Amer. Journal of the med. sciences, Sept. 1892.
- Nicolas, La sclérodermie. Bull. médicale XIX, p. 275, 1905.
- Nicolas et Pavier, Sclérodermie et maladie de Raynaud, examen radiographique. Bulletin de la société des hôpitaux de Lyon, 1905, IV.
- Nicola, Monatshefte f. Dermatologie, 1888, II, 8. 45.
- Nikitin, Ein Fall von Atrophie im Bereich des ersten Ästes des Trigeminus. Revue f. Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle Psychologie, 1910, 70. Zeitschrift f. Psych. u. Neurologie, Referate, I, 8. 511.
- Nikulin, Moskauer venereodermatol. Gesellsch., Sitz. v. 4 III. 1898. Berl. Monatshefte f. Dermatol., XXI, 1898, 8. 403.
- Nixon, mit nach Lewin-Heller.
- Derselbe, Scleroderma and myositis. The Lancet, 1905, 12. I.
- Nobl, Über das Koordinationsbild der idiopathischen Raxatrophia und der hereditären Sklerodermie. Archiv f. Dermatol. u. Syphilis, Bd. XXIII, 1908, 8. 328.
- Derselbe, Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderkrankheiten, 25. II. 1908. Deutsche med. Wochenschrift, 1909, 8. 1401.
- Northridge (Fruchtmann), Inaug.-Diss. Jena 1881. Zit. nach Lewin-Heller.
- v. Nottkaff, Neuere Arbeiten u. Ansichten über Sklerodermie. Zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. allg. Pathol. and path. Anatomie, 1898, IX, 8. 570.
- Nußbaum, Über Sklerodermie im Kindesalter. I.-H. Würzburg, 1900.
- Oliver, Thèse de Paris, 1884.
- Oro, Monatshefte f. Dermatologie, 1894, IX, 8. 90.
- Oppenheim, Lehrbuch d. Nervenerkrankheiten. V. Aufl., Berlin 1908, 8. 1541.
- Oppenheimer, Ein Fall von Atrophia cut. propria idiopathica (Erythrodactyl). Wiener klin. Wochenschrift, 1901, 8. 1115.
- Orlison, Trophic complete hemiatrophy. A trophic paresis. Journal of nerv. and mental disease, XXXV, 1908, p. 686.
- Oster, On diffuse scleroderma. Journal of genito-urinary diseases, 1908, Nr. 2 und 3.
- Otto, Über Sklerodermie. Inaug.-Diss., Berlin 1900.
- Pagenstecher, Einseitige angeborene Gesichtshypertrophie. Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, LXXXII, 5-6, 8. 519, 1906.
- Palm, Verhandl. d. Berl. dermatol. Gesellsch. v. 7. VII. 1896.
- Palisieri, Scleroderma e malattia di Parkinson. Creviera della clin. med. de Genova, VII, p. 147, 15. V. 1901.
- Derselbe, Contribuzione allo studio di scleroderma. Annale del R. Ospedale Provinc. di Ancona, 1907.
- Pantegrazzi, Scleroderma e gotta associati a malattia di Parkinson. Cura clinica. Bull. della soc. Lancia, XVI, p. 44.
- Parquet, Scleroderma concomitante à une thyroïdectomie pour goitre exophtalmique guéri. Société de chirurgie, 16. XI. 1910. Bull. Revue neurolog., 1911 p. 527.

- Pauliaki, *Virchow's Archiv*, XLII, S. 234.
 Pearce, *Scleroderma*. The Medical Fortnightly, 1902, Aug.
 Pellissier, Über einen ungewöhnlichen Fall von progressiver Hemiatrophie, Myoklonus, Sklerodermie und Atrophie d. Knochen und Gelenke, *Neurol. Centralbl.*, 1896, XII, S. 530.
 Pepper, *Amer. Jour. of med. sciences*, 1891.
 Perry, Ein Fall v. Sklerodermia gubata. *British Jour. of dermatol.*, 1898, Februar.
 Peterson, Ein Fall v. Sklerodermia diffusa. *Ref. Arch. f. Dermat. and Syphil.*, XLI, S. 461.
 Philippson, Zur Behandlung d. Sklerodermie. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1897, S. 1629.
 Piazza, Ein Fall von erworbenem totaler rechtsseitiger Hypertrophie des Körpers. *Monatsschrift f. Psychiatrie u. Neurologie*, 1909, XXV, S. 497.
 Pic et Gardère, Un cas d'atrophie généralisée de la région viscérolimbale du corps avec pseudohypertrophie de la région pébrueuse et des membres inférieurs. *Lyon médicale*, 1909, CXIII, p. 51.
 Pick, Über eine neue Hautkrankheit. *Dermatol. Zeitschr.*, 1895, S. 50.
 Pisko, *New Yorker mediz. Monatsschr.*, 1894, Nr. 6.
 Plonaki, Verhandl. d. Berl. dermatol. Vereinigung, 3. XI. 1897.
 Pospelow, *Moskauer neurol. Gesellschaft*, 1890—1894.
 Derselbe, Die trophischen Störungen der Haut bei spinaler Gliose oder Syringomyelie. *Arch. of Dermatol.*, XLIV.
 Potain, Un cas de sclérodactylie. *Gazette des hôpitaux*, 1887, p. 718.
 Pringle, *Dermatol. Gesellsch. v. London*, 10. Oktober 1894 und *British Journal of Dermatol.*, 1896.
 Pusinelli, Ein Fall von diffuser Sklerodermie. *Gesellsch. f. Natur- u. Heilk.* Dresden, 28. IX. 1901.
 Quinquaud, Le panaris nerveux. *Annales de dermatol.*, 1882, p. 390, und *la France médicale* 1883, p. 325.
 Radd, *Wiener klin. Wochenschr.*, 1899, Nr. 18.
 Radcliffe-Crocker, *Brit. Jour. of dermatol.*, 1899, Jan.
 Rapis, *Bulletin de la société médicale de la Suisse romande*, citiert nach Schulzgen.
 Rasmussen, *ed. Virchow-Hirsch' Jahresberichte*, 1897, II, S. 538.
 Ran, Ein Fall von Sklerodactylie. *Inang.-Diss.*, Bonn 1896.
 Ranzier, Un cas de sclérodactylie. *Gazette des hôpitaux*, 1911, 2. III.
 Raymond, De la sclérodémie. *la semaine médicale*, 1898, p. 21.
 Raymond et Alquier, Deux cas de sclérodémie avec examen histologique. *Séances de la société méd. des hôpitaux de Paris*, 27. V. 1904.
 Raymond et Sicaud, Trophodermose hémistrophique totale et familiale. *Revue neurol.*, 1902, p. 593.
 Reiskarad, Ein Fall von ausgebreiteter Sklerodermie. *Gesellsch. d. Chirurgen*, 11. VII. 1895.
 Reiss, Über die Beziehungen der Sklerodermie zur Tuberkulose. *Wiener klin. Wochenschrift* 1909, 32.
 Reitmann, Über eine eigenartige der Sklerodermie nahestehende Affektion. *Archiv f. Dermatolog. u. Syphil.*, Bd. XCII, 1908, S. 412.
 Rendu, Sclérodémie avec sclérose présumée probable. *Journal de médecine et de chirurg. prat.*, 16. X. 1898.
 de Renzi, Scleroderma. La nuova rivista clinico-terapeut. Napoli, avril 1901.
 Respighi, Un caso di sclerodermis etc. *Giornale ital. delle malattie vener. e della pelle*, Dezember 1894. *Ital. Annals de dermatol.*, 1896, p. 593.
 Cassirer, *Vasculodermatologische Symptom.*

- Riegel, Nimb. medicin. Gesellschaft, 6. XI. 1902.
- Riehl, Berichte der Leipziger med. Gesellschaft, Sitz. v. 9. II. 1892.
- Riska, Inaug.-Diss., Göttingen 1875.
- Rille, Fall von ausgedehnter Alopecie und daneben bestehender Sklerodermie. Verhandl. d. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 31. V. 1890.
- Rille, Fall von Sklerodermie und Raynoldscher Krankheit. Münchner med. Wochenschrift, 1905, S. 2346.
- Robert, Les myopathies dans la sclérodémie. Thèse de Paris, 1890.
- Roger, Union médicale, 1869, p. 198.
- Roger et Ganget, Article Artérite chronique in traité de médecine de Boussard et Gilbert; T. VI, p. 538.
- Rollleston and Pearson, Generalised scleroderma with Raynolds disease. British med. journal, 1901, I, p. 273.
- Rom, Ein Fall von Sklerodermie. Medycyna 1907.
- Roma, Un cas de sclérodémie etc. Kgl. ungarische Gesellsch. d. Ärzte in Budapest, 22. X. 1898.
- Roquez, Le traitement ophtalmique de la sclérodémie. Annales de dermatolog. et de syphilis, 1910, p. 283.
- Rosenthal, Über einen Fall von partieller Sklerodermie mit Übergang in halbseitige Gesichtstrophie, komb. mit Alopecia areata. Berl. klin. Wochenschr., 1889, S. 255.
- Rosin, Ein Fall von diffusom chronischem Hautödem. Berlin. klin. Wochenschrift, 1901, S. 833.
- Rothardt, Adhäsische Krankheit und Sklerodermie. Virchows Archiv, I, S. 565 und LXI, S. 490.
- Rossolimo, in Virchow-Hirsch' Jahresberichte, 1891, II.
- Rouhier et Lacassagne, Un cas de sclérodémie progressive avec quelques réflexions sur la pathogénie. Lyon médical, 1911, 3.
- Roux, Sclérodémie et corps pituitaire. Revue neurolog., 1902, p. 711.
- Rozalski, La sclérodémie des contemporains est-elle une entité morbide distincte ou bien n'est-elle qu'une modalité épaisse. Revue méd. pharm. de Constantinople, 1900.
- Rusch, Über idiopathische Hautatrophie und Sklerodermie. Dermatolog. Zeitschrift, 1906, S. 748.
- Rutten, Un cas d'hémiatrophie faciale gauche. Namer 1903.
- Sacht, E., Sklerodermia und Sklerodactylia. Phil. med. Journal, S. II. 1907.
- Sackur, Berliner chirurgische Gesellschaft, 91. V. 1906, in Berlin. Min. Wochenschrift, 1909, p. 1089.
- Sainte Marie, Contribution à l'étude de la maladie de Basedow. Thèse de Paris 1887, (nach Sattler).
- Sainton et Bantle, L'hémiatrophie faciale, ses variétés cliniques et pathogéniques. Gazette des Hôpitaux, LXXXIII, p. 1841.
- Salomon, Ein Fall von Hémihypertrophie facialis progressiva mit Augenmuskelsymptomen. Neurolog. Centralbl., 1902, 19, S. 546.
- Samuel, Die trophischen Nerven. Leipzig 1860 und Hallebergs Realencyklop., II. Aufl., XX. Art. Trophicosenosen.
- Sancileux, De la existence de la sclérodémie et des altérations du corps thyroïde. Thèse de Paris, 1896.
- Sarubin, Zur Histologie der Scleroderma circumscripta. Journal russe des maladies cut., 1901, p. 459.
- Santvoord, New York medic. Record, 1888, 14. Januar.
- Sattler, Die Hautkranke Krankheit. Leipzig 1909, S. 325—332.
- Savill, Engl. dermat. Gesellsch., 24. XI. 1897 und 26. X. 1898.

Derselbe, Sequel of a case of scleroderma of the extremities (sclerodactylia, acroteric scleroderma (Hutchinson) associated with a previous and family history of angioneurotic edema. *Proceed. of the royal society of medicine*, III, 2, 1900, December, p. 33.

Derselbe, Erythromelalgia and scleroderma. *Deutsch. med. Journal*, 1902, I, p. 1088.

Derselbe, Hemiatrophie facialis. Morphose or localized scleroderma of the face. *British med. Journal*, 1900, I, 264.

Schadowaldt, Beitr. z. Lehre v. d. Sklerodermie. *Inaug.-Diss.*, Berlin 1888.

Schäffer, Verhandl. d. IV. Kongr. d. deutschen dermatol. Gesellsch. 1894, S. 561.

Schäper, Verhandl. d. Berl. Charitégesellsch., Januar 1900.

Schild, *Dermatolog. Zeitschrift*, X, S. 388.

Schlessinger, Hemiatrophie faciei auf der Basis einer ventralen Erkrankung. *Verh. d. Psychiatr. und Neurologie in Wien*, 2. IV. 1896. *Bel. Neurol. Centrallit.*, 1896, S. 709.

Derselbe, Fall von Sklerodermie. *Wiener Min. Wochenschrift* 1908, S. 1141.

Schlessinger, Ein Fall von doppelseitiger umschriebener Gesichtshypertrophie. *Archiv f. Kinderheilk.* XLII.

Schlessinger, Die Syringomyelie. *Wien* 1895. II. Aufl. 1902.

Schmidt, Zur Kasuistik der Sklerodermie. *Archiv f. Dermatolog. u. Syphil.*, LXXXVI, S. 125.

Scholtz u. Döbel, Vier Fälle von Sklerodermie der Haut. *Archiv f. Dermatolog. u. Syphil.*, 92, S. 400; Dausibe, Döbel, L.-D., Königsberg, 1908.

Scholz, Med. Sektion der Selten. Gesellsch. f. vaterländische Kultur, 14. VII. 1899.

Schubert, Ein Fall von Sklerodermie. *Münchener med. Wochenschr.*, 1909, S. 382.

Schuhiger, Über Sklerodactylie. *Monatsh. f. prakt. Dermatol.*, 1897, XXIV, S. 396.

Schäffer, Fall von Sklerodermie. *Wiener Min. Wochenschrift*, 1906, S. 642.

Schulz, Sklerodermie, Morbus Addisonii und Mischkretaphie. *Neurol. Centrallit.* 1899, S. 845.

Schultze, Scleroderma diffus hypertrophica. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1892, S. 1644.

Derselbe, Sklerodermie an den gelähmten Gliedmaßen bei Myelitis localis. *Deutsche Zeitschr. f. Nervenkheilkunde*, IV, 1893, S. 358.

Schütte, Verhandl. d. Berl. dermat. Gesellsch., 1893.

Schwerdt, Weitere Fälle von Sklerodermie behandelt mit Mentherialcrem. *Münchener med. Wochenschrift*, 1907, 25.

Schwimmer, Die neuropath. Dysmatosen. *Wien* 1893.

Sciamaera, *Patologia et Therapia del Gran Sempato*. Milano 1894.

Selkayron, Sklerodermie de la face et des mains, zit. nach v. Northoff. *Neurol. Centralblatt*, Art. Gesichtshypertrophie, *Erkenntnis-Bibliothek*, IX, III. Anlage.

Senator, Über einen Fall von Sklerodermie und Sklerodactylie. *Berl. Min. Wochenschr.*, 1884, S. 485.

Derselbe, Diskussion zum Vortrag von Uhlenhuth.

Siebert, Zwei Fälle von Sklerodermie. *Inaug.-Diss.*, Göttingen 1889.

Silva, Uma forma rara e rara de scleroderma. *Bollet. della clin.*, 1907, 12, p. 329.

Singer, Zur Pathol. der Sklerodermie. *Berl. Min. Wochenschr.*, 1895, S. 366.

Soderberges, Syndrom von Spasmus, Paros und Neuralgia facialis mit

Hemiatrophie, okularen und andersartigen sympathischen Symptomen verbunden. *Ned. med. Arch.*, 1889, 3—4, Nr. 9.

Sartar, Un cas de sclérodémie. *Annales de dermatol.*, 1900, 8, 1142.

Derselbe, Sclérodémie diffuse progressive symétrique. *Société de dermatol. et de Syph.*, t. VII, 1900. *Archiv f. Dermatol. u. Syphilis* 63, 8, 487.

Spadaro, *Revista clin. di Bologna*, 1887.

Spiegler, Ärztlicher Verein zu Köln, 10. IV. 1905. *Münchener med. Wochenschr.*, 1905, 5, 1707.

Spiegler, *Verhandl. d. Wiener dermat. Gesellsch.*, 5. V. 1897.

Derselbe, *Wiener dermatol. Gesellsch.*, 16. IV. 1902.

Spiegler, *Beitr. z. Lehre v. d. Sklerodermie*. Inaug.-Diss., Bonn 1886.

Spillmann, Sclérodémie larvée en coup de sabre de la région frontale; crises épileptiformes concomitantes. *Revue franc. de la Salp.*, 1888, Mai.

Derselbe, Un cas de sclérodémie généralisée (scléromie ou sclérodémie codrémense). *Revue méd. de l'Est*, 1902, XXXIV, p. 166.

Springer, Dactylie hypertrophique symétrique du gros orteil. *Revue de médecine*, 1887, p. 284.

Stäckelberg, Sklerodermie mit Hemiatrophie des Zuges. *Russk. Wratsh.*, 41, 1909.

Stachelin, Morbus Basedowi kompliziert durch Sklerodermie. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1908, 8, 483.

Stanischew, *Zur Kasuistik der Sklerodermie*. J.-D., Berlin 1902.

Stegmann, Ein Fall von Atrophie faciei und seine kosmet. Behandlung. *Wien. klin. Wochenschr.*, 1904, 8, 944.

Stenke, Akromegalie und Akromikrie. *Petersburg* 1901.

Sterling, Ein Fall von Sklerodermie. *Molyvna* 1906.

Sternberg, *Zur Klinik d. Sklerodermie diffusa*. Inaug.-Diss., Berlin 1894.

Sternthal, Beitr. z. Kasuistik d. Sklerodermie. *Arch. f. Dermat. und Syph.*, XLIV, 8, 286.

Stephan, Ein Fall v. Sklerodactylie. *Berl. klin. Wochenschrift*, 1896, 5, 1121.

Steven, Case of scleroderma subformis. *Glasgow med. Journal*, 1886, XXVI, p. 280.

Derselbe, Case of scleroderma with generalized hemiatrophy of the face, body and extremities etc. *Glasgow med. Journal*, 1898, 1.

Striegler, *New York medic. Journal*, 1895.

Stier, Über Hemiatrophie und Hemihypertrophie nebst einigen Bemerkungen über ihre laterale Lokalisation. *Deutsche Zeitschrift f. Nervenk., Bd. XLIV*, 8, 21 (nicht mehr benutzt).

Derselbe, Demonstration dreier Fälle von Hemihypertrophie. *Berl. Gesellsch. f. Psych. u. Nervenk.*, 12. V. 1911, *rel. Neurol. Centr.*, 1911, 8, 769.

Derselbe, Demonstration eines Falles von Hemiatr. faciei. *Sitzung d. Berl. Gesellsch. f. Psych. u. Nervenk.*, 9. I. 1911, *rel. Neurol. Centr.*, 1911, 8, 168.

Stüttgen, Tenosynovialergien mit Atrophie des Fußphalangen. *Münchener med. Wochenschrift*, 1902, 8, 656.

Störck, *Gesellschaft f. innere Medizin u. Kinderheilk.*, 3. XII. 1908. *Deutsche med. Wochenschrift*, Verminablage, 1909, 8, 909.

Störck, Über eigenartige Bindegewebskrankungen (Sklerodermie). *Wiener med. Wochenschrift*, 1909, 8, 151.

Stowers, *Brit. Journ. of Dermat.*, Juli 1896.

Strasemann, *Monatshefte f. prakt. Dermatol.*, 1867, II.

Strasmeir, Ein Fall von Sklerodermia diffusa. *Petersburger med. Wochenschrift* 1906, Nr. 42, 8, 335.

Strümpell, Ein Beitrag z. Pathologie und path. Anatomie d. Arteriengefäße. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhilkunde, XI, 8, 82.

Supino, Riforma medica, VII, p. 130.

Swale, Vincent, Innere Sekretion und Drüsen ohne Ausführungsgang. Ergebnisse der Physiologie, XI, 8, 218.

Sympton, Brit. med. Journal, 1884, I, p. 2893.

Tedeschi, Una forme non continue di scleroderma. Gaz. degli ospedali e delle cliniche, 20. VI. 1902, p. 725.

Derselbe, Ricerche sul ricambio materiale in un caso di scleroderma. Accademia di med. di Torino, 19. VII. 1901, Riv. med. XVII, 1901, No. 32.

Tenneison, Annales de dermatol. et syph., 1895, p. 661.

Teske, Die traumatische Sklerodermie mit Berücksichtigung der Unfallheilkunde. Monatsschrift f. Unfallheilkunde, 1906, S. 210.

Tevill, Report of a case of diffuse scleroderma. Memphis med. Society, Monthly Dec., 1900, p. 624.

Thibierge, Contribution à l'étude des lésions vasculaires dans la scleroderma. Revue de médecine, 1899, p. 271.

Derselbe, Scleroderma systématique de la face. Société de dermatol. et de syph., 7. XII. 1905, ref. Revue neurolog., 1906, p. 328.

Thirial, Du sclérome chez les adultes comparé à celui des enfants. Journal de médecine de Bordeaux, 1847.

Török, Das Wesen und die Pathogenese der Hautveränderungen der Sklerodermie. Festschr. med. Abt. d. k. u. f. Presse, 1908, Nr. 34.

Touchard, Recherches anatomocliniques sur la scleroderma généralisée. Thèse de Paris 1906.

Trimmer, Ein Fall von Sklerodermie. Nordl. Centralbl., 1909, S. 1968.

Tronissaint, Trophonévrose osseuse d'origine palmaire. Archiv. de méd. expériment. et d'anat. pathol., XV, 1903, p. 30.

Tschernack, zit. nach Schulzgen.

Tschernack, Hemihypertrophie facialis cum scleroderma insulari. Klin. Vorlesung über Nerven und Geisteskrankheiten. Warschau 1904, S. 160.

Tschoris, Ein Fall von diffuser Sklerodermie mit ungewöhnlicher Pigmentierung der Haut und der Schleimhäute. (Morbus Addisoni.) L.-D. Erlangen 1902.

Uhlenhuth, Über diffuse Sklerodermie. Berl. klin. Wochenschr., 1898, p. 207.

Ullmann, Ein Fall v. Sklerodermie. Wiener klin. Wochenschrift, 1886, p. 466.

Unger, Die Histopathologie der Hautkrankheiten. Berlin 1884. Art. Scleroderma.

Urban, Ärztlicher Verein Hamburg, 14. III. 1901. Hirschner med. Wochenschrift, 1901, S. 908.

v. d. Velde, nach Lewin-Heller, Cours. de médecine et chirurg. Bruxelles 1899, p. 561.

Ventura, Gazzetta med. ital. Lombard, 1879, XLII.

Verhagen, Cas de syringomyélie, zit. nach v. Nottthall.

Vernoni (i Mirani), Gazzetta hebdomadaria, 1863, p. 113.

Vespa, Un caso di malattia di Reynaud. Soc. Lincei. degli Ospedali di Roma, 29. II. 1886. Berl. Arch. f. Dermat. und Syph., XLVIII, p. 141.

Viaud, Thèse de Paris, 1878.

Vidal, De la scleroderma spontané. Gazette des hôpitaux, 1878, p. 329.

Vidal et Blacher, L'Union médicale, 1878, p. 494.

Vilecq, Contrib. à l'étude de la scleroderma. Arch. général. de médecine, 1899, II, p. 282.

Volhard, Fall von Hemihypertrophie facialis mit gekrozierter Pigmentation am Rumpf. Deutsche med. Wochenschr., 1903, S. 280.

- Derselbe, Über chronische Dystrophie und Trophosenosen der Haut im Anschluß an kranke Mittelfinger. *München med. Wochenschrift*, 1903, 8. 1906.
- Vorschütz, Zur Kasuistik der Sklerodermie mit besonderer Berücksichtigung der Therapie derselben. 1-D, Gießen 1902.
- Wadstein, Ein Fall v. Sklerodermia diffusa. *Arch. f. Dermatol.*, XXXVI, 8. 32.
- Wagner, Über Sklerodermie. *Dermat. Zeitschrift*, 1897, 8. 692.
- Ward und Corning, A case of scleroderma with examination over osteophyte. *New York Journal of med.*, 1909, Jan., p. 245.
- Ward, Ein Fall von multiplex circumscripta Sklerodermie. *Monatschrift f. praktische Dermatologie*, XXXV, 1907, 8. 419.
- Wasservogel, Ein Fall von Hemiatrophia faciei. *Wiener klin. Wochenschrift*, 1902, 8. 115.
- Weber, Correspondenzbl. f. Schweizer Ärzte, 1878.
- Weber, *Medical News*, 22. II. 1896.
- Weber, Ein Fall v. Sklerodermie, behandelt mit Extractum Thyroideae. *New Yorker Med. Monatschrift*, 1897.
- Weber, Parker, Trophic troubles of the feet in a case of asymmetric sclerodactylia with Raynaud's phenomena. *The British Journal of dermatology*, XIII, February 1901.
- Weber, Parker, Sequel of a case of trophic disorder of the feet. *British Journal of dermatology*, XIV, 1902, No. 168.
- Weinberger, Fall von ankyloisierender Arthritis deformans mit diffuser Sklerodermie. *Vereinbeilage d. Deutschen med. Wochenschrift*, 1904, 8. 2470.
- West, Sklerodermie systematisch. *Dermat. Gesellschaft, London*, 14. X. 1896.
- Westphal, Zwei Fälle v. Sklerodermie. *Charité-Annalen* I, 1876, III, 8. 341.
- White, Note on a case of combined scleroderma and Raynaud's disease. *Lancet* 1896, I, p. 1134.
- Williamson, Hemiatrophia facialis progressiva. *The Lancet*, 1908, I, p. 1545.
- Willner, Rheumatischer Rheumatismus (type Sacrosc) mit vasomotorisch-trophischen Störungen. *Wiener med. Wochenschrift* 1903, 6.
- Willrich, Ein Fall v. Sklerodermie in Verbindung mit Morbus Addisonii. 1-D, Göttingen 1892.
- Winfield, A case of scleroderma simulating Raynaud's disease and Addison's disease. *Journ. of cutan. dis.* XXII, p. 586.
- Wirsbubski, Zur Kasuistik der Hemiatrophia facialis progressiva. *Praktisch. Wschr.* 1905, 16—17.
- Wolff, *Berl. klin. Wochenschr.*, 1873.
- Wolters, Beitrag z. Kenntnis d. Sklerodermie. *Arch. f. Dermatol. and Syph.* XXIV, 1892, 8. 626.
- Derselbe, Zur path. Anatomie d. Sklerodactylie. *Arch. f. Dermatologie*, XXX, 1893, 8. 323.
- Derselbe, Ein Fall v. Sklerodermia circumscripta. *Deutsch. med. Wochenschrift*, 1895, Nr. 53.
- Derselbe, Ein Fall v. Sklerodactylia. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1896, Vereinsbeil., 8. 53.
- Wulff, Ein Fall von Sklerodermie mit Myositis. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 11. III. 1901. *Deutsche med. Wochenschrift*, Vereinsbeilage 1901, 8. 188.
- Zambaco et Berillon, Scleroderma avec Sclerodactylie. *Annales de dermat. et syph.*, 1903, p. 752.
- Zarubin, Zur Histologie der Sklerodermia circumscripta. *Archiv f. Dermatolog.* 4, Syph., LV, 8. 48.

Ziegenweil, Een geval van Hemihypertrophie facialis progressiva. *Psychisch. en geneesg.* Bladen 1898, p. 474.

Ziehen, Über einen Fall von Hemihypertrophie faciei. *Zeitschrift f. die Erforschung des jugendl. Schwachsinns*, 1909, III, 3.

Zumbusch, Fall von Sklerodermie. *Wiener Klin. Wochenschrift*, 1908, S. 62.

In den folgenden Literaturnachweisen handelt es sich um einfache Demonstrationen von an Sklerodermie erkrankten Patienten:

Apert, Brac, et Rousseau. *Arch. für Dermat. u. Syph.* XCII, S. 478.

Balzer et Golup, *Idem*, XC, p. 225.

Becker, *Deutsche mediz. Wochenschr.*, 1907, S. 1378.

Beermann und la Roche, *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, XCVII, S. 110.

Brulow, *Deutsche mediz. Wochenschr.*, 1902, S. 91.

Derselbe, *Idem* 1903, S. 174.

Delbanc, *Idem* 1906, S. 1762.

Ehrmann, *Arch. für Dermat. u. Syph.*, XCVI, S. 34.

Fäal, *Idem*, XCVI, S. 99.

Derselbe, *Idem*, XCVII, S. 115.

Fox, *Idem*, LIV, S. 147.

Fleisch, *Deutsche mediz. Woch.*, 1906, S. 2198.

Galewsky, *Arch. f. Dermatol. u. Syphil.*, LXI, p. 418.

Halle, *Deutsche mediz. Wochenschr.*, 1903, S. 901.

Heuß, *Arch. für Dermatol. u. Syphil.*, LXXXII, S. 296.

Hollmann, *Idem*, LXV, p. 266.

Jacobsohn, *Idem*, LXXXII, S. 305.

Kaposs, *Arch. für Dermat. u. Syphil.*, LII, S. 105.

Derselbe, *Idem*, LII, S. 280.

Derselbe, *Idem*, LIII, S. 299.

Derselbe, *Idem*, LIII, S. 371.

Klotz, *Idem*, LIV, S. 163.

Körte, *Deutsche mediz. Wochenschr.*, 1906, S. 1172.

Kreibitz, *Arch. für Dermat. u. Syph.*, LXII, S. 267.

Derselbe, *Idem*, LX, S. 263.

Kren, *Idem*, XCVI, S. 343.

Derselbe, *Idem*, XCVII, S. 114.

Ledermann, *Idem*, LXV, S. 250.

Lesser, *Idem*, LXVII, S. 127.

Derselbe, *Deutsche mediz. Wochenschr.*, 1901, S. 111.

Derselbe, *Idem*, 1902, S. 238.

Derselbe, *Idem*, 1904, S. 1257.

Lilienthal, *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, XCV, S. 177.

Lion, *Idem*, LIII, S. 392.

Loewenheim, *Idem*, LII, S. 395.

Mattenauer, *Idem*, LXIII, S. 263.

Derselbe, *Idem*, LXVIII, S. 439.

Müller, *Arch. für Dermat. u. Syph.*, LI, S. 308.

Müller, *Idem*, LXXXVII, S. 401.

Nekam, *Idem*, IC, S. 429.

Neurath, *Deutsche mediz. Wochenschr.*, 1906, S. 1021.

Nobl, *Arch. für Dermat. u. Syph.*, LXXXIV, S. 335.

Perle, *Idem*, LXXXII, S. 413.

Derselbe, *Idem*, LXXXII, S. 420.

Derselbe, *Deutsche med. Wochenschr.*, 1906, S. 1179.

- Pinkev, Arch. für Dermat. u. Syph., LXXVIII, 8. 286.
 Riehl, Ibidem, LXV, 8. 426.
 Rille, Deutsch. med. Wochenschr., 1906, 8. 88.
 Rosenthal, Arch. für Dermat. u. Syphil., LXVI, 8. 220.
 Derselbe, Ibidem, LXXIV, 8. 321.
 Scherber, Ibidem, LXXIV, 8. 82.
 Derselbe, Ibidem, LXXVIII, 8. 374.
 Schild, Ibidem, LXV, 8. 269.
 Schlesinger, Deutsche med. Wochenschr., 1909, 8. 2138.
 Spiegler, Arch. f. Dermat. u. Syph., LXIII, 8. 368.
 Spitzner, Ibidem, LV, 8. 285.
 Weidenfeld, Arch. f. Dermat. u. Syphil., LXXIV, 8. 316.
 Weiss, Ibidem, LIII, 8. 370.
 Zumbusch, Ibidem, LXIII, 8. 298.
 Derselbe, Ibidem, LXXXI, 8. 423.

Sechstes Kapitel.

Das akute unbeschriebene Ödem.

- Archard et Ramond, Trophodème. Revue neurolog. 1906, p. 2238.
 Adams, Chronic oedema of the face and mucous membrane. British med. Journal, 1909, II, p. 833.
 Adams, Fall von intermittierendem Ödem. Münchner mediz. Wochenschrift, 1908, 8. 1963.
 Adler, zitiert nach Fuchs.
 Alekoff, Étude anato-mo-pathologique de l'œdème bleu. Arch. d. anatol., 1906, I, p. 321.
 Allard, Klinische Beobachtungen an anaphylaktischen Anfällen nach Serum-injektionen. Berliner klin. Wochenschr., 1911, 8. 114.
 Apert et Delille, Soc. méd. des hôpitaux de Paris, 25. X. 1904. Journal de méd. et chirurg. prat., 10. XII. 1904.
 Armand et Sarvaat, La maladie de Quincke, œdème aigu angioneurotique. Gazette des hôpitaux, 1905, 41.
 Arnstam, Angioneurotic edema complicating erythema multiforme, The Canadian Lancet, 1907, April.
 Ashton, Angioneurotic edema: a report of three cases showing some interesting manifestations. Med. News., 1889, I, p. 381.
 Atkins, A case of angioneurotic edema. West London med. Journ., XI, 228—230.
 Audéoud, Un cas d'œdème des paupières chez un nourisson. Revue médicale de la Suisse Romande, Jan. 1904, p. 70.
 Baduel, Riv. critica di clinica medica, 19. X. 1905.
 Bates, Eine anid in the etiology of angioneurotic edema. Med. Record, 1909, Ed. 96, p. 293.
 Ballenger, The Medicine, February, 1896.
 Bannister, Acute angioneurotic edema. Journ. of nerv. and mental diseases, XXI, 1894, p. 627.
 Barié, Bulletin de la société méd. des hôpitaux de Paris, 30. XI. 1900.
 Barlow, Henoch's Purpura or angioneurotic edema. Brit. med. Journ., 1906, I, p. 15.
 Baureh, Angioneurotic edema; with a report of four cases. Medical Record, 1909, Vol. 56, p. 256.

- Bauer et Desbats, Trophœdème des membres supérieurs ayant débuté à la ménopause. *Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière*, 1900, p. 426.
- Darke, Zur Ätiologie d. akuten angioneurotischen oder amygdänoideen Hautödems. *Beil. klin. Wochenschr.*, 1892, Nr. 4.
- Dayet, Un cas d'œdème circonscrit aigu. *Société belge de dermatolog.*, II, p. 7, 1900.
- Dezert, Notes on a fatal case of angioneurotic oedema. *The Lancet*, 1907, II, p. 1025.
- Beck, Ein Beitrag zur Lehre des akuten neurotischen Ödems. *J. D. Heidelberg*, 1907.
- Bengué, Contribution à l'étude des œdèmes rhumatismaux. *Thèse de Paris*, 1891.
- Bérard, Un cas de trophœdème chronique. *Lyon médical*, 1906.
- Bettmann, Epidermalysid diffusa hereditaria. *Dermatolog. Zeitschrift*, X, p. 361.
- Binet, Revue de la Salpe trière, 1886.
- Birch, Note on a case of angioneurotic oedema of the tongue. *The Lancet*, 1907, I, p. 23.
- Bircher, Über akutes amygdänoidees Ödem. *Med. Klin.*, 1907, 8, 1100.
- Boss, Über periodische Neurosen des Magens. *Deutsche med. Wochenschrift*, p. 864, 1893.
- Baelt, Œdème ambulatoire non inflammatoire du voile, du palais, du pharynx, de la glotte, des lèvres, des mains et des pieds. *Revue de médecine et de pharmac. militaire*, 1879, Nr. 43.
- Du Bois-Havenith, La Pollélinique. 1886, Nr. 2, ref. *Monatsh. f. Dermatologie*, 1891, I, p. 48.
- Bärner, Über nervöse Hautschwellungen als Begleiterscheinungen der Menstruation und der Klimax. *Volkman's Hefte*, 1888, Nr. 322.
- Baeth, Œdème beim Meibom-Rasel. *Med. Record*, 1886, II. Juli, ref. *Monatsh. f. Dermat.*, 1896, II, p. 641.
- Bouman, Een val van verkregen chronisch trophœdēm. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, 1905, p. 506.
- Brabyn, Wandering oedema. *Brit. med. Journ.*, 1897, II, p. 944.
- Bramwell, Angioneurotic oedema. *Clinical studies*, 1907, V, p. 274.
- Bregman, Über zwei Fälle v. angioneurotischem Hautödem. *Wiener med. Wochenschr.*, 1896, Nr. 44, S. 1848.
- Briggs, Œdème fondroyant abdominal-pelvien simulant la rupture d'une grosse tumeur. *Journ. of Amer. med. Assoc.*, I, 10, II, 1908.
- Briand et Montfrier, Œdème éphémère des membres inférieurs, asthénogène, urémique: origine centrale de ces troubles. *Revue neurol.*, 1905, p. 1204.
- Brown, Wandering Oedema. *Brit. Med. Journal*, 1897, II, p. 883.
- Brown, Cases of angioneurotic edema. *Cardinal med. Journ.*, April 1900.
- Bukowsky, Ein Beitrag zur Lehre von der Epidermalysid diffusa hereditaria. *Archiv f. Dermatolog. u. Syphil.*, LXIII, p. 163.
- Calmann, Zur Kenntnis der Hymenischen Krankheit. *Jahrb. f. Psychiatrie*, XI, S. 45.
- Calvé, Pathogénie des œdèmes. De l'œdème aigu toxico-infectieux de la peau et des muqueuses (Maladie de Quincke). *Thèse de Paris*, juillet, 1904.
- Cardarelli, Sulle neuropatie delle estremità. *Riv. crit. d. clin. mod.*, 1900, 15, XII.
- Cartaz, Troubles vasomoteurs de la face. *Archiv. internat. de laryngolog.*, 1905, de l'astel, Œdème rhumatismal à répétition. *Annal. de dermatol. et de syphil.*, 1899, p. 302.

- Castelli, Contribution à l'étude des œdèmes aigus. Thèse de Lyon.
Cavazzini Moretti, Self-œdema acuto da angioneurosi. *Gazz. degli osped.*,
14. VI. 1892.
Chauvet, Œdèmes éphémères de nature arthritique. Séance de la société
médic. des hôp., 8. II. 1884.
Christolin, Angioneurotic edema, report of a case. *Fort Wayne Med. Journal*,
Febr. 1902.
Chittenden, *The Americ. Journ. of med. sciences*, Oct. 1888.
Chrétien, Urticaire d'origine angionévrotique avec manifestations internes.
Le Petit médical, 1904, XIX, p. 272.
Claude, A propos d'un cas d'œdème de la main supposé hystérique. *Revue
neurolog.* 1906, p. 1090.
Cohnheim, *Allgem. Pathologie*, 1882, I, p. 445.
Colin, *Bull. de l'Académie méd.*, 1879, p. 1283.
Collet et Benitter, Œdème congénital du membre supérieur. *Lyon médical*,
1903, Bd. 100, p. 545.
Colléville, Essai sur quelques variétés d'œdème sans albumine. Thèse de
Paris, 1883.
Collins, Angioneurotic edema. *Am. Journ. of med. sciences*, 1892, Bd. 104,
p. 654.
Conby, Thèse de Paris, 1902, p. 42.
Courtade, Cas d'œdème aigu. *Archiv. international de laryngolog.*, 1903,
November, December.
Derselber, Laryngite œdémateuse séropathique. *Archiv. international de
laryngolog.*, nov. et dec., 1903 et *Journal de méd. et de chirurg. pratique*, 25.
XII. 1903.
Courtellement, Tophœdème chronique. *Nouvelle iconographie de la Sal-
pêtrière*, 1905, I.
Courtois-Suffit, *Annal. d. dermat.*, 1889, No. 22.
Derselber, Œdème aigu de la peau. *Gaz. des hôp.*, 1890, 30. August.
Couty, Étude sur une espèce de purpura d'origine nerveuse. *Gaz. hebdom.*,
1876, p. 565, p. 567.
Crépin, Gérard, Les œdèmes neuroarthritiques. Thèse de Paris, 1905.
Cressy, *Presse méd. belg.*, XLIII, p. 298.
Creschi, Essai sur l'urticaire interne. Thèse de Paris, 1889.
Crezer Griffiths, Types of edema in infancy and childhood. *Med. News*,
1892, II, p. 428.
Cunze, *Arch. f. Heilkunde*, XV, 1874, p. 63.
Curschmann, Über hysterisches Ödem. *Münchener med. Wochenschrift*,
1904, 8, 180.
Curtis, Swollen and transient swellings of the lips. *East med. and surg. Journ.*,
1880, Bd. 102, p. 156.
Cutler, Probable case of acute circumscribed edema. *New York dermat.
Society, rel. Annal. d. dermat.*, 1890, p. 777.
Davaire, Contribution à l'histoire du rhumatisme. Nodosités éphémères
chron. du tissu cellulaire sous-cutané. Thèse de Paris, 1879.
Debove, De l'œdème segmentaire. *La médecine moderne*, 1897, 38.
Derselber, L'œdème segmentaire. *La presse médicale*, 1902, p. 519.
Decker, Angioneurotic edema. *Montreal med. Journ.*, XXXI, p. 507.
Delbrel, Urticaria der Respirationswege. *Journ. de Méd.*, Juli 1896.
Deschamps, Un traitement de l'œdème essentiel des paupières. *La clinique
ophtalm.*, 10. 8. 1888.
Dessors, Œdème rhumal chronique. *Soc. méd. des hôp.*, 13. II. 1891.

- Dide, Maurice, *Dermato-psychoses*. 'Reuses 1904.
- Diehl, Familiäre Auftreten von vasomotorisch-trophischen Störungen. *Monatsschrift f. Psych. u. Neurologie*, Bd. X, S. 401.
- Diethelm, Über akutes univers. angioneur. Ödem. L.-D., Zürich 1905.
- Diller, A case of myasthenia gravis complicated by angioneurotic oedema. *Journal of nervous and mental disease*, XXX, 1902, p. 229.
- Dinkelacker, Über akutes Ödem. L.-D., Kiel 1882.
- Dön, A case of Henoch's purpura associated with angioneurotic oedema. *The Lancet*, 1905, II, p. 523.
- Dön, A case of Henoch's purpura associated with angioneurotic oedema. *The practitioner Journ.*, 1908.
- Douglan, Sulla malattia di Quincke e sulla sua analogia coll'artrosia. *Riforma med.* XXIII, 1907, p. 589.
- Dayes, Étude des altérations histologiques des nerfs périphériques dans les oedèmes chroniques. *Gazette des hôpitaux*, 1905, p. 33.
- Douglas, A case of angioneurotic oedema. *Journ. of laryngol.*, XX, p. 467. Mc. Dowell, zit. nach Whiting.
- Doyne, zitiert nach Pacht.
- Darman, Acute circumscribed cutaneous oedema. *Brit. med. Journ.*, 1899, I, p. 422.
- Draper, *Clinical lectures on the palsy*. New York 1875, I, p. 319.
- Dreyfus, Lucien, Des oedèmes vasomoteurs à la face. Thèse de Lyon, 1900.
- Drummond, Alcoholic oedema. *British med. Journal*, 1897, 25. März.
- Duckworth, *Brit. Journ. of dermatology*, 1899.
- Dufour, Oedème hystérique de la main, de l'avant bras et du bras. *Revue neurolog.*, 1902, p. 624.
- Duvernay, Sur un cas d'oedème angioneurotique de Quincke. *Lyon médical*, Bd. 114, p. 496.
- Ebstein, Über akute anisokrische Hauterkrankungen mit angioneurotischer Basis. *Vierteljahr Archiv*, 174, S. 198.
- Edgeworth, Hysterical paroxysmal oedema. *British med. Chirurg. Journ.*, XII, p. 61.
- Edwards, Acute enlargement of the thyroid gland—angioneurotic oedema. *Intern. med. Magaz.*, I, p. 242 (nach Collins).
- Einis, Über einen Fall von Erxema reflexum s. neuroticum in Kombination mit Urticaria. *Deutsche Mediz. Ztg.*, 1909, S. 426.
- Elliot, *Journ. of cut. and genito-urin. dis.*, 1888, I, p. 12.
- Derselbe, Acute circumscribed oedema. *Med. Record*, 16. V, 1892.
- Evans, Some cases illustrating the influence of heredity in angioneurotic oedema. *Guy's Hospit. Rep.* 1904, LVIII, p. 111.
- Emmingshaus, *Wes. u. Kgl. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch.*, Leipzig, 21. VII. 1873.
- Erichson, zit. nach Joseph.
- Erdhwailler, Über die im Gefäßnetz Blauklotz-Darmknoter beobachteten Hautödem unbekannter Ursprungs. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1905, 22, S. 870.
- Étienne, Oedème aigu essentiel localisé sans phénomènes généraux. *Gaz. hebdom.*, 1894, 29.
- Étienne, Des trophodèmes chroniques d'origine traumatique. *Nouvelle iconographie de la Salpêtrière*, 1907, p. 148.
- Derselbe, Les oedèmes aigus essentiels. *Société méd. des hôpitaux de Paris*, 21. XII. 1909.
- Evans, A case of angioneurotic oedema (Gardner's disease) associated with pregnancy. *Lancet* 1895, I, p. 1871.

- Fabre, *on. rach. Gilles de la Tourette*.
 Fairbanks, *Hereditary oedema*. *Amer. Jour. of med. sciences*, 1904, p. 877.
 Faisans, Thèse de Paris, 1882.
 Falcore, *Rivista venet. dell. scien. med.*, Sept. 1887.
 Favre, Deux cas d'oedème rhumat. essentiel. *Arch. d. méd. et de pharm. milit.*, 1892, p. 507.
 Feilchenfeld, *Deutsche mediz. Wochenschr.*, Vereinsbeilage, 1903, S. 110.
 Feindel, Le trophodème chronique. *Gaz. hebdom. d. méd.*, 1902, p. 157.
 Féré, Note sur quelques cas d'hydrarthrose intermittente neuropathique. *Rev. de chirug.*, 1896, p. 616.
 Derselbe, Urinaire d'origine alimentaire limitée aux parties non paralysées dans un cas d'hémipégie infantile. *Revue neurolog.*, 1902, p. 717.
 Derselbe, Oedème post-épileptique. *La Belgique médicale*, 1901, p. 45.
 Féréal, Nodosités cutanées sphéroïdes chez les arthritiques. *Gaz. des hôp.*, 1883, p. 1045.
 Finck, Über Urticaria. *Wiener medizin. Blätter*, 1906, 29 u. 21.
 Fitzgerald, *Edinb. hosp. reports*, 1901.
 Fallet, Oedème neuropathique catolentil à des poussées d'oedème angioneurotique. Thèse de Paris, 1895.
 Farsberg, *Hygiea*, 1892, Janvier.
 Fretsch, Oedème héréditaire congenital persistant à un membre inférieur. *Proceed. of the royal Society of Medicine II*, January 1903. Clin. Section, p. 53.
 Freudenthal, Über eine metastatische auftretende Schwellung d. Parotis und ihr Fortbleiben während d. Schwangerschaft. *Berl. klin. Wochenschrift*, 1893, XI, S. 880.
 Fritz, *Rec. méd. des hôp.*, 25. XI. 1883.
 Derselbe, *Bullet. méd. and surg. journal*, 1903-1904.
 Fuchs, Über Epidermitis perior. fugax. *Grades Arch. f. Ophthalmol.*, XII.
 Gagnani, Oedème hystérique etc. *Rev. neurolog.*, 1898, p. 788.
 Galliard, Oedème idioopathique aigu des paupières. *Société méd. des Hôpitaux de Paris*, 1900.
 Galatti, Ein Fall von Oedem d. Haut und des Gehirns. *Wien. med. Wochenschrift*, 1896, XV, S. 890.
 Garrel, *Rev. de laryng.*, Bordeaux, 1892.
 Garrel et Bonnamour, De l'oedème laryngé angioneurotique, localisation de la maladie de Quincke au larynx. *Annales des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx*. Juillet, 1901.
 Le Gendre, Oedèmes intermittents du visage et des extrémités etc. *Soc. méd. des hôp. d. Paris ref. Annal. d. dermat.*, 1890, p. 779.
 Gergens, Über d. Verminderung d. Gefässwände b. ausgeprägtem Tetan. *Pflügers Arch.*, XIII, p. 169.
 Gevaert, En cas d'oedème angioneurotique. *Rev. mensuelle d. malad. de l'enfance*, XII, 1894, p. 369.
 Gibson, Case of angioneurotic oedema with history of injury of the head. *Lancet*, 1898, II, p. 300.
 Glorieux, Volumineux oedèmes de l'avant-bras et de la main. *Revue de neurolog.*, 1910, p. 242.
 Gueda, Beitr. z. Lehre d. spinalen Oedems u. d. Arthropathien bei Syringomyelie. *Mitt. u. d. Grenzgeb. z. Clin. u. innere Med.*, IV, p. 740.
 Goltz, *Deutsche med. Wochenschr.*, 1889, S. 225.
 Goudet, Unusual case of angioneurotic oedema. *Amer. Med.*, January 1908.
 Graham, *Canadian Practitioner*, 1888, p. 33.
 Derselbe, *Annal. of Hygiene and Pathol.*, April 1894.

Grant, Angioneurotic oedema. *Proceed. of the royal society of Med., laryng.* section 1909, II, 7, p. 124.

Graves, Zit. nach Curtis.

Griffith, Remarks on a case of hereditary localized oedema proving fatal by laryngeal obstruction. *British med. Journal* 1901, I, p. 1439.

Griffith and Newcome, *Transact. of the Assoc. of Americ. Physic.*, XII, p. 411.

Gruss, *Wiener med. Blätter*, 1887, S. 26.

Guinon, A propos du tœdème congénital. *Soc. d'obstétr.*, II, 3, 1907, rel. *Rev. neurol.*, 1907, S. 101.

Gunn, Zitiert nach Fuchs.

Hahn, Beitrag zur Pathogenese der transitorischen Aphonie bei Typhus abdominalis, und ihre Beziehung zum akuten circumscribten Ödem. (*Hydrops hypostrophos*). *Wiener klin. Wochenschrift*, 1904, S. 1239.

Hallgrén, Oedèmes névropathiques. *Rev. médic. d. Normandie*, 1906, p. 263.

Hallcock, *Annals of laryngology, otology and ology*, November 38.

Hallepeau, Sur un cas d'oedème chronique d'origine utérine. *Ann. de dermat.*, 1901, p. 320 u. 1893, p. 192.

Derselbe, Deuxième note sur un cas de congestions œdémateuses paratuberculeuses incessamment récidivantes. *Ann. d. dermatol.*, 1898, p. 568.

Hallstedt, Case of probable persistent angioneurotic edema of the larynx and soft palate. *The Laryngoscope*, November 1908.

Derselbe, Angioneurotic edema involving the upper respiratory tracts. *Am. Journ. of med. Sciences*, 1905, p. 883.

Hamburger, Untersuchungen über die Lymphbildung, insbesondere bei Muskelskler. *Zeitschr. f. Biologie*, XXX, 1894, p. 141.

Derselbe, Z. Lehre der Lymphbildung. *De Bois' Archiv*, 1895, p. 394 u. 1897, p. 132.

Handwerck, Karzinomales Ödem der Sehnervenpapille eines Auges, eine Lokalisation des akuten unschriebenen Ödems. *Münchener med. Wochenschrift*, 1907, 47.

Harshitz, Akutes paroxystisches Ödem mit tödlichem Verlauf. *Münchener med. Wochenschr.*, 1911, Nr. 48.

Harrington, Boston med. and surg. Journal, 1900, Bd. 152, p. 363.

Harris, Myopathia avec oedème général et albuminurie. *Proceed. of the royal society of médecine*, II, 1909, 7.

Hartzell, *Univ. med. Mag.*, 1890.

Hassel, Angioneurotic edema, *Transact. med. Society, New York*, II, 1905, p. 543.

Haynes, A case of angioneurosis of the face. *New York med. Journ.*, 1897, p. 851.

Heidenhain, Versuche und Fragen zur Lehre von der Lymphbildung. *Pflügers Archiv*, XLIX, S. 299.

Heller und Schultz, Über einen Fall hysterisch veranlagter Blasenbildung. *Münchener med. Wochenschrift*, 1909, S. 2112.

Henning, Über das chronische Trophödem. *J.-D.*, Heidelberg 1906.

Hensck, Vorlesung über Kinderkrankh., VIII. Aufl., S. 452.

Hertel, Ein Fall von akutem angioneurotischem Ödem. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1905, 47, S. 1863.

Hertoghe, Contribution à l'étude du tœdème chronique. *Revue Iconographique de la Salp.*, 1901, S. 426.

Hers, Periostritis angioneurotica. *Centralbl. f. innere Mediz.*, 1908, 12.

Hertzog, Rhinitis vasomotoria. *Gaz.* 1896.

- Higier, Akutes und chronisches Ödem bei naschem Nerven, insbesondere bei Hysterie. *Petersb. med. Wochenschr.*, 1894, Nr. 10, S. 443.
- Hirtz, La maladie angio-neurologique. *Bullet. méd.*, 1901, 25, XII.
- Holmes, Case of acute local edema complicated with purpura and ulceration. *Brit. med. and surg. Journ.*, 1891, Bd. 124, p. 481.
- Holstschiner, *Allg. mediz. Centralblatt*, 1885, S. 1935.
- Hops et French, Œdème périmant labiale des jambes avec exacerbations sigues. *Neur. Journ., de la Salpêtr.*, 1908, 3.
- Horsley and Hargreaves, *Brit. med. Journ.*, 1893, I, p. 111.
- Hoswilt, Three cases of anastis edema following traumatische. *Med. News*, 1892, I, p. 435.
- Huchard, Die arthritischen Ödeme. *Rev. gén. de chir. et de thérap.*, 20, XII, 1895.
- Härble, Bemerkungen zur Arbeit Paglieros. *Wägers Archiv*, LXXII, p. 618.
- Jacob, Remarks on unusual forms of localized edema. *Brit. Journ. of dermat.*, 1890, p. 155.
- James, *Lancet*, 1896, II, p. 1766.
- Jamieson, Acute circumscribed cutaneous edema. *Edinburg. med. Journ.*, 1888, I, p. 1090.
- Johnson, A case of polystictic quiet effusion. *The Lancet*, 1905, I, p. 1717.
- Johnston, *Am. Journ. of obstet.*, 1885.
- Joseph, Über akutes unsehr. Hautödem. *Beil. W. Wochenschr.*, 1890, Nr. 4.
- Derselbe, Über Urticaria. *Strophilus infantum* und Prurigo. *Archiv f. Kinderheilk.*, XXXVIII, I.
- Juller, *Cincinnati Lancet and Observer*, 1878, nach Ocker.
- Kalberlah, Ärztlicher Verein zu Frankfurt a. M. *Münchener med. Wochenschrift*, 1900, S. 1974.
- Te Kamp, Ein Fall von doppelseitigen Hydrops genas internationa. *Deutsche med. Wochenschrift*, 1907, 12.
- Kapost, Artikel Urticaria. *Lehrb. d. Hautkrankh.*, V. Aufl., 1900.
- Keefe, Some observations on urticaria with two cases of irregular edema complicating malaria. *Brit. med. and surg. Journ.*, Bd. 120, p. 451.
- Keiling, Ein Fall von familiären periodischen Anfällen von Erbrechen und Diarrhoe und vasomotorischen Störungen. *Zeitschrift f. klin. Medizin*, 1896, XIX.
- Klemeniewicz, Sitzungs-Berichte d. k. k. Akad. der Wissensch., Juli 1885, Bd. 84.
- Kirk, Case of myxoedema with recurrent acute edema of the lips, tongue, and soft palate. *Glasgow med. Journ.*, 1894, I, p. 75.
- Kirich, L-D., Greiswald 1889.
- Klippel et Monnier-Vinard, Œdème chronique unilatéral. *Revue neurolog.*, 1907, p. 618.
- Koster, Ein Fall v. Hydrops utricul. internitt. *Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde*, II, p. 464.
- Kohn, Angioneurotic edema, report of a case with a review of the literature. *Americ. Medic.*, Dec. 1903.
- Kohnstamm, Verhandl. der deutschen dermatolog. Gesellschaft, X, S. 344.
- Kraus, Ein Fall v. postglomeruläres Lähmung mit eigenartigen Ödemen. *Archiv f. Kinderheilk.*, Bd. 50, 1899, S. 259.
- Kreibitz, Die angioneurot. Entzündung. *Wien* 1905.
- Kreibitz und Kohlsch, Experimenteller Beitrag zur psychischen Urticaria. *Archiv f. Dermatolog. u. Syphil.*, 1890, S. 187.
- Kucera, Ein Fall von Urticaria und Grund psychischer Störung. *Wiener med. Presse*, 1905, 42, S. 2252.

Kuhn, Ein Fall von schwerem angioneurotischem Ödem. Berl. klin. Wochenschrift, 1909, 419.

Küll, Familiäre Erkrankung an akutem untheilbarem Hautödem. Mediz. Klinik, 1909, 5, 1930.

Kürbitz, Über einen Fall von akutem untheilbarem Ödem bei Tabes dorsalis. Münchener med. Wochenschrift, 1906, Nr. 34.

Küssner, Über hydrop. Anschwellungen anklaren Ursprungs. Berl. klin. Wochenschr., 1889, Nr. 16.

Laignel-Lavastine et Paul Thion, Syndrome de Binswanger chez une gélénuse avec trophodème. Rev. neurol. 1905, p. 1216.

Laker, Note über d. Auftreten von Gesichtödem nach hypnotischem Schlaf. Berl. klin. Wochenschr., 1885, Nr. 49.

Laufgräf, Verhandlg. d. laryngolog. Gesellsch. z. Berlin, Bd. 6, p. 8.

Laurier, Trophodème chronique chez une Épileptique. Lyon médical, 10, 4, 1894.

Lannois, Une observation de trophodème chronique héréditaire. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, 1900, p. 631.

Lannois et Laroze, Trophodème hystérique. Journal des praticiens, Lyon, 31, XII, 1904.

Larlet, Trois observations d'urticaire palédique. Ann. de dermat., 1883, p. 234.

Larlet-Jacob, Deux cas de trophodème chronique héréditaire. Revue neurolog. 1902, p. 273.

London, Berl. klin. Wochenschr., 1880, Nr. 2.

Liedermann, Dermat. Verein in Berlin, ed. Monatsh. f. Dermat., 1892, 1, p. 521.

Lemaire, Œdème aigu angioneurotique (maladie de Quincke). Echo méd. du Nord, X, 1906, p. 229.

Lemann, Purpura rheumat. with angion. edema and visceral crises. New Orleans Med. and surg. Journ., Okt. 1909.

Lepage, Œdème névropathique, œdème hystérique. Rev. méd. d. Normandie, 1906, p. 395.

Lesser, Leich. d. Hautkrankh., IV. Aufl., 1888, S. 124.

Leven, Névrose liée à la dyspepsie et à la dilatation de l'estomac. Gaz. méd. de Paris, 1881, 86.

Lévi, D'une forme hystérique de la maladie de Raynaud et de l'érythromélie. Arch. de neurologie, XIX, 1895.

Levin, Nord. med. Ark., 1874, VII, 10.

Lewinski, Zur Pathol. d. Nerv. sympathicum. Berl. klin. Wochenschrift, 1885, S. 555.

Lewis, A remarkable angioneurosis of the tongue etc. New York med. Journ., 1888, II, p. 494.

Leyden, Über periodisches Erbreehen. Zeitschr. für klin. Medizin, IV, S. 903.

Loder, Angioneurotic edema. Médecine Detroit, 1898, IV, p. 300.

Loeb, Physiologische Untersuchungen über Jodwirkungen. Zur Theorie des Ödems. Pflügers Archiv, LXXI, S. 465.

Loewenbreim, Über urticarielles Ödem. Berliner klin. Wochenschrift, 1903, 46, 8, 1900.

Loimann, Wieser med. Wochenschr., 1888, Nr. 27.

Long, Examen histologique des teguments et des nerfs nerveux dans un cas de trophodème congénital. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, 1907, p. 155.

Lovett, Acute circumscribed edema. Boston med. and surg. Journal, 1890, Bd. 123, p. 499.

- LaVing, Angioneurotic oedema. New York med. Journal, 1907, 10. VIII.
- Lubinski, Pseudoperitonitis angioneurotica. Centralbl. f. innere Mediz., 1908, 18.
- Mabille, Observation de trophœdème. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, 1901, p. 304.
- Mader, Kasuistische Mitteilungen. Zeitschr. für Heilkunde, 1900, p. 326.
- Maubruner, Un cas d'œdème des mains chez un mélancolique. La tribune médicale, 26. VIII. 1896, p. 696.
- Mausberg und Donath, Über paroxysmale Hirnoplethmie. Deutsch. Arch. für Min. Mediz., Bd. 45, 3 u. 4.
- Maxon, Oedème aigu bilatéral, œdème de Quincke. Arch. d. méd. et pharm. mil. LI, p. 184.
- Marinova, De la main enroulée. Nouv. iconogr. d. l. Salpêtr., 1897, p. 84.
- Maisterman, A case of wandering oedema probably of septic origin. Brit. med. Journ., 1897, I, p. 886.
- Matas, New Orleans med. Journal, October 1897.
- Mathies, Sur une forme particulière d'œdème névropathique. Annal. de dermat., 1892, p. 11.
- Dervelle, Sur une forme particulière d'œdème névropathique. Gaz. d. hôp., 1890, p. 721.
- Mathieu et Sikora, Gaz. des Hôpitaux, 1898, p. 720.
- Mathieu et Veil, Étude sur certains œdèmes névropathiques. Arch. général. de médecine, 1886, I, p. 658 und II, p. 721.
- Mauds, Oedema in Graves' disease. Practitioner 1891, II, p. 401.
- Mauthner, Intern. Zeitschr. f. Heilkunde, XI, 12—14.
- Meachen, Angioneurotic oedema. Med. Times and Hosp. Gaz. XXXV, 8, 72.
- Meige, Le trophœdème chronique héréditaire. Nouv. iconogr. d. l. Salpêtr., 1891, p. 455.
- Meige, Sur le trophœdème. Nouv. iconographie de la Salp., 1901, p. 463.
- Dervelle, Migraine ophthalmique, hémiparésie et aphasie transitoires, hémiface œdémateuse, photophobie et tic de clignement. Revue mensuel., 1904, p. 961.
- Mendel, F., Das akute circumscripte Ödem. Berl. klin. Wochenschrift, 1902, 8, 1128.
- Meitner, Journ. of the Am. med. assoc., 24. Oktober 1896.
- Meyerhoff, Eine seltene Form von Magenödem. Deutsche mediz. Wochenschrift, 1881, 8, 710.
- Milhan, Troubles trophiques dans l'intoxication aiguë par l'oxyde de carbone. Gaz. des hôp., 21. XI. 1895.
- Millard, Des œdèmes dans la maladie de Basedow. Thèse de Paris, 1888.
- Milroy, An undescribed variety of hereditary oedema. New York med. Journ., 5. XI. 1892.
- Milton, On giant urticaria. Edinb. med. Journ., Decbr. 1876, p. 543.
- Minsch, Rivista venetiana dell. scienz. med., 1887, I.
- Möbius, Behandlung der vasomotor-troph. Neurosen. Pynakht-Stützungs Bandh., I. Aufl., Bd. V, 8, 433.
- Modinoy, Sur l'œdème angioneurotique ou maladie de Quincke. Gazzetta degli ospedali e delle cliniche. IX, XII, 1901, rel. Revue mensuel., 1902, p. 577.
- Montini, Sur un cas d'œdème trophique guéri par la méthode de Chiquet. Travaux d. mensuel. chirurgicale, VII, p. 139.
- Mooney, Detroit med. age, XIV.
- Moore, Zitiert nach Schlesinger.
- Morichau-Brauchant, Les œdèmes aigus circonscrits de la peau et des muqueuses. Arch. de la dermat. et de syphil., 1896, 1.

Merchau-Bauchant et Landry, Bulletin de la société méd. des hôpitaux de Paris, 28. XII. 1905.

Morris, Angioneurotic oedema. Report of two cases with the histology of a portion of the gastric mucosa obtained by the stomach-tube. Americ. journal of the med. Association, Nov., 1904, p. 812.

Derselbe, Final note on case II of angioneurotic oedema. Amer. Journ. of med. science, 1905, p. 382.

Moxon, Med. Times and Gazette, 3. II. 1878.

Moyer, Chronic hereditary trophoedema. Journal of nerv. and ment. disease XXXI, p. 331.

Müller, G., Der ärztliche Praktiker, 1891, Nr. 27. (Nach Schlesinger.)

Müller, Hermann, Über paroxysmales angioneurotisches Lungenödem. Korrespondenzblatt f. Schweizer Ärzte, Juli 1892.

Mumford, Angioneurotic oedema. Boston med. and surg. Journ., 1891, Bd. 124, p. 234.

Napier, Acute localized oedema. Glasgow med. Journ., 1899, I, p. 130.

Nagel, Œdèmes éphémères de nature arthritique. Progrès médical, 1884, p. 845.

Nonne, M., Ein Fall von Elephantiasis congenita hereditaria. Virchows Archiv, Bd. 123, p. 189, 1892.

Nordmann, Œdème aigu des paupières. Société méd. des hôpitaux de Lyon. Lyon médical 23. 4. 1905, p. 921.

Norton, Angioneurotic oedema. New York med. Journal, 1897, I, p. 160.

Onuf, Angioneurotic oedema and allied conditions; report of seven cases. Med. Record, 1899, Bd. 56, p. 183.

Oppenheim, Lehrb. d. Nervenkrankheiten, V. Aufl., S. 1526.

Oppenheimer, Die Fälle akuten umschriebenen Hautödems auf alkoholischer Grundlage. Deutsch. med. Wochenschr., 1886, S. 47.

Oppenheimer, Urticaria and acute circumscribed oedema. Lancet, 1886, II, p. 170.

Urmstedt, Transactions of the ophthalm. soc., VII, p. 101.

Oster, Hereditary angioneurotic oedema. Am. Journ. of med. sciences, Bd. 65, 1888, p. 362.

Oster, Les manifestations viscérales du groupe des érythèmes. Médecine moderne, 1904, 4.

Ostrowski, s. d. nach Cohnheim.

Otto, Petersb. med. Woch. 1896.

Ouvry, Contribution à l'étude des œdèmes aigus. Thèse d. Paris, 1905.

Overton, Über d. Mechanismus der Resorption u. der Sekretion. Handb. d. Physiologie, herausgeg. von Nagel, II, 1, 868.

Packard, E. A., Arch. of pediatrics, Oktober 1899.

Palmer, Urticaria acuta. Boston med. Journ., 1902, I, p. 825.

Parhon, C. et Cazacuon, Sur un nouveau cas de trophoedème chronique. Considérations sur l'étiologie et la pathogénie du trophoedème. Nouvelle iconographie de la Salp., 1907, Nr. 6, p. 448.

Parhon et Florin, Sur un cas de trophoedème chronique. Nouvelle iconographie de la Salp., 1907, p. 159.

Parker, Ch. A., Œdème angioneurotique chez un homme de 48 ans. Proceed. of the royal society of medicine, II, 2, Laryngolog. section, December 1908.

Pascher, s. d. nach Bürgel.

Perraud, Epithemal congestive tumors of the skin. Annal. d. dermat., 1899, p. 163.

- Pétrez, Deux cas d'ophtalmoglye bulbeuse. Bull. d. l. Soc. des scienc. médic. et. Rev. neurol. 1905, p. 233. Bocarist, 1904, 2.
- Pietzer, Deutsche med. Wochenschr., 1890.
- Potain, Des nerfisme und arthritischen Ödeme. Ref. Monatsh. für Dermat., 1897, II, S. 342.
- Poussier, Œdème catarrhal aiguë d'origine vasculaire. St. Petersburg 1905.
- Prior, A case of angioneurotic oedema. Austral. med. Gazette, 29, III 1905, p. 117. Ref. Archiv. de Dermatolog. et Syph., Mai 1906.
- Prothau, Diéphantis du membre inférieur droit. Lyon médical, 1895, 21.
- Pugliese, Beiträge zur Lehre von der Lymphbildung. Pflügers Arch., LXXII, S. 981.
- Quincke, Über akutes unbeschriebenes Hautödem. Monatsh. für prakt. Dermat., Juli 1887.
- Quincke und Gross, Über einige seltene Lokalisationen des akuten unbeschriebenen Ödems. Deutsche med. Wochenschr. 1901, S. 102.
- Rabitch, Ein Beitrag zur Kenntnis der akuten Hautödeme. Wiener med. Wochenschr., 1896, 16.
- Rab, Ein Beitrag zur Kenntnis des akuten unbeschriebenen Hautödems. Münchener med. Wochenschrift, 1902, 8, S. 318.
- Rapin, De quelques formes rares d'urticaire. Rev. de la science médicale, 1886, p. 672.
- Reissner, Sur une forme d'hypertrophie des membres (Dystrophie congestive myopathique). Nouv. boung. d. la Salpêtr., 1901, p. 451.
- Reissner, Des angioneurotiques hémipares. Genève 1898.
- Raven, Angioneurotic oedema of the tongue. British med. Journal, 1911, II, p. 1886.
- Reitmann, Fall von Quinckeschem Ödem. Wien. dermat. Gesellsch., 25, XI 1908.
- Rimond, Des crises gastro-nerveuses. Arch. général. de méd., 1889, 140.
- Romak, Ödem der akuten Katarrhen auf späterer Basis. Berl. klin. Wochenschrift, 1891, 2.
- Rosenin, Skin eruptions in hysteria with the report of a case of urticaria. Amer. Medicine, 22, III 1907.
- Rouch, Nouveau dictionnaire encyclop. des sciences méd., art. polyp. morphol.
- Rusakov, Semaine méd., 1899, 42.
- Rühl, Über akutes unbeschriebenes Ödem d. Haut. Wiener med. Presse, 1888, 11—13.
- Robinson, Fugitive oedema of eye lids. Brit. med. Journ., 1888, I, p. 1008.
- Rockwell, A case of angioneurotic oedema. Medical Record, 1910, p. 743.
- Roger et Toulé, Sur la pathologie de l'œdème. C. R. de la Soc. d. Biol., 27, VII 1895, p. 415.
- Rogowitz, Beiträge z. Kenntnis d. Lymphbildung. Pflügers Arch. XXXVI, S. 222.
- Rollefsen, Perinatal hereditary oedema of the lower limbs. Tas. Lancet, 1901, II, p. 805.
- Rosé, A case of angioneurotic oedema. Albany med. annals, XXIII, p. 491, 1902.
- Rouss, Soc. méd. des égar., 14 II, 1898. Ref. la semaine médicale, 1898, p. 19.
- Rosenfeld, Zur Kenntnis der vasomotorisch morphischen Neurina. Gesamte. f. Neurologie u. Psychiatric, 1903, S. 465.

ROSTENVITZ, Sur un cas de trophodème circonscrit à un orteil. Thèse de Bakou, 1903.

Roth, *Pellagra*, 1886, p. 484.

Roth, *Archiv. de med.*, 1888.

Roth, Über akutes Hautödem. I-D., Erlangen 1902.

Roux, Du trophodème dans l'érythème et l'épilepsie. Thèse de Lyon, 1904.

Rumpel, *Ärztliches Verein Hamburg*, 27. VI. 1909. *Beit. Münchener med. Wochenschr.*, 1909, S. 965.

Russel, Report of a case of acute circumscribed oedema of the skin. *Journal of dermatology etc.*, 1895, XI, p. 103.

Sainton et Voisin, Contribution à l'étude du trophodème. Nouvelle iconographie de la Salp., 1904, p. 189.

Salgues, Des oedèmes aigus localisés multiples et transitoires. Thèse de Bordeaux, 1904.

Salles, Oedèmes éphémères de nature arthritique. *Journal. de méd. et chir. prat.*, Nov. 1888.

Sammel, *Artik. Hydrops*. *Eisenberg's DoctoresMag.* III. Aufl. Bd. XI, p. 125.

de Santi, A case of angioneurotic oedema of larynx with recently developed difficulty in breathing. *Annals of the Laryng. Society of London*, 1902, III, p. 57.

Sattler, *Die Rachenkrankheit*, Leipzig 1909, S. 298 u. 300.

Scalco, Disturbi vascolari — edema circoscritto della faccia e delle mani. *Riv. clin. e teraput.*, Mai 1890.

Schlesinger, Das akute umschriebene Ödem. *Sammeltext: Contrah. c. d. Genesgebieten d. Mediz. u. Chirurgie*, I, 1895, Nr. 5.

Schlesinger, *Die Strömungskörn.* Wien 1895. II Aufl. 1902.

Schlesinger, Über die funktionelle Form d. akuten symmetrischen Hautödems. *Wien. Abh. Wochenschr.*, 1898, Nr. 14.

Schlesinger, Beiträge z. Klinik der Rückenmarks- und Hirnhäuten. *Jena* 1896, S. 116.

Schlesinger, Hydrops hypostrophus. Ein Beitrag z. Lehre d. akuten angioneurotischen Ödems. *Munch. med. Wochenschr.*, 1899, Nr. 35.

Schlesinger, Hydrops hypostrophus und Hydrops articular internuncius. *Mon. u. n. Genesgebieten der Medizin und Chirurgie*, V, 1900, p. 441.

Schlesinger, E. Akute umschriebenes Ödem (Quincke) kombinert mit Psychosenalgie. *Medizin. Klinik*, 1900, 4.

Schlichter, *Krankungen der Gefäße*. *Nothnagel's spec. Pathol. u. Therapie*, XV, 1902, Teil 2.

Schwarz, Angioneurotic and other essential edemas in children. *Medical Record LXXI*, p. 625.

Schwidop, Rhinitis vasomotor. *Surg. Clin.*, I, 1902, p. 199.

Schikavitch, Angion. edema with report of a case. *Arch. of Pediatr.*, 1909, p. 512.

Senator, Über intermittierende Gelenkversteifung. *Chancensamml.*, XXI, 1896.

Senlecq, Un cas de trophodème circonscrit chez un nouveau-né. *Rev. neural.*, 1907, p. 458.

Shanklin, Oedema aigu du pommex comme complication de la crise de l'épilepsie. *New York medical Journal*, 1906, p. 54. *Beit. Rev. neu.*, 1906.

Sigard et Laignel-Lavastine, Trophodème chronique aigu et progressif. *Nouv. Iconogr. de la Salp.*, 1903, p. 33.

- Simonin, Œdème aigu circonscrit de la face et ictérique généralisé chez un dément adhésif. *Gaz. d. hôp.*, 1909, p. 1746.
- Slifer, Angioneurotic edema. *Philad. med. Journ.*, 1889, July 29.
- Ramsay Smith, A case of angioneurotic edema. *Lancet*, 1884, II, p. 76.
- Derselbe, Angioneurotic edema. *Practitioner*, 1894, I, p. 259.
- Smith, Report of several cases of angioneurotic edema. *Medic. News*, 1889, I, p. 320.
- Derselbe, A case of wandering edema. *British med. Journ.*, 1901, 1903.
- Smith and Henry, Acute circumscribed edema. *Arch. of pediatr.*, May 1906.
- Snow, A., Guttie neurosis in children. *Arch. of pediatr.*, 1893, Dec.
- Solis-Cohen, Vasomot. Alaxis: a contribution to the subject of Histiocytosis. *Am. Journal of med. scienc.* 1884, Bd. 292, p. 130.
- Derselbe, Visceral angioneurosis. *New York med. Journ.*, 1910, 28. II, 26. II, 5. III.
- Soyez, Étude clinique sur l'œdème hystérique. *Thèse de Paris*, 1886.
- Spéville, Œdème inflammatoire aigu essentiel de la paupière supérieure chez l'enfant. *Journal de Paris*, 1901.
- Springg, Œdème résultant de la main gauche. *Proceed. of the royal Society of Medicine*, II, 3. I. 1909, Clin. Section, p. 16.
- Stäkelin, Beitrag zur Lehre von den gastrointestinalen Autointoxikationen. *Œdema cutis dyspeptica et Asthma bronchiale dyspepticum*. *Charitéannalen*, XXXIV, 1910.
- Starkensteen, Der Mechanismus der Atemnährwirkung. *Zeitschr. f. experimentelle Pathologie und Therapie*, X, 8, 78, 1911.
- Starling, zit. nach Hamburger.
- Starr, Localized transient edema. *The New York medical Journ.* 1902, 12. September, p. 301.
- Stehriginsky, Contrib. à l'étude des œdèmes idiopathiques. *Manifester russe médical*, 1907, 20.
- Steiner, Zu Kasistik d. Quinckeschen Ödems. *Leipzig, I.-D.*, 1901.
- Stekel, Nervöse Angioödem. *Wien* 1908, 8, 94.
- Stephen, Wandering edema. *Brit. med. Journ.*, 1897, I, p. 126.
- Stern, Thoracic pericost edema of angioneurotic origin. *Medic. Record*, 24. X. 1908.
- Stölperius, zit. nach Joseph.
- Strändler, Über einen Todesfall durch das sogenannte akute umschriebene Ödem. (Quinckesche Krankheit.) *Prager med. Wochenchrift*, 1903, 8, 566.
- Strübing, Über akutes angioneurotisches Ödem. *Zeitschr. f. Wis. Mediz.* 1885, IX, 3, 287.
- Derselbe, Über *Adiposis solitaria* (Dercos) u. das *œdème blanc et bleu* Charot. *Archiv für Dermatol. und Syphil.*, LIX, 8, 151.
- Sturberg, Über die Bedeutung der Dermographie für die Diagnose funktioneller Neurosen. *Deutsches Archiv f. klin. Med.*, 88, p. 567.
- Sutherland, Deux cas d'œdème congénital du type familial. *Proceed. of the royal Society of Med.*, II, 1909, Clin. section, p. 12.
- Sykes, A vasomotoric neurosis in varying regions of the same patient. *British med. Journal*, I, p. 767, 1905.
- Talley, James Ely, Angioneurotic edema of the salivary glands. *Philadelphia med. Journal*, 1900, 20. X.
- Taylor, *Philadelphia med. Journ.*, 2. IV. 1898.
- Testelin, Des œdèmes dans la dialyse arthritique. *Thèse de Paris*, 1884.
- Texti, Œdème trochantérique et vasomoteur du membre inférieur. *Riv. crit. di clinica medica*, V, 42—44.

Tigerstedt, zit. nach Eriksen.

Tobiesen, Über Elephantiasis congenita hereditaria. Jahrbuch f. Kinderheilk., 1929, Bd. 49, S. 392.

Tropéa, Oedème des pieds chez deux imbécilles. *Neur. Jengu. d. l. Salpêtr.*, XIX, p. 95.

Tourette, Gilles de la, *Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie*. II. Ed., Paris 1905.

Troisier, Des oedèmes rhumatismaux myxomatés. *Gaz. des hôp.*, 1883, p. 1045.

Troisier et Brang, Nodulites myxomatés et le rhumatisme. *Rev. d. méd.*, 1881, p. 297.

Trousseau et Gallois, Oedème arthritique des paupières. *Presse médicale*, 1901.

Trumann, A case of angioneurotic oedema. *The Lancet*, 1906, I, p. 1535.

Tschirkoff, Oedèmes vasomoteurs sans albuminurie. *Revue de médec.*, 1935, Nr. 8, p. 625.

Uggetti, Sopra due casi di edema essenziale periodico. *Boll. delle clin.*, 1902, 12, 206.

Uhle und Wagner, zit. nach Dinkelacker.

Uhlich, Eine merkwürdige vasomotorische Neurose. *Zeitschrift f. experimentelle Therapie*, VI, 8. 311.

Uuna, Angioneurosen. *Monatsh. für Dermatol.*, 1900, I, S. 471.

Derselbe, Das nicht entzündliche Ödem der Haut. *Monatsh. f. Dermatol.*, 1909, I, p. 445.

Ullmann, Ein Fall von circumscribtem angioneurotischem Ödem mit konstativem epiletiformen Anfällen. *Arch. f. Schiffe- und Tropenhygiene*, 1899, III, S. 176.

Valentin, Über hereditäre Dermatitis bullosa und hereditäres akutes Ödem. *Berlin klin. Wochenschr.*, 1885, p. 150.

Valobra, Les oedèmes circonscrits aigus et chroniques sous la dépendance du système nerveux. *Neur. Jengu. d. l. Salpêtr.*, 1900, 2, p. 205.

Vercillo, Un caso di edema acuto angioneurotico. *Gin. med. Pisa*, 1900, p. 285.

Versacek, Contribution à l'étude de l'edème aigu paroxystique. *Bull. d. l'Acad. Royale Belgique*, XIII, p. 545, 1903.

Verriest, Oedème sévère de la peau. *Journ. d. neur.*, 1900, V, p. 489.

Verhezen, Urticaria et éruption urticaire de naupages. *La semaine médicale*, 1905, 24.

Vigoureaux, Oedème dysplasique du membre inférieur gauche. *Neur. Jengu. d. l. Salpêtr.*, 1899, 6, p. 881.

Vintras, Two cases of spontaneous oedema. *Brit. med. Journ.*, 1903, I, p. 1162.

Wagner E., *Archiv für Heilkunde*, Bd. XI.

Wagner, Beitrag z. Kasistik d. akuten angioneurotischen Ödems. *Deutsch. militär. Zeitsch.*, XXVIII, 8. 471.

Wallace, R. Angioneurotic Purpura. *Amer. Medicine*, April 1901.

Ward, Erythème et urticaire avec un état sensible à l'oedème angioneurotique causé par le fait seul de s'exposer aux rayons du soleil. *New York med. Journal*, 1905, D. IV, p. 142.

Wüster, Parkes, Oedème chronique des doigts. *Proceed. of the royal society*, 2. V. 1909.

Wüster, Parkes, So called trophoedema of the left lower extremity. *Proceed. of the royal soc. of Medicine*, 2. III. 1909. Clinical section, 52.

Weidenfeld, Über mechanische Reizbarkeit der Haut (Dermographismus).

englisch eine Studie über Adrenalinwirkung auf die Haut. Archiv f. Dermatolog. u. Syph., 19, S. 229.

Wéill et Péhu, Triphlebite chronique aux conjonctives du membre inférieur chez un enfant de onze ans. Lyon méd., Bd. 102, p. 3188.

Wende, Acute circumscribed edema associated with hemoglobinuria. Journ. of cutan. and genito-urin. diseas., 1899, p. 178.

Whiting, Atroparosthia and angioneurotic edema. Med. Rec., 1903, p. 6.

Winkelhe, Angioneurotic edema as a familial cause of sudden death. The Lancet, 1908, 7, 31.

Witkowsky, Ueber neurotische Ödeme. Jahrb. für Kinderheilk., XXV, S. 252, XXIX, S. 388.

Wiel, Harry, Angioneurotic edema of the genitals. Journal of Amer. med. Association, I, 20, p. 1908.

Wilhelm, Epidermolysis bullosa und Hydrops hypertrophicus. Wien. Med. Rundschau, 1906, Nr. 1.

William, On cutaneous disease, London, p. 451.

Williams, Wandering edema, 1900, I, p. 2640.

Wills and Cooper, Angioneurotic edema. Brain, XVI, 1893, p. 482.

Woodberg, Journal of Laryngology. Örebro, 1906.

Wright, A case of so called angioneurotic edema. Brit. med. Journ., 1906, II, p. 196.

Derselbe, Transact. Pathol. Society of London 1901, p. 304.

Wuffl, Case of acute circumscribed edema of party edg. Journ. of Amer. med. Association, Bd. 27, p. 1255.

Wynter, Edema chronic. The Lancet 1902, I, p. 446.

Yarian, A case of angioneurotic edema. Medical News, LXIX, 1896, p. 238.

Zille, Sur un cas d'œdème angioneurotique suivi de la maladie de Werlhof. Gaz. méd. Hôp. et de la clinique, 1907, p. 290.

Zilberth, De Tuedine sign angioneurotica ou maladie de Quincke. Bil. med., XXI, 1905, No. 29.

Zurloer, Über einen Fall von akuten circumscribtem sog. angioneurotischem Ödem. Archiv für Dermatol. u. Syph., 36, S. 301.

Siebentes Kapitel.

Die multiple neurotische Hautangrän.

Adrian, Fall von multipler neurotischer Angrän der Haut mit Extremitätenbowl. Österreichischer Ärzteverein in Stralburg, 1. III. 1902. Deutsche med. Wochenschrift 1902, S. 143.

Astuc, Über Syringomyelie. Bibliotheca medica, 1880.

Atkinson, Multiple cutaneous ulceration. Americ. Journ. of Med. Sciences, 1881.

Audry, Gangrène disséminée de la peau d'origine syphilitique. Ann. d. dermatol. et de syphilis, 1899, p. 296.

Ausa, Juan de, Gangrénas litymptas sécas en plaques et autres lesiones similes das Olymptas. Revista clinica de Madrid, III, 3, p. 81.

Balowsky, Quelques remarques sur le mémoire de M. Valocher intitulé: Contribution à l'étude des gangrénas cutanées spontanées chez les sujets litymptas. Nouvelle biographie de la Syphilis, 1908, 8, p. 500.

Derselbe, Quelques remarques sur le mémoire de M. Alfred Gardon intitulé: Troubles vasculaires et trophiques de l'Olymptas. Rev. neur., 1908, p. 1069.

- Balzer, Gangrènes cutanées kystiques. Soc. d. dermat. et de syph., 11. XII. 1896.
- Derselbe, Bull. d. l. Soc. de médecine des hôp., 25. XI. 1907, p. 1373.
- Balzer et Faure-Beaulieu, Gangrène cutanée kystique. Soc. d. Dermatol., 6. XI. 1902. *Annal. d. dermatol.*, 1902, p. 3034.
- Balzer et Michaux, Gangrènes multiples cutanées chez une hystérique. Soc. franç. de dermatologie, Séance de 13. I. 1898.
- Baranitz, Atanasio, Creciones cutáneas angiomatísticas simétricas chez une femme kystique. B. Pédicúlo, 10. IX. 1905.
- Baum, Ein Fall von neurotischer Dermatitis. Berl. dermatol. Gesellsch., 1895, 10, 1.
- Bayer, Contributions à l'étude de nodes gangréneux hystériques. *Journ. des sciences méd., et natur. de Bruxelles*, 1892.
- Derselbe, Gangrènes disséminées et successives de la peau d'origine kystique. *Annal. de dermatol. et de syph.*, 1894, p. 501.
- Bettmann, Hysterische Selbstbeschädigung unter d. Bilde der multiplen neurotischen Hautgangrän. *Münchener mediz. Wochenschr.*, 1905, 8. 1775.
- Derselbe, Über die Hautaffektionen der Hysterischen und atypischen Hypothesen. *Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk.*, XVIII, 8. 145.
- Binswanger, Die Hysterie, S. 685.
- Bilroth, Diskussion zum Vortrag von Neumann.
- Blandin, Gangrène spontané partielle revenant à des longs intervalles etc. *Gaz. des hôpitaux*, 1843, p. 34 (zit. nach Tannefier).
- Bon, Mendicino, XIII. *Congrès des médecins aliénés et neurologistes*, 1-6. VIII. 05. *Rev. neur.*, 05, p. 599.
- Borzecki, Ein Fall von akrotychisches symmetrisches Hautgangrän. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, 1911, CVIII, 5. 47.
- Brandweiner, Multiple neurotische Hautgangrän. *Monatshefte f. prakt. Dermatologie*, Bd. 39, 8. 241.
- Brisson et Ricard, Hystérie et troubles trophiques. *Séméiot. Biol. neurop.*, 1907, p. 625.
- Bronson, A case of symmetrical gangrene. *Journal of cut. and gen.-urinary disease*, XXI, p. 456, 1903.
- Bouchon, Considérations sur l'étiologie et pathogénie de l'ulcère rond. Thèse de Paris, 1894 (zit. nach Tannefier).
- Carle, Des gangrènes multiples et primitives de la peau. *Annales de dermatol.*, 1902.
- Passier, Über multiple neurotische Hautgangrän. *Klinisches Referat. Centralblatt f. d. Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie*, 1900, p. 161.
- Cavagnis, ref. Monatshefte f. prakt. Derm., XLIV, 8. 425.
- Chrostek, Multiple neurotische Hautgangrän. *Wiener Monatsh. d. Hautkrankh.*, II, 1905, 8. 88.
- Corlett, A case of spontaneous gangrene of the skin. *Journ. of cutan. and genito-urin. diseases*, 1897, p. 551.
- Costa, Mendes de, Gangrènes neurotiques. *Vereenig. van Nederlandsch Dermatol.*, Dec. 1897, ref. *Annal. d. Dermatol.*, 1899, p. 488.
- Craighton, Cutaneous lesions with neurotic symptoms. *Journ. of nerv. and ment. disease*, 1901, XXVIII, p. 291.
- Croquis et Bierre, Ein Fall von echter spontaner Hautgangrän mit Suggestion behandelt. *Archiv f. Dermatol. u. Syph.*, CIII, 8. 165.
- Cruyl, Soc. française de dermatol. et syph., 26. IV. 1897, ref. *Arch. für Dermat. u. Syph.*, XLV, 8. 291.

- Cutler, New York dermatol. Society, 27. IX. 1896, ref. Ann. d. dermat. et de syphil., 1897, 8. 1190.
- Dahls, Fall von multipler neurotischer Hautgangrän. Petersburger med. Wochenschrift, 1938, 8. 206.
- Denne, Fortschritte der Medizin, 1888.
- Dexter and Ellis, A study of so called spontaneous gangrene. Cleveland med. Journ., IX, 8. p. 583.
- Diffler, Gangrène symétrique des extrémités. La médecine moderne, 1894, p. 967.
- Dieulafoy, Académie de médecine de Paris, 97. 1908, ref. Monatsh. f. prakt. Dermatol., XLVII, 8. 425.
- Dinkler, Über akute multiple Hautgangrän. Archiv f. Dermatol. u. Syphil., Bd. LXXI, 8. 61.
- Doutrepoint, Über einen Fall von akuter multipler Hautgangrän. Arch. für Dermat. u. Syphil., 1896, 8. 179.
- Drevalke, Akute multiple Hautgangrän. Arch. für Dermat., XXII, 8. 285.
- Dufiz, Ulcera cutanea bei Hysterie. I-II, Jena 1905.
- Egger, Pemphigus hysteric. Corr. für Schweizer Ärzte, 1908, 8. 538.
- Ehrh, Gangraen. cat. hysteric. Wien. klin. Wochenschr., 1894, 8. 330.
- Elliot, Journal of cutan. and genito-urinary diseases, 1888, p. 521. Ref. Monatsh. für Dermatol., 1889, I, 8. 545.
- Féré, Note sur la gangr. spontan. de la peau chez les hystériques. Annal. d. l. Soc. d. Biologie, 26. V. 1894.
- Frankenberger, Fall von spontaner Hautgangrän. Münch. med. Wochenschr., 1902, 8. 2165 und 1905, 8. 196.
- Gabbi, Sopra un caso di gangrena cutanea in soggetti isterici. Giorn. ital. delle malat. ven., 1907.
- Le Gall, Contribution à l'étude des gangrènes cutanées d'origine hystérique. Rev. neur., 1902, p. 820.
- Gaucher et Barbe, Éruption pemphigique gangréneuse d'orig. hystérique. Annal. d. Dermatol., 1895, p. 27.
- Générier, Troubles vasomoteurs chez une Hystérique. Nouvelle iconographie de la Salp., 1904, p. 466.
- Geyer, Beitrag zur Lehre von den Hauterkrankungen. Archiv für Dermat. u. Syph., Bd. LXXXIV, 8. 199. (Festschrift für Neiber.)
- Gilles de la Tourette, Traité de l'hystérie, II, p. 414.
- Gardes, Troubles vasomoteurs et trophiques de l'hystérie. Revue neur., 1908, p. 845.
- Gross, Über künstliche Hautgangrän. Deutsches Archiv für Klin. Medizin, Bd. LXXV, 8. 151.
- Hackel, Petersburger med. Wochenschr., 1894, 18.
- Hallopeau, Sur une nouvelle forme de trophodermose vésicobulleuse d'origine dentaire. Bull. d. l. Société française d. Dermatol., XIX, 206.
- Hallopeau et Costensen, Sur un cas d'ulcérations trophonévrotiques liées à un oedème bleu chez un hystérique. Annal. d. dermatol. et de syphil., 1929, p. 74.
- Hallopeau et le Damany, Soc. franç. de dermat., 15. XI. 1894, ref. Rev. neur., 1905, p. 152.
- Hartinger, van, Hysterical neurosis of skin. Americ. Journ. of the medical sciences, 1897, Vol. 114, No. 1, p. 64.
- Heath, Multiple cutaneous gangrene of the scalp in a cathectic child. British med. Journ., 1897, 3. Juli.
- Hebra, Wiener dermatol. Gesellsch., 1902.

- Hensen, Münch. med. Wochenschr., 1900, S. 343.
- Hintner, Über einen Fall von multipler Hautgangrän. Arch. für Dermatol. und Syphilis, XXXVIII, S. 207.
- Hollstein, Zur Kanistik der spontanen und erworbenen Hautgangrän auf nervöser Grundlage. Deutsche med. Wochenschr., 1904, S. 1572.
- Häber, Vergleichende Untersuchungen über den histologischen Bau der Bläschen bei Herpes zoster und Herpes zoster gangrenosus. Fortschritt. Kaposi, 1906, S. 229.
- Hutchinson, Symmetrical necrophoritis without Raynaud's phenomena. Arch. of surgery, 1896, VII, 301-309.
- Janevsky und Mourak, Beiträge zur Lehre von der multiplen Hautgangrän. Arch. für Dermat. und Syph., XXXV, 1896, S. 359.
- Joseph, Über multiple neurotische Hautgangrän. Arch. für Dermatol. und Syph., XXXI, S. 321.
- Isaac, Herpes zoster atyp. hyster. Monatsschr. f. Dermat., XXVI, S. 623.
- Isacrlin, Bewegungen und Fortschritte in der Psychotherapie. Ergebnisse d. Neurologie und Psychiatrie I, S. 5.
- Jacobs, Gangraena hysterica. Arch. für Dermatol. u. Syphilis, XLII, S. 143.
- Kalb, zit. von Kaposi.
- Kaposi, Lehrs. der Hautkrankheiten. V. Aufl., 1890, S. 357.
- Derselbe, Multiple Hautgangrän. Verh. d. Wien. dermatol. Gesellsch., 1892 (zit. nach Hintner).
- Köhner, Deutsche mediz. Wochenschr., 1890, S. 504.
- Kopp, Zur Kanistik der multiplen neurotischen Hautgangrän. Münch. mediz. Wochenschr., 1886, S. 665.
- Krecker, Über die Selbstbeschädigung der Hysterischen. Münch. mediz. Wochenschr., 1896, S. 69.
- Kreibich, Zur Pathogenese kolligativer Blasen. Dermatolog. Zeitschrift, XI, H. 3, S. 315.
- Derselbe, Die angioneurotische Entzündung. Wien 1905.
- Derselbe, Über Decubitus acutus und Blasenbildung bei Nervenkrankheiten. Archiv f. Dermatologie und Syphilis, 1908, XCII.
- Derselbe, Bemerkungen zu Handwainers Fall von neurotischer Hautgangrän. Monatsschr. f. prakt. Dermat., XXXIX, 1904, S. 365.
- Lähr, Die nervösen Krankheitserscheinungen der Lepra. Berlin 1899.
- Latte, Über multiple neurotische Hautgangrän. Monatsschrift f. praktische Dermat., XXXIX, 1904, S. 189.
- Ledermann, Multiple neurotische Hautgangrän. Berl. dermatolog. Gesellsch., 1904, 14./6. Dermatolog. Zeitschrift, 1904, XI.
- Leclair, Recherche clinique et autopsiopathologique sur les affections cutanées d'orig. nerv. Paris, 1882, p. 117.
- Lesné, Soc. française d. dermatol., II, III, 1897.
- Lévy, L., Troubles vasomoteurs, congestion, pâlissement. Arch. d. Neurol. sér. IV, T. II, p. 71.
- Lewontin, Über atrophische Hautgangrän bei Hysterischen. L.-D., Berlin, 1904.
- Löblowitz, Urea neurotica mucosa uris. Archiv für Dermatologie und Syphilis, VII, 2, 3.
- Lusati, Vignolo, Beitrag zum Studium der sog. hysterischen Dermatosen. Gazz. med. Ital., 1906.
- Matsenauer, Fall von hysterischer Hautgangrän. Wiener klin. Wochenschr., 1904, S. 141.

- Holmes. A case of spontaneous gangrene of the skin in a hysterical female. *The Lancet*, 1904, II, p. 824.
- Modica. A proposito dei disturbi trofici nell' isteria. Milano 1912.
- Neumeister. Über einen Fall von Gangraena cutis multiplex neurotica. J.D., Hiesken 1903.
- Müller. Ein Fall von trophisch-neurotischer Hautgangrän. *Centrbl. f. innere Mediz.*, Wiesbaden, 1902, 8, 521.
- Derselbe. Ein Fall von multipler trophisch-neurotischer Hautgangrän. *Neurolog. Centrbl.*, 1902, 8, 521.
- Myers. Peculiar trophic affection of the skin in neuritic subject. *Pennsylv. Med. Assn.*, Aug. 1902.
- Nasrath. Über Gangren bei Hysterischen. *Wien. klin. Wochenschrift*, 1898, 8, 144.
- Neißer. Diskussion zum Vortrag von Neuburger. *Arch. f. Dermatol. u. Syphil.*, XXIV, 8, 864.
- Neuburger. Fall von Trophomycose. 66. Versammlg. deutsch. Naturforscher und Ärzte, 1895.
- Derselbe. Über den sogen. Pemphigus neuroticus. *Arch. f. Dermatol. and Syph.*, XXIV, 8, 328.
- Derselbe. Fall von neurotischer Hautgangrän. Ärztlicher Verein in Nürnberg, 29. XI. 1902, *ver. Deutsche med. Wochenschrift*, 1903, Vereinsbeilage, S. 28.
- Neumann. Ein Fall von unbeschriebener Gangrän. *Anz. der Gesellsch. d. Ärzte in Wien*, 12, 9, 25. V. 1886.
- Derselbe. Multiple neurotische Hautgangrän. *Wiener med. Wochenschrift*, 1905, 8, 178.
- Nold. Wiener dermatolog. Gesellschaft, 26. I. 1898. *Archiv f. Dermatologie und Syphilis*, XLV, 1898.
- Noyes. Trophic disorders in diseases of the nervous system. *Journal of nervous and mental disease*, XXXII, p. 723.
- Oestreich. *Dermatologische Zeitschrift*, V, 1.
- Pospolover. Trophische Störungen der Haut bei spinaler Glomerulose oder Springergrippe. *Arch. f. Dermatol. u. Syphil.*, XLIV.
- Quinquand. Lésions trophiques de la main et de l'avant-bras consécutives à une névralgie. *Annal. d. dermatol. et de syphil.*, 1890, p. 264.
- Rasch. Über hysterische Hautaffektionen. *Dermatologisches Centralblatt*, 1899, 8, 322.
- Renaut. Sur une forme de gangrène ulcéreuse et dissimulée de la peau: l'ulcère gangréneux. *La médecine moderne*, 1899, p. 161.
- Renshaw. Multiple insular necrosis of skin and subjacent tissues. *Brit. med. Jour.*, 1904, I, p. 1258.
- Ribaultin. Gangr. cut. hyster. *Mosk. f. prakt. Dermatol.*, XXXII.
- Ricard. Contribution à l'étude du pemphigus hystérique. *Thèse de Paris*, 1909.
- Rieske. Zur Kasuistik der Gangraena cutis. *Wiener klinisch. Wochenschrift*, 1899, 8, 370.
- Rieske. Gangraen. cut. hyster. *Wien. klin. Wochenschr.*, 1900, 8, 827.
- Reyrolle. Gangraen. cut. multipl. *Berichte der mediz. Gesellsch. in Leipzig. Schmidt's Jahrb.*, Bd. 257, S. 68.
- Roethliker. Ein Fall von multipler neurotischer Hautgangrän. *Wärzburg. L.-Z.*, 1907.
- Roth. Über die Ätiologie der sogen. spontanen oder neurotischen multiplen Hautgangrän im Anschluss an fünf Fälle. *Orient Beilage*, 1905, *Neurolog. Centrbl.*, 1905, 8, 438.

Desjardins, Zur Ätiologie der spontanen oder multiplen oder neuritischen und hysterischen Gangrän auf Grund von fünf Fällen. *Archiv f. Dermatologie und Syphilis*, 73, 1905, S. 257.

Rosenthal, Multiple neuritische Hautgangrän künstlicher Natur auf hysterischer Basis. *Berliner Dermatolog. Gesellschaft*, 10. V. 1904, *ref. Dermatolog. Zeitschrift*, XI, 1904, S. 155.

Rothmann, *Deutsche Medizin. Wochenschr.*, 1896, S. 164.

Rouvier, *Le syndrome méridien*, 1888, p. 419.

Sanger, *Neurot. international. Transact. of the Internat. Congr. London, 1883* (mit nach Doutréleport).

Shepherd, Einige Fälle von eingeheilten Hautverwundungen. *Monatsschrift f. praktische Dermatologie*, XXVI.

Schults, Typhus abdominal. mit symmetr. Gangrän. *Deutsch. Arch. für Klin. Med.*, XXXV, S. 183.

Schrümmer, 66. Naturforscherversammlung, Wien, 1894.

Singer, Über Spontangangrän und Simulation bei Hysterie. *Wien. med. Wochenschr.*, 1899, Nr. 25 u. 26.

Sickler, Wb., A case of trophonévrose of the hand etc. *Journal of nervous and mental disease*, 1897, p. 11.

Smith, Case of Raynaud's disease or symmetrical gangrene. *Brit. med. Journ.*, 1888, 1, p. 343.

Sorrentino, Un cas de trophonévrose dermique des extrémités inférieures coïncident avec une phase psychologique. *Annal. d. dermat. et de syph.*, 1907.

Starr, Vasomotor and trophic neurones. *The Journal of the American med. association*, 17, 7, 1910.

Staub, Zur Kenntnis des atypischen Herpes zoster. *Arch. f. Dermatol.*, 1892, XXIV, S. 241.

Strümpell, Über einen Fall von schwerer Selbstbeschädigung bei einer Hysterischen. *Deutsche Zeitschr. für Nervenheilk.*, 11, S. 356.

Stubenrauch, Über einen Fall von multipler Hautgangrän. *Munch. med. Wochenschr.*, 1896, S. 785.

Szallasy, V., Ein Fall von multipler neuritischer Hautgangrän in ihrer Beziehung zur Hysterie. *München. med. Wochenschrift*, 1907, S. 21.

Terrin, Que faut-il penser de l'intensification, des troubles vasomoteurs et des troubles cardiaques dans l'hystérie. *Le Progrès médical*, 1909, 28, p. 477.

Teschlupf, Beitr. z. Lehre von der symmetrischen Gangrän. *Arch. für Psychiatrie*, XXXIII, 1, S. 250.

Thomer, 29. Versammlg. schweizerdeutscher Irrenärzte, 25. u. 27. XI. 1899, *ref. Neurol. Centralbl.*, 1899, S. 94.

Török, Über das Wesen der sogen. Nerven der Haut. *Arch. für Dermatol. u. Syphil.*, 1900.

Toussellier, *Les gangrènes cutanées d'orig. hystér.* Thèse de Paris, 1893.

Towle, Gangraena raris hystér. *Am. Journ. of cutan. diseases including Syphilis*, Bd. 28, 1907, p. 477.


Truffi, Gangrène multiple spontanée de la peau. *Revue de médecine*, 1904, p. 992.

Truffi et Carpi, Costituzione allo stadio delle gangrene cutanee neuritiche. *Gazz. med. italica*, 1910, 2-4.

Valotia, Constitution à l'état des gangrènes cutanées spontanées chez les sujets hystériques. *Nouvelle iconographie de la Salp.*, 1908, p. 481.

Valleix, Troubles trophiques symétr. des mains et des arachides etc. *Nouv. Iconogr. d. l. Salpêtr.*, 1899, p. 294.

- Veillon, E., Contribution à l'étude des gangrènes primitives multiples du *peau*. Thèse de Lyon, 1902.
- Veillette, Un cas de gangrène cutanée d'origine kystique. *Soc. Congr. d. l. Salpêtr.*, 1895, p. 3.
- Weir Mitchell, Les lésions des ongles. Traduit par Dutro. Paris 1874.
- Wenle, Dermatitis vesicululosa et gangraenosa unguium. Report of two cases having a kystic traumatic origin. *Journal of cut. and genito-urinary disease*, 1900, XVIII, p. 548.
- Zeisler, Trophic affections of the nails. *Journ. of cutan. and genito-urin. Dis.*, Nov. 1901.
- Zengeler, Über symmetrische Gangrän (Raynaudische Krankheit). *Mediz. Korrespondenzblatt d. württemb. ärztl. Landesvereins*, LXIX, S. 171.
- Zieler, Über akute multiple Hautgangrän nebst Untersuchungen über durch reine Salzsäure hervorgerufene Nekrosen. *Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilk.*, XXVIII, S. 184.



Schemata des Aufbaus des vegetativen Systems (sympathisches System im rothen Strich)
nach GUSTAFSSON und MAYER modifiziert.

- | | |
|--|---|
| <p>— Parasympathisches System</p> <p>I. Kollateralsystem</p> <p>II. Vagus-System</p> <p>III. Sacral-System</p> | <p>— Sympathisches System (im rothen Strich)</p> <p>Ausgangslinien = präganglionäre Fasern</p> <p>Endlinien = postganglionäre Fasern</p> |
|--|---|

















































YALE MEDICAL LIBRARY



3 9002 01060 0451

Accession no.

7613

Author

Cassirer, R.

Die vasomotorisch-
tropischen

Call no. Neurosen

~~19th cent.~~

RC343

912 C

